





M



Ex Bibliotheca  
majori Coll. Rom.  
Societ. Jesu



EPITOME

# GALENI PER- GAMENI OPERVM,

IN QVATVOR PARTES DIGESTA,  
PVLCHERRIMA METHODO VNIVERSAM ILLIVS VI-  
ri doctrinam complectens: per DO. AND. LACVNAM Se-  
cobiensem, Equitem auratum, & Medicum longè excellentis-  
simum, summa fide studioque collecta.

*ACCESSERUNT EIUSDEM AND. LACU-  
NÆ Annotationes in Galeni Interpretes: quibus varij loci, in quos hactenus  
impegerunt lectores, & explicantur & summa fide restituntur.*

*Item,*

*De ponderibus & mensuris medicinalibus vtilis Commentarius;*

*Index rerum & verborum maxime memorabilium copiosissimus.*



BASILEÆ,  
PER THOMAM GVARINVM,  
M. D. LXXI.

## AD LACUNAM.

Debemus tibi plurimum *Lacuna*,  
 Quicunq; egregias amamus artes,  
 Et Coistudius sensu tenemur.  
 Tu, quicquid pater asserit Galenus  
 Versu multiplici & laborioso,  
 Paucis contrahis, explicasq; chartis,  
 Et suum statuis modum labori.  
 Felix o rer & amplius vocandus.  
 Non frustra tibi contigit *Lacuna*,  
 In re difficili, & parum expedita,  
 Ἀπάντων μέτρον ἑμμετρεῖν ἄριστον.  
 Pyrrhus.

## ILLVSTRISSIMO ET REVERENDIS.

SIMO D. D. FRANCISCO A BOVADILLA ET MENDOZA,

Cauriensi Episcopo, ac sanctæ Romanæ Ecclesiæ Senatori vigilantissimo,

Patrono suo, &amp; optimo Mecenati, ANDREAS LACVNA Se-

tobienlis, Doctor Medicus, Miles S. Petri,

S. P. D.



*H*eroftratum illum insolentissimum haud immerito infamant, conviciisq; proscindunt litera, Pater amplissime, quod combusserit antiquissimum illud ac celeberrimum Ephesiæ Dianæ delubrum: idq; non odio aliquo in deam ipsam accensus, sed ut tantum memoria sui, posteritati relinqueret: quæ sane vel hodie vixet, piacularis tamen, & flagitiosa, nimirum qualis fuit ille. Siquidem si non aliud, ac certe verisimile est, nebulonem illum fuisse caduci, vilis atque delecti animi: qui cum potuisset optimis institutis & artibus iuvare mortalium genus, simulq; immortalem se reddere, maluerit tamen facinus tam indignum perpetrans, omnibus innotescere, famamq; sibi eam conciliare, quam præstitisset illi si consecutus non fuisset. Contra vero fecerunt veteres illi patres, philosophiq; gravissimi, bonorum nobis optimum auctores, qui ob admirandam illam sapientiam suam, strenuèq; in communem usum nauatam operam, hodie celebrantur ab universis, atq; inter diuos relati sunt. In quibus illi, mea quidem sententia, summa laude videntur digni, qui arti Medicæ, sociis humani generis tuerici, conservatriciq; summo studio incubuerunt, eamq; opibus & facultatibus suis auxerunt, atq; locupletarunt: cuius porro inuentionem Græci serè universi, in deos ipsos, atq; illorum amicos, referunt. Tradunt quippe Aesculapium ab Apolline patre institutum, filios suos postea Medicinam docuisse, atq; in hunc modum artem ipsam ceptam diuini auspicii, successione quadam hereditaria, à parentibus propagatam semper in libros, ad Hippocratem usque (qui oriundus etiam ab Aesculapio fuit) peruenisse. Cautum siquidem erat in illa Aesclepiadarum familia, ne quis artem & industriam medendi, possessionem planè diuinam, à Deoq; solus ipsis concessam, cuiuspiam communem faceret, qui ab eodem non esset genere exortus. Id quod fuisse in causa, videtur, ut peritior artu illius, τῶν ἱατρῶν τιμή; hoc est, filios Medicorum, Græci semper vocarint: ac si fieri illo modo non posses, ut legitimè quispiam Medicinam proficeretur, quam minime à genitoribus suis accepisset. Nec perperam quidem illi, iudicio meo, fastidiabant: quandoquidem vel optima quæq; instituta vilescunt, & dilabuntur, variisq; fiunt obnoxia adulterii, dum circa delectum illum ab omnibus profanantur: multoq; aptiores ad quamcunq; artem capeendam, exercendamq; sunt ij, qui à parentibus suis, vna cum generationis primordiis contraxerunt quandam veluti inclinationem, propensionemq; in eam ipsam artem, cui postea indulserint: quàm quibus natura & mens, ob diuersam genituram, ad contraria inclinatur. Quare sæpe soleo admirari, cum ad cuedenda numismata Principes admittant tantum eos viros, qui & in genui sunt, & industrij, moribusq; integerrimis præditi: cur ad conservandam instaurandamq; salutem hominum (quæ quibusvis gemmis & margaritis longè preciosior est) ut deligant quidem inculpatisima ingenia, cuiq; solis provinciam adeo periculosam committant: abigant aut illos à tam sacro & heroico munere, qui ad aurigandum vel remigandum sunt, potius quàm ad medendum, aptiores, non sint aquè solliciti. Hoc siquidem maxime sua ipso-

## EPISTOLA DEDICATORIA.

rum intererat. Ut igitur ad Hippocratem redeam, ille omnium primus artem Medicinam rationali methodo condidit, nobisq; volumina octoginta reliquit, quæ incôparabilem doctrinam eius, vitæq; innocentiam, testantur. Eum postea secuti sunt Diocles Caristius, Praxagoras, Chrysippus sophista, Erasistratusq; ex filia Aristotelis genitus: qui antistites Rationalis sectæ extiterunt. Nam sub Philino Coo, eodem fere tempore, factio Empiricorum est orta: cuius fautores fuerunt Serapion Alexandrinus, Apollonius Antiochenus, & Menodotus. Qui sanè dissidebant à Rationalibus, quòd illi quidem ratione simul & experientia uterentur ad inuestiganda præsidia, morbis ipsis cògruentia: hi autem solo vsu contenti essent, eorum quæ aliàs obseruauerant. Ab utrisq; recesserunt ex æquo Methodici nuncupati, causarum abditarum indaginem (quasi Logici summo studio explorabant) respuentes: nec tribuentes quicquam experimentis particularibus, quibus nucebantur Empirici. Reducebant aut hi, ut omnes particulares affectus ad generales duos, nempe strictum & laxum: sic vniuersas curationes ipsorum, ad duas similiter: strictionem videlicet eorum quæ laxa essent, & relaxationem illorum quæ stricta. Auspiciis huic sectæ dedit Themison Laodicenus: absoluit aut eam Thessalus ille Trallianus, qui pollicebatur se edocturum artem ipsam accuratissimè, vel sex mensibus tantum. Post quos omnes tandem Galenus secutus, Medicinam in tot sectas diuisam, laceramq; suæ integritati atq; nicori restituit: explodens quidè omnia peruersa dogmata, quæ grassabantur suo tempore, diramq; exercebant tyrannidem: reuocans autem Hippocraticam rationem medendi, quæ iam plus quàm sexcentos annos sepulta fuerat, eamq; & explanans, & validissimis rationibus roborans. Cuius viri doctrina & methodus, ob dulcedinem insitam, atq; sublimitatem, ad eòd allicit omniũ studiosorum animos, ut qui semel illam gustarit, amplius abstinere ab ipsa non possit. Ceterum cum ob crebras digressiones, quas facit, dum prauas opiniones aliquantulum morose refellit; nonnulli quibus cordi est breuitas, à lectione illius deterrentur: rem non minus gratam, quàm utilem vniuersis, me facturum existimaui, si omnia Galeni opera in Epitomen succinctam redigerem, excutiens quidem illa, quæ nihil succi in se haberent, colligens verò reliqua, ex quibus tota ars constaret. Quod hercle institutum meum mirum in modum promouit, ac veluti còcalscecit clarissimus & ornatissimus vir, amplitudinisque tuæ amantissimus, Ioannes Aquileius, Medicus Pontificius: qui quidem quo seruet sapientiæ incredibili amore, nunquam desistit me hortari, monere, instigare, & (ut ingenue fatear) cogere, donec ad laborem me accinxerim. Quam prouinciã difficilem, ac meis humeris impare, equidem vix suscepissem, nisi ille institisset tanta vehemètia. Quantum verò laboris exhauserim, dum huic saxo voluedo incumbo, nemo æque nouit ac tua Celisudo, Antistes reuerendissi. sub cuius umbra & auspiciis omnia fuerunt elaboratâ. Quamquam vel ex ipsius operis mole, atq; difficultate, pendere lectores candidi poterunt, non potuisse hunc nostrum partũ in lucem adduci, citra enixum atq; conatum maximum: cum nobis necessum fuerit, in primis quidem instaurare deprauata exemplaria, tã Latina, quàm Græca: dein ea mutuo inter se cõferre: postea lapsus omnes corrigere, lucemq; obscuris sententiis addere: demũ succum omnẽ atq; medullam elicere, eamq; digerere in ordinẽ: ac deniq; vniuersos locos communes, præcipuasq; sententiâs, ad margines annotare. Quòd si addidero, quoties mihi opus fuerit eadem ipsa relegere, examinare, & transcribere, priusquàm traderentur prælo, nec modum nec finẽ fecero. Perpetuò autẽ sum-

## EPISTOLA DEDICATORIA.

ma cū religione curauimus, ne aut aliquid infereremus huic operi, quod Galeni non esset: aut ex doctrinā illius quippiā relinqueremus, quod pertinere videretur ad artem. Iam verò præcipua loca quæ restituenda censuimus, asterisco annotauimus, quo videlicet Lector admonitus, posset si quādo vellet, codices græcos consulere, iudiciūq. suum interponere. Ex annotationibus margini appositis, quæ esse vice scholiorū possunt, cōstat uimus copiosissimū Indicem, ut omnium rerum & sententiarū, quæ præcipua in Galeno habentur, lectori ad manū largā semper copia suppetere. Porro vniuersum opus in quatuor sectiones, siue classes, digessimus: quarum prima quidem continet ea omnia, quæ ad artus constitutionē, humaniq. corporis fabricam atq. compositionem pertinent. Secunda autem, quæ tum ad sanitatem tuendam, tum ad morborum cognitionem spectant. Tertia vero, omnes differentias morborum, generalemq. medendi methodum, ambit. Quarta deniq. vindicat sibi historiam omnium medicamentorum simplicium, atque compositorū. Harum autem nostrarū lucubrationū eam partem consecrare T. C. statui, quæ ut lectū iucundissima est, sic in se veram philosophiā, adeoq. (si Galeno credendū sit) exactissimam Theologiam amplectatur: cum exercitatio meditatioq. assidua circarēs naturales, ac præsertim circā nostri structuram corporis, nostrā erga Deum fidem, propensionēq. multum adaugere, ac veluti concalsciat. Nam cognitū ius perfectē quæ sapientia & bonitate sua fecit ille conditor noster, in maximā admirationē, cūmendationēq. sui, omnium animos reuocat. Tali autem admirationi, charitas fides, atq. firmisissima spes, euestigio succedunt. Sed ex hac etiam naturalium rerum contemplatione, copiamus aequitatem exercere & iustitiā: quandoquidem & elementa ipsa, & cæteræ vniuersi partes, sibi inuicem cedere, & suum amare quæq. ordinē, æquabilitatēq. seruare geometricā, nemo tam caciens est, qui nō cernat. Unde ab ambitione, posidendiq. libidine, naturalis Philosophia pars nos reddet alienos. Hinc etiam nō vulgarem fortitudinem comparamus contra mortis formidinem: cū didicerimus hominē esse portūculam vix perceptibilem vniuersi, cunctiq. si genita sint, etiā corruptioni esse obnoxia.

Ut verò hanc naturalium rerum historiam dicarem T. C. eadem me causa impulerunt, quæ iam pridem conciliant tibi omnium studiosorū animos, Pater obseruandis, nempe singularis prudentia tua, rara temperantia simul & continentia, non vulgaris animi magnitudo, constantia insignis, admiranda clementia, incomparabilisq. omnium linguarum, artium, atq. disciplinarum peritia. Eos quidem semper sapientia amore flagasti, ut quarum vnam tantum aut alteram, vel optima quæq. ingenia vix tandem post multos annos assequi mediocriter possunt, eas omnes disciplinas, non per transennā (quod aiunt) aut primoribus degustandas labris, sed consummate, integraq. tibi esse indispensandas putares. Quem feruorem ac diuinum affectum animi, adeo labore improbo, vigilisq. immensis fouisti, ut non modo tui voti compos, sed promptuarium etiam omnium Artusarum, quid dico promptuarium? imò sacratissimū quoddam templum, nobis euasisse videar. In quo quidem, si latina, græca, atq. hebræica lingua puritatem ac proprietatem requirat quis: si artium omnium liberalium ornātū: si iurisprudentia, Theologiæq. veluti summū apicem, vniuersas inquam has scientias & facultates reperiet absolutissimas. In quarum singulis tam feliciter es versatus, ut ex æquo omnes didicisse videaris. Quæ immortales virtutes tuæ, adeo, sanquam per gradus quosdam, te ad maximum dignitatis fastigium pari amoris vicissitudine promouerunt, ut pri-

# EPISTOLA DEDICATORIA.

*modo quidem, dum egressus pueritiæ fines vix esses, cum maximo bonorum omnium applausu creatus fueris Gymnasiarcha celeberrimæ Academiae Salmanticensis: quam ita singulari prudentia tua & consilio rexisti, ut eorum qui eo in munere te præcesserant, gloriam prorsus obliteraueris. Haud multò post factus es Toletana Ecclesiæ Archidiaconus: quæ dignitas quantopere in Hispaniis illustris sit, nemo est qui vniat & neficiat. Nec intercesserunt multa mensium curricula, quin iam Episcopus Cauriensis euaderes. Quod pastoris tam insignis munus, adeo pie religioseque, hactenus semper administrasti, ut si ceteri Ecclesiastici proceres eandem, quam tu, viam ingrederentur, non tot cladibus hodie afficeretur Ecclesiæ: non tot indies sauciaretur vulneribus: sed semper contra hostes suos præualeres. Postea verò PAVLVS III. Pont. max. fama tuarum virtutum adductus, à Deoq. ipso inspiratus, te vlerò (ut solet complures alios, quos & pietate & doctrina ceteris antecellere intelligit) in ordinem Patrum amplissimorum censuit esse accersendum. Inter quos adeo splendes & fulges, ut de te cunctis raram quandam expectationem exhibeas. Nihil dicam impræsentiarum de antiquissima & nobilissima, ex qua oriundus es, Mendozarum familia: quandoquidem illa vniuerso innotescit orbi: & animus nobis est persequi, non quæ natura tibi, sed quæ virtutes tuæ præstiterunt. Ut autem reliqua expediam: quemadmodum ingenuissimus iste animus tuus Musarum omnium delubrum atq. sacrarium est, sic ades tua semper Academia quadam hominum doctissimorum quam absolutissima existit: quos adeo semper foves, auges, cohonestasq. muneribus, ut eruditum tantum virum natum esse videaris. Quam sanè tibi insitanti, cognatamq. in studiosos omnes benignitatem, abunde etiam sum ipse expertus: quippe cum me anno quadragesimo sexto supra millesimum, ex Germaniæ redeuntem, ubi primum attigi Romam, quam munificentissime exceperis, exceptumque præfereris cura valetudinis tuæ, ac postea indies magis summa liberalitate locupletaueris. Hæc itaq. omnia adduxerunt me, ut hæc mei ingenij primitiæ, calore splendoris tui consecræ, ad maturitatemq. perduceret, Tuæ Celsitudini offerrem. Tuæ igitur partes erunt, Pater amplissime, eorum meditationes contra maledicorum morsus defendere, quos in tutelam tuam recepisti quam benignissime. Vale. Venetiis, ex adibus illustrissimi D. D. Ioannis Furtadi à Mendozæ, in hac insigni Republica Cæsari Oratoris circumspectissimi.*

XV. Calend. Maias, M. D. XLVIII.

**SOLENCHVS LI-  
BRORVM GALENI, QUI IN  
quaq. sectione habetur, cum eorundem interpretibus,  
quorum uersiones, dum Epitomen condere-  
mus, sequuti sumus.**

PRIMAE SECTIONIS LIBRI:



Khortatio ad artium li-  
beralium studia, Eras-  
mo Roter. interpret.  
col. i

De optimo docendi ge-  
nere, lib. i. eodem Erasmo interpre-  
te. 3

Quod optimus medicus idē sit & phi-  
losophus, lib. i. eod. interp. 4

De sectis ad eos qui introducuntur, lib.  
i. Augustino Ricco Luc. interp. 5

De optima secta ad Thrasymbulum, lib.  
i. Iunio P. Cracouiensi interp. 9

De constitutione artis Medicæ, lib. i.  
Victore Trincavelio interprete. 20

De partibus artis Medicæ, lib. i. Victo-  
re Trincavelio interprete. 31

De elementis, lib. ii. Victore Trinca-  
uelio interprete. 33

De temperamentis, lib. iiii. Thoma  
Linacro interprete. 39

De inæquali temperie, lib. i. Thoma  
Linacro interprete. 61

De optima corporis constitutione, lib.  
i. Augustino Ricco interp. 65

De optimo corporis habitu, lib. i. Au-  
gustino Ricco interp. 67

De animi morum & corporei tempera-  
menti mutua cōsecutione, lib. i. Ioa-  
ne Paul. Crass. interp. 68

De naturalib. facultatib. lib. iiii. Tho-  
ma Linacro interprete. 73

De naturalib. facultatū substantia, lib. i.  
Victore Trincavelio interprete. 89

An sanguis in arteriis natura cōstinea-  
tur, lib. i. Victore Trincavelio inter-  
prete 90

De motu musculorum, lib. ii. Nicolao  
Leonicensio interprete. 91

De vteri dissectione, lib. i. Iano Corna-  
rio interprete. 103

De semine, lib. ii. Iano Cornario inter-  
prete. 106

De foetus formatione, lib. i. Iano Cor-  
nario interprete. 121

De septimestri partu liber i. Augusti-  
no Ricco interprete. 126

De instrumento olfactus, lib. i. Victo-  
re Trincavelio interprete. 128

De ossibus ad tyrones, lib. i. Ferdinan-  
do Balamio interprete. 131

De dissectione venarū & arteriarū lib.  
i. Antonio Fortolo interp. 143

De nervorum dissectione, lib. i. Anto-  
nio Fortolo interprete. 149

De anatomicis administrationibus, li-  
bri i x. Iohanne Guinterio Andernā  
co interprete 151

De vsu partium humani corporis, libri  
xvii. Nicolao Regio interprete. 194

De placitis Hippocratis & Platonis,  
lib. ix. Iohanne Guinterio Andernā  
co interprete 321

SECVNDAE SECTIONIS LIBRI.

Num ratio tuendæ sanitatis, ad medici-  
nalem, an ad exercitatoriam spectet.  
Iunio Paul. Par. interprete. 359

De exercitio parvæ sphaera, lib. i. Ioa-  
ne Fichardo interprete. 365

De alimentorum facultatibus, lib. iiii.  
Martino Gregorio interprete. 368

De euchymia & cacoehymia, lib. i. Fer-  
dinando Balamio interprete. 404

De attenuate victus ratione, lib. i. Mar-  
tino Gregorio interprete. 413

De cognoscendis curandisq. animi af-  
fectibus, lib. i. Bernardino Donato  
interprete. 419

De consuetudine, lib. i. ex veteri trans-  
latione restitutus. 426

De sanitate tuenda, lib. vi. Thoma Li-  
nacro interprete. 428

De vsu respirationis, lib. i. Iano Corna-  
rio interprete. 484

De causis respirationis, lib. i. Iano Cor-  
nario interprete. 488

De difficili respiratione, libri iiii. Iano  
Cornario interprete. 489

De pulsuum vsu, lib. i. Thoma Lina-  
cro interp. 505

Introductio in pulsus, Martino Grego-  
rio interprete. 510

De differentiis pulsuum, lib. iiii. Her-  
manno Cruserio interprete. 519

De dignotione pulsuum, lib. iiii. Her-  
manno Crusenio interprete. 538

De causis pulsuum lib. iiii. Herman-  
no Cruserio interprete. 552

De præcognitione ex pulsib. lib. iiii.

Hermanno Cruferio interprete.	579
De diebus decretorijs, lib. 111. Ioanne Guinterio Andernaco interp.	607
De crisibus, lib. 111. Nicolao Leonice- no interprete.	622
De præcognitione, lib. 1. Leonardo la- chino interprete.	645
De præfagio ex infomnijs fumendo. col.	652
Quomodo morbum simulâtes sint co- arguendi, lib. 1. Ioan. Ficardo inter- prete.	653
TERTIAR SECTIONIS LIBRI.	
De differentijs morborum, lib. 1. Guil- lielmo Copo Basiliensi, & Thoma Linacro interpretibus.	657
De causis morborum, lib. 1. Guil. Co- po, & Thoma Linacro interp.	660
De symptomatũ differentijs, lib. 1. Guil- lielmo Copo, & Thoma Linacro in- terpretibus.	664
De symptomatum causis, lib. 111. Guil- lielmo Copo, & Thoma Linacro in- terpretibus.	668
De causis procatarteticis, lib. 1. ex anti- quæ reſtitutus versione.	694
De plenitudine, lib. 1. Victore Trinca- uelio interprete.	696
De atrabile, lib. 1. Augustino Ricco Lucenſi interprete.	702
De tumoribus præter naturã, lib. 1. Au- gustino Ricco interprete.	705
De tremore, palpitatione, cõvulſione & rigore, liber 1. Domínico Monte ſauro interprete.	710
De morborum temporibus, lib. 1. Ioan- ne Guinterio Andernaco interpre- te.	716
De totius morbi temporibus, lib. 1. Io- anne Guinr. And. interprete.	719
De locis affectis, lib. v 1. Gulielmo Co- po Baſilienſi interprete.	723
De differentijs febrium, lib. 11. Nico- lao Leoniceño interprete.	780
De Marafmo, lib. 1. Victore Trincaue- lio interprete.	803
Contra eos qui de typis ſcripſerũt, lib. 1. Victore Trincauelio interp.	809
De typis, lib. 1. Augustino Ricco inter- prete.	810

Ars medicinalis, Nicolao Leoniceño interprete.	813
De methodo medẽdi, lib. x 1111. Tho- ma Linacro interprete.	840
De arte curatiua ad Glauconẽ, lib. 11. Nicolao Leoniceño interprete.	955
De venæ ſectiõne aduerſus Eraſiſtra- tũ lib. 1. Iosepho Teſtãdro interprete. col.	985
De venæ ſect. aduerſus Eraſiſtratzos Romæ degentes, lib. 1. Iosepho Te- ſtãdro interprete.	987
De curãdi ratione per venæ ſectiõnẽ, lib. 1. Theodorico Gerardo interp. col.	989
De hiruſinibus, reuulſione, cucurbitũ la & ſcarificatione, lib. 1. Theodori- co Gerardo interprete.	999
De purgantium medicamentorum fa- culratibus, lib. 1. Ioanne Guinterio Andernaco interprete.	1000
Quos purgare, quãdo, & qualibus me- dicamentis oporteat, liber 1. Ioanne Guinterio Andernaco interp.	1002
De priſana, lib. 1. Augustino Ricco in- terprete.	1008
Conſilium puero comitali morbo la- boranti, Augustino Ricco interpre- te.	1004

QUARTAR SECTIONIS LIBRI.

De ſimplicium medicamẽtorum facul- tatibus, lib. x 1. Theodorico Gerar- do interprete.	1012
De ſubſtitutis lib. 1.	1144
De compoſitione medicamẽtorum ſe- cundum genera, lib. v 11. Ioan. Guin- terio Andernaco interp.	1148
De compoſitione medicamẽtorum ſe- cundum partes, lib. x Iano Corna- rio interprete.	1188
De theriaca ad Piſonem, lib. 1. Ioanne Guinterio Andernaco interp.	1270
De antidotis, lib. 11. Ioanne Guinterio Andernaco interprete.	1280
De ponderibus & menſuris libellus, Andrea Lacuna Secobenſi, autore. col.	1289
Vita Galeni, eodem autore.	1294



# GALENI

## PERGAMENI EXHORTATIO AD BONAS ARTES DISCENDAS



A MEYS: animalia bruta nō habent rationem illam euuanciant, sermocinatio nemē, qua nos ipsi praediximus: eam tamen quae secundum animā intelligitur, quam *in diuina* vocant, hoc

Bruta inesse rationem reuocant  
in diuina  
hoy

Bruta esse animam expectant  
Homo filius  
animae capax

Homo filius dicitur rationis, quod ratio ne lateri ante-  
rellat.  
Ratio nobis in-  
esse cōmune cum  
diu.  
Fortuna inpro-  
bita, inuoluntaria  
trago.

Mercenarii cōmuni  
dedit, cum o-  
mnium artium  
auctore.

Inuoluntarium  
hominem in-  
flectat.

Imperitiorum in-  
flectit ad illa  
lustrum est, quod  
in animam eorum  
est latum.

Pulchritudo ar-  
te non exornat,  
sed nūciet.

& excellentior est, quanto ipse animus corpore videtur esse quippē praestantius. Oportet itaq; ad adolescentiam suam ipsius formam ad speculum contemplari: qui si se conspexerit facie pulchra, ad vigilandum est, vt talis sit etiam animus: ex-  
tremūq; vehementer absurdum, in formā cor-  
pore animū habitare deformem. Rursus, si se vi-  
derit esse forma corporis infelici, tanto magis il-  
li curandum est, vt elegantem efficiat animum,  
10 quo audire possit illud Homeri:

*Est aliquis, cui forma parum sit corpore felix.*

*Sed exemptis formam verbis Deas erant, &c.*

Quōd autem nec ipsi Athletarū professio, quae pollicetur maximū robur, gloriāq; apud val-  
gus conciliat, etiam componi debeat cum artibus homine libero dignis, vel hinc nobis licet colligere, quod cum variae sint bonorū species, quae natura hominibus insunt, puta quae ad ani-  
mum, quae ad corpus, & quae ad facultates exte-  
rioriores spectant, nullam harum Athletae, nec in so-  
mniis quidem, agnoscunt. Sequi de quod ad pri-  
mam attinet, animam habere nec ne, profus  
ignorant Athletae: tantum adest, vt illam sciant  
esse rationis participē. Etenim cum semper ma-  
ximam vim carnis, sanguinisq; coaceruent, ha-  
bent animam suam veluti multo immerfam coe-  
no, vt nihil possit intelligere, verū nō minus stu-  
pida sit, quam brutiorū animae. Cum autē supra  
modum laborent, supra modūq; (vt dixi) ex-  
pleantur, manifestum vtiq; est, eorū habitudinē  
maximē periculosaē existerē: id quod sentiens  
Hippocritae, summē bonam habitudinē Athleta-  
rū in maximo versari discrimine: affectuonēq;  
Athleticam nō esse secundum naturā: meliorem  
autē esse habitudinē salubriorem. Quibus ver-  
bis nō solum negant palam eorum exercitatio-  
nem naturalem existerē, sed ne libitudinē qui-  
dem illam dignatus est appellare, quod obno-  
xia periculo sit, faciliq; in diuersum mutabilis.

Item quod ad formā corporis attinet, sic illis ha-  
bet res, vt nō soli exercitatio Athletica nihil ad  
pulchritudinē conferat, Verum etiam plurimum  
obstet, ob ingluuiē illam, qua distenduntur, ac si-  
pra modum ingurgitantur. At fortasse nihil qui-  
dem ex his quae exposita sunt, sed robur sibi ven-  
dicabunt Athletae: Quod per deos robur ut ad  
quid vilesan ad agrum colendum? Perpulchre  
igitur vel fodere, vel metere, vel aliud quidpiā,  
quod ad agricolationem pertinet, possunt. Sed  
fortassis ad res bellicas valet. Audi Euripidem  
igitur, qui laudes eorum canit, dicens:

*Non acherus hostem praelaborator, nam*

*Deos serant. Nilime uberrata aspice,*

*Pedibus citi hostem submovet busti patris.*

*Nullo profecto una sunt hoc,*

*Vbi cecino ferrum micare capere.*

Ergo inde forte gloriatur, quod praeter ceteris plu-  
rimum colligit, coaceruentisq; pecuniarū. Atqui  
videre licet omnes istos arti alieno obstrictos,  
non solum id temporis, quo exercent artē Athle-  
ticam, verum etiam dum ab ea dimissi sunt. Quan-  
quam ne id quod perclarum est, ex arte para-  
re diuitias, sed talem potius artem scire, quae fra-  
cta nani, simul cum domino erant. Ex dictis li-  
gitur evadit periculum, & ingratissimā adole-  
10

Animi vici-  
tati praefertenda  
pulchritudinis  
corpore.

Athletarum  
professio.

Bonorum spe-  
cies tres.

Athleta omni  
genere bonorū  
sunt destituti.

Athletarū ani-  
mam esse volu-  
tatis molis demer-  
sam causā.

Athletarū ha-  
bitudinem ma-  
ximē periculo-  
sam existerē.

Athleticam ex-  
ercitationē pul-  
chritudinis ob-  
stet.

Athletarum et  
serbari invidet

Athletae omnes  
esse arti alieno  
obstrictos.

Arti quae pa-  
randa.

scentes, nec diuitiis, nec generis claritate, nec pulchritudine formæ, nec exercitio aut robore Athletico fretos, oportere nos studia liberaliū artium negligere. Verumenimverò cū in geminū discrimen ipse artes distribuantur, quarum quædam ratione cōstant, sūntq; ingeniz & honestæ: quædam contrā, cōtempnibiles, quod cor poris laboribus cōstent, quas sedentarias & manarias vocant: præstent vñq; ex priori genere quampram ediscere. Nam posterius alteri ge nus desituere solet senectute cōsecutos artifices. Prioris porrò generis sunt, Medicina, Rhetorica, Musica, Geometria, Arithmetica, Dialectica, Astronomia, Græmanica, & Legum prudentia. Adde his si velis, fingendi, pingendi artificii. Quamquā enim hæc in manaria consistunt opera, earum tamen exercitatio nō eget robore iu uenili. Ex his itaq; artibus aliquam eligere cōve nit, & in ea exercere optimē iuuentutē, cui mens uō sit omnino pecunia: vel præstantissimā harū omniū, quæ quidē iudicio meo, est ars medendi, quod deinceps vobis est demonstrandum.

### GALENI PERGAMENI de optimo docendi genere, liber vñus.

Doctrina prout  
optima quod.



Auorinus censet illud esse optimū genus doctrinæ, per quod vtrang in partem præparatur. Quam do ctrinā Academicū vetustiores exiit 10 mabzr desinere in epochen, hoc est suspensam sententiā. Sequidem cū argumētis cōtrariis in vtrang partem suo more agnassent aliquod dogmā, rāndē permittebant discipulis, vt quod verus ipis videretur, eligerent. Ceterū cū nonnulla videamur vobis videre, aut aliquo alio sensu percipere, vt in somniis, aut per insaniam: nonnulla item reuera videamus, aut alio quo vis percipiamus sensu: hæc quidem postiora, omnes homines, exceptis Academicis & Pyrrhoniis, credunt ad certam cognitionē pertingere. Quæ verò per somnium, aut mentis errorem apparent animo, ea falsa prorsus existi mant. Quod quidem si sic se habere Academicū nobis concesserint, delectant oportet ē libris suis, quod inibi scriptum est, an rerum iudicio nec sano esse magis fidē habendā, quā in sano: nec rectē valenti magis quā in ægro, nec vigilanti magis quā in dormienti. Quippe si istis nihil est cognoscibilis, quā in his qui sunt diuerso modo 10 affecti, nimirum veritatis iudicia confusa erunt: nec ipse præceptor Academicus, neq; etiam eius discipulus poterit iudicare rationes, quæ in am bas partes inter se pugnantēs differuntur. Atq; hoc ipsum est, quod veteres illi docuerunt, nul lum esse darum si natura iudicium homini, quod exactē posuit dignoscere: eōq; nulla de re pronunciadū esse absolūtē, sed de omnib. semper suspendendam esse sententiā. Verū si nobis phy sici concedant (vt decet) sensus iam nihil opus habebimus in vtrang exerceri partem, sed opus tantū erit repetitio ne eorum, quæ fuerint ex emplis tradita. Lubens autem Favorinū inter rogare, num hominū naturalis quædam iudi candi vis in sit, quæ sermones veros discernat a

falsis: an potius ars quædam & ratio sit, vtrun que cognoscendi. Si natura, qui sit, vt non om nes inter hos consentiamus, nec similiter iudi cemur. Sin ars est, & ratio, hæc omniū primū artem discenda. Dein conueniat ludimagistros variis modis exercere discipulos, multis exem plis propofitis. Nam dicere, nullū idem nobis veri ac falsi iudiciū, est omnem agnitionis spem prorsus exterminare. Igitur quamvis iudicium nature, philosophæ contendant nullum, eo tamen nullū nec antiquius habemus, nec generosius. Cui quidē naturali iudicio licet credere, vel non credere: ipsum autem per aliud iudicari non po test, cū nimirum eo cetera iudicentur omnia. Quoniam autem ex ipso naturali iudicio artes omnes parant sibi & instrumenta, & iudicandi secundum artem, organa: per quæ quidem alia sibi cōponant homines, alia rursus ab aliis com posita iudicant: docebo equidem in vniuersum & instrumenta, & iudiciū, tum ea per quæ sibi pa rabis veros sermones, tum ea per quæ iudicabis ab aliis dictos. Nam quod ex sese eviderent ap paret sensibus, aut intellectui, ad id nihil est opus inquisitione. Ceterum si nihil sit tale, neces sum est vt accedat cognitio, quæ aliunde petat ur. Etiam si perinde ac in corpore oculus, sic sit intellectus in animo, hoc est, non pariter ex tus omnibus, consentaneū profectō rationi est, vt quomodomodū qui cernit acundā, adducit ad id quod videtur, eū cui visus hebetior est: ita qui bus contingit in rebus intelligibilibus perspicere clarē, quod intellectui offertur, veluti manu du cant ad contemplationem & cognitionem eandem, illos qui hallucinantur. Atq; hoc quidem est præceptoris officium.

Favorinus cum  
sonat.

Nodicio natura  
si singula iudi  
cantur.

Epiche.

Pyrrhonij.

Academicū  
salsum dogma



### GALENI PERGAMENI, quod optimus medicus idem sit & philosophus, liber.

Vod accidere solet Athletarū ple trisq; qui cupiunt quidem in Olym plus victores evadere, ceterū vrid assequatur, nihil exercet, curantve, rale quippiam cōpluribus medicis vñu venit. Nam laudant quidem Hippoc. ac me dicos omnibus anteposuit: vt autē similes ille e vadit, quid vis studio habet potius q; hoc: quip pe qui ne legūt quidem illius cōmentarios, nec si vid facit, intelligunt quæ dicuntur: aut si quis id quod cōsequatur, nō perducit speculatiū ad artis rationē ad experientiā, vt confirmet quod didici cit. Quorū si dicit alter vtrū, necessum est cui vñu uerū studij atq; instruit sine frustretur. Nullū au tem nunc nasci, qui natura satis cōpositus sit ad percipiendam artem tam familiārē, tamq; amicā humano generi, dictū absurdum videretur, cū idem sit nunc mundus qui olim. Probabile tam en est, ob prauam educationē, qua hodie insti tuuntur mortales, & ob diuitias viriati antepo sitas, ita nēminem amplius existere, qualis fuit vel Pludias inter statuanos, vel Hippocrates inter medicos. Siquidē fieri non potest, vt qui plu ris facit diuitias, quā virtutē quig; artem non in hoc duciat, vt bene de hominib. mererē, sed vt di-

Præceptoris of  
ficio.

Speculatio ne  
in naturā cum  
firmādam esse  
experientiā.

vt discerneret, ad propriū artis finem perveniat. Proinde finem etiā nequit, vt finis & pecuniæ sit duo serviamus, & exercemus artem tam sublimem, tamq̃ arduam: sed necesse est, vt qui velle mentis incumbit in alterū, alterum negligat.

Iam verò cum oporteat medicum varias regiones orbis lustrasse, diuersasq̃ ciuitatū & locorū temperaturas, sitūs, & constitutiones accuratè nouisse, vt de illis posita iudiciū ferre, manifestū vñq̃ est, qui talis sit euasurus, eum debere non modo contemporem pecuniæ, sed suprà modū etiam induturum, atq̃ impigriū esse. At fieri non potest, vt ita sit induturus & impiger, qui mebratur, qui sese ingurgitat, quiq̃ (vt summam dicam) pudens tantūm, & cauenti obsecundat.

Qui igitur sobrietatis amator est, nec minus veritatis amans, luc verus medicus comperitur. Huic autē cum naturali, etiam ars rationalis descendit, exerceatq̃ est: quod sciat, quot in vniuersum sint morbi, & quo pacto causisq̃ fumenda sit curationis ratio, qualisq̃ præterea sit vniuersa corporis humani natura: id quod ars ipsa rationalis, siue logica, docet accuratissimè.

Quid igitur iam deest medico, quo minus sit & philosophus, quisq̃us Hippocratis artem, vt par est, exerceat? Etenim si ob dictas causas sit vniuersa corporis humani natura: id quod ars ipsa rationalis, siue logica, docet accuratissimè.

Quid igitur iam deest medico, quo minus sit & philosophus, quisq̃us Hippocratis artem, vt par est, exerceat? Etenim si ob dictas causas sit vniuersa corporis humani natura: id quod ars ipsa rationalis, siue logica, docet accuratissimè.

Quid igitur iam deest medico, quo minus sit & philosophus, quisq̃us Hippocratis artem, vt par est, exerceat? Etenim si ob dictas causas sit vniuersa corporis humani natura: id quod ars ipsa rationalis, siue logica, docet accuratissimè.

Quid igitur iam deest medico, quo minus sit & philosophus, quisq̃us Hippocratis artem, vt par est, exerceat? Etenim si ob dictas causas sit vniuersa corporis humani natura: id quod ars ipsa rationalis, siue logica, docet accuratissimè.

Quid igitur iam deest medico, quo minus sit & philosophus, quisq̃us Hippocratis artem, vt par est, exerceat? Etenim si ob dictas causas sit vniuersa corporis humani natura: id quod ars ipsa rationalis, siue logica, docet accuratissimè.

Quid igitur iam deest medico, quo minus sit & philosophus, quisq̃us Hippocratis artem, vt par est, exerceat? Etenim si ob dictas causas sit vniuersa corporis humani natura: id quod ars ipsa rationalis, siue logica, docet accuratissimè.

Quid igitur iam deest medico, quo minus sit & philosophus, quisq̃us Hippocratis artem, vt par est, exerceat? Etenim si ob dictas causas sit vniuersa corporis humani natura: id quod ars ipsa rationalis, siue logica, docet accuratissimè.

Quid igitur iam deest medico, quo minus sit & philosophus, quisq̃us Hippocratis artem, vt par est, exerceat? Etenim si ob dictas causas sit vniuersa corporis humani natura: id quod ars ipsa rationalis, siue logica, docet accuratissimè.

Quid igitur iam deest medico, quo minus sit & philosophus, quisq̃us Hippocratis artem, vt par est, exerceat? Etenim si ob dictas causas sit vniuersa corporis humani natura: id quod ars ipsa rationalis, siue logica, docet accuratissimè.

Quid igitur iam deest medico, quo minus sit & philosophus, quisq̃us Hippocratis artem, vt par est, exerceat? Etenim si ob dictas causas sit vniuersa corporis humani natura: id quod ars ipsa rationalis, siue logica, docet accuratissimè.

Quid igitur iam deest medico, quo minus sit & philosophus, quisq̃us Hippocratis artem, vt par est, exerceat? Etenim si ob dictas causas sit vniuersa corporis humani natura: id quod ars ipsa rationalis, siue logica, docet accuratissimè.

tur, restituuntq̃ dependit: morbosā verò, quæ contraria his sunt. Vtraq̃ igitur medicum nouisse oportet. Ceterū quia ratione horum scientiā facile quis cōsequatur, nō pariter ad hinc omnibus est confessus. Verūm hi experientiam solam ar-

ritatis esse affirmant: alii verò & ratio nō parū videtur conferre. Quis igitur solā experientia ducunt, Empirici & Menores nuncupantur: sic vñ Dogmatici & Rationales, qui vniuersam ratione ad inuenta remedia. Atq̃ hæ quidem duæ principes sunt inter medicos sectæ: altera quidē per experientiam ad remediōrū inuentionē festinat, altera verò per iudiciōnē. At tum iu-

uanna, tum nomia Empirici in duæ species diuidunt, quarū primā naturalem appellant, cōplectentē affectūs omnes, qui in corpore citra manifestam causam oriuntur: secundam autē, artem fortuitam, quæ eorū esse voluit, quæ a casu solent homini accidere. Ipsius autē inspectio-

nis Empiricæ tres sunt species. Prima dicitur Circaicis uisitatōis, quāsi incidendiā dicat, dum incō-

sultō ad experendum accedimus. Secunda dicitur exidit, hoc est, ex proposito, nominatur, quando vel in somniis admonit, vel alia opinione ducti, aliqui sponte experimur. Tertia deniq̃ dicitur imitatrix, dum quidvis eorū quæ opem attulerunt, aut noxiā, rursus in eisdem affectibus aut experimur, aut declinamus. Quæ quidem vñma species, ipsorū artem maximè cōstituisse videtur. Quia verò occurrunt ipsis Empiricis inter-

terdum affectus in cogniti, vel quorū nō habent satis explorata remedia, instrumētū quoddam commentū sunt ad inuenda præsidia, nempe transit ad similia, nimirū ab affectu ad affectū, à loco ad locū, siue ab auxilio ad auxiliū. Talis itaq̃ via est per experientiam ad artis finem. Quæ verò ratione periturū, corporis curandi naturam præiudiciū iubet, nec non omniū causarū vires, in quas incendens corpus, vel salubris, vel morbosus seipso efficitur. Præter ista, aëris etiā, & aquarū, & regionū naturæ, & vitæ studiorū, & ciborum, & potuum, & consuetudinū, oportet medicum necessariō peritum esse, Rationales contendunt, vt egritudinē omniū causarū, & medicamentū facultates inueniat, necq̃ tum ab affectu ipso, tam à viribus ægrotantis, nec non ab omnibus iis, quæ recensui, posuit indicationes elicere, congruentiq̃ morbus seipso accommodare remedia: semper contrariis affectibus contraria prædicia ministrans. Ceterū si quibus rei cōferentis indicationē Dogmatici, ab iisdē Empirici obseruationē eliciunt: Dogmatici siquidem interdū plus sanguinis detrahūt, ipsi rei natura & ratione ductus: Empirici verò, quod in aliis sic obseruant. In vniuersū autē, eadem in eisdem affectibus remedia Dogmatici pariter & Empirici admittunt, de modo inuentionis ipsorum inter se alternantes. Ex apparentibus enim accedentibus circa corpus, indicio causæ Dogmaticis sit, per quam inueniūt. Empirici verò instruitur recordatio eorū, quæ sæpius eodē modo obseruata sunt. In quibus autē Dogmatici nullā habent accideiē manifestā, quod causam ipsam demonstrēt, in his causam procatartica nō cōtēntur inuestigare: vt, si canis radibus fue-

Veritas qua Medicum qua magis oportet.

Empirici sola experientia ducunt, Dogmatici & rationales qui.

Empirici in ipso libere uti possunt, imitatrix, artem exidit.

Imitatrix.

Transit ad similia.

Rationales progressus.

Medici qua cognoscenda sunt secundum naturam hanc.

Empirici Dogmatici quoque ducuntur.

Morsus rabidi canis curatus.

rie, aut vipera, quod momordit, tunc sanè minime cicatricem statim inducunt vlceri, sed potius contrà, particulas quæ circa vlcus cõstitunt, nõnunquã minutim præcidit, dein verò calidis & acerbis medicamentis venenũ extrahunt, quod in corpus vnũ cum morfu est illapsum. Eadem autẽ medicamenta etiã Empirici applicant, non ipsa rei natura ad illorum inventionẽ perducti, quẽadmodũ Rationales, sed recordatione solũ eorum, quæ longo vñu atq; experiẽtia explorant. Dogmatici porrò ipsam experientiam accusant, hi tanquã inconstantẽ, aliq; ceu imperfectam, aliq; vt artis omino expetere. Rursus rationẽ Empirici, tanquam probabilem quidem, sed oò veram, damnant. Methodici autem (sic omni seipso nuncupauerũt, ac si nõ etiam priores dogmatici artẽ methodo pertractandam esse tradiderint) nõ verbø otentas cum veteri sectis certare mihi videntur, sed multa locũ artis immutare opera: quidquidem neg locũ passum, neg causam, neg gratem, oeg autũ tempus, nec regionem, nec consuetudinẽ, nec virum ægri in spectatione, seu naturæ, seu habitus, cõferre quicquam ad indicationẽ auri, sed à solis affectibus, eius quod consert, indicationẽ satis sibi esse putant. Atq; horum sanè quidam, morboz omniũ qui ex viciis ratione proveniunt, aliq; omnium simpliciter, duas esse cõmunarẽs, & tertiam quamdam ex illis misam, ostendere nobis conantur, astrictiõnẽ videlicet, fluorẽq; atq; ex his tertiã dispositionẽ constaram. Morbum itaq; omnem, vel astrictũ, vel fluentem, vel etiam ex vtroq; complicatum esse contendunt. Vtilis autem indicationem, io astrictis quidem, laxationem: in fluentibus verò, suppletionẽ existere. At in cõplicatis affectibus, ei quæ magis vrget, esse occurrendum. Suam autem sectam destruant esse cognitionem evidentiũ cõmunstatum, finem medicinz sequenonum. Nolunt porrò dici dogmatici, quod tacitent se nõ indigere latentibus, quẽadmodum illi. Nec Empirici etiam se appellari patiuntur, licet illi q̃ maxime circa evidentia verentur, quod Empirici in evidentibus vtantur observatione, ipsi verò indicatione regantur: quodq; illi quidem, tanquam ab ignotis, ab obliuiscis recedant, ipsi verò tanq̃ ab inutilibus, inanibzq;. Porrò totam artem medendi adeo breuẽ efficiunt, atq; in angustum contrahunt, vt nõ modò in perualgatis illis sex mensibus (quibus posse doceri eam proficentur) verũ multo eam citros vniquẽsam possit quispiam ediscere: cũ iuxta eorũ decreta, sat sit nobis causis vnuerfis, tam procatarticiis, quã coniuñctis, neglectis, astrictos quidem affectus laxare, fluidos autem sistere, à quacũq; illi causa processerint idq; nulla habita temporũ, ætatũ, regionũ, aut laborantium particularũ ratione. At quantopere hallucinantur hi, vel Empirici percipere possunt: qui vident planẽ, quos rabidus canis momordit, si statim vlcus ad cicatricẽ ducatur, prius non administratis remediis, quæ ab ipsius causæ procatarticijs indicatione sumuntur, convulsos omnes animã exhalare: seruari autẽ quibus iuxta indicationem illius, adhibita fuerint medicandi ratio. Quare neg ipsarũ causarũ,

neg ætatũ, nec temporũ, nec regionũ, nec deniq; affectarũ particularũ indicationes negligunt: cũ experientia didicerint, nec senectute confectis, nec item admodum pueris, vel si laborant pleuride, venam secandam esse. Sub cane autem, & autẽ canem laboriosas purgationes existerẽ. Eos qui septentrionali subiacent, aut Aegyptũ, aut plagam meridionalem incolunt, copiosas & semel factas evacuationes nõ ferre. Qui verò inter hos sunt mediq;, manifestam subinde ex venæ sectione vtilitatem sentire. Quinetiam oculum phlegmone obfessum, diuersam curationem requirere, ab ea, quam inflammata auris postulat. Quippe acutũ cum oleo rosaceo instillarum, vnicũ aorium infillationi auxiliatur. Oculũ autem, si quis id infundat, haod leuem noxam attulerit. Ad hęc gurgulio ni inflammato, spinæ Aegyptiæ fructus, nec nõ scissile alumen, presentanea remedia sunt: quibus tamen neq; in auribus, neque in oculis vti impunẽ licet. Obiciunt etiã Empirici cõtra ipsos methodicos: vbi pars quæpiam astricta est, nõ continũ laxandam esse: cũ nimirum in ipsius cruris inflammatione, quæ sponte decubuit, minime qui dem ante totius corpõs evacuationem (dum plethoria adest) laxanda sit inflammata particula: sed refrigerantibus potius & astringentibus medicamentis admodum cõprimenda. Vbi autẽ corpus vacuatum fuerit, tum demũ laxandam esse. Atque his quidem contra illos argumentis vtuntur Empirici. At Dogmatici, quod tum sudores, tum vrinæ, tum defecationes alui, atque adeo etiam sanguinis fluxus per nares, q̃vis modum naturæ excedant, in morbis cõtingat oriri vtiliter, cõuellunt eorũ methodicorũ sententiã, qui ex immoderatis fluxionibus morbos cõmuniter iudicant: nempe in fluore quidem vocantes morbum, vbi humores ex-cernuntur immo dicunt astrictiõne autem, vbi præter naturam sistuntur: curantq; vtroq; remedio cõtrarie. Nam tamen illæ excretiones criticæ suppressæ vilo modo nõ sint, quia per eas id quod lædit, vacuatur: Methodici tamen, qui naturalibus excretionibus ad omnia, tanquã regula, vtuntur, prohibere eiusmodi accidentia conantur. Ceterũ qui methodici non in excretionibus ipsis, sed in affectionibus corporum, cõmunitates suas collocant (n nomine siquidem tenus inter se omnes concordet sunt, sed in rebus ipsis dissentunt) quo pacto eas dicere evidentes sunt ausi, cũ à sensibus remotissimæ sint, nec possunt nisi per signa cognoscit? Quod quidem si nobis fateant, in quoniam à prisca medicis discrepant, non satis ooui: nec etiam qua freti ratione, sex tantũ mensium curriculo, se edoctos artem promittant. Quippe ad cognoscenda ea quæ nostros sensus effugiunt, non videtur mihi esse opus methodo exigua: cũ præsertim talia indagandi oecessaria in primis sit anatomice administrationis cognitio, actum naturalis scientia, tum dialectica exercitatio: vt quæ vnusquisq; partis propria functio sit, atq; eius quæ vñs, facillẽ deprehendat: vtrq; etiam ex quibus quid concluditur, planẽ perspicat, ne sophismatũ quandoque aut ab alius, aut etiam à seipso fallatur. Verũ

Porro sensus  
que nullo pa-  
cto remanet  
dam esse.

Variationes co-  
pulas qui fieri  
minime, quig  
facili.  
Aurium infla-  
mati acerbis  
lari acerbis cum  
rosaceo instil-  
latum.  
Oculis acutum  
esse perniciosis-  
simum.

Corpusculum in-  
flammato quæ  
cursant.  
Empiricorum  
argumenta cõ-  
tra methodicos  
em.

Dogmaticorũ  
obiciuntur cõ-  
tra methodi-  
cos.

Methodici mol-  
ta artis immu-  
tant opera.

Methodici à so-  
lis affectibus in-  
dicationes fo-  
mant.  
Methodici con-  
struunt duas  
cõmunarẽs morboz astricti-  
fluentem atq;  
fluorem, ac ter-  
tiam ex his cõ-  
statam.

Methodicorum  
secta quod.

Methodici quibz  
distinguitur ab Empiri-  
ci et Rationa-  
libus.

Methodici pol-  
licentur se totũ  
artem de totũ  
curaculo me-  
dicinæ scire.

10

10

10

40

50

60

quandoquidem & de phlegmone, & de meatibus, plurima absurda prodiderit Methodici, pauca adversus eos dicere est animus, quæ iuventuti erudiendæ nonnulli vilitatis adherent. Inflammatio est tumor præter naturam, dolorificus, tactui renuus, durus & calidus, partem ipsam, quam antea (contrà quàm alii existimant) nec rariorem, nec densiorem, nec etiam diuiniorem efficiens: sed affluxu humoris supervacuam repletam, atque ea de causa durentem. Cuius quidem curatio, evacuatio est humorum: quibus vacuans, partes laxiores reddentur. Tensio igitur, necessariò comitatur repletas: sicut laxitas, eas, quæ evacuantur fuerint, particulas. At densitas & raritas horum neutri sunt ex necessitate annexæ: sicut nec fluxus, nec retentio. Neque enim si rarum quippiam existit, etià ex ipso quid effluere prorsus necesse est (quid enim si crassum & pusillum fuerit quod cõmatur): nec si densum sit, necessariò quodcungue cõnebit. Nam multum & tenue, etiam per densos meatus diffuit. Præcibatur itaque didicisse illos, externi quod præ in particula contenti est, rarefacto quo quod ipsam continet: & eo quod continetur, attenuato, copiosioris effecto, & vehementius moto, & ab aliquo exteriori attracto, vel ab aliquo interiori expulso: non autem ipsam evacuationem referre ad solam raritatem meatuum. Frequenter etiam natura ipsa impetu vehementiori insurgens, quicquid sensit supervacanei in corpore, expellit, exprimitque. Oculus præterea nonnunquam fluxione affligitur, aut copiosiori existente quod fluit, aut etiam tenuiori effecto, aut à natura per eam partem expulso, nihil illius corporibus à naturali constructione mutans. Et oportet quidem, si velimus mederi affectui, tennem fluxum crassorem reddere, copiosum vero evacuare. Opinari autem inflammationem unam affectum astrictum esse, & complicatū aliā, quemadmodū opinantur methodici, depravata certe est iudiciū. At quia iis, qui introducendi sunt, ista sufficiens, huic præseni sermone iam suum finem imponam.

**GALENI PERGAMENI**

de optima secta ad Thrasibulum,

liber unus.

**E**dicoꝝ \* theorematū singulū, atque uniuersum omne theorema, in primis verū esse debet: secundū, vti le: tertiū, iactis fundamentis cõsentiens. quoniam si desit vili, ne theorema quidem dici meretur. Quatenus enim sub cõprehensione omne theorema cadit, cætenus verū sit est necesse. Falsū namque cõprehensio nulla est. Quatenus autē ad finem aliquem vitæ cõmodum pertinet, eò vtile esse affirmandū est. Quia verò quemadmodū sub vno principe subditorum multitudine mente concipitur, sic & theorema ipsū ad antè iactum principii refertur: ob id omne theorema verū, vtile, consensensque, necessariò dicendum. Quare si omne aliud, liquidū certē est, medica etiā theorematū his tribus esse diiudicanda. Igitur quandoquidem nec verum ipsum, quale nam sit, nec vtile, nec etiam consensuens, facile aut æstimari, aut deprehendi pos-

sunt, notas horū aliquas indicandi instrumenta in primis tradere, præcū operæ fuere. Ipsum porro verum, ex orationis cum rebus cõcordia æstimabitur. At verum, aliquæ sensibus evidentes sunt, aliquæ sensibus latent. Evidentium rursum aliquæ per se innotescunt, vt albus atque color: alie ab aliis evidentiis adipsiuscunt, vt quæ deprehenduntur signis. Ad hæc, verum sensus abditariū aliquæ intellectu & perspicue sunt, & dicuntur: vt, bis duo, quatuor constituntializ cogno sunt per ostensionē: vt si dixeris, quo bene vti licet, eodem & abviti. Oportet autem semper sermonem, atque omne theorema ad propositionem rei speciem referre. Iam vero iudicia de rebus sensus evidentiis atque occultis differunt. Quæcungue enim sensus evidentiū rerum, per se de seipsis notitiam faciunt, sensus diiudicantur: vt album & atrum. Quare illi medicis iure sunt de iudicandi, qui de rebus sensus evidentiis, sententiam, non sensoris, sed ferre demonstratione conantur. At evidentium quidem sensus, non autem per se cognitorū, iudex est observatio. Præterea, sensus abstrusarum rerum, vt plures sunt differentie, ita & diuersa iudicandi instrumenta. Ex abstrusis autē sensus, aliqua intellectus perspicua sunt: vt hoc, fieri non posse, vridem homo Athenis simul atque in Aegypto sit. Aliqua per ostensionem agnoscuntur. De perspicuis intellectus iudicium ex cõmuni omnium hominum conceptione habetur. At quæ ostensione percipiuntur, per consensum abis, quæ ab omnibus conceduntur, diiudicantur. Rursum, concensus diiudicatio in plura diuiditur. Aut enim ex cõsensu cum sensus apparerent, aut cum intellectu per spicuis, aut cum demonstratis, concessum diceretur. Igitur quo modo verum, & ad iudiciū veritatis ducta, iudicari oporteat, iam explicauimus. Deinceps de vtili dicamus theoremate. Vtile theorema, cū ad artis finem refertur, dignoscitur. Oportet autem ipsum, primū quidem comprehendere posse: alioqui in vtile theorema redditur. Deinde, ipsius apprehensionem non conuenit vulgaribus esse communem, sed artificibus propriam. Idcirco namque eos falsos esse nos dicimus, qui sensus evidentiis in illi artis existimant. Neque enim ex sensus evidentiis ars constitui tur, nec per sensus evidentiis sit eius traditio: quandoquidem nemo sensui nota tradit, sed ea quæ ex sensus notis præcepta oriuntur, quæ planè sensui subiecta nō sunt. Hæc igitur artis principium esse, haud ab re quispiam existimauerit: de eo enim theorematā, ex evidentiis sensui nata, quod principium tradendū ad sensus evidentiis artibus evadit. Itaque sensui nota, principii inventionis theorematū esse iure dicuntur: principium verò artis nequaquam. Nam artis principia vulgo ignota esse debent, sicut & ipse artes illi omnes ignorare sunt. Præterea, artium principia traduntur: evidentiā autem sensui haudquam traduntur. Theorematā namque, aut in sensui notis, aut in illis quæ ex aliis percipiuntur, aut in his quæ præostensa fuere, aut in manifestis intellectus constitunt. Quod igitur ex manifestis sensui cõsensu, aut in illis quæ manifesta sunt sensui, ratione inventū est, & vniuersum prolatum,

Inflammatio  
sua phlegmonae,  
quid.  
Phlegmonae effe-  
ctum particu-  
lam nec rari-  
orem, nec den-  
siorem, nec diu-  
iniorem efficit.  
Phlegmonae co-  
ratio.  
Tensio comita-  
tur repletam.  
Lenitas comi-  
tatur vacuam.

Exterius quid  
modum sit

Tenuis fluxione  
interioris cras-  
sorem esse reddere  
debet.

Theorema o-  
mnino verum, vti-  
le, cõsensuens  
quod esse debet.

Præcū comprehen-  
sio nulla.

Vtile theorema  
quomodo di-  
gno scitur.

Artem non cum  
sensu ex eiden-  
tiis iungam.

Artem principia  
vulgo esse igno-  
ta.  
Artem vulgo ef-  
ficere non  
Theorematā in  
artibus consti-  
tuere.  
Theorema  
quod dicitur.

Theorema o-  
mnino at rruum,  
fieri atq. per-  
petuum est.

Artiū fidei di-  
nerfi.

Medicam arti  
offe factorem  
fieri et obfer-  
uatiuam.

Medicina arti  
propofitum at-  
que fuaum val-  
eum.

Confequentia  
qua dicitur.

Relia medice-  
rum tria, ratio-  
nalis, empiri-  
ca, methodica-  
que.

Sollarum triū  
communio.

Methodici et  
rationales qui  
perueniunt ad  
feruantes in-  
ter fe.

Empirici me-  
thodici, qui  
inter fe funt con-  
cordes.

id appellatur theorema. Omne autē theorema,  
eternum, firmum, atq. perpetuum est: Quia mob-  
rem hallucinatur illi, qui ab ipfis theorematibus  
medicinam appellari existimant artem coniecta-  
tricem: cum ab actione, & merentis opera, quæ  
incertum habet eventum, ea coniectrix redda-  
tur. Ceterum quoniam vtile diiudicandum esse  
prohibebatur, si referretur ad finem, artis fi-  
nem proponere iam temerarium fuerat. Artium  
igitur aliquæ, ea quæ non sunt efficiunt: vt na-  
uium structura. Nonnullæ, quæ facta sunt, con-  
seruant: vt nauium gubernatoria. Aliæ vtriusq.  
prestant: vt edificatoria. Porro in facientibus ar-  
tibus, aut seruantiis, vnus est consequendi fi-  
nis modus: ac proinde in his simplex est vtilis  
estimatio. Arin vs quæ iuxta faciunt & seruant,  
non ita facile sunt diiudicare. Arin itaq. medica  
inter eas est, quæ faciunt, atq. conseruant non ob  
id tamen geminū esse eius finē credere cōuenit,  
& quod nō est facere, vt opte sanitate: & eam  
quæ est, conseruare. Si quidem ipsius artis vnici  
quæ propofitū, sanitas scilicet finisq. vnicus, nem-  
pe adeptio illius: quamvis modi sint ipsius ade-  
ptionis multiplices. Quippe dum submouemus  
aduersa & noxia, sanitatem acquirimus: dum vi-  
tium illa, præsentem sanitatem tuemus. Quare  
vtile in medicina recte aritumabimus, nonnunq.  
si ad sanitatē accendendum, nonnunq. si ad eam  
retinendam conseruare, non bifidi reputantes. Confe-  
cutionē autem ipsam diiudicare oportet ex eo,  
qd sublatū vno, aliud necessariū aufertur: si-  
cut & positū, ponitur. Talia namq. consequen-  
tia, coniectrixq. iure puranda sunt. Neq. enim  
quod medicinale theorema verum vtilēq. sit, co-  
gnoscere fatis fuerat, sed nihil secius ipsum cum  
aliis coherere, cōsentireq. opus est. Quandoquid-  
dem igitur omnis oratio, omnēq. theorema, tri-  
bus hisce perpenditur: tres autē in medicina sectæ  
celebres sunt, Rationalis, Empirica, Methodi-  
cæq. agē & hisce iudicandis rationibus vs, earū  
singulas diligentius examinemus, vt synceræ &  
salutarē, cæteris positis habitis, adhareamus. In pri-  
mis itaque quid inter eas conueniat, & quid cu-  
iusque sit propriū, exponere videtur necesse.  
Dein autem, singulas ad examen reducere. Por-  
ro cōuenit inter illarum trium sectarū professores,  
quod evidentiā theorematū vtilia sunt, ana-  
logifimus, obseruatio, hitoria, ad similitudinē.  
Præterea quod hitoria sine iudicio nō admitten-  
da: quod instrumenta, & remediōrū applicando  
rum modus ex vsu sunt: quod ex aliis ab depre-  
henduntur: quod idēdem præsentibus malis ea-  
dem sint faciēda: quod adiectionibus & subtra-  
ctionibus sanitas cōseruatur, atq. fugatur morbi:  
q. ad materiam adhibenda nōmā, experien-  
tia potēs atq. vtilis est. Si quidem quæ nutrit, &  
quæ nō nutrit, purgantia & leralia omnia, ex  
perientia cōperta sunt. Verum Methodici & Ra-  
tionales earens inter se conueniunt, quatenus  
vtriusq. vtile percipi ex indicatione arbitrantur.  
Quatenus verō ad diuersis accipit, earens sunt  
discordes. Si quidem methodici ex evidētib.  
sensui, vtilia iudicari existimant. At Rationales,  
ab huiusmodi quidem minimē, sed ab oculis  
hoc est, a causis. Quia in re etiam Empirici

Rationalibus suffragatur. Rursum, hoc loco in-  
ter Empiricos methodicosq. conuenit, oculū  
ex evidētib. nō agnoscī, ex quo cōferentium  
indicatio oriatur. Obiiciunt autem Empirici &  
Methodici Rationalibus, inuilem esse rerū ab-  
ditatum notitiam: nihil enim adbitum vtile re-  
periri. Ad hoc Rationales Empiricos quidē re-  
spondent, sensu cognita non satis esse, vt in ip-  
sibus obseruatione deprehendantur, cum ne ip-  
si quidem Empirici in omnibus sensu percēptis,  
vtantur obseruatione. Ac proinde oculis esse  
opus, vt & quibus cōferentium indicationes ual-  
deantur. Ultra dicta etiam, quādoquidem Em-  
pirici asserunt, & in præteritis & in præsentibus  
obseruandum esse, cum infirma sint, nam præ-  
teritis, tum præsentia, in infinitis autem obserua-  
tio fieri nō possit, planē eorum obseruationem  
ex his esse, quæ fieri non possunt. In Methodicos  
autem, sensui perspicua cōferentium esse indi-  
cariū putantes, hæc Rationales adducunt: Sen-  
sui nora ex seipis percipi possunt: vulgo igitur  
nora erant. Quoniam verō & cōmunitates indi-  
cant, similēq. cum indicantibus sese indicari of-  
ferunt, vulgariis vtrig indubant cōmunita-  
tes: atq. ita nihil a vulgaribus, & Methodicis, diffe-  
retis. Quod ab affectibus verō cōferentium  
indicatio non proveniat, hinc maxime licet cer-  
nere: quod eodem affectu, exempli gratia, phleg-  
mone, occupante differentes corporis partes,  
vt oculos, iecur & gulam, nō vtriusq. eadem ra-  
tione medēdi, cum nimirū desideretur diuersa.  
Oculo namq. inflammatio, fucus feniiculi, & lac  
muliebri cōueniunt. Gula autē, aut iecori, aliud  
quippa mē: cum tamen idē semper in omnibus  
eodem affectu applicandum esset prædicium, si  
affectus ipsi cōferentis indicarent. Non appli-  
cantur autem, affectus igitur cōferentia nō indi-  
cant. His summatim expositis, quidnam sit ipsa  
indicatio, atq. enī analogifimus, & qua ratione  
ab illis, necnō ab obseruatione sumatū vtile, ex-  
pedit aliquid dicere. Quemadmodū igitur sen-  
sui evidentiū aliqua per seipsa percipiuntur, vt  
album, & nigrum. nōnulla, adhibita obseruatio-  
ne, vt ea quæ dignoscuntur per notas: ita & iu-  
uantia quidem per indicationem patefciunt, nul-  
lūq. cogitationis opē indigēt. Quare quod in  
apertissimis & sine cōtroverfia cōcessis reperit,  
id nimirū & in perceptis ex indicatione contige-  
rit. Obseruatio autē, proportionē ad ea respon-  
det, quæ per signa & notas comprehenduntur.  
Verim ex analogifimo iuuans ipsum percipitur,  
quando causa ipsa ignoratur, nullūq. obserua-  
tio haberet, sed affectus quāssimilimus ex sym-  
ptomatis est. In huiusmodi enim ad indicatio-  
nem profuturum colligi nequit, cum ignoretur cau-  
sa. Idcirco nulla præterea facta obseruatione, ea  
suum similitudinem inuenientes, cogimur ad simi-  
le transgredi. Analogifimus itaq. per transitū ad  
simile fit: quo vtentes, a simili ad similia transi-  
mus. Empirici verō secus ac nos (hoc est, nullo  
profus iudicio adhibito) transitum huiusmodi  
vtriusq. Est igitur indicatio, iuuantis cōprehen-  
sio, simul cum cōprehensione infestantis adve-  
nitiæ, sine obseruatione intratio cinio. Experien-  
tia verō, est eius quod frequenter & eodē modo  
vifum

Empiricorum  
methodicorumq.  
di rationales  
abeclos.  
Rationalium  
contra Empiri-  
cos respondit.

Rationalium  
affertio contra  
methodicos.

tadiationem  
cōferentium  
non sum ab af-  
fectibus.

Oculo inflam-  
mato fucus feni-  
culi, & lac  
muliebri avari-  
liatur.  
Afflicta consue-  
ritus non vno  
dicant.

lanentia per  
indicationē pa-  
tefciunt.

iuuans quo pa-  
tis percipitur  
ex analogifimo.

Analogifimus  
fieri per transi-  
tū ad similia.

Indicatio  
quod.  
Experientia  
quod.



Observatio et  
experimenta te-  
dem.  
Analogia  
quid.

Empiricorum  
propterea.  
Rationem  
obstantem ad  
verum Empiri-  
cam.

viliū est, cōprehensio & memoria. Exterius ob-  
servatio & experientia sunt idem. Analogismus  
autem est comparatio, & perceptio causarum ita  
utrumque, per similitudinem. At deinceps, pro-  
pria causę fectę cum expofuerimus, ad verius  
singulas aliquid inducemus. Empiricorum fuit  
propria, utrumque in concubitus observatio,  
hūstoria, diuerfusq; à simili transitus. Ab ipsa ra-  
men causa sure petenda est, quę non in omnibus  
accidentibus, sed in certis quibufdam, se con-  
ferenda observare fateantur: cum accidentia, quę  
tenus sensui evidētia sunt, tam illa in quibus fit  
observatio, quā cetera omnia invivilla, nulla  
ex parte difident. \* Dicant igitur nobis, quid  
tam accidentia villā cōmoneant: apparetne,  
an occultis? Enim appars dixerint, quod villā  
accidentia producant, & in quibus est ob-  
servandum, inferemus iterum, hoc appars, quatenus  
confpicuum est, nihil ab invivillis differre  
accidentibus. Quid si occultum effe quod  
indicat villā accidentia, affirmet, occulta ad ac-  
cidentium observationem conducere, necessum  
est fateatur. At occulta nulla vivilla, quā ratio-  
nem comprehendit queunt. Quare si occulta villā  
sunt, in concubitus o ceculorum est observatio.  
Et si nihil aliud quā ratio comprehendit ē, ap-  
ertum iam est, absq; ratione observatio nō fieri  
nō posse. Quid autē in similibus accidentiū cō-  
cubitus observatio colligi nequeat, per hęc vā-  
de persequimur. Cū enim prorsus oporteat  
apud concurrentia, nō modō genere eadem, nu-  
mero æqualia, magnitudinēq; similia effe, sed et  
iam idem tempus, eundem ordinem servari  
necessum sit: vti etiā cōstitueret Empirici) si de-  
beat integra, absq; horarū observatio fieri: cūq;  
in omni vira, nē duobus quidē ægrotis, nedum  
pluribus, omnia symptōmata quę comitantur  
morbo, accedere similitur queant, clarū est hu-  
iusmodi observatioē fieri haud quāquā in istis  
concubitus posse. Quid si duo etiam ægri nū-  
la in re differentes in vena fuerint, non ob id ra-  
men cōcedenda observatio est: quandoquidē  
ipsi in pluribus fieri debet. Porro in quibus pro-  
positis viliū plerūq; aut invivile nos observemus  
iam dicamus Empiricis. Nos scilicet in solis sym-  
ptomatum generibus observare, in quibus nec  
potentia, nec tempore, nec magnitudine, nec or-  
dine, nec alio quopiam est opus: vti in denū ita  
pore: quę quę causas, loci, facultate five symptō-  
mata sunt, ex reparantur villā: quę verō nō hu-  
iusmodi, cū invivilla explodes ceterum si  
dicant, morum hæmorrhōia plura symptōmata  
comitantur, vos autem nihil in his observa-  
tione hæc eis respondebimus, non in illis sym-  
ptomatis, sed in ategreſſis causis, nos o observa-  
tioneē facere: symptōmata verō ad ategreſſa  
causarū causarū cognitionem, in quibus observa-  
tioneē itavimus, expendere. Causis namq; igno-  
rata, & facultate curādi ex indicatione carentes,  
observatioē in ategreſſis causis præstamus.  
Etenim cū demedias stupet, minimē portulacā  
observatur, sed affectus ab acidis acerbisq; or-  
tus: qui si ex fluxione, aut vomitu, aut fecibus se-  
re: ardore productus sit, nihil in portulacā pre-  
sidij fuit. Præ istius causam rimari, dein portu-

Acta videtur. Iam verò Empiricorum historia, quæ  
vniuersum, cum vi remedia contra omnes morbos  
abundent, nūm vi ipsa traditio sit breuior, In-  
nam omnino esse, nec confici posse, mox patefa-  
ciat. Omnis enim historia, aut præsentium, aut  
præteritorum est. Si quidem futurorum non hi-  
storia, sed potius diuinitio est dicenda. Etenim  
ipsi Empirici frequenter præteritorum historia  
sunt vsi: quam definiuit esse narrationem rerum  
fapsius circa eadem probatarum. Cuius autem o-  
mnia in historia enarrata vera esse affirmat, qui  
quem profectò iudicem habere deberent, qui  
et h̄e historiam institutam esse, diiudicare. Et cum  
non adit, aliquod diiudicandæ historiæ instru-  
mentum est reperendum, quod à falsis vera di-  
scerni possint. Si quidem circa vnam eandemque  
rem, non solum non consentiunt medici, sed et-  
iam contraria opinantur. Quare cum ipsi fate-  
ri cogantur, vtile esse historiam admittere, inter  
rogandi sunt, experientiam, an ratione, histo-  
riam iudicent. Ratione quidem nequeunt, cum  
ipsam exterminēt, et alioqui eo iudicare debent,  
quo istorum vniuersumque percipiunt. Arque expe-  
rientia, quæ iuuat, deprehensa fuisse prædictis  
experientia igitur etiam indicat ea esse necesse.  
Quare necessariò etiam Empirici de historia per  
experientiam iudicium faciunt id quod si ita est,  
relinquitur, superuacuum inuicem esse histo-  
riam. At Rationalis medicus, per causam dii-  
dicare historiam poterit: qui vbi causam nanci-  
scitur non potest, historiæ iudicium experientis cō-  
mitti. Nullius autem iuuantis notitiam haberi  
posse ex historia, nē magno quis negotio pro-  
baverit. Si quidem per quæ conclusimus in con-  
curribus obseruationem fieri non posse, per eam-  
dem efficiat, neque historiā posse constitui.  
Neg enim obseruationem fieri non posse, posse  
autem non obseruata describi, quipiam dixe-  
rit. Vniuersum autem ipso transitu ad simile Em-  
pirici, nonnūq̃ ab auxiliis ad auxilia, nonnūq̃  
alocis ad locos: est cū à vitiis ad vitiā. Ab auxi-  
liis quidem ad auxilia, vi quando mepilos, vi-  
ce cotoneorū, terminosis exhibent. Alocis au-  
tem ad locos, vi quando ea quæ in musculari-  
membris obseruantur, talibus etiam applicue-  
runt. A vitiis verò ad vitiā ita transeunt, veluti  
cū remedia ad sanguinis fluxum probata, ad  
hæmorrhoi morum accipiunt. Quomodo au-  
tem intelligant ipsam similitudinem, si interro-  
ges, facile ipsos cōvinces, argi in absurditates in-  
numeras precipitabis. Nunc verò de clarandam  
superest, quo modo Rationales transitum ad si-  
mile (quem nonnulli vocant analogismū) vsur-  
pent. Ipsorum symptomata, aliqua quidem cau-  
sas, aliqua passios locos, aliqua facultates, aliqua  
ægroratus sequuntur. Hæc Rationales omnia  
distingunt, nobiscū vbi obseruandum sit, nec nē.  
Quod aliā verò adit, abstinere, non laborat,  
cū nihil aliud ad curandō conferant. Quin etiam, vbi  
concurrit ipsi in aliquo symptomate inuili va-  
riare videtur, hanc seclius illdem vniuersum, quā si  
penitus confimilis concurfus adfuerit. Quoci-  
ca vitiā symptomata distinguit Rationales ad  
inuilibus (quæ facultate caret Empirici, cū  
secundum concurfus aut absentiam similia

Historia omnia  
esse praevalens  
aut praevalens.

Futureorum quæ  
historiam, sed  
damnationem  
esse.

Нынешнее издание  
сати от Емеля  
по раскраске  
полно, с 2-х  
полосками раскраски

Ex bullaria nō  
posse haberi in  
manu notari.

Empirici quo-  
modo videntur  
transire ad fi-  
nalem.

Rationalizing  
partial vaporization  
and simple trig-  
onometry.

Observationē  
absque ratione  
facti non posse.  
Observationē  
non posse colligi  
in similitudinem  
accidentali con-  
suetudine.

Observatio de  
hoc fieri in pla-  
nities.

Portulaca ad  
volantur propo-  
re dentitione.

symptomati, soleant semper curationē variare) sæpius dissimili in multis apparente concursu, eadem medicamenta sectatur, vt in emprosthotono, opithotono, opithotono, qui affectus diuersum cōcursum habere videtur. Intelligēs siquidem copiam sanguinis (si sic euenierit) in causa esse illorū affectuū, musculorūq; esse vitium, atq; vnum eundemq; morbum, eadem via incedet. Nam in priorē, aut in posteriorē, aut æqualiter in vtrāq; partem conuelli, patiens symptoma est: quod obseruatum, nullum ad curationē momentum addert: quemadmodum nec lachryma. Contra nonnunquam simili apparente concursu, vbi causam animadverit, differenti curatione vitur: vt in illis qui ob erosionem, aut fracturam, cruenta ore emitebant. Diuidens enim symptomata Rationalis, ad vtilēq; indicantia respiciens, atq; vtilia tantū ex ipsis deligens, auxiliūq; contra ea pugnare valentibus vtens, plerūque diuerso apparente concursu, eodem ipse semper modo curabit: aut contrā, apparente simili, diuersam curationē instruit, remedia nempe causis symptomatica producentibus, contraria adhibens. Sed quomodo, dicit aliquis, vtilia symptomatica à vanis, ipse Rationalis distinguat? Ad indicantia propolita referendū, respondet. Quemadmodum autem concursus, ita & curatio rationem distinguit: atque in primis perspicuum habet, quænam curationis auxilia, symptomatica quæ à causis producta sunt, aduersantur: quæ symptomatica à loco, facultateve exortis. Sciens namq; hoc à causis symptomatica nasci, à locis illud, aliud deniq; à facultate à causa præterea, auxiliū genus indicari, à loco vtendi modum, si vti à facultate mensuram, si quidem eadem causa sit, & causam præsentia signa similia etiā appareant, sed nec locus sit idem, nec facultas eadem, vtique idem remediū genus accipiet, sed mensuram, & vtendi rationē variabit. Contrā, si causa planē diuersa fuerit, sed locus & facultas sint idem, nō idem auxiliū genus, sed mensura, & vtendi ratio seruetur. Postquam igitur Rationalis medicus & concursus & curationes metiri est idoneus, potest secundum cōcursum similitudines, aliquas curationis partes pro suo arbitratu mutare. At Empiricus neque causam, neq; causā, aut loci, aut facultatis proditoria rimatus symptomatica, id nequam facere poterit: quo circa neque ad simile transitum iuter curandum ritē vsurpauerit. Ostendimus itaque ea quibus Empiricorum secta insignitur, atq; infirmatur: nempe obseruationē, historiam, & ad simile transitum, frustratoria esse, minimēq; consistere posse. Modō superest vltima acies cum Methodici depugnanda, quorum sanē iustitratia sunt hæc. Cum eadem symptomatica sunt, affectus autem, quibus hæc inhiærent, differunt, nō eadem medendi ratione eē vtendum: vt in phrenide generis affectū, atq; laxi. Rursus, si iidem ad sint affectus, symptomatica autē differat, eadē (inquit) curatione vtetur: vt in colicis, cerebriq; phlegmone, si vtrāq; sub astrictione generis continetur. Quandoquidē igitur symptomatica eadem cum sint, dissidente tamen ratione in medendo vtitur, cūq; illa differat, eodem nō

nūq; modo curamus, ideo inuiliā prorsus ad curationē pronunciant esse symptomatica. Cum autē subliis affectibus, ipsa pereant symptomatica, positis autem, perdurent, viles esse affectus contendunt, vt qui hæc exorientes producant, extinguant autem evanescentes. Quod autem per ea quæ methodo faciūt, cogantur vilia faceri symptomatica, facile cogniti eā. Nam homines vtique infantes, siue ob fluxum, siue ob astrictiōnem infantes, collocant in tenebrosos cubiculo, lucē ipsam addere ad infaniam existimantes. At veteros, siue astrictiōne, siue etiam fluxu laborent, loco splendido continere conantur. Tenebris enim veteris angescere putant. Cum igitur delirantes ex astrictiōne, in tenebris, quæ adaugent ipsam astrictiōnem, detineant: in luce autem, veteros ex fluxu, licet lux ipsa fluxum reddat magis exorbitantem, videtur certē mihi affectus ipsos negligere, solūq; intueri symptomatica. Sed neq; affectus conferentia indicare, vt opinatur Methodici, videri illis rationibus, quibus ipsi inuiliā esse symptomatica nitentur probare, etiam elici potuit. Nam si idem affectus sint, causæ verō differant, non eandem curationē admittunt. Vnde namq; suppreſſio, vnus quidem effectus est. Verum si calculus sit in causa, excindimus: si phlegmone, eam plasma illinimus. Si vesicæ supra modū distento, oriculanū specillum, aut cathetera imponimus: aut sgrum in genua bescentes, a phronitro extremum vrinariæ situlæ perficimus. At vna cum est causa, licet affectus differant, idem curandi genus admittimus. Cholera namq; & arthritus morbus, quauis dissimiles, eadem sermē & ipsi ratione curantur. Quamobrem, quoniam subliis causæ affectus auferūt, postea conſtituit: item diuersæ causæ, quauis affectus sint idem, diuersam: eadem, licet affectus variant, eandem curationem postulant, non iniuria nos

40 & causis, & affectus, & passos locos expendimus. Et quemadmodū symptomatica ipsi Methodici, quoniam à diuersis affectibus ea eadem, & ab iisdem diuersa pro veniunt, nihil cōmodi indicare testatur: itidem nos, à diuersis causis eosdem, ab iisdem diuersos gigni affectus cernentes, eos ad vtiliū indicationē in cōmodos esse dicimus: ad curationē autē sufficere perceptionē causæ, dignotionem perpetui loci, necnon ipsius facultatis mensuram. Quandoquidem sit ne fluor, an

50 astrictio, supervacaneum puto cognoscere, cum affectus nō quid agendū sit, aut quo modo, sed suam ipsorū subliantē indicet: id quod ne bruta quidem ignorat. At artifices tali indicatione nō egent, sed illa scire exoptant, per quæ linguae res pellantur. Nam si morbi sua ipsorū remedia eodē cerēt, laborites ipsi, per quæ ad sanitatē redirent, intelligerent. Quin & ex auxiliis adhibitis, non morbos, sed causas indicare medelam,prehendunt. Auxilia namq; non effectus, sed efficiētib; aduersantur. Itaq; non prorsus in cōmoda esse symptomatica, nec à morbis conducibile, sed à causis, indicari, satis amplē est offensum. Iam verō cum Methodici medicā facultatem definiūt esse cognitionem per se evidentū cōmunitatum, manifestē etiam hallucinantur,

Rationalis cura  
methodo-  
ri.

Infantes ite-  
muniter illu-  
cari in tene-  
bris.

Luce augere  
infaniam.  
Tenebris veter-  
num angescere.

Affectus confu-  
sionē non so-  
dicare.

Vrina suppreſ-  
sa vana cura-  
torū, pro du-  
rificatione cau-  
sæ.

Curationi quæ  
sufficiant.

Affectus suam  
ipsorū subliantē  
indicare docet.

Causa medelā  
inducit.  
Auxilia non effi-  
citis, sed effi-  
cientibus ad-  
uersantur.

Causa generis  
auxiliū indicat  
causā.  
Locus indicat  
vtendi modū.  
Facultas vtri-  
usq; prædicti  
inducit.

Rationalis pos-  
se curationem  
variare, id  
quod non licet  
Empirico.

Methodicorum  
dogmata.



*Menstruorum  
retentio, nō est  
afflictio, sicut  
neg. fluxu eorū  
naturalis, ex-  
creuit.*

*Communita-  
tes evidentes  
nō est.*

*Causarum dif-  
ferentia duplex.*

*Causa externa  
non laedit, nisi  
morbosa cau-  
sa adfit.*

atque convinci possunt: quandoquidem cōmuni-  
tates ipsæ, quas vocant, neque evidentes sunt, ne-  
que per se perceptibiles. Siquidem cūm non om-  
nis densitas & retentio afflictio sit, neque omnis  
raritas aut excretio fluxus (in pregnantibus enim  
retentio menstruorum nō est afflictio: sicuti neque  
fluxus, expulsiō illa materis vitulæ, quæ in mul-  
terculis mollioris vietus ratione visus externi sin-  
gulis mensibus solet) relinquatur manifestum,  
quæ sola ipsa symptomata respicit, eum nec fluxum,  
nec afflictionem deprehendere posse. Sed hæc ex aliis  
etiā esse dandicanda. Siquidem densitas ipsa &  
raritas, nonnullis quidem ingenuit, aliis advenit,  
& præter eorum naturam sunt: ac proinde oportet, in aliud quippiam affectio-  
nes eas referentis, ita secundū naturam ne sint,  
an vitiolæ, iudicium ferre. Amplius, id quod im-  
moderati, atque præter naturam est, evidens non  
est: quandoquidem ut cognoscatur, magna est  
opus inquisitione, necnon collatione ad vires.  
Atque cōmunitates (quod fatentur etiā Methodici)  
præter naturam sunt, atque immodica quæ-  
dam, cōmunitates igitur evidentes nō erunt. Il-  
lud etiam considerandum est, num quicquam vn-  
quam medicum acciderit, ipsiusmodi aut im-  
modica raritate vexatus. Quod si nemo vnquā  
cōmunitates percipit sensu, cur ipsi artem medi-  
cam definiunt esse notitiam per se evidencium  
cōmunitatum, quas quidem investigare & co-  
gnoscere, Erasistratus & Hippocrates oppido  
quā difficile & laboriosum existimant? Cie-  
terum etiam cōmunitates ipsæ evidentes sunt,  
nec ob id tamen eas aliquid vtile indicare est fa-  
ciendum, cūm aliunde ipsa vera indicatio inveni-  
gari debeat, nempe ab efficientibus causis, quarum  
differentia communissima est duplex: alix si-  
quidem in nostro corpore continentur, alix ac-  
cedunt extrinsecus. Verūm cum ab aliqua exter-  
na causa pulsamur, minimè laedi possumus, nisi  
alia interna causa in corpore delatens, impe-  
tum externi illius excipiat. Porro Methodici nō  
duas tantum cōmunitates, sed plures etiam sta-  
tuunt. Alias namque in viciis ratione, alias in chie-  
vrigia collocant. In viciis quidem ratione, ut  
astrictum, & fluxus, adiunctamque magnitudinē,  
& morbi tempora quatuor, & longinquitatem,  
& accretionem, et intermissionem. In manuaria  
autem opera, quod a natura alienum est, ponūt,  
loco, & tempore, & pluribus aliis. Sed de us tan-  
tum cōmunitatibus, quæ ad viciis rationē per-  
tinent, satis fuerit in præfationem aliquid dice-  
re: quas quidem intro uixerunt, nihil reperien-  
tes, quod auxiliorum differentias indicaret, ut  
scilicet iuxta ipsarum diversitatē, diversam in-  
venirent medendā rationem. Quod autem ma-  
gnitudo cōmunitatum non indicet magnitudi-  
nem remediorum, hinc nobis discernere licet, quod  
in ipsis morbis curandis, non simpliciter auxi-  
liorum magnitudine egemus, sed huiusmodi  
certa magnitudine. At magnitudo cōmunita-  
tum, non hanc huiusce auxilii magnitudinem,  
sed simpliciter magnitudinē indicat. Deinceps  
neque morbi tempora vtile quippiam indicare  
ostendimus: prius tamen aliqua de temporum  
differentiis tractanda sunt. Dux igitur temporū

differentiæ apud medicos celebrantur. Aliqua  
enim morborū, aliqua auxiliorū dicuntur tem-  
pora. Atque hanc manifestā curatio fiet. Causarum  
autē motiones morbi esse tempora dicunt.  
At motionis differentiæ sunt quatuor: initium,  
incrementum, status, & declinatio. Hæc eadem  
sunt & temporum nomina. Auxiliorū verō tem-  
pora, ea quæ ad ipsorum exhibitionem idonea  
sunt prædicant. Sunt autem idonea, quando re-  
medium postulant quidem quatuor: prohibens  
verò, nullum. Plerique autem auxiliorū morbo-  
rumque tempora, non re ipsa, sed cogitatione tan-  
tum differre existimant: quod auxilii morbi  
tempus simul incidat, interdumque eodem tem-  
pore & morbus sit, & auxilium optima reperia-  
tur occasio. Hallucinantur autem non leuiter.  
Nam si eadem auxiliorum morborumque tem-  
pora forent, nec re ipsa dudarē, oporteret quocu-  
que morbi tempore, tempus etiam auxilii ad-  
desse: nō autē quocumque morbi tempore auxilia ad-  
hibemus, nō eadem igitur auxiliorum morbo-  
rumque tempora. Perung etiam administra-  
re remedia, cūm morbus quidem non adest,  
sed futurus timetur. In morbi autem vigore &  
impetu, auxilium cōmodum tempus nō est. Con-  
trā verò in ipso vno declinationis tempore, plu-  
ra quis auxiliorū tempora, & quidem opportu-  
nissima accipiet. Ad hæc, morborum quatuor  
tempora habentur, initium, augmentum, sta-  
tus & inclinatio, quæ quidem in auxiliis mini-  
mè repere licebit. Quoniam morborū tempo-  
ra, aliqua vniuersalia, aliqua particularia sunt.  
At remediorum, generalia quidem describi pos-  
sunt, particularia verò nō item. Ex quibus liqui-  
dō constat, non sola cogitatione, sed re ipsa etiā,  
distingui huiusmodi tempora. At tempora qui-  
dem id quod vtile est indicare, methodici hæc ra-  
tione impulsu putant, quod tempora nō omnia  
ad cūm medicamentive assumptionem apta esse  
cernebant: cūmque temporibus nōnullis hæc vti-  
liter exhiberi, nōnullis verò noxiè spectarent, id  
ob temporū discrimina accidere arbitrabantur.  
Quare ex eodem fonte & cūm proposita, & reme-  
diorum tempora manare profitebantur. Hæc  
lūmque inter illos fecerit Hippocrates, dicens:  
Quando morbus in summo est, tunc victu te-  
nuissimo vtridum. Suspensus est quippe, ipsum  
naturæ temporis ductum, alimentis qualiter  
tunc præcipuisse, cūm tamen a tempore faculta-  
tem illi mensus fuerit, ac secundū ipsius faculta-  
tis mensurā, cūm qualitatē accepit: id quod ex  
his quæ subinxi, declarat. Coniectandū enim,  
inquam, an æger possit durare. Plerique enim tem-  
pora, quod a facultate requiritur, intervertūt, &  
ne accipiat impediri: nonnulli autē quid fa-  
ciendū sit, edocent. Cūm igitur ad quod ali-  
quid postulat, eius quod postulat propositum sit:  
quod verò nos postulatū sumere impedit, pro-  
positū nequaquā datur: vniq; morbi tempora nos  
interdum postularum sumere prohibentia, pro-  
posita minimè fuerint. Neque alia ratione constat  
duxisse Hippocratem, inter morborum initia  
quid videtur mouendū, moue: vigenibus autē,  
quiesce: melius est: quā quod circa ipsa prin-  
cipia, vires nondum infirmas esse intellexerit,

*Temporū diffe-  
rentia duplex.*

*Causarum mo-  
tiones differen-  
tiae sunt quæ  
tuor,*

*Tempora auxi-  
liorum.*

*Tempora auxi-  
liorum remedia-  
rumque non ead-  
em esse.*

*In vigore mor-  
borū remedia, nō  
est opportuna  
auxilia.*  
*Declinatio mor-  
bi opportuna  
est auxiliorū  
viam.*  
*Morborum tem-  
pora quatuor,*

*Tempora inter-  
dum interve-  
nere quod a fa-  
cultate requi-  
runt.*

sed posse eas facile inactiones perferre: at circa morbi statum, & invaleſcere cauſas morbiſicas, & virtutem languidam effici, proſtèrni, atq; la- beſactari. Cui accedit, neq; impunè poſſe admi- niſtrari remedia, cum omnia præter naturã ſint, ob idq; naturales facultates inſeſtèr, nec poſſunt adeo morboſas cauſas teſcinde, quin vbi cum illis, aliquid etiam benignè ſubſtantiæ rapiant.

Quare primũ ipſam auxiliorum naturam, & vſum, non ignoſcere oportet. Auxilia autem per ſe, cauſas extirpare non poſſunt, ſed naturæ ad- miniculum poſtulant: & ſermè ſolum impetum, moruſq; initium naturæ iniiciunt, quæ per ſe poſtea totum opus aſſoluit. Igitur cum eſt valida, remediolorum violentiam perſert, & bonæ inge- nitiæq; ſubſtantiæ detractationem facilè ſuſtinet, minimòq; negotio ipſam direxanti excutere poſſet. Atq; morbi vehemètia valde laborans, adhuc remediis adhibitis magis opprimitur, & propriis direptis opibus, infirmior redditur, & lædentibus cauſis magis ſuccumbit, morbiq; au- tores nullatenus poſſet expellere. Cum verò na- tura ipſa conata, diſcutere ſibi inſeſta nõ valuit, magnopere ex ipſo conatu imbecilla efficitur. Atq; his de cauſis, in principio quidem nõ licet, mouere, iuxta doctri- nã Hippocratis: in ſtatu aut ceſſandum eſt. Quod autem neg facultas ipſa in- dicare remediũ poſſit, ex hoc evadere perſpicuũ.

Nam ſi conſtans vi- remedium mdicat, in ſanis quoq; quidoquidem in eis conſtat, remedium ſimiliter indicabit. Sed in ſanis remediũ non in- dicat, ergo neg etiam in ægris modum ſeruans facultas indicabit remediũ. Siquidem opus eſt, vt ſcopus præſentia indicet: facultas autè ipſa, ſcopum admodum ſuprà eſt expoſitum, prohibe- re ne accipiat id quod requiritur, valet itaque remediũ ſcopus, ipſa nequaquam exiſtit. Quam vicem autè in exhibendis remediis facultas ge- rit, eandè in dandis cibis, morbi tempora. Item, vt ad remedia ſe habent eorum appetentes cau- ſe, ita & ad alimenta facultas. Facilitatem verd exiguum eſcam poſtulare, nõ initium, atq; in- crementum, inde declaratur, quòd ex ægritudine conualeſcentibus modicum cibum præbemus, quem facultas requirit. Nam ſi modicum cibum incrementi oſtenderet, expediret iſto ad ſatu- riam impleri, abſente nempe ipſo paucum ci- bum indicante propoſito. Ad hæc, nõ mdica- ri alimentum qualiter, quante tẽmẽ de tem- pore, hinc erit liquet. Quod genus indicat, id qua- litatem iſtudicare eſt neceſſe. Atqui alimentum genus facultas indicat: illius igitur qualiter, quantitatẽ quoque indicabit: nam ſine differentiã alimentum genus indicat. Differentiam verò acci- piens, & diſcrimen in genere demõſtrabit. Qua- re mento Hippocrates ciborum quantitatis ſco- pum, facultatem ſtatuiſſe videtur, vbi ait: Augẽ- ſcentia corpora plurimum habent calidi innati: plurimo igitur alimento indigent. Item qualita- tem pro facultatis differentiã evidentẽ aſſumit,

60 dicens: Cibus iuuenibus quidem in ſummo æ- tate flore non muratur: ſenibus autem exquisitè permixtatur. Ex quibus clarifiſimũ eſt, virtutem abſolutè eſcarũ genus a ppetere: differentiã verò addita, qualitatem. At tempus, nec ciborũ qua-

litatem, nec quantitatem oſtendere. Nam ſi mor- borum tempus ciborum quantitatem & qua- litatem præſcriberent, aut in ſu conſervationẽ, aut abolitionem id facerent. Primum autem eſt omni ex parte ridiculum. Ex ſecundo verò infer- tur, talem tantũq; cibum, aliqua adverſus tem- pora contrarietate eſſe præditum. A ſolis namq; contrariis contraria tolluntur. At temporibus nec talis, nec tantus cibus cõtrarius dicitur, cõm nõ ſub eodem genere conſtiterent, nec poſſit quod vnum eſt, dici contrariũ pluribus. Hæc ea- dem ratione efficitur, vt nec remediolorum diſfe- rentiam morborũ tempora indicent. Quòd au- tem aium, principium indicare, quod augmen- tum prohibet, ſcopum aſt agnitum indicare ni- hil, extremè ridiculum eſt. Cuius erroris origo ipſis ex altera falſa opinione manauit. Creden- tes enim quilibet morbuſ tranſire per quatuor tempora, verifiſimile arbitratũ ſunt, vt morborũ initia ſuppreſſionem in incrementi indicarent. Id igitur ipſos latuit, non omnem morbum incipe- re, augeri, in ſummo cõſiſtere, ac declinare. Ac- tu nanque morbi, qualis apoplexia eſt, ſimul atq; in vaſcunt, ad extremam aſcendunt magnitudi- nem. Et qui iudicant morbuſ, vno tempore, de- clinatione ſcilicet, muſtat. Siquidem iudica- tione, in ſua vehemètia morbus, adhuc etiam augeteſcentes, diſcunt. Poſſet præterea inter- minari, remediis alibi, deleri morbus: atq; ita cõtra morbi tempora præteriri, ſuccidẽ cõ- tinget. Id præterea Methodicorũ decretũ eſt fa- ctum, quòd inter morborũ initia aſtringentibus ſemper vendũ cenſent. Cauſam verò inde plac- tum illud accepit, quòd malitæ phlegmonæ per aſtringentia, reprimẽtiq; inter initia deſinit. Cum autè quilibet ſecundũ ipſos phlegmonẽ, aſtrictio ſit, abſurduſ planè videtur, aſtrictos aſ- ſeſtus per cõdenſantia tolli id quòd ſe hoc nomi- ne facere proſentent, nõ vt cauſe reprimantur,

60 ſed vt corpora firmiora, minusq; panibilia red- dantur. Quibus ita reſponſum velim, minimè ſi- ri poſſe, vt nocentibus cauſis ſimul auſtis, cor- pora ægrè panibilia reddantur. Cæterũ quòd in- dicantibus phlegmonis, cõmodè aſtringentia ad moueantur, ob iſpercuſionẽ humorũ læden- tium, nõ vt cõſolietur robur particulũ, vt illi exi- ſtulant, nemo id nõ fatetur. Nam ſi ex aſtrictio- nis ratione firmitudo conciliaretur corporibus, valentiores bene ſanis, ſenſiq; iunioribus longe vegetiores exiſteret. Qui igitur corporibus ro- bur firmitudo inẽniẽ cõparare ſtuduerit, minimè qui corpus dum reddatur, cogit opus eſt: ſed qua ratione membrorũ vires augetant, quibus liberè atq; expedire proprios vſus exhibeant.

60 ſed vt corpora firmiora, minusq; panibilia red- dantur. Quibus ita reſponſum velim, minimè ſi- ri poſſe, vt nocentibus cauſis ſimul auſtis, cor- pora ægrè panibilia reddantur. Cæterũ quòd in- dicantibus phlegmonis, cõmodè aſtringentia ad moueantur, ob iſpercuſionẽ humorũ læden- tium, nõ vt cõſolietur robur particulũ, vt illi exi- ſtulant, nemo id nõ fatetur. Nam ſi ex aſtrictio- nis ratione firmitudo conciliaretur corporibus, valentiores bene ſanis, ſenſiq; iunioribus longe vegetiores exiſteret. Qui igitur corporibus ro- bur firmitudo inẽniẽ cõparare ſtuduerit, minimè qui corpus dum reddatur, cogit opus eſt: ſed qua ratione membrorũ vires augetant, quibus liberè atq; expedire proprios vſus exhibeant.

60 ſed vt corpora firmiora, minusq; panibilia red- dantur. Quibus ita reſponſum velim, minimè ſi- ri poſſe, vt nocentibus cauſis ſimul auſtis, cor- pora ægrè panibilia reddantur. Cæterũ quòd in- dicantibus phlegmonis, cõmodè aſtringentia ad moueantur, ob iſpercuſionẽ humorũ læden- tium, nõ vt cõſolietur robur particulũ, vt illi exi- ſtulant, nemo id nõ fatetur. Nam ſi ex aſtrictio- nis ratione firmitudo conciliaretur corporibus, valentiores bene ſanis, ſenſiq; iunioribus longe vegetiores exiſteret. Qui igitur corporibus ro- bur firmitudo inẽniẽ cõparare ſtuduerit, minimè qui corpus dum reddatur, cogit opus eſt: ſed qua ratione membrorũ vires augetant, quibus liberè atq; expedire proprios vſus exhibeant.

60 ſed vt corpora firmiora, minusq; panibilia red- dantur. Quibus ita reſponſum velim, minimè ſi- ri poſſe, vt nocentibus cauſis ſimul auſtis, cor- pora ægrè panibilia reddantur. Cæterũ quòd in- dicantibus phlegmonis, cõmodè aſtringentia ad moueantur, ob iſpercuſionẽ humorũ læden- tium, nõ vt cõſolietur robur particulũ, vt illi exi- ſtulant, nemo id nõ fatetur. Nam ſi ex aſtrictio- nis ratione firmitudo conciliaretur corporibus, valentiores bene ſanis, ſenſiq; iunioribus longe vegetiores exiſteret. Qui igitur corporibus ro- bur firmitudo inẽniẽ cõparare ſtuduerit, minimè qui corpus dum reddatur, cogit opus eſt: ſed qua ratione membrorũ vires augetant, quibus liberè atq; expedire proprios vſus exhibeant.

60 ſed vt corpora firmiora, minusq; panibilia red- dantur. Quibus ita reſponſum velim, minimè ſi- ri poſſe, vt nocentibus cauſis ſimul auſtis, cor- pora ægrè panibilia reddantur. Cæterũ quòd in- dicantibus phlegmonis, cõmodè aſtringentia ad moueantur, ob iſpercuſionẽ humorũ læden- tium, nõ vt cõſolietur robur particulũ, vt illi exi- ſtulant, nemo id nõ fatetur. Nam ſi ex aſtrictio- nis ratione firmitudo conciliaretur corporibus, valentiores bene ſanis, ſenſiq; iunioribus longe vegetiores exiſteret. Qui igitur corporibus ro- bur firmitudo inẽniẽ cõparare ſtuduerit, minimè qui corpus dum reddatur, cogit opus eſt: ſed qua ratione membrorũ vires augetant, quibus liberè atq; expedire proprios vſus exhibeant.

60 ſed vt corpora firmiora, minusq; panibilia red- dantur. Quibus ita reſponſum velim, minimè ſi- ri poſſe, vt nocentibus cauſis ſimul auſtis, cor- pora ægrè panibilia reddantur. Cæterũ quòd in- dicantibus phlegmonis, cõmodè aſtringentia ad moueantur, ob iſpercuſionẽ humorũ læden- tium, nõ vt cõſolietur robur particulũ, vt illi exi- ſtulant, nemo id nõ fatetur. Nam ſi ex aſtrictio- nis ratione firmitudo conciliaretur corporibus, valentiores bene ſanis, ſenſiq; iunioribus longe vegetiores exiſteret. Qui igitur corporibus ro- bur firmitudo inẽniẽ cõparare ſtuduerit, minimè qui corpus dum reddatur, cogit opus eſt: ſed qua ratione membrorũ vires augetant, quibus liberè atq; expedire proprios vſus exhibeant.

60 ſed vt corpora firmiora, minusq; panibilia red- dantur. Quibus ita reſponſum velim, minimè ſi- ri poſſe, vt nocentibus cauſis ſimul auſtis, cor- pora ægrè panibilia reddantur. Cæterũ quòd in- dicantibus phlegmonis, cõmodè aſtringentia ad moueantur, ob iſpercuſionẽ humorũ læden- tium, nõ vt cõſolietur robur particulũ, vt illi exi- ſtulant, nemo id nõ fatetur. Nam ſi ex aſtrictio- nis ratione firmitudo conciliaretur corporibus, valentiores bene ſanis, ſenſiq; iunioribus longe vegetiores exiſteret. Qui igitur corporibus ro- bur firmitudo inẽniẽ cõparare ſtuduerit, minimè qui corpus dum reddatur, cogit opus eſt: ſed qua ratione membrorũ vires augetant, quibus liberè atq; expedire proprios vſus exhibeant.

60 ſed vt corpora firmiora, minusq; panibilia red- dantur. Quibus ita reſponſum velim, minimè ſi- ri poſſe, vt nocentibus cauſis ſimul auſtis, cor- pora ægrè panibilia reddantur. Cæterũ quòd in- dicantibus phlegmonis, cõmodè aſtringentia ad moueantur, ob iſpercuſionẽ humorũ læden- tium, nõ vt cõſolietur robur particulũ, vt illi exi- ſtulant, nemo id nõ fatetur. Nam ſi ex aſtrictio- nis ratione firmitudo conciliaretur corporibus, valentiores bene ſanis, ſenſiq; iunioribus longe vegetiores exiſteret. Qui igitur corporibus ro- bur firmitudo inẽniẽ cõparare ſtuduerit, minimè qui corpus dum reddatur, cogit opus eſt: ſed qua ratione membrorũ vires augetant, quibus liberè atq; expedire proprios vſus exhibeant.

60 ſed vt corpora firmiora, minusq; panibilia red- dantur. Quibus ita reſponſum velim, minimè ſi- ri poſſe, vt nocentibus cauſis ſimul auſtis, cor- pora ægrè panibilia reddantur. Cæterũ quòd in- dicantibus phlegmonis, cõmodè aſtringentia ad moueantur, ob iſpercuſionẽ humorũ læden- tium, nõ vt cõſolietur robur particulũ, vt illi exi- ſtulant, nemo id nõ fatetur. Nam ſi ex aſtrictio- nis ratione firmitudo conciliaretur corporibus, valentiores bene ſanis, ſenſiq; iunioribus longe vegetiores exiſteret. Qui igitur corporibus ro- bur firmitudo inẽniẽ cõparare ſtuduerit, minimè qui corpus dum reddatur, cogit opus eſt: ſed qua ratione membrorũ vires augetant, quibus liberè atq; expedire proprios vſus exhibeant.

60 ſed vt corpora firmiora, minusq; panibilia red- dantur. Quibus ita reſponſum velim, minimè ſi- ri poſſe, vt nocentibus cauſis ſimul auſtis, cor- pora ægrè panibilia reddantur. Cæterũ quòd in- dicantibus phlegmonis, cõmodè aſtringentia ad moueantur, ob iſpercuſionẽ humorũ læden- tium, nõ vt cõſolietur robur particulũ, vt illi exi- ſtulant, nemo id nõ fatetur. Nam ſi ex aſtrictio- nis ratione firmitudo conciliaretur corporibus, valentiores bene ſanis, ſenſiq; iunioribus longe vegetiores exiſteret. Qui igitur corporibus ro- bur firmitudo inẽniẽ cõparare ſtuduerit, minimè qui corpus dum reddatur, cogit opus eſt: ſed qua ratione membrorũ vires augetant, quibus liberè atq; expedire proprios vſus exhibeant.

Remedia o-  
mnino eſſe præ-  
ter naturam.

Auxilia per ſe  
cauſas morbiſi-  
cas extirpare  
non poſſe, ſed  
aditum motus  
naturæ mul-  
ta.

Facilitatem ad  
indicandũ reme-  
diũ.

Facultas probi-  
bet ne accipia-  
tur id quod re-  
quiratur.

Conualeſcen-  
tibus modicu-  
m præberi.

Tempus nec  
qualitatẽ nec  
quantitatẽ ali-  
menti iudicare  
Facultas indi-  
cat alimentum ge-  
nus.

Facilitatem eſ-  
ſe ciborũ qua-  
litatem ſcopum.

Contraria a ſe  
in cõtrariis tol-  
li.

Vno pluribus  
duo cõtrarium  
non poſſe.  
Morborum tem-  
pora, remedi-  
orũ differentiã  
non indicant.

Morbi non o-  
mnino quatuor  
ſortibus tem-  
pora.

Acuti morbi ſi-  
mul atq; in va-  
ſcunt, ad extre-  
mũ perueniunt  
magnitudinẽ.  
Morbi qui indi-  
cantur, contin-  
entur declina-  
tione.  
Morbi poſſe in  
initia deſicere.

Phlegmonis in-  
corporatio, ſi  
modè a diſcreti  
aſtringentia.

Robor qua-  
ritur concilia-  
do corpus.



re audeas, statim alacritati tuæ obsecundare, atq; in tuam gratiam duos cōmentarios cōscribere, alterum in quo monstratur, quamlibet artem à finis notionē suam habere constitutionē: alterū (quē habemus præ manibus) vbi ostendimus, methodū eam quæ omnes alias artes, ipsam quoq; medicinā constituisse: id quod tam nobis est exordium. Cum igitur artium ipsarū alie quidem in sola naturæ contemplatione, quas sibi propofuerit considerandas, suum habeant finem, vt astrologia & physice alie edant præterea nonnullas actiones, à quibus cessantes, nullum permanens opificium ostendunt, vt saltatoria: alie opificium rerum possunt ostendere, vt ars ædificatoria & fabrilis: alie deniq; nihil efficiant ipse, aliquid tamen aucupari conentur, vt venatoria: manifestum vtiq; est, artem me dicam ex effectiuarum genere existere: habet .n. aliquod opificiū, qd finita actione possit ostendere. Quare iam operæ precium fuerit, eandem methodū, quam in ceteris factibus artibus priorū cōmentario tradidimus, ad hanc, quā in præfenti cōstituere conamur, transferre, posito hic quoq; eodem principio, quod in aliis est statum, nempe finis notionē. Prima igitur quæ in nobis suboritur cognitio, est hominum rectē valen num: altera ab illa, corundem, cum morbis impliciti sunt. Vnde mox in nobis bene valendi desiderium assurgit, atq; aliāq; sanitatis conciliatricem constituendi. Vt autem proponimus efficere integram valetudinem, sic ex factiuarum numero ars ea furit adest, quam cōstituere volumus. Dein, cum duplices factiue artes sint (nonnullæ quidem res ipsas faciunt, alie labefactas instaurant, corrigunt) hæc quam inuestigamus, in eis potius erit, quæ rem iam factam rescunt, quam quæ aliquid, quod prius non esset, edunt. Quemadmodum igitur illi qui ædificaturus, aut collapsas instauraturus est ædes, necessum est prius omnes ædū particulas, earūq; constitutionē accuratē nouisse: sic enī qui artem, quæ circa humanū corpus versatur, cōstituturus est, illius partes omnes sigillatim necessariō debet cognoscere: quali nimirū substantia, qua magnitudine, quali figura & numero prædictæ sint, quāq; inter se structuram formantur. Et quemadmodū ille qui extruit domū, nunquam cognitionē particulariū, nisi ex resolutione assequi poterit, ita nos corporis humani notitiā, ex illius dissectione consequimur. Deus quippe & natura, instaurat illius quæ primū rēdes est fabricatus, prænotant partes, earum officia pro exemplari vti. Nos verò illum qui extructā domum contemplantur, imitatur. Vbi autem ex dissectione ipsa, naturā, formā, magnitudinē, numerum, & concretionē partium similariū apprehendimus, compositorū pariter membrorum (quæ nonnullāq; & instrumentaria vocantur) scientiā assequemur. Quo si deinde, vt duplices partiū actiones in corpore repariantur, simpliciu nempe, atq; compositarū: cum & eras vniuersū moueri, & sigillatim musculos eius omnes videamus: cūq; musculo quocūq; per transversum resecto, necessariū sit deperire ipsius motū aliquem cruris: vulneratōq; nervo,

primū quidem, musculum cui inseritur, expertem motus & sensus reddi, mox verò & articulum q ab eo mouebatur. Quare itanc nobis artem cōstituturū, necessariū fore arbitror, etiam partiū actiones cognoscere: id quod sanē ab ædificatoribus nos distinguit. Duplex igitur est, vt particularum, ita & actionū natura: vna quidem prima, & maximē propria, dum panter omnes simplices partes agunt: altera verò ex accidenti, aut secundaria, quæ tonus est instrumenti. Vt, totius quidē cruris actio incessus est, qui fit, dum articuli illius vicissim nunc extenduntur, nunc inflectuntur. Ipsius porro facultatis motu cis à cerebro descendentiā, nervus veluti via quædam est. Cerebrū namq; esse nervus omnibus huiusmodi facultatis originē, principiumve, inde perdisca licet, quod secūto quocting; nervo, in supremis partibus, quæ cerebro connentes sunt, actiones seruantur integræ, cum tamen omnes in inferioribus petant. Incessus itaq; actio est tonus cruris, cui actioni musculorum præest genus. Ossa siquidem, cartilagine, adeps, glandulæ, arteriæ, citia, venæ, membranz, ligamentūq; a musculis habent initium motus. Primum enim ab ipsis ossa mouentur, mox cætera vni cum ipsis enā moueantur oportet. Ad quem motum necessaria fuerit optima cum osium, tum etiam ligamentorū cōmoderatiō, cōstitutioq;.

Ac de cæterarum partiū actione & vtu, similiter discernendum, vt quæ optimē cōstitutæ sunt, seruentur, quæ autem vitio nō carent, ad meliorem statum ducantur: id quod minimē nobis licebit, nisi vniuscuiusq; partis rum actionē, rum vsum, atque adeo etiam structuram examinauerimus. Structuram porro cuiuscūq; rei, in vitiosa sit, an ab omni prorsus immunis vitio, nemopendere poterit, nisi is magnitudinē, numerum, figuram, & situm omniū partiū, ex quibus talis res constat, optimē scrutatus prius fuerit. Quandoquidē omniū instrumentariorū corporū, quæ ex cōpositione suā essentia fortuntur, tum vitii, tum integritatis, affectusq; omnes, quatuor generib. his cōtinetur. Quod si partes vnionis quoq; ex natura participes sint, quintū hoc genus his addendū erit corporibus: ita vt quod in ipsis se præstantissime habuerit, sit optimas habiturū actiones: quæ admodū pessimas, quod deterrimē. Si ergo etiam vniō solatur, talis affectus enī morbus, quem vnitatis diuortiū vocamus, quo nō solum instrumentaria, sed similares etiam affiguntur particule. Ceterū in offe is affectus fractura dicitur: in carne verò musculorū parte, si cum distentione accidat, fissura, hoc est, scissura. Vbi autem sic filamenta teoduntur vt disrumpantur, conuulsio: vbi caro circa tensionem solatur, vlnus. In nervo dicitur affectus is, scissio. Si vlnus ab acuto telo insignitū, punctio vocatur: si à graui, cōtussio: si à corrosione ortum habeat, in offe quidem, caries: in aliis autem partibus, vlcus vocatur. Tot ergo, talisq; in hoc quinto morborum genere, quod simplices particule occupat, differentiæ erunt. Instrumentariis verò sæpe accidant, atq; diuisiones dicuntur. Sed si similis quæpiam particula dissecetur in totū, affectio illa, partim

*Nervum autē cōstituturū, necessaria est partium actionū cognitiō.*

*Cerebrum esse originem suarū talū vnitatis per nervos dicitur.*

*Musculos præstare motum.*

*Arti quolibet à finis autem suū habet cōstitutionem. Methodus quæ alias artes, ipsaq; medicinā constituit.*

*Medicinā autē, ex effectiuarū genere cōstituere.*

*Triplex ars duplicis.*

*Medicinā autē ex eo esse quod labefactas instaurant.*

*Medicinā autē cōstituturū corpus humanū: particulas quoque sui debet cognoscere.*

*Deus et natura prænotant imperia partium, utrum officio pro exemplari vti.*

*Alium partium duplicis, simpliciu nomen, ex compositarum.*

*Instrumentariū vitium integrū fortuitū, in magnitudine, numero, figura et sitū cōsistit.*

*Vitium solatur morbus, in magnitudine, numero, figura et sitū cōsistit.*

*Conuulsio. Vlnus. Scissio. Punctio. Cōtussio. Caries. Vlcus.*

*Diuisio.*

illius quæ secta est, dicitur, partim totius instrumēti: quæ minus nōn quā huius nō nisi ex accidenti dicenda sit, ut cum aliquis musculus paritur. Quādoq; autē etiam primū, ut cum aliquod ligamentum: quem admodū igitur in hoc vno morborum genere fecimus, sic in aliis quatuor differentiz tibi scrutandis sunt. Quibus examinatis, nō esse oportet, possit ne pars quæpiam in alterius locum reſtitut, an minimē. Quādoquidem si reſtatuens carnem vitiatam, facili poteris similem aliam reſicere: ſecus autē si nervus, vel ligamentū dissectum fuerit. Neq; enim alia reſarctis, qualia erant priora. cum illa quidem ex sanguine generetur, hæc verō ex ſemine ducant originem. Os quoq; in iis eſt, quæ per primam efformationem conſtituta ſunt. Ceterū in locum ipsius aliquid ſuggerere poſſimus, quod oſi quā ſimilimū ſit. Verū in alio methodo ipſa nos cogit ad inquirendū, utrū vnaquæq; pars, earum quæ & ſimplices, & ſimilares vident, vñ ſit, an potius ex pluribus conſtituta. & præterea, quia ſit earum cōpoſitionis modus. Quæ inquitio, quāvis nō philoſophus modō, ſed etiam medicorū nōnullis admodum ſit vix diſſicilis, nā tamen quibus adſint ſeptem adimenta quæ ſubdam, facili cum illius, tum aliarum omnium diſſicultatum, ipſam veritatē inveniri: aut ſi minus, ſaltem non omnino de invētiōe deſperabunt.

Septem igitur illa ſunt, natura perſpicax, educatio optima, præceptoris ingenius, labor improbus, veritatis ardentiffimus amor, optima methodus, exercitatio deniq; aſidua. Quorū ſi vel vnum deſideretur, qui ad vñ veritatē introducendus eſt, non eſt admodum ſperandum, illum poſſe ſui voti compotem fieri: ſi verō omnia cumulara adſint, quid deinde verat, quo minus veritatem, bona etiam ſpe, exquiramus? Revertamur autem eō, unde digreſſa eſt oratio, diſquiramus primū, an carius (exempli gratia) elementum, vñ ſpecie ſit. Deinde verō, ſi ſecus videatur, an plura. Mox quoq; ea ſint, & quæ, & quæ habeant cōpoſitionis modum. Profecto ſi caro cum vel ſecatur, vel impenſius caſſit, dolet, fieri nequit ut ex vno elemento cōſiſt: ut ex atomo, quem admodū Epicurus exiſtimavit. Quare pulchre diuus inquit Hippocrates: Si vnus exiſtat homo, ne unquā dolebit: quia in alterū nequit mutari, ſi vñ eſt, cum nihil præterea relinquatur, in quod mutetur. Quod ſi eſt mutationis, erit quoq; alterationis expertus, atque impabile, ac proinde nulli dolori obnoxius. Si itaq; elementum carius eſſet ſpecie vñ, nunquā illa doleret: dolet autem, igitur elementū carius non eſt ſpecie vñ. Rurſus, ſi impabile eſſet elementum carnis, nō doleret: atque dolet, non igitur eſt impabile. Quibus rationibus, ſub vertutū dogmatā eorū, qui tum atomos, tum ſimilitudines, tum elementa quatuor, ſed quæ mutuo inter ſe tranſmutari nequeant, introduxerūt. Quippe ſi duos digitos ſimul cōmitas, & moxq; diſiungas iterū, neq; eorum conventus, nec diſſolutio, aliquē excitabit dolorem. Ut enim aliquid dolet, ita patitur. Siquidem pars, ab his duobus prodiit, ab alteratione per totum, & ſi continui diſſolutione. Quādoquidem igitur nec conventus, nec ſepa-

ratio corporibus vel maniſeſtō panibilibus, vñ adfert dolorē, minus proſectō adferet impabilebus. Ex enim quodcūq; in dolore futurum eſt, neceſſum habet, ut cum patendi, tum ſentiendi facultate prædiū ſit. Nulla tamē neceſſitas cogit, id quod ſentit, ex illa primis conſtare, quæ ipſa etiam vim habeant ſentiendi: nam ſat erit ſi ex patibilibus ſit. Dū enim patitur, alterabaturq; potēt aliquā ſentiendi vim aſſequi. Cū innumeris poſſent eſſe alterationes elementorū, vnde mox innumeris particulari poterant præteritæ orari, ſic ut alix evadant ſenſus expertes, alix illo præditæ ſint. Ex dictis igitur conſtat, elementa eſſe plura vno, eiq; alterationi eſſe obnoxia: nunc verō numerus eorū nobis inveniendus eſt. Neceſſum autem eſt, ut illa quæ rem quāpiā alterant, primū quidem illud conſiderant, quod ab eis alterā dū eſt, atq; ita mox ipſum tandem immutent, idq; per tales qualitates, quæ alterare totam proximæ rei ſubſtantiam poſſunt: cuiuſmodi ſunt caliditas, frigidi-

tas, humiditas, atq; ſiccitas: quæ quidem acbuz qualitates planē & ſunt, & dicuntur: ex eiſq; vel maxime oppoſito prima, atq; in hac ipſa, caliditas. Præter has quatuor, nulla reperitur qualitas, quæ corpora quib; occurrat, alterare poterit poſit. Vnde ſi nūem ad minima viſ ſecueris, nix quidem ſervabitur: ſed ſimilac calſiet, deſuetur acturum nix eſſe. Quare quæcūq; corpora has quatuor qualitates ſibi vendicaverint primū, erunt omnī corporū elementa: ſunt autē hæc, terra, aqua, ær, ignisq; ac proinde vniuerſe, qui demōſtrationi parent, philoſophi, hæc eſſe omniū quæ gignuntur, intereuntq; vera elementa, neq; non mutuo ſe tranſmutare, habereq; omnia ſubiectum quoddam cōmune, autem at. Igitur ex quatuor elementis ſimul cōtemperatis, corpus vñ ſimilare gignitur: quod pro varia temperamenti ratione, aut particeps ſenſus, aut illius expertus evadit. Vnde corporū ſimilitudines differētiæ, quæ ſimplices quidem ſunt, torſunt, quorū elementa: calidiores nempe, frigidiore, humidiores, atque ſicciores. Totidē verō & cōpoſitæ, ut quæ ſimul calidiores & humidiores ſunt: quæq; frigidiore & humidiores: & præter has, alia tertia, ſiccior atq; calidior: & quarto deinde loco, quæ ſiccior eſt, & frigidiore: ſic tamē, ut quæ temperatiſſima eſt, & horum omnīū prima, nō negligatur. Cū igitur ab vñ ſit iam oſſicium, ſimilitudinū partium integritatē & vitium, in elementorū tum moderatione, tum immoderatione cōſiſtere, ſuper eſt ut inquiramus, quo modo ab earū vno morbus ſit diſtinguendus. Diſtinguetur autem & rei cuiuſq; nonne. Porro ſalubris conſtitutio corporis, actiones ſibi ex natura debitas, in oſſenſus habet: morboſa, oſſenſus. Idcirco ſi quis ſanus quidem ſit, altero tamen, qui itidē proſpera valetudine fruatur, actiones habeat imbecilliores, erit ſanē ſi intertemperat illo, necdum tamen a grota: itaq; inter ſalubres habitus vniuerſos, vnus erit temperatiſſimus, oſto autē intertemperati. At inter morboſos, nullū temperatum invenias: eundem tamen numerū cōmplement, quem intertemperatū ſalubres. Ac de his hæc ſententia. Deinceps autē dicendum eſt, quo modo

*Dolorum cor  
pore eſſe do  
let panibilib;  
& ſimilac  
ſenſibile corp;  
non neceſſario  
ex ſubſtantia  
conſiſt.*

*Elementa eſſe  
plura vno  
nam altera  
tionem obnoxia  
Alterant ſe  
mutuo: ſed  
non poſſe  
Taliſia qua  
litatē.*

*Actus quali  
tatem calidit,  
frigidiore, hu  
miditatem & ſic  
citatem.*

*Elementa o  
mnium ſunt,  
terra, aqua,  
aer, ignisq;.*

*Similitudinē  
partium differē  
tiæ ſimplicis  
tot eſſe: quæ  
mutata, totidē  
quæcūq; eſſe  
compoſitæ.*

*Similitudinē  
partium integritatē  
et vitium  
in elementorū  
moderatione,  
immoderatione  
neq; conſiſtere.  
Morbus qui di  
ſtinguendus a  
vitiis ſimilitudinū  
particularum.*

*Morbi ſunt ſani,  
quorū conſtitutio  
inter ſalubres.*

*Carnis reſtitu  
ſimilem caſſat  
tari poſſe.  
Nervum aut li  
gamentum ſiſ  
ſum, reſtu  
ſui non poſſe.  
Caro ex ſan  
guine, nervi  
ex ſemine gene  
rari.*

*Adinventio ſi  
piti ad veritatē  
ſe obſtru  
ſe rebus porre  
ſpiciant.*

*Carnis elementū  
tam non eſſe  
vñ.*

*Carnis elementū  
tam nō eſſe  
impabile.*

*Pars cuiuſq;  
aliquid, nō al  
terationem &  
ſimilitudinē con  
ſtituit.*

modo quis morbos curret, quo modo & sanitate  
tueatur. Invenio medendi Methodos ex ipso  
cum sanorū, tū ægrorū corporū affectū, suū prin-  
cipium habet. Cum .n. id qd' exquisitè sanū exis-  
tit, omni ex parte sit moderatū: qd' verò ægrū,  
immoderatū: advertendū in primis est, quoniam  
ea sit illius immoderatio. Quippe necessariū est  
aliā inveniri immoderationē contrariā, per quā  
illam exterminemus. Reddita siquidem ab im-  
moderatione ad temperē, in omnibus erit per  
immoderationē contrariā. Ut tandem neces-  
sarium sit, id quod propter naturam affectū est, dum  
ad naturalem statum redit, illam eandem quasi  
viā incedere, quam prius consecravit, præterq̃  
quod ordine contrario. Quare generalissimus  
curandorū morborū scopus erit, Contrariā con-  
trariis remedia esse, & particularem particula-  
riā cōstrariā. Calido enim morbo, frigidū & fri-  
gido calidū. Ita etiā sicco, qd' humectat: humidū  
quod exsiccet. In similibus siquid res se habet  
hoc modo. In instrumentariis autem, oportet in  
vnoquoq; prædictorū quatuor generū, morbo-  
se immoderationi cōspici adhibere contrariā,  
donec ad moderatōem, naturāq; statum per-  
venit fuerit. Ut, si (exempli gratia) caro plus  
quam par sit, vlcen excrescent, erodenda est. Sin  
autem nimis cauum sit vlcus, implendum. Simi-  
liter & in aliis faciendum. Considerandum au-  
tem in omnibus generibus est, num habeamus  
facultatem, ea quæ ex indicatione se offerūt, per-  
ficiendi. Si quidem morbi species, curatonis tan-  
tūm modum indicat. Id autē fieri possit nec ne,  
haud item indicat. Etenim eorum omnium que  
profunt corpori, in causa est, cum ipsa natura,  
tum etiā medicus. Quædam tamen medicus,  
quædam etiā natura præstare nequit. Os nimi-  
rum ita perforatum, vt de suo loco partes decedant,  
membrūq; difformi reddatur, haud po-  
test natura corrigere ad conformare, sicuti po-  
test medicus. Sed natura potest vlcus cauum im-  
plere: quemadmodū quæ semicocta sunt, aut e-  
riam cruda, concoquere: id quod negatū est me-  
dico. Quāquā hac peragenda, medici mirifice  
natura potest ex viū esse, vt dum congrua  
medicamentis vlcus reddit purissimū, & eis quæ  
concoctione egent, ea offert quæ modicè califi-  
cant. Iam vero natura ipsa, nonnulla etiā pri-  
mū a se confecta, denuo non valet reficere: vt  
venam, arteriam, ligamentū, neruū, & alia id ge-  
nus. Si quidem ob inopiam materię, nullum eo-  
rum natura reficere valet, quæ ex semine suum  
ortum duxerunt. Igitur scopis ipsi a Methodo  
medendi reperti, eos in particulare materiaz  
inducere oportet: vt deinde comprehendantur,  
que aut omnino, aut ex parte aliqua, aut aliquo  
etiā tempore, secundū eam fieri possint, quæq;  
secus. Nec verò est exiguā latus artis portio, re-  
mediors in omniū materiis, tam similiarum par-  
tum, quā in dissimilariū morbiā cōgruentium,  
adinvicem. Quorum vniuersum genus, in offe-  
rendis, efficiendis, evacuandis, & iis præterea  
quæ extrinsecus accidunt, plane consistunt. Quæ  
omnia, ubi artis cōducitur ad amissam perfecti-  
tus, et consecretus fuerit, iam causas omnes salu-  
bres, vt nihil illi præterea ad artem medendi de-

fit, absoluisse putandas est: hia omnibus redactis  
in capita duo, nempe corporū cognitionē, qui-  
bus remedia offerenda sunt, atq; ipsam remedi-  
um naturam. Verū hoc mox illi quoq; super-  
erit, vt ipsi aliquam affectū omnū dignoscen-  
dorum facultatē comparet, maxime vtr eorū,  
qui partes in alio sitas occupant: quos exacte co-  
gnosceret, vni cum affectis particulis, haud fuit  
obvā cuiusq;. Quocirca de his etiam aliquid  
impræsentariū dicendum. Tria sunt genera re-  
rum præter naturā. Primū, affectus qui lædūt na-  
turales functiones. Secundum, horū causæ. Ter-  
tium, symptomata. Sed causæ potissimū appel-  
lantur, cum agitur: quāvis ita nonnunq; dicatur,  
quod vim habeant agendi. Symptomata verò  
genus in tres differentias digeritur: in actionia  
lætionem, in ea quæ corpori accidunt, & in ex-  
crementorū exuperantia. Quocirca omnium sym-  
ptomatum existit causa ipse affectus: ob idq; meri-  
to ex illis agnoscitur. Symptomata porro non-  
nulla affectus ipsos necessariō concomitantur.  
Alia non ex necessitate, sed aut sæpius, aut raro,  
aut equaliter. Sicuti alia rursus, affectū discer-  
entia necessariō sequuntur: quod sæpe, alia raro,  
alia in incipit sunt. Ea itaq; symptomata, q̃ mor-  
bos ex necessitate sequuntur, quod affectū in se  
cognitionē habeant, dicuntur Græcis pathognomo-  
nica, & pro morborum notis habenda sunt.  
Quæ verò non necessariō, ea vel morbi differen-  
tiam, vel illius mores, vel magnitudinē indicit.  
Vtrorūq; autem vim vno eodēq; aperiamus  
exemplo. Costas succingēs membrana teneatur  
inflammatione: quæ affectum necessitatē sequen-  
tur tumor præter naturam, rubor, & dolor veluti  
pungens circa ipsas costas: quoniam est substantia  
affecte partis membrana. Latē etiā vagabimur  
dolor, quod ea ipsa membrana latē etiā  
diffunditur. Febrim quoq; tum ex ipsa phlegmo-  
ne, tum ex vicina cordis, sequi necessariū est.  
Quorū si vel alterū desit, iam non ex necessitate  
febris aderit. Nam si dignus inflammatione labo-  
ret, aut costas cingens membrana scirrhus, ac de  
matēve assilatur, nō cōtinuō adnotetur febris.  
Quin & spirandi difficultas incidit, quæ affe-  
ctus ipse producit, potius quā in læsa pars. Do-  
lor namq; respirationis operā (cuius viū nondum  
explo) diffoluit: vt mox necessū sit alterū ce-  
lerius illi succedere actionem, vnde spiritus fre-  
quē & parvus redditur. Aderit etiā, præter eam  
quæ coniungi a febre nō potest, & pulsum quoq;  
alteram, nempe durities tensioni iuncta: quia  
pars phlegmone obiecta, nervosa est. Cum autē  
duplex sit ea tunica quæ costas velat, si ea pars  
quæ exteriori ossibus latet, valde aliquādo la-  
boret, scilicet ægri in latus decumbit oppositū.  
Nam si decubant in læsionē, cōpressio molestā  
adfert. At si interior (qd' frequentius contingit)  
vehementius dolent, si in oppositum latus recl-  
nent, cōm nimirū pensilis sic reddatur inflāmata  
particula. Quod si vtraq; membrana afficiatur,  
par in vtroq; latere decubitis fuerit. Ad hæc, si  
inflammatio in thoracis illius partibus excite-  
tur, clavicula trahi deorsum videtur. Si in infer-  
nis, dolor præcordia pertingit. Quam obrem exi-  
gua inflammatio erit, & secundū partes costarū

horum præter  
naturam esse  
tria genera.  
Affectus  
Causa.  
Symptomata.

Symptomatum  
differentia tria.  
Affectus cognos-  
centia ex Sympto-  
matibus.

Pathognomo-  
nica.

Febricitudo sym-  
ptomata.

Dolorem lateris  
ex causis res-  
pirationis ope-  
rantur.





fitus loci æstimandus est, quid o astringente me-  
dicamento opus fuerit. Quia si medicamentum  
ipsum astringens potest eo pervenire, nil vetat  
quo minus ipsum admodum situm. Sin minus, ca-  
uendum tunc, ne humorem ex vicinis partibus  
in affectum locum pellamus. Quare vel aliquid  
admiscendum astringenti medicamento est, qd  
eo virtutem illius perducit: vel ab illius vi in  
totum fuerit suspendendum. Ac de his quidem  
iam dicta sufficiant. Deinceps nonnulli de præ-  
sagio dicendum, cuius artem qui constituere vo-  
luerint, is necesse habet prius examinasse, an fieri  
cuiuslibet rei animatae proprii vitæ spacium cõ-  
stitutum est à natura, sic etiam omnibus mor-  
bis: ut nullo deinde pacto, si sit alius illorum à  
natura constitutum bimetrum tempus, possit is  
quatuor diebus absolvere: an verò & in longum  
protrahi, & celerrimè possit finire. Vbi igitur ex-  
tremè in locum aliquem decubuerint, nec des-  
tauat amplius, si cuiuslibet humoris naturam ex-  
ploraverimus, facili artificiali quadam cõsuetu-  
ra concoctionis rationem & tempus depelen-  
demus: modo cetera omnia rectè circa ægrotan-  
tem traicentur. Nam quicquid erroris fuerit in  
his commissum, erit profecto in causa, ut vel se-  
rius morbus solvatur, vel mors celerrimè adven-  
tat. Quare tunc sanè præsagia sunt eventura, ubi  
& medicus præstansimul fuerit, & æger in nullo  
delinquat. Medicus igitur his duobus, mor-  
bo inquam & naturæ, vel vi colluctantibus, sem-  
per mentè intendit: ac dum dixerint quodnam  
horum robustius sit, primum quidem suum de  
salute hominis aut internæ, præsagium deprimat.  
Dein verò, quod alterum altero fortius esse  
novit, eo & illius præstitum tempus agnoscit.  
Vt enim celerrimè morbus solvendus est, si vires  
fuit validiores: si citò mors advētat, si hæc im-  
becilles fuerint, morbus autem vellemens. Sed  
magnitudo excessus horum tempus indicabit.  
Naturæ robur ex propriis illius actionibus cõ-  
prehendes, maxime verò ex pulsū. Si quidem is,  
facultatis vitalis est opus. Morbi autem magni-  
tudinē cognoscis ex viis symptomatum. At qua-  
tenuis alterum altero prævalet, concoctio crudi-  
tatisq; indicabit: quas subinde ex propriis excre-  
mentis cognoscet. Quæ cum in ventriculo con-  
ficiuntur, deiectiones cõmonstrant: quæ in va-  
sibus, urinae: quæ in corpore universo, sudores.  
Quo etiam modo & reliquæ concoctiones om-  
nes se habent, quæ in vna quapiā parte, aut plu-  
ribus absolvuntur. Quibus omnibus cõmune est,  
nunquam morbum solui posse, nisi prius in ex-  
crementis, concoctionis signa cernantur. Nam  
ut concoctiones omnes celerrimè crasim, salustisq;  
fecunditate indicant, sic cruda, & quæ ut præpo-  
nuntur abscedunt, vel nullam crasim, vel labo-  
res, vel tempus prolixum, vel mortes, vel crudi-  
tates declarant. Ac iam mihi videtur universa me-  
dendi Methodus (quæ formam tantum, ac veluti  
universalem speciem tonus negotii continet) ad finem suum pervenisse. Reliqua autem nunc  
fuerit, ut modum aliquem, quo quis possit eos, qui  
a morbis sunt liberati, rescire: et prospicere au-  
tem his, qui in morbos proclives sunt: ac eos de-  
vitiis, qui inculpata fruuntur corporis valetudi-

ne conservare, doceamus. Ergo ex symptomati-  
bus, quæ medium inter ea quæ sanis insunt, & ea  
quæ eveniunt ægris, feruntur, deprehendunt ipsa  
in morbos proclivitas. Affectiones verò quæ ra-  
lem proclivitatē gignunt, per contraria sunt cor-  
rigendæ: tamen hæc res summam tractanda  
est: nam si transigenda particulatim, omne exuberans  
est vacuandū: sic ut prius sit distinguen-  
da exuberandi ratio, quantum ad an qualitatem,  
aut vtraque etiam ratione cavberet. Ac deinde,  
quod potest iterum ad naturalem statū redire,  
sic per contraria alteretur, ut quod crassum len-  
tūq; est, tenue fiat: quod tenue, crassius redda-  
tur: ambo verò panter concoquantur: obstru-  
ctiones præterea aperiantur: quæ toto genere  
exsunt: præter naturam, quemadmodum veneta  
animali, tum alterentur, tum evacuentur. Alie-  
ratio autem per contraria fiat, quæ vel tota sub-  
stantia adversantur, vel altera, vel vtraq; qua-  
tate. At evacuatio, per ea quæ trahendi vim habet.  
Cæterū hæc omnia quibus sunt peragenda reme-  
dia, ab ipso morbo petendū est. Quin si omnes  
pariter humores accreuerint, præcipua ipsorum  
vacuatio erit per secliam venam. Deinde verò  
per incisiones, per exercitia, per balnea, per me-  
diam. Nec alia enim erit vacuandi ratio, cum so-  
lus sanguis excesserit. Vbi autē dant vel atre-  
bilis fucus, vel serosus humor continetur in pri-  
mis venis, purgandi tales humores sunt is, quæ  
alium commoueat. Si in aliis tenuia & aquosa  
excrementa fuerint, per urinā si biliosiora, per  
purgatoria. Possunt tamen & tenuia etiam alii  
deiectione purgari. Sed quæ totum corporis ha-  
bitum occupaverint, cum tenuia fuerint, aut su-  
dore, aut medicamentis, quæ cum applicata, vim  
exiccandi habent: cum verò biliosa, primum qui-  
dem purgatione egent, mox evacuatione per cu-  
tim. At cum pituitosus fucus exuberant, si sal-  
sus sit, est purgandum. Si acidus, experimundum  
an possimus eum alterare: & longè etiam magis  
si dulcis fuerit, erit enim is cõcoctus facilius. Por-  
rò ad concoctionem conducit quies, calidatio  
modica, cibi parvus usus, boni tamen succi, po-  
tus vini parvi calfacientis, moderata frictio, me-  
diocri vias calidiorum aquarum, insuperq; cibi  
atq; medicamēta moderatè calfacientia. Obstru-  
ctiones referant quæcumq; deficiunt, vel me-  
dicamenta attenuantia. In quibus autem nulla  
causa, nullusq; affectus præter naturam est, sed  
cum gracilitate, sola imbecillitas virium, q̄ facile  
in naturalem habitū reducuntur, si moderatis ci-  
bis & modicis reficiantur. At materiæ qui-  
bus hi alienda instaurandiq; sint, in opere de sani-  
tate tuenda explicavimus. Ne tamen defesse ali-  
quid hinc sermone videretur, non modo ipsius ana-  
leptices, sed universi etiam salubris negotii me-  
thodus, hoc quoq; loco repetenda est. Si solum  
hoc eveniret corpori, ut in halitus disaretur, &  
subinde inaniretur, cibis potissimè defectu illum  
sarcire possit. Quia vero humorū copia, præva-  
guis excrementa gignuntur, & egerunt excretioni-  
bus: quæcumq; natiū est minus, superfluum suc-  
cum vacuare, excrementa verò cõcoquere et ex-  
purpare: si tamē causæ omnes videntur, à quibus  
solet vitari fucus, refrigeratio inquam, æstus,

Proclivitas in  
morbo, unde  
deprehenditur.

Exuberans om-  
ne vacuum-  
dum esse.

Tenuis fucus  
esse contrax-  
des, ut cuncta  
quantur: cras-  
si autem in-  
creascent.

Veneta altera  
da & vacuan-  
da esse.

Alterationem  
per contraria  
moliantur.  
Vacuatio fiat  
per trahentia.  
Solutio vera  
cõmodissima  
vacuum pletho-  
ram.

Purgatio qui-  
bus debet  
humoribus,  
qualisq;.

Puritas dulcis  
q̄ concoctio fa-  
cilius.

Concoctioni  
quæ conducit.

Obstructiones  
aperiantur.

Analgetica.

Excretionum  
vires.

Sensitum vi-  
norum.

lassitudo, cruditas, remolentia, ira, furor, & confusio. Ergo vt vniuersam medicine rationem per capita resumamus, medicina est e numero facultatum artium, quae res vitiatas rescindunt. Ea autem sibi exemplar nullum constringit, sed contemplantur quidem omnia ex corporis affectionibus ac deinde, si quid vitiosum sit, corrigere id coherant. Sed hoc differt ab aliis artibus, quod maxime ex parte se operantur naturae ministrum praestent.

### GAL. DE PARTIBVS ARTIS MEDICAE LIB.



On absq[ue] ratione mihi quidem, Iuste charissime, de partibus artis medicæ dubitare videns: quippe cum alios alio modo eas partem animadversas idq[ue] maxime Romæ, vbi artē ipsam medicā, in membra innumera rescindit: ita vt alios oculos medicos vocent, alios auricularē, & eos etiam qui ani crās medentur, pecu-

Romani q[ui] medicina arti multiplem.

Medicina omnium artium maxime.

Romæ Alexandriamq[ue] populosissimas vbi possit quoniam medicum alere, qui vel vnicuique morbo curare possit. Graeciam vniuersam vix potuisse praestare medicum, quod sola Roma.

Arteriam esse duplicem tunica.

Facile est arti.

Theoretica.

in alias simpliciores haud quidem secari sufficere. Vniuersa tamen ratio curandi suffusione, alius quibusdam notis eger, & illis quidem duplicibus secundum genus. Sunt autem hæc, prima quidem præparatoria. Secunda verò illa, quam apothecapeucen Graeci vocant. Siquidem si quis vult aliquem nimis repletum, aut præis plenum humoribus, vel etiam dolentem secundum caput, ad huiusmodi operationem deducere, is inflammationes in membranis quæ punctæ sunt, facili exorabit, & malè vniuersum caput afficiet. Quod ne fiat, arte præparatoria erit opus: cuius institutum est, totum corpus ab excrescentiis, succedens exvendantibus vacuū, atq[ue] illud caput ab omni dolore immune reddere. Nec verò eodē modo se habet nonia inflammationis curandæ, quo illam se habere diximus, quæ succurrendum est suffusionibus. Quin etiam alia est ars curandæ inflammationis secundum genus: alia eius, quæ ex certa particula definitur: vt ophthalmia, quæ inflammatio externæ oculorum tunice existit: aut peripneumonia, quæ pulmonis: aut pleuritis, quæ membranae costalis ambientis. Porro si secundum corporis affectiones velit quis ipsam artem partem, primæ maxime eius partes erūt, curatrix, salubris, prophylactica, analeptica, sennu custodiendū ratio, educatrix infanū, necnon optimi habitus conciliatrix. Est tamen & alia partitio, quæ a ratione operationū, & eadem differentis depromi potest: quemadmodum chirurgien, pharmacucent, & diætenen, esse primas atq[ue] præcipuas artis medicæ partes pronunciat. Quæ partitio quibusdam penes materiam differentias fieri videtur. Nam cum omnis particula corporis iuuari & seruari possit, aut victus ratione, aut medicamentis, aut manu opera, inde tres illas indicat partes distinctissime videtur. Dicamus itaque primas, & proprias, & quæ maxime esse artis medicæ partes eas, per quas ipsius artis finē consequimur: alias autem esse lites superiores. Ac tot quidem secundum numerum primæ proximæque sunt, quot sunt maxime propriæ rationes medendi. Licebit porro medicam ipsam artem in suas partes diuidere duplici modo: vno quidem, si sumamus initium ab ipsius artis prima ac maxime propria materia, vt constat per multimembrem illam diuisionem, quam assignauimus. Altero verò, a secunda materia, nec ita propria, hoc est, a corpore humano (quod quidem per accedens, eatenusq[ue] artis medicinalis, necnon philosophiæ materia exiit, quatenus sanitatē & morbum recipit, generationēq[ue] & intentum subit) initio diuisionis exordio. Ceterū non modè partitio quæ ex huiusce materiæ sectione elicitur, ad vltimas vsq[ue] deducitur, & elementares ipsius artis particulas, verū & illa etiam, quæ a præcipua rationis artis materia oriatur. Præterea abt & alio modo fieri hæc artis partitio potest, si vnumquodq[ue] morborū propositū genus, per proximās differentias ad vltimā vsq[ue] particulas animus sit diuidere: quæ partitio si rectè fiat, consequenter etiam perueniet ad elementares vsq[ue] notias. Nilū igitur est, cur ex multiplicitate partitioū dubitem. Quin potius tecum perpende, an nihil sit præter-

Suffusio curanda, quæ natura sua necessaria. Natura præparatoria. Natura apothecapeucen.

Vbi debet necesse est esse suffusio, ante vniuersum humorum potestatem.

Ophthalmia quid. Peripneumonia quid. Pleuritis quid. Medicina partes secundæ quæ sunt effectus.

Medicina partes secundæ operationum dicitur.

Partes firmari vel ratione, medicamentis, aut manu opera.

Medicina partes maximæ propria sunt, per quas artis finem consequimur. Medicina partes duplices.

Corpus humanum ex accedens, eatenusq[ue] artis medicinalis, necnon philosophiæ materia.

præter-



Medicina dicitur  
fieri ex materia  
et forma. Propria  
ipsum autem ma-  
teria.

prætermisum, ex iis quæ occurrere possunt. Optimum tamen iudicio meo fuerit, si initium à maximè propria simpliciter ipsius artis materia: cui mox ex prædicta methodo addiderimus cetera.

### GALENI PERGAMENI de elementis lib. I.

Elementum est  
maxima res,  
quæ efficitur,  
partes.  
Sensum vero  
si indicem pro-  
prium elemen-  
torum.



Vando quidem elementum est mini-  
ma res, quam constituit, porno: nec  
id ipsum quod videtur, est etiam re-  
vera minuium: manifestè sanè liquet,  
sensum minimè eorū fore indicem,  
quæ vera, & ex ipsa natura sunt res vniuersales  
elementa. Idcirco non cum Hippocrate, neglectus  
iis quæ prima, sensus iudicio, simpliciter magis ha-  
beatur, illa autem quæ vere sunt naturæ huma-  
næ elementa, quæ in alia dissolui non possunt,  
nec minus curandis morbis ex vñ sunt, quæ  
hæc, quæ sensus talia videntur, summo studio in-  
quiramus: nempe an vñ tantū specie, an plu-  
ra potius & dissimilia sint. Quod si non tantum  
vñ, sed plura sint atque varia elementa, quæ ten-  
dum rursus, quod vñ tantum sint illa: scivñ & quæ,  
& qualia, quæque inter se tandem cōmunionem  
fortantur. Quod igitur primū id elementum, ex  
quo tum nostrum, tum aliorum omnium corpora  
constant, nec forma, nec potestate sit vñ, hæc  
docet ratio Hippocratis. Si homo esset vñ,  
nevisquam doleret. Quod si doleret, vñ cum ne  
cessario medicamentum desideraret. rectè qui-  
dem ille & brevisimè totam rei summā demon-  
strans. Nam si homo esset vñ, hoc est, vñco  
ex elemento constaret, non esset ex quo dolorem  
posset accipere. Quod si aliquo dolore corperet,  
vñca tantum esset medendi ratio. Nam  
cū à nulla causa externa perpeti posset, ne cessā-  
riū à sua ipsius natura, interne pati deberet.  
Cum autem vñca tantum fuerit vñco, quæque  
natura, vñcus erit affectus, ratioque redeundi ad  
naturalem situm visus: id quod absurdum est,  
cū infinita ferè sint, vt morborum, sic prædi-  
corum species. Eadem quoque ratione licet eorū  
sententias convellere, qui atomos, omnes  
propterea qualitates atque alterationes expertes,  
necnon inco-pacilia corpūcula introduxerunt,  
vñcoque generationis primordia. Quippe nec  
homo doleret, si talis esset natura illius. Siquidē  
necessum est, vt id quod dolo, cum sensus, tum  
etiam alterationis sit capax. Quod si ab omni  
genitus sit alteratione alienum, eundem omni-  
no statum, quem ab initio sortitū est, perpetuū  
seruabūt. Lam verò, si transmutetur quidem, sed  
nulla illi sit inuata sententia de vis, nihil propterea  
magis affectiones ipsas sentire poterit, quàm ip-  
si lapides sentiunt. Cum igitur vt vñco horum  
atomis in alteras illas corpūculis delectetur,  
certè si ex eis, aut alia quæpiam simili atque  
vñco formi natura, concreuerit elementum, non vñco do-  
leremus: dolemus autē, nequaquā igitur finis  
ex vñca simplici vñcoque substantia conditi.  
Porro cum duo sint instrumenta, quibus om-  
nia inveniuntur dogmata, ratio videlicet atque  
experientia, neutrum horum vñcoque ita illis in-  
sensiet, vt aliquid sint repetitū cōcretum ex eis,

Elementum cor-  
porum non est  
vñco.

Atomus hæc  
possi quidem  
se elementa cor-  
porum.

Dolorem, nec-  
essario debet  
esse tum sensus,  
tum alteratio-  
nis capax.

Instrumenta  
quibus omnia  
inveniuntur  
dogmata, est  
ratio, experien-  
tia.

quæ pariter impanibilia, & sine sensu sint: quod  
ipsum deinde panibile sit, atque sensus participes.  
Ius verò quantumlibet illæ omnes atomi in-  
itum haberent sensum, essent tamen impanibiles  
impenetrabilesque, ita vt ex solo mutuo earum  
complexu, ipsa caro generaretur, nihil magis  
impactum acum perirentur, quàm cum ac-  
ipsa digitos iunctos disiungimus. Reliquū igitur  
erit, vt sentiens corpus vel ex iis sit, quæ pa-  
ritur vim habeant sentiendi & patendi: vel ex  
iis, quæ pati quidem possint, sed nullum deinde  
sensum habeant. Nos autem mox perpedimus,  
vñco horum sit vñco. Si igitur elementū non  
posset esse impanibile, nō erit enim specie vñco.  
Siquidem quod est vñco, semper est impani-  
bile: cū nihil reliquum sit, in quod transmutari,  
aut à quo pati queat. Quicquid enim transmu-  
tatur, in alterum transmutatur: & quod patitur,  
ab altero patitur. Quare plura esse elementa, iam  
comperit cum sit, eorum numerum inquiramus.  
Prius tamen scias omnes eorum, qui in  
vñco elementis differunt, distinguamus.  
Rediguntur enim in quatuor: quæ prima  
est, quæ ex sensu vacua, pariter & impani-  
bilis: altera, quæ ex sensu quidem prædictis, ce-  
terum impanibilis, consistere quæ sunt altera-  
tionis obnoxia, pronūciat. Quæ ambigunt in hoc  
veniunt, quod ex impanibilis statuit. Quare  
cum impossibilia tradant, eas multas faciemus.  
Super sunt itaque duæ: altera, quæ corpus sentiens,  
ex primis elementis facultatem cum patendi,  
tum sentiendi habentibus, constituit: altera, quæ  
ex panibilibus, sed sensu expertibus. Inter quas  
item ea est cōmuniō, quod ambigunt ex panibilibus  
aiunt. Quarum scitarum vtque possibile quid  
proferret. Nam si ipsas particulas explorare, ratio-  
nemque examinare volueris, ea quæ corporum  
sunt vñco sentiendi habentium, omnes & panibi-  
les sunt, & facultate sentiendi prædite. Quod si  
prima respexeris elementa, facile fieri poterit, vt  
quamvis ea nullum habere elementum dicatur, mo-  
do possint in se mutuo, multis intercedentibus,  
particularibus alterationibus, sensu prædictum cor-  
pus gignatur. Quoniam enim ex pluribus  
quicquam componitur, si ea quæ in composi-  
tionem veniunt, qualia sunt, talia id extremum  
durauerit, nunquam profecto id nouam ali-  
quam, ad vñcoque vt adipsetur formam, que  
in eis non præsent, ex quibus constituebatur.  
At si ea inuifaniam varientur, transmutentur,  
& cōmīscantur, poterit tunc in composito ali-  
quod fabrorum, quod ab eis quæ prius in primis il-  
lus elementis reperiebatur, su generis alterius.  
Quare qui ex igne, aqua, aere & terra, inuicem  
transmutans atque alterans, & ad temperantem  
quoddam reducens, gigni corpus voluit senti-  
entis facilitate prædictum, hī cōsueti ea pronun-  
tiant. Qui verò ex illis ita vt sint permanentibus,  
& cōmīscantur tantummodo, perinde vt tri-  
umque horum, & fabre sunt in aëre, nō nimirū  
ea quæ fieri nequeunt, scētantur. His igitur,  
& quod vñco plura omnino sint elementa, & quod  
pati citius possint, monstratū est: id quod cō-  
firmans Hippocrates, ait: Qui, obsecro, fieri po-

Elementum nō  
possi esse impani-  
bile.

Transmutatio-  
nem fieri in al-  
terum.  
Passionem fieri  
ab altero.  
Scias verò quid  
de elementis dif-  
ferant, esse qua-  
tuor.

De elementis a-  
priori sententia  
non fabrorum.

test, vt ex vno quicquam constituatur, cum ne ex pluribus quidem possit, nisi ea probe fuerint composita. An vero ex iis primis elementis, quibus omnibus vis inest sentiendi, cōsistent sensibilia corpora: an ex illis potius que illa careant, nondum monstratum est. Porro nonnulla quidem omni carere sensu inde perspicui est, quod ex compositis etiam quardam lūvismodi sint. Fatua itaq; est hæc naturalium philosophorum, quàm medicorū opinio, qui vnum vel hominis, vel etiam ipsius vniuersi elementum asserunt. Thales etenim, Anaximenes, Anaximander, cum illisq; etiam Heraclitus, ex elementorū transmutatione mutua, quod singula in vicina alia cernant degenerare, vnūquodq; ex illis esse elementum vniuersale, prorsus demonstrare conantur, sic tamen vt aliud aliud statuat. Qui sane milui videntur omnes cōmunem illam somniasse materiam primam, omnibus elements subiectam: quam vt vnicui videntur, sic etiam vnicui esse elementum putant. Ceterum qui vniuersa pronuntiant vnum, tam ipsius naturalis philosophiæ, quàm Medicinæ principia destruant, ob idq; contra eos disputandum nō est. Id autem ab omni ratione est alienū, si propterea quod nullum ex elements quatuor, solum syncrētismq; in corpore cernitur, velut quis insinuat, ea omnia simul in eo reperiunt. Nam cur vis tu in animantium corporibus reperire terram (exempli gratia) impermissum & puram, quum ne in vniuerso quidem erukemodi à te offendi queat? Quamcumq; enim particulam eius accipias, ea statim erit alicuius caloris humorisq; & ætæ substantiæ participes: cum tamen ea terra, quam opinamur esse elementum, sit & maximè densa, grauiusq; ac præterea frigida & sicca. Quod si tu in mundo mihi ostendens lapidem, terreum sanè corpus: ego tibi aliquid illi simile in animantium corporibus, osesum nempe, cartilaginis, pilorum, testardumq; genus ostendam. Ne igitur amplius impermissum quicquam exquiras in animalium corporibus, quandoquidem nec in ipso orbe id reperies, adulierno carens. Sed quotiescunq; aliquam videntem particulam frigidam, siccamq; & densam, ea sans sit, ad reuocandam tibi in memoriam terram. Satis etiam sit humidum aliquid conspexisse, rardumq; & fluens, ad concipiendam mentem aquam. Calor quoq; animantis, ignis tibi repræsentet memoriam: necnon natura spiritus, citra quem animal consistere nequaquam potest, ætæ in primis, ac mox ignis, nbi memoniam refinet. Nec vero insinuat poteris, vniuersos fructus ex terra gigni & ex aqua, cum inde suum habere ortum videantur. Quod autem ætæ ignisq; per tota simul temperaturorū etiam participes sint, lunc planè licet cognoscere, quod si aqua maceraueris teeram, nihil præter lutum efficies: fructus autē lutum non sunt. Si igitur fructus omnes ex elements vniuersitatis suam ducunt originem, nō est quod de ipsis animalibus dubites, cum nimirum & ab illis alantur. Audenter itaq; profitemur, quod est, terram, aquam, ætrem & ignem, prima esse, cōmuniatq; & simplicissima rerum omnium elementa, & primordia: ex quibus vtique tum

stirpes, tum animantia omnia gignuntur, aluntur, atq; augmentum suscipiunt. In ipsi enim solis summæ qualitates reperies, absque ulla misitura aut temperie. In igne nempe, summam caliditatem & siccitatem. In terra, summam frigiditatem & siccitatem. In reliquis, reliquas qualitates, prout sui cuiusq; natura postulat. Affirmare autem esse aliquod elementū summè humidum, simulq; arbutari illud esse quippiam ab aqua diuersum, extremæ cuiusdam ineptia est. Porro quod summus calor igne simplicior sit, quodq; illo accedente ad materiam, ignis gignatur, pro confesso ab omnibus habetur philosophis: qui quidem in vniuersum fatentur, materiam quamdam prorsus qualitarum expertem (quæ omnibus elements subiacet) atq; etiam calorū summum, qui in ea productur, igni existere suæ generationis principium. Quin etiam materiam ipsam esse ab omni penitus autem id esse, quod in illa tum gignatur, tum pereat. At elementum eod à principio differt, quod minimè sit necesse principia in eodem esse genere, cum iis quorum sunt principia: elementa vero, ad idem semper genus pertineant. Simplex namq; qualitas composita, & simplex corpus, corporis compositi elementum existit. Cum igitur calidum, frigidum, humidum atq; siccum, dicantur tripliciter: nempe vel sicut qualitas, vel sicut impermixtum corpus, vel sicut illud quod mixtum est: nec ipsa deinde qualitas esse elementū videatur, nec etiam mixtum, temperandūque corpus: reliquum est, vt elementum id esse corpus dicamus, quod est omnium temperamenti atq; mixturæ expert, necnō qualitaribus simplex. Quare ad ipsum ignē, ætrem, aquam & terram, tandem ac necessariō devenimus: in quibus primis summus esse calor, summum frigus, summus humor, & summa siccitas. Quibus etiam elements vniuersalibus, vel syncrētis, perspicere vtitur: quemadmodum aqua quotidie, cum bibimus, aut lanamur: et ætrem, qui nos vndiq; ambiat, dum illum inspirando attrahimus. Igne etiam, dum frigemus, vt caleamus vnumur. Animantia præterea quæ vel arena, vel terra, vel lapidibus, vel etiam luto, osibusue vescuntur, terram manifestè introducunt in corpus. Quare nō video equidem, cur dicant nonnulli, nec ignem, nec ætrem, nec aquam, nec terram, vel detrahi ex corpore nostro, vel illi etiam apponi: ac prouide ea minimè nostri corporis elementa existere. Quod si qui ob id non putent vllum nos corpori elementum offerre, quod nemo eatenus calsat, donec vratur: vel bibat, quoad disrumpatur: nō intelligunt, si vel vnum elementū omnino intereat, statim etiam intetur animal. Intertib autem frigidum elementum, si comburatur: calidum, si nimis refrigeretur: humidum, si areseat impenitens: siccum deniq; si plus quàm par sit, humectetur. Vnde aliter se habet res, quàm illi sentiunt. Semper enim aut eximior elementū aliquod, aut apponitur corporis diuē moderate fieri debet ab iis, qui seruare incolume animal ipsum conantur. Si quidem immoderate elementorū vsus, ad interitū ducit. Ergo cum nulla qualitas reperiri seorsum à sub-

*Elementis solis summæ qualitates inesse.*

*Aquæ esse summè humidam.*

*Calorū summū accedente ad materiam, ex igne gigni.*

*Materiam diuē naturā, vncōr republiq; Qualitatem gigni in materia perrigē. Elementū et principia q; distincta.*

*Calidum, frigidum, humidum et siccum tripliciter dici.*

*Elementū quod est corpus dicatur.*

*Elementis vniuersalibus nos vtique perspicere.*

*Animal interitū, si vel vnum ex elementis intereat.*

*Elementum semper aut eximior, aut apponitur corpori vniuersum moderate fieri debet ab iis, qui seruare incolume animal ipsum conantur.*

*Materiam primam vocant quatuor elementū subiectam esse.*

*Elementum primum nullius repperiri posse. Terra elementorum cuiusmodi esse debeat.*

*Elementorum singula esse quid simile in animantium corporibus.*

*Fructus vniuersos ex terra gigni et ex aqua.*

*Elementa prima esse terram, aquam, ætrem et ignem.*

Qualitas nulla  
esse ab ipse sub  
stantia potest.

à substantiis queat, cognitur eas vñ cum sub  
stantiis assumere, atque ita corporibus, quæ illis  
egent, offerre. Quæ si illas summas exposcant,  
ipsam elementum admodum vñ ignem in  
quam, aut aquam, aut terram, aut ætherem. Vbi ve  
rò mediocri opus est qualitate, misce ex elemen  
tis medicamento, atque interdum nutrimento uti  
mur. Negi sane vñ quam cœ medicina elementum  
ex viū est, nisi dum corpus humanum qualita  
re indiget. Quod autē Hippocrates nonne qua  
litate, corpus summa præditum qualitate spe  
perum intelligat, ex dictione illius licet nobis  
colligere. Si quidem vbi ait, cum interit homo,  
necesse est vñ quumque ad propriam natu  
ram reverti, sic uti ad siccum, humidum ad hu  
midum, calidum ad calidum, frigidum denique  
ad frigidum: non solas profecto qualitates, sic  
cum, humidum, calidum, & frigidum vocat, sed  
substantias illas, in quibus qualitates expe  
runtur. Ipse enim sunt, quæ animalia vñ fun  
cto abeunt, quæque elementis vñ ueritatē mis  
centur. Qualitates autem dixerimus animante  
mortuo interire: ad propriam verò eas naturam  
reverti, non item. Quare nō est quod quispiam  
amplius persuadere conetur, illum ex qualitatibus,  
quæ ne seorsum quidem à corporibus con  
sistere possunt, animalia gigni arbitrarī: sed ex  
corporibus, quibus summe illæ qualitates in  
sunt. Ea quippe sunt cōmunia elementa omniū.  
Quæ verò calidum, frigidum, humidum, atque  
siccum, ob aliquam excellentiam horum, dicitur,  
propria sunt vñ cuius. Homo igitur constat  
ex simplicissimis sensibilibusque elementis, quæ  
similaria vocantur. Ipsa autem ex quatuor hu  
moribus. Qui rursus ab esculentis & potulentis  
suum ducunt originem. At hæc, ex ære, igni, a  
qua, & terra gignuntur. Quæ sanē ex nullo am  
plius corpore constituta sunt, sed ex materia &  
qualitatibus tantum: quas ipsorum esse princi  
pia concedimus; elementa autem nequaquam:  
tamēti elementa, ab ipse qualitatibus habeant,  
quod elementa sint. Si quidem si summus calor  
materiam accedat, iam id totum elementum ignis  
evadet: similiterque de ceteris qualitatibus tri  
bus, dicendum. Ex nulla autem qualitate alia,  
præterquam ex his quatuor, iudicatur esse ele  
mentum. At verò de propriis animalis elemen  
tis, hoc est, de ipse humoribus, in sequenti com  
mentario tractandum est. Ex eis enim partes si  
milares gignuntur. His rursus simul cōiunctis  
bus, primum id, ac simplicissimum instrumen  
tum absolutum, quod vñus functionis grana à  
natura productum est. Mox autem, quum hæc  
item vñā componantur, aliud maius instrumen  
tum perficitur: ac deī, vñ uerū integritas cor  
poris. Ergo, vt totum repetamus disputationē,  
si nos dolemus, neque specie vñā erit, nec im  
pauibus nostra substantia. Atqui dolemus, nō igitur  
erit ipse vñā, neque impauibus. Rursus, si pa  
tiatur, oportet vt caliditas, vel frigida, vel hu  
meditas, vel siccitas patiatur: quum nulla alia  
qualitate possit quæ proxima vñ, alterari to  
ta per tota. Quocirca manifestum est, calidita  
tem ipsam, frigiditatem, humiditatem & siccita  
tem, substantiam cuiusque rei constituere. Quo pa

cto autem vñ quæ miscentur, tota per tota mis  
centur, solis ne qualitatibus (vt Aristoteles sen  
sit) aut potius ipse enam substantias in sese pen  
etra nōbus mutab, non est opus medicum explo  
rasset. Hoc tamen dixisse impræsentiarum sit  
factis, quod si vinum (exempli gratia) aquæ misce  
tur, particule vñque horum infinguntur in  
mutuam: inter se mutuo agunt, atque pa  
riuntur: & sic facilius sibi invicem qualitates cō  
municant, quod in minutura redacta, distitit  
commota, & cōmista fuerint. Tempore nanque  
est opus, vt eorum quæ cōmiscentur niuud, par  
ticule inter se invicem exacte agant, exacteque  
etiam pariantur, ac ita totum id vñum & sibi vñ  
dique & penitus simile evadat.

## GALENI PERGAMENTI de elementis lib. II.

Igitur vt calidum, frigidum, humidum atque  
siccum, omnium rerum communia sunt ele  
menta: sic nimirum sanguis, pituita, ac bilis  
tum æra, tum flava, omnium animalium sangui  
ne prædiorum propria elementa existunt. Cæ  
terum hominum proprii sunt similes particu  
le: quamvis & hæc nonnullis sanguine prædiorum  
etiam communes adsint, vt boui, canī, & e  
que: non tamē vñque adeo humanis similes. At  
verò quod omnes sanguineorū animalium par  
tes, ex materno gignantur sanguine, satis omni  
bus constat: qui cum sit non modò purior, sed  
vñque etiam bilis princeps, demonstratum  
est, quæ ratione adductus Hippocrates, ipse  
quatuor humorum materiam esse generando ho  
mini tradidit. Caro porro & nervus particule si  
milares existit. Cum autem caro sanguinea sit,  
præterea mollis & calida: at nervus exanguis,  
durus & frigidus: similiterque alie particule a  
liis differentiis fortiantur: rationi consentaneū  
videtur, ipsam sagacem naturam, quæ tempore  
ex sanguine menstruo efformabat scitum, quod  
crassius in eo erat, ad solidiora: quod tenuius,  
ad molliora: sic vt quod calidius: quod calidiora:  
& quod frigidius, ad frigidiora corpora consti  
tuenda, attraxisset. Subsequenti autē tempore v  
namque ex concretis particulis, suis habuisse  
alimentum incrementumque, ex propria & peculia  
ri materia. Nam quemadmodum in lacte reper  
tur & serum, & quædam casei substantia: si in  
sanguine reperire licet quendam tenuem liquo  
rem sero lactis persimilem, nec non veluti limū  
quendam, ac præterea ipsas fibras, quibus à san  
guine exemptis, vt nō amplius ipse sanguis con  
crescet, sic enī colore variabitur. Vnde sanguis  
minimè simplex erit. Alio qui in omnibus quum  
animalibus, tum hominibus esset perpetuo si  
milis. Contrariū autem licet experientia cognos  
cere, cum ex varietate colorum, tum vel maxi  
mè ex iis quæ vacuantur ope medicamentorum  
purgantium. Quæ quidem si propinquant, vt de  
cet, pro differentiis morborum, differentes ac pe  
culiares sibi succos elicient: contra quā Acle  
piades persuadere conatur, nempe medicamen  
ta ipsa hæc quidem familiares sibi succos attra  
here, sed transmutare illos corruptumque, ac in sui  
naturam, qualescunque fuerint illi, convertere,

Multum ex  
ram excellen  
tiæ, plurimum  
tendentes com  
missionem, cō  
in ipse com  
posita moram.

Elementa com  
munia.

Elementa prop  
ria. Similes par  
ticule homini  
bus propria.

Menstruo ex  
sanguine gigni  
tur omni sangui  
neorum partes.

Humori qua  
tus, sunt mate  
ria humana ge  
neratione.

Solidiori par  
tes ex solidiori  
menstruo por  
tionem constitu  
tū esse.

Alimentum, iace  
mentum, ratio.

Sanguinem par  
tes diversas.

Sanguinem ab  
co coactum, ut  
non sibi data  
vacant.

Sanguis non est  
simplex.

Athletici opo  
no resistunt  
ora medica  
menta purgan  
tia.

*Purgantia medicamenta hu-  
mori propriis  
trahunt, et quo-  
dam ardent.*

Quæ sanè, ut sunt absurdissima, sic ea quæ per immodicas purgationes indies fieri videmus, ostendunt evidentissime, quemadmodum proprium humorem quodlibet pharmacum attrahat. Siquidem quæviscumque aliquis medicamentum hauriat, quod vim habet bilem supra modum vacuâ, primo quidem, vomitu ralem humorem eiciet, mox postmodum, postmodum bilem atram, postremo sanguinem purum, quo evacuato agunt animum. Quod si medicamentum pituitam solvens propines, illa in primis vacuabitur: dein flava bilis, quod educit sit facilis: postquam atra, ad motum rebellis & contraxit. Vltimo autem omnium semper educitur sanguis, quod nature est admodum affinis exultat. Vbi igitur primus ille humor profusus vacuatus est, non potest iam esse incolume animal, cum vniui ex suis elementis amiserit: sed dissoluitur profusus, & perit. Mox autem ex reliquis profusit humoris, qui aptior est vt vacuetur. Quippe naturalis quedam vis rei vnicuique inest, ea quæ conveniunt sibi, trahendi. Sic ut in magnere vis est attrahendi ferrum. Atque per hoc facultatem tum nutritionis, tum vacuatio nes huius ipsa quidem semper id quod expiendens est, attrahente, nonnunquam tamen cum hoc, aliquid eius quod non est congruum: vt in purgantibus medicinis vti aliquando venit. Quæ quidem, ubi vniuersum id bilis, aut pituitæ, quod in corpore fluitat, attraxerint, peculiarem solidarum partium humorem, vt & labore arripiunt, eas quas dissoluentes & colligantes, deducuntque ad elementa, atque animal ipsum interfectioni tradentes. Violentia verò illius attractionis, alius quæpiam humor consequitur illi affinis, qui primus vt attrahebatur.

*Sanguinem vlti-  
mo omnia va-  
cuat, quod sit  
affinis nature.*

*Attrahitque fa-  
miliam suam  
in se ipsam.  
Magnus trahit  
firmus.*

*Purgantia  
immodice.*

*Constitutio ani-  
malis ex di-  
part elementa-  
rum miscella.*



Onitare animalium corpora ex calidi, frigidi, sicci, humidique mixtura, neque esse horum omnium parem in temperata portione, demonstratum antiquis ab vnde est, tum philo-  
sophorum, tum medicorum præcipuis. Cum autem ex calidi, frigidi, humidi & sicci temperie constari corpora dicunt, de his quæ summo gradu sic se habent, ipsi scilicet elementis, intelligendum auunt. Cum verò animal, sit præterea, calidum, frigidum, humidum, aut siccum esse, non item. Neque enim vllum animal aut calidum in summo esse posse, vt est ignis, aut in summo humidum, vt est aqua. Pari modo nec frigidum, siccumve in summo: sed ab eo quod in mixtura pollet, appellationem fortiri. Non posse autem differre temperamentorum esse plures quam quatuor, hinc docere conantur, quod duntaxat quatuor sint qualitates, quæ in se agere potest: nempe calor, frigus, siccitas & humiditas: ex quibus quatuor tantum (iudicio suo) oriuntur temperamentorum coniugationes, quæ consistere possunt: nempe calidum & humidum, calidum & siccum, frigidum & humidum, frigidum & siccum. Siquidem coniugata alia duo, quæ contrariis qualitatibus constant, calidum nem-

*Animalia non  
dici calida in  
summo, sed per  
excessum.*

pe & frigidum, necnon siccum & humidum, minime consistere posse. Quæ verò illi mihi prætermisisse videntur, nunc ad dicenda reor. Vni igitur & primum id est, quod temperatam naturam, quæ & virtute & vitiis, reliquis præstat, sine qua de illis ne loqui quidem poterunt, omnino ac si nulla sit, omittunt. Quippe quod vel in calida temperie calidum prævaleat frigidum, vel in frigida temperie frigidum prævaleat calido, id ne intellexisse quidem est, nisi prius ponantur eucratos, siue temperata: ad quæ sunt intenti, cum videtur sanitatis tue eundem investigat, efficeret temperatam quandam statum consistit. Ergo quem assidue sectantur, & quod semper respiciunt, im-  
temperatos statum corrigunt, hunc quoque idem primum omnium statum censuerim. Ha autem tantum abest vt eius meminerint, vt etiam totum præterant. At non prætermisunt, inquirunt ex his aliqui: in calido namque & humido comprehenditur. Quam sententiam Aristoteles sectatores sequentes, ipsi quatuor temperaturas, quatuor anni temporibus comparant. Hyemem itaque frigidam & humidam dicunt. Aestatem autem, calidam simul & siccam. Autumnum, frigidum atque siccum. Ver denique, tum temperatam, tum calidam & humidam vocat. Ad eundem modum & ex ætatis, puerilem quidem tum temperatam esse, tum verò calidam humidamque. Sed & mortui autem animalium corpora ad frigidum & siccum perducunt. Vnde colligunt, vitam, cum illi cõtraria sit, calidam & humidam esse: ac proinde calidam & humidum temperamentum, optimum & temperatissimum esse. Bessiam autem hallucinantur. Primum quidem, quod in quatuor anni temporibus, quartam temperamentorum coniugationem iuvenum contendunt: id quod non videtur necesse. Dein, quod ex ratione concludunt, ver calidum & humidum esse, quod si hyeme quidem calidius, sitat autem humidius. Si quidem eodem nomine dicitur frigidum simul & siccum, propterea quod æstate frigidius est, sic-  
vni & siccus hyeme. Quare nec ætati, nec hyemi ver compare est æquum, sed potius ipsum per se testimare: cum quodlibet anni temporis, non ex alterius comparatione, sed suapte testimatum natura, iudicari debeat tale, vel tale. Ad quam formam si expendas ver, videbitur tibi planè in omni excessus medio consistens. Proinde rectè ab Hippocrate est dictum, vel saluberrimū esse, minimèque morbis perniciosus obnoxium. Est & autumnus, vt quæ ætatis minus calidus, sic vni quæ hyemem minus frigidus. Quare ratione hæc nec calidus absolutio sermone est, nec frigidus: quippe cum ambo sit, ac neutrum ad summum. Extremum alterum in eo est incommodum, nempe inæqualis ipsa temperies, quæ autumnū maximè morbosum facit. Quod Hippocrates enā significauit, dicens: Cum eodem die modò calor, modò frigus nos afficit, expectandos esse autumnales morbos. Itaque non rectè frigidus, siccusque dicitur. Nec tamen æqualiter est repperatus, vt ver: quin potius hoc maximè ab illo tempore disider, quod mediam temperiem & æqualitatem perpetuo parem nõ seruet. Quippe mentis multo est calidior quæ manet, aut vesper:

*Temperatam naturam esse à veterem prætermisam.*

*Temperatam naturam esse regulam constituendam rationem.*

*Veterum duplex lapsus: et ad significationem temperamentorum.*

*Ver esse per se asserendum.*

*Ver in medio omni excessus consistit. Ver saluberrimum esse.*

*Autumnus inæquali temperie, alius morbosum causat.*

*Autumnus ad  
sicum decli-  
nat.*

*Ver non esse de  
conlem calidū  
& humidum.*

*Temperem ac-  
ru calidū atq;  
humidum, esse  
omnium alia-  
rum pferam,  
nec reperiri pos-  
se in quatuor  
annis temperi-  
bus.*

*Incorrupta for-  
mari a frigido  
offusa omnia,  
putrefieri a ca-  
lido et humida.  
Boream formae  
re impuriora v-  
nuerit.*

*Austrinum fla-  
rum putrefac-  
re singula.  
Ver tempera-  
tum, et saluber-  
rimum.*

*Animantia de  
lia esse calida  
et humida, nō  
abfoluti, fed col-  
lata ad ftirpes.*

*Canis fieret  
humidus.*

*Canis humi-  
dus formici et  
apium.*

*Temperantius  
non collatio  
non dicitur.*

*Elementa sola  
dicuntur calida  
et humida, non  
canes, frigida  
aut fici.*

sperti: nec in humido & sicco omnino medium  
statum obñnet, quemadmodum ver, sed ad sic-  
cus declinat. Idcirco patere arbitror, nec autum-  
nū abfoluto frigore, & citra exceptionem, fri-  
gidum & siccum dici: dum effe fieri neque ver  
calidum atq; humidum. Ego siquidem, tantum  
abest vt ver, aut si quid aliud est temperatum, ca-  
lidum & humidum esse credam, vt quod planē  
contrarium est, id affirmem, omnium scilicet aë-  
ris temperamenrorū id psumum esse, quod lu-  
midum est & calidum. Quod sanē temperamen-  
tum in quatuor anni temporibus invenire non  
possumus, quamvis id in pestilenti aëris constitutio-  
ne inodere aliquando videatur, quemadmodū  
Hippocrates olim congnisse in Cranone memo-  
rat, vbi nimum assidue per ætatem largo imbril-  
pluerat ( quod calidi humidique status est pro-  
prium ) quam intemperiem aëris comitari fuit  
vari & grauisimū aëctus, haud dubiē dixit  
putredinis fofoles. Nam vt a frigido & sicco om-  
nia incorrupta feruistrū, sic a calido & humidum  
facilimē cōputrescant. Boreæ etenim status sic-  
cus & frigidus, omnia q̄ durissimē imputria cō-  
seruat. Austrinus autem flatus, qui calidus & hu-  
midus est, illa subito ad corruptio nem perducit.  
Ver itaq; laudatq; calidum & humidum pro-  
uenciamus, cūm nec tale sit, nec si esset, vtiq; sa-  
lubre esset, aut sumit ac commodum. At quatuor  
qualitatum mitionis equalitas, & medix tem-  
peraturæ eius, & salubritatis est causā. Perperam  
etiam faciunt, dum statum temperamēta, ad  
quatuor anni tempora transferunt, quum non  
idem sit, aut similiter dicatur animalis tēperies  
calida & humida, sicuti aëris temperamētum  
calidum & humidum dicitur. Qui error inde il-  
lus videtur ortus, quod nō memiserint, animan-  
tia verentibus pronūciata fuisse calida & humi-  
da, nō propriè temperaturæ ratione, uec sermo-  
ne abfoluto, sed ad stirpes, & demortua, collata.  
Quippe demortuis & stirpibus, animantia calidi-  
ora humidioraq; sunt. Quinetiam ex animatibus  
ipsis inter le speciatim collatis, canis quidē  
est siccor, homo autem humidior. At si formice,  
vel apī ipsū canem compares, illas sicciores,  
hunc humidiores inuenies. Ita idem ani-  
mans, præt vt homo, siccum: præt vt apicula, hu-  
midum fuerit. Rursus ad hominem collatum, ca-  
lidum: ad leonem, frigidum erit. Calidus etiam  
est canis, vt viuens ( cūm mortuus non amplius  
calidus sit ) non calidus autē, si ad alterum com-  
paretur caueni. Atq; hæc quidem omnia per col-  
lationē inter se dicuntur. Quæ verō in animan-  
tium genere conferuntur, alia ratio: sicuti et-  
iam quæcūq; in aliqua animalium specie. Canis  
namq; ad formicam est humidus: in animan-  
tium genere est siccus. Rursus, ipsorum speciatim  
canum, hic siccus, ille humidus, alius ( vt fas  
est cani ) temperatus exiit. Quod ergo abfolu-  
to sermone, nec ad aliud vllum collatum, vocat  
siccum, id in solis est elementis: similiterq; de  
ceteris qualitatibus est feniendum. Nullum e-  
nim ceterorum corporum, prorsus calidum aut  
frigidum est, sed sola elementa. Quicquid præter  
huc cepit, ex his minis constat. Ac propterea  
per secundam significationem, nō amplius ab-

foluta ratione, vel vt syncerum & a mitione alie-  
num, reliquorū quodvis calidum aut frigidum  
dicitur. Ac duu quidem significata calidi, frigi-  
di, humidi & sicci, hæc sunt: alterū, abfoluto ser-  
mone loquentium, mīstura carens atq; syncerū:  
alterum contrariis quidem mīstis constans, cæ-  
terū ex pollutis in mīstura nomine appella-  
tum. Quo genere sanguis humidus dicitur, sic-  
vus & os siccū. Formica verō sicca est, & vermis  
humidus: scilicet vt sunt animalia. Dicitur pur-  
rō vnumquodq; secundum genus, vel speciem,  
non modo calidum esse, aut frigidum, sed alia  
enam qualirantibus præditum, cūm supra medio-  
cre atq; mediū fuerit. Verbi grata, animal dicitur  
calidum, cūm supra mediū temperie sit animal.  
Equis calidus, cūm supra medium temperie  
equis fuerit. At verū in quoque genere spe-  
cieve sunt media, quæ a summis in eo genere, spe-  
cieve, finibus equaliter distant. Ac genus quidē  
est animal, species equus & canis. Medium  
temperie in toto animalium genere, est humo-  
Medium verō vt in hominum specie, quem Gre-  
ci eufaron, hoc est, quæ dratum appellant, ab om-  
ni excessu, defectuve remittit. Quisq; igitur  
supra hunc fuerit, is aut prorsus calidior, aut  
frigidior, aut humidior, aut siccor erit: idque  
partim abfoluto sermone, quia minime vni ali-  
cui priuam collatus dicitur talis: partim non  
abfoluto, quod symmetri & medio totius spe-  
ciæ comparatur. Ergo vnumquodq; horū quæ  
ralia sunt, aut calidum, aut frigidum, aut humi-  
dum, aut siccum tripliciter dicimus. Nempe aut  
comparantes id culibet particulari indiuiduo:  
aut cum vniuersūq; tum generis, tum speciei  
medio id conferentes: vel deniq; summū atq; im-  
permittum ipsum esse æstimates, id quod sanē  
ad sola pertinet elementa. Quare ad tractationē  
de temperamētis illi duo primi modi nobis tan-  
tū sunt necessarij. Quoniam autem multa gene-  
ra sunt, quemadmodū & indiuidua, ad quæ cō-  
parare possumus, patet idem corpus multis  
modis, calidum, frigidum, humidū, atq; siccum  
existere, simulq; suscipere varias appellationes.  
Verū vbi stirpem animantisve vllum, eucatō, si-  
ue optimē temperatū dicimus, nequaquā in ea di-  
ctione, simpliciter cōtraria inter se cōparamus:  
sed ad naturam vel animalis, vel stirpis referi-  
mus, cūm eorum quodq; pro sua natura optimē  
sele labrat, optimēq; suas obeat functiones. Sic  
enim dicimus animalia ipsa & stirpes optimā  
& mediam habere suo in genere temperaturā, non  
vtiq; abfoluto sermone, ac si paritas exquisita cō-  
trario in us repeririatur, sed quod ēa medio-  
cris, quæ ad potestātē refertur, eis addit. Ac tale  
quid etiam dicimus esse & iustitiam, nō quæ men-  
sura & pondere, sed quæ eo quod pro dignitate  
conuenit, equalitatem explorat. Est ergo tempe-  
ratura equalitas, in omnibus animalibus tem-  
peratus, stirpibusq; non ea quæ ex pari elemento-  
rum commissorum mule spectatur, sed quæ tum  
animalis, tum stirpis nature conuenit. Conue-  
nit autem alia, vt humidum sicco, & frigidum  
calido præponderet. Itaq; ad interrogantem, cu-  
ius temperamenti sit homo: si quidē vt in anima-  
libus interrogatio fiat, ad id qd medio est inter

*Media in quo-  
que genere, vel  
specie, quæ di-  
stant,  
tamen est me-  
diū in toto aut  
mālo genere.*

*Temperatura  
corporum quo-  
tripliciter asse-  
rmatur.*

*Temperatura  
ad iustitiam  
iustitia quid.*

animalia omnia temperamento respicientes, respondere oportet. Si verò facta collatione cum indiuiduo aliquo, vniq; ad illud solum conferendo, tunc respondendum est. Si ab solutè, atque vt ad omnem substantiam, sicut contraria quæ sunt in eo comparare oportet, atque æstimare, haudquã ad actionem referentes temperem, sed potius ad elementorum portiones, hoc est, ad substantiam quandam, quæ panter ab extremis distet, quæ prima omnium sunt elementa. Si quidem quæ supra citauimus hanc substantiam temperies fuerit, eam simpliciter calidam, frigidam, humidam, siccamve asseremus. Vbi verò cum medio temperamento conferimus, nõ simpliciter, sed quod ad mediocre eiusdem generis sic se habet. Porro generum omnium supremum substantia est, sub qua quidem tam animata, quàm inanimata continentur. Vniua autem genera, superne distinctibus nobis, sunt, homo, cornus & ficus, eorû species dicuntur. Inferne verò ascendentes, scilicet ab in diuisis substantiis, eadem sunt prima genera: indicanturq; alio opere est, merito omnia quæ media sunt, inter indiuidua & genera prima, tum genera, tum species à veteribus nominari. Iam verò, quemadmodum nomen albi, tum de colore albo, tum de corpore, quod ipsum colorem suscipit, enunciat: sic etiam calidi nomen, non solum de substantia calore prædita, sed de ipsa etiam caliditate dicitur. Dicitur itaq; ipsa caliditas calidum: sicut & corpus ipsum, quod tamen nunquam caliditas appellabitur: in exteriori similiter qualitas eadem ratio est habenda. Quæ corpora igitur has qualitates quatuor, caliditatem inquam, frigiditatem, humiditatem & siccitatem, puras & impermixtas forisunt, ab solutè dicuntur talia, elementarig; genitorum & pereuntium existunt. Reliqua verò vniuersa corpora, in illorum medio sunt colloca, cum non sint summis qualitatibus prædita, sed prorsus aut in medio contrarium consistant, aut ad alterum extremum sint procliuia & propensa. Idcirco nomen in vniuersum temperamentorum differetia exoritur. Quarum vna quidè temperata est & media, octo verò nõ temperate. Harum rursus, quatuor simplices sunt, calida, frigida, humida & siccæ: quatuor verò composite, calida & humida, calida & siccæ, frigida & humida, frigida & siccæ. Temperatæ enim decimas esse, in qua ille quatuor qualitates ad æquilibrium miscetur. Non temperatam autem, in qua vna aut duæ qualitates prepollent. At calidam temperaturam pronuncio, in qua calor vincit ipsam frigiditatem alterius oppositionis, quæ in humido & siccæ est, interim paritate seruata. Similiterq; in frigida, humida, & siccæ temperie simplici iudicandum. Ceterum calidam & humidam eam temperaturam censemus, in qua frigiditatem caliditas, siccitatem humiditas superat. Nec fuscæ calida & siccæ, frigida & humida, frigida & siccæ temperies sunt æstimandæ. In qualibet autem distictam temperaturam permagnus est excessus, defectusq; modus. Idcirco, si cui agnoscendari illarum est cura, incipiat exercitacionem ab his habere in quolibet genere oportet, quæ temperate mediocriter

sunt: quandoquidem si cum his alias comparet, facile quod in quavis superet, deficere, inueniet. Cum igitur temperies calida, alia quidem actû, alia potestate dicatur, quod videlicet nondum sit, sed possit esse quod dicitur: differamus primum de us, quæ calida, frigida, humida, aut siccæ esse actû dicuntur, idq; auspiciat ab vniuersa substantia, mox descendam ad animalia & sterpes. Cum autem quod in omni genere, maximeq; in vniuersa substantia est mediû, id ex mitione extremorum consideretur, certe si à calidissimo igni, aut a aqua feruente, ad frigidissimam glaciem transeamus, in ipso exquisitissimo medio, id quod symmetron est, intellectû deprehendemus. Quin etiam id nobis preparare licebit, miscendum aquæ feruenti parum modum glaciæ. Quod enim ex ambobus est mistum, pari intervallo ab vtriusq; extremorum aberit. Quare non erit difficile, ei qui tale mustum tegerit, habere medium vniuersæ substantiæ, in calidi & frigida oppositione: atque alia omnia, illi veluti forme adaptata, discernere. Quod si terram etiam pari atq; modo imbuens, medium in siccæ humidig; oppositione faceret. Quamquam hæc non minus verè, sed tantum particularum appositiones sunt. Siquidè miscere corpora tota per tota, non hominis, sed Dei & nature est opus. Iam verò corpus de quo iudicandum est, medio criter calens esto: nam interdum nimio calore liquatur adeo, vt humoris saldam in agnem præ se ferat. Sicut interdum etiam adeo cognit frigore, vt siccetur quim sit mediocre, nobis esse videtur. Porro ipsa hominis temperatissimi cutis, ac præcipue quæ in manu est, omnium extremorum est media: cuiusq; temperata à natura, quod sensibile omnium esset veluti norma quædam, talisq; instrumenti futura. Ex dictis igitur constat, inter omnia quidem corpora, hominè esse temperatissimum: inter omnes autem humanas particulas, cutem cam, quæ intra manû habetur, si modò nullû callum cõtraxerit. Quæ quidè quæ sunt duores particule, in his omnibus siccum prævalet: quæ cunq; verò molliores, in us humidus plus est quim siccus. Ceterû homo temperatissimus, qui tum hominû, tum reliquorû animalium futurus est regula, cum vniuersa substantia collatis, medius apparere in ea debet: magisq; cum hominibus atque bestiis. Dein verò sapientissimus sit oportet, habetiq; actiones corporeas consentientes animi moribus: ac non solum mediâ temperatû, sed optimam etiam formam nonem sortiatur. Quod verò ad natus pertinet, quum ex gemini vius grata sint facite, nempe tangendi atque comprehendendi: vniq; illarum quæ molles sunt, ad exquisitum tangendum, vt duræ ad aliquid vi maiori capiendum, magis idoneæ existunt. Quin etiam cutis, quæ vniuersæ, quæ generationis corruptionig; subiicitur, substantiæ est media, nec dura lapideus est, sed ab omni exuberantia remota, atque omnino secundum naturam se habet. Quo scilicet tuis genere maximè perfectum esse tractum censemus. Etenim nervus omnis est exanguis & frigidus. Caro multum sanguinis, atq; calida. Media inter vtrunque est cutis: nec planè exanguis

Temperem calidam dico vel actû, vel potestatem.

Medium in vniuersa substantia.

Miscetur exposita, solum Dei, atq; nature est opus.

Cutem vole meum in homine temperatam esse extremorum median.

Hominem esse omnium corporum temperatissimum.

Hominem qui futurus sit animalium omnium regula, qualem non esse oportet.

Manu tangendo atque apprehendendo gratia esse facias. Manus molles. Manus dura. Cutis media qualem non esse debet.

Nervus omnium esse exanguis, & frigidus. Caro esse multum sanguinis, calidamq;.

Substantia est generis omnium supremum. Genera vniuersa duo species.

Elementa quæ sunt.

Temperamentorum differetia notum.

Temperata temperata.

Temperies non temperata quæ.

Atq; ad vniuersum.



exanguis vt nervus, nec sanguine vndans vt caro, sed veluti nervus sanguine præditus. Si igitur hanc omnium animalium partem, veluti normam iudicemus proponens, reliqua illi cõferas, octo in vniuersum diuersas intemperies reperies: de quibus membratim differam. Humidissimum frigidissimumque in corpore pituita est. Calidissimus sanguis: non tamen perinde is humidus est vt pituita. Frigidissimum est ac siccissimum, pilus. Minus eo & frigidum & siccum, os. Hoc verò minus siccum est carnago. Proximè hanc sequitur claudiosyndeimos. Post hunc tendo. Deinceps membrana, & arteria, & vena. Succedunt dein nervi duri: molles quippe in humiditate & siccitate mediam naturam, licet vtiq; obtinent. Nam in altera oppositione tantum caloris desiderant, quantum sanguinis. Ita verò & reliqua prius dicta, etiam sunt frigidiora cute, quò minus habent sanguinis. Enam vasorum tunica non solum exangues sunt, sed etiam nature frigide: contactu tamen sanguinis calfiunt, atque ad mediũ temperamentũ itatum deveniunt. Sanguis verò ipse à corde suum calorem accipit. Id viscus liquidus tum omnium animalis particularum maximè sanguinem, tum verò calidissimum est. Proximũ illi est iecur. Verum cor, paulò minus quàm cutis est durum: iecur multo. At caro humidior cute est: eadem tamen calidior. Spinalis autè medulla cute est humidior, atq; frigidior: sicvñ hac rursus humidius est cerebrum. Cerebro autè ipso adeps: cui concreno cõtingit, propterea quod oleo cum sit, membranis frigidis adiacet, ob quã viciniam cogitur. At nec circa iecur coire adeps potest, nec circa arterias, vnas, aut cor. sicvñ nec circa villam præca lidam partem. Quoniam autè cogitur ab eo quod valde est frigidum, idcirco calfacta liquatur, ceterorũ coagulatorũ more. At cerebrum calfactũ liquatur minime: eoq; adipe minus est humidũ. Minus humida quàm adeps est ipsa etiam pulmonum caro, quæ nec calfacta liquatur. Iam longè etiam quàm hac adipe minus humidam est tum lenis, tum renum caro. Omnia tamè hæc cute sunt humidiora. Quarum rerũ demonstrationes proximo commentario trademus.

## GALENI PERGAMENI

de temperamentis lib. II.

**E**Rgo quorũ sint in vniuersum temperamenta, quorũq; modis vnumquodq; illorũ dictatur, in proximo definitũ est libro. Vbi à vobis etiam est traditũ, animal ipsum maximè quidem absoluto sermone calidum & humidũ dici, quod in eo solent humiditas aut calor experet (sic enim liceret inveire animalia sicca, frigidãq; cõplura, veluti culices, muscas, apes, formicãq; sed ranti ad demortua collatum. Monstrumq; similiter est, cutem volæ manus, in homine qui optima temperatura sit præditus, esse temperatissimam, tonusq; mediũ substantiæ. Et autem plurima in hominibus differat. Verum maximè temperatus is est, qui corporis habitum mediũ horum extremorũ videtur, gracilitas nōpe, crassitudinis, mollitiæ, durtitiæ, itemq; caloris & frigoris (nam interdũ in animalis sangui-

ne prædicto & humido, frigiditatẽ quandam pol lentem reperias) quiquẽ etiam liber cum sit ab immodicis animi affectibus, omnes tam naturales quàm animales actiones & facultates habet inculpantissimas. Idem medius oportet sit inter frigidum & calidum, inter humidum & siccum: pilosq; habeat cum puer est, magis rufos, quàm nigros: cum in flore consistit, contrari. Cæterũ quandoquidem se nobis occasio iam obtrahit, de ætatebus nonni hil dicendum est. Prima constitutio animalis recena formatur in vtero, ex semine & sanguine est: qui humores calidi sunt & humidus. His autè magis semper siccificandus, primũ quidem formatur membrana, tunica, nervi, visceraq; & sanguinis vasa, nempe illorum substantia testis. Vinmò verò perficiuntur ossa, vngues, & carnagines, scilicet substantia ipsorum cõcreta. Quibus perfectus in vtero, ita deinde paritur infans, adeo tamen mollis & humidus omnibus partibus suis, vt omnia ipsius membra nutrites, perinde ac si cerea sint, pro arbitrio formetur & hiant. Idcirco nuper nati animalis corpus maximè si suillum, ovellũve id sit, propter redvndantem in eo humorem, libens non comedas. Nam capillum, quod siccus sit, & melius eius est, & iucundus. Contra verò quàm in novellis porcellis, quæcunq; iam consenuerunt, hæc omnes partes præficus rigidatq; & sine succo possident. Quæ medio itatu horum, ac nuper natorũ sunt, ea quantum à senio absunt, tantũ & ab extrema sunt siccitate remota. Quæ minora sunt, atq; ad huc augeant, tantũ ea quoq; absunt ab humore fortis delectescens vtero, quantũ processerit ætate. Florescens vero ætas omnium animalium, maximè in medio extremorũ est. Porro senes naturalis particularũ temperamento sunt sicci, licet copia excrementorũ humidũ esse dicantur. Siquidem cum particula senilium corporũ per caloris imbecillitatem similiter nutriti non possint (qua ratione dicuntur sicce) fors illis copia humidũ excrementi redvndat, & superfluit. His itaque sicci est senex, quibus solicer puer est humidus: ipsi namq; soli corporis partibus. Quid igitur siccissima ætate senilis sit, ex iam dictis constat. Quod autem & frigidissima, ex tactu ipso, ex calore qui videtur in sensibus, ex frigidis morbis, quibus facile corripuntur, ac deniq; ex imbecillitate naturalium functionũ, faciliẽ etiam quis iudicaverit. Et quid quæro aliud est senium, quàm via ad interitum? Si enim mors, naturalis caloris extinctio est, vti quæ senium veluti tabes quedam eius fuerit. At verò de puerorũ & florentium ætate, vera nam sit calidior, maxima inter medicos digladiatio est. Quĩ quidem omnes perperam mihi videtur facere, dum sensibilibus rerum cognitionem, laborioso cõsequi rationismo volunt. Nam cum eorũ quæ actũ calida sunt, alius esse iudex quàm tactus nullus possit, sanè si multos viros, tum senes, tum adolescentes, tum pueros, tum infantes tetigerint, invenient facili, qui magis, minũve calidi sint. Ego siquidem, quod actũ calidum est, tactu iudico: sicvñ & quod potestate calidum iudicatur, id ratione conor investigare,

Intemperies col  
leta ad omni  
oña.

Pituita.

Sanguis.

Pilus.

Os.

Carnago.

Claudiosyndeimos.

Tendo.

Membrana.

Arteria.

Vena.

Nervi.

Sanguinem à  
corde suum ca  
lorem accipit.

Cor omnium  
particularum  
tum maximè  
sanguinem, tum  
calidissimu  
m esse.

Iecur.

Caro.

Spina et medulla.

Cerebrum.

Adipem quoque  
circum iecur et  
quoniam hæret  
partibus.

Pulmonum caro.

Lenis caro.

Renum caro.

Formationem  
primũ anima  
lis consistit ex  
semine, & san  
guine mixtis.  
Partes quæ cir  
cumque postea  
formantur  
vtero.

Recente edia  
animalis cor  
pora etiam in  
capite existere.  
Capitulum  
carum tendit  
inter.

Ætatem floru  
tem esse in ma  
du extremorũ.  
Senes effi  
nato  
valde sicci  
fieri, humidus  
excrementorũ  
copia.

Senilem etatẽ  
esse siccissimam  
aliorum. & frigidissimam.

Senium esse ad  
interitum viũ.  
Mortem esse ex  
trahentem se  
rurale calorem.

Tactum solum  
esse iudicem co  
rum quæ actũ  
calida sunt.  
Potestatem cali  
dum investigare  
ratione.

Animalia frigi  
da quæ.

Animalia duri  
calida et humi  
da, non simpliciter,  
sed ad de  
mortua colla  
ta.

Cutem volæ ef  
fe mediũ naturæ  
subsistentia.

Humorem tempe  
ratissimu volæ.

Calidum itaq; quod in ætatibus cognoscere cupimus, primum & maxime tactu diiudicemus. Sicut autē optimū iudiciū illi alicuius infantis corpore. Potest namq; & qualis calor illi ante biennium fuerit, in memoria reponi: & qualis nunc sit, post duos fortē vel tres interpositos annos. Nam si murari omnino villa ad calidi frigidūq; vel infans facta videbitur, nullā præterea negotium erit, quā vsq; ad florentem ætatem excessus futurus sit, colligere. Quod si plures puellōs pluribus cōferre ætate florentibus velis, miles pōmnia, & natura, & educatione, suis similibus cōferes, ita vt reliqua omnia, quālibet fieri potest, sint paria, vna tantū ætate excepta. Si quidem in cōtrariis naturis disquirere differentiam ætatis, citra maximā impossitūram nō licet. Quare te his iam instructum, ceu rectē iudicaturū, ad ipsam experientiam remitto. Quippe si reliquis omnibus quæ extrinsecus adveniunt alterationibus circumcisis, eas quæ ex sola ætate proveniūt differentias perpendis, nec puer iuvene, sicvti nec iuuenis puero, absolute videbitur esse nūli calidior, cum nimirum eorum calores different qualitate quadam, quæ ex imparitate distat, gignitur. Est enim pueroꝝ calor magis halitusosus atq; copiosus, tangentiꝝ blandior. Florentium vero calor subacut quiddā habet, atq; in fluxu. Quæ differentia occurrit adducit plures vt credant, florentiꝝ corpus esse longē calidius. Res vero fecus se habet. Nam quemadmodum aër, aut etiam lapis, aliquando parī calore cum aqua esse potest, nullum eō faciente discrimen, quod lapis siccus sit, aqua humida: sic nimirū calor equalitas in pueris, florentibꝝq; inuenitur, etiā si alter in humida, alter in substantia sicca repræsentetur. Quā ratione in pueris magis ha-litusosus, & multus, & suavis: in florentibus vero exiguus & aridus, nec similiter suavis occur-sus calor exiit. Siquidem pueroꝝ subitanꝝ, vapore humida, multū foras effluit: florentium substantiæ parī, vapore efficit. Itaq; neuter eorū simpliciter videtur calidior, sed alter multitudine eius quod defluat, alter acrimonia. Quippe insiti calor, cūq; blandior, plus habet puer quālibet florens ætate, à quo quidē acrimonia calor vincitur. Ergo calidi frigidꝝq; corporis solus tactus est iudex: humidi autem & sicci, vni cum tactu ipso parati. Siquidē quod sicci est, idem prorsus est nūli tamen si quid durū est, idem statim & siccum erit, nisi mediocriter existat calidum. Nam & quod à frigore concretū est, durū cernitur, sicvti glacies. Quare nec si quid cum vè hemeti calore fir molle, idem statim est humidū: verum cum mediocriter est calidum, rū æthima-re durum ne, an molle fir, oportet. Si enim molle sit, humidum est: si durū, siccum. Quæ quidem si sic habent, parū quæ in humano corpore dūre sunt, nulla est humida. Nec enim tanta in eo esse frigiditas potest, vt aliquid in ipso cōcre-scere in duntaxat queat. Potest tamē quod prius fuit fluxile, aliquando cōcrevere, vt adeper: idu-rum, ne sic quidem evaserit. Cōmodo igitur dictum veteribus est, humidū sinā esse adipem. Se-cundo post eam loco, carnosum genus. Eius plures sunt speciem. Prima quidem, quæ propter

caro appellatur, quā scilicet nusquam in corpore per se iolam invenies, sed est porpetuo musculi pars. Dein cuiusque viscerum propria substantia est, cui ipsorum tota actio tribuitur. Porro cerebri pulmonisq; corpus, proximum adipi est, humiditas ratione. Propinquam habet naturam his, osium medulla: nō est tamen eiusdem generis cum ipso cerebro, neq; etiam cum spinali medulla. Hac cerebrum calidius est, & humidius, eōq; mollius. Cuius anteriores partes tantō humidiores sunt, quantō molliores. Omnē tamen hæc cute humidiora & frigidiora existit ac brevier, omne exangue, frigidius est sanguis prædicto. Proxima cuti est mollium in eorum natura. Duriore autē in humido & sicco, secundum cutis naturam se habent. Ac calore ab eius natura tantum abstant, quantū consentiens est exangue corporis & sanguine prædicto abesse. Lienus autem, renum, & iecinoris caro, tantū cute est humidior, quantū est mollior: calidior vero, quantū magis abundat sanguine. Iam cordis caro his omnibus tantū est siccor, quāto durior: calidior autem nō modō his, sed etiā omnibus absolute corporis partibus. Ac secors, & lienus, renum, pulmonisq; caro, simplicis cuiusdam naturæ est, circa cuiusq; visceris venas, arterias, & nervos cretens. Cordis simplex carnis natura nō est, sed sunt in eo fibre, quales in musculis cernimus, quibus caro circumdaretur. Atq; hæc quidem carnes cutē sunt calidiores: fibres verō quicūq; sunt, partim paulō magis, partim paulō minus, cum frigiditate sunt, tum siccor, partim fimbres omnino sunt substantiæ. Porro omnes membrarū cute sunt sicciore: ligamentarū ipsā, quāto cute duriora sunt, tantō etiā sicciora. Tendones quoq; longē duriore sunt cute. Cartilago verō post ligamentum est: ac deinceps mediū quoddam inter ea corpus, quod *synsarcoside* vocantur, quidam anatomici appellant, ac si dixeris ligamentum cartilagineū. Os verō omnium quæ cutis operit, durissimum est. Et eorum que cute extant, siccissimus est pilus: deinde cornu, mox ungues, ungulæ, calcaria, & rostra. Succorum optimus ac maxime familiaris est sanguis. Huius vti sedimentum est fax, atra bilis. Quæ idcirco tantum frigidiore, nō crasior sanguine est, sicvī alia bilis longē calidior. Frigidissimū verō ac humidissimū omnium quæ in animalī habetur, pituita est. Instrumentū autem quod id cognoscitur, ipse est tactus. Ac particule quidem, & succi corporis, ad hunc modū se habent. Iam verō crasiusculo & graciliter habitus, corporum temperamenta sequuntur, non ea modō que naturalia sunt, sed etiam si quæ ex longa consuetudine sunt contrācta. Multos liquidum, qui natura graciles fuerant, pingues redditos vidi: contrarij qui pingues fuerant, graciles: illis quidem ex oculo & delicata vita, toto temperamento ad humiditatem mutato: his vero, multa tolerantia, & cunis & nō vixit perfricatis. Ceterū quibuscunq; latiores sunt venæ, li calidiores natura sunt. Quibus angustiores, contrā, magis frigidi. Caloris namq; opus est, has dilatare. Quare meritō in idem recidunt, venarū quidem angustia, cum habitu pingui & crassiori: halitus autē gracilis, est laxior.

Carnet anspici  
per se repertum.

Exanguis a-  
mala frigido-  
re sunt sangui-  
ne praeclari.

Corde care co-  
lucet videri-  
fi corpore par-  
ciant.

Fabra.

Member no.

Tendons.  
Cartilage.

Chondrosty-  
desman.

2

Poland.  
Sanguis f.  
tunc optat

Atra bolus fac  
sanguinis.  
Puncta fragilis  
fieri & huius-  
modi sunt  
quae in corpore  
habentur.

Talis est in-  
strumentum  
qualitatis de-  
terminatum.

Pinguetudo vo-  
de cōtrahatur.  
Gracilitas vo-  
de cōtrahatur.  
Veni Lactari-  
bus praelati, ca-  
belaveri, fieri  
angustioribus,  
frigidioribus.

УСПАХИ.

അവനും കാര്യം  
നിന്നു തന്നെ  
എന്നു തന്നെ.

*Puerorum* in  
mumq; calore  
differe ante  
se qualitate e  
tunt.  
*Puerorū* calor  
mitis.  
*Florentium* ca  
lor acru.

Tallus quatuor  
fit index,  
Iuxta omnia of  
se dura.  
Dura quae  
sunt, non necesse  
est esse sicca.

Molle cum me-  
diocri calore of-  
fe huiusmodi.

Caran plants  
Specimens.



venarum. Quod si quas simul pinguis crassiusq[ue] est, ac venas laticas habet, in consuetudinis alicuius occasione, nō natura, pinguis est redditus. Sicuti est durius, qui angustias habet venas, & graciles est, ne hūc quidem talem esse natura, est necesse. Quinetiam cum fames viget, ex laxitate & angustia venarum, nō ex extero corporis habitu, spectanda est mediocritas, monet diuus Hippocrates. Quippe qui angustias possidet venas, & exigui sunt sanguinis, nec longam intemiam ferunt. Quibus sunt late, iis copia sanguinis inter, & citra noxam cibo abstant. Etenim quicquid pingue est in sanguine, leuēq[ue] id in corporibus calidioribus alimentum quoddam calido fit in frigidioribus verō astrictum. Vbi igitur id a venis transmissum, incidit in particulas frigidas, in ipse quidem concretit. In calidioribus vero natura partibus, cuiusmodi sunt carnosae, a calore absumitur, & digeritur: nisi forte frigida

Venas angustias habentes, acri fuerint intemiam.

Venas laticas habentes, facili cibo abstant.

Pomina aut sunt vero pinguiora.

Infusum.

Corporalis qui.

Cibusque velis acquirere naturam. Adipem quoque generat.

Temperata natura esse omnium aliorum sanctorum.

Sanctiora statu habentia si latius sunt. Temperata sunt temperata et minoribus, quibus non deperit in duntaxat.

modum naturali calore optimā seruante temperiem, humidum, quod intra sanitatis terminos est, auctū, nō adipem modū in hominē, sed etiam corpulentā pingue: & adipem quidem partibus adiacit, liberalius autem carnē adauget: sic enī, si humidum & sicum mediocritatē ad vnguem inter se seruent, calor autē sit in hominē minor, necesse est huius corpus adipē quālibet carnis copia magis abvadat. At verō si calor augment, seu utq[ue] mediocritatem altera contrarietate, minus erit et animalis adipis, quālibet carnis. Sicuti est durius, si quando præpollent sicum, altera contrarietate medium modum seruāt, & gracilius & durus corpus evadit. Ex quibus liquet, non solum ratione monstratū esse, quōd simplices in animalium corporibus intemperies labantur, sed etiam, quōd singulari manifeste sint nome, idēq[ue] in universis habitum corporis differētis.

Porro calida & sicca temperies, hirsuta est: verū ea in summo. Mediocriter autē, quē calida quidem est, sed in altera contrarietate mediocritatē habet. Similiter & quē sicca quidem est, sed in calido & frigido mediam temperiem obinet, modice est hirsuta. Nuda pilis sunt frigida omnia temperamenta, siue ea modice se habeant in humiditate, siue etiam immodice. Ceterū ad summum glabra est frigida temperies & humida. Minus hac, quē frigida est, sed in altera oppositione, temperata. Adhuc minus, quē frigida est & sicca. Si quidem siccitas cutis, in iis qui molli sunt cute, maximē omniū idonea est ad pilorū generationem: & quōd siccor calidiorq[ue] fuerit, eo magis pilos gignere potest. Hanc enim siccam & calidam cutem, velut terrē statū affimiles, quē a beunte sit vere, vel ineunte aritate. Etenim per omnē cutem digeritur semper a calido aliquid, quod secum etiam nōdūli interni humoris evehit. In quibus igitur humida est cutis, & mollis, quales modō cōcrefcens caesus, in iis, eorū quē exciderunt, viā per cutem dilatare nō manent: nēq[ue] partibus eius, quē prius discedebāt, rursus inter se cōiungunt. At in quibus dura est, nec absumilis caseo cōcreto, perforatur quidem, eorum quē exeunt transillit. Cū autem vni rursus per siccitatem nequeat, seruat imminutus meatus, qui etiam perpetuo transluenium istū, indies magisq[ue] fitulatur. Per eorū igitur, habitū minime impeditus est transitus. Sin autē fuliginosus, terreisq[ue] vapor sit, id quōd per meat, subinde cōiungit, vti in angustis spiramentis impactus, nec facile rursus intrō redeat, nec item possit vacuare, sed impellatur ab alio secundo vapore, angustie rursus ab alio, & sic consequenter, simulq[ue] multū vapores fuliginosī invicem complcan & coniungunt, in vnum corpus degenerent, quale est fuligo ea, quē foris cernitur. Fit autem niger pilus, cū devito vi caloris vapore, excrementū in exactam fuliginē permittatur. Flauus verō, cū vapor minus torretur. Nā quod tunc est impactum, flauibiles excrementū existit. At albus pilus ex pituita nascitur. Rufus, sicuti coloris albi, itaūq[ue] est medius, sic generano eius ex pituitose bilioisq[ue] fecis, flida quadam natura provenit. Crispi pilī sunt, vel propter siccitatem temperamenti, quē inorquet illos (qua

Hirsuta esse quē calida iis & sicca.

Glabra existit, quē frigida sunt & humida. Cū sit illi idonea est pilorū generatio.

Pilorum generatio.

Pili a nigri generatio. Pili flauis generatio ex flauo bile. Pili albi generatio ex pituita. Pili rufi generatio. Pili crispi quē sunt.

*Anthropi  
mores et c.*

ratione Aethiopes omnes sunt crassi vel propter imbecillitatem exhalationis, quæ rectam viam sibi moliri non potest: vel denique ob duriorē cutis naturam, quæ ipsam exhalationē, etiam si valens sit, prohibet recta fecti regione, cogitque ut ad latera se inflectat, ac sibi obliquum transitum parat. Est quidā ambobus coarctatus, & exhalationis, quæ meatum finit, imbecillitate, & cutis ficitate, pilorum radices obliquitas ipsa contingit. Quales autem in tā dade fiuntur, tales rationabile est pilos perpetuo fore. Atque licet quidem pilorum sit generatio. Sequens est, ut causas omnium quæ temperamenti in pilorum pro ætate, regione, & corporis natura, differentiis contingunt, dicamus. Ergo Aegyptii, Arabes, Indi, quique calidam & siccam regionem incolunt, nigros, exigui incrementi, siccos, crispos, & fragiles pilos habent. Contrā, qui humidam, frigidamque regionem habitant, Illirii, Germani, Sarmatæ, & omnis Scythica plaga, modicæ autē, graciles, rectos, & rufos obtinent. Qui vero inter hos temperatum colunt tractum, hi pilos plurius incrementi, robustissimos, & modicē nigros, modico critereq; crassos, tum nec prope crispos, nec omnino rectos, emittunt. In ætatibus ad eundem modū. Infantium quidem pili, Germani: florentiū ætate, Aethiopibus: Ephëborum atq; puerorū, iis qui temperatum locum incolunt, in robore, crassitudine, magnitudine, colorēq; ad portionem se habent. In corporum quoque naturis, ad ætatem & regionis portionē similiter se habere pili videntur. At pueri admodum parvi, nudi prorsus sunt pilis, quod nec meatus adhuc vilis illis in cute sit, nec excrementum fuliginosum. Incipientes autem pubescere, paruos & imbecilles exigit. Qui verō iam florent, hi valentiores, multos, magnos, & nigros habent: quod & frequentes meatus iam illis sint facti, & excrementis fuliginosis, præ ficitate & calore, abvndent. Cæterum pili qui in capite, ciliis & superciliis habentur, etiam pueris nobis innascuntur. Siquidem generatio eis est, non qualis herbis, sed qualis stirpibus prima ratione à natura conditis, nō temperamenti necessario sequentibus. Verum hi quoque, quod quidē sint, id naturæ arti acceptum lenius. Quod nigri, rufi, aut alio quovis sint colore, id ætatis temperamento omnino debent. Subnigri enim fecti sunt, quoniam quodā in meatibus est impactum, nondum totū est nigrum: quippe cū humiditas multa sit, & transitus facilis, & devitio imbecilla. Boni vero incrementi & modicē crassi sunt, propter excrementū, quibus aluntur, copiosi. Siquidem ipsa pars corporis, in qua fiunt, sicca est. Tota namq; calua offesa est. Cutis verō quæ illi est circumdata, tanto reliqua totius corporis cute est ficior, quanto durior. Ascendunt tamē tum ab iis que circa cerebrum sunt, tum verō ex toto corpore, fuliginosi excrementi non parva vis. Quo fit, ut quale ætate florentibus totū corpus, eiusmodi iam infantibus sit capitis cutis. Eōq; rationabilibus nōnulli procedente tempore calui redduntur, quibus scilicet à primo ortu cutis durior erat. Siquidē in ea cute, quæ fuerit ficcata impenitus, nihil nasci potest. Itaq; etiam

interna manuum, & interna pedum, semper sunt pilorū experta, quod ficitissimis, densissimisque tendo fit, qui sub cute habentur. Quibus autē ad summam ariditatem cutis capitis non pervenit, imbecilli ais omnino, albigi pili sunt: quos vulgō canos appellant. Imbecilli quidem, congruentis alimentis peturia: albi verō, propterea quod alimentū quo aluntur, veluti marcor pituita est, quæ spacio compurrit. Vbi enim mætas eriamtum inanet, excrementū verō exiguum est & lenū, in quidēq; à calore propellitur, non dissimiliter putredine afficitur. Iam calui sunt homines, cū senescunt, à fyncipite magis. Quæ neciunt magis à temporibus: quoniam regio illa est omnium aliarum ficitissima: Hæret enim cutis illic ofsi nudo. Tempora verō, humidiora sunt, quod in his musculi magni sub ipsa cute habentur. Omnis namq; muscularis carnis osus est. At caro tum esse, tum cute humidior. Verdenimvero, quandoquidem humanum corpus nōnullis quidem æquabili per totum temperamento esse potest, nonnullis autē, nequius paucis, inæquabiliter esse affectum, cū eorū alie particule temperata, aliæ intemperatę esse possint, certe ex vniuersa particula corporis, simpliciter de toto semper coniectandum nō est. Neq; enim li, qui docere mores ex ingenio corporis proficiunt; de omnibus pronuntiant simpliciter. Verū si quis impenitē furto est pectore, hunc audent indicant. Sin cruribus hirtis, salacem. Quare hominum temperamenta considerantibus, singule partes per se examinande sunt. Nec si cui thorax hirtus est, huiusmodi corpus calidius, ficitiusq; ex necessitate putandum: sed plurimū in corde caloris esse, eōq; audent illum, cui talis fuerit, existere. Possit verō aliquando etiam huius ipsius rei occasione accidere, quo minus totū lius corpus similiter calidum ficitiusq; sit, quod scilicet plurimū caloris sursum spiraverit, atque in ambientē abierit. Nam si tota corporis temperies æqualis sit, erit his statim thorax ipse vniuersus latissimus, vnde amplæ, arteriæ magnæ, eandēq; maxime vehementissimēq; pulsantes: tum plurimū per totum corpus pili, atq; hi quidem in capite plurimū incrementi, nigri, & crispi: vtiq; in prima ætate. Procedente vero tempore, caluites excipiet. His etiam & robustum, & exactē delinatum, & musculofum totum erit corpus: tum cutis nigrior, durior, hirsutiōq;. Ad eundem modum si cōtrariā omnia in thorace sint, atq; æqualis in toto corpore vigeat temperies, hoc est, si humidiores & frigidiores vniuersæ corporis partes fuerint, thorax quidem angustus, & glaber erit: sicuti etiam totū corpus pilis nudum. Cutis verō mollis & alba, capilli subruhi, ponitum in iuuentute. Hi in senectute nō caluescent, rimidiq; statim, & ignavi, & fegnes: adde etiam, paruis venis, ac minimis conspicuis, & adpositi sunt. Idem neruis muscularib; imb pilis nudum. Quibus parū exactē deliniatis, & blefis. At vbi varia partū temperies est, ex vna earū, de toto corpore clare nō licet: sed addide singule sunt, quoniam temperantur ex functionibus sigillatim investigandæ. Cūns quidē in nostra regione (quæ temperata est) subiectæ partū naturæ producat nō tā mea

*Vale manus  
et glabra.  
Planis pedu  
argilabra.  
Casi qui sili.*

*Calidius cu  
in fyncipite  
R.  
Canis cu  
in temperis  
patet.*

*Pronuntians  
simpliciter de  
corpore vniuersi  
li nō est, ex v  
alio eius particula.*

*Hirtis pectus,  
audent.  
Hirtis cruribus  
libidinis.*

*Calidi & fici  
temperamenti  
nota.*

*Frigidi hami  
dus tempera  
menti nota.*

*Temperis pat  
tibus, ex carm  
fuit bonis  
proficiendo.  
Cuius in reg  
no temperate,  
frigidiorum  
partium natu  
ram producit.*

*Pilorum vari  
tates secundum  
varias ætates,  
regiones, tem  
peramentis, tem  
peraturam.*

*Infantes cu  
glabri.*

*Pilorum capi  
tu aliorum &  
superciliarum  
generatio qua  
li casual.*

*Calui qui sili.*



cum est animans. Quippe ostrearum corpus humidissimum est, cunctis ipsa succulissima. Verum si per totum æquabiliter sit corpus attemperatum, ratio est, ut qualis sit curis, talis sit & reliquarum partium vnaquæque. Spectandum præterea in vniuersum est, ex quibus in quæ, mutationes ipsæ sint factæ. Est enim nec ratio, ut præfens nota, prioris temperamenti sit, non eius quod in corpore nunc habetur. Veluti si quis sexaginta annos natus, denso pilo sit, non quoddam calidus & siccus nunc sit, sed quod talis antea fuerit. Iam verò neque ex ipsa excrementorum natura, in definiens de temperamentis est pronuntiandum. Fieri siquidem potest, ut colligantur pituitosa excrementa, nec tamen humida sit particula, sed simul frigida & sicca: cum iustum ex cibis, nequaquam ex nostro corpore, ipsa pituita ornatur. Corpus enim ubi ingeluit cibos non vincit, simile us ipsum quod excrementum gignit. Cæterum quod non omnia que calfaciunt, necessaria erant exsiccant, ut perperam nonnulli putarunt, nemini obscurum existimo. Aqua siquidem calida, & quæcumque natura sunt calida & humida, si inflammationi, ex ipsi gratia, admoveantur, tamen ipsa quædæ superuacua, que media simularum spem occupant, evocet, corpora tam ipsa tantum abesse ut succret, ut ena illis humorè adiciat. Atque iam hæc secundum commentarum claudamus.

### GAL. DE TEMPERAMENTIS. LIB. III.

Ubi igitur antea tradidit sit, vnumquodque actus calidioris, frigidioris, humidioris, atque siccioris, vel ex eo tale dici, quod summam habeat humoremmodi qualitatem, vel quod vincat in eo id genus qualitatum aliqua: vel quod ad cognan generis mediocre aliquid, vel ad vnumquodlibet, a nobis sit collatum, demonstrumque præterea sit, quemadmodum est ut quis cognoscere exacte possit, reliquum est, ut de eis, que talia potestate sunt, disseramus. Etenim quod quale dicitur, tale non dicitur, sed potest tale esse, id hoc esse potest dicitur: verbi gratia, hominē qui nuper natus fuit, rationalē, & aëtem volentem, scilicet quod totū vnumquodque futurū est, hoc ceu iam id sit, apellantes. Est autem perfectum quid, ac præfens, ipse actus: sicut in perfectum, ac futurum, potestas. Ac maximè quidem proprie sola ea potestate esse dicimus, in quibus natura ipsa suo pte impetu ad absolūonē venit. Proximè huic modus, eorū est, que sunt propinqua materia, ut dum sanguinem potestate carnē appellas, quoddam minimam mutationē ad carnis generationē requirit. Dicitur potestate ena esse, quod ei quod ex accidenti dicitur, est ex aduerso positum: ut si quis dicat, frigidum calidationē ex accidenti, non ea propria potestate calfacere corpus carnosū iuuenis. Porro quæcumque medicamenta calfacere nostrū corpus sunt nata, ea, licet talia non appareat tangenti, calida tamen potestate vocamus, quod facile possunt calida esse, quodque promptē in ignem vertantur: hoc inter tactū discriminare, quod oleosa & aërea, in flammam, ut prunā autē terrea degeneret. At quemadmodum neque ignis ipse arguerit prius quā

visita ab eo ligna matura sint, ita nec animantium calor a medicamentis, nisi illa prius & cōmuni aliquantūper, & nostro corpori iuncta, ab ipso etiam mutetur. Quæ quidem si perfrigerato corpori quātūvis tenuia iuspergantur, non calfacient illud. Proinde que refrigeratæ sunt partes, eas eiusmodi medicamentis plurimū perficimus, rarefacimusque, quō scilicet interiorum pharmacum penetrans, naturalis animalis calor iunctum, mutetur, & caliat: quippe cuius si particula quæpiam vel minima, calorem actū concipiat, hunc deinde in totum, propter continuatētem, porrigat. Ac quicquid potestate itidem calidum est, hunc non dū in natura sua iungendo calidum præpollat, sed in propinquo est ut præpollat, adeo ut breuē opem quō viuatur, requirit extrinsecus. Hanc illi modō frictio abvnde præstare potest, modo vel ignis, vel corporis natura calidi contractus. Alia tamen cinis, alia tardius corpus nostrum recalciant. Cum autem

quatuor sint corporis facultates, attractrix, recenter, alteratrix, expultrix, quæ effectus sunt totius in quovis corpore substantiæ, quam consistat ex calido, frigido, humido & sicco, inter se mixtis, dicimus, sane ubi corpus nostrū vnaquælibet earum qualitatum corpus sibi admodū committat, nec ipsum hoc casu tota subitanea existimandum est agere, nec quod ab ipso mutatur, posse et assimilari. Quare nec vnuquodque nutrit quod dicitur mutari est, id quod ipsum mutatur. At si exacte illud mutet, id est, si tota operetur subitanea, uti que tūc sibi assimilabit id quod mutabatur, tamen etiam ab eo nutritur. Neque enim aliud nutritum est, quod assimilatio perfecta. Omne autem animal cōgruenti, sibi quod simili alimento nutritur, quale est, quicquid corpori, quod nutritur, assimilari potest. Cæteri pro ratione similitudinis, alia cinis, alia tardius assimilantur. Aut si quidem caro, haud magno negotio: nulla, maiori: bubula etiam hac maiori: vnum verò, omnium minimum, assimilari poterit, ubi prius in instrumentis cōtibus manserit aliquandū. In quibus antequam demutari sit, fieri non potest, ut animalis corpori sit nutritum. At quæ quidem assimilantur, omnia quidem nutrita vocantur: reliqua omnia, medicamenta: quorū duplex natura est. Quippe vel cuiusmodi sunt assumpta, eiusmodi etiam permanentia, vincunt, corpusque mutant, ad eundem modum, quod id cibo: atque hæc prorsus tum venenosa, tum naturæ animalis corporis medicamenta sunt. Ut mutationis initium ab animalis corpore consecuta, deinceps iam putrescunt, & corrumpunt, ac deinceps corpora vni corruptum, & putrescunt. Sunt hæc quoque noxia venena. Est præterea & tertia medicamentorum species, eorum numerū, quæ corpus quidem recalciant, mali tamen nihil afferunt: sicut & quarta alia eorū que & agunt, & patiuntur aliquid, sed ipso vincuntur, planèque assimilantur: quibus accedit, utramque medicamenta sunt, quæ nutrita. Nihil autē miri est, si exiguū consecuta momentū aliqua, maximam a priori naturam mutationē habeat: cum cōstet olim in Myria domū integrā cōstargasse ex solo stercore colubino, quod ab ardentis colubis inflammatis, fenestre

Medicamenta  
augere calorem  
nostrū non possunt  
propterea ab  
ipso mutentur.

Facultates  
naturæ  
corporis  
quatuor, attractrix,  
recenter, alteratrix,  
expultrix.

Nutritio est  
assimilatio per se  
ita.

Animalia  
omnia sibi sibi  
li alimenti non  
trahunt.

Vnumquodque  
corpus  
assimilari  
potest.

Nutritiva  
que dicuntur.

Medicamenta  
naturæ  
duplex  
species.

Medicamenta  
rum  
familia  
naturæ  
duplex.

Stercus  
colubini  
inflammabile.

proxime

Pituita  
est  
cibus,  
monstrum  
ex  
misterio  
corpore.

Calfacientia  
omnia non ex  
necessitate  
fieri.

Actus calidioris,  
frigidioris,  
humidioris  
atque siccioris,  
quæcumque  
dicatur.

Potestas  
quæ  
dicatur.

Actus, perfectus  
ac præfens  
quid,  
Potestas, imper  
fectum atque  
futurum.

Potestas  
propinqua  
quæ  
dicatur.

Oleosa in flammam  
non vertuntur.  
Terra non  
proinde degenerat.

Archimedes in-  
dustria.  
Specula sym-  
ta.

Lapides attriti  
edant flammam.

Medea medica  
mentum.

Calida pot-  
stis.

Vinum muta-  
re solet.  
Nutrimentum  
duo tripliciter.

Vinum immo-  
ditur haustum, fri-  
gidum afflicto  
inducere.

Eroditum co-  
tum nonnullum,  
cur minus tunc  
fuerant.

Nihil laque fo-  
rissimum a-  
gendi facili-  
tatem ferunt.  
Lachryma Cy-  
prinae tunc  
per se non fuit.

proxima suum communicavit incendiū. Quia ra-  
tione enim aiunt Archimedes hostiū tritones  
ventibus speculis incendisse. Succenditur his  
prompte lana, stupra, elychnum, ferula, & quic-  
quid similiter sua siccam & raram fuerit. Flam-  
ma edunt & lapides attriti, atque eo magis, si quis  
sulfure illos illeceat. Quare lucernā extinguens  
quidam, ac rursus lapidē, vel muro admovent,  
quā antea sulfure illeceat, seu prodigiū quid il-  
lam accensam ostendit. Eiusmodi erat medica-  
mentum Medea, ex sulfure & humido bitumi-  
ne constans: quod quidem quibus illitum erat,  
omnia, ubi in id incidēbat calor, accendebat, &  
inflammabat. Vniuersi igitur haec, potestate di-  
cuntur calida. Iam verū quicquid corporum na-  
tura calidiorum propriū est nutrimentum, id  
ea semper non torborat tantum, fed etiam in-  
stus eorum calorem augebit: id quod omni nu-  
trimento est cōmune. At vino prae cetera pro-  
priū ac suū est, mutationis celeritas, ita vni-  
us ut redx, elychino, stupra, & pua. Porro cū tri-  
farium nutrimentum dicatur, secundū Hippo-  
cratem, nempe & quod nutrit, & quod velui nu-  
trimentum est, & quod futurum est nutrimen-  
tum: id vni quod iam nutrit, propriū nutrimen-  
tum vocatur, cū corpus nutrit & calefaciat:  
quod reliquorum necium facit. Quemadmo-  
dum igitur si exigue & imbecille flammæ, con-  
fectum multū olei infundatur, illam prolixius  
extinguet: sic etiam vinum, ubi plus bibitur quin  
ut vino possit, tantum abest ut animal calefaciat,  
ut etiam apoplexias, paraplexias, comata, caros,  
neruorum resolutiones, epilepsias, conuulsio-  
nes, & tetanos, qui affectus sunt frigidi, indu-  
cat. Generati enim, quæcumque assumpta in  
corpus ut nutrimentum calfaciunt, haec interim  
frige facere depellentes, si in modicē aut intem-  
pestuē sumantur. Nec verō mirari debemus, si  
nonnulla quæ cū imposita, hanc erodunt, ex-  
cerant, ut liniapi, muria, allia, & cepe quantu-  
tissime comedantur: cū tamen neque intus in  
vino semper loco permancant, sed vndeque  
ferantur, ac tum cibis, tum variis succis per-  
mixta cōmuntur, innumera subest alterationes:  
ita ut quod conueniens in eis est, asimuletur:  
quod insuper vacuū & acre, per alium, vrinæ,  
sudoremque exaceratur. Quod autem si acrimo-  
niam suam seruent, etiam exacerant interna,  
ex his quæ ob cacochymiam sponte accidunt  
viceribus, cū in internis partibus, tum vel ma-  
ximē in ipsa cute, facile intelligere poterit. Ne-  
que enī est dubitandum, cur medicamentum, nonnulla,  
cū nihil nos offendat extrinsecus, intus assum-  
pta magis afferant in alium: aliqua rursus intro  
assumpta, nonnulli quantum ledant, nonnullam  
conferant: aliqua uō solum intro assumpta, sed  
etiam extrinsecus applicata offendant. Quippe  
ubi intus forisve parem agendi facultatem for-  
tur. Mirum autem esse nō debet, si lachrymam  
Cyrenicam ipsam quidem per se non liceat ci-  
ta in cōmodum sumere: quæ tamen si omni-  
nino exigua, vel cū aliis opportunē sit sumpta, in-  
agnopere conuenit. Atque ad hunc quidem mo-  
dum, quæcumque corpus calfaciunt, ubi mu-  
tationis principium in ipso accipere, recalcace-

re illud sunt apta. Quæ verō refrigerant, vel uti  
papaueris succus, lux a nostro corpore, ne vel  
pauculum quidem demittitur, sed ipsum statim  
vincunt, ac mutant, etiam si calfacta prius dede-  
rit. Est enim eorum natura frigida, ut aqua: quæ  
per se quidem frigida est, ex accedente verō ali-  
quando calida. Verū acquisitus eius calor  
breui perit, naturalis frigida manet. Queni-  
admodum igitur aqua calida flammæ iniecta  
eam extinguit, sic meconium, vel si id quantum-  
vis calfactum dedens, & calorem animalis per-  
frigerabit, & necis periculum afferet. Quan-  
quam id genus medicamenta, si parce exhibita  
sint, & vni cum eis quæ ipsorum frigiditatem re-  
tundit, nonnunquam vsum aliquem nostris cor-  
poribus præstāt. Iam verō medicamen id quod  
cantharidas recipit, hydencis auxiliatur, tam-  
enli cantharis ipsi velleam exviceret. Discre-  
re autem in omnibus quāmaximē oportet, quæ  
per se sunt, ab his quæ per accidens. Nonnulla  
quippe cū succis sunt iortia subitannam, ubi  
largo calore liquata fuerint, humiditas specū  
exhibent: ut res, & ferrum. Quædam per se hu-  
mida, ubi in syncero frigore luti morata, appa-  
rent siccæ: ut glacies. Quocirca de illis absolūtē  
pronunciandum non est: fed qualiter in calore  
frigoreque se habeant, considerandum: ac sic tan-  
dem non ad id quod secundum accedens est, fed  
ad id quod per se, respiciendum nobis iudican-  
dum. Porro cōmuni in omnibus, vni-  
candi ratio, est altera nonis celeritas. At cū ca-  
lidum, frigidum, humidum, atque siccum, sumptis  
dicantur: nempe licet quidem, per id quod ex-  
perat: illa verō secundum qualitatem quam ha-  
bent summam, & qua nimirum denominantur:  
in vtrūque horum prompte veniunt, de quo  
agitur iudicium, tale potest esse fuerit. Oleum nan-  
que, bitumē, resina, & pix, calida potestate sunt,  
quod in flammam vertuntur facili. Vinum au-  
tem, quod facile fiat sanguis. Pani in odore mel-  
caro, & lac. Atque hæc quidem, totis ipsorum al-  
terans substantias, nutritiēta se alterant sunt.  
Quæ verō vnaqualibet qualitate alterantur, ac  
mutantur, ea medicamenta tantum sunt. Medi-  
camenta indēm sunt, & quæ nulla substantia  
sua mutata parte, sed tota seruata integra, cor-  
pus ipsum afficiunt. Ceterum totum eorum ge-  
nus naturæ ipsi contrarium, graue, ac maximē  
deleterium existit: quam vis ubi planē exhiben-  
tur minima, nullum exhibent sensibile nocu-  
mentum. Porro iudicabitur contraria ipso-  
rum, ex ea, quæ media intercedit, mutatione.  
In elementis, verbi gratia, neque aqua mutari  
potest in ignem, neque ignis in aquam, sed ambo  
in aërem, ipse verō in vtraque. Ergo contrarius  
& sine medio est aquæ marino in aërem, itēque  
ignis, non contrarius ignis & aquæ in aërem.  
Hæc igitur inter se contraria, pugnantiaque sunt.  
Non dissimilis ratione papaueris succus huma-  
no corpori profusus contrarius est, ut quod in  
eum quicquam agere, ne vna quidem qualitate  
possit, ac multo minus tota sua substantia. Atque  
vinum quidem deleterioque genus suumodi est.  
Alterum est eorum, quæ ex nostro calore mo-  
mentum aliquod mutationis accipiunt, & deni-

Papaueris suc-  
cus non immu-  
tatur a nostro  
corpore.  
Aqua per se est  
frigida.

Cantharis ve-  
licam exviceret.  
Distingueda  
offi, quæ per se,  
est, ex accedens  
si dicuntur.

Potestate tale  
quæ ratione de  
calore aliquod.  
Potestur cali-  
da quæ dicun-  
tur.

Nutrimenta  
quæ.  
Medicamenta  
quæ.

Deleteria quæ  
dicuntur.

Contraria  
quæ intercedit  
sub-  
stantia.

Contrarius in  
se vtriusque tri-  
stus.

Papaueris suc-  
cus humano  
corpore omnia  
se contrarius.  
Deleterioque pri-  
mum genus.  
Deleterioque su-  
stantiaque genus.

de in multas alterationes vertuntur, quibus corrupta naturam nostram accidit. Quæ igitur corpus possunt, putrescunt, & liquant, merito potestate calida nominantur. Ceteri, quæ refrigerant, & sensum auferunt, notabilémq; inducunt torporem, frigida. Verum in applicationibus usque natura quidem sunt frigida, sed per accidentis calida, contingit eorum calorem acquisitum necessariò penne: propriam autem temperiem frigidam, à iustis nihil immutaram per seuerare. At quemadmodum salamandra ad certum usque terminum ab igne nihil patitur, virtus autem si longiori spacio sit igni admodò: sic & mandragora, & cicuta, & psyllium, breui spacio igni applicata, propriam adhuc temperantiem seruant: largius autem ex calfacta, illico coram pilant, nec quicquam efficere, eorum quæ prius poterant, valent. At talium quidem omnium natura, hominibus maximè exiit contraria: eorù verò quæ celerimè nutriunt, cõuenientissima. Reliqua omnia, media inter hæc sunt, quorum alia magis, alia minus agere ac pan à nostro corpore possunt. Siquidem calidiorum & pipæ, agere magis in corpus nostrum, quam pan ab eo valent: vinum, & mel, & pitana, pan magis quàm agere. Ceterum ubi duo corpora inter se cõmittunt multo repugnant tempore, certantq; de alterando, utrunq; eorù tum agere, tum pati est necesse. Semper quippe agitur quod vincitur, in id quod vincit: adeo ratem exigunt ut sensum effugiat. Hoc autem in usque nutriunt, etiam compertum est. Lactuca quidem, quando ab testant in ventriculo coquitur, manifestè quidem refrigerat, sitim compescit, atque adeo quod frigida & humida sit, somnum conciliat. Vbi verò ex ea nutritus homo iam fuerit, insensibilis caloris substantiam augebit. Ventriculum autem ea ledit refrigeratur. Quare ubi id genus vitæ præstant, & quod veluti medicamenta corpus nostrum afficiant, & tanquam nutrimenta naturalem calorem augeant: cum hoc exploratum iam sit, interdum qualitatē caloris intrudi, interdum substantiam eius augeri: si ergo non concoquatur lactuca, aut si maus, succus ipsius, quando is, si liberalius sumatur, similem cum paupercis succo in homine effectum sortitur, erit vitæ tantum medicamentum: at si absolute coquantur, quis ambigit, quin corpori etiam sit nutrimentum: Lactuca itaq; tam cibus, quàm frigidum medicamentum exiit. Eruca autè, & ex herbis anethum, ruta, origanum, pulegium, calamintum, thymum, atq; thymum, tum cibum, tum medicamenta calida sunt, dum sicché adhuc coquantur, medicamenta: mutata verò in sanguinē, nutrimenta: secunda nimirum nutrimenti significatione, qua id significatur, quod non dū est alimentum, sed velut alimentum. Si igitur frigidior iusto fuerit ventriculus, quando in eo delituerit, donec coquantur omnes id genus herbe, calfaciunt ipsum, atq; ad temperamenti aequalitatem reuocant, profunq; ut medicamenta. Si vero calidior impendat sit, maffimaburillum, ac magnopere ledent: atq; has quidem alterationes, qualitate sua inducunt. Nam omnino percoctum, atq; in sanguinē bonū coherere substantiam

caloris naturalis augebunt, non qualitatē intendunt. In vniuersum autem, siue frigidus, siue calidus potestate sit cibus, posteaquā in sanguinē est cõuersus, naturalem similiter calorem augebit. Quod verò ad sanguinis formam spectat, nec dum planè sanguis est redditus, refrigerat, calfacitve animal, medicamentum nru. Etenim cuiuslibet corpori proprietates quædam temperamenti est, quæ huic quidem naturæ cõsistenti, ab hac verò dissentiens videtur. Quod si id quod sibi cõsistens est, in suam naturam tranfmittit, caloris proprii substantiam augebit. Sin verò ipsum temperamentum mutatum sit, vitæ vel calorem quandam conquiret, si id à quo est mutatum, sit calidum: vel etiam proprium amittit, si id minime calfaciat. Quare omnia eiusmodi ex eorum sunt numero, quæ ad aliquid relata decuntur: cum ad proprietatē mutantis nature, quicquid assumitur, vel nutrimenti, vel medicamenti, vel vitæ nomen sortitur. Verbi gratia, cicuta sterno nutrimentum exiit, homini medicamentum. Rursus, cornu veratrum est nutrimentum, homini medicamentum. Ergo manifestum iam arbitror factum, iudicium eius quod respectu nostri calidum, frigidum, humidum, atque siccum dicitur, non ex his quæ posita extrinsecus sunt, sed ex illis quibus ipsi afficiuntur, certè ex actibus fieri posse: atque id tanquam primum ac maximum spectandum esse deinde, si res exigat, etiam quod ab externis penitit: idq; nō quo vis modo, sed secundum quæsit rei substantiam. Vi igitur absolutissimè iudicemus, cibus vel medicamentum quod admouetur corpori, expertus esto omnis acquisitæ caloris & frigoris, planèq; sit tepidum. Nam siue potestate frigidum, cum id applicat, manifestè calfaciat, siue calidum refrigeret, corpus primo occurru qualitatē acquirit, non eius quæ propria est rei admodum, sensu afficietur. Applicatur autem ipsum medicamentum, quum eius vim exploras, non cuiuslibet corporis affectui, sed simplicissimo, & summo. Quod si summi quidem caloris affectioni admodum, frigoris sensum exciet, erit profectò sic frigidum. Pari modo, si frigido affectui applicetur, calidum statim appareat, id quoque erit calidum. Sin vel calide affectioni calidum, vel frigide frigidum percipitur, nō est quod hoc calidum, illud frigidum omnino pronunties. Iudicabimus autem quod ex accidenti aliquid facit, tum ex affectu ipso, tum tempore. Ex affectu, si vnus sit, & simplex: ex tempore, ad hunc modum. Quod protinus ut admodum est, manifestè calfaceat vel refrigeraretur, id vitæ se, & per se tale fuerit. Quod tempore id facit, fortasse ex accidenti alioquo huc est actum. Velut iuueni quadrati corporis terano astate media laboranti, frigida liberaliter affusa, caloris repercussum ex accidenti facit, cum nimirum astringens. Ceterum quod aqua frigida per seminimè calfaciat, ex primo eius occurru patet. Sed non minus quandoque calor ex accidenti perfrigerat, vacuatione vitæ intercepte: si vn perussio phlegmonem. Cum enim ex calida fluxione consistat phlegmonem, propria quidem eius curatio, vacuatio superuacui est, cui succedit affectus par-

*Salamandram  
vis ab igne si  
domini admo-  
sa fuerit.*

*Lactuca facili-  
tate.*

*Nutrimenta si-  
milis et medica-  
menta.*

*Lactuca succum  
liberaliter sum-  
ptum, sensum  
tum pauperum  
focis faciliat  
sortitur.*

*Cibus omnis in  
sanguinem res  
sui, naturalem  
calorem augeat.*

*Ad aliquid  
quod decantur.*

*Cicuta sterno  
nutrimentum  
exiit.  
Veratrum est  
nutrimentum  
cõuenientissimè.*

*Medicamenta a  
naturæ re-  
pleta esse  
admodum legi-  
da, et corpora  
simplicissima  
afficiunt.*

*Accidentaria  
alimenti quæ-  
libet iudicant.*

*Aqua perussio  
frigida, calfa-  
cit ex accidenti.*

*Calor ex acci-  
denti refrige-  
rat.*

*Phlegmonem  
generat et co-  
rat.*



tis refrigeratio. Ergo cū duplex, in his quæ phlegmone laborant particulæ, affectus cōstitat, unus quidem in quantitate, alter in qualitate, sequitur prioris curationem, etiam posterioris curationis sunt quæ accidenti ea medicamenta, quæ materiam calentem evacuant, inflammationis etiam particularū refrigeratoria. Sed pro modo simplicis affectus etiam vniū medicamen inveniatuū. Nepe calidū in fummo affectu, frigidum in fummo medicamen paratur. Paululum recedentia fummo, medicamen etiam pro ratione adhibere, quod declinet parū in fummo frigore. Quippe si auspiciatus à tali coniectura examen ipsorum sis, facilius propriam vi eorum invenies. In vniuersum autē, in omni simplici affectu calido, quodcūq; adhibuit medicamen primo statim occurrit, frigoris sensum intrulit, id frigidum potestate est: ac multo profecto magis, si post primam exhibitionem tale perpetuo manet. Quod si prorsus calidū ipsum affectum sanet, frigidum id ex necessitate fuerit. Adhibendum verū est, quam exploratur quidem, omnino tepidum. Vbi autem iam cognitum est, & grata curationis petitur, rectius frigidum sumitur: nisi medicamen quidem ipsum, summi sit frigoris, morbus autē in fummo calore non sit. Porro cū frigidum calidūve aliquod per se, vel primū, vel nullo intercedente medio, esse dicimus, omnib. eiusmodi vtrūq; idem potestate significamus. Quemadmodum igitur

*Frigidum potestate.*

*Medicamē quæ applicandum sit.*

*Alia ex potestate calidum quæpoteat dicatur.*

*Quæ potestate dicuntur, etiam referuntur ad aliquod. Probato propria.*

*Tactū indicatorem spiritum, a dicitur esse expertū ad lumen quælibet.*

## GALENI PERGAMENI de inæquali in temperie, liber

YNN.



Nequalis in temperie alia in toto animalis corpore fit, veluti in ea hydrops specie, quæ à anasarca vocatur, ac tere in omnibus febribus, exceptis quas appellamus hecticas: interdu in singulis partibus, idque tum ob fluxio-

nem, ut dum ex tumore aliquo præter naturam affectus sunt: tum ob solā qualitatis alterationē, quæ multifariā solet accidere, atq; in octo in temperaturis, quatuor quæ dē simplices, quatuor vero cōpositas, ut diximus antea, digeruntur. Quod autem eiusmodi in temperies eo ab æqualibus distent, quod in omnibus in temperant affecti corporis partibus, non insit æqualiter, id clarescit. Ergo quis sit omnis in æqualis in temperaturæ generandæ modus, in proposito libello exequi est animus. Meminisse tamē oportet, corpus quidē ipsum diuidi in maximas partes: has rursus, in alias minores: atq; illas deniq; in similes & primas, quas diuisile in aliam speciem nō est: quinenam cōplura esse spacia inter ipsas similes partes, atq; us etiam plura & maiora, inter ipsas instrumentanas, compositisq; aliquæ verō, & in vnaquolibet similiari particula, veluti osse, cutisq;. At quæ mollia quidē sunt corpora, ea, quoniam sibi inuicem incumbūt, interposita spacia latere conspectū nostrū faciunt. Quæ dura siccatq; sunt, in eis cernere spacia licet: sicuti osium cauernulas, quæ plurimo humore tum crasso, tum albo replete sunt, ad alenda ossa.

*In æquali in temperie, æqualis quæ distinet.*

*Corporis humani in diuisio.*

*Spacia partium in æquali.*

Quandoquidem igitur omnium particularū in æqualiter affecti corporis, non eadem est temperies, certē differētiæ ipsius in temperamētū in æqualis, naturam corporis affectū sequenti: cū aliter simplex caro, aliter vniuersus muscularis, impari temperamento afficiatur. Quippe calida fluxio, vbi procubuit in musculari, primū maiores arteriæ, vixitq; oppletur, ac distenduntur. Ab his, minores atq; ita res procedit ad minimas. In us, vbi valenter impacta fluxio est, neque adhuc fissitur, pars quidem eius per ipsarū ora, pars per tunicas transcolatur ad exteriora. Tum verō spacia ipsa vacua, quæ inter prima sunt corpora, fluxione implentur. Scilicet omnia ab humore, omni ex parte incallescunt, & perfunduntur. Ea sunt nervi, ligamenta, membranz, caro ipsa, anteq; hæc, arteriæ & venæ, quæ sollicitæ & primæ, & præter cætera, vario dolore afficiuntur. Interius namque d fluxione tum excallescunt, tum distenduntur, & diuelluntur: exteriorius nō modò calescunt, sed etiā premuntur, ac degrauiantur: appellaturq; morbus ipse phlegmone, q̄ musculari in æqualis est in temperies. Feruet enim iam qui in eo est sanguis: ac secum ex calcitrit primum quidem, ac maximè, arteriarum atq; venarum tunicas: mox omnia quæ extra has sunt, quibus sollicit circūfunditur. Ita duorum alterum necesse est sequi, vt si fluxio viciorum, corruptio sequatur victorum corporum: si fluxio sit victa, vt musculari ad naturalem statum redeat.

*In æquali in temperie, naturæ corporis afficiuntur sequenti.*

*Phlegmonis generatio ex æquali.*

Elio igitur prius victa fluxio: duplex hic incidit curationis genus: nempe aut discussio omni eo quod in partem confluit, aut cōcoctio. Verū discussio, siue digestio, optatā maximè curatio est. Cōcoctionem hæc duo necessariō sequuntur, puris generatio, & eius in aliquod spaciū abfcessio. Abfcedit aliquando in capacitarum quæ proximè sunt, tum maximam, tum minimè momentaneam: qd si abfcessio: si genus optimū est. Aliis in nō momentaneam quidem, non tamen maximam. Interim in maximā, non tamen

*Phlegmonis est musculari in æquali in temperie.*

*Phlegmonis in toto.*

*Phlegmonis est in toto, siue curationem optandam.*



*Abſceſſum mo-  
do dicitur.*

non momentaneam. Ac quæ in ventriculū in-  
cidunt abſceſſionū optima eſt, quæ in ſinum e-  
ius internū abit, in quem etiam plerumq; ſe ape-  
riunt: mala verò, quæ ſub peritonæum. Pari mo-  
do in iis quæ circa cerebrum exiunt, bona eſt,  
quæ in priores ventriculos eius abſcedit: mala  
quæ ſub involucria ipſius, & quæ etiam in poſti-  
cum eius ventrē ſe recipit. Qui verò circa coſtas  
colleguntur abſceſſus, ſi in capacitates erum-  
punt peſſioris. At muſculorum abſceſſus, ſub cu-  
tem: viſcerum autem, in arterias & venas, quas  
in ſe cōnnect: vel in membranā quæ ipſis pro-  
cute eſt. Verim ſi victæ à fluxione fuerint particu-  
læ, in tantam intemperiem deveniunt, vnde  
tum earum percat actio, tum ipſæ tempore cor-  
rumpuntur. Porro definiētur primū dolere, cum  
mutata qualitatē fuerint aſimilata. Nō enim  
cum mutata particulæ rēperies iam eſt, dolent,  
ſed dum mutantur. Si quid cum alteraſcit, cor-  
rumpit atq; natura (quemadmodum dixit Hip-  
pocrates) dolores ſunt. Alteratur autem, cor-  
rumpitq; natura cuiuſque, cum vel calſcit, vel  
frigeſcit, vel humectatur, vel exsiccat, vel vni-  
tas eius diſſolvitur, in iis quidem intemperan-  
tiis, quæ inæquales ſunt, ex calſcaciendo, vel ſi-  
gefaciendo, poſſimus: quippe cum efficaſſi-  
mæ qualitates iuxta ſint: ſecundo loco, eſſicando  
vel humectando. Ex eſuendo verò, vel ſiſen-  
do, deficiente hi; humida, illi ſicca ſubſtantia.  
Ex vulnerando, & rodendo, & tendendo, & pre-  
mendo, & convelleido, vni tate ſoluta. Ergo ſi  
calor ſanguinis in particula quæ phlegmone la-  
borat, eſt mitis, tum qui in toto animalis eſt cor-  
pore, mediocriter tēperatus, non facile vni cum  
aſſiſta particula calſcit. Sin vel ille ſeruet vehe-  
mentius, vel qui per totum ſpargitur animal  
bilioſus eſt, illico totus ad calorem vertitur. Mul-  
tō verò magis, ſi vbi ambo concurrunt. Porro  
calſcit primū, qui in arteriis eſt ſanguis. Poſt hūc  
verò etiam qui in venis eſt. Quod ſi in propin-  
quo viſceri, cui plurimus ſit ſanguis, obſeſſa  
phlegmone particula fuerit, iam celerius cum  
hoc, vniuertiſ qui in animali eſt ſanguis ipſum  
calore excipiet. In ſumma, quicquid facile altera-  
bile eſt, aut calidū natura, id à quovis calſcaciē-  
te primū calſcit. Non ſecus & ab eo quod frige-  
facit, quicquid facile alterari eſt, vel natura frigi-  
dum, id primū frigeratur. Ac promptus quide-  
m, ut alteretur, ſpiritus eſt. Calidiſſima autem  
natura eſt, ſtaua bilis: frigidīſſimāq; pituita. Sau-  
guis poſt ſtaua bilē maximè eſt calidus. Sicut  
nigra bilis poſt pituitā, eſt frigida. Quinetiā  
alteratur ſtaua bilis leui momento, ex quovis in-  
cam agente. Nigra ægrè alteraſcit. In ſumma,  
quicquid tenuiſſimum eſt paruum, id promptè altera-  
tur. Cōtrā, cui craſſi ſunt partes, ægrè. Iam ve-  
rò quæ perſpiraria carēt, celerius putreſcunt,  
priſterum ſi calida ſint & humida. Quare, pro va-  
rietate horum omnium quæ dicta ſunt, neces-  
ſum eſt muſtrari phlegmonum inæquales al-  
terationes incidant: maximè quidem inflammationē  
to eo qui in phlegmone eſt ſanguis: dein eo,  
qui in viſcerib; labetur & corde: atq; huius ma-  
ximè eo, qui in ſiniſtro eius ſitu cōſiſtit. Etenim  
vbi totū corpus incalcſcit præter naturam, ſinus

ille ad ſummum calorem pervenit, cum tenuiſſi-  
mum ac maximè ſpirituoſum ſanguinē habeat, &  
moueatur perpetuo. Cæterum in febris in id ge-  
nus omnibus, calſcit quidem ſanguis aliquādo  
vniuertiſ, \* recipit calorem illum præter natu-  
ram, qui ex humorum putredine eſt ortus. Non  
tamen aut arteriarum, aut ipſarū venarum tu-  
ræ, aut aliud vllum circumiacentium corpo-  
rum, ſiū prius matauit temperiem, ſed adhuc  
calſcit mutatur, quod ſi id panatur diutiſſus, etiā  
aliquando vinceit, proſuſq; mutabitur. Ter-  
minus mutationis cuiuſq; particulæ, eſt ſuſceſ-  
ſio illius leſio. Ad quem vſq; terminū omnis al-  
terationis latitudo, via eſt in id, quod præter na-  
turam eſt. Ergo toto hoc tempore corpus incal-  
leſcit, pro modo alterationis, ad portionē ſen-  
tit dolore. Quum verò omnes ſolidæ particu-  
læ corporis excaſcæſcit ad abſolutionē iam ſunt,  
eiſmodi febriſ Heſticam Græci nomināt, cu-  
non amplius in humoribus & ſpiritibus, ſed in  
corporibus iis, quæ habent rationem habent,  
comprehenſam. Hæc doloris eſt expertis: putitq;  
qui ea febricit, omnino ſe nō febrere. Neq; enim  
eius calorem percipiunt, mirum omnibus co-  
rporibus æque percaſcæſcit: quum neque  
etiam citra alterationem ſit ſenſus, neque in us  
quæ iam ad perfectionem ſunt alterata, dolor.  
Porro, quod alibi vbi Hippocrates ait, omne mor-  
bum eſſe vicus, id quidem nō vique adeo alienū  
videri debet. Vicus namq; vni tati ſolus eſt. In  
modicus autē calor, ſegregando ſubſtantie con-  
tinuitatem ſummum verò frigus, ſtipando, ex-  
primendo, & quaſiando, proximè accedunt ut  
vni tatem ſoluant: id quod certè immodici calo-  
ris & frigoris terminus cōmodè ſtatui poterit.  
Ceterum omnis immoderatus exceſſus, in habi-  
tudinē conſiſtit ad aliquid. Non enim pari ratio-  
ne à calidis frigidisq; aſſicitur omne corpus. Vn-  
de ſit, ut aliqua animalium cōvenientes inter ſe  
ſuccos habeant: aliaque nō ſolum nō conveni-  
tes, ſed etiā qui ſe mutuo corrumpant: vel vni lo-  
mo, atq; vipera, quorū vni uſq; ſalua alteri per-  
niciēs exiſtit. Ira vniq; & ſcorpium necauerit, ſi il-  
li ieiunus inſpuas. At non homo hominē, nec vi-  
pera viperam, nec aſpis aſpidem, morſu interi-  
mit. Si quidem quod ſimile eſt, id cōgruum, ami-  
cūq; eſt: quod contrarium eſt, inimicum & no-  
xium. Augetur enim quidq; ac nutritur ſimili-  
bus: perimitur & corrumpitur à diſſimilib; Quo  
circa ſanitate tutela, per ſimilia perſicitur. Mor-  
borū ſublatio, per cōtraria. Heſticā itaq; febrem  
maximè ſeſcit, qui ea laborat. Requiritq; febriū  
nulla eſt, quæ non à ſhorante ſenſiatur: ſed alia  
magis, alia minus ſunt graues. Sunt enim ex iis,  
& quæ rigorem ingerant: quod ſymptoma ſit ab  
inæquali intemperie. Iam verò accendi febrem,  
& citra phlegmonem, ex ſolis humoribus putre-  
ſcentibus, licet: ſi vni & aliud genus inæqualis  
intemperiei in toto corpore oriri, modò ſuligi-  
noſo vapore detento, modò exercitationibus  
& pluſculis laboribus calore aduſto, modò ab  
ira, modò à devſione quavis externa, ſanguine  
incalcſcente. Quādiu igitur intemperies ipſa non  
nunq; ſpirituoſam duntaxat invadat partē, non  
nunq; etiam ipſos humores, quodq; omnibus

*Inſtimate par-  
tes dicitur quas  
do ſoluntur.  
Dolor ſori-  
dum alteratur,  
corrumpiturq;  
natura.*

*Qualitates eſſi-  
caciſſimæ quæ  
emulant.*

*Spiritus altera-  
ri facile.  
Staui bilis eſt  
calidiſſima.  
Pituita eſt fri-  
gidiſſima,  
Sanguis qua-  
liſ.  
Atra bilis qua-  
liſ.  
Tenuiſſimæ par-  
tes ſanitate  
priſtina altera-  
ri caſſimè citra  
ægrē.  
Perſpiraria ca-  
rentia celerius  
putreſcere.*

*Febricitans le-  
ſionem eſt ter-  
minum muta-  
tionis cuiuſq;  
particulæ.*

*Heſticam fe-  
brim occupant  
ſolidæ corporis  
partes.  
Heſticam fe-  
brim eſſe dolo-  
re expertam.  
Senſus non al-  
liſque altera-  
tione.  
Morbum vniū  
eſſe vicus.  
Vnus eſt vni tati  
ſolutus.*

*Exceſſum a-  
nimæ immoderatum,  
conſiſtit  
re in habitudine  
ad aliquid.*

*Salinem iram  
hominis neca-  
re ſcorpium.  
Similia amant,  
ſibi eſſe maxime  
congrua & co-  
muniſ.*

*Diſſimilia, eſſe  
inimica & ve-  
rius in viciis.  
Sanitate tutela  
per ſimilia perſicitur.*

*Morbus per con-  
traria tolli.  
Febriſ poſſibile.*

*Febriſ phlegmo-  
ſa generari.*

huiusmodi febribus, si diu perdurauerint, he-  
licia superveniat febris, nemini obsecrum ex-  
stimo. Quemadmodum ergo ex devotione accen-  
ditur febris, ita nonnulli tæpe ex frigore refrige-  
rat vehementer toto corpore frigui: aliqui verò  
etiam perierunt. Sed quod non omnes enī doleant,  
ne id quidem later. Dolēt enim, maximè circa  
vnguim radices, & qui ex rigore ingenti vehē-  
menter perfrigerati, celeriter se se calacere prope-  
rarunt. Quam quidem inæqualem intemperan-  
tiam, quā videat aperte quis esse causam dolo-  
ris, non est quod de ceteris dubites: nec si simul  
riget & febricitet ægrotantiū aliqui, sentiuntq;  
humorem punitum, qui frigidius est, mistum  
amaræ bilis, quæ est calida, moueri per sensibilia  
membra: vt in epialis febribus, in quibus simul  
umbas qualitates contrarias intra corpus æger  
sentire videtur, cum iuniorum calidum ipsum &  
frigidum, per id genus febres, tenuissimis por-  
tunculus aspergantur, adeoq; misceantur in vi-  
cem, vt ne miniam quidem viuis sumere pos-  
sit particulam, in qua alterum non sit compre-  
hensum. In ipsa nam accellionis inuāsiōe, nō  
nulla & riget & sunt atq; intus quidem, & in  
ipsis visceribus, magnū incendium externis au-  
tem partibus, frigus maximum sentiūt. Ac rales  
febres sunt, quæ græcè lypix vocantur, atq;  
ardentium febrium quoddam perniciosissimū ge-  
nus. Quinetiam is qui riget, nec tamē febricitet,  
inæquale temperamentum accit. Rarum tamen  
est id isyptomia, licet quid mulieribus, vni vi-  
ris quibudam accidat, vbi aut desit vira, aut cō-  
tinua ciborum copia prædesit. Porro antiquis  
vires nemo, vt videtur, ita est affectus, cum neque  
ad oculos, nec in visceribus saturitate tunc viue-  
rent. Vnde factum est vt scriperint veteres me-  
dici, rigon febrem necessariū superuenire: tamē-  
tisi sepe numero rigorem vidimus, quem nul-  
la sequuta sit febris. Compositur autem ex hac  
intemperie, & ea quæ febricitantem est, epialis.  
Appello ita febrē illam, quæ ambo semper simul  
accidunt. Nam in qua rigor quidem præcedit, fe-  
bris sequitur, veluti in tertiana & quartana,  
hanc epialam non voco. Ita ex duplici inæquali  
intemperie epialus componitur, atq; etiam alie  
ferē omnes febres, præter hecūcas. Pariter & qui  
particulæ alicuius cum tumore sunt morbi, hi  
quoq; omnes cum temperamento inæquali cō-  
sistunt: vt cancer, erysipelas, carbunculus, her-  
pes, eczema, plaga dæna, gangryna: differunt ta-  
men, pro ipsa fluxionis diuersitate. Siquidem  
qualis fluxio fuerit, talem præter naturā tumo-  
rem gignit.

### GALENI PERGAMENI de optima corporis constitutione, liber vñtus.



Vando quidem temperamentū ex  
calido, frigido, humido & sicco, de-  
finitum congruenti mēsurā, simi-  
laris membrorum existit sanitas: in o-  
stia autem ex omnibus his constitu-  
tūo, politione, magnitudine, figura, & partium  
numero cōstitutum: concedendi iure est, corpus  
aliquid, licet ex pluribus optimè temperatis parti-

culis compositū sit, secundum tamen ipsarū ma-  
gnitudinem, aut numerū, aut figuram, aut mu-  
tum inter se cōiunctum, nōnullū posse vim con-  
trahere. Porro, vt à cōmuni notione exordiamur,  
saluberrimum corpus omnino vno ore lan-  
dantur: nō id quod Græci *εὐκτατα* vocant,  
hoc est, optimo labatu præditum: idq; ad vnam,  
eandemq; rem respicientes. Quippe omnium i-  
plius corporis particularū functiones esse robu-  
stas aut, nec à morbiferis causis facile vinci pos-  
se. Ceterū cum ipsæ particularū functiones se-  
cundum naturam promptè obeunt, sanitas est.  
Vbi verò id cum quodam enī robore præstat,  
bonus habitus dicitur. Cōmune autem vniq;  
est, nō facile morbus succumbere. Quare bonus  
habitus, omnium illa saluberrima cōditio exi-  
sit, quam vniuersi percipiunt: cuius accedens  
& mensura est, in obeundis functionibus stre-  
nuitas, atq; constantia. Quia ratione merito bo-  
nus habitus appellatur. Meminisse autem o-  
porter, nostrā corpora ea miscella quatuor elemen-  
torum consistere, variatq; esse partium tempera-  
turas: ad hæc, singulis organicis membris vni-  
cam inesse particulam, cui tota actionis causa tri-  
buitur: cuius gratia reliquis omnia creata sunt,  
quæ totum cōplecti instrumentū. Quibus præ-  
missis, erit optima corporis constitutio ea, in  
qua similes partes propriam temperiem possi-  
dent, nec non cuiusq; instrumentariarū compo-  
sicio ex illis, secundum ipsarū magnitudinē,  
numerum, figuram, mutuumq; inter se connex-  
um, certa quadam & exacta mensura constru-  
cta fuerit. Quocirca id tale corpus optimè suis  
fungetur actionibus: ac proinde aliorū omniū  
& similitudinū erit, & minime prolabitur in mor-  
bos. Siquidem vniuersis causis morbificis tam  
extrinsecis quā intrinsecis facile relucetabitur,  
quod omnino ab vniq; extremitate recedat, adeoq;  
optimis succis abvndet, vt tristitia, iras, vigilas,  
curas, iubres, squalores, & pestilentiam, aliis o-  
mnibus ferat multo facilius. Nam quæ maximè  
vinosis succis redvndat, faciliè ab huiusmodi cau-  
sis tentatur, vt pote quæ per se iam morbis proxi-  
ma sint. Quoniam aut sanitas extendi in satis am-  
plam latitudinem potest, non solum in hoc com-  
mentario corpus illud absolūtissimū, quod ra-  
tō invenitur, & tanquā Polyleti regulæ exem-  
plum est, debes effingere, sed eorū etiam mē-  
nisse, quibus cum quotidie versamur, quæ ab  
eo breue aliquid deficiunt, nō tamen adhuc in-  
signem admodum lapsum sunt nacta. Quod igi-  
tur exquisitè bona temperie præditū est, mediū  
sanè locum obinet inter molle & durum, & in-  
ter hirsutū & glabrum: pariter nec amplius, nec  
augustius est vena, nec pulibus magnis aut par-  
vis recedere à medio citate videtur. Quod verò  
vndeque exacta in intrum extrumque partibus  
mensura constat, id tanquam Polyleti est regu-  
la. At ea corpora quæ iam calidiora sunt, plus  
quā in partibus, non tamen admodū multo, plu-  
ter etiam quæ frigidiora, humidiora, & sicciora  
modicè, nisi partem vnam nō rectè efformatū ha-  
beant, corpori tamen symmetrio nō nunq; præsta-  
re videtur. Quippe vbi id genus corpus mode-  
rato diuini evasent, & diuersas omnes externas

Neque tamen  
saluberrimum  
corpus.

Sanitas quan-  
do dicitur.  
Habitus bonus  
quando dicitur.

Corpora mi-  
scella sunt  
quatuor elemē-  
torū miscella.  
In vniuerso  
singulis vniq;  
particulari vni-  
cam, cui tota  
actio tribuitur.  
Constitutio o-  
ptima qua.

Vniq;  
redvndantia  
corpora, facili  
à causis morbi-  
ficis affici.  
Sanitas est  
latitudinē am-  
plam.

Temperatissi-  
mi corpora au-  
tem  
Polyleti regu-  
la.

Durior moder-  
ato corpore ad-  
versus exten-  
sum causas fir-  
mior reddit:  
mollior ad vna-  
rum suarū.

Refrigeratio  
vehementior.

Dolor causam  
esse inæqualem  
intemperan-  
tiam.

Epiala febris.

Lypix febris.

Rigor absq;  
febre, quibus acci-  
dat.

Vires fuisse  
temperantia-  
m.

Rigor sine  
accedere cura  
febri.

Epiala febris  
qua dicitur.

Febres fieri o-  
mnino præter na-  
turam, consistere  
ex duplici inæ-  
quali intemperie.  
Tumores si-  
cuti in epiali  
intemperie.

Similariū par-  
tis causas qua  
sunt.

causas, firmius ac tutius redditur. Vbi verò molli-  
us, aduersus internas. Atq; eadem ratione vbi  
densius fuerit, externis magis resistit. Vbi verò  
rarior, ab internis minus offenditur. Raritas si-  
quidem corporis, quibus plus recrementis per  
diffusionem educitur, salubrior existit: quibus  
verò minus, infalubrior. Nam ab omnibus ex-  
ternis causis facilis corpus rarum obleditur.  
Corpus autem quod ex quississima constat men-  
sura, nec rari, nec densum dici potest, sed in me-  
dio prorsus consistit. Cui quidem vtrunq; ex-  
cedentiū corporū præstat secundū aliquid. Quod  
enim densius est, magis ab exteriorib; causis est  
tutum: quod verò rarius, ab interioribus. Versus  
autem quod exactè resistit, planè non inue-  
niatur. Sed mediocriter id resistit, qđ inter omnes  
excessus est medium, quodq; omnium etiam cor-  
porum saluberrimū esse censimus. Quare id sin-  
gulis excedentibus mediū, scđdum aliquid est  
decretius: collectum verò omnium optimū, & maxi-  
mè eligendum videtur. Quod autem corpus i-  
psū, quod tum similibus, tum inuenturis  
particulis optimè constitutum est, vel paruum,  
vel magnū, vel mediocriter necessariū esse nō de-  
beat, hinc discas licet, quod magnū quidem, ob  
humoris, vel materię multitudinem: parū au-  
tem, ob siccitatem, aut ob materię penuriam effi-  
citur tale. Potest itaq; aliquod corpus & pulcher-  
rimū, & optimè temperatū effici, quantūcu-  
q; magnitudinē sortitū id fuerit. Augmen-  
tum enim sit, quovq; ossa consumentur: consi-  
mantur autem, in exigua magnitudine, ob mate-  
rię defectū, vel ob siccitatem: ita vt simpliciter  
neq; magnitudinē, humedine inditū sit, neq;  
paruitas siccitatis, nisi aut magnū molle, aut pa-  
uum etiam sit durum. Quamobrem optimā cō-  
stitutionē in his duobus merito collocabimus,  
moderata scilicet consimilitudinē particularū tem-  
peratę, necnō exactissimā instrumentalium mensurā.

# GALENI PERGAMENI

de optimo corporis habitu, li-  
ber vñus.



Habitus nomen de omni fixo & vi-  
solubili prouinciare consueuimus:  
nihil adhuc magis laudātes, vel im-  
probantes. At cum bonum habitū  
aut malum dixerimus, iam tūc qua-  
lem nam habitū dicamus, distinguimus. Quis-  
pe bonus simpliciter habitus, optimam corpo-  
ris constitutionem sequitur: cum verò qui non  
simpliciter bonus sit, in quacūq; corporis na-  
tura reperire licebit, aut simpliciter, aut ad ali-  
quid relatum. Ignor quum sanitas latitudinem  
habeat, intentionem quidem ipsius media boni  
habitus vocant: lapsum verò nondum no-  
mine proprio appellabunt, sed perinde ac genus  
ipsū, sanitate nuncupauerūt. Itaq; bonus ha-  
bitus optima quædam sanitas est. Ceterūm ha-  
bitus Athletarū, non est simpliciter bonus ha-  
bitus, ac proinde periculosus existit, si ad sum-  
mum pervenerit, quemadmodum dixit Hippo-  
crates. Nam bonus simpliciter habitus ad sum-  
mū bonitatis pervenit, omnium erit corpo-  
ris affectuum tutissimus. Porro tam bono sim-

pliciter, quā ipsorum Athletarū habitui, bo-  
na omnū particularum temperie cōmunis est:  
vt etiam suāctionū robur, atq; succorum bo-  
nitas. Inerere autem, quoddam haberi simpliciter  
bono, sanguinis cōmoderato, actōnis solida-  
rum partium molis, habeatur: in Athletico au-  
tem, horum ipsorum, potissimūq; carnosi ge-  
neris, excellens sit copia, ratione cuius periculū  
necessariū sequetur, si in summo consistere,  
ne aut exanguatur, & suffocetur calor innatus,  
ob plenitudinē illam exuberantem diffusionē  
prohibita, aut aliquod ex præcipuis vasis rum-  
patur, quæ in pulmone, & in iecore, & in thora-  
ce sunt ita. Si quidem sanguis ipse, tum ob na-  
turalis caliditatis copiam, tum ob actōnis perpe-  
tuitatem, necnon ob incrementum assiduum  
quali effluens, ipsorum vasorum tunicas, vt  
mustum doli, disrumpit. Hæc igitur omnia, nec  
non repentinè omnium functionū resolutio-  
nes (vt paucis docuit Hippocrates) necessariū  
immoderate repletiones sequuntur.

Repletiones im-  
moderate quæ  
sequantur.

# GALENI PERGAMENI

de animæ morum & corporis tempera-  
menti mutis consequentis,  
liber vñus.



Vemadmodū ex cibo & potu, nec  
non ex quotidianis exercitationi-  
bus, bonam corpori consuetudinē  
temperiem, sic etiam ex hac, quæ vi-  
tutem animæ comparandam, non  
nihil emolumentū attulerimus: id quod certè in  
actiōibus atq; vniuersis affectibus, qui secun-  
dum tres animæ species, ob temperamentorum  
diuersitatem maxime in puellis differunt, liqui-  
dè constat. Alij enim timidissimi sunt, alijs auda-  
ces, alijs inexplēbiles, alijs sobrii, alijs verēcundi,  
alijs deniq; admodū impudentes. Ex quo quidem  
in illis morū discernimus, ratione concludere ali-  
quos potest, non eandem omnibus animæ na-  
turam, siue substantiā, inesse. Nam si substantia  
animæ esset illis per omnia similis, easdem vtriq;  
actiōnes agerent: eisdemq; ob causas similes, af-  
fectibus affectib; Quare laudubie pueri tam-  
en inter se animorū essentia differunt, quæ vtrū  
proprijs actiōibus atq; affectibus discrepant.  
Quod quidem cum sic habeat, facultatibus quo-  
que differunt. Porro singulorum quæ sunt, ef-  
fectus quædam causa est, quæ ad aliquid referri  
intelligitur, cuius nomen per se est inditum. In  
quodam autem à seipsa ad genitū relatione, ge-  
nui facultas consistit. Quæcirca tot facultatibus  
substantiam, quorū etiam actionibus, esse prædi-  
tam dicimus. Si quidem quia alio (exempli gra-  
tia) vires habet purgandi, os vetriculi roboran-  
di, crenata vulnera glutinandi, plena vlcera soli-  
dandi, & humidas palpebras excidendi, tot facul-  
tates, quot etiam opera, proficimur ipsam for-  
mā. In vniuersum autem, animæ species sunt tres:  
rationalis scilicet, irascibilis, & appetitiva. Qua-  
rum quidem illa prima (quam etiam intellectu-  
cem vocamus) veritatis, scientiæ, disciplinarum,  
atque, vt summam dicam, honestorum om-  
niū desideratix est, secundum desiderii com-  
mune

Temperamē  
vnde con-  
solorem.

Temperamē  
propter  
virtutem ani-  
mæ.

Facilitas morū  
diuersitatis.

Animæ substan-  
tia non eadem  
omnibus est.

Effectus cau-  
sa.

Substantiam  
esse per se  
facile  
tamen quæ a-  
ctionibus præ-  
dictis  
Alia faculta-  
tes.

Animæ species  
tres.  
Rationalis ani-  
mæ quæ ap-  
petat.

Raritas corpo-  
ris quibus sa-  
lubrior existit  
brius.

Densius corpus  
magis est ab  
exterioribus cau-  
sis tutum.

Medium quoque  
sive corpus, ex  
cedentibus me-  
diocriter me-  
diocriter aliq-  
uod est deterius.

Magnū cor-  
pus, vnde sit ta-  
le.

Paruum corpus  
vnde sit tale.  
Magnitudinē  
nihil conferre  
ad optimam cō-  
stitutionem cor-  
poris.

Augmentū sit,  
quovq; ossa  
conferuntur.  
Optima corpo-  
ris cōstitutio  
in quibus con-  
sistat.

Habitus de qui  
bus docetur,  
Habitus simp-  
liciter bonus.  
Habitus non  
simpliciter bo-  
nus.

Sanitas latitu-  
dinem habet.  
Habitus bonus  
est sanitatis in-  
tensio.

Athletarū ha-  
bitus periculo-  
sus.

Habitus simpli-  
citer bonus, vel  
si ad summum  
pervenerit, om-  
niū affectuum  
tutissimus.

Habitus simpli-  
citer bonus, ac  
simpliciter bo-  
nus, non veni-  
tio, disorgan-  
tione.

*Irafrigiditas animæ quæ non rationis sed appetitus est.*

*Appetitus animæ quæ non appetitus est.*

*Appetitus animæ in corde.*

*Rationalis animæ in corde.*

*Rationalis animæ in corde.*

*Animæ irascibilis in corde.*

*Animæ irascibilis in corde.*

*Animæ irascibilis in corde.*

*Animæ irascibilis in corde.*

*Animæ irascibilis in corde.*

*Animæ irascibilis in corde.*

*Animæ irascibilis in corde.*

*Animæ irascibilis in corde.*

*Animæ irascibilis in corde.*

*Animæ irascibilis in corde.*

*Animæ irascibilis in corde.*

*Animæ irascibilis in corde.*

*Animæ irascibilis in corde.*

*Animæ irascibilis in corde.*

*Animæ irascibilis in corde.*

*Animæ irascibilis in corde.*

*Animæ irascibilis in corde.*

mune significatur. Et irascibilis, quæ enim animam appellat, libetatis, victoriæ, potentie, imperii, gloriæ, honoremque flagrat libidine. Tertia verò illa, quæ à Platone per excellentiam appetitiorum appellata est, veniens, effulcentior, potentiorumque voluptatibus perfusa delictat. Hæc honorem expetere nequaquam potest, si cum nec rationalis vetera, nec efficit, nec potum: cum quibus etiam imperium, gloriam, dignitatemque laudis iniuria aspernabimur. Pariter quæ irascibilis animæ parti, quæ à rationali & appetitive exoritur, non appetit. Iam verò appetitiorum animæ partem in secore, irascibilem in corde, rationalem in cerebro collocari, alibi à nobis est demonstratum. Ex quibus quidem rationalem esse immortalem, Plato sibi persuasisse videtur. Ego verò, sit immortalis, nec ne, quid illi obicem non habeo. Hoc autem mihi cum illo convenit, species animæ, quæ in corde & secore habitat, simul cum animalis interire. At vero cum vulnera corpora ex duobus consistunt principis, materia nempe, & temperie quatuor qualitatibus primarum, quæ illi inest, & species necessaria descendit esse animæ aut ipsa, dum corporis dicitur esse species à Aristotele, non de ea species, quæ instrumentarius hæret corporibus, sed potius de altero similitudine & naturalium membrorum principio dicitur, quod quidem ab ipsa primo actiones proveniunt: ceteræ substantia animæ, calidi, frigidi, humidus, & sicca, quodammodo temperavitur erit. Quod autem animæ substantiam proprie eius vires sequitur, ostenduntur, si eius etiam actiones ita se habere, declaraverimus. Quamobrem, si rationandi facultas animæ pars existat, interitum vni, cum & ipsa cerebri sit quedam temperies. Atque in hunc modum omnium animæ specierum vires ipsam temperaturæ sequentur: humidusque naturæ animæ substantia fuerit. Itaque ipsius animæ intellectus, non quælibet corporis species est capax. Cum tamen dogmatibus nullam firmam rationem adferre valeo, cum animæ substantia, qualis nunc sit, me proliis lateat, si in incorpoream ipsam annumeremus. In corporeis quippe, temperantia inter se longiusculam, numerumque permixta esse conspicio. In incorporeis verò substantiæ, quæ ipsa per se subsistere queat, neque corporis qualitas aut species sit, nullum discrimen invenio. Non tamen illud exacte, sanguinis immixtione, & cicutæ potu corpus frigidare: licet & vehementi febris plus quam par sit cullieri. Cur autem refrigeratur nimis, aut calore alicuius corpus, penitus ab anima relinquatur, longa iudagatione fatigatus non dum repen: quinadmodum neque cur ista bile in cerebro copiosiore collecta, desipimus: atra verò, melancholia vexatur: neque cur pituita, & omnino refrigerantia, letheique causæ esse solent unde & memoris, & intelligentie iactura facimus. Necnon, cur ista tantum iactura propinqua cõclit: omnem autem mortem & anxietatem discutiat eorum vinum, atque etiam ænopia radix. Porro vinum si largius sumatur, malo est: si verò quis ipsum si largius sumatur, quoque, digerit, sanguinemque augeret, & nutrit, nun hoc animæ mortem iuxta & audacio

rem efficiet: interveniente scilicet media temperatura, quam producit ex æquis humoribus. Corporis itaque temperata, non modo animæ actiones variant, sed etiam ipsam à corpore interdum seungere possunt: cum extreme frigida, calidæ medicamentis, statim perire alimuntur cernimus. Quo in genere continetur & ferarum venena: Quippe demorior ab aspice illico exanimari cernimus, penitus æt cicutam biberentem vitæ ipsius veneno etiam refrigerare. Sed nec minus ab humido & sicco, quàm à frigido & calido, vires animæ permittuntur: ut in affluendis medicamentis, atque adeo in quotidiano victu, percipimus: id quod etiam demonstratur à Platone in Timæo, ubi humiditatem demensit, audaciter intelligentie in anima causam esse arbitrat. Ceterum si humiditas animum, siccitas sagacitatem parit, extrema siccitas extremam sagacitatem producit: iudicium verò humiditas tantum perfectæ sagacitatem detrahit, quanta eius portio siccitati permixta fuerit. Quare animantia omnia, summa intelligentia destituta quæ sunt, quantum humoris, tantum & amentie formantur. Si igitur pars animæ capax rationis, vnde cum corporis temperamento mixtur, certe mortalem speciem animæ non solum gerere morem corporis, sed corporis etiam esse temperiem ostendit. Temperies itaque cordis irascibilis anima exultat: secoris autem, appetitoria. Etenim anima ipsa, substantia quedam existens, facultatibus multis prædita est. Cum autem substantia dicitur rum materia, tum species, tum ex utroque composita: animam eam esse substantiam quæ species dicitur, Aristoteles pronuntiavit, aliud quippiam à temperatura esse animam plane asseverare non potens. Spiritum autem esse animam, quemadmodum & naturam, Stoici contendunt: sed humidioris frigidioremque naturalem: animale contra, aridiorem & calidiorum. Quem quidem spiritum materiam propriam esse animæ constat. Materie autem species, temperamentum fuerit in eodem natura aëre igneque substantiæ mixture consistens. Neque enim aer solum, aut ignem, animam esse, dicere possumus: cum nec summe frigidum animalis corpus, nec summe calidum effici vixquam appareat, neque aliorum aliorumque excellentium occurrant deprehendantur. Porro aer, suapte natura frigidum elementum est, sed per ignis elementi mixtionem, mediocre, ac temperatum redditur. Quæ igitur animæ corporis esse speciem, hoc est, formam existimavit, non efficit, sed temperantia commodatione ipsam perspicacitatem fieri, dicere contra Platonicos poterunt, neque ob id tantum asserere, siccitatem adversari mentis acuminis: quum nimirum splendor siccus, secundum Heracitum, sit animus sapientissimus: quæ sententia videtur ponitur. Quippe si sidera pellucida iuxta & sicca, summa intelligentia esse prædita cernimus: quid si quæ illis inesse videtur, deorum excellentiam non sentire, planè sagaciorare videtur. Cum autem alibi sentiam spiritum probati ad siccitatem dixerimus, cur haud ita pauci ad extremam visum senectam viuentes desipiant, si quis interroget, respōdebimus,

*Temperantia animæ, quæ non appetitus est.*

*Aquid venenæ refrigerare.*

*Demensit in dicitur humiditas.*

*Intelligentiam parit audacia.*

*Animæ tantum esse animam.*

*Animæ mortalis esse speciem.*

*Animæ mortalis esse speciem.*

*Animæ mortalis esse speciem.*

*Animæ mortalis esse speciem.*

*Animæ mortalis esse speciem.*

*Animæ mortalis esse speciem.*

*Animæ mortalis esse speciem.*

*Animæ mortalis esse speciem.*

*Animæ mortalis esse speciem.*

*Animæ mortalis esse speciem.*

*Animæ mortalis esse speciem.*

*Animæ mortalis esse speciem.*

*Animæ mortalis esse speciem.*

*Animæ mortalis esse speciem.*

*Animæ mortalis esse speciem.*

Frigiditatem  
ad versari a-  
nimus anima  
affertur.  
Anima tota  
corpore susci-  
pitur Galeum.

Malum esse  
nihil vltim.  
Plato affert.

Anima vires  
siqua temper-  
mentis, Ari-  
stoteles ait.  
Mores cognos-  
ci ex figura par-  
tis Aristote-  
lis ait.  
Septentriona-  
lem more esse  
arctisimos.  
Asia, Aethio-  
pam, more,  
magis cum  
medicinis.

Mores siqui ple-  
rumque natura  
regionis.  
Sordiditas est  
si quibus cal-  
idus aetheris  
monstrat pulsat.

Intraundum  
lucem abstru-  
ere vitium.  
Stupidos pro-  
ditus efficit.

Vino citra duo  
decimum an-  
num potum Pla-  
to interdicit.  
Vino licet ac-  
tuitate senect.

Vinum senibus  
cur vitio.  
Vinum ad ver-  
sam creaturam.  
Vino quibus in-  
terdicit Plato.

id non ob siccitatem, sed ob frigiditatem acci-  
dere: quae omnibus animae actionibus officit.  
Ex hocigitur ingens mihi iam oboritur suspici-  
o, vt totam animae substantiam esse corpoream  
credam, quid interdum non modò pereant in-  
genitae animae facultates, sed etiam aliae contra-  
ritas illis introducantur: vt dum cernere quae non  
cernuntur, audire quae non audiuntur, sese quis  
arbitratur. Quo pacto enim ea quae ipsi cum  
corpore interdici necessitudine, in natura plane  
cōtrariam transire possent, nisi aut qualitas ali-  
qua, aut forma, aut affectus, aut facultas corpo-  
ris esset? Porro ex vitioso corporis habitu lan-  
guere animam, ac neminē spontē esse malum, sed  
ob prauam habitudinē corporis, & rūdem edu-  
cationem: ac proinde nec debere turpia vitupe-  
rari, professus quidem est Plato in Timaeo. Ari-  
stoteles autē, secundo de partib. animalū, ipsius  
animae vires, materna sanguinis sequi temperiē  
existimat. Qui rursus, primo de historia anima-  
lium innuit, instrumentarum partū figuratio-  
nem, animae moribus accommodari: ac proinde  
ex illa recōditos hos cognosci. Hippocrates etiā  
in libro de aquis, aëre, & regionibus, ait, eos qui  
plagam Septentrionalem incolunt, aut etiā mō-  
tana loca, agrestissimis esse moribus praeditos:  
Asiam autem regionibus ceteris longē clemen-  
tiores existere, in eā omnia multo meliora &  
grandiora nasci: necnon mores hominū rūm mi-  
niores, tum ad agendū prōptiores esse, ob opti-  
mam Asiaticā celi temperiem haberi tamen illic  
magis imbelles homines, quā in Europa. In  
summa verō, species & mores hominū air ple-  
rumque naturam regionis sequi: calido autē, frigi-  
do, humido, & sicco, vnam regionē differre ab  
alia. Alibi enī tradit Hippocrates, quibus cu-  
biti vena (veies enim arterias etiā vocabant  
venas) vehementer ederet pulsationem, eos ho-  
mines furientes existere: & meritō quidem. Nam  
prae nimia in corde abvndantia caloris, ita vehe-  
menter mouentur arteriae: furientes autem atq;  
iracundos, caloris abvndantia efficit. Stupidos  
verō, graues, & pigros, temperaturae frigiditatis.  
Hippocrates itaq; voluit, non solum irascibilibus  
appetitionis partem animae, sed etiam cogitatri-  
cis vires & facultates, corporis temperaturae ad-  
haerere, atq; illam omnino sequi. Nec secus Pla-  
to, ex terrae diuersis habitationibus, ex vario spi-  
ritu, ex insolationibus, ac deniq; ex varietate nu-  
trimenti, non solum ipsorū corporū, sed animo-  
rum etiam proficiter nasci diuersitates: tem-  
peramento scilicet ipso (quod subintelligere o-  
portet) interueniente. Quare pueris quidem ci-  
tra duodecim annū prorsus vino interdicit, se-  
cundo de legibus: idq; nec in furorem agantur.  
Profectus autē, vt ipso vtantur, permittit: quippe  
quod aduersus accretitae senectutis remediū  
sit, animiq; maiores discutiatur, ac deniq; durio-  
res mores emolliatur. Etenim iuuenilis aetas cali-  
da est, ac multo referta sanguine. Contrā senilis,  
& frigida, & sanguinis inops. Propterea senibus  
vini potus vitiosus est: autem qui crescit, aduer-  
satur q̄maxime. Eum verō neq; in exercitū per-  
mitterbat Plato vt vinum gustarent milites, neq;  
in ciuitate ipsa serui: sicut neq; principes, neque

administrantes rem publicam, neq; iudices, neq;  
hi breuiter, qui de re aliqua essent consultaturi:  
quod nimirum veluti quidam tyrannus animae  
facultatibus imperet. Sed neq; interdiū, nisi aut  
exercent corpora, aut tollendi morbi gratia,  
permittit vnq; vini ponere: neq; item noctū,  
dum libera nauanda esset opera. Pro virili autē  
esse emittendū singulis, vt alimento, studiis, &  
disciplinis simul & vitium fugerent, & virtutem  
ipsam capeferent, idem professus est. Exterū  
qui cunctos homines virtuti comparandae ido-  
neos, & qui nullum iustitiae amantem esse arbi-  
trantur (quod est nullā naturalem finem statue-  
re) vtriusq; hominū naturam ex dimidio tantū co-  
gnouerunt. Neque enim omnes iustitiae hostes,  
neq; omnes amatorum nascuntur, ob corporis tē-  
peraturam vtriusq; tales geniti. \* Ac sane qui talia  
astruit, subinde perunt, quo videlicet iure quis-  
piam debeat laudari, vituperari, odio haberi,  
aut amari, cum bonus aut improbus nō suo pte  
ingenio, sed ita temperatura sit factus, quam ab  
aliis causis quisq; accepisse deprehenditur. Quia  
(scilicet respondebimus nos) omnibus hoc no-  
bis inest, vt amplectamur bona, ambiamus, &  
amemus: malum abominemur, atq; procul arce-  
mus, ignuriosus adhuc, genitūmne sit tale, an mi-  
nus. Scorpiones enim, plalangia, viperasq; neca-  
mus, cum tamen ita natura, non sua sponte, talia  
creata sint. Primū etiam, maximūq; Deum nō  
genitū Plato assensens, bonū tamen illum esse  
proficiat, nōq; ipsum talem ab aeternitate, nō  
ex seipso bonū effectūm, natura duce colimus,  
& amamus. Prorsus enim nullo vnquam tempo-  
re genitus est, omnibus seculis increatus, sempit-  
ernusq; existens. Merito iratū malos odimus,  
causam cur mali existant, necdum prae meditati.  
Bonos vicissim, siue natura, siue institutione &  
doctrina, siue lionefio vitae exercitio probitate  
sint affecti, recipimus, atque amore prosequimur.  
Quocirca Stoicos admiro, qui homines  
vniuersos ad virtutē adificandam habiles esse  
opinantur, sed ab aliis quibus cum viuunt, ita re-  
cto itinere detorqueri. Haud siquidē dicere po-  
terunt, qui omnīū hominū primū geniti sunt, ita  
quibus nam deprauati fuerint, ante se nullum al-  
ium habentes. Videmus etiam pueros complu-  
res, isdem parentibus ortos, ab eisdem prae-  
ceptoribus educatos, isdemq; alimentis vfos, na-  
tura tamen ipsolongissime inter se differre. Quos  
quidem quis per deos flagitia edocuit? Reperies  
enim paucos admodū pueros natura ad virtutē  
propensos, sed ita parentib. & paedagogis ad eam  
minis increpationibusq; conuerti. Porro illi ex-  
trema dementia tenentur, qui nos voluptate  
ad virtutē detorqueri aunt. Quos quidem erudi-  
tissimos: Posidonius refutans, ait in nobis ipsis  
intestina quaedam vitiorum semina, & tanquam  
igniculos delatere: nec tam nobis a vitiosis  
cauere, quā vitiorum incrementū resingere  
& coercere esse opus. Non enim (vt fert Stoico-  
rum opinio) rotā extrinsecus ingruit in nostros  
animos vitium, sed plurimū in seipsis vitiosis  
hominē causa habet. Quod extrinsecus aduenit,  
longē minus est. Proinde sanē canfuetudine pra-  
ua accedente, secundum partem animae ratione  
carentem,

Vini imperat  
animae facul-  
tates, vt in  
quodam tyran-  
nat.

Inclinatio ho-  
minum ad bon-  
um, & a vitio  
recipienda.

Deus non ge-  
nitus, ac aeternus.  
Et non in seculo  
natus existit.

Stoicos siquidē  
ait Galeum.

Homines ge-  
niti non sunt  
ab aeterno, vt  
dicit moueri  
Galeum.

Puerorum pau-  
cos esse natura  
ad virtutē pro-  
prios.

Posidonius  
genitūmne sit  
talē.

Causa quā  
tam potius ad  
bonitatem  
animae, vel prae-  
uocatur.

catentem, pravi reddimur: falsis autem opinionibus, secundum intellectum partem imbuimur. Sic uti dum a bonis, syncerisque variis instrumur, opinioniones quidem veræ sunt, mores autem humani. At in cogitante animæ parte, intellectus, stultitiam, ratione maioris minorisque evanescit, corporis temperaturæ sequuntur. Ipse autem temperaturæ, primam in vitro generationem & cibum probos succos parantem, habet autorem: atque hæc mutuo sese & a dagent, & fouent. Calida namque, exempli gratia, temperies, iracundia facit inde rursus iracundia ingenitæ calorem accendit, & ignem reddit. Contra qui medio crui temperaturæ consistunt, medio criteque commoti animo, ad probos succos gignendi proficiunt.

**GALENI PERGAMENI**  
de naturalibus facultatibus, liber primus.



Vando quidem sentite & moueri secundum electionem, propria animalium sunt: augeri verò, & nutrir, plantia etiam cõmunia: erunt vni prius quidam, animæ, posteriora verò, nature ipsius opera: quare animalia ipsa, simul & ab anima & a natura gubernari dicimus, stirpes a sola natura. Quamquam his etiam animæ vegetatricem aliquam tribuere haud immerito poterit, distinguens illam a sensitiue, quæ animæ albus in est. Porro cum corpus aliquod ab his sub quibus ante fuit in nullo est immutatum, quæ efcere id dicimus. Quod si in aliquo ab his recessit, eamena id moueri. Vbi igitur corpus ipsi aliq ab vna in alteri qualitate mutatur, ut ab albo in nigro, aut a frigido in calidum, motu ipsam alterationem vocamus: estque vnus motus genus. Alterum genus in corporibus iam est, quæ sicut mutant: cui generi latius nomen est. Atque hi quidem duo motus simplices & primi sunt: augmentum verò & diminutio, ex his compositi. Illa, cum ex minori maius fit: licet, cum ex maiori minus: propria scilicet utrobique seruata forma. Aliq autem duo ab his motus sunt, generatio & corruptio: illa quidem ad substantiam producho, hæc illi contraria. Omnisque his motibus cõmunis est prioris status immutatio: sicuti & diuersi quælibet, prioris status conseruatio. His præmissa, inquirendum iam nobis est, quor & quæ nature sint facultates: tum, quod opus edere singule earum sint atque. Porro opus appello, quod iam factum atque completum per actionem est: veluti sanguinem, carnem, neruum. Actionem autem, ipsum actum motum. Causam verò, a qua hæc procedit, facultatem. Etiam vbi cibum sit sanguis, passivus quidem cibus, actiue verò ipse vena fit motus: quæ actio nem lecebit ubi appellare nature opus, non tam opus ipsum, actionem. At ubi quidem tam vena, quam reliqua particulari singule, ob certam quandam temperiem, quæ ex quatuor sunt

causas ad ipsas quatuor qualitates reducere. Nam tametsi in animalibus & stirpibus calidum & frigidum magis agere, sicutum verò & humidum pariter videtur, non ob id tam sic res habet in omnibus. Ceterum omnis potentia siue facultas, in relatione ad aliquod intelligitur. Primum siquidem, actiue ipsius potentia est causa, dein etiam opera, ex accidenti quodam: quare si causa ad ali quid est, potentia quoque in relatione dicitur ad ali quid, nimirum causa cum sit. Cuius quidem agentis causæ substantiam quandiu ignoramus, facultatem eam, siue potentiam, appellamus: in vena quidem potentiam quandam sanguificam, in ventriculo concoctricem, in corde pulsatoriam dicentes. Incipiendum itaque nobis ab ipsi operibus est, si ceteratione & via, quor & quæ facultates sint, inventum sumus. Singula namque opera, ab aliqua procedunt actione. Hanc verò omnino aliqua precedit causa. Ergo nature opera dum adhuc in vitro gestatur, ac fingitur animal, omnes corporis sunt particule: edito verò in lucem, cõmune in omnibus nature opus est, earum magnitudinem perfectam perducere.

Postea verò, etiam ut omnes perdurent, molli tione. Actiones quæ tribus his operibus respondent, necessariæ res sunt, vna scilicet cuius generatio, augmentum, & nutritio. Verum generatio, simplex actio nature non est, sed ex alteratione & formatione cõposita. Si quidem alterari oportet, est fingi materiam ipsam, ut ex ea gignatur animal. Augmentum verò, soliditatem aciem formatum animalia particulari augmentum, ampliationem in longum, latum, & profundum est. At nutritio, iisdem partibus appositio quædam est, sed sine ampliatione. Ergo primo omni illi agamus de ipsa generatione. Profecto in vitro, ante etiam in terram semine, statim quibudam temporibus, multæ constant partes eius quæ gignitur substantiæ, humiditate, siccitate, calore, & frigore, ceterisque omnibus, quæ hæc sequuntur, qualitatibus (hoc est tactilibus, atque illis quæ gustu, odoratu & visu diiudicantur) inter se differentes. Quo circa si primæ & elementares alterationis facultates requiramus, hæc sunt, humiditas, siccitas, caliditas, & frigiditas. Si verò eas quæ ex his inter se mixtis nascuntur, tot sanè omni in animali erunt, quor fuerint in eo sensibilia elementa, hoc est, similes partes: quas nimirum in prima animalis generatione, natura creat, vna generatrice, alteratriceque potentia. Propriam autem vniuersalem visceris corpus, si ab eo venas, nervos, & arterias excutamus, similes, simplices, atque cõpositionis est experti. Ceterum si quæ organa ex geminis constant tunica, sed simplicibus & dissimilibus, horum ipse tunice elementa sunt. Atque in vtraque tunica sua quædam alteratrix vis est, quæ ex menstruo sanguine eam particulam generauit. Itaque alteratrices facultates in omni animali genere tot membratim erunt, quor habet in se elementares particulas. Sed & actiones propriæ cuius membratim particulæ necesse est esse, quemadmodum & usus. At alteratrices nature facultates, quæ particulares sunt, omnes nunciarum & ventriculi, & intestinorum, & vteri substantiæ, qualis est, effecerunt: cõpagem verò, formamque, formatrix

Facultas omnis in relatione est habet ad aliquid.

Vena inest facultas sanguifica. Cordis inest facultas pulsatoria.

Partes corporis inuicem sunt nature opera.

Alteratur natura tri, generatio, augmentum, nutritio. Generatio composita est alterationem & formationem. Augmentum quid sit. Nutritio quid.

Generatio composita est.

Facultates elementares primæ, quæ, facultates ex primis cõstituta, quæ, Elementa sensibilia sunt similes partes.

Alterationem facultates tot inest singulis animalibus quor elementares particulas.

Formatrix seu cõpag.

Temperies quæ sequuntur, Temperies calida iracundia facit.

Animalis propria. Placuit communia cum animalibus. Anima operis. Nature opera. Animalia gubernari ab anima & a natura. Scitum diffusi, sicuti a sola natura. Scitumque inest anima vegetatrice. Alteratur.

Latius. An. Tio. Diuisione.

Opus quid dicatur. An. Tio quid. Causa quid.

Partes omnes operis temperationis nature, quæ producit sunt.



quædam virtus effinxit, quæ ars optima exiit, tam cōsulō & artificiose compingit singula, ut nō possint aliter se habere melius. Sed neq; ipsa facultas auctrix, deest iis qui gestantur in vtero, sicuti nec vis nutritrix. Sunt tamē eo tempore alte matricis & formatricis potentie, veluti ministræ quædam, nec sustinent ipsæ primas partes. Vbi verō perfectā magnitudinē animal est adeptū, toto postquā editum est tempore, vsp ad ætatis vigorem, auctrix virtus dominatur. Auxiliari-  
ces & veluti ministræ eius sunt, alteratrix & nutri-  
trix. Auctrix autem facultatis est proprium, in omnem partem proferre solidas corporis partes, quas elementares & similes, simpliciter appellauimus: id quod solius naturæ proprium est munus. Nam quæ a nobis extensa sunt, sicut vna dimensio est a panuntur, ita minuuntur reliquis. Quare iis quæ augentur, necessaria mutatio est: de qua iam nonnihil dicamus. Quum id quod in nutrimenti affluit specie, corporis eius quod nutritur, omni parti affigitur, actio quidē ipsa nutritio est: causa verō liuius ipsa facultas. Et alteratio quidē hic quoq; ipsius actiōnis genus est, nō tamen qualis erat in generatione. Ibi tanq; quod ois non erat, postea factum est ois in nutrimento verō, ei quod iam factū est, id quod affluit efficitur simile. Ita nō immeritō alteratio nomen illam nominamus generationē, hāc assimilationē. Ergo generatio, auctio, & nutritio, prima naturæ operum, ac veluti capita sunt: quare etiam effectores horum facultates primæ principiq; tres fuerunt. Desiderant tamen tum ipsarum inter se, tum aliorū ministeriū. Ac quæ quidem generatrix, auctrixq; desiderent, dictū iam est. Quæ autē nutritrix facultas requirit, nonne dicitur. Ergo cūm actio huius facultatis assimilatio sit, nec fieri possit, ut assimilantur muteturq; inter se vlla, nisi societatem aliquam, cognationēq; in qualitatibus habent, idcirco primum quidem nec quodq; animal quocunq; cibo nutriti poterit: deinde nec quibus nutriti poterit, in vtiq; propterea. Atq; huius necessitatis causa plaribus alterationis nutrimenti instrumentis vniq; animalis est opus. Nam ut ex pane, aut lactuca, aut beta fiat sanguis, permulta sint alteratio requiruntur. Quæ quidem vna est causa, cur multa sint ad alterationem nutrimenti instrumenta organa. Altera causa est excrementorū natura: quibus excipiēdū & euacuandū, secundū quoddam in corpore particularū genus est destinari.

Est & aliud tertium genus instrumentorū, pro bonis succis vndiq; per totū corpus deferendis, tributū. Alia tanq; organa idoneū cuiq; partiu huius nutrimenti alterando præparant, alia separant excrementa, alia transmittūt, alia suscipiūt, alia expellunt, alia salubrium succorum in omnem partem ferendū sunt vix. Quæ omnia vniui nutritions gratia, sunt a natura condita. Porro nutritio ipsa, ad id qd nutritur, eius quod nutrit assimilatio est: quum necessariū præcedit semper agglutinauo: sicuti & hanc appositio. Postquā enim succus is qui omne animalis particulam nutriturus est, a vasis excidit, in totam eam primum dispergitur: mox adiungitur: dein agglutinetur, ac demū assimilatur. Disseret autē

appositionem ab agglutinatione, sicuti & agglutinationem ipsam ab assimilatione, hinc cōstat, quod in hydropē quidem humoris fiat appositio, nō tamen agglutinao: in leuce autem, ad hærentia quidem cernitur, at assimilatio non item. Porro nutrimentum dicitur proprie quod assimilatur & nutrit: nam qd agglutinetur, vel quod apponitur, id nō proprie nutrimentū est, sed æquivoce, ut veluti nutrimentū: multoq; minus, quod in ventriculo cōnectur. quanquā etiam nutrimentū vocamus, quod si probe concoquatur, aliquando fit nutrimentū. Ceterū nullam esse assimilationem veram, sed apparentem tantū, dicunt hi qui nec artificiosam naturam existimant, nec animalis habere providentiam, nec denique vllas proprias obnere facultates, quibus sicut alia trahit, alia teneat, alia demutret, alia expellat. Asclepiades porro nō solum negauit inesse renibus vim secretandi lotiū a sanguine, venientū vnam ipsam minimē quidem per meatus vretæ demitti in vesicā, sed per alias quasdam obscuras vias, ac nullo sensu perceptas, professus est, contrā quā licet plane cognoscere, vel ex ipsi viuorū anatome. Sed nec admittit, asserit plus bilis nōdem medicamentis vacuari, hyeme prurire: neq; rursus plus bilis, in iuuenē: in senē, plus prurire. Quippe medicamenta ipsa minimē familiares sibi succos at trahere, imō verō nihil profusū ab vllō trahi, im pudenter pronunciat. Opinio cuius q̄ sit absurditatis plena, indicat lapis magnes: ex quo quidem vidimus ferreos stylos quinq; continenter appensos, quorum primus partem lapidis tergit, per illum scilicet diffusū in reliquos, ipsius lapidis vi. Hippocrates verō, qui naturæ mysteria nouit, hanc semper tum admiratur, tum prædicat. Huc facultates ad desse affirmat: vñ, qua sibi cōuenientē attrahat: alteram, qua aliēū a se repellat. Ipsam præterea tum nutrire animalia, tum augere. Iam morbos quosque finire, indicareq; vñdem facultatibus putat. Porro non modō medicamenta purgantia proprias sibi qualitates attrahunt, sed etiam quæ surculos, & telorū cuspidēs, quæ præter nōnunquā in carne sunt infixæ, euellunt. Iam verō quæcunq; vel serpentū venenā, vel quæ telis sunt illata educunt, hæc quoq; eandem quam magnes ipsæ facultatem ostendunt. Ceterū eorum quæ venena extrahunt, alia venenum viperæ, alia pastinacæ marinis alia alterius cuiuspiam eliciunt: liquidq; videre licet sepe ipsæ medicamentis venena iacenta. Et itaq; rebus quibuscq; facultas quædam, quæ nimirum congruentem sibi qualitatem attrahit: id quod certē vel in tritico videre licet manifestūsum. Nam si fistilla vasa aque plena, in tritici acervo recondas, id humorem in sepe fistilla evoans, tum molem sibi, tum pondus adiicit: cūm videbret triticū ipsū trahendi ad se vicini humoris maiorē vim habere, quim vel vehemens calor Solis. Atq; ad hunc modū renibus inest propria quædam vis lotiū trahendi. Si quidē venæ causæ pars altera, sursum ad cor ascēdit: reliqua super spissū incedit, per totam eam ad crura vsp potest: cui renēs a lateribus vtrinq; per venas quasdam emulgentēs adherere. Per

Nutritimentum  
proprie dictū.

Nutritimentum  
æquiuocū dictū.

Asclepiades  
error.

Magen.

Hippocrate  
color & admi-  
ratur naturæ.

Purgantia me-  
dicamenta mag-  
is vim propriam  
sibi qualitates  
trahendo.

Medicamenta  
educuntia ve-  
nena.

Attrahunt  
vni congruentem  
sibi qualitatem  
sine rebus.

Triticum habet  
vim trahendi  
sibi humoris  
vicini.  
Renibus vtrinq;  
per venas trahendo.

quas

Auctrix facultatis  
quædam virtus  
est, quæ fa-  
cultatem illi.  
Auctrix facultatis  
propria est.  
Auctrix facultatis  
quædam virtus  
est, quæ fa-  
cultatem illi.  
Auctrix facultatis  
propria est.

Assimilatio  
nutrimenti est  
per se necessaria  
nam  
Nutritio quæ  
dicitur.

Assimilatio.

Nutritrix facultas  
est opus esse  
assimilationis.  
Assimilatio  
quæ requiritur  
est.

Organa natura  
est curatio  
plurima.

Instrumentum  
nutrimenti  
instrumentum  
generis vni.

Nutritio quid  
est  
Assimilatio  
semper assimila-  
tionem præcedit.

Appositio præcedit  
agglutinationem.



quas quidem cum etiam feratur sanguis, quod serolum eius, & tenue est, id per renes, seu per colatona quædam transibit (non quidem confectione ad id quod vacuatur, qualiter Erasistratus existimauit, sed ob renum facultatem tractatæ, alioquin nulli ex reterna vrina perirent) quod vero sanguinem & crassum, id coarctetur, ac per vniuersum corpus regentur. Non est autem diversa ratio, qua vrinae per renes in vesicam feruntur, & qua sanguis in omnes animalis partes: neque etiam qua flaua secerntur bilis.

### GAL. ENI PERGAMENI de naturalibus facultatibus, liber secundus.

Quod necesse quidem sit fieri vim quandam in rebus esse, quæ huiusmodi qualitatē, qualis in vrina percipitur, ad se trahere sit habilis, superiori monitruimus libro. Quæ nimirum facultate cor etiam, viscū ex his quæ post iecur habentur, in dexterum proculdubio sinū, suum alimentū trahit, deinde per arterialem venam ad pulmonem transmittit. Reliquorū quoque nullum, nec Erasistratus quidem ipsi, nutriti ex corde placet, propter eas, quæ super valis crescunt, membranas. Iam verò, qui pro tenuitate, aut crassitie humorum, latitudine autem, aut angustia meatuū, fieri aut ipsam humorū segregationem, hi nobis rationem reddant oportet, cur vrina, quam bile esse tenuiorē constat, in bilis vasa non infuset. At certè nullam aliam reddere poterit, præter facultatem illam à natura vni cuique instrumentū statim ab initio tributam, sine qua durare animalis non poterit. Siquid nec viuent, nec durare vult animalium, vel breuissimo tempore fas erit, si tot in se particulas, rames dissidentes cum habeat, nulla facultate vratur, nec quæ conueniens trahat, nec quæ alienū secernt, nec quæ id quod nutrit, alterabit. Quibus quidem facultatibus vitatur natura illa, quæ particulas effingit, eāque sensum adauget, atque omnino est per eas rotas extensa: vt quæ sanæ rotas per rotas, singat, nutriat, atque augeat, vereri semper ipsius materię forma mutata: quo vel maximè nomine differt natura ab statuata, quæ foris quidē materiam ipsam adornat, intus autem illaboratam atque neglectam relinquit. Pluidas siquidē ex cæra efficere ebur, aurumve nō potuit, sed neque ex auro ceram: quippe horum quodvis manens id quod à principio erat, foris tantū speciem artis adeptū, perfectā sit statuata. Ar arura, nullus materię veterem formā seruat: alioqui sanguis omnino essent cunctæ animalis particule, is soli ceri qui à matre cōcipiente confusus ad maris semen, instat cæra cuiuspiam, atque vnus & vniformis materię, artificij subiectæ. Nulla autem animalis particula ex ea ipsa materia fit ita rubra, humidave, sicuti est ipse sanguis. Nam os, cartilago, arteria, vena, neruus, adipis, glandula, membrana, medulla, exanguia quidē sunt omnia, licet cōcreta ex sanguine, videlicet materia principii. Semen verò cum sit effictū animalis principii, trahendi de sanguinis possidet facultatē, nō secus quæ magnes ferrū. Quare primò quidem competentem sibi sanguinem attrahet, quem &

facile vincere, & celeriter assimilare, & sibi nutrimentum facere possit. Mox arbitror secūdō attrahet, & tertio, quod scilicet sibi molem magnitudinēque nullā ex nutrimento adducat. Vndeā alteratrix inventa vis est. Tertia verò formatrix apparebit: cuius ope semini primū veluti cōcreta quiddam tenue, in embranā illam sibi induit, quam Hippocrates sexta de cum fertu, Muxicæ cuidam mulieri ouorū tantæ similem excuisse ait. Post hoc verò reliqua etiam quæcumque ab eo, in libello de infans natura, sunt scripta, singit. Cæterum cum augen illa post formationem cōueniat, id profectō assequitur, tum in omnē extenta partem, tum verò nutrita. Cor igitur ab initio ita mihi parum efficit, vt nilul à mliq semine, aut limasui à faba distet, intellige. Augentur porro ea tantū, quæ viuunt, quorum nimirum formæ perfectæ iam sunt. At eius quod sit, processū ille qui est ad formā, non vnq̄ auctō, sed generatio nominatur. Siquid augentur id quod est: gignitur quod nō est. In vniuersum autē descendit Erasistratus est opinio, dictis attractionē fieri successione continuā ad id quod vacuatur. Quæ ratio, tantū succedere cōnnui necessariū facit, quantum efficit. Hoc verò us qui cōmodo sunt corporis habitu, sans ad nutrimentum est: vt pote quibus ea quæ apponuntur, iis quæ effluunt, paria esse oportet. Ar in us qui ad vltimum sunt graciles, ac liberaliter refici possunt, nisi multo plus sit quod apponitur, quā id quod vacuatur, pristinus restitui habitus nunquam poterit. Liquet igitur, quid tanto plus sunt hi attractibiles, quanto etiam plures egent.

Trahitur itaq̄ nutrimentū, nō successione continuā, ad id quod vacuatur, sed p̄inde ac à magnetis lapide ferrum, qui scilicet talis qualitatē trahendæ vim habet. At verò distributionis principium expressio ventriculi præstat: reliquū autē eius progressum omnem, tum venæ ipse cōtractæ ac propellens, tum singula quæ nutritur ad se trahenna. Quare improbē Erasistratus habet luenatū, dum horum omnium causam successione illam ad id quod vacuatur, itatur: sicuti etiā vbi ex sectionis scirrho gigni semper hydropem ait: id quod certè hominis planè est secundū. Siquid ex diuturnis hæmorrhoidibus, vel suppreffis, vel immodica profusione, hominem ad extremā frigiditatē decubentibus, nō semel aut bis, sed sæpe iam aquam intercutem collectā videt. Sicuti mulieribus quoque tum menstruæ partitionis omni modo cessano, tum immodica vacuatio, sæpe hydropem accersuerunt. Nonnulli verò earum, & qui muliebris vocatur fluxus, in hunc terminatus est morbus: vt interim qui ab illis incipiunt, aliove quopiam opportunum ad id membrorum, hydropas impræsentiarum præteream. Est tamen ea primā generādis hydropis causa, quæ ex singulorum defectu procedit: similis genere, atque ex ciborū cōcoctionis defectu diarrhæa. Atqui in tali hydropis genere, nec aliud viscus villū, nec iecur vno est affectū. Sed illud enī, quod innuere videretur, præ se fert extremā absurditatē: nēpe fieri posse vt bilis cibis statim mista, formæ eius nobis ad veniat, non gignatur in corpore. Mel siquidē, non eo quæ ple-

Formatrix fa  
militas.

Autis qui  
fat.  
Cordi magni  
tudo in primo  
era.  
Augerit autem  
quæ viuunt.

Generatio quæ  
dicitur.

Nutrimentum  
trahi, non suc  
cessione ad id  
quod vacua  
tur, sed p̄inde  
vt à magnetis  
trahitur ferrū.  
Distributio ali  
menti quæ mo  
do fit.

Hydrops qui  
bus ex cōcoctio  
nis defectu  
fit.

Hydrops gene  
randa primā  
causa, ex sin  
gularum de  
fectu.  
Diarrhæa et cū  
hæc cōcoctio  
nis defectu.

Lati expone  
do ratio.

Pulmonem fo  
li, inter omnia  
viscera, nutriti  
en uide.

Facultas na  
turalis esse ne  
cessaria ad vi  
tam.

Naturā esse per  
tinet corporis  
partis exten  
sam.

Natura ab sta  
tuata quæ dis  
fertur.  
Pluidas.

Sanguis est ma  
teriale principii  
quæ quæ cō  
coctio autem  
corporis partem.  
Semen est effi  
ctum animalis  
principii.

rimam in se bilem continet, sed quod intra corpus est mutatur, in hanc alteratur & vertitur. Quippe anarum gustantibus esset, si bilem in se extra corpus contineret: omnibusq; similiter hominibus aequalis ex eo gigneretur bilis copia. Verum id secus habet. Siquidem quædam sunt in flore, potissimum si calidiore natura sint, ac vitæ laboriosam transigant, in his totum mel vertitur in flauam bilem. Senibus vero admodum est accommodum, ut pote quibus non in bilem, sed in sanguinem cõvertatur. Gignitur autem in ieciore, atq; etiã in venis, ipsa bilis vnã cum sanguine. Est enim exacte iam demonstratum veteribus, dum in venis alimentũ ab innato calore alteratur, sanguinẽ quidem ex mediocri calore fieri: reliquos verò saccos, ex eodẽ immo dico. Atq; huic sententiæ, quæ euidenter sensibus apparent, omnia consentiunt: quando & ex cibis, hi qui natura sunt calidiores, magis sunt biliosi: qui frigidiores, magis pituitosi. Simili modo et ætatis, quæ calidiore natura sunt, huius biliosiores esse cõstat: quæ frigidiores, pituitæ magis obnoxias. Iam vtrationũ, & regionũ, & anni temporum, multoq; priores his, ipsarũ quoq; naturarum, quæ frigidiores sunt, ex magis cernuntur pituitosæ: quæ calidiores, magis biliosæ. Præterea ex morbis quoq; qui frigidi sunt, hi à pituita oriuntur: qui calidi, hi à bile ortum habent. Cum enim ob certam illarum quatuor qualitatũ temperiem, particula quæq; certam habet functionem, necesse omnino est, propter eius temperiei vitium, aut profusum corrupti functionem, aut impediri: ac proinde vel totũ, vel in parte ægrotare animal. Ac primi quidem, maximẽq; generales morbi sunt quatuor: qui calore, frigore, siccitate, humiditateq; inter se discedunt. Porro in febribus, admodum vitiatũ ipsa cõcoctio ventriculi, ob calorem alium præter naturam, qui cum substantia sua functionem ipsarũ, merito inter primos morbos annumeratur: quare actio ipsa necessariò ex commoda nascetur temperie. Negi enim alia de causa potest interperies primorum esse causa morborũ, nisi quod cõmoda sit temperies corrupta. Cum enim ab hac manent actiones, necesse est prima earum vitia, ex hac manare corrupta. Est autem cõmoda calor temperies, ipsius actionis causa. Quare in omni actione, id quod melius est, cõmodo temperamento ferre acceptum cõuenit: quæ deteriora sunt, vitiosa. Sanguinem atq; à mediocri, bilem ab immo dico calore nasci, purandum. Vnde illis qui sanis citra vitium sunt, vbi aliqua occasione contra consuetudinẽ cibo abstinuerit, os quidem amarum, lorum verò biliosum redditur, atq; etiam mordere venter, quod videlicet ex quæ conquantur immo dico, primũ quidem salisiora, postea verò amariora reddantur. Nam si mel ipsũ, quod omnium dulcissimũ est, plurimum percoquere velis, id quoque reddidissimum amarissimũ. Quod namq; à dulcedinem generandam calons ei debebat accedere, id totum profas intra se obtrinet. Quare si calidum cum sit, calido adhuc iungatur, statim fit bilis, non sanguis. Postulat itaq; ut vertatur in sanguinem, naturam hominis frigidam, statimq; frigidam.

Non ab re igitur censuit Hippocrates, mel biliosius naturus nõ esse ex vñ: immo autẽ esse morbis, quos amara excitant bilis. At simili natura, maximẽ cõueniens existere. In vniuersum autẽ, corporibus calidis, quacũq; ex occasione sint calida, mel atq; dulcia omnia, generande bilis causam præbent: his autẽ quæ contrarij sunt habitus, sanguini. Atqui non potest idẽ eibis alia verti in bilem, alius in sanguinem, nisi intra corpus eorũ generatio peragatur. Etenim si cibus quicquid a se & in se hanc habens, nec in animalis corpore mutatus, bilem gigneret, vtrq; in omnibus eam corporibus pari modo generaret. Sunt igitur semper nobis causæ ipse inquirendæ. Quoniam in temperiam eitorũ causis cognoritur, is faciliã naturam suam ea reduct. Porro affectus qui minimẽ ex accidunt, sed primũ & per se habefactat functionem, is verẽ morbus est. Iam vero Hippocrates temperatũ calorem, & qui modicẽ est humidus, sanguinis generandi causam affirmat: quæ ratione sanguinem potestẽ calidum & humidũ esse atq; vt flauam bilem calidam atq; siccam, quantumvis sit aspectu humidam. Quippe disiderat quod secundum apparentiam humidum est, ab eo quod viribus tale existit. Cum enim vbi plurimũ in ventriculo flaua bilis cõtinetur, perperã sibi vt gēatur, signum est, ipse potestẽ ipsam calidam esse, & siccam: atq; vt prius frigidam, humidamq; cum quæ etiam albicans ille succus, quem *chylus*, id est, mucum, appellat Prodicus, frigidus atque humidus est. Est & alius humor frigidus simul & siccus, qui est in autumno, & in ætate illa quæ succedit vigori, crescit, quam atram vocamus bilem, flaua multo acriore, & maligniore. Dysenteriam siquidem quæ ab atra incipit bile, mortiferã pronunciat Hippocrates. Non tamẽ quæ à flaua oritur, potius mortifera esse, pletq; ex ea feruntur. Est autem atra bilis receptaculum lien: qui vbi minus quim iustũ sit, allam ad sese trahit, vtriusque quando est male affectus, neq; valenter trahit, vt sanguis impunior est, sic totũ corpus magis redditur decolor. Tum regnũ morbi, qui à liene ægrotante ortũ habet, nequiores sunt: itẽq; vlcera cicatrices nigre. Ceterũ quibus corpus floret, is lien, Hippocrates testimonium minuitur. Quibus verò id viscum magis & tumens augetur, is corpus minuitur, et cacochylum reddit. Quemadmodũ igitur in seruati multo duo proventire excrementa cernimus, alterũ leuius, magisq; acreum, quod nimirum florem vocamus: alterum grauius & magis terreum, quod appellamus fecem: sic etiam in sanguine generando, excrementa gignuntur duo, quæ illis proportionẽ respondent: alterũ tenue, humidumq;, & fluidũ, quod flaua dicitur bilis, & in vesicis felis excipitur: alterum visculentũ & terreũ, quem veteres atrum succum appellant, quẽq; ad se lien ipse trahit. Ceterũ nõ eandem habent li succi speciem, cum respondent nature modo, quam vbi præter naturã se habent. Quippe quæ flaua dicitur bilis, dũ ad vitium peracta, crassifragnea, & vitellina redditur. Atra etiam bilis, perperã idẽ, lãgẽ in aliq; quã naturalis, evadit. Siquidẽ rale acriũ, in morẽ acẽ, sit: tum corpus

Mel biliosius natura non esse ex vñ, consuetudinem autem sentit.

Affectus primus labefactat functionem, is verẽ morbus est. Iam vero Hippocrates temperatũ calorem, & qui modicẽ est humidus, sanguinis generandi causam affirmat: quæ ratione sanguinem potestẽ calidum & humidũ esse atq; vt flauam bilem calidam atq; siccam, quantumvis sit aspectu humidam.

Pituita frigida & humida.

Atra bilis acrior & malignior quam flaua.

Lien præparatorem atræ bilis.

Liene imbecille, quæ accidunt.

Regni morbi à liene ori, nequiores.

Masti & sanguinem excipit.

Flauam bilem dum ad vitium peracta, crassifragnea, & vitellina redditur.

Atra bilis per acta, qualem redditur.

Mel florentius in bilem cõvertitur, mel finibus commodum. Bile generat.

Sanguis fit ex mediocri calore.

Frigidi morbi à pituita oriuntur. Calidi morbi à bile.

Morbi primi quatuor.

Consuetudinem ventriculi vitari maximam in febribus. Añtionem ex cõmoda oriuntur perit.

In sanis citra vitium sunt, vbi aliqua occasione contra consuetudinẽ cibo abstinuerit, os quidem amarum, lorum verò biliosum redditur.

Quæ conquantur immo dico, primũ salisiora, postea amariora reddunt. Mel reddidissimum amarissimũ. Quod namq; à dulcedinem generandam calons ei debebat accedere, id totum profas intra se obtrinet.

10

20

30

40

50

60

corpus rotis, necnon terram ipsam fermentat, ubi scilicet ascutina putredo nigro illi succo naturaliter se habent accensur. Multique videntur veterum medicorum plerique, id quod est tali succo naturaliter se habere, quodque infra delectatur, & sepe supra illatur, atrum vocare succum, non autem bilem: quod verò exvitione quapili ac putrefactione, in acidum migravit qualitatē, id atrum nuncupare bilem: quod excrementum iam præter naturā est, quum numerū ab vitione non naturalis caloris acrimoniā illam asciuerit, ac veluti cinis quidam sit reddendum. Sic quodammodo & fœx vitæ, id nō vitæ dissidet. Illa namque admodum calida est, adeo vt carnem vrar, liquet, atque corrumpat. Altera que nondum est vitæ, ad omnia virtutibus medicū, quæ terra singulari, alijsq; enī quæ tum siccandū, tum refrigerandi facultatē habent. Sanē in atræ bilis sic vitæ speciem enīam vt reclinā illa subinde veniunt, quoniam ipsa quoque igneo percocia est calore. Reliqua bilis genera, partim ex iam dictorū mixtura consistant vniuersa, partim tanquam viæ quædam sunt ad harum tum generationem, tum inter se mutationem. Dilatant inter se, quod alie meracæ sunt, ac solæ alie veluti sero quodam imbutæ. Verūm feri genera que in succis habentur, omnia sunt exercementa, purūq; ab eis esse postulari animalis coeque. Ea verò que prædicta sunt, naturæ visum aliquem conferunt. Purgatur autem ab his sanguis tum per lientem, tum per eam quæ secuniori subest velicā. Requirit enim sanguis in non potius animalis particulis crassitudinem. Est enim quando nec in posse rem suum succum postulat, qui tamen igneus ad extremū factus non sit. Porro quod pituitum expurgat, natura nullum instrumentum cōdidit, propterea quod frigida & humidā est, ac veluti ex dimidio coctum nutrimentum. Desiderat igitur talis succus non vtiq; vacuam, sed in corpore manens alterari. Excrementū verò quod a cerebro destillat, fortasse nec pituitum quis rectē, sed mucum, & destillationem appellat. Ergo quemadmodum ex bilis generibus aliud vtile naturalēq; in animalibus est, aliud invale & præter naturam: sic pituitæ quod dulce est, id salutare esse animanti & naturale putandū. Quod acidum salūq; est, acidū quidem, omnino crudū esse: salūm verò, computruisse. Porro omnimoda cruditas pituitū intelligenda est, quæ in secundā concoctione incidit, quæ in ventu agitur non aut in ea quæ prima est, quæq; in ventriculo perficitur: quā si hac destitueretur, ne succus quidē omnino esse posset,

ante assimilationem agglutinatio fieri: hinc verò ab appositione præcedi, quæ finis est actionis quæ ab attractrice perficitur. Porro ad nutritionem ipsam ampliori opus est tempore, quā ad perficiendas aliarum facultatū actiones: requiriturq; vt appositio in particula succus, si illam sit numeratū, minimē transferatur ad alias, sed in ea quiescant quare necessaria enīam videntur naturæ ipsi facultates quædā retentrix, quæ id quod appositum est retineat. Talis autem vis, in maxillis, maximeq; cauis instrumentis cōspicitur admodum cernitur in partibus aut obliuor. At inter animalis partes maxime causæ, amplissimæq; sunt, ventriculus, vterus, & quæ fecunditatem vocantur. Rennt autē venter cibum, quoad cum concoxit: nec minus sarti vterus, quoad hunc consummat. Cæterum longe amplius perficendi fortis tempus, quā ibi consequndū. Ac prouide retentrix vteri a nobis multo clarior cognosceretur. Quippe nouem mensibus plerisque mulieribus perficitur in vtero fortis, qui tota quidem ceruicē conuenit: completur autem fortis vniūq; vni cum secundis. Eūq; tum oris conueniunt, tum morte fortis in vtero finit, ipsa actionis vilitas. Nam vbi id completum est, cuius grana retentrix facultate est vis vterus, vniūq; hanc inhihet, ac cessare facit, propultrice, quæ hactenus quieuerat, loco eius assumpta. Sanē erat sic vti quiescit huius facultatis finis, ipse visus: enī actionis eiusdē finis, simili ter ipse visus, vt pote quo exaritate agat, nō excitante quiescat. Succedentibus igitur recte omnibus quæ in vtero sunt, expultrice quiescit omnino facultas: improprie autem cedentibus, non amplius expectat vterus nouem mensium temporis moram: imō retentrix facultas itam desinit ab opere, & expultrice vt moueatur permittitur: renum sibi mutuo succedit. Iam verò prægrantes ipse primis diebus, possimūq; eo ipso quod semen est conceptū, moueri, atq; in scriptum concurrere vterum sentiunt: quod si præter hæc, citra affectum aliquem, enīam conueniat os vteri, iam semen ipsum a mare, & se cepisse, & retinere arbitrantur: quo tēpore adeo claudatur vterus, visq; ad horam partus, vt ne specilli quidem mucrone admittat. At verò Hippocrates cōnuere os vteri, & in conceptionibus, & dum phlegmone affectū est, proficitur. Cæterum in conceptionibus, seruato naturali habitu: in phlegmone, in durum mutatur. Igitur absoluto, aut enīam mortuo fœtu, sub facultate expultrice os vteri aperitur: fundus aut, atq; vniūq; partes circūiacentes vtero, sese deorsum contrahunt, atq; factum propellunt: idēq; tanto labore et conatu, vt interdum ipse vterus excidat, potissimum cū eius ad spiritū ligamenta sunt laxa. Porro oblietrices ipse non vident surgere parturientes, neq; in sella collocant, donec ad fortis transitū os vteri factis patet: id quod ex assidua manū contractatione sensiti fieri paulatim. Opus autem ipsum quod a seipsis præstant parientes, non vteri est, sed musculorum qui sunt in abdomine, qui scilicet cum ad deiectionē, tum ad reddendam vrinam nobis enī auxilio sunt: atq; ita quidem in vtero, dum memoratæ facultates apparent. In-

Nutritio quæ sit necessaria.

Retentrix facultas in quibus cōspicitur, Partes maxime causa.

Vteri natura in operatio admiranda.

Expultrice et retentrix vteri sibi mutuo succedit. Conceptus vterus.

Vteri in clausura, et in conceptionibus, et dum phlegmone resistit.

Oblietrices vteri.

**GAL. DE NATURALI FACULT. LIB. III.**  
de naturalibus facultatibus, liber tertius.

Nutritionem quidem fieri, quum id quod nutrit, in quod nutritur, assimilatur: esseq; in singulis animalis particulis facultatem quandam attractricē, quam membratim assimilatricem & nutritionē quoque naturaliter præter attractricem, quæ materiam cōuenientia nutrimenti suppeditat, in proximo demonstrarum est libro. Indicatū præterea est, & quod

60

ventre verò, ad hunc modum. Quum in pro sua natura se habet, ac cōfistētia virtute vntur, quamlibet exigui sit quod in se cōtinet, totū id vndiq; complexus nullum vacuum relinquit locum. Quum imbecillus est, quacunq; parte com plecti exactē assumpit non valet, ac prouide lazum quoddam spatū efficit, permittitq; ea quæ in se continent humida, ex alio in alium locum transire, ac fluctuationum sonitus edere. Talis autē ventriculus, quū imbecillus sit, haud qui- 10 dem probē concoquit, sed in eo diuini videbi- tur quædam manere grauitas, tum cibi, tum por- tus, vt qui etiam tardius cōcoquat. Eius autem diutina ciborum moræ, non est causa angustia infimi orificij ventriculi, quū videamus indies multa longē crassissima, quæ per imprudenti vorantur, facili excrementis: sicuti & alia liquida reti- neri: vnde neq; enam eiusdem in ventriculo mo- 20 ræ finis aut terminus erit ciborum in cremore conuersio (alioqui forbiniones, & lac, & pitāne cremor, in omnibus illis cōtransirent) sed conco- ctiō, quæ ad conuersionē in cremore res est di- uersa, sicuti nutritio à sanguificatione. Est autē concoctio ipsa in ventriculo, nutrimentū in pro- priam eius quod nutritur qualitatem mutatio. Vbi igitur ad perfectiōnem concoxit cibos ven- 30 triculū, tum apert inferius os, excidētiq; per ipsum facile cibū, etiam si lapides, ossa, acinos, a- liæque quæ vtri in cremorem non possunt, pluri- ma secum habeant. At interim dum coquit ven- triculū, cibos rotas (perinde vt vterus partum) am- 40 bit, & amplexatur, claudensq; ad vngue infu- mum illius orificiū, quod pylorū nominant. Ita- q; neq; in vtero, neq; in ventre, neque in vesica vtravis, licet reperire locum aliquē vacuū, soli- cet instrumentū tunicis, ea quæ cōtinent, sem- per arte amplectentibus, quandiu naturaliter se habet animal. Quare illis omnibus ingente- 50 sunt aliquid facultates, quibus retinere quæ expe- ditur, expellere aliena, possunt. Siquidem quod bilem ad se trahit ea quæ iecinori subest vesica, suprà est monstratū. quod autē & in ventrē quoti- die ciuit, id quoq; euidenter cernitur. Atqui si tractricis operā statim expultricis actio excipe- ret, nec media semper inter eas intercederet vis retentrix, par semper in vesica bilis inuenerit 60 modus: ar nō sic inuenitur, sicut nec vniū in al- tera, quæ lotio est addita. Porro vbi ventricu- lus circa imas partes multitudine ac acrimonia humoris afficitur, si firmæ sint quæ circa stoma- chum habentur partes, diarrhæe citantur. Quū verò sic eas os infestatur, si cæteræ partes valen- tes sint, vomitiones sequuntur. Quippe ventri- culus, non secus quā partes reliquæ, vt conue- nientem sibi qualitatem expet, sic prorsus alienā respuit. Quare si expetit, trahit vngue sicuti et ex- pellet, si etiam fastidiū trahit. Ad hæc autē, si tra- 65 hit, necessariō etiam fruatur id quod non licebit illi, nisi retineat. Sed ipse frustionis aliquis erit finis, nempe benignioris ciborum substantiæ su- ctus, & reposio intra ventas. Post quem finem iam expultricis facultatis agendi succedet tem- pus. Nam vbi abvnde saturatus est venter, quic- quid reliquū nutrimentū est, veluti onerosum ali- quod reicit, quanquā ex eo, quod cū ventriculo

habet, commercio, ipsum quoq; consecutū est salutare aliquid. Quippe vbi conueniūt duo cor- 70 pora, quæ ad agendū ac patiendū sunt nata, si pa- res ut vires sint, ex æquo nū agent, tum patiētur. Sin longē superet, vincitq; alterum, magnum quiddam, in id quod patitur, efficit: ipsum ve- rō vel exiguum aliquid, vel omnino nihil patie- tur: quo nomine diuiset nutrimentū si in medica- mento venenoso: hoc nanq; vim corporis vinci- 75 cit, illud ab hac vincitur. Minime igitur potest conuēnsi animali nutrimentum esse, quod ab- lis quæ in animali sunt qualitatibus non vinci- tur. At vinci aliud nō est, quā alterari. Non tam- en æquali omnes modo vincunt nutrimentū particula. Siquidem alteratio quæ fit in ventre, maior est quā quæ in ore pñitur: minor verò 80 ea, quæ in iecinore & venis. Horum nanq; altera- tio, nutrimentum in sanguinis substantiam mu- rat. Quæ in ore agitur, mutat quidem id in alter- ram speciem manifestē, non tamen ad perfectio- nem transformat. Ceterum quā magna fit cib- 85 orum in ore alteratio, hinc discas licet, q; man- sum truci crudos furunculos ocyssimē & mu- rat & coquit: quomodo tamen si aquæ admiscetur, nequeat tale quicquam prestare. Nec est quod id mirere. Nam pituita quæ in ore habetur, & li- chenium remedium est, & scorpius statim necat: 90 præterea multas ex venenatis bestis, partim por- tinus perimit, partim ipatio: omnes certē infi- gniter ledit. Verū quanto i q; manū sunt ci- 95 bus, qui inherescunt in vacui denium inter- uallis, magis sunt alterati, tanto etiā his magis i q; qui devorati sunt. Siquidem incomparabilis est li- orum alterationis excessus, si & quæ in ventre est pituita, & bilis, & spiritus, & calor, & tota v- 100 tris substantia, æstimetur. Quod si viscera quoq; illi adacēria, rīquam magno lebēi plures ignis focī, pariter æstima sint, & dextis quidem te- cut, si sinistris lien, supēre cor, & transferunt fe- ptum, & eleuāt, & assidue morum, ingentem 105 quandam ciborum, qui in ventriculū sunt devo- rati, alterationem fieri credideris. Quo autem pacto mutari facile in sanguinem possent, nisi ta- lis essent mutatio preparati? Monstratū nanq; est, nihil in contrariā qualitatem totum simul 110 migrare. Porro venter duas habet tunicas, vsq; ad ipsum os pertinentes. Quarū minor quidē, qualis in ipso est venter, talis persistit, in dire- ctūq; porrectas fibras fortitur, trahendi nimis gra- 115 tia. Altera ad carnosiōrē speciem in gula con- vertitur, habētq; transversas fibras, ad cōtrahē- dam vndiq; Quippe singulorū quæ mouentur in- strumentorum corpora, pro fibrarum positura 120 motus habent. Iam in singulis intestinis circula- res in vtrāq; tunica fibræ sunt, quod cōtrahantur duntaxat, nec quicquam trahant. At venter alias fibrarum rectas habet, quibus scilicet tra- 125 hat alias transversas, quibus cōstringat. Verū vbi transuersæ fibræ tenduntur, latitudinē ven- tris minorem reddunt. Rectæ autem dum cō- trahuntur, necessariō longitudinem minuunt. At verò deglutientibus nobis, liquidō cernitur 130 larynx furium in tantum currens, quanquā gula deorsum trahitur: quāvis cōpleta iam degluten- di functione laxauerit sese gula, loculēter descē- 135 dere

Ventriculus quā-  
da non recte cō-  
coquet,

Cleuesio est nu-  
trimentū in pro-  
priū eam quod  
nutritur, quod  
tali, mutatio.

Pylorus.

Vesica felle tra-  
ha bilis,

Diarrhæa quā  
da excoctat.  
Vomitiones  
quandæ.

Nutrimentum  
a letetia me-  
dicamento quā  
modo differat.

Vinci nō esse a-  
liud quā alter-  
rari.

Alterationem  
vbi differat.

Alteratio quā  
fit in ore.

Triticum mæ-  
sum crudus fu-  
runculus co-  
quere.  
Pituita a vici-  
nitate furunc.

Alterationem  
quā in vtri-  
culis fit, de-  
monstrat.

Ventriculus deus  
iuncti tunicas  
q; ad os parti-  
nentes.

Fibra recta,  
trahit præta.  
Fibra transuer-  
sa ad cōtrahē-  
dum.

Intestina non  
trahunt, sed tra-  
hebant tantum.

Larynx furium  
tantum trahit,  
quantum gula  
deorsum.

Ventriculi interna tunica in velle.

Gulae cili ad velle in velle. Dupliciter ad facili quia velle.

Gulae interna tunica interna tunica, et de facili.

Venter quodam in velle in velle.

Gulae interna tunica interna tunica, et de facili. Gulae interna tunica interna tunica, et de facili.

Infructum in velle in velle. Gulae interna tunica interna tunica, et de facili.

Nova obliqua opulentia in velle in velle.

dece cernit illa summitas asperae arterie. Siquidem interna & ventriculi tunica, quae rectas habet fibras, quaeque tum gula intrinsecus velle, tum os ipsum, ea inquam super internis partibus ipsius laryngis extenditur. Itaque fieri nequit, quum ipsa & ventriculo deorsum trahatur, quum simul eam secum deorsum trahat laryngem. Sed quod superius partibus contractis, inferius dilatentur, commune quidem id est, tum viuis, tum demortuis corporibus. Gula igitur, ut monstrauimus, trahitur: alioqui laryngem non traheret. Trahit autem per gulam ipse ventriculus cibos, quos etiam per eandem evomit. Atque idcirco facilius est deglutire quum vomere, quod scilicet deglutitur ambabus ventris tunicis operantibus, interna quidem trahente, externa se contrahente, ac trahente: vomatur autem altera tantum, quae foris est, ac trahit, agente, nec vlla in os trahente. Non enim sicut ventris appetentia deglutientes cibos praecedit, sic in vomitionibus appetit oris pars vlla, excitata affectiva quippe, sed sunt ambobus ventris affectiva inter se contraria: quorum vtriusque miserat gula tunica externa, cui transverber sunt fibrae. Etenim deglutitio in his qui immo dicitur appetunt, occisimè fit: ventre nempe cibos deorsum vellente, prius quam sint mansi, ut in Haezulis, & Synodontibus accidit, quorum praegulofitate (ut Aristoteles inquit) venter aliquando in ore invenitur. At vero vtriusque gulae tunicam praedictis quodvis actionibus posse, hunc deprehendens: quod si in vno animali externam quidem tunicam, cui transverber ad sunt fibrae, in alio autem internam, cui rectis, transversis incisibne fecutus, vtriusque planè animal deglutire videbitur. Ex quo manifestè patet, quod altera earum deglutire licet, exterius deorsum quum ambabus. Sed hoc interim perpendendum est, spiritus qui vna cum cibis deglutitur, gula inter deglutientium impleri, effugit siue luitus obliqui. Inducimus igitur quatuor in ventre virtutes sitas: nempe in deglutendo attractionem, in coquendo retentivum, in vomitione, & concoctorum ciborum in tenuem intestinum descensum, expultricem ipsam vero concoctionem quandam existeret alterationem. Quia quidem facultates ministratae esse nutritivis, similiter expositi est. Sed enim ut stercus luum manum canibus exiit suavisissimè, ita iecinone excrementorum, aliud leni, aliud bilis velle, aliud renibus est acceptum. Ergo vniuersa instrumenta geminae facultates obnènt, & qua coveniens trahunt, & qua alienum repellit. Proinde si quod vel ex vniua tunica instrumentum cõstit, vel vtriusque velle, vterius, & vena, vtriusque fibrarum genus obnènt, rectum & transversum. Quin tertium quoque fibrarum genus obliquum est minus omnino, quam duo praedicta genera, numerosum. Invenitur id in his instrumentis, quae ex duabus tunicis consistunt, in altera sola, rectis scilicet ipsae fibrae immittunt. In his autem quae ex singulari consistunt tunica, vna cum duobus aliis

tus tempore. Venae porro tunica, ex multifariis fibris est condita. Externa arteriae tunica, ex circularibus: interna ex rectis plurimis, paucis autem cum his obliquis, consistat. Sola instrumentorum omnium ex duabus tunicis, atque harum vtriusque transverber consistante fibris, facta sunt intestina. Arteriae vtriusque velle, & vteri, ubi vel multitudine eorum quae continentur deglutuntur, vel qualitate mordentur, quod offendit abicere properant. Quorum vtriusque aliquid violenter incidit, quo casu provocatur abortus: fit autem in plerumque ex naturae commodo, quod genus non abortu, sed partus nominatur. Atque abortus quidem sequuntur vel medicamenta quae ipsos provocat, vel etiam tensionem vteri partus autem, ipsius factus motiones vehementissimas. Communes autem omnibus his affectibus ipsa est offensio. Cuius triplex est causa: aut molles nimiae, aut pondus aliquid, aut morbus. Molles, ubi amplius distendi vterus non tolerat. Pondus, quod supra vires eius sit, quod cõmmer. Morbus, ubi vel humores qui prius in membranis continebantur, histoptis, in ipsum vterum sunt effusi vel etiam totum partus corruptus & putris, ac innoxiam famem dissolutus, vteri tunicis eius occasione irritat, quod mordet. Ad haec, excrementa singula, si morbi in corpore durius trahant, putrescent quare mordacia & acris, arguis quae ipsa conueniunt, insecta redduntur. Minus tamen id in ea velle quae ieciori habet, similiter se habet, ut quae nervorum planè sit expers. Quisquam certe cum hac ipsa trahit liquidum, excrementumque, necesse est eam vel succi multitudine pressam, vel qualitate illius offensam, & expulsionem desiderare. Iam nec illud difficile cõpertum est, & tractum & expulsionem diuersis in temporibus per eundem eius meum fieri. Vteri praeterea itomachus, pari modo sicut intro seminis, ita foras partus via est. Verum hic trahit facultas, & quae atque expultricis, non liquet vulgo. Quum igitur attractionem & expulsionem, per vnam eandem fieri viam cernamus, non debemus mirari, etiam si per venas in venarem naturam nonnullam excrementa propulset, dum purgantia pharmaca propinamus: ar multo minus, si per quas venas à ventre in secur facta est digestio, rursum ex iecinore in ipsum trahi aliquid alimentum in longiori inedia potest. Venae siquidem illae, quae medium spanum inter secur & partes circa ventrem occupant, duplex ministerium praestant, nempe ut quum in illa abundancia fuerint alimenta, per eas sursum ferat in secur: quum autem vacua sunt, nutritis auct, per easdem ipsas ex hepate rursum trahatur. Siquidem totum ex toto trahere, ac non impartire, vnaque omni consilium ad cõspiratio esse videtur. Quare multis eorum qui valentem exercitationem subit ad proflus intermiserunt, aut artuum aliquem praeciderunt, sanguinem per intestina certis periculis simul plangunt cernimus evacuari, sicuti illa cernit alios humores à natura in morbis expelli. Ac trahit quidem id quod est valentius: vacuat autem id quod est imbecillius. Porro valentior, imbecilliorque altera quam altera particula est, vel absoluto sermone, naturae, et cõmuniter

Vena confusa. Arteria confusa.

Infructum in velle in velle. Gulae interna tunica interna tunica, et de facili.

Abortus.

Partus.

Vteri offensio in velle in velle.

Excrementa singula in corpore durius trahant, putrescent quare mordacia & acris, arguis quae ipsa conueniunt, insecta redduntur.

Vteri itomachus in velle in velle.

Venerum quae velle velle in velle in velle.

Trahit litem ex toto.

Sanguis quodam in velle in velle.

omnibus: vel priuatim huic cuiuspiam talis effici-  
tur. Et natura quidem, omnibusq; communiter  
animalibus, corq; secur, & iecur q; in testina & vē-  
ter, item arteriæ q; veng, tum quod vnde est ad se-  
se trahere, tum quod diuersum ab hoc est, si se re-  
pellit e, magis valet. At priuatim in vnoquoq;  
nostrum alio tēpore secur valetius trahere po-  
test, alio ventriculus. Quippe vbi in ventriculo  
copia alimentis est, ac iecur vehementer appetit,  
omnino id valetius trahit. In vicinēq; iecinore  
referro & distento, ventrē verō appetente, ac va-  
cuo, valetior habendi vis in hunc transferetur.  
Estiq; nōnunquā quo minus anima esuriat cau-  
sa, nutrimentū ab vndā in iecinore. Nam vter,  
si melius, paratiusq; nutrimentum habet, exter-  
num non postulat. Sin aliquando postulat, neq;  
eius copia datur, excrementis biliosis, purisosis,  
atq; serosis impletur: quæ vniq; trahenti iecur illi  
remittit. Siquidem vt particule altera ab altera  
nutrimentum trahūt, sic altera in alteram, quod  
supervacuum est, si se pellit. Estiq; hęc vo-  
catum fluxionum causa. Confluunt autem ac fugantur  
superflua à foronibus semper ad imbecilliores  
particulas, donec ad omnium imbecillimas de-  
ventum sit: à quibus postea in alias transiunt  
nequeunt. Constat itaq; non esse vnicum motus  
modū, quo in corpore materię moueantur, quā  
contrarias potestas, necessitas cōtrarij motus  
sequantur. Eōq; venter, quod excrementorum  
in eo fluitat, per vomitionem expurgat: quod  
subsidet, alui deiectione: etsi in morbo ileo, in  
quo trāsitus omnino est præclusus, eo ipsius in-  
testini phlegmonem, iterūq; vōmitur. Vnde  
mirū non est, si à corporis superficie, insolito  
frigore subitō & stipata, & imbecillior reddita,  
ad ipsā vsq; intestina, & ventrē, aliquid transla-  
tum pervenit. Ac tales quidē motus celerius ces-  
sant. Qui autem ab internis partibus irritant, ij  
& vehementiores sunt, & diuturniores. At ve-  
rō quom partīcula quęq; similiter ventri appet-  
at, vniq; & nutritur, & nutrimentum amplecti-  
tur ad eundem, quo venter, modum. Ceterū  
venter ipse non idcirco circa cibos se contrahit,  
quō reliquis partibus eos reddat accommodos,  
sed quōd totū eius corpus, & attrahēdē proprij  
sibi qualitate, & eadē fructū, sicut antē monstra-  
tum est, vim obtineat. Accidit verō iterum, vt  
eos alteret. Humore quorum vbi impletus sana-  
tūsq; est, pro onere eos de cetero habet, & deu-  
cit, ipse scilicet ad aliud opus, nempe vitæ aggluti-  
net, conuersus. At ab eo nutrimentū descendēs,  
quam per tota intestina rursū permeet, per vasa  
quæ ad ea pertinet, rapitur: pluriū quidem in  
venas, exigua quædam porno in arterias. Quo  
tempore tuncis etiam intestinoorum apponitur.  
Ac inibi omnem iam naturæ circa nutrimentum  
operam in tres temporū vices cogitatione parti-  
tus, in prima quidē simul & maore id in ven-  
triculo, & concoq; intellige: tum ventri ipsi ad  
saturitatem apponi, aliquid verō eius etiam ad  
iecur ascendere. In secunda, trāsire ad intestina,  
iisq; ipsi & iecinon ad saturitatem apponi: tum  
portunculam eius exiguam in omnem corpo-  
ris partem ferri. Porro hoc tēpore, quod in pri-  
mo est appositū, id ventriculo affigi intellige. In

tertia verō temporis portione, ventriculum qui-  
dem iam nutriti, iis quæ affixerat planē assimi-  
latis: affigi verō tam iecinori, q̄ intestinis, quæ  
iis fuerant apposita: præterea in omnes corporis  
partes digestionē appositionēq; fieri. Quod si  
rursus animal nutrimentū accipiat, quo tempo-  
re id vter coquit, eōq; fruitus, quicquid vile ex  
ipso est, tunicis suis apponeas: eodem intestina  
quidem cum quem sibi affixerat succum, protu-  
sus assimilabunt. Parimodo iecur. In toto verō  
corpore, partes nutrimenti quæ fuerat apposite,  
assingentur. Sin autem venter manere sine cibo  
cogatur, hoc tempore à vena quæ in lactibus ac  
iecinore sunt, nutrimentum trahet, non ex ipso  
iecinoris corpore. Siquidem qui in quaq; parti-  
cula iam contentus, agglutinatus, ac assimi-  
latus est succus, hunc alteram particulā revellere  
non est credibile. Iam verō lenem, quod in ieci-  
nore crassius est, ad se trahere, conficit eōq; & ad  
vtilius mutare, & lenēq; etiam aliquid trahi in vici-  
nas partes, competū est. Sic vti & in ventriculū  
alio tempore licet excrementū remittere: alio  
rursus ex ventre aliquid propriū illius nutrimen-  
ti ad se attrahere. Ergo, vt summum dicam;  
quodq; ex quoq; trahere, ac in vnumquodq; mit-  
tere, diuersis in tēporibus potest: vt in arteriis,  
corde, thorace, & pulmone videre licet: quibus  
dilatis vicissim, cōtrahitisq; necessum est: qui-  
bus aliquid prius est attrahitum, in ea mox emit-  
ti. Quare vasorum, quæ in corde sunt, osculis,  
membranas applicat natura, quæ retroferri ma-  
terias prohibent. Quāquā nō possunt ita ad  
vnguem claudi illorum vasorum ora, vt ex eis  
nilul recurrat retrō, præcipue in arteriam veno-  
sam. Est autem singulis arteriis vis quædam à  
corde profecta, qua tum dilatantur, tum contra-  
huntur. Ceterum quæ arterie ad cutim finiun-  
tur, externū aërem, quod dilatantur, attrahunt.  
Quæ verō parte aliqua ad venas se aperiant,  
quod tenuissimū, maximumq; halituorum in eis  
sanguinis est, ad se alliciūt. Sic vti à corde, quæ illi  
vicinæ sunt. Quippe in successione ad id quod  
vacuatur, q̄d leuissimū & tenuissimū est, prius ei  
quod vacuatur succedit, q̄ id quod grauius &  
crassius existit. Est autē omnīū quæ in corpore  
sunt, leuissimum, tenuissimūq; spiritus. Secū-  
do loco halitus. Tertio gradu, qui planē absolu-  
tus, attenuatissimū est, sanguis. Hæc igitur, arterie  
ex omni parte ad se trahunt. At ex intestinis &  
ventre, quæ adeo crassum grauiūq; in se nutrime-  
tum habet, nihil, de quo ratio vlla sit habēda, in  
se possunt trāsferre arterie, quō prius implan-  
tur leuionibus. Sunt itaq; duo trāctionum gene-  
ra: vniū, quod successione ad id quod vacuatur  
constringit alterū, quod qualitates sit conueni-  
tia. Aliæ namq; aër in folles, albet ferrum à ma-  
gnete attrahitur: ac secundum prius quidem gen-  
us, etiam emittit trahi aliquid potest: ac secun-  
dum posterius, cominus duntaxat. Præterea suc-  
cessionē ad id quod vacuatur, prius id trahitur  
quod leuius est: conuenientia qualitates, nōnun-  
quam quod grauius. Transferitur autē sangui-  
s in arterias à vena ob reclusa ora, quæ inter se ha-  
bent, alterū vas in alterū. Necmō ex dextro cor-  
dis specu in sinistrū, quod tenuissimū sanguinis  
est,

Venter toleran-  
da causa.

Ventriculū per  
nutrimentū in-  
capiam, impleri  
excrementis vari-  
is.

Fluxionum  
causa.

Fortiores par-  
tes semper ad  
imbecilliores  
excrementa pro-  
pellere.

Ileo morbo in-  
sistente iterum  
erom.

Venter cur cir-  
ca cibos contra-  
hatur.

Tempora tria  
circa nutrimentū  
si concoquunt,  
distributionem  
gunt.

Venter, si a-  
fficit, per me-  
mbranas muscu-  
li alimentum  
trahere.  
Succus semel ap-  
positum alim-  
enti, nō trahi  
ab altera.  
Licet aliquando  
mātrix in ven-  
triculū aliquid  
excrementū  
remittat.

Quodq; requi-  
rit trahi, ex  
in quodq; ma-  
tere.

Membrana no-  
strahendo que  
sunt salia.

Arterie emul-  
sæ vni quan-  
dā causā a cor-  
de, quæ dilata-  
tur & contra-  
hantur.

Arteries quam  
dilatant, ex-  
ternū aërem  
attrahunt.

Arteries ut ve-  
niunt, attrahere  
subtilissimū  
nutrimentū san-  
guinis.

Spiritus esse  
ferrum tenū  
simum quod.  
Halitus est spi-  
ritum et te-  
nuissimum.  
Trāitus duo  
genera.

Successio ad id  
quod vacuatur  
quæ fiat.

Succurren sub-  
tilissimū à dex-  
tro cordis sinu  
trāferre in  
sinistrum, per  
membranas spe-  
ci.

est, etiam trahitur, id quod constat, cum ob foramina illa interpositi septi, quæ à lato ore magis magisque in angustius procedunt: tum vel maxime, quod cum in dextro cordis sinu duo ora sint, vnum quo sanguis in vehitur, alterum quo emittitur in pulmonem, longe maius est id quo in fertur, quam id quo emittitur. Neque est quod dicat aliquis, absumptum esse sanguinem aliquod in ipsam substantiam cordis nutritionem. Siquidem alia vena est, quæ ut id varie fissa dispergitur, quæ nec ortu à corde habet, nec sanguine ab eo accipit. Manifestum igitur est, aliquam portionem illius sanguinis, qui invehitur in dextrum ventriculum, in sinistru siquæ transmitti: cum etiã duorum numero quæ in sinistro cordis ventriculo sunt vascula, longe minus id sit, quod à pulmone in eum ducit spiritum, quam arteria illa magna, quæ ex eo procedit, à qua reliquæ omnes, quæ sunt in corpore, oriuntur: ceu non spiritus modo à pulmone accipiat, sed etiam ex dextro sinu, per tam dictas communes vias, sanguinem. Porro

*Cer. materiam a vena, qua per eam superius dispergitur, nō ab ea qua dextrum ventrem irrigat.*

*Carot. vniuersam materiam ex sanguine.*

*Mobilium esse incrementum ossibus.*

*Cer. cartilagineam materiam ex melle quodam humore.*

*Distillatio huiusmodi materiam ex corpore, unde accidit.*

*Vinum aqua citius excipitur a venis.*

*Vinum album et purius promptius in corpus digeritur, nigrum moratur.*

# GALENI PERGAMENI, de naturalium facultatum substantiis, liber vltimus.



Videtur quidem in nobis anima sit, ne mox est qui nesciat: vipote cum nō sit, earum omnium functionum, quas corpore indies obimus, aliquam oportere esse causam. Quippe nihil fieri sine causa potest. Atque nam ea sit causa, unde hæ functiones procedant, non æque est competentum. Varij enim vix modo opinantur. Ego autem, licet non sum is, qui velim mihi persuadere, me eorū certam habere notitiam, quorum certā demonstrat ionem nō habes, deus famem impresentiarum nonnihil differat, in de nobis exordio sumpto, quod ego hæc scribam, me scire profiteor. Omnia nimirum corpora, quæ lucipenes nos giuntur, ex quatuor clementiarum

*Nihil fieri sine causa potest.*

*Corpora vniuersa consistere ex vniuersa quatuor elementis.*

per totum mistoriam temperaturam suam habere ortam. Quorum clementiarum ipse corpore substantia, an per se viuere permittit, vel solæ potius qualitates, ut id scire non ducō esse operæ precium, sic nec pronuntiare velim. Probabilius tamē mihi videtur, quod temperamētum id per qualitates fiat. Anima verō ipsa, an immortalis sit, quæ corporis immittit substantiam, anima gubernet, me nequaquam hoc certō scire affirmare: nec illud, an vilam ea peculiarem, & per se, substantiam possideat. Sed hoc mihi plurius constat, quod quantalibet anima in hæc commigret corpora: ipsorū tamē naturæ ex elementorū temperie constitutibus, obnoxia est. Oportet autem corpus ipsum, quod animam suscepturum est, paratum idoneumque esse. Nam si magnam subierit illius temperamētum alterationem, cogitur inde anima exire: veluti cum omnino respiratio intercipitur. At dū corpus ipsum naturaliter feruit sua constitutionem, nunquam fieri posse credendum, ut ab illo anima secedatur. Et hæc de causa, scire quænam sit animæ substantia, nec est ad morborum curationes necessarium, neque enim ad ipsam philosophiam. Porro stirpes, internum aliquod motum intum, & aliquem præterea rerum sibi congruentium sensum habent, præterea numerum fluctantibus illis quatuor, attractrice nēpe, & repellente, alteratrice, & expultrice, quas naturales dicimus. Sensu autem & motu, qui ab interno & proprio impetu sit, animalia ipsi plantis præstant. Est enim stirpibus ea tantū cognitio tradita, quæ ex volupate quadā, vel tristitia, aut alia quapiam illius simili affectione, aut saltem illius ex proportionē respōdente, nascitur: cum nulla alia causa esse possit, cur ea quæ sibi competat, & attrahant, & coniciant, præter volupatem, & frustrationem, quæ ab illis giuntur. Nam alterius cuiuspiā cognitionis quæ ad sensus spectet, neque esse particeps anima naturalis, vipote quæ visibiles qualitates, vel auditiles, vel gustantes, vel olfactiles, vel tactiles nequaquā possit apprehendere: sed illas tantū, quæ his quæ alere possunt, vel secus, insunt. Cetera cum stirpes trahant, retineant, alterent, atque à se expellant, recte mihi videtur Plato eas & sensu congruentiū in congruentium præditas, & animalia etiam esse, dixisse.

*Temperamentum fieri per qualitates, pro his solum vult Galenus ambigere.*

*Anima efficiatur naturæ corporis.*

*Anima non potest secedere à corpore, quando illud naturaliter feruit, stirpes habere congruentium sensum, præterea quæ quatuor facultatibus naturalibus.*

*Animalia præstant plantis sensum, præterea quæ quatuor facultatibus naturalibus.*

*Animalia præstant plantis sensum, præterea quæ quatuor facultatibus naturalibus.*

*Animalia præstant plantis sensum, præterea quæ quatuor facultatibus naturalibus.*

*Animalia præstant plantis sensum, præterea quæ quatuor facultatibus naturalibus.*

*Animalia præstant plantis sensum, præterea quæ quatuor facultatibus naturalibus.*

*Animalia præstant plantis sensum, præterea quæ quatuor facultatibus naturalibus.*

*Animalia præstant plantis sensum, præterea quæ quatuor facultatibus naturalibus.*

*Animalia præstant plantis sensum, præterea quæ quatuor facultatibus naturalibus.*

*Animalia præstant plantis sensum, præterea quæ quatuor facultatibus naturalibus.*

*Animalia præstant plantis sensum, præterea quæ quatuor facultatibus naturalibus.*

*Animalia præstant plantis sensum, præterea quæ quatuor facultatibus naturalibus.*

*Animalia præstant plantis sensum, præterea quæ quatuor facultatibus naturalibus.*

*Animalia præstant plantis sensum, præterea quæ quatuor facultatibus naturalibus.*

*Animalia præstant plantis sensum, præterea quæ quatuor facultatibus naturalibus.*

*Animalia præstant plantis sensum, præterea quæ quatuor facultatibus naturalibus.*

*Animalia præstant plantis sensum, præterea quæ quatuor facultatibus naturalibus.*

*Animalia præstant plantis sensum, præterea quæ quatuor facultatibus naturalibus.*

*Animalia præstant plantis sensum, præterea quæ quatuor facultatibus naturalibus.*

*Animalia præstant plantis sensum, præterea quæ quatuor facultatibus naturalibus.*

*Animalia præstant plantis sensum, præterea quæ quatuor facultatibus naturalibus.*

*Animalia præstant plantis sensum, præterea quæ quatuor facultatibus naturalibus.*

*Animalia præstant plantis sensum, præterea quæ quatuor facultatibus naturalibus.*

*Temperamentum fieri per qualitates, pro his solum vult Galenus ambigere.*

*Anima efficiatur naturæ corporis.*

*Anima non potest secedere à corpore, quando illud naturaliter feruit, stirpes habere congruentium sensum, præterea quæ quatuor facultatibus naturalibus.*

*Animalia præstant plantis sensum, præterea quæ quatuor facultatibus naturalibus.*

*Animalia præstant plantis sensum, præterea quæ quatuor facultatibus naturalibus.*

*Animalia præstant plantis sensum, præterea quæ quatuor facultatibus naturalibus.*

*Animalia præstant plantis sensum, præterea quæ quatuor facultatibus naturalibus.*

*Animalia præstant plantis sensum, præterea quæ quatuor facultatibus naturalibus.*

*Animalia præstant plantis sensum, præterea quæ quatuor facultatibus naturalibus.*

*Animalia præstant plantis sensum, præterea quæ quatuor facultatibus naturalibus.*

*Animalia præstant plantis sensum, præterea quæ quatuor facultatibus naturalibus.*

*Animalia præstant plantis sensum, præterea quæ quatuor facultatibus naturalibus.*

*Animalia præstant plantis sensum, præterea quæ quatuor facultatibus naturalibus.*

*Animalia præstant plantis sensum, præterea quæ quatuor facultatibus naturalibus.*

*Animalia præstant plantis sensum, præterea quæ quatuor facultatibus naturalibus.*

*Animalia præstant plantis sensum, præterea quæ quatuor facultatibus naturalibus.*

*Animalia præstant plantis sensum, præterea quæ quatuor facultatibus naturalibus.*

*Animalia præstant plantis sensum, præterea quæ quatuor facultatibus naturalibus.*

*Animalia præstant plantis sensum, præterea quæ quatuor facultatibus naturalibus.*

*Animalia præstant plantis sensum, præterea quæ quatuor facultatibus naturalibus.*

*Animalia præstant plantis sensum, præterea quæ quatuor facultatibus naturalibus.*

*Animalia præstant plantis sensum, præterea quæ quatuor facultatibus naturalibus.*

*Animalia præstant plantis sensum, præterea quæ quatuor facultatibus naturalibus.*

*Animalia præstant plantis sensum, præterea quæ quatuor facultatibus naturalibus.*

*Animalia præstant plantis sensum, præterea quæ quatuor facultatibus naturalibus.*

## GALENI PERGAMENI de sanguinis in arteriis naturae continetur, liber vltimus.



Vni secta quacuque arteria, sanguis inde effluat & videat, duorum alterū necesse est: aut illum in ipsis arteriis cōtinuari, aut aliunde in eas transfundi. Sed aliunde transfunditur, si saltem cubiliter cōstat, eas solum spiritū (cum secundum naturam habentem) cōtinuisse. Quod si ita res esset, profecto esset opus, ut illato vulnere, ante sanguinē, ex euntē spiritū videremus: at nō videmus, igitur neque prius solus ille continebatur. Itaque arteriæ nūquā vix sunt solū spiritū cōtinere. Etenim secto abdomine vni cum perito nō, in liedis qui nuper laetant, manifeste videtur licet mesenterij arterias referat lacie. Enum-

*Arteria, nūquā solum spiritū cōtinere.*

*Arteria, nūquā solum spiritū cōtinere.*

*Arteria, nūquā solum spiritū cōtinere.*

*Arteria, nūquā solum spiritū cōtinere.*



vero quæ in humanam veniant cognitionem, omnia tum sensu, tum ratione deprehenduntur. Vnde quemadmodum ex sensibilibus multa sunt, quæ plurimus de causis sensus effugiunt, ita et rationem. Dubitant autem Etasistrati sectatores, quomodo, si sanguine repleta sint ipsæ arteriæ, possit spiritus à corde in vniuersum corpus deferri. Ad quos dicemus, non mitti spiritum, sed attrahi nec ex solo corde, sed vndique. Demò strarū quippe à nobis est, in libro de vsu respira-

*Spiritus non mitti à corpore a corde, sed vndique attrahi à corpore.*

*Spiritus nō substantiam, sed qualitatem ex vso esse cordis, cum refrigeratur et appetat. Refrigeratio est finis respirationis. Arteria non eo dilatatur quia implentur, sed implentur quia dilatantur.*

*Vivens quoque differt à non vivente.*

*Arteria omnes partes permeatur simul.*

*Motus celeritas facultatibus attestatur, potenter aduersatur.*

*Musculi sunt instrumenta velut aræ motus. Musculi motus ratione possunt.*

tionis, aut nihil penitus, aut admodum parū substat spiritus, in cor trāssumi. Vniuersus siquidē excitari potest, vt diligentioribus tum philosophis, tum medicis visum est: qui nō eius substantiam, sed qualitatem potius cordi esse ex vīa autumant, vt pote quod refrigerari appetat: atque hunc esse respirationis finē. At verò arteriæ ipsæ non eo dilatantur, quia implentur, sed ideo potius implentur, quia dilatantur. Cū enim in suis tunicis vires quasdam habeant, quibus se dilatant, ex vnaquaq; sui parte, per extrema foramina, quoscūq; illis connēs est, vnde possunt, attrahunt. Potens facilis intelligere exempla, quæ sit differentia, quod aliquid repletum dilatetur, vel quod dilatatum repleatur. Vires quippe facili, dum implentur, dilatantur: fabricorum verò folles, dum dilatantur, implentur. At facultatis illius quæ arteriæ dilatatur, cor veluti fontē esse, alibi à nobis est dictum. Et est hoc clare magis naturæ congruens, vt sic opinemur, quā vt spiritum per eas, veluti per inanima quiddā corpora, ferri arbitremur. Differt siquidem vivēs, à non vivente, non tam substantiæ cōplexu, quā quod sit facultatis participes. Quod autem à cor de ipso tunicis arteriarum facultas quædam qua dilatantur, non autem materia per illarum cavitatem, mittatur, ex hoc cognosces manifestissimē, quod si aliquam conspicuā arteriā cute nudaveris, ille per longitudinem secte, fistulā aliquam imposueris, ita vt totum vbius obstruatur, videlicet illā pulsantem. Vbi vero circūducto laqueo, ipsius arteriæ tunicā circa calamū astrinxeris accuratē, non amplius vltra laqueū quin tumlibet tam sanguinis quā spiritus delatio per cavitatem fistulæ fieri possit) pulsantem videbis. Porro mouetur arteria vniuersa vno eodēq; tempore, nec altera eius pars prius, altera verò posteriùs, sed quemadmodum simul ac mouere pedis digni propofuerimus, quāvis vis nulla in ea parte ratiocinandi vis sit sit, consensum tamen facultate illi, in temporis momento distributa, mouemus, ita etiam idipsum fit in corde & arteriis. Motus enim celeritas, vt facultatibus attestatur, ita materis potius aduersatur.

## GALENI PERGAMENI de motu musculorum, liber I.



Nitrumēta motus voluntarij musculi sunt, quorū adeo magna multitudo est, vt ne numerari quidē facile possint. Nam & natura ita quidem coalescent inter sese, vt videantur vnus esse. Et cū vnus aliquis in multos rēdones desinat, non vnus amplius solus esse videtur, sed quot tendones. Idcirco, & quia multi-

plici sunt figura, & in dissimiles inferuntur partes, modum motus difficulter comprehensibilem habent. Ceterum omnis musculus tendōve transuersim atque insigniter sectus, aut phlegmone, aut scirrho, aut putrefactione, aut cōtusione, aut duritie cicatricis affectus, nocet quidē omnino quibuscūq; moribus particule in quam inferuntur. Tendōnū porro natura, mista mediāq; est, inter ligamentū & neruum. Etenim ligamentum ipsum, corpus neruosiū est, ex ossē omnino ortum habens, insertum autem in os, aut in musculum. Nervus autem & ab ex cerebro aut spinali medulla oriuntur: quorum substantia est veluti duriusculum factum cerebrū, qualem esse spinalem medullam constat. Sed ipsius etiam cerebri pars posterior, dūnor est anterior: & quicunque neruorum molliores sunt, hi nihil à spinali medulla nō videbuntur differre. At aliorū ossium medulla, humida & fluxilis est, pinguedineq; perfusilis: quare ex ea oriri nullum neruū videbis: neque est ipsi involucre viliū, nec arteria, aut venæ complexus, nec vili prorsus cōmunicatio cum musculis. Porro à cerebro aut spinali medulla musculi omnes necesse est vtriusque accipiant, qui visu quidem paruius, sed virtute magnus exiit. Cognosces autem id ex passionibus. Nam incusus, oppressus, contusus, laqueo interceptus, scirrhis affectus, & putrefactus, aufert musculo omnem motum & sensum.

Quin & neruo inflammatum, non pauci ipsasmo correpti sunt, & mēte alienati: quorum quidam sic affecti, cū sapientiores medicum nacti essent, qui neruum illis abscinderet, statim spasmodi, & mentis alienatione sunt liberati: sed postea musculi, in quem neruus inferretur erat, insensibilem atque inuilem ad motum habuerunt: tanta vis neruis à supremo principio affluit. Non enim ex seipsis eam, neque connatam habent. Id autem hinc facile cognoscere poteris. Nam si aliquem neruū, aut ipsam spinalem medullam incidieris, quantum superius est incisione, continuum cerebro, id quidem adhuc conseruabit principij vires. Omne autem quod inferius est, neque sensum neq; motum vili præbere poterit. Nervi itaq; riuorum instar: à cerebro, ceru à quodam fonte, deducunt musculi suas facultates. Quos quum primum attingit, scinduntur multipliciter in aliam subinde atq; aliam sectionem: tandemq; in tenues non & membranas sibtas solui, totum sic musculi corpus texunt. Ligamenta verò, per quæ ossibus musculi colligantur, coalescunt, membranas circa ipsos gignant, & quasdam intrō propagines in ipsam carnem musculorum demittunt: quam veluti quendam locum intellige multis riuus irrigat, vno quidem prædicto neruo, duobus verò aliis, altero sanguinis calidi & tenuis & vaporosius, altero frigidioris atq; crassioris. Vocatur autem ipsorū alter, arteria: alter vena. Isti igitur principia à corde & hepate habentes, corpus musculorum irrigant. Quorū gratia fit ipse musculus, veluti quædam planta. At propter sensum & voluntarium motum, quibus animal à nō animali differt, & quos musculus ab ipso suscipit neruo, factus est animale instrumentū, & vni proprius

*Tendones natura medulla inter ligamentum et neruum.*

*Ligamentum quid. Nervus.*

*Nervus. Spinalis medulla.*

*Medulla ossium.*

*Nervus omnes aut à cerebro, aut à spinali medulla oriuntur. Nervus affectus musculi accidit vtriusque riuus remperire.*

*Nervus inferre vim à supremo principio.*

*Nervus aut spinalis medulla transuersim inciditur, quæ infra sectionem sunt partes debiles motu simul et sensu.*

*Nervus à cerebro inferre suas facultates. Nervus non sinitu suas facultates.*

*Ligamenta quoque membranas circa nervos facies. Musculi quoque riuus riuus.*

*Arteria. Vena. Musculus veluti quædam planta. Musculus, animale instrumentum, & vni proprius.*

Motus natura-  
li qui.  
Motus anima-  
les qui.

Sensu inest cu-  
lis particula  
motus practus.  
Tendo illa da-  
nor nervo, quod  
to ligamento  
mollior.  
Ligamentu  
motu infensile.  
Nervus omni-  
sensu practus.

Tendone ma-  
nus.

Nervus est via  
facilitatis motus  
a cerebro  
descendens.  
Tendo omni-  
sensu infensile.

Lingua muscu-  
li carnes ten-  
duntur.  
Lingua ma-  
nus.

Cor mouetur  
perpetuo circa  
voluntatem mo-  
torum.

Laborum, ocu-  
lorumque mu-  
tus.

Musculi nulli  
mouentur ex.

arteriam & venam, naturale. Etenim motus qui ex arteria & vena procedunt, sunt naturales, & voluntatis expertes: qui autem musculis, & animalibus, & voluntarij. Eit autem musculus, instrumentum vno sensus, sed motus, etiam vniuersus sit particeps: quia nullus motus voluntarius potest sine musculis fieri: at sensus inest vniuersis particulis, quæ quocumque nervi particeps sunt. Iam tendit, tanto durior est nervo, quanto ligamento mollior: quin & mole corporis talis, ut qui ex ambobus maximè factus sit. Et ligamentu quidem omne infensile: nervus autem omnis sensu præditus: tendo verò, neq; infensilis, quia est nervi particeps: neq; infensilis vi nervus: nō enim est nervus tantu. Quatenus igitur ligamentu nature est particeps, eatenus hebetatur in eo acrimonia sensus. Cum namq; ex fine musculi ornatur, multo maior nervo qui descendit in musculum, liquet vtriq; nō ex nervo tantu ipsu consistat esse, verum etiam aliquid momentaneu ex natura ligamentorum fuisse. Multis quippe locis sexcupla, multis etiam decupla crassitudine nervu superat. Et merito sanè taneus & talis est factus, ut qui & nervi, & ligamentu vsum exhibiturus erat. Alligat enim musculum subiectis fibris, in quorum capita munita cartilagine inseritur: & hac quidē ratione nihil differt a ligamento. Sentit autem, atq; mouetur, quia ratio ne nervi est particeps. At nervus ipse via quædam existens faciliatis motricis, a cerebro descendens, ut eā communem faciat, extensus est, atq; ligamentu commixtus. Tendo itaq; sic ex vtriusq; consistit. Omnis igitur tendo, in eo omnino inferitur: non tamē omnis musculus definit in tendonem. In nullo enim musculorum mouentiu linguam (constat enim ex varis musculis) tendo nascitur. Nullum si quidem eo erat lingua motura, sed editura vocē articulata, & saporis diudicator, & masticationis atq; deglutitionis adiumentum futura. Iam cor plurimu à musculo differt, & crassitudine, & formatione, & contextu, & duritie, sicuti & eiu opibus. Perpetuo quippe mouetur cor, cum systole, cum diastole, idq; circa voluntatem impetu. At musculus esse similes motus sunt, nec sine voluntate fieri vnuquam possent. At labra oris, ex cute musculusq; concreta, absq; offese mouentur. Similiter oculi, motum habent voluntariu à musculis: nullum autē eis cum eis motu. Præterea & cutis que in fronte & superciliis est, cum plurimæ partes faciei, osibus quiescentibus, motu voluntario mouentur. Quod si stomachus ipse, vel ætiophagus, musculus etiam est, erit vtiq; musculus: neque in tendonem definit, neq; os secum nouens. At qui in ceruice verticis suscipientes vtriusq; & qui in sede etiam est, quinq; in testes & penem descendit musculi, nulla profecto secum os mouent: quare à prædictis musculis nullus prius nascitur tendo. Ceteri omnes musculi, quicunq; ossa mouet, in tendones omnino desinunt. Qui verò aliud quippiam mouent, quim os, ut musculi oculorum, linguæ, testiu, penis, pharyngis, atq; laryngis, horum quibuscum sunt tendones, quibusdā minime. Musculi igitur oculorum, membranis quibuscum, sed valde aponeurosis, in duram &

nervosam tunicam adiacentem ragoidi, perveniunt: Penis autē & testium, nulla aponeurosi facta, carnis ipsorum particulis innascitur. Musculorum qui in pharynge & larynge sunt, quibusdā obfcurè quædam aponeuroses, quibusdā omnino non sunt. Motionis autem modus alibi alius existit. In lingua quidē motu omnē videre possumus: sursum enim atq; deorsum, ante & retru, sinistrorsum & dextrorsum circumferri videntur: partem etiam quasi reflexa & propensa, nonnunquam circulariter vndiq; circunducta. Sed in oculis quatuor quidem sunt recti motus: sursum, deorsum, dextrorsum, & sinistrorsum: duo autē alij circulares. Duo enim musculoru circa tempora: firmantibus enim dentes, invicem tenduntur, atq; curvantur: hianibus verò, laxantur & porriguntur. Ad hoc, in magna illa brachij motione, dum musculus flectit cubitum, curvatur planè & in seipsum cont-dum extendit illud, laxatur & exporrigit. Eisdem motus & musculis magnus interna parte cubiti apparatus habet: contrahitur quidem in flectendis digitis, laxatur & exporrigitur, dum illi extenduntur. Sic etiam & alij musculi penè omnes qui in artubus sunt, du plices motus videbuntur habere, si eos denudaveris cute. Sed musculi proprii motu, quoniam & figura diversis, possedit, contractis crumetis similes. Ceterum septu transversum simile est tali cuiuspi rei, nisi quod non perforatum est. Accidit autē abdominis musculus, diversum ab eis qui in artubus & facie locantur: hi enim cum tenduntur & ad principiu retrahuntur, curvantur alii autem dum tenduntur, exporriguntur: curvantur verò dum laxantur. Porro musculorum qui in cruribus, manibus, atq; temporibus sunt, nullos habet tertium alium motu diversum ab extensione & contractione. Quare illi omnes hallucinantur, qui vniuscuiusque musculi multos esse motus affirmant, ignorantēs aliā ab alio musculo gigni monem. Vterque enim oculus, quatuor rectos obinet motus, quia & rectos musculos quatuor. Habet etiam duas circulares mones, quia duos circumverentes musculos. Ergo ut ætio vna, sic illorū musculorū singulis, natura vnicuique motus inest, alius verò per accidens. Siquidē operat quicq; trahens ad seipsum particulā quæ mouetur: nō operatur autem, cum in contrarium locū ab alio musculo simul cum mota particula abducitur. Idē opō omnis pars quæ mouetur, nō vno, sed vanis vti musculis, à quibus, veluti à validis in contrariu distracta habentis, vicissim habet alteru ipsoru, nempe qui trahit, intensum, alterum qui trahitur, laxatum. Iam verò si totos musculos atque tendones per transversum abscondas, penitus dissolues motum subiectarū particularū. Si autē incidis solū, vtiq; tantu lēdes, quantu in cidi sit. Quod si vniuscuique musculoru contrariu perest, motu simul peribit. Necessē nāq; est, motum qui sibi invicem succedunt, altero percurrente, & reliquū simul perire. Nam si is motus percat, qui particulam est natus extendere, flectetur quidem primum, manebit autē in hoc statu semper, quod nō amplius extendi possit, motu extorior priuata. Quia enim extēdi nō amplius po-

Lingua motu.

Oculorum motus.

Temporum motus.

Brachij musculi.

Cubiti musculi.

Sed musculi.

Septem transversum.

Abdominis musculi.

Crurum musculi.

Oculorum vtriusque motus.

Quatuor recti, quia tendunt musculi.

Musculi singuli, ut vni cum esse motus.

Motus qui sibi succedunt in vicem, necessim est vno percurrente, perire alterum.

test, idcirco nec flecti quidem. Similiter si mori, qui natus est particulam flectere, exolui accedat, extendetur quidem primū, sed immobilis in posterum fiet, quū nō amplius ad flexionem venire possit, qua præcedite extensio sequitur. Itaq; abfissio eo qui intrus est musculo, extēsa pars in hac figura perseverabit: eo autem qui foris, flexa non extendetur amplius. Quod si rurs illam extēdas manibus, itam in priuū statum redibit. Quippe flexio ab internis, extensio ab extrinsecis editur, tum musculari, tum tendonibus. Ad hæc, si principium supernum musculi transuersum abscideris, totus ad caudam feretur. Si finem inferiorem, retrahetur ad caput. Si vtrinq; abscideris, cum concurrentem ad medium inter ipsos fines videbis: ad cō omnis particula musculi cognatum habet motū in se, ipsum scilicet coitionē. At verō, scirrlo genito in interno, aut tēdone aut musculo, pars flexa non amplius extenditur: in externo verō, extēsa non amplius flectitur: contrario modo quā in vulneribus se habebat. Quæ autē in scirrhis, cadem in phlegmone, & in cicatricum dānnē fieri cernuntur. Ergo tendi quidem sursum, & demitti manum, articuli qui in humero est, & muscularum ipsum mouentium: extendi autē & flecti, brachij ad vnam: at volui ad prouum, & ad supinum, brachij ad radium est actio. Quā verō manus rangit spinā, ea actio à quatuor articulis simul motis fit. In vniuersum autē, vniūquisq; dum tenditur musculari, trahit ad seipsum partem in quā inseritur. Qui enim in caput brachij inseruntur, sursum tendunt ipsum. Cubiti verō os extendit qui in cubito sunt, foris in ipsam aynā sinētes. Radium ad prouū qui intrus in cubito sunt, in ipsum extrinsecus terminantes. Porro quisq; dignus ab internis tendonibus flectitur. Ceterum neq; omnis motus manuū, a bone fit muscularum: neq; omnis immobilitas quiete. Nam cum duo motus sint sibi inuicem proximi, sed qui dissimiliter fiunt, reclinatio scilicet ac decidenna, reclinatio quidem actione musculari, atq; ob id voluntariē, perficiuntur. decidenna præter voluntatem accidit, nec musculo agente, sed potius quiescente indiget. Hac enim ratione, de cadere & declinare differunt: eadēq; & decorsum fecit manum, atq; demitti. Decorsum enim fertur cessantibus omnibus musculari qui in ea sunt, & corporibus ab iniurata gravitate decorsum tractis. Demittitur autē, musculari qui sub ala sunt, ad seipsos trahentibus brachium. Tertius itaq; hic decidennæ motus in ventus est musculari, præter duos illos iam dictos: quo quidem etiam si nec extendatur, nec contrahatur aliquis musculari, ad totus tamen membri motū mouetur, perinde vt ossa, aut aliquod inanime corpus. Ex ipsis autē versis musculari motibus, contractio quidem est tanquā instrumenti animæ actio: extensio autē tanq; instrumenti quidē, nō tamen actio, sed simpliciter motus. Est & quartum genus motionis, quo quidem agūt valenter musculari, quamvis haud moueri videantur: vt si manum sursum tensam esse fingamus, & in ea diu figura seruari: quia nāq; tunc musculari agunt, ideo eos moueri dicimus. Quatuor

igitur omnino differentur motuum reperiuntur in musculari. Nam aut contrahuntur, aut extenduntur, aut transferuntur, aut tensi manent. Est autē eiusdem generis quarta differentia cum prima: ambæ enim actiones musculari sunt. Porro qui musculari corpus sic constitutum aint, vt suapte natura contrahi & flecti possit, sine adiniculo animalis potentie, hi quidē minime probabilia pronunciant. Nam si vterq; musculari, quod secundum illos natus est facere, id semper ageret, nihil certē prohiberet, perpetuū corpus obnoxium esse terano affectui, qui tum sanē fit, dū inuare partes in cōtraria retrahuntur ab oppositis musculari. In exactam itaq; & perfectam flexionem nūq; corpus musculari ex seipso pervertire poterit, nisi à facultate animali adiutū: licet magis propriū sit corpori ipsius musculari cōtrahi, q; extendi. Iam verō cum ossa inuicē cōstant, vt aliquis articulus fiat, alterū quidem ipsorum est quod mouetur, alterum vcluti sedes quædam est quod mouetur et subsistat, quo modo cernis cardines ostiorum se habere. Quare necessariū manent quidem, cauitas et verō quod mouetur, convexitas adest. Vocatur autē cauitas glene & coryle: sicuti convexitas, caput, condylusq;. Verim tantū coryle quā glene est profundior, quānto caput cōdylū est longius. Cū verō hoc modo bene se habentur quæ mouenda erant, multo adhuc aptius artificiosiusq; natura cōiunxit eis, quæ motura erant. Nam musculari quidem, instrumenta motū prōduxit ex superiacentibus ossibus, in quibus sunt coryle. Inferuit autē in capita subiacentia, quæ erāt mouenda: & per hæc extēta, capinbus sursum tractis, simul cum eis totum membrū sursum trahitur. Cū autē alter ipsorum maius, alter verō minus os esset moturus, magnitudinem musculari qui motus erant, creauit proportionē parē moli mouendū ossium. Quare alij quidem lūre ex ipsis capinbus aut condylis superiacentia ossium sunt exorti: alij verō paulō his inferius iuxta corylem aut glenam, sed non multū. Pariū siquidem hoc pacto penitus fuissent, nec potuissent mouere subiectū os. Ergo nullus musculari dīctorū, extremam flexionē, aut summā extensionem partis efficere poterit, absq; animali impetu: quo quidem si prouetur musculari, medij videbis figurā ossiū inter se iunctū fieri. Quod si extremū incidens musculari, flecti membrum vltra mediam figurā videbis. Pari modo si musculari internū incidās, extēdi particulam plus medio videbis. Itaq; prævalente musculo externo, extensionem: interno autē, flexionem fieri coningit. Quare qui pollens ipsis corporis musculari fit motus, quando neuter tonum animale habet auxiliare: non æquipollens verō, cū alter solus dominatur: ac proinde necessum est vnicat cōtrāctio illius musculari, qui ad animalis facultate adiuuatur. Porro musculari, quā ad structuram quidem ipsorū pertinet, perfectē generalit possunt: ob ligamentum autē in caput ossis inferunt, prohibentur quo minus extremē contrahantur, cōiunguntq; mediam seruare figuram, nisi forit ab animali facultate moucantur. Ex dictis igitur constar, abfissio musculari

*Vires ab interno, extensio ab externo factum musculari cum tendonibus. Musculari transuersum scirrlo, in quam reuoluitur partem.*

*Musculari omni dum tenditur, trahit ad seipsum partem, in quam inseritur.*

*Reclinatio qui fiat. Decidenna si præter voluntatem. Declatio manum, atque deorsum, quomodo differant.*

*Contractio, Extensio.*

*Motionis quatuor genus.*

*Motuum quatuor differentia in musculari.*

*Tenacitudo quo fiat.*

*Musculari absq; facultate animali non possit ex quibus contrahi. Ossium motus ratio.*

*Glene, coryle, Condylus.*

*Musculari in personam ratio.*

*Media figura in motu ar-  
morum quando  
feruntur.  
Extensio quo  
musculari fiat.  
Planus racione  
si musculari.*

musculo externo, vltra quidem mediâ figuram subito infecti membrum, non tamen ad extremam: quandoquidem externus musculus non potest penitus extendere ipsum, absque animalis impetu. Hæc subscribitur quæ ab Hippocrate de figuris sunt tradita. Primum quidem, quod flectentes penitus aut extendentes quâcumque partem, dolemus. Secundum, quod mediâ istarum figurâ, minimū dolorem affert. Tertium, quod mutatione celerem in extremis figuris appenimus.

Quartū, quod diuissimè mediâ figurâ seruamus, nullā mutationē cupientes. Quintū, quod hanc quoque mutare aliquod desideramus. Sextum, quod omnis figurâ molestâ, est summè imbecilis. Nam figurâ excessus, in eorū dolore affertur: nempe quum alter musculorum agat, alter extendatur præter naturâ. Mediâ verò istorum figurâ & ab actione & à nimia tensione vtroque inhiens, in eorū iucundissima est. Quare & mutationem figurarum quidem quæ dolorificæ sunt, celerem optamus: eius verò quæ dolore caret, tardam: quippe & ipsam mutare aliquando desideramus, quia in ea etiam tensione quandū in musculo fuit, minorē tamen quim in omnibus est. Eam autem dolore carere dicimus, non quod nullus penitus doloris sit pariceps, sed quod minimi, & eius fermè insensibilis, propter paucitatem. Atque ipsam mutarum cupimus, quum cōgregatæ paulatim, sensibilis reddatur. Dum enim summè imbecilli fuerimus, ut in stomachicus & cardiacis syncopis, tunc nec breuiem quidē tensionē ferimus, nec mediâ toleramus figurâ: quod sit, ut quāvis impoñentes simus ad motus, tamen aliis aliō iactemus mēbra, aliq̃ quidē cōsequi figurâ dolore carentē operantes, sed nihil tale, prius inuenire potentes. Igitur omnes musculi, ex se quidem in extremâ contractionem fesiunt, sed non possunt hanc cōsequi, quod oppositi in contrariâ trahentes habebant, & cum illis grauitatem osium annexam.

## GALENI PERGAMENI

de motu musculorum, liber  
secundus.

Porro in mediâ figurâ, quæ in partibus cernitur, necesse est duplicem constitutionem inesse musculis: alteram, quæ neuter oppositorum musculorum agit, sed ambo quiescunt: alteram, in qua similiter vtrique agunt: quæ actio tonica nominatur. Sic autē etiam prope mediâ figuram vtriusque constitutus membrū, quæ vtriusque musculi agere poterit. Quum autem ad aliquā superantium figurarū duxeris ipsum, alteri musculi satis esse possunt actioni eiusmodi. Quare mediâ figurâ cum tali actione, neutra superantium inferior est: vnde nec ipsam simpliciter carere dolore dicamus, sed eam quæ in quiete sit. Mediâ namque figurâ cum intentione vtriusque musculi, æquæ & extremâ, dolorem affert. Quū verò in ipsâ quiete mediâ figurâ partim simpliciter est, partim nō simpliciter: simpliciter quidē mediâ omnium membri superantium figurarū: non simpliciter autē, quæ alterius oppositionis solus est: quæ quidem simpliciter mediâ est, ea sine sanguine duntaxat fuerit: de nulla tamē aliarū

exactè id dici possit. Huius autem sermonis in manu constitutus exemplum. Etenim quum in ipsâ extremâ figurâ sint quatuor, pronâ, supinâ, summâ extensione, & flexio summâ: atque figurâ quidem supinâ manus sit, quum eius concava pars, supinam est, cōvexa autem dorsum: pronâ verò huius cōtrariâ: ficuti mediâ ambarū, quum intrinsicus quidem sit cōcauū, extrinsecus autem conuexum: ac subiectus quidem est parvus digitus extensus: os verò cubiti, osi radii: quæ figurâ mediâ, potest quidem extensâ perfectè manū, potest etiam flexâ consistere: quemadmodum & alterius oppositionis mediâ figurâ consistere potest, quum supinâ est manus, & quum etiam est pronâ: certè quæ quidem simpliciter mediâ figurâ est, omnium istarum est mediâ. Quæ autem non simpliciter mediâ, vnius est mediâ vtriusque oppositionis. Alia enim extensionis atque flexionis extremâ, alia supinæ & pronæ, mediâ figurâ existit. Mediâ itaque simpliciter ex concursa ambarum dictarum mediâ figurarum consistat. Alia verò mediæ quatuor quidem eunt vniuersis, sed nulla ipsarum simpliciter mediâ totius mēbri erit, sed vnius tantū oppositionis. Aut enim extensus & cōtractionis solum erit mediâ, aut supinæ & pronæ. At quum vtrique ipsarū sit duplex, iuncta viciniam excessibus reliquæ oppositionis, sic necesse est quatuor omnino fiant. In singulis autem ipsarum, aliud quidem commune est omnium, aliud verò proprium cuiusque. Commune quidem, quod omnino vnum aliquod genus musculorum agit: reliqua verò tria tenduntur quidē per accidens, non autem agunt. Propriū verò cuiusque angularis quidem & pronæ est, ut agant quidē musculi, qui intus convertunt os radii, alij autē omnes quiescentes tenduntur. Ceterum angularis quidē, sed supinæ, est proprium, ut qui extra circumducunt, agant, reliqui verò quiescentes tendantur. Eodem autē modo & in mediâ inter pronam & supinam, ut cum summa quidem extensione soli extendentes agant, est proprium: cum flexione verò soli flectentes, quum ceteri omnes otiosi quidem sint, sed tendantur. Rem autem accuratius examinemus in hunc modum. Brachium est pars totius manus maximâ: cuius termini sunt articuli duo, quorū alter in flexurâ brachij, alter in humero cernitur: alteri illi vniū os rotundum & magnum. Altera pars totus manus, quam vnam dicimus, brachio quidē iungitur per cubiti articulum: carpo autem, per ipsum. Constitit vna ipsa duobus osibus: vno quidē, quod etiam dicitur vna: altero verò, quod radii. In articulatione autem ambo ad brachij inferiorem oram: vna quidem vbi medius locus condylorum brachij est: radii verò externum brachij ipsius cōdylum amplectitur, in glenem definens, atque circum ipsum veluti axem quendam annos cōversiones regit: quare intro quidem dum circumagitur, pna figurâ manns: extra verò, supinâ sequitur. Extendere autem & flectere manū, & articulationis cubiti ad brachium est actio. Brachij enim ora inferior dilatata, non diu circumscribitur. Vna verò, pectus duos flexos faciens sibi in vicem oppositos, me-

Figura manus  
quatuor extre-  
ma.

Figura manus  
simpliciter me-  
diâ, quæ sit.

Figura simp-  
liciter mediâ  
quæ quatuor  
plex.

Angularis fig-  
ura proprium.

Brachij disti-  
pna.

Vna  
Radii.

diāmy ipſorum cavitatem figura x literæ ſimi-  
lem efficiens, hac cavitare amplectitur medium  
locum condylorum brachij. Quum igitur con-  
cavitatis vñq; circumferuntur circa concavitatē brachij,  
extendi atq; flexi accidit toti membro. Vt  
autem in cutra partem inclinet, ſuperſcilia me-  
diæ cavitatis, cauſe ſunt, coarctantes vñq; apo-  
phyſes. Quum igitur anterior apophyſis, motus  
dux eſt, flexitur membrum: extenditur autem,  
quum poſterior. Terminus verò, flexionis  
quidem, vt anteriorem apophyſin affirmet ad  
os brachij: extenſionis verò, vt poſteriorem.  
Duo autem muſculi in paribus anterioribus  
brachij, ac tonide in poſterioribus orti ſunt, va-  
lidis ligamentis vñq; inferi. Incipiunt enim ma-  
iores eorum à capite brachij: minores multò in-  
ferius: ſeruanturq; omnes quatuor rectā ad vñ-  
nam: & inferuntur in hunc maximè locum, vñ-  
de orti incipiunt corone. Ab his igitur muſcu-  
lis vñnam attrahentibus, extenſio, & flexio fit.  
Quatuor autem aliq; principia quidem habent  
ab vñna, ex vñq; parte flexuræ, quæ in gibbero  
eſt: duo quidem extrinſecus, duo verò intrinſe-  
cus. Omnes tamen quomodo ſunt obliqui, oſi radij  
inferuntur. ad finem quidem ipſius ſuperiorem,  
magnin medio verò, parui: qui etiam ipſi dum  
tenduntur, ad principia ſimul attrahūt radium,  
& per hunc totam manum, pronam quidem in-  
ternam, ſupinam externam efficiunt. Ex prædictis igitur  
facile demonſtrare licebit, in quatuor diſ-  
ferentis figurarum non ſimpliciter mediarum,  
vñum quidem genus muſculorum ſemper age-  
re: omne autem aliud quieſcere quidē ab acti-  
one, verū extendi: vt in angulari ſimul & pro-  
na figura, in qua muſculi quidem interiores mo-  
uentes radium, operantur, exteriores autem o-  
ſioſi extenduntur. Similiter & vñna muſculi, &  
aliq; omnes in figura ea inuertuntur, quantum  
totam manus diſcedit à figura ſecundū naturā. Nec ſe-  
cus in figuris aliis non ſimpliciter medius cuſti-  
mandum. Ergo media ſimpliciter figura, præ-  
terquam quod nullum muſculum habet, nec a-  
gentem, nec qui violentè moueatur, ne aliquid  
quidem eorū quæ in membris ſunt diſtorquet:  
quare ſola prorfus caret dolore. Cætera verò  
omnes, aliæ magis, aliæ minus in verſos habent  
muſculos omnes, & tendones, & neruos, & præ-  
terea etiam arterias & venas, ac proinde dolo-  
rificæ ſunt. In ſingulari autem ipſarum, quantum  
diſcedens ab extrema conſtitutione ducis mem-  
brum ad mediam, tanto minus dolorificam ef-  
ficies figuram. Sola itaq; figura ſimpliciter me-  
dia, muſculos omnes perfectè quieſcentes exhi-  
bet. Iam verò ex dormientibus q; tantum muſ-  
culos omnes perfectè quieſcentes habent, qui ob  
ebrietatem, aut defatigationem, aut virium  
infirmiſſimam, omnes corporis partes omnino  
exolutas habentes, in mediam ear figuram re-  
ducere, ipſi muſculi permiferunt. Non tamen  
in extremis figuris vñnam particulam quivis po-  
teſt habere, dum dormit. Quęcumq; autē in me-  
dio ſunt inter extremas & mediam figuram, in  
his vt plurimum, ſomnum capimus. In quacun-  
que enim talium conſtituens membrum, muſ-  
culus circa ipſum tonicè agentibus \* commi-

ſeris ipſius figuræ conſervationem, adeò illam  
rueuntur, vt ſedentes qui diſ dormiunt, & deam-  
bulantes nonnulli. Id quod mihi olim contigit,  
qui ſermè ſtadium integrum dormiendo peregre-  
gi. Sicut qui paruum aliquod corpus flexis digi-  
tis etiam dormientes ſeruant, nec citra tonicam  
actionem vehementem. Ad hæc, inferior maxil-  
la, nō diſcedit à ſuperiori, niſi aut ebrius, aut val-  
de ignauus, aut deſicius fit is qui dormiat. Et ipſe  
quoque ſtertor, propter hæc fieri aſſolet, re-  
laxata quidem inferiore maxilla, ſupino autem  
iacente homine. Itaq; & ſupinum iacere, & hie-  
re \* cum ſtertore, aut exoluntionis, aut ebrieta-  
tis, aut ignauitæ ſunt ſigna. Ob idque Hippocra-  
tes vtrunq; damnat: decubitus autem in al-  
terum latum commendat: ſicvtri & mediocrem  
ſeruant. Extremæ igitur inferioris maxillæ figu-  
ræ, ſunt, tum quæ maximè hiantibus, tum quæ  
dentibus invicem firmantibus ſit: quarum illa  
quidem à muſculis qui in mento & collo ſunt,  
deorſum trahentibus: hæc autem ab iſis qui in-  
tra maxillam ex palato oriuntur, & eis qui tem-  
porales vocantur, perſicuntur. Verum mediocri-  
ter huiusmodi, media figura fit, omnibus diſtis mu-  
ſculis quieſcentibus: ad quam motientibus ma-  
xilla inferior ſponte ſua mento accedit: omnes  
enim tunc muſculi ſua actione priuantur. Porro  
meatum excretoriorū finibus, ceu portis qui-  
buſdam, cuſtodes præſunt præuulſi muſculi,  
qui ne in dormientibus quidem permittit quic-  
quam externi, priuſquam ratio ſuſſerit. Contin-  
git autem iniunctis nobis aliquod excrementum  
externi, aut reſolūti his muſculis, aut ratione  
deprauata, vt in phreneticis: aut etiam ratione  
& muſculis grauatis, vt in ebriatibus. Temera-  
ria igitur ſententia eſt, quæ aſſerit dormientium  
animam quieſcere: quandoquidem ceſſatio illa  
uon quies perfectæ, ſed intermiſſio vigoris exi-  
ſtit. Non enim ſenſus expertes penitus ſunt dor-  
mientes, ſed difficulter ſentientes: ac proinde a-  
ctiones quæ in illis ſiunt, non omnes ſunt natu-  
rales, ſed ex eis multæ animales exiſtunt, quom-  
nimirum variè transferant membra, nec nō dor-  
mientes loquantur. Ac reſpiratione ipſa, actio exi-  
ſtens phrenon & muſculorum thoracis, motu  
etiam fit voluntario, eſtq; animæ, non naturę o-  
pus, nempe iudicio ſubdita: quippe mouere mu-  
ſculos, animæ officiū eſt. Etenim ſi quæ ſiunt, ſe-  
dere potes quæ viſi, & quæ nō ſiunt, facere, id-  
circo aut tardius, credens & rarius, hic motus  
eſt voluntarius. At motus arteriæ & cordis, quā-  
doquidem non ſubiciunt noſtræ voluntatis im-  
pero, non animæ, ſed eſſe opus nature dicitur.  
Reſpirationi itaq; etiam inter dormiendum do-  
minatur voluntas, etiamſi id non aſſequamur  
mente. Siquidem neq; palpebrarum motus, neq;  
aliis multis actionibus animalibus animū adhi-  
bemus ſemper dum vigilamus. Quare quam  
cauſam in vigilantibus dixeris, quod ſepe non  
animaduertant particulares actiones: hæc etiā  
& ad dormientes & grauius oppreſſos transferre  
licet. Multos enim homines interdum actiones  
quaſdam eſſe conſtat, quār paulo poſt pen-  
tus ſunt obliui, quod inter actionibus tota men-  
te non fuerint. Pars quippe animæ imaginariæ,  
quæ

Dormiens Gal.  
inferius Radis  
abſoluit.

Stertor quomodo  
de accidet.

Decubitus ſup-  
ino damnatur.

Dormitio ſuo al-  
terum latum cō-  
mitari abſoluit  
poterat.

Maxilla inferi-  
ori figura re-  
tinetur à quib.  
muſculis ſiunt.

Maxilla figura  
media motu  
liberè accedit.

Muſcoli excre-  
mentorum reſer-  
uari dicuntur.

Dormientes nō  
eſſe omnino ſen-  
ſus expertos.

Reſpiratione eſt  
voluntarius mo-  
tus, opusq; ani-  
mæ.

Motus voluntas  
reus qui ſit.

Motus arteriæ  
& cordis eſt  
naturalis.

Imaginariis  
motu reuerſari.  
quæ

Extenſio, flexio  
que brachij, à  
quibus muſcu-  
li ſiunt.

Figura anguli  
et media, ſola  
prorfus caret  
dolore.

Summaris qui-  
bus capitur ſi-  
gnis.

quæ etiâ & recordari videtur, si insignes impressiones rerum imaginatione cõceperit, cõseruat perpetuò eas: atq; id quidem est memoria tenere. Sin verò obliuiscas & penitus superficialias, non cõseruas: & hoc est obliuiscas. Ob idq; in vementibus animi affectibus, nullius eorû quæ egerint, in posterum meminerunt. Quid igitur nunc est, in somnis obliuiscas agente anima, obliuiscas etiâ imaginatione fieri, idcõq; neg. stabiles, quò id etiâ in vigiliis contingat? Quod autem

*Respirationes  
libera, forent  
quendam libe  
rationem consi  
dero.*  
*Voluntaria o  
pera duplicia.*

*Tactus nã  
lax et non in  
gram.*  
*Respirationis  
natura.*

*Natura con  
suetudinis  
aliteram, in  
venit medi  
figurat dolor  
carum.*

*Dolor ex  
põrte figura.*

*Spina figura  
media nã  
recta.*

omnes homines quo tempore cessant ab actio  
nibus necessariis, medium figuram & dolore ca  
rentem in omnibus partibus habent. Verum in  
lingua quidem per coniugationem omnes mus  
culi orti sunt: superne, inferne, & à dextris, & à  
sinistris: quare nihil miri si in contrarios motus  
particula deducatur, à musculis oppositis. In  
musculo autem et vesicæ, necnò diaphragmatis,  
aliter habet negotiû. Nam quum singulis harû  
partium vnicus tantum fit rotundus, sine villo op  
posito, musculus, in cõtrarios deduci motus hæ  
particulæ non æquè faciliè possunt. At musculi  
qui est ad vesicam & anum, officii est, nõ excer  
nere superflua alimeti, sed retinere: nisi forte per  
accidens, quum desinent agere. Cæterum in stru  
menta excrementis, duplicia genere sunt. Eorum  
quippe alia animæ, alia naturæ sunt. Atq; animæ  
quidem instrumenta semper motu voluntario  
agunt: in strumenta verò naturæ, aut ipsam. At  
phrenes quidem, & omnes musculi epigastrici,  
instrumenta animæ sunt. Intestinalium autem  
structura, vni cum vetriculo, ipsius naturæ. Mus  
culi itaq; epigastrici omnes, quum agentes ten  
duntur, premunt intro naturæ instrumenta: hæc  
autem, si phrenes ipsis cedant, in illarum locum  
ab euntia, musculorum violentiam exolunt. Sin  
autem resistit, nunc ceu à duabus manibus pres  
sa, extrinsecus à musculis, intrinsecus à phreni  
bus, anteriore quidem parte cartilagini pecto  
ris, posteriore spinæ coherentibus, ea quæ con  
tinentur in cavitatibus illorum, fortiter propul  
suntur: quo tempore musculi anni est oculus.  
Cæterum in egerendo quidem, superiores: in  
merendo autem, inferiores magis tenduntur mus  
culi. Simul autem cum ambobus extenduntur  
musculi seruantes respirationi: vt videlicet oc  
currant vetriculo & intestinis, ab epigastrico in  
ipso propulsans ad regionem thoracis. Cum expira  
tionis nullus musculum omnino est opifex: sed  
videtur hoc ipsum opus, aut potius affectus tho  
racis, omnino esse similis decedente illi à no  
bis expofite. Etiam autem est spiritus confer  
tim emissus ab intercostalibus musculis: quod  
etiâ thoracis opus, dicte reclinatio, quoddã  
proportionem respõdet. Verum quæ expirationi  
contraria sit inspiratio, etiam non verò vehemens  
inspiratio, priorem quidem oppositionem so  
læ phrenes efficiunt: alteram verò intercostales,  
cum musculis qui ad thoracem ex collo, scapu  
lisq; proveniunt. Quum autem maxima quiddẽ  
inspiratio per externos, maxima verò expira  
tio per internos intercostales fiat, iustius vnq;  
quispiam musculos thoracis externos, iis qui  
thoracis parte interna sunt, quàm phrenibus,  
oppositos esse dixerit. Porro diaphragma i  
plum, vbi agere desinit, laxiusq; fuerit, nunc qui  
dem ipsius cõuexitas versus spinam vergit, nunc  
verò ad ventrẽ: multò tamen promptus versus  
spinam fertur. Estq; in omnibus figuris hominis

(vna excepta prona) superius quidem diaphra  
gma, inferior verò spina: quare merito ad eam  
vergitur: tum quia grauatur quiddẽ ab his quæ an  
teriori parte superacant, tum quia retrò molis  
simum & tenuissimum omnium viscerũ habet pul  
monẽ. Duplex igitur quæ sit tensio omnib. mu  
sculis ani ex  
terna manus  
est non excre  
mentis cõstru  
gent.  
Excrementis in  
strumenta du  
plicia.  
Phrenes.  
Intestina sunt  
naturalia in  
strumenta.  
Epigastrici mo  
sculorum opus.  
Expirationis  
nullum muscu  
lum esse opifex.  
Efflatio quid.  
Inspiratione re  
spiratio con  
traria.  
Inspirationem  
maximam fieri  
per externos  
intercostales  
musculos, vt ex  
pirationem per  
internos.

*Respiratio  
libera, forent  
quendam libe  
rationem consi  
dero.*

*Tactus nã  
lax et non in  
gram.*  
*Respirationis  
natura.*

*Natura con  
suetudinis  
aliteram, in  
venit medi  
figurat dolor  
carum.*

*Dolor ex  
põrte figura.*

*Spina figura  
media nã  
recta.*

*Tactus nã  
lax et non in  
gram.*

sculis, vna quidem, quum agentes in seiplos coeunt: altera verò, quum à musculis oppositis extenduntur: priorem quidem placentem, in inspiracionibus non violentis habent: altera verò sit, alijs musculis ventris agentibus, alijs intercostalibus, & his etiam solis. Verum musculi costarum & ventris, quando quiescunt, convexi perpetui sunt: quum autem agunt, intrò cedūt, minuscule curvi fiunt, contrò quàm ceteri omnes aliarum partium musculi.

### GALENI PERGAMENI de vteri dissectione, Liber unus.

Vterus inter vesicam & intestinum rectum.



Collum vesicae funnata, & collum casti nam.

Vteri modicus magnitudo.

Pudendi mulieris descriptio.

Cornua, sive apices vteri.

Vteri descriptio.

Terus sub peritonio, inter incumbentem vesicam, & rectum intestinum, suam sedem forsitur. At verò foraminum vesicae circa pubem sita est, collum brevius & laxius habens, quàm vesica virilis, quod inter ossa pubis ad foraminum pudendum extriditur. Rectum verò in testinum osi sacro, & quibusdam spinæ vertebrae innititur: ac proinde spina circa id incurvatur. Magnitudo vteri non squalis omnibus est. Ceterum magnitudine moderatus, superna quidē extremitate est propinquius umbilico, inferna autē muliebri pudendo cōmittitur. Estque spatium ab illa extremitate suprema, usque ad oram exteriorē pudendi, ut plurimum, quod moderatum est, vnde cum digitorum. Secundum latitudinē verò, ad vtrumque latus per suos apices, sive cornua, extenditur. Ipsum autem muliebri pudendum circa externas partes pellicae eminentiā adnatā habet, instar præputii virilis. Corpus vteri, vesicae simile est: à lateribus tamen habet papillares exortus, versus lumbos nates, qui apices & cornua appellantur. In mulieribus tamen minimè reperitur scetus intra ipsa cornua, quod admodum in ceteris animalibus, numerosum partu gestantibus (multo enim minora sunt, quàm pro magnitudine factus) sed in reliqua tota vteri cavitare. Cōtingit autē moderatæ magnitudinis vterus ipsa tenuia intestina: qui verò excellenter est parvus, ea solum cum quibus coaluit. Rursus maximus vterus, nēpe qui iam factum gestat, latera implet, ac cum ventris, & multa intestina contingit. Appendet autē per fibrosas quasdam & tenues distantes intestino recto & vesicæ. Appendet itē osi sacro per quoddam ligamenta robusta, ac per similia etiā, ipsius spinæ vertebrae: cuius musculis magnis (qui memores vtriusque faciunt exortus, & in vtrumque vteri partē, & in vesicæ collū, & in sedē distribuuntur) connexus est. Laxa sunt autem hæc omnia ligamenta, & ob id vterus plurimum moveri, & habitu suo transmutari potest. Sunt ligamenta alia & appendices quæ in ipsum vterum inseruntur, partium quidem eius corpus texentia: quorum pars non exigua vteri nervi ab spinali medulla ori: partium verò incrementū & nutrimentū ipsius vteri, itēque scetus gratia, constructa: ut sunt arteriæ atque venæ. Vesicæ autem & podici sic iuncta collum coalescit vterus, separari ut per excoriationem facile ab ipsis possit. Coalescunt etiam ei testes & seminales vasa: quemadmo-

dum cum pudendo ipse circa extremitatē suæ collū. Tam verò à vena cava, & arteria magna illi incumbente, exoritur dux venæ, & dux arteriæ, vtrumque sanè vna, vena quidem à vena cava, arteria verò ab arteria. Deinde altera quidem à dextris ad dextram, altera verò à sinistris ad sinistram vteri partem delata, antequam in ipsum vterum inferantur, ramulos ad testes extendunt, posteaque in vteri corpus se infundunt, atque intertexunt ipsum. Hæc itaque quaruor vasa, paulò inferius sunt sita, quàm quæ deferuntur per renes: venæ tamen multo sunt arteriis maiores. Aliæ præterea venæ & arteriæ, ab vtraque vteri partē, circa collum ipsius inferuntur, ab ea quæ ad pudendum & sedem pervenit, manifestè distinctæ. Ipsum autem vteri corpus dux constituit tunica obversum potest, ad distensionem & contractionem aptissimæ: quarum externa quidem, nervosior, simplex, & vna est: interna autem venosior & duplex: cuius partes commixtæ quidem inter se, non coalescunt tamen, nec priores vniuntur, sed se duntaxat contingunt, & à circumfusa tunica connentur. Si igitur per excoriationē eas separare cōtemus, duo videbuntur tibi vasa esse, sub vna eademque tunica sita. Hanc enim tunicam velut vterum in duas partes separare amplius non potes. Habet autem multas asperedines illa venosa tunica, maximè circa fundū. At nervosa quæ ipsam ambit, multo crassior quàm vesicæ tunica est, & ipsa multis venis arteriisque intertexta. Ceterum collum vteri musculoso existens, ex carne natum est dura cartilaginosaque: ac progressu temporis adeo cartilaginosa evadit, ut quæ sæpius perierunt, aut iam aniculae sint, his multum durum & cartilaginosa existat. Habet autem in se foramen, per quod excurrunt menses, actum vteri semen exopit, tum egreditur partus. Finit autem collum ipsum in muliebrem finem non rectum, neque rectū in omnibus: sed declinat in sinistram, & dextrā, sursumque & deorsum. Quod autem ad anteriorem & posteriorem partem attinet, similiter se habet in omnibus. Consistentiam etiā vteri, pro ætate atque affectuum ratione, connngit variari. Quin secundum naturam, crassius quidem & magnus, ac tumidus apparet vterus, lunari purgatione procedente. Siccus autem & tenuis est, qui longissimè ab eo tempore abest. Crassior item pregnantis: crassissimus, eius quæ sæpe peperit. Rursus, eius quæ iam concepit, crassius est: eius verò quæ partui est vicina, magnus simul & tenuis. At verò testes sumuntur à lateribus vteri siti sunt, singuli ab vtraque fundi parte, prope cornua magnitudinem multo minores quàm in maribus: figura item & corporis miscella omnino multum differentes. Latī enim sunt furcines, rotundi verò & oblongi maribus: & glandulosi quidem illis, tenera verò carne masculis. Complectitur autem vtrumvis eorū propria pellicula tenuis. At hystrum feminei testes non habent: eis tamen & arteriæ & venæ inferuntur, ex eis quæ ad vterum tendunt, in singulos singule progredientes. Verò cōmissa inter se hæc vasa priusquam inferantur testibus, instar cæsariæ intorquetur, nō secus quàm

Vteri vasa.

Vterum cuncti rones duas tunica.

Vteri collū cartilaginosa.

Vterus gravidus tum crassior.

Testes femininorum sunt.

Testes femininorum in astra lunari quoque de ferrent.

Testes femininorum pellicula.

Testes femininorum cæteri sunt.

Testes femininorum vasa.



*Seminaria vasa in feminis.*

quā in ipsīs maribus. Ceterū feminaria vasa, quæ & ipsa continent semen, prope testes quod sunt ampla, sensilemque possident cavitatem: angustiora verò ac veluti nō causa redduntur, paulo longius inde progressa. Deinde rursus iuxta cornua dilatarunt, ubi sanē in vterum inferuntur. Porro prægrante muliere, primò quidem intra vterum secunda producit: dein tunica factum ambientes, ac demum fœtus. Secunda ipsa, vasa multa sunt, tum venarum, tum arteriarum, ex propinquo inter se sitæ: quarum ipsa intermedia, membranis quibusdam expleantur. Ex tunicis autem ipsīs, altera totum factum amplectitur, altera uicumbit duplicata circa caput, clunes, ac pedes eius. Ac vocatur quidem illa agnina, hæc autem fœrciminales. Ambæ autem candidæ sunt, ac tenues, ferè araneæ telæ consimiles. Adnascitur secunda vterum in hunc modum. Vasorum vtero oscula, per quæ mulieri menses purgantur, aperiantur quando mulier est conceptura. Con-

*Prægrante muliere, quæ prius signatur, secunda deservit.*

*Agnina mulierum.*

*Fœrciminales. Secunda vterum cum vtero.*

*Conceptionem fieri aut incipere, aut fluxum, aut defluentibus.*

*Conceptio cum antequam fluxus mensis incipiat, fieri non potest.*

*Asperum quādam lane, spiritum ad conceptionem. Secundum ipsa vasa, spiritum ipsi vtero accere.*

*Coryledones, si ut acetabula. Vasorum secunda propter ipsa.*

*Vmbilicus quid.*

*Vrugin.*

mor autem non modicus in vtraque continetur membrana: flatus quidem in fœrciminali, albidior verò in agnina, & copiosior: quando quidem hæc altera maior est, vi potius vniuersum factum contegens.

*Agnicum membrana nam contegere totum fas-tum.*

## GALENI PERGAMENTI de Semine, Liber primus.



N semen sit tum materiale, tum efficiens generationis principium, ut Hippocrates quidem professus est, an efficiens tantum, ut Aristoteles antumax, nobis venit considerandum. Quod dignum ex animalibus brutis, quæ quidem retinent semen, omnia etiam concipiunt, minime autem quæ excernunt illud post coitum, ipse didici experimento: id quod etiam in mulieribus postea exploravi, quæ quum hæc de re percontatus essem, responderunt mihi, se quendam, circa vterum, motum percipere, ut qui veluti vellatur, & paulatim in seipsum contrahatur, ubi semen concipiant. Quibus etiam & scripta medicorum subscribunt, & quæ ipse etiam expertus sum, per refectiones animalium prægrantium, quorum omnium vteri apparebant factibus obvolvi. Videntur enim vteri (ut Platon ait) veluti animal quoddam, proli desiderio affici, & ob id attrahere in se ipsos semen, & circumcirca in rugas cōplicari continere, quemadmodum & hoc ipsam viris aliquando evidenti sensu est perceptum, nimirum ad cucutibulæ medicinalis similitudinem attrahente vtero ipsorum pudendi. Maxime autem contingit hoc, cessantibus iam ipsis mēstribus, quo præcipue tēpore vteri semen concipiunt. Porro qui putant Aristotelem quidē voluisse, semen masculi cōnecti in vterum, principii motus menstrui recremento imponere, ac mox excerni: quicquid partem fieri fœtus ex Aristotelis sententia existimant, vtrique mentē illius viri ignorarūt. Is quippe, veluti ex ligno & fabro fit mensa, sic ex menstruo sanguine, & mortuo principio viri, fœtum conficitur ait. Quapropter & nonnulla animalia, nec excernere geniturū affirmat, sed distribuere tantum in feminam animalē caliditatem, effecit talia ex insectis quædam: ita ut femina quidem articulum in marem demittat, cominoraturque in complexu per multum tēpore, corpus quidem accipiat nullum, sed solam facultatem formantem, & formam ipsam specificantem. Tam verò, quod ipsemet Aristoteles ait, inuari & dissolui geniturum in vtero, alienum à ratione videtur: quum nimirum conceptionis tēpore, minores & minus instanti cernantur vteri. Ceterum, etiam si id concedamus, persequarimur postea, vtrum in ipsa amplitudine vteri, menstruum quidem recremento consistat, semen autem acuatim allabens, ipsum percutat, atque exhibito motus principio excernatur rursus, per ipsius vteri collum: an potius eo tēpore quo femina masculo coit, semini obviam menstruum sanguis feratur, ut suscipiat eam, quam illo assequitur, facultatem. Verumque tamen absurdum. Nam si in ventre vteri acuatū, ac longo

*Bruta excernunt semen post coitum, non concipiunt.*

*Vteri proli desiderio affici, veluti animalia quædam.*

*Semen quo præcipue tēpore concipitur. Aristotelem interpretatur Galenus.*

*Aristoteles opinio improbatior.*

Grumus quan-  
do fiat.

Vterum ad pu-  
dum procre-  
are, ut est ob-  
viam semini.

Membram ob-  
viam semini in  
vtero.  
Hippoc. corpi-  
re aborsum, ci-  
tra quam in  
fuo illo inveni-  
endo est polli-  
cium.

Semini praebe-  
re generationi ve-  
ni arteriam. Et  
venam. primo  
organum.

Natura nihil  
frigida malit.

tempore contineatur menstruum, non amplius  
vitiq sanguis hoc fuerit, sed grumus. Quando-  
cunque enim exciderit sanguis ex vas in quodq  
organum cauum in animali, statim fit grumus.  
Nec reperio quo pacto etiam semen sine sangui-  
ne excerni possit, cui quo convenit & conspirat  
in idem iuxta amplitudinem vteri. Si vero ob-  
viam venit femini sanguis, oportet sanè ipso-  
rum congressum in vasculis oculis fieri. Verum  
si hoc ita habet, vnum in tot partes semen dice-  
mus dividi, quot sunt ipsa vasculi ocula, ut ad  
singula sua pars deveniat: id quod feminis vi-  
scolitatis adversatur, & altera moderatè substan-  
tia opus habet, quae dividat ut coherens sibi  
maneret: quod longe convenientius est ipsi sub-  
stantiae feminis. & tertia alia substantia non indi-  
get, praeterquam attractione vteri, & feminis ex-  
tractione. Quemadmodum enim venter ubi ci-  
bos appetit, cum fundo suo ad galiam recurrit,  
qua nimirum veluti manu vititur: eodem modo  
vterus qualitatem feminis concupiscens, it ob-  
viam, ac totus quidem ad pudendum accurrens,  
collo ipso, veluti stomacho, ad similitudinem ma-  
nus, vititur, intrudenti confertur semen. Itaq si  
quando hic stomachus debilitetur, semen attra-  
here non potest. Quod si etiam allabatur vasculi  
oculis semen, & rursus exciderit, discuntatque  
in aërem, quod per Deos erit principium fetus.  
Primum etenim invenire causam oportet ipsius  
elapsus sanguinis, femini appropinquantis, ex  
singulis oculis vasorum vteri: deinde alteram,  
quae totum in idem coaceruet: postea autem &  
causam membranae totum hunc sanguinem for-  
mifecus cooperientis: quae quidem non ex ratione  
tantum, sed ex eo quod apparet, necessitatem  
habet. Apparet enim nobis orbiculatim ipsum  
conceptum continens statim post conceptio-  
nem primam. Nam & trum & quatuor à prin-  
cipio dierum sepe exodit mulieribus genitura  
tenui contenta in volucrio: id quod ex refectio-  
ne animalium licet deprehendere. Videbis eum  
manifestè vterum quidem totum circum semen  
contractum, membranam verò huic obvolutū:  
quam quidem excrevit illa nequissima mulier,  
quam Hippocrates (ut ipsemet fatetur libro de  
fetus natura) prudēs ac volens cogit facere ab-  
orsum. Colatrens namque bisiphi semen, quo  
tempore ab vtero attrahitur, extenditur qui-  
dem & dilatatur, nempe omnibus vteri parti-  
bus aequaliter appetentibus ipsum. Propterea  
verò quod viscosum & crassum est, calidis cor-  
poribus conversatur, facili in membranam coa-  
lescit, quae iuxta vasorum ora ex ipso vtero pen-  
det, de cetero in totū illi subtenit. Porro vena,  
arteria, & nervus, prima & communissima ani-  
malium organa, à quibus omnes partes reguntur,  
non ex sanguine, ut Aristot. ait, sed ex semine ge-  
nerantur: nimirum alba & exiguia quā sunt. Quod  
si sanguinem transmutās natura, ex rubro face-  
ret album, ex liquido crassum, viscosum ex le-  
vi, ut ex eo rectè illa vasa cōpigi possent, labo-  
raret vitiq frustra, studens huiusmodi parare san-  
guinem, quāle à principio habet semen. Atqui  
natura ipsa nihil frustra molitur: cui quidem  
nullū maius operis precū accidere potest, quā

principium optimè excerptum, ut quod non solum  
medium tonus, sed potētia etiam totum esse dic-  
tatur, vel testimonio Aristotelis. Absurdū itaq  
fuerit dicere, statim in ipsis auspiciis frustra ope-  
rari naturam: habentēq album & crassum &  
viscosum humorem, ad neruorum, venarum,  
& arteriarum generationem, eicere quidem  
hunc, ut Aristoteles putat, ex sanguine vero al-  
bum similem gignere. Si nanc exangiem esse ho-  
rum trium organorum substantiā natura vult,  
siue crassam, siue extendi, & in fistulā modum  
cauari, ac quālongisimè progredi citra divul-  
sionem, ad haec omnia certè nihil substantia fe-  
minis reperiri posuit aut cōmodus, aut aptius.  
Est autem semen vitali spiritui plenum. Quare  
maximè contrarius hic fermo naturae operibus  
est, si excerni quidē in aërem dissolutorum, ipsum  
dicamus, retineri autem sanguinem mensurā,  
ceu benignissimum, quem vt alienum natura  
excernit singulis mensibus. Non enim est fami-  
liaris vtero sanguis mensuris, sed ipsum semen:  
& propterea susceptorium liuius organum na-  
tura constituit vterum. Quantum igitur ex fe-  
mine vterum ipsum cōtingit, hoc est statim mem-  
brana. Reliquum verò totum, labiuit quidem  
& ipsum insitas facultates: attracticem quidē  
familiarium, & per quam retenturum, & altera-  
turum, alimentūq sibi futurum erat: expulsi-  
cem deniq alienorum & superfluatorum. Habuit  
praeterea & familiares materias quas attractio-  
nem erat ab vtero, sanguinem videlicet & spiri-  
tum, per ocula quibus connexi est. Et sanè haec  
statim à principio per ambientē membrā nō-  
dum durā factā, attraxit. Ad finem verò, tan-  
tū per foramina illius, ob attracticem perpe-  
tuam, obq intervētum humorū, minimè coale-  
scentia, sed ad petta magis, per quae scilicet fere-  
bantur materies. Solet autem alimentum non  
semper pari copia, sed iuxta proportionem au-  
gmenti illius quod altius, aut exiguū, aut co-  
piosum assuere sanguis quidem ex venter, spiri-  
tus verò cum sanguine tenui, modico & calido,  
per arterias, vtrūque ad propriam suam cauita-  
tem. Quin & temporis progressu necessarii est  
hanc viam in fistulā modum cauari, ac vas fieri.  
Ceterū quandoquidem impossibile erat, se-  
men ad fundum vteri illapsū, ipsum totum  
illunire, vitpote qui exortus vtrūque veluti cor-  
nua quaedam haberet, haec sanè formio femi-  
nae illeuit natura. In haec siquidem cornua, sin-  
gula ab vtraque parte existentia, vas seminale se-  
ingent, ex femine profectum testibus. Quan-  
do igitur simul sub idem tempus, cum mātē  
semen femina emiserit, ipsum muliebre semen  
per vtrūque eiectionum cornu, delatimq in me-  
dium vteri spatium, simul quidem oblitui vas,  
simulq ad masculi semen perveniens, vni cum  
illo miscetur. Sic ita per membranas ambo mu-  
tuō innectuntur, quae tunc in sua profectio-  
nem ipsū muliebre semen produxit, vt totam geni-  
turam amplectens, hanc fetus vilitatem prae-  
staret, & vt veluti alimentū quoddam, masculo  
femini fieret: tenuius enim est illo, & frigidius,  
familiarius verò omni alio ad ipsius nutritio-  
nem. At verò fines illi vasculi, per quos singulis  
men-

Principium di-  
ctar potētia  
esse totum.

Semini substā-  
tia quibus re-  
bus aspersa.

Semē vitali spi-  
ritu cōplēnū.

Sanguis men-  
struum non est  
se familiarium  
vteri.

Membrana ex  
qua femini  
parturitur.

Semini esse  
quatuor facul-  
tates natura-  
les.

Semē quod ma-  
terias trahit  
ab vtero, et  
per quae ma-

Seminalia va-  
sa seminale pro-  
fecta aristoteli,  
superiora in tot  
vna matrice.

Semē muliebre  
magis vili  
in vtero.

Semini femi-  
nam tenuius  
frigidiq ma-  
gis.

*Acerabula quæ Coryledones. Secunda quæ ducatur.*

*Farcinales membranae sunt, quæ suspensæ sunt.*

*Corde & hepate generatur.*

*Cor mouet per prius.*

*Venerum, arteriarumque generatur.*

*Cerebrum ex solo semine erit.*

*Cerebrum producit.*

*Cerebrum in alio loco sedet.*

*Spinalis medulla in toto corpore, aut in toto corde.*

*Vitam in toto corpore, aut in toto hepate.*

*Thorax primus est principis, secundus est principis.*

*Tempora generatur, quatuor.*

*Genua quæ.*

mensibus superfluum sanguinis ex toto corpore in vterum derivatur, exiunt vera acerabula, siue coryledones. Appellatur autem secunda, externa illa membrana, quam pertransiunt arterie, tum venæ, materias ipsas ad factum ex vtero deferentes. Altera autem membrana, quæ sursum ad cornua pertingit, farcinalis vocatur: quæ augescens liquidis excrementis in facta, ex ipsis suscipit alterum. Porro ex spiritu & tenuissimo sanguine, qui vni cū illo per arterias ad factum confluunt, calidissimū ex visceribus ipsa natura constituit. Alter verò sanguis crassius, speciem hepatis originale producit: atque hanc etiam plerūque venter per secundam late persequitur. At arterie ad aliud calidissimū viscus feruntur, quod ob excellentem caliditatem, moueri veluti flamma quædā non cessat, sed semper vicissim distenditur & contrahitur. Et venæ quidem arteriarumque, materias in hepate viscera deducunt, veluti radices ipsorum exiunt. Quæ verò protendantur in totū factum, tunicas similes sunt, in multis ramos distractas. Generatio autē his est, ex substantia feminis in fittale modum cauta. Tertium verò principium, à quo omnes productū sunt nerui, generationē ex solo semine habet. In permutatione quippe ipsius ad semē muliebri, multæ bullæ sunt ruptæ, ex quibus intro & ad profundū spiritus seipsum seruare cupiens, concessit. Neque enim veluti vapor erat, sed per se mobile animalis principii, quemadmodum & ciuitatem spiritus plenam, ex circumsistente humore produxit feminis. Quod autem neque etiam inde promptē euacuaretur, firmam sibi domum fecit ex liquida feminis substantia, quæ ipsam ambit: id quod in ea crassius & durius erat, ad externum lineamentū extrudens: quod vni ipsius progressu temporis calefactum & refectum, erat futurum os. Hec in principio quidem facultas opifex, ac fingens animal operatur: nondum tamen apparet, præ paruitate. Quando verò primum apparere incipit, maxima sunt tria hæc ex vicino inter se sita, & se invicem contingentia. Principium quidem neruorum futurum, quod cerebrum appellamus, in alio sede locatum: cor autem & hepar (quæ sese mutuo contingunt) sub dita. Quæ principia tria, longius progressu temporis disparantur, & in totum, quod eis efformatur, animalis corpus transmutantur germina. Spinalē namque medullam cerebrum veluti truncum quandam producit: cor verò arteriam maximam, quam sortam Aristoteles vocat: hepar denique venam cauiam. Et sanè apparet statim à principio circa medullam spinā ipsa firmata: circa cerebrum verò, calua obducta: sicuti & iuxta cor thorax, qui non solum domus futurus erat in partu, sed primum & principii palissimum respiranonis organum. Hæc igitur aliquanto posterius sunt. Ipsi autem factum generationis, quatuor in vniuersum sunt tempora. Primum, in quo seminis species vincit, & dominatur: quæ quidem consuetudo, non factus, sed genitura vocatur. Vbi verò expletus quidem sanguine fuerit fetus, cor autem, cerebrūque & hepar adhuc articulatæ sunt & informata, firmitudinem tamē & magnitudinem mo-

mentanciam iam habent, hoc tempore secundum erit. Tertium deinde est tempus, quando illa principia tria manifeste videre licet, reliquarum verò partium designationem per lineamenta, & quasi obfcuriorem quandam adumbrationem. Quartum denique & postremum tempus hoc est, quod factus omnibus artibus suis est integrè consummatas & ab solutus: quo tempore non factus solum, sed iam puer ab Hippocrate nominatur. Factus itaque velut planta, omnem generationem & formationem à semine accipit, duplexque principium motus & formationis statim ab ipso principio. Qualis enim est radicans in plantis deorsum, talis est fortibus insertio arteriarum & venarum in vterum. Qualis verò sursum vergens truncus in plantis, tales sunt in fortibus à tribus principiis exortus. Etenim natura feminis non aliis viribus producit plantam, aliis animal: sed quemadmodum plantæ semen terra indiget, ut nutratur ex ipsa & augetur: sic nostrum indiget vtero semē, ob causas easdem. Ad hæc, radices sibi generat plantæ, quibus trahat alimentum ex terra: ita chorion, hoc est, secunda, gignit vasa, fortū radices. Producit quidem truncum à seipso semen plantæ, & ab illo alios & alios ramos, vsque ad extremas propagines: at non fecus in fortu videre licet iuxta illa tria principia tres truncos natos, arteriam nempe adriam, venam cauiam, & spinalem medullam: qui in varios ramos diuancantur, vsque ad vniuersam gemuna. Quæ triplex planta animal futura est, non reiecta illa, quam à principio habuit facultas vegetariæ, sed altera insuper acquisita. Ex loco autem in locum ipsam transire oportet, ubi perfectum fuerit, ex vteroque solum: quod factus minime posset, si frigidum ut arbores fieret, & si organum ad ambulandum aptis careret. Quare duo principia acquisiuit, alterum organorum, quæ custodiuntur sunt ipsi naturalem caliditate: alterū eorum quæ subferuntur sunt omnibus ad quas concitatur actionibus. Sed his quidem posterius vteretur. Principio autem plantatio primò est vsus, quod vni quod non ex sanguine, sed ex semine, arteriam, venam, neruum, os & membranam produxit: & secundam quidem primum ei fornicem circumdedit, ac simul cum ipsa farcinalē membranam condidit, tenuem quidem, angustamque & infirmam, futuram tamen adiumentum secundæ, in materiem attractionis, susceptrumque formati animalis vrinam. Nam ad totum factum ambiendum, excipendumque vaporem desistentem ab illo, generata est tunica agnina, satis ampla & robusta. Reliquarum autem membrandarum, quibus variæ partes reguntur, nulla in primis diebus ne cessariam habet generationem: neque enim sufficeret ad ipsorum omnium opificum, substantia feminis) sed procedente tempore, dum quod antea erat semē, iam grandis factum est fetus. Ad quarum generationem natura vitur genitura viscositate: ex qua quidem quicquid crassius magisque terrecum, ac minus tractile est, ad osium regionem delegat: quæ sanè arida & terrea, pinguitudinisque experta, sed obducta membranis tenuibus, caruque operata perficit, ad id maximè vsa

*Fetus est planta comparatio pulcherrima.*

*Animal dicitur triplex planta.*

*Principii plenitudo, quæ ex semine generatur.*

*Secunda.*

*Farcinalis.*

*Agnina tunica.*

*Conitura viscosa, quibus sit generanda idem osium generatio.*

caloris vi: qua nimirū omnem glutinosam substantiam ad osibus exyget, ligamentis quibus invicem copulatur, imposuit. Ceterū ubi iplis osibus carnē superferuit, prius quā membris integer, ibi minus aridum totum eo factum est. Extendit autem & a membranis circumostialibus, etiam caribus ipsis gracilia opercula. Quin & neruum in vnamque ipsarum disperdit, ubi eo prius in fibras araneorum telis tenuiores dissoluit. Sed alias etiam fibras & si-  
 10 muliter tenues ex ligamētis productas & caribus implicatas inexit, atq; ita rursus in vnum & idem ambo coēgit fibrarum genera, totum quidem organum in quo hæc fabricavit, musculum efficiendo: id verō ubi fibræ congregiuntur, tendinem. Ligamentorum etiam non modicā partem in ipsos musculos indidit. vt nervorum, non in hos solū, sed & in viscera omnia. Est & aliud fibrarum genus in ventre, intestinis, & vtraque vesica, ad quō in vtero & corde, generatio-  
 20 nem ex femine habens, quibus veluti nexui cuiusdam totum visceris corpus circumcirca accreuit, ex sanguine ortum. Omnia siquidem quæ carnosā specie prædita sunt, sunt ex sanguine cōdita. Membranosa verō omnia, ex femine suum ortum sortiuntur. Ob id quæ ex sanguine generata sunt, si corruptantur quandoq; facile regenerantur, vt quæ materiam generationis largiamur possident. Quæ verō ex femine, aut neq; prioria, aut valde rarō, regigni possunt: quamquam efficiens ipsius causa perfectis animalibus insit. Quod si quicumq; eorum quæ ex femine ortum duxere, carne nudatū sit, caro quidem circumnascetur, simile verō illi quod densum est, nullo modo amplius inaccessibile potest: vel si Aristoteles moneat, singulorum inesse naturis, vt bisulpiis similia faciant. Etenim in id quod naturæ eius quod transmutatur propinquius est, facilis est transmutatio. Ac proinde sanguinis facilitatem est carnem fieri: diffusillimum verō \* membranā, neruum, venā, arteriam, tunicā &c. Primum igitur vnum quodq; eorum quæ nutari debent, familiarem sibi ex sanguine, ac similem succum trahit: qui postea dissolutus vaporis insit, his quæ ipsum attraxerunt, apponitur: ac tandem ab eis transmutatur, illis assimilatur. Non ergo videtur, vnamquæque primarū partium animalis à principio quidem ex femine natam esse, aliud autem esse ipsarum vitium & familiarissimum alimentum. Proce-  
 30 dunt porro arteria & vena in vtrunque testem non recta via, sed flexuosa, multisformis, in qua quidem licet videre sanguinem albescentē paulatim: postea verō, ubi ipsarum vas testem contingit, in eo plant feminis substantia iam perspicua conspicitur. Est enim vtriusque arterie tum venæ, generatrix natura feminis. Verū ex sanguine ipsam conficiunt, diuissimè in verginibus illas versato. Alteratur enim sanguis transiens in semen: quomodo omne alteratur, in suam naturam ducat ipsū quod alteratur, quemadmodum etiam apparet. Album enim & crassum & viscosum est semen, aptum vt ex eo arteriæ & venæ nutrantur. Ceterū amputatas venas, ac rursus generatas in magnis viceribus vidimus:

id quod asselet fieri conspirante in vnum robustissima facultate cum materia seminaria copiosa. Arteriam verō aut neruum nemo vnumquod vidit regeneratum, ob penuriam materiæ, quam & copiosam & valide facultati iunctam, ad eod crassiorum valorem requirit generatio. Verū iuxta primam generationem ex femine, coaceruatus adhuc est humor, ex quo vasa ipsa formantur: opifex autem ipsius duplex est, tum facultas, quæ in ipso semine habetur, tum quæ in vteri vasis, quibus allapsus est. Quare nihil mirum, prima nature organa velociter formari in foetibus. Sed nec tribuere vasis illis flexuosis totam feminis generationē est æquum, vt Aristoteles facit, prius testes facultate semen gignendi. Arteria itaq; & vena, & vasis quæ circa ipsā sunt progredientes, per illa deorium feruntur, donec perveniunt ad venam testicularem dictam, quæ iuxta caput testicali incumbit, quod epididymis appellatur, ex qua fistule multæ in testem perveniunt, seminario humore refertæ. Huic testiculari venæ & arteria & vena adnascuntur, circa paulo ante relaram obvolvuntur: cui & parvam quandam à seipsis distributionem largiuntur, prorsusquam inferantur testi. Inde feminialis micatus geniturarū hauriens, ad pudenti exortum eam subvehit. Quovisq; enim intra illa testis arteria ipsa & vena, peritoneo feruntur. Hinc verō peritonæi, vtriusq; momentaneo foramine perforatū est, & micatus ab ipso maximus ad testes descendit. In quo & obvolutio vasorum gignitur, & vas feminale ex vena testiculari enascens, ad illa ascendit: coniungens quidem circa exortū ipsū testiculum, non tamen ex ipso generationē habens. Iam verō iuxta vtriusq; meatum arteriam & venam descendente reperias, ascendens aut vas seminariū. Inde verō rursus non amplius extra pubis offa, sed per profundū & supra ipsā in declivē fertur, donec ad vesicæ perveniat collum, cui pudentum continenter collaret. Quia enim vas seminariū longissimum factum est, ob id tantam viam circumcurrit. Coniungit enim ita sanguinē in vasis mortem concoqui, & in gramos iuxta, & vas feminale longissimum & vancosum iuxta vesicæ collum existentis, genituram quam longissimè inoculari. Ceterū in quibus testes exēti sunt, epididymide intra testē, nihil tantum vas seminariū. Deperit autem animalibus nō solum emissio feminis (hoc enim us felicitate cederet, qui abstinere à venereis percipiunt) sed & virilitas & omnis masculina in climato. Sic enim si animalis feminis excindas testiculos, neq; libidine concitabitur, neque marem admittet, sed admittet feminam naturam. Quo nomine scrofe castrantur, siūque sic castrati masculis similes, atq; vberius alimentum accipiunt, pinguioremq; & suaviorē carnem, quā reliquæ scrofe, habent, quemadmodum & mares canibus. Non tamen similiter periculo vacans ablatio testis ipsi feminis est. A lateribus enim ab vtriusq; parte singuli adiacent, arteriam quidem & venam, veluti qui in masculis sunt, pampinoso formiter sibi insertas habēt: vas verō feminale ad vtriusq; cornu finiens. Nec cessarium itaque est vtriusq; latus diffindere, si  
 40  
 50  
 60  
 70  
 80  
 90  
 100  
 110  
 120  
 130  
 140  
 150  
 160  
 170  
 180  
 190  
 200  
 210  
 220  
 230  
 240  
 250  
 260  
 270  
 280  
 290  
 300  
 310  
 320  
 330  
 340  
 350  
 360  
 370  
 380  
 390  
 400  
 410  
 420  
 430  
 440  
 450  
 460  
 470  
 480  
 490  
 500  
 510  
 520  
 530  
 540  
 550  
 560  
 570  
 580  
 590  
 600  
 610  
 620  
 630  
 640  
 650  
 660  
 670  
 680  
 690  
 700  
 710  
 720  
 730  
 740  
 750  
 760  
 770  
 780  
 790  
 800  
 810  
 820  
 830  
 840  
 850  
 860  
 870  
 880  
 890  
 900  
 910  
 920  
 930  
 940  
 950  
 960  
 970  
 980  
 990  
 1000

Arteriam, vena-  
 summe ampu-  
 latam, cui res  
 generati non lo-  
 cal.

Testes primariū  
 Anatomici, facul-  
 tate gignendi  
 semen.

Testicularia  
 vasa.  
 Epididymia.

Seminaria vasa  
 in.

Peritonæi por-  
 forati.

Seminaria vasa  
 infirma in-  
 pedientia.

Spadonibus, ou-  
 mone virilis  
 non perire.

Scrofa castra-  
 ta.

Castrati car-  
 ni suaviori  
 esse.

Testis abla-  
 tio in feminis  
 periculosa, &  
 quare.

Musculi consi-  
 stunt.

Tendo.  
 Ligamentum.  
 Visceribus vni  
 versis esse ner-  
 vos indidit.

Carnosa o-  
 mnia esse ex  
 sanguine orta.  
 Membranosa  
 omnia à femi-  
 ne oriri.  
 Genita ex san-  
 guine regenera-  
 ri posse.  
 Genita ex femi-  
 ne regenerari  
 non posse.

Nutritio / vni-  
 versis ex san-  
 guine illis por-  
 tio sanguinis.

Sanguinis in fi-  
 stro deventu-  
 ra.  
 Vasi femina-  
 ria esse vni-  
 versarum  
 generatricum  
 feminis.  
 Semen ex san-  
 guine gigni.

Venas amputa-  
 tas, regenera-  
 tas, vidit Ga-  
 lenus.

*Castrati quoque accidunt.*

*Castrati sunt aliud quippe magis, quam a masculis.*  
*Testes quoque non minus praestant cordis.*

*Testes alterant immensum corpus.*  
*Carnum non ita stricte regere quippe quam grauius & virulentius.*  
*Testes quid praestant.*  
*Cum mundi principium ita.*  
*Testes bene viuendo principium.*

*Testes sunt sicut domus.*

*Efficiam cumque particulae secundum corpus solidum solida sunt.*

*Testes corpus nutriti ab humore sicut, quod contrahunt.*  
*Testes conficere semina.*

*Testes cum colorum totum corpus in feminam qualitate commutant.*  
*Faciliter foris corpus in suam naturam mutat.*

quis excindere velit: atque in hoc facit maius periculum est, quam in maribus. Porro quibus excisi sunt testes, non virili robore destituntur, perfrigeranturque, seu virum formae: alteroquin insit caloris principio priuati, neque ampla illis est venae, neque flondu sanguis, neque valde pulsant arteriae, suntque glabri vniuersum corpus, neque venere appetunt, aliud quippe magis existentes, quam animal. Quare hac parte testes etiam in ipso corde sunt praestantiores, nempe qui praeter hoc, quod caliditatem ac robur animalibus exhibent, amplius enam generi conferuando praesunt. Quam eorum facultatem insiguum, haud scio quomodo neglexerint veteres, conseruantes, an non conseruati semini, discipulantes. Alterant enim totum corpus per ipsos testes. Nec solum insinuaui est caro vicularum non castrarum, sed & qualitas ipsa carnum simile quiddam testiculorum qualitatē habet, graue nempe, & virosum. Testes itaque praesentia sua, tum calorem, tum robur, atque adeo coeundi appetentiam ipsi animali conciliant. Externum tertium hoc, neque cor ipsum exhibere potest: quare illud quidem viuendi tantum, testes vero bene viuendi principium fuerunt. Quanto autem melius est bene viuere, quam simpliciter & solum viuere: ratio in animalibus testes corde sunt praestantiores. At in senectutibus & debilibus, testes ipsi sunt laxi, contra quam in iuuenibus, formidulsi. Nonnulli ex quadrupedibus substrici quidem sunt testes, ut quibus: volucibus autem omnibus intra peritonaeum prope spinam firmitur. Iam vero vnaquaeque animalis pars humore ad se loco alimendi influentem, in sui ipsius naturam permutat. Est autem propria vnicuique particulae essentia huiusmodi secundum humorum, qui in ipsis sunt, naturam, sed secundum corporum solidorum substantiam, a quibus contentorum humorum sit alteratio. Quod quidem si sic se habet, continetur autem scrofos humor in testibus, ab huiusmodi vniue ipso rum corpus nutritur. Vnaquaeque autem pars familiarissimum sibi alimentum conficit: quare testes semen etiam conficiunt. Sed operantur ipsum tum arteriae, tum venae, quamvis paucum longo tempore: at testes non solum multum, atque id breui tempore, sed exactissime elaboratum: syncrasisma enim exacte est ipsis feminis qualitas: ac prouide omnibus animalis partibus quam celerrime illa communicat. Fortes si quidem facultates in naturam suam alterant totum corpus. Paucillum quippe delectum humoris corpori animalis illatum, totum ipsum transmutat quam breuissimo tempore. Similiter auxiliata medicamentis corpus vniuersum alterant, alterant ne venenosus contraria, non substat nra ipsorum totum corpus persoluerit (quod vitare impossibile esset tam breui tempore) sed qualitas facta distributione. Quid igitur mirum est, ex testibus in totum corpus facultatem quādam distribui, qualis neruis quidem sensus & motus ex cerebro, arteriis vero pulsandi facultas ex corde? Atque quidem facultas in maribus, roboris & virilitatis, in feminis vero efformationis existit causa. Ob idque femineum

animal excisis testibus, castrato masculo animal latet: reliquae vero omnes partes easdem facultates in vtrisque habent. Trahunt itaque serosum humorem testes, quem ipsis ante praeparant vasorum inuolutiones. Deinde ubi qualitatis ex ipso fructum ceperunt, eamque ceteris communi-carunt partibus, id quod superfluum est, in meatu seminarios deponunt, huius vero foras in coitu exercentur. Idcirco per immoderatam quidem venerem, omnia a spermatica organa, vacua & exhausta redduntur: turgentia vero, ubi adeit vix raro castissima. Trahunt itaque viulenter semen ab ipsis venis testiculorum: venae rursus a superpraepositis atque hae rursus ab his quae deinceps sunt sistit: qui tractus non cessat, donec ad omnem corporis partem transumptio ipsa perueniat: quo fit ut totius animalis partes omnes proprio alimento priuentur, donec omnium fortissima expleatur. Neque vero solum serosum humiditatem ab omnibus animalis partibus sic auferri contingit, sed etiam vitalem spiritum. Quare mirum non est, immodico ventris coitu imbecilliores reddi: videlicet illo toto corpore, utroque humore syncrasisma ablato, accedenteque ad haec voluptate, quae ipsa per se est sufficiens, ut firmitudinem vitalem dissoluat, adeo ut iam quosdam ex nimia volupate constet animam exhalasse. Igitur omnes solidae corporis partes ex femine generantur atque nutriuntur. Quippe quaeque pars, ex qua primum facta est substantia, ex eadem semper nutritur, quod nutritio expletio sit substantiae defluens. Quapropter etiam nunquam generari licet, quae cum a principio ex sanguine sunt concreta: non generari autem praeterquam alioquin venam quandam, atque id raro (quibus sua ex semine generatio a principio contingit. Ut autem de vasis seminariis rursus aliquid dicam, sciendum est, ipsa esse plena semine, vel eo tempore quo animalia venere non videntur id quod fieri potest trahentibus ipsis genitum a testibus, & ipsis testibus etiam ad illa etiam elegantibus: idque per epididymidem maximam, per quam scilicet mediam, connectuntur ipsi grandulosi testiculi seminariis vasis. Imo vero si licet fateri quod verum est, epididymis ipsa est principium & radix vasorum seminalium, quae ex toto testiculo semen in seipsum haurit.

*Excella femina, castrato majore animi laetor.*  
*Testes trahere humorem feminam.*

*Vitalem spiritum etiam rapi non humorem in se ipsa a iocunditate organum.*  
*Cito immodico coitu veniens, cum imbecilliores redduntur.*  
*Voluptas vitalem spiritum immittit non potest dissolvere.*  
*Solidas partes ex semine generantur nutritio.*  
*Naturae est ex parte substantiae defluens.*

*Spermatica va-sa esse semper referuntur.*

*Epididymis est radix seminalium vasorum.*

## GAL. DE SEMINE LIB. I. de Semine, lib. 11.

Porro testes muliebres adiacent quidem vtero, utrinque singuli, consimile vasum involuunt, veluti in qui in maribus sunt, suscipientes. Non procedunt tamen in eundem locum hae vasa, propterea quod neque foras, quemadmodum marem, sed in ipsos vteros oportebat feminam emittere semen. Ideoque veluti seminali meatui obviam euntes vteri, a latibus praelongos exortus extendunt, per quos semen susceperunt. Maxime vero plenum est vas feminale in animalibus veterem appetibus: sicut viciis vacuum a recenti coitu. Haec etiam idem aliquando non modicam co-

*Feminas non muliere foras ferre, sed in vtero.*

piam in iis quæ ex longo tēporis intervallo impregnantur in quāri sanē prælongius illis exoritur, quæ cornua appellantur, videbis manifestē humore seminariū crassiusculum. Ad hunc enim locum farcinialis membrana pervenit, necnon genitura crassa. Admirari autem subit etiam hic eos, qui dicunt vas seminale extra uterum habere ad aperta oscula, inferique in colūm vesicæ, eodem quæ in maribus modo, ac prout facinarum semen effluere. Cuius opi-

*Herophilus.*

*Seminales meatus in feminis aperti circa cervicē, intra uterum, unde semen semper effluat.*

*Prout formandi ratio.*

*Semen muliebri quod possit proferre.*

*Semen vniuersum perfectum posse ex vtroque muliebri emitti.*

*Pollentes coniungere feminas vel abque mare.*

*Similitudinis horum ad parentis consideratio.*

*Similitudo vnde oratur.*

*Animalia omnia quæ ex utero, & semine.*

*Similitudinem vtri ad feminam.*

que tandem sit causa, ob quam species animalis magis fiat secundum matrem: iuxta alterutrum parentem ipsa similitudo: hoc tamen promissio, quod natura quidem corpus præparat animæ moribus & facultatibus aptū, sed quod mores & facultates habet, ex temperamento secundum substantiam insitos, vnde etiam prima ipsorum est generatio. Contingit igitur ex his suppositis, tanquam fulcris, concludi, species animalium, ad subiectas generationi substantias, hoc est materias, consequi: & esse ipsum animal, aut equum, aut bovem, aut hominē, iuxta substantiam ex qua factum est, & non secundum facultatem illius substantiæ: mortem, formatiōemq. Ceterum nec semen ipsum facultas solū est, sed & materia quedam: nec menstruum materia solū, sed facultas. Vt enim semen ad materiale principium animalis maxime offert, sic menstruum ad potentiale conducit. Est autem semen sanguis accurate percoctus, à vase coarctantibus ipsum: vnde sanguis non solum materia generandi ipsius factus fuerit, sed & semen potentia. Quod igitur ex materia simul & facultate vnumquodque gignatur animal, omnibus in consensu est. Quod verò tum semen, tum menstruum habeat vtrique principia, non tam æqualibus viribus prædita, sed semen quidem effectuum fortissimū, materiale verò modice molis: menstruum autem materiale quidem plurimum, potentiale verò siue effectuum, maxime debile, id etiam est confitendum. Si ergo materiale gignendi principium, iuxta quod species animalis absoluitur, in solo menstruo esset situm, factus vniue ex eadem specie cum matre generaretur: quemadmodum etiam, si effectuum solum in semine esset, semper vniue similis foret patri. Quando verò vtrunque ambo ipsa principia habet, ac prædominant in menstruo quidem materiz copia, in semine autem facultatis, aut roboris: merito (opinor) speciem animalis à matre potius esse suscipi fertur, quā à patre, etiam ipsius semen ad materiale principium conferat. Similitudinem verò non magis iuxta matrem, quā patrem, refert: quāvis quod ad robur quidem seminis attinet, factum patri magis assimilari oportebat. Verum genitura muliebri etiam ad valetudinem conferens, quā facultatem ex menstruo per nouem menses prædeuntē assumpserit, tanto exuperat, quanto circa primum congressum expe-

rabatur. Propriū enim muliebri semini est, suam ipsius substantiam ac facultatem magis quā masculini, augere, atque corroborare. Non desunt quæ, si femina non solum animalis, sed etiam facultatis principium sit, supervacaneos esse masculos dicant. Quidam verò gallinarum hac parte mentionem faciunt, quæ sub ventanea & fauonia appellata oua parunt, citra mixturā masculinā. At Empedocles futuri fetus partes diuisas esse contendit, eāque partem in masculo, partem in muliebri semine contineri, atque inde etiam ipsius venerei complexus appetentiam oriri animalibus, nimirum diuisis partibus inter se veniri appetentibus. Quæ opinio longe absurdissima est, facileque redargui potest. Quæ vero sit

*Naturam præparare corpus anima moribus aptum.*

*Mores genera- tis prima ex illi præparat.*

*Species animalium ad substantias generatio- ni materias ab seque.*

*Semen esse facultatem atque materiam, menstruum autem materiam & facultatem.*

*Semen quod. Sanguis est semen potentia. Animal omne gignit ex materia simul & facultate.*

*Speciem animæ in à matre potius suscipi fertur.*

*Oua sub ventanea citra opertā gallinarum orantur.*

*Empedocles opinio refellitur.*

ro sit

rò fit causa ob quam quò ipsum fecundum animal etiam semen emittat, masculum, tamen fit generatum: aut cur generato masculo, etiam ad huc seruatur fit ipsum semen fecundum, considerandum. Præstabilis enim erat ipsum fecundum animal habere excrementum conferens ad factus generationem. Quippe semē fecundum, ex quo diximus gigni farcinalem membranam, proprium ac familiare alimentum masculo semini existit, quem fit illo tum humidus, tum frigidus, necnon magis tenuis.

Quare perperam faciunt, qui frustra ipsum generatum esse pronuntiant, impossibile esse feminam vitæ coaceruare excrementum, contendunt. Melius siquidem eos modicè castigato sermone errat dicere, impossibile esse feminam & sanguinem habere excrementum, & etiam semen prolificum, ut cui frigidi temperamenti ratione, superfluous sanguis accumulatur: forti autem caliditate opus sit ad generationem feminis exactè elaborari & percocti. Est enim humidior atque frigidior femina: calidior autem & siccior masculus. Vnde merito alteri quidem deest quæ ad exactam feminis concoctionem: alteri vero impossibile est sanguineum excrementum habere, præ caliditate & siccitate id ipsum totum siccante. Ob id igitur & animalia que siccior temperamento prædita sunt, omnia generare solent citra conversationem masculi. Deest tamen his quippiam ad perfectionem, si non assument ex illo caliditatem. Itaque possibile est animam concipere tale temperamentum corporis, quod imperfectum animal generet atque alterius miscella. Perfectum vero in seipso id concipere, sanè difficile, & fortassis etiam impossibile est. Porro rationale debet esse generatum semen, ut sitam simulatque est distinctum, substantia ipsius partim in membranam abeat, partim in vas distendatur, partim denique pulset. Quod igitur in planis est terra, hoc est in conceptibus perfectè, alimentum suggerens, donec totum animal perfectè absolutum fuerit. Et quemadmodum plantarum semini largus ex terra humor, sic animalium semini, materia in maternis venis infusum alimentum existit. Dicere autem quis possit: Si iuxta prædominans semen similitudinem particularum natum ad parentes fieri cōtingit, omnes partes alteri parenti necessariorum futuras similes, cumque tandem semen prædominabitur: id quod fecus apparet. Ceterum (ut discutiamus hæitationem hanc) quum semen ipsum similiarum partium existat, fit fecundum quidem in vtero semini vini miscetur, possibile sanè est ipsa circa effingendos factus invicem prædominari, iuxta partes diuerfas. Imò vero, etiam si dissimilium partium ipsum semen existet, posset tamen ex omni suis ipsius particula, pro etaculationis modo alterata, omnes animalis partes efficere. Prædominatur autem iuxta mixtionem in aliquibus quidem partibus semen masculinum, in aliquibus vero fecundum. At ubique ipsum præpollat, ea pars domanti fit similis. Etenim in omni particula materis opifex simul adest, seminiq; semper mouet atque conuincit seipsum. Nihil itaque miri est, utriusque parentis partes assimi-

lari circa diuerfas partes. Num igitur etiam sic de genitalibus partibus eandem assignabimus causam? quod ex ipsis hæc quidem masculina fiat, hæc autem prius fecundum? & quod masculus toto corpore a femina in vniuerso animalium genere differat? Barbae namq; & crista: & calcaria, dentisq; exerti, necnon vniuersa cornu, ut in ceruis, masculorum sunt partes: secundum quas fecundum maribus longè inferiores sunt. Differunt etiam ab illis secundum alias.

Arteriarum tamen omnium atque venarum numerus, formatio, & positio, eadem est, per totum masculorum & femineorum animalium corpus. Opinari autem, masculum animal, ubi prævaluerit masculum semen, & femineum iuxta feminei seminis gigni excellentiam, sanè probabilis est: pugnat tamen cum hoc, quod feminae sæpenumero simillima patri gignantur, & ex masculis non pauci matris. Quod igitur masculus aut femina generetur, mihi sanè videtur causam ipsam tribui debere qualitatum actuumque (que caliditas & frigiditas sunt) temperamento. Apparet siquidem masculus non solum calidior femina, sed siccior etiam sitam à principio esse: atque ob id, quam illa tempore breuiori ipsum formari tradetur. Est autè siccior, quod citius accipit formam, quod nimirum ea que præ maximo humore distillant, vix effingit, aut formari queant, nisi prius compagem firmam habuerint. Ad hæc amplas arterias, & venas, & thoracem, & omnes partium cauitates habet quod effusant, quandoquidem hoc à spiritu exuberanti & calido efflu maxime solet. Quare & arterias maiores, & fortius pulsantes habet, ac totum corpus concitatur & vegetum ad motum, alique id genus, que omnia non solum in iam ædificata, sed in his etiam que adhuc gestantur in vtero, signa sunt caliditatis prædominantis. Idcirco in dextro vtero sæpe semper masculi gestari videntur, sicut in sinistro femellæ. Sic enim testiculos dexter magis succulentos, quam sinister existit: priusq; in pubertatis tempore inflatus, generatores masculorum efficit: sinister verò maior, & posterius tumescere incipiens, feminarum genitores ostendit. Si igitur dextre partes sinistras sunt calidiores, fuerit utique hoc signum, masculum caliditatem existeret, quem enā esse sicciorē ostendimus. Quod verò ad calidum & siccum temperamentum consequatur actuum robur, omnibus est in confesso. Cur autem eiusmodi temperamento præditi, extri pendentes habeat testiculos, & iuxta ipsos pudendū prælongū, atq; ex nulla parte vterum: contri verò humidior frigidioreq; factus, testiculos intus habeat reconditos, itremq; vteros, atq; adeo totum pudendum intrinsecus, implexentiarū venit nobis considerandum. Est enim proportio maxima inter genitalia masculi & femineæ. Omnia siquidem genitalia membratum masculus, tum femina habere eadē videntur, positione tamen ac magnitudine differentia. Quin & vasa testes nutritia, vteriq; sexui ex usdē venis & arteriis procedit. Eandem enā proportionem sortuntur principia vasorum nutritiuum vterū, cum iis que sunt in sacro vtero-

*Natus postea  
seminis  
quod parentis  
fecundum dixerit  
partem.*

*Masculi &  
feminarum  
semen.*

*Generatio ma-  
sculi & femi-  
nae, tribuitur  
temperamento  
alimenti qua-  
litate.*

*Qualitates ali-  
menti caliditas  
& frigiditas.*

*Masculi tempo-  
re breuiori for-  
matur quam  
femina.*

*Siccior est,  
quod citius ac-  
cipit formam.*

*Calidior prædo-  
minans forma.*

*Masculi in dex-  
tro vtero, femi-  
nae in sinistro  
gestantur.*

*Testiculos dexte-  
ri maiores,  
sinister postius  
feminas ge-  
nerat.*

*Robur actuum  
consequitur ad ca-  
lidum & siccū  
temperamentū.*

*Genitalia ma-  
sculi & femi-  
nae proportionē  
sibi correspondē-  
tia.*

*Semen fecundum  
masculino ab-  
scentum esse.*

*Femina esse  
frigidiorem &  
humidiorē  
masculum.*

*Animalia sic-  
ciora tempera-  
mento, solum o-  
mnia generare ab-  
sque conuincione  
masculi.*

*Concipi aliquod  
perfectum ani-  
mal ab ipse al-  
terius in seipso,  
per difficile esse  
fit.*

*Semen prolifi-  
cum, quale nō  
esse debet.*

*Semen, similia-  
rum partium  
insimile.*

10

10

10

10

10

10



rum. Nec verò nervorum principium vtriusq; diversum est, sed ab eisdem medullis spinalis regionibus in artibus femininis procedit. Omnia ergo quae generales partes constituunt, in vtroque sexu existerè apparet, in nullòq; penitus femininè à masculo, aut masculinè à femininè, separari: sed uno solo differre, quòd alterae partes intus, alterae foras existit. Quare si animo volutabis, quòd in formatione animalis, quòd hieret vtero, gentales partes primam delineationem, & qualis ad-

*Genitalia masculina à femininis hoc solum differre, quòd illa quòd foras prominunt, haec autem intus existant.*

*Talparum oculi est imbecillitatis naturae, erumpere non possunt. Cane præformatione cecus catulus nascitur.*

10 vtrumque sanè modum circa viam quancumq; genitaliù partem omnè extrinsecus lineamentum, veluti septum nutritum effingit. Postquam verò opificij speciem delineavit, acervato spiritus impetu vrens, simul & quòd effusum est, propellit, & quòd continet, & ambit, simul permittit. Si vero aliquando circa ultimum opus debilitetur, ipsum quòd moliebatur imperfectum relinquit: quemadmodum perfectò circa totum talparum genus apparet, quibus lineamentum quidem oculorum intus expressa sunt, verum foras emergere non potuerunt, natura debiliore effecta, quam ut id efficere possent. Cane porro, cecus catulus parere præformatione, in proverbio est. Sarius tamen est ipsos rectè editos catulos, imperfectos, quàm cecos, dicere: vtpote post paucissimos dies visuros. Nilul igitur mirum est, quemadmodum talpae oculos intus habent, quos natura extra producere non potuit, eodem modo & genitales partes femininis intus effigatas esse, extrinsecus emergere non potuisse, propterea quòd natura ipsarum debiliore, & imperfectior sit. Verum tanto sanè femineorum animalium natura perfectior est quàm talparum, in quantum talpae nullo excitans commodo fruuntur. Non parum verò ad generis propagationem feminineum animal coufert: nam & humidius & frigidius productum, recrementa secum connaturum erat, ad alimentum sœcibus ipsis idonea. Quam enim primi & recentis factus compages laquidior sit & frigidior, tunc & principium formationis serius accipit, & finem adeò tardum non possunt. Et quum circa partes quae postremum effigantur, naturam delassari & debilitari contingat, ab solvantur etià alius imbecilliores. Expellunt autem semper excrementum supervacaneum à fortioribus ad imbecilliores partes. Quia verò omnium feminearum particularum debilitissimae sunt generales, ob id sanè in has supervacaneus sanguis pervenit, qui salubris quidem purgatio sit laciniis, prout quàm concipiant: tempore verò gestationis in vtero, idonea materia in alimentum ipsis existit sœcibus. Manifestum igitur iam factum est, in calidiori & sicciori temperamento masculum generari: in frigidiori vero & humidiori, feminam. Speciem autem, siue animalis genus, lionem videlicet, leonem, atq; equum, ad naturam materis, in animalis generationem subiecte, consequi quemadmodum sanè & formae similitudinem ad vtrumque parentem, effigiantur ac formantis facultatis esse,

*Excrementa prius semper à fortioribus ad imbecilliores partem.*

*Menstruum sanguinem id est alimentum effigiat.*

*Masculum genus in calidiori & sicciori temperamento: in frigidiori & humidiori feminam.*

*Speciem animalis ad naturam materis subiecta consistit. Similitudo forma ad patrem, unde oritur.*

quae in semine continetur. Quare trium similitudinum, tria principia habebimus: similitudinem nempe generis animalis iuxta substantiam ex qua generaturum est, fieri dicentes: formae vero, iuxta motum ex semine: vtramque est, aut masculam, aut feminam, secundum vtrumque principiorum temperamentum. Vtrumque autem principia appello menstruum & semen. Ac de his haec tenus. Deinceps aliquid & de assibus glandulosis: quos quidem qui semen & continere & generare existimant, hallucinantur. Cur enim, si & hi seminis vasa sunt, animalibus quibus testes excelsi sunt, deperit penitus coeundi appetentia? Impossibile quippe est, organa seminis generandi vim praedicta habere, ipsorum verò vsum non habere. Natura etenim, quae neq; invivilem, neq; supervacaneam aliquam particulam fecit, in istas facultates omnium corporis organorum, animalibus dedit, easque nulla institutione edoctas, ad proprias actiones obeundas. Assites itaq; glandulosi ex testium castratione nihil perpe-

*Similitudinem trum, propria tris.*

*Assites glandulosi.*

*Naturæ nihil fecisse supervacuum.*

petui, castratum animal ad venerem cōsortium non excitant, ceu quidvis aliud ponas existentem, quum organum seminale, & alterius cuiusdam utilitatis grana geniti. Porro duplicem omnium glandularum utilitatem esse, Optimus Marinus tradidit. Aut enim fulciant vasa sublimia, quae findi solent, & divulsionis periculum circa vehementiores motus sustinere: aut ob humorum generationem partes madefacere possunt, quae humectatione viscosa, & ex natura dispersa indigent, ne facile resiccata, pigre ad motum reddantur. Atq; in hoc secus quod glandularum genus, quod viscosorum humorum est productum, inferi arterias & venas ait, & quasdam in vasorum mesenterij glandulas desinere: Duplex namque & harum glandularum genus esse, quòd vilitas duplex existat: densas quidem & siccitas, quae vasa quae findi solent, fulciant: raras verò & humectas, in quas vasa inferuntur. Si igitur & oris amplitudine, & quae summum, & vniuersum intestinum certe quaedam glandulae humectant, nihil sanè mirum est etiam collo vesicae simile quoddam auxilium preparatum esse, ne resiccata aliquando, aegre mobile fiat. Ac multo magis visum simile est, huiusmodi auxilium ipsi virili pudendo à natura preparatum fuisse, propterea quòd memorabilis magnitudinis in viris lux glandulae existant. Periculum enim est, ne quum praelongum & nudum sit confectum pudendum, aliquando resiccatum obtorqueatur, & obstructus meatus eius cōnuet. In faciem sanè ipsum vren collum nec praelongum nec nudum effunditur intus sit, & ex ambientibus ipsum & circumfins multam humectationem suscipit: imò ex ipsis mensuris etiam irrigatur. Potest fortassis & natura vren morda circa tem vrinæ, hunc humorem veluti linimentum laicè pudendi meatui praeparasse. Si autem in assibus glandulosi generaretur semen, castrata animalia ipsum vtrig excernerè appetent: at-

*Glandularum duplex utilitas.*

*Glandularum duplex genus.*

*Pudendum virile. Assites glandulosi assites fuisse ad levandū hominem per penem arduum.*

60 est, quòd neq; generatur: id quòd incussum debet nobis servari.

*Semen non generatur in assibus glandulosi.*

# GALENI PERGAMENTI de factum formatione, lib. vms.



*Libri de natura factum dubio fuisse Hippocrati. Genera recte exorta de feto pto.*

*Secunda.*

*Secunda confisi iatio.*

*Petus per qua vasa alioque viro.*  
*Secunda qua parte cingit vtrum.*  
*Secunda vasa in duo venas ex tendit arteria vtro.*

*Vtrius.*

*Parcimalem membrana vtri ab vtro. Aquina mbra in fatus obvoluit.*  
*Cota.*

*Petus vtri in feto gigni pferat subltan tiam sanguinis.*  
*Hepar vtri in feto gigni pferat subltan tiam sanguinis.*

On est vnus limitatus ac certus terminus factib. manifeste formationis, aut monitionis, aut partus. Ceterum qui libellus de natura factus compositus fuit, huc in Hippocrates, sine Polibus fuerit, generatur quod vbi sex diebus in vtero maffi, foras prolapsa est in quadam muliere, aut similem fuisse ovo crudo, cui adempta sit testa externa, & in cuius interna membrana pelluciscat inclusus humor. At liquor ipse in ea geniturus (vt autor ille recenset) ruber atq; rotundus erat in membrana aut ipsa fibre quaedam albae crassae videbantur inesse, cum cruore crasso & rubro obvoluit, ac circa membrana foris etiam eruenta veltigia. Iuxta cuius medium, tenue quid eminebat, instat vmbilici, per quod sane extra & intra spiratio primum fieri apparebat. Quin & membrana quaedam geniturus ambiens complectens, tota ex illo protendebatur. In qua descriptione membrana geniturus complectens, ea erat quae secunda appellatur. Albas vero atq; crassas fibras, quas cum cruore crasso & rubro in se videbatur habere, generationis venarum & artenarum lineamenta fuisse putandi est. Cōstat enim membrana ea ex numerosis arteriis & venis, coniunctis tenui & membranoso corpusculo. Principiū aut generationis horum vasorum, ex arteriis & venis vteri exiit. Quarū extrema, in internā vteri regione oscula aperta habent, & per haec vasa sola factibus ad impragnatas communio exiit. Ex nulla enim alia parte secunda perforata est, imo neq; coningit verū, preterquam iuxta haec sola vasa. Reliqui vero spantū internacēs, subēditur quidem vtero intrinsecus, ac circa concretionē ipsa porro secūde vasa, angustissima quidē principia habēt, per quae vnita sunt oscula vasorum vteri. Secedenna autē ab ipso, in idem inter se mutuo remeant, veluti plantarū vāre ac tenues radices, in principii trunci cōiūctas. Sic siquidem, totus ille parnasū vasorū cōgregatus in duas amplas arterias, ac tōndē venas absoluitur. In quarum medio, meatus quidam appellatur vtrius, hoc est, ductor vtrius, gignitur, in fundum vesicae ipsius factus perforatus. Cuius poro alterum osculum, vbi id quatuor vasa segregatur, paulatim dilatatur, teuē in embriū farcimini similem generans: quae forinsecus alteri agninae nominatae membranae, in qua factus continetur, praetenditur. Atque haec quidem extra factum exiunt. Partium verō quae ipsi factui sunt proximae, prima omnium est cutis, at tegendum corpus producta. Deinde consequenter sub ipsa, continuat his quatuor vasis intra cutem partes, quarum nullam prius possibile est generari, quā omnia secundae vasa, per quae factui nutrito cōtingit, in pēdēta quatuor sint cōgregata. Impossibile siquidem est, in factu aliquam generari particulā, citra substantiā sanguinis. \* Non tamen quae albae & exangues sunt partes, gigni ipso ex sanguine possunt, veluti generatur substantia hepatis. Ceterum enim generationē hoc viscus ex sanguine habet, vtpote quod substantiam

niam ipsi quāsimilimā possidet. Reliquae partes omnes sanguine longiori tēpore indigent, vt gignatur. At venarū, artenarū & membranarū corpus omnino ex angue quum sit, merito à semine primam habet generationem, nimirum praedito glutinosa substantia. Facta aut prima vasorū radicatione in oculis eorum quae in vterum tendunt, verisimile est ipsorum opificem, videlicet semen, alimentū ipsi suppeditare, trahēdo ex vtero sanguinē: paulatimq; sic primū genitū dilatare, in longum extendere, augerēq; & sensim in idem coagmentare tenuiora, ad ampliorū generationē. Apparet aut ex his quatuor vasis, quae iuxta vmbilicum & porū qui ad vtrūq; est, coagmentatur, statim vbi cutē factus ipsius penetrant, alterū par euestigio vniri, atq; sic vnā magnā venā produci, eāq; inferi in hepā. Nec verō existimandū est, quod praexistēt hepan hanc inseratur venā, sed quod huius ipsius vene rursus diuicicate & scissae, vbi introrsum penetrat, alteri quidē eius fissurae, lecoris substantia innascatur: alteri verō, quae mēterū gignit, adiungatur venter, splen, omentū, & intestinorū volumina, quā nihil horū antea existeret, sed ad suffiram venarum cōcreta & congenera sint. Non tamen hic ipse arteri, vbi primum permeantur cutim, statim aut aduascemēt sibi aliam substantiā habent, aut in multas partes scinduntur, sed quādiutissime dux permanent, & vesicam furus perreptant, ibiq; firmate, tum aliorum, tum ad corporis pēdū feruntur, donec in os factū perveniant. Iuxta quod dux arteriē apparent, quarū singulae ab vtriusq; parte deferuntur in crura, maxima nimirum quae in spina est, & quae finis tro cordis vetriculo annexa cernitur, in ipsas diuancat. Corda porro generādo materē, ex praegnanate aut per arterias, aut per medium hepatis suppeditari est necesse, idq; secundum venam, quae ex ipso sublimis fertur ad superiōriū huius visceris partium generationem: id quod longū tempus desiderat. At verō in abortibus fortium supra trīginta dies, propē inter se sita manifestē apparent tria haec animalis membra, hepar, cor, & cerebrum: atque maius quidē vtriusq; alius hepatis. Itaq; possibile est in venire, quādo cor principii sui formationis sortitur. Quum igitur libros de semine scripsi, cor similiter vt hepar circa primos gestationis in vtero dies, veluti fundamentū quoddā generationis dixi obnere, ex vtu ipsius, q in perfectis animalib. maximē insignis exiit, ad haec rationationē pductus. Vbi verō reliqs omnib. tū medicis, tum philosophis complacuit esse repertū, factum vsq; ad manifestā effigiationē similiter gubernari vt plantas, nihil probabilius est visum, nullā generationis ipsius in principio vilitatē haberi, imō penitus hepate postterius ipsum formari: ex duob. his alterū necessariū iudicans, aut ex emergente ab hepate sanguine, vni cum hepatis de vena etiā cor ipsius gigni: aut per magnam arteriā, quae nō solum spiritum, sed etiam sanguinē habet. Qui aut in cōmentariis de respiracione & pulsiū vū à me cōscriptis exercitā fuerint, cognoscent factū in principio generationis, quādiu ab vnica anima, hoc est, à natura regitur, neq; artenarū,

*Partes à similitudine.*

*Naturalis mō dūm artus.*

*Arteriarum fectū in factum pēdū.*

*Hepar vtri mater alio vtriusq; in prima generatione.*

*Palinodia Galina.*

*Cor hepate postterius formari. Cetera generationis.*  
*Factū, dem à se la natura regitur, nec artenarum, vtrūq; dū fectū bene e. gita.*

*Forma copara-  
ta ad superi.*

neq. pulsū, neq. cordis functione necessariō e-  
gere, quem admodū neq. plātas. Porro quemad-  
modum vbi plantæ semen in terram moderatē  
calidā & humidā est coniectū, ex ipso statim du-  
plex exortus videtur nasci, alter infra terrā, alter  
supra terrā, qui progressū tēporis & crassescit,  
& in alios atq. alios exortus sciundūtur, quos nu-  
triri & augeri in dies cōstat, ferreq. tandē fructū  
in extremitatibus suis, planta iam absolutā &  
perfectā: sic factus primo fuz formatiois tēpo-  
re exigūū augmentum habet: quando verō mā-  
nifestē in articulos digeri incipit, vberius: quē-  
admodum maximū & vberimū, vbi totus fue-  
rit articulatus. Terminus igitur primi tēporis, in  
quo factus nondū corde habet opus, mihi vide-  
tur esse, in quo iam vniuersa hūura venarum  
circa hepate facta. Etenim ipsius magis veng,  
quā videmus per vmblicū ferrī, vniuersē alie  
corporis veng, tum partes, tū germina existū: al-  
tiorē quidē porta (est enim duplex fontibus) gra-  
na generationis omnīū, quæ circa hepate sunt, fa-  
cta: inferiori verō, causa productiōis illarum,  
quæ in ventrem, splenem, omentum, intestināq.  
disseminantur. Cōpleto autē hepate, ex venis qui-  
dem iuxta gibbū ipsius, veluti ex radicibus quib-  
usdā stipēs, coaceruantur maxima totius corpo-  
ris vena, quam quoniam ob excellentiā nominā,  
Cuius venæ altera quidē pars infra ferrit iuxta  
spinam firmata, in reues ac lumborum regione  
quædā germina emittens: altera sursum per me-  
diū thoracē in collum tendit, primō quidē obli-  
ter in septū transversū, postea in membranas  
succingentes thoracē, inq. tunicam cordi obvo-  
luntur, ac deinde in dextrum cordis ventriculū,  
inq. ipsū thoracem varios faciens exortus. Ex  
quibus pars spinæ & thoracis supra ferrit trans-  
versū materā generationis suscipiūt: quo tem-  
pore etiam cor ipsū formatur. Eodē verō tem-  
pore verisimile est etiam venas ex inferiori por-  
ta in omnes partes circa ventrem hūsas, iam ipsi  
fieri causam generationis. Formato corde, in ip-  
sū insen potest prædictū par arteriarū, iam  
coactū in vniū, quod in media spina firmatū cer-  
nimus, donec prope cor perveniat. Quā autem  
duo cordis ventriculi sint, in dextrum quidē san-  
guis ex hepate accedit calidus moderatē: in fini-  
strū verō multo calidior, & tenuior eo, per dētā  
arteriā ferrit. Quare & vetriculū, & vtrāsq. ma-  
terias iam habens cor, pulsabit vtrūq., & arterias  
eodem suspensus motu movebit, adeo vt nō am-  
plius veluti planā, sed quemadmodū aliquid  
animā, furtus gubernari videatur. In est autē pul-  
sus corporibus calidis. Ceterum vt nullū exan-  
gue animal est manifestē calidū, sic nec manifestē  
calidū, est exangue. Cor itaq. est indurum anima-  
libus, veluti focus ignis: ex eo siquidē animalis  
corpus maiorem caliditatē acquirit ea, quæ insi-  
ta est à natura venis ac hepate, & sanguini in ip-  
so contento. Quemadmodū autē cor posterius  
hepate generari, consentaneum rationi erat, ob  
idq. prægnatū vtero est propinquius ipsū hep-  
ate locatū: sic cerebrū adiac. longius quam cor  
ab vtero locari expediebat, vt pote quā etiā stru-  
ctura ipsius posterius sit productū, propterea  
q. neq. indiget factus qui in vtero gestatur, cere-

bro, quā nec voluntario motu aut actione, nec  
sensu vilo aut exteriori aut interno habeat o-  
pus. Posteriū itaq. circa tertium temporis ordi-  
nem, tum cerebrū, tum omnia circaiacentia sunt  
enormata, quo tempore vniuersæ partes ad per-  
fectionem iumpsiū struatur pervenerint. Ma-  
nifestū est autē, quod capitis os posterius omni-  
bus aliis osibus cōgelatur, confirmatur: &  
ob id iuxta sinciput adeo tenue & imbecille est,  
vt in recēs ætatis puellū motū cerebri vō solum  
tactu, sed visu etiam deprehendamus. Est iam  
quartū tempus adeit à primo conceptū, in quo  
partes iuxta motū posterius formata: cor robo-  
rantur: quam ob rem sanē infantes actiones ani-  
mæ nutritiūq. robustius assues possidēt. Secūdam  
in illis sibi vendicāt sedem actiones profectæ à  
corde. Debilissimæ verō sunt quæ procedūt à ce-  
rebro, quā nec moveri, nec stare firmiter valeāt,  
tantū abest vt ratio cernat. Postremum omnīū os  
capitis ipsiū corroboretur, & enascūtur dentes,  
& calua pilosa redditur. Postea verō vniū cū or-  
ganis absolutæ animæ facultates, actiones suas  
obicit. Arterias igitur & venas, necessariū est pri-  
mas omnīū ex semine generatas esse. Est circa fa-  
cultates vitæ nostræ administratōes & gubernan-  
tes, ratio ipsa postea cū omnium & sit, et absolutū  
rur: quæ quidē feliciter dispēsat res hominū, vbi  
vniuersa anima iuxta naturam habet: infeliciter  
verō, quā præter naturā emora fuerit. Iam verō  
vide nam corporis actiones oriūtur, facile ex di-  
gnonomb. liquet. Prima igitur dignoio ex præ-  
cisā, aut laqueo interceptis arteriis & nervis est,  
in quibus partes quidē ex altera laquei parte, vi-  
dentur, proprias obire actiones, ex altera verō eas  
profus amittere: vt si medulla spinalis (exempli  
gratia) circa abque sping locū fuerit dissecta, ner-  
vi quidem, qui supra regionē spinx, ipsi medullæ  
incumbentes, sanctatā oriuntur, tum motū, tum  
sensum cōstituant videntur: vtrō infra, omnes  
vtrūq. amittunt. Vide liquet, eas facultates ipsi  
spinali medullæ supernæ ex cerebro influere. Si-  
militer quæ arteria hincq. aliquo vasculo exce-  
pit, id quidē quod ex ipsa supra laqueū cōtinuū  
cordi est, pulsare, veluti antea, apparcat, altera  
verō pars infra laqueū statim pulsū præterit: cō-  
spiciū sanē etiam hinc est, arterius principū mo-  
tus ex corde esse. Ad hęc, medullæ quidē spinalis  
ac nervorū, per omnia eadem, quæ cerebrū, sub-  
stantia existit: quemadmodum & continentium  
ipsa tegumū eadem etiā est cum involutis am-  
bientibus cerebrū. Arteriarū verō substantia, ni-  
lū, ne propē quidē, cordis habet: quæ admodū  
veng venarū, hepatis. De origine autē hepatis  
dis veng, dubitatē sectōrix artis periti. Rationa-  
bile autē est coniectare, principia venarū in vte-  
ro, summa esse extremitatibus radicū planta-  
rum: stipiti verō cuiuspiam, venam per vmblicū  
in hepate procedentem assimilari: atque omnes  
deinde venarum extremitates, quæ in animalī  
videntur, ramū, & non radicib. consimili-  
bus proportionem habere. Semen igitur opifi-  
cis rationem habet, à quo vasa, per quæ sangui-  
s prægnante attrahitur ad viscum generatio-  
nem, omnīū prima generantur. Secūda au-  
tem ab his, hepate, & cor, veluti fundamentum  
domus:

*Vena porta do-  
plex.*

*Vena cana ro-  
dearia.*

*Vena cana di-  
visio.*

*Spina supra si-  
gnum veng ge-  
nerat.*

*Cor quo sermo-  
tur tempore.*

*Ventri partes  
vide & quan-  
do gerantur.*

*Corde vetricu-  
culi duo, quod  
& vnde tem-  
pore.*

*Cor quando  
pulset.*

*Pulsus inest cor-  
poribus calidis.*

*Exanque natiū  
esse manifestū  
videtur.*

*Cor esse indurū  
animalibus,  
veluti focus i-  
gnis.*

*Cor posterius  
hepate genera-  
ri par erat.*

*Cerebrum pos-  
terius vtero i-  
pso corde.*

*Furtus in vte-  
ro non indige-  
re cerebro.*

*Caliditū post  
alia omnia q-  
da tempore.*

*Infantibus in-  
esse robustius  
actiones: ani-  
malis autē ad-  
modum ambu-  
lans.*

*Arteria & ve-  
na prima ex  
semine ex fusi-  
ne oriuntur.*

*Ratio, postea  
cū omnium &  
sit, & absolutū.*

*Ratio quando  
fluitur seu  
fuit, aut mor-  
tetur.*

*Ab omni cap-  
to vnde oria-  
tur, liquet.*

*Cerebrum do-  
minare motum  
omniū facultatū  
spinx.*

*Cor esse princi-  
pium motus ar-  
teriarū.*

*Substantia in-  
terior, & vtri-  
usque medulla,  
cōdura.*

*Hepaticū ve-  
ne cōsideratur.*

*Semen habere  
rationem opifi-  
cis.*

*Generare quā-  
libet prius, &  
quod post-  
erior accidet.*

domus: quo tempore & alia quædā finguntur. rum his vicina, tum inter hæc & vterum sita. Quando verò neg iuxta quantitatē, neg iuxta qualitatē, substantia partium permanet, nimirum defluxu ipsarum magno quotidie fiēte, & qualitate item multiformiter variante, auxilio vtiq; inter se mutuo opus habent, quod et evacua tum rursus expletur, & quod variatum est, cor rigatur. Cor igitur postquam respiratione fuerit priuatum, ipsam moueri cessat, et cum ipso tum animal perit. Priuatur autem respiratione, non solum stranguulatis, aut ob inflammationē partium circa asperæ arteriæ summum, ob tura to meatu respirationis, sed & neruis thoracem mouentibus male affectis, quorum omnium principium est medulla spinalis, veluti cerebrum illius. Quemadmodum igitur cerebrū cordi vtile est, per neruos thoracem mouens, quod dissentio quidem inspiratio contingit, contracto autem expiratio: eodem modo cerebro cor vsum aliquem præstat, ut enim his hepar. Ceterum propter hepar generati sunt renes, & velicæ duæ: quarū altera bilis susceptrix in ipsum viscus adnata est, altera verò, quæ loquum excipit, iuxta re nes locatur. At faculterà huius visceris excrementa repurgat lien. Quod verò & venter hepatis alimētum præcoquat, & intestinorum obvolutio gratia distributionis sit facta, admodum est perspicuum. Porro simul vt nata sunt animalia, i-

pse crediderim circa sapientissimum, eundemq; potentissimum opificem factos esse. Quis verò hic sit, pronunciarē non audeo, præ consiliū inopia obmutescens. Supremam enim video in formatione sapientiam & potestatem: neg animam in semine plantatitiam quidem ab Aristotele, appetitricem verò à Platone, ab Stoicis denique appellatam naturam, scireum ipsum formare existimo, quum nō solum non sit sapiens, sed & penitus bruta & rationis experte: neg rursus discedere ab hac opinione valeo, propter naturam ad parentes similitudinem: apparet enim animam corpus formantem, ex parentibus in ipsum factum transfundi, eum contentam in semine. A rationali verò anima, quæ post partum per omnē vitæ se ostendit, recedo, propterea quod ante corporū dissectionem non cognoscimus, neg partes corporū, neg ipsarū actiones. Itaq; dubitare me, consiliūque inopem esse fateor, de opifice factus causa, non less quam de substantia animæ, quum de his nullam opinionem scientificè demonstratā repererim. Hoc verò vt possibile pronūciare potero, videlicet vniuersum corpus, vbi iam efformatum est, per omnem vitam tribus principis mortuum gubernari atq; regi: eo quod ex cerebro est, per neruos, & mulculos: quod ex corde, per arterias: quod ex hepate, per venas. Ex quibus autem principis hæc fiant, hæcenus nihil habeo quod pronunciarē intrepide possum.

### GALENI PERGAMENI de Septimestri partu, lib. vnus.



X seminis cōceptionibus (sine quatuor oblatione fieri minime potest, vt idoneum pariendi tempus quis ritē inueniat) pleraque mulieres grauidas in medio temporis ipso, intra centum nonaginta dies, & ducentos, peperisse animadverto: paucas tempestiuus, cur tardius: nullas planē celerius cētesimo & octogesimo secundo die cum dimidio, & quibuscūq; horis, vel post exactum quarum supra ducentesimum. Iure igitur septimestris partus ædendi, primus terminus esse censetur dimidiū anni tempus: quum nimirum tempestiuus nulla partum ædiderit, sed tardius omnes. Tempus autem id cētesimo & octogesimo tertio die, minus quibuscūq; horis absoluitur. Arque ego vnam semel mulierem reperi, quæ centesimo & octogesimo quarto die completum peperit. Diem impræsentia appello, interval lum vintiquagur horarum quinoctialium. Sic enim & anni trecentis & sexaginta quinque diebus, & quarta insuper diei parte consistere dicunt: tempus verò mēstruū, arciter vintiquagurum cum dimidio. Nimirum mensem appellari ipsarium id, quod ab vno lunæ congressu cum sole, vsque ad alium mox sequentem interit, omnibus in consensu est. Si enim triginta diebus quilibet mensis consistat, nonmēstres factus exactē vsque ad ducentesimum septuagesimum diem vtero gestaremur, quod nō contingit. At annus dicitur tempus illud, quod

Conditio ma  
gifica coman  
datur.

Animam plan  
tatur esse bru  
tam, et ratione  
expertam.

Rationalis ani  
ma non formab  
satur.  
Galeni fater  
tur se dubitare  
de opifice factus  
causa. Et de sub  
stantia animæ.

Principia mor  
tuorum tria no  
strum corpus re  
gunt.

Septimestris  
partu adendi  
primus termi  
nus.

Diem quod.

Anni quod die  
bus consistit.

Mēstruū tem  
pus.

Substantiam  
partū nō per  
manere, sed flux  
u atq; motu.

Cor priuatur  
respiratione mo  
uere cessat.  
Respiratio à  
quibus causis  
subleuatur.

Neruis moueri  
thoracem, et me  
dulla spinali or  
iuntur.

Inspiratio expi  
ratioque, quomodo  
fiunt.  
Hepar gratia  
singulis cibis re  
mouet atq; reposit  
da.

Lienus mucus.  
Venter hepatis  
alimētum præ  
coquit.

Particulis sin  
gulis adesse sibi  
regem, simulat  
que nata sunt  
animalia.

Animæ constructio  
ne particulæ.  
Opificis ætem  
quod indicat.

Cassa corporis  
pluriditudo.

Natura corporis  
virescentia pro  
gradum.

Annu quod  
si pos dicatur.  
Signum quod  
Hippocrati de  
septimestri fe-  
bris sententia.

ab vno signo solem in idem signum cōstituit. Si-  
gnum autem ipsum impresenarium pro pun-  
cto capitur. Porro Hippocrates, septem qui-  
dem menses septimi cōstiti locum cōstituit: ex quib-  
us quinque esse integros ait, qui inter primum  
& septimum mediū habentur: duos autem de-  
ficientes, nempe primum & septimum: at non  
ita deficientes, vt supra dimidium eis deficiat.  
Mensis enim dimidium, est dierum quatuordecim  
cum dimidio, & quarta adhuc diei parte:  
quamobrem primi mensis & septimi tempus,  
prædicto hoc erit maius spatium. Si igitur pri-  
mi mensis tempus à conceptu vicefimum diem  
excedat, siq; verbi gratia dierum vigintrium,  
quum sequentes quinque menses centum & qua-  
draginta septem dies supra diei dimidium con-  
tineant, tempus sanè id, quod ex vniq; constab-  
bitur, dierum erit 170. cum dimidio. Septime-  
ster autem factus ab eo tempore, quindecim, ad  
minimum, actis diebus, in lucem produci po-  
terit. Necessè quippe est, vt si sextum mensem  
partus debeat excedere, septimi plus quàm di-  
midium attingat. Quare non omnes hi in vni-  
uersum dies erunt 185. cum dimidia adhuc diei  
parte. At si vni citius his præscriptis diebus se-  
ptimester iussus xdi non possit, ira neq; o mni-  
no tardius ducentis. Si enim centum & septima-  
ginta diebus cum dimidio vigintriuem adici-  
as, omnes simul centum & nonagintanovem  
cum dimidio erunt. Fingamus rursum mulierem  
prioris mensis dies 13. gessisse vtero: qui sanè  
dies si addiciantur quinque subsequentiū men-  
sium diebus 147. cum dimidio, atque his insu-  
per septimi mensis dies 29. accedant, vniuer-  
sum hoc tempus quatuor & ducentis diebus ac  
insuper dimidio cōstabit. Quia verò in maximis  
distantiis primus & septimus extiterūt menses,  
infantem hunc non esse vitale, Hippocrates pro-  
fiteretur. Quod autem ad mensem lunarem per-  
tinet, in minori etiam tempore quàm sit anni di-  
midium, factus septimester p̄di posset: quod iam  
ostendam. Quia enim ratione necesse est vt septi-  
mester partus anni saltem dimidium attingat,  
ea nimirum ante centesimam & octogesium  
secundum diem, & 15. horas, vel circiter, vitalis  
nullo pacto exiit. Quatenus autem si dies ad  
menses lunares exactè computentur, prius erit  
eo tempore licet sexundum partum existi-  
mare, nunc declaro. Fingamus enim primo me-  
se mulierem sexdecim dies vtero gessisse: post  
quinque autem subsequentes menses, pariter sex-  
decim dies: quippe hac ratione tempus id om-  
ne 179. dies cum dimidio explebit. Verùm in  
minori intervallo quàm sit anni dimidium, se-  
ptimester factus vitalis xdi negat Hippocra-  
tes. Atque idcirco tum primi, tum etiam septimi  
mensis plus quàm dimidiam partem  
factum attingisse est necesse, pri-  
usquam xdat in  
lucem.

LIBRI DE FORTVVM FORMA-  
TIONIS FINIS.

## GALENI PERGAMENTI de instrumento olfactus,

Lib. vnus.



On modo percēptionem odorum, Olfactus de quib-  
sed etiam facultatem, cuius est odo-  
rem percipere, medici olfactum ap-  
pellant. Secundum autem vniūq;  
significatum, vnum est instrumen-  
tum olfactus, quo facultas ea sibi sensibilia ap-  
prehendat. Porro si ipsos nasi meatus aliquo  
odorato vnguento repleueris, nunquam prius  
senties, quàm aërem inspiraueris: & ob id non-  
nullis videtur nasum viam esse olfactualem: id  
verò corpus cuius est odores percipere, inter-  
ius esse solum. Scire autem oportet, quodd  
quum talis septum medium habeat, & duos  
hos omnibus patentes meatus, vtrique nare  
alterum, supra mediam nasi regionem vterque  
eorum bipartitur, ita vt pars quidem altera, in  
interiores oris partes declinet, altera verò re-  
cta se ad cerebrum conferat: Nam sunt ibi duo  
quoque ipsius exortus oblongi, & cani, qui ex  
anterioribus cerebri ventriculis suam ducūt ori-  
ginem. Hi in eam caluarie partem descendunt,  
vnde exoritur nasus: ibidemque ea ossa habent  
sedem, quæ colatoria vocantur. Sed & crassior  
membrana, qua parte hæc ossa attingit, exilibus  
quibusdam foraminibus est perforata. Vnde per  
eam primum, dein per iam dicta ossa in meatus  
illos excolantur crassiora excrementa cerebri.  
Nam quæ similia vaporis sunt, per caluarie for-  
aturas vacuantur. Extensa insuper est vniuersis il-  
lis nasi meatibus exangulis quedam tunica, cras-  
sior quàm sit membrana: atq; ea quidem illi con-  
tinetur eā, quæ ori, linguae, gutturi, faucibus, as-  
pectu arteriæ, & gulæ subternitur. In hanc au-  
tem tunicam à cerebro nonnulli nervi inferun-  
tur, parui quidem omnes, præter illos qui de-  
feruntur in linguam. Satis appere crassi sunt, hi, quæ  
ea particula copiosiori etiam eget sensu, vt po-  
te genita vt exiit gustus sensorium. Ob hoc ip-  
sum natura oculis impertit et nervos, eōsq; longe  
crassiores illis, qui ad linguam attingunt:  
& secundum hos aures, atque ori ventricu-  
li, quod & ipsum sensu eget quamplurimum.  
Oculus itaque visus est instrumentum: aures, au-  
ditus: lingua, gustus: appetentis verò cibi & po-  
tus, ventriculus, & præteritum eo eius. At verò ta-  
cilem facultatem, quod ad cognitionem spec-  
tat, natura ceterarū crassissimam fecit: quam  
vni definito loco, sicuti alias omnes, minimè  
adscripsit, sed per corpus vniuersum dispersit: ac  
proinde plures illi nervos exiitiores, durioresq;  
& qui magna ex parte ab spinali medulla ortun-  
tur, indidit. Eas verò quas recensimus particu-  
lis, vt pote quibus ampliori sensu erat opus, ma-  
iores, & molliores, & omnes à cerebro prodeū-  
tes, dedit. Iam igitur instrumentum visus, ad  
quod solum pertinet humanis atque splendoris  
sensus, quammaximè efficit lucidum: aërem  
verò auditus, cuius erat eos percipere sonos,  
qui cum aëre feruntur. Linguam præterea ex hu-  
midiori corporis specie construxit, ceu instru-  
mentum futurum, quo succi omnes discerneren-  
tur.

Olfactus de quib-  
bus dicatur.

Nasus est via  
olfactus.

Nasus meatum  
vtriusque bi-  
partem.

Cerebri exor-  
tus versus oas  
dictum nasus.

Colatoria ossa.

Nasus tunica.

Lingua nervi.  
Lingua est quæ  
dam infortuna.

Sitissimum instru-  
mentum.

Tallem facul-  
tatem esse cras-  
sissimam a natura.  
Tallem facul-  
tatem esse per cor-  
pus diffusam.

Visus instrumen-  
tum lucidum.  
Auditus instru-  
mentum nervi.  
Lingua construc-  
ta.

Mensis lunaris.

10

10

10

*Olfactus sensu-  
le.  
Olfactibus sub-  
stantia.*

*Talium instru-  
mentum esse cer-  
vix.  
Olfactum sensu  
vix vaporisum  
esset.*

*Olfacendi sen-  
sum neg. ef-  
fectu nati pellicu-  
la neg. os ut  
cur.*

*Inspiratio in  
modum.*

*Olfacendi sen-  
sum in antero-  
ribus cerebri  
ventriculis fieri  
esse.  
Nisi illi oleo in-  
traeam & in-  
spiratum, jam-  
modo sensum  
neg. oleum me-  
re quo laborat  
corpus.*

*Cerebrum in ca-  
lente cuncta  
transfert.  
Olfactum refri-  
geratum non  
ferre caput ex-  
hibet.*

tur. At verò sensile id quod sibi olfactus ascuit, inter aërem humoremq; & ignem est medium. Nam id quod à singulis corporib; diffundit, ipsa esse olfactuum substantia. Quum autem pro suorum sensuum similitudine, instrumentum unumquodque à natura paratum sit (instrumentum quippe visus, humidum ac pellucidum est, tactus verò, terrestre & durum) sensorium sanè quod percipiat odores, opus est ut vaporisum existat. Quare neq; os nasi, neq; item membrana illa cuius nuper mentionem fecimus, sensorium esse possit olfactus, quum & dura corpora sint: neque tantum eis insit aut talis nervus, quantum & quale olfaciendi facultas postulat. Nervus etenim qui visui inferuit, quamvis ad crystallum tantum pervenit corpus, eo longè maior est, qui defertur ad os ventriculi. Extrema & interior pars illius auditorij meatus, ubi situs auditus est, quamquam brevissima sit, crassum tamen est nervum adepti. Nec lingua quocq; exiguorum nervorum, ex his qui à cerebro oriuntur, esse videtur princeps. Quà obrem haudquaquam verisimile est, facultati olfaciendi tributum esse à natura tam exiguum sensorium, ut est ea nasi pellicula. Nam quod pertinet ad os nasi, tantum abest ut sit odoratrix facultas princeps, ut tactrice etiam careat. Sed ex hoc enim, quòd eo tantum tempore quo spiritum introducimus naris, ipsos odores percipimus, planè consistere videtur, neque ossa, neque tunicam nasi, neque eam que palatum, guttur, ac fauces vestit, sicut nec coloratum meatum, esse odoratus sensorium, sed ab eam aliam particulam interius sitam, atque in penitioris corporis sede delitescentem. Porro ubi peccus à musculus dilatur, pulmones sequuntur ipsum: quos subinde externus aër per asperam arteriam, guttur, os, atque etiam nares, continuatione quadam, sublequitur. Potest autem cerebrum, quum inspiramus aërem, & ipsum sua actione, & suis etiam quibusdam quasi germinibus, peccus dilatare, ali-quid in suos sinus attrahere. Fieri etiam potest, ut ipsum quod alia movet, sibi quoque leuem aliquem motum, tum in seipsum, tum verò ex se præstet. Coarctatur enim dum sese contrahit: quum verò undique se dilatat, funditur: atque ita externus aër, ex continui ratione, illud, quò se retrahit, sublequitur: sicut etiam dum diffunditur, efflabitur. Quòd igitur olfaciendi sensus in anterioribus ventriculis cerebri situs sit, nullis rationibus sum adductus ut credam. Primum, quòd illos qui capinis graevudine, ob cerebrum crassus vaporib; opplen, tenentur, argi inde obfusos olfactum, stertutamentis præcipue iuvenit: qualia ex nigella oleo intrita inspirantibus ægris, & capite resupino instillare naris soleo, idque prius ore aqua repleto. Ad hæc quum cerebrum contento spiritui repleatur, incallescere, consentaneum rationi videtur, expirationem ad ea que noxia sunt excutienda, inspirationem verò ad refrigerium illi summè conducere. Tertio autem, quòd in eis quibus ex vitiis est, aut ex calidum caput, tum rosarium, tum aliorum refrigerantium odor, manifestè remedium

calori adferat. Instrumentum itaq; olfactus, minimè in illa nasi pellicula, sed interius reconditum est: ita tamen, ut foraminum nonnulla eo perveniant, que neq; etiam perpetuò ad aperta sunt, sed habent opercula quædam membranosa & tenuia. His igitur per inspirationes violentia spiritus referantur, patet rei sensui aditus ad eam particulam, cui vis illam dignoscendi indita est. Quare non quemadmodum palpebrarum motus pro nostro sit arbitratus, sic meatus illi opera nostra aperiuntur, quum nullum habeant voluntarij motum, imò nec naturalem, nec dilatanter etiam ab instrumentis que inspirationi deferuntur, sed à solo per inspirationem infusente aëre. Nisi autem per inspirationem cerebrum dilatur, expellanturq; ab eo antea contentus spiritus, fieri non potest, ut aër ad ipsum per dictos meatus irumpat, quamvis sit is vehementissimè illatus: licet ipsius aëris occursum, tunica in quâ is meatus descendunt, facile sentiat. Quare si secundum nares meatus olfactory consistere, viderentur vix in maximo aëris impulsu: quibus ad apertis, subinde odoris sensus subsequeretur. Non subsequitur autem, ergo nec secundum nares meatus olfactory consistunt. Ad hæc, si meatus illos secundum nares ad odores percipiendos extruxisset natura, vix non obstruxisset illos: quemadmodum neq; eos qui in auribus sunt: quum longè præstet quencunque sensum semper esse ad sua sensilia apprehendenda promptum, quàm solum eo tempore quo fit respiratio. Neque ob eam causam natura oculis openimenta palpebrarum apposuit, quòd melius non sit eos vixqueque operari: sed quòd molles illi sint, ac probe expositi, facile possint à rebus extrinsecus occurrere sensibus lædi. Iuvant etiam palpebre ad capeiendum somnum. Nemo siquidem in aëre lucido reclusus oculis potest dormire. Quare & illas animantibus, quibus nullæ sunt palpebre, foveas quasdam natura indidit, que totos oculos, ubi somnus vigeret, quasi in cubiculo receptos, admitterent. Est enim id nature institutum, ut in suis functionibus perpetuò sensus versentur: etsi rei cuiuspiam vitiis oblecta occasione, interque scere aliquantisper cogantur. Nequit autem animal deridens, sensus integrè sentientes servare. Nam quæ simul esse non possunt, ne Dn quidem omnes, etiam si velint, coniungunt. Quòd si eodem fuerint extructi modo ipsi olfactory meatus, quo ait Aristoteles, erunt ponus damno non leni, tantum abest ut allatur sint nobis viliam utilitatem: nimirum nos per maius vix spiritum sensu olfactus prius, quod in nullo alio factum fuisse vixquid videmus. Porro stertutamentis, capitis graneditu auxilio sunt. Fiant autem, quum maximas inspirationes progredias, quam celerrimè cessant subsequitur. At estatio-nem voco \* cœterum factam expirationem. Vnde si per stertutamentis nihil ex carnatur à cerebro, non solum non levant ipsa capinis graevitatem, sed magis etiam replentem eas accumulantes. Cæterum ægrotis ad solem conversis, proritam stertutamentis: quia vaporosus in cerebro spiritus ab eo funditur. Exturbant porro

*Olfacendi ra-  
tio.*

*Palpebrarum  
visus.*

*Palpebras in-  
vare ad capi-  
endum somnu.*

*Aristotelis sen-  
tentia de olfac-  
torum meatus  
bus existat.*

*Stertutamentis  
an vitiis gra-  
vioribus.*

*Estatio quid.*

*Stertutamentis  
provocant ad  
silen.*

sternunt amara-  
rum yfus.  
Odore valen-  
tiores ca-  
pos replent.

Respiratio à ce-  
rebro qua de  
causa fiat.

Cerebrum in-  
spirare, capite  
requit.

crasiores & lentos de cerebro mucos sternuta-  
menta, eos vna cū spiritu excusso explodentia.  
Quod autem ab odoribus vellementionibus ca-  
pit continud idatur, replenturque, atque red-  
datur gravior, ac nonnunquam excitetur deli-  
rium, id recte argumento est, pormo oem aliquā  
substantiā illorū eō insillire: aliō qui ex sola qua-  
litate cōmuniōne nunquam ab effectibus ad-  
eō repetitis & validis caput arripitur. Si igitur  
respiratio vniuersa à cerebro ea de causa x-  
datur, vt in corde seruetur quidam caloris mo-  
dus, cur sibi quoque non administrabit id ipsum,  
quom suapte naturafacillimē à rebus tam ca-  
lescentibus quā refrigerantibus laedi possit.  
Aut cur natura conueniam quandam motiōē  
cerebro non tribueret, quā inspirando se ventu-  
laret atque excitaret ad pulsū: expirando verō  
pituitosa & mucosa excrementa à se abigeret.

### GAL. DE OSSIBVS LIB. V. 130

de ossibus, ad Tyronem, lib. vnu.



X ossibus singula, qualia sint, &  
quam inuicem structuram habeat,  
nota esse medico debent, si recte ea  
vel fracta, vel dimota sua sede, sit cu-  
raturus. Quare in omnibus quæ ad  
medicinam pertinent, id quod secundum natu-  
ram est, tanquam scopum semper habere conue-  
nit. Sunt autem ossia inter animantium partes du-  
rissimā & andulsiā, necnon terrestria maxi-  
mē quæ quidem cetera fundamenta quedam, totā  
molem corporis sustinent, atque stabiliunt.  
Eorum tamē quædam grandia & ampliter cō-  
caua, medullofaque sunt: quedam parua, & so-  
lida, ac sine vlla medulla. Grandibus magna ex  
parte in extremo, aliorum ossium appendices  
adnascuntur: vtpote, humero superius, cubito  
inferius, radio verō ac femori, itēque tibie  
ac suræ, infra suprique. Maxilla inferior me-  
dullofa est, adnascensque appendicis experta.

Ossium natu-  
ra et materia.

Ossium differe-  
ntia.

Sed ex eius extremis partibus, quæ infra est, vni-  
tur per symphyin, hoc est, coalitum. Supra in  
duos processus, in cornem videlicet, quæ in  
acutum tendit, ac ceruicem tantum, desinit. Por-  
ro compactio humani corporis ossium, sceles-  
tus appellatur. Ceterum alia per articulum, al-  
ia per symphyin ossia iunguntur. Articulus  
enim naturalis ossium est composio: at sym-  
phyis, naturalis vni eorundem. Articuli dif-  
ferentia sunt duæ: diarthrosis, & synarthrosis.

Scelestus.  
Articulus.  
Symphyis.

Diarthrosis.  
Synarthrosis.

Enarthrosis.

Arthrodis.

Coryle, aceta-  
bulum.

Cilium.  
Corymbus.

Dicitur quidem diarthrosis, ossium structura,  
quorum motus est evidens. Synarthrosis vero  
ossium quoque compositio est, quæ obscurum  
invalidumque habent motum. Diarthroses est  
triplex species, Enarthrosis, Arthrodis, & Gi-  
glymos. Enarthrosis, quom excipiens cauum,  
admodum altum est, caputque quod in id infer-  
tur, oblongam. Arthrodis verō, quæ cauum le-  
niter & in superficie, & capitulum etiam depres-  
sum habet. Ex caus capitula ipsa excipientibus,  
quod altius descendit, coryle, hoc est, acetabuli:  
qd in superficie situm est, Cilium. in nullis appel-  
latur. Ciglymus est, dum ossa sese inuicem ingre-  
dienia, coniunguntur: quemadmodum vertebrae  
inter se, ac humerus cubitūque alligatur. Synar-

throses quoque triplex habetur species: Sutura,  
harmonia, & gomphosis. Sutura compositio  
quædam est, ad consutarum rerum similitudinē.  
Harmonia vero ossium structura est per simpli-  
cem lineam. Gomphosis, quā instar clauis os ossi  
iungitur. Symphyis dupliciter differt. Nam alia  
inter se inuicem ossia, vt molliora: alia aliorū in-  
teruentu, vt duriora, coalescunt. Huius discre-  
tie vltimū, tres sunt species, Synchondrosis, Syn-  
neurosis, & Syssarcosis. Quia verō ipsa occasio  
ne obrulit, non nihil & de neruis dicamus; quorū  
tres sunt species. Qui enim ex cerebro, & dorsi  
medulla oriuntur, voluntarij nerui: qui ex muscu-  
lis, tendones: qui ab ossib. ligamēta appellantur.

Sutura.

Harmonia.  
Gomphosis.

Synchondrosi.  
Synneurosi.  
Syssarcosi.  
Nerui voluntarij  
differtentia.

#### DE CAPITIS OSSIBVS. CAP. I.

OS capitis caluaria dicitur, estque futuris distin-  
ctum: quā numerus positurāque, pro capitis fi-  
gura variatur. Naturalis capitis figura, ad obli-  
gæ sphaeræ similitudinē structa est: habetque prio-  
rem & posteriorem partem p̄minentiore. Ac tali  
quidem capiti tres insunt suturae: duæ  
quidem transuersæ, quarum altera in occipito  
est labdoeides, ad similitudinē A litteræ sic ap-  
pellata: in fincipite altera, quæ coronalis voca-  
tur: tertia, quæ à posteriōnis medio, per capi-  
tis longitudinem, ad mediam vsq̄ anteriorem,  
extenditur. Harum suturarum figura H litteræ  
p̄cipue similis est. At quæ figura fastigiato est  
vertice, ex quidem vituperatur. Atq̄ vbi ipsa  
quidem posterior emuncta perit, sutura labdoe-  
des aboletur. Si anterior nō addit, coronalis etiā  
sutura deperditur: sitq̄ vtriusq̄ remanentium su-  
turarum figura T litteræ similis. Harum autem  
vtriusq̄ eminentia deperditā, geminæ quæ ser-  
uantur suturae, ad rectos se inuicem angulos in-  
terficientes, X litteræ similitudinē referunt. Namq̄  
altera quidē transuersa per medium positissimū  
caput extenditur: altera à parte posteriori per lon-  
gitudinem in priorem, vti in ceteris caluariis o-  
mnibus, tendit. Hæc capite semper seruat, ut  
sutura per capiti longitudinem semper sit  
vna. Labdoeides sutura.

Capiti ossium  
confideratio.  
Capiti natu-  
ralis figura.

Capiti trans-  
uersa: Labdoe-  
des, coronalis,  
& media.

Capiti fastigi-  
atum dicitur.

Sutura per ca-  
piti longitudi-  
nem semper sit  
vna.  
Labdoeides su-  
tura.

Sutura capiti  
quæque per ar-  
ticulū.

Sphenoides n.

Pterygoides n.  
symphyis.

Ossa capitis sex

Sinopsis ossa  
quadrilatera.  
Occipitis for-  
mæ maxillæ.

capitis, quæque per articulum, alia per symphyin ossia iunguntur. Articulus enim naturalis ossium est composio: at symphyis, naturalis vni eorundem. Articuli differentia sunt duæ: diarthrosis, & synarthrosis. Dicitur quidem diarthrosis, ossium structura, quorum motus est evidens. Synarthrosis vero ossium quoque compositio est, quæ obscurum invalidumque habent motum. Diarthroses est triplex species, Enarthrosis, Arthrodis, & Ciglymos. Enarthrosis, quom excipiens cauum, admodum altum est, caputque quod in id inferitur, oblongam. Arthrodis verō, quæ cauum leniter & in superficie, & capitulum etiam depressum habet. Ex caus capitula ipsa excipientibus, quod altius descendit, coryle, hoc est, acetabuli: qd in superficie situm est, Cilium. in nullis appellatur. Ciglymus est, dum ossa sese inuicem ingredienia, coniunguntur: quemadmodum vertebrae inter se, ac humerus cubitūque alligatur. Synarthroses quoque triplex habetur species: Sutura, harmonia, & gomphosis. Sutura compositio quædam est, ad consutarum rerum similitudinē. Harmonia vero ossium structura est per simplicem lineam. Gomphosis, quā instar clauis os ossi iungitur. Symphyis dupliciter differt. Nam alia inter se inuicem ossia, vt molliora: alia aliorū interuentu, vt duriora, coalescunt. Huius discretie vltimū, tres sunt species, Synchondrosis, Synneurosis, & Syssarcosis. Quia verō ipsa occasio ne obrulit, non nihil & de neruis dicamus; quorū tres sunt species. Qui enim ex cerebro, & dorsi medulla oriuntur, voluntarij nerui: qui ex musculis, tendones: qui ab ossib. ligamēta appellantur.

DE CAPITIS OSSIBVS. CAP. I. OS capitis caluaria dicitur, estque futuris distinctum: quā numerus positurāque, pro capitis figura variatur. Naturalis capitis figura, ad obli- gæ sphaeræ similitudinē structa est: habetque prio- rem & posteriorem partem p̄minentiore. Ac tali quidem capiti tres insunt suturae: duæ quidem transuersæ, quarum altera in occipito est labdoeides, ad similitudinē A litteræ sic ap- pellata: in fincipite altera, quæ coronalis voca- tur: tertia, quæ à posteriōnis medio, per capi- tis longitudinem, ad mediam vsq̄ anteriorem, extenditur. Harum suturarum figura H litteræ p̄cipue similis est. At quæ figura fastigiato est vertice, ex quidem vituperatur. Atq̄ vbi ipsa quidem posterior emuncta perit, sutura labdoe- des aboletur. Si anterior nō addit, coronalis etiā sutura deperditur: sitq̄ vtriusq̄ remanentium su- turarum figura T litteræ similis. Harum autem vtriusq̄ eminentia deperditā, geminæ quæ ser- uantur suturae, ad rectos se inuicem angulos in- terficientes, X litteræ similitudinē referunt. Namq̄ altera quidē transuersa per medium positissimū caput extenditur: altera à parte posteriori per lon- gitudinem in priorem, vti in ceteris caluariis o- mnibus, tendit. Hæc capite semper seruat, ut sutura per capiti longitudinem semper sit vna. Labdoeides sutura. Capiti fastigi- atum dicitur. Sinopsis ossa quadrilatera. Occipitis for- mæ maxillæ.



Ossium capituli  
differentia.

xia primam vertebra[m] habet. Horum autē sex  
quę diximus, incipitis ossa rarissima & infirmis-  
sima: occipitum densissimum, firmissimumque  
medium inter hæc ipsa, os frontis habetur. Re-  
liqua vtriq[ue] ad aures posita, multasiam se ha-  
bent. Namq[ue] horum pars, quia petre speciem re-  
fert, brioides vocatur: id os, protentis labdo-  
us futurę finibus terminatur. In eo styloides  
(quia columnę est similis) processus inest, in eo-  
demque continetur auditorius meatus. Altera  
deinceps pars, iuxta eos exortus habetur, quo-  
rum vnus mamillaris dicitur: alter ossis iugalis  
est. Præter hanc tertia quoque pars à temporib[us]  
occupatur.

#### DE OSSIBVS IUGALIB. CAP. II.

Temporis musculo præpositum est os, quod  
transversam in medio futuram habet: cuiusq[ue]  
posterior pars omnis, cum capitis osse quod iuxta  
aurem habetur: anterior, cum parte supercilij ex-  
trema, ad paruum oculi angulum continuat[ur].  
Id os totum Zygomata, à nostris iugale ap-  
pellatur.

#### DE OSSIBVS SUPERIORIS MAXIL- LAE. CAP. III.

DE futuris quę in maxilla superiori continen-  
tur, dicamus: quarum prima fove iugali exoritur,  
cuius pars posterior tendens, sub eiusdem  
ossis concavo definit, ibiq[ue] cum communi sphen-  
oidis ossis futura continuatur. Altera partim  
recte, partim oblique sursum ad oculorum se-  
des procedens, per medium illorum ambitum  
inferiorem fertur. Mox ibi in partem conditur.  
Altera enim pars, magnum prope angulum, ex-  
tiori in parte ad medium superciliorum pro-  
cedit. Quę deinceps huic succedit, per concavum  
sub eodem angulo ad communem capitis futu-  
ram pertinet, eadēq[ue] angulum ipsum compre-  
hendit, & illi quoq[ue] naturale foramentum subie-  
ctum, quod omnium quę sunt in eo loco fora-  
minum maximum est. Sub dictis duabus futu-  
ris, tertia pars antedictę scissurę, inferiorem  
in sede oculi ambitum incutens, interius ad imū  
tendit, ibiq[ue] communi capitis futurę iungitur.  
Quare terna maxillę ossa ab vtriq[ue] parte censetur.  
Quorum habetur maximum, quod iuxta iu-  
gale situm est. Deinceps sicut & magnitudine os  
illud in oculo ipso habetur, quod nervos ad su-  
periores maxillam cōtinet. Minimum omnium,  
iuxta magnum oculi angulum est locatum. His  
tribus ab vtriq[ue] latere os vnum insigni magni-  
tudine subiacet: cuius os mali, dentiumque  
omnium, exceptis incisivis, alveoli, partes sunt.  
Hæc autem ossa discernuntur futuris quatuor.  
Quarum verò & his maximis futuris duo alia  
exigua, quę scilicet nasi foramenta ad palatum  
tendunt.

#### DE OSSIBVS NASI. CAP. IIII.

Nasq[ue] quoq[ue] ossa duo sunt, quę futuris à medio  
superiorum descendens habent discernuntur. His  
ossibus inferiore in parte cartilaginea tenuiaq[ue]  
corpusecula (alæ vocant) ab vtriq[ue] latere adna-  
suntur. Ossimus in maxillę superioris extre-  
mo, os vnu, in quo dentium, qui secant, radices &  
alveoli continentur, id quod nonnulli simplex,  
nonnulli compositum esse tradunt: quem admo-

dum in superiori maxilla, alij quindecim, alij tan-  
tium ossa octo numerant.

#### DE DENTIBVS. CAP. V.

Dentes in ossium numero habendi sunt, qui  
sexdecim in vtriq[ue] maxilla existunt. Eorum au-  
tem priores quaterni, quod fecerit, *tepis* appella-  
ti, in vtriq[ue] radicibus singulis. Deinceps illi ca-  
nini hærent vtriq[ue], quibus singulę quoq[ue] radi-  
ces insunt. Ultra hos maxillares, quini ab vtriq[ue]  
latere: sed qui maxillę superiori insunt, ter-  
nus: qui inferiori, binis radicibus maiori ex par-  
te adherescunt. Nonnulli autem non vtriq[ue]  
quini maxillares, sed quaterni senive oriuntur.  
Eos non maxillares modò, sed molares etiā ap-  
pellant, quod his cibi artantur. Canini nomē  
inditum est, quod canum dentibus quamsimili-  
ni existant. Omnes in suorum ossium concavis  
insunt. Ex ossibus dētes tantummodo mol-  
lium cerebri nervorum participes sunt, ob idq[ue]  
evidentem sentiendi vim possident.

#### DE OSSIBVS MAXILLÆ INFERIO- RIS. CAP. VI.

Ossa maxillę inferioris, quod elixum in sum-  
ma menti extremitate laxatur, pars quę quasi  
capitulata est, duobus seu cornibus terminatur:  
quorum alterum in mucronem desinens, ten-  
dionem à temporis musculo descendente[m] re-  
cipit. Alterum capitis ossi sub eo exortu, quem  
maxillarem vocant, annectitur: ibiq[ue] in parau-  
lum finem rotundo quodam quib[us] rubercolu-  
selesent.

#### DE SPINA. CAP. VII.

Spina ex vertebra[rum] quatuor & viginti constat:  
quę si plures paucioresve sint, præter naturam  
sunt. Harum contextus omnis in cervicem, dor-  
sum, lumbos, & os sacrum dividitur. Cervicis  
capiti annectitur. Huic dein dorsum, cui pars inest  
quę & pectus longitudo: quod subest reliquū,  
lumbi appellantur: cuius pars vltima sacrolarō-  
ve osse finitur. Septem in collo vertebra[rum], duode-  
cim ad costas, ad lumbos quinq[ue].

#### DE VERTEBRIS COLLI. CAP. VIII.

EX vertebra[rum] colli, primę quidem duę inter se  
vndiq[ue] colligantur. Reliquarū verò quinq[ue] an-  
terior pars coalescit nexu cōstricta firmissimo,  
idq[ue] intervenit eius membrana, quę geminas  
spinalis medullę tunicas ambiat: quę ratione  
vertebra[rum] omnes se habent, duabus primis ex-  
ceptis, quę vt capitis obsecundent motionib[us],  
paulo laxiis collazent. Prima vertebra la-  
tissima & tenuissima est. Secunda angustior, va-  
lidioreq[ue] ac reliquę deinceps eodem modo se ha-  
bent. Quod enim spinę medulla in gignendis ner-  
vis consumitur, attenuariq[ue] magis, eo inferio-  
rum vertebra[rum] minuitur foramina. Quam  
autem capitis duplex sit motus, atq[ue] alter an-  
nuendo, abnuendoq[ue] fiat, alter in latera: illum  
quidem vertebra[rum] secundę processus potissi-  
mus præstat, hunc verò ipsius summę verte-  
bra[rum], & capitis transversę partes efficiunt. Poste-  
riorem processum, quem spinam vocat, omnes  
habent vertebra[rum], prima excepta, quę duntaxat  
in parte anteriori exiguum quiddam processum  
exigit. In ceteris cervicis vertebra[rum], trāsvērsi pro-  
cessus semper sunt perforati, septima eadēq[ue]

Dentes in vtra  
que maxilla si  
decim.  
Incisivi dētes.  
Canini dētes.  
Maxillares den-  
tes.

Dentes tantum  
recipere molles  
nervos à cerebro.

Maxillę inferio-  
ris ossium cō-  
sideratio.

Spina consistere  
ex vertebra[rum].

Colli vertebra-  
rum distinctio.

Vertebra[rum]  
foramina ex-  
tenuari paulu-  
tim.  
Capiti duplex  
motus.

Vertebra[rum]  
processus.

ultima excepta, cui interdum etiam, sed raro, à la-  
tenbus foramina insunt. Hos ipsos processus so-  
lae cervicis vertebrae leniter quasi bipartitos ge-  
runt, praeter duas primas, in quibus simplices  
plane habentur: ut sexta verò duplex manifestè  
apparet, & ceterorum omnium maximi: sicut  
& ea ipsa maxima est: quorum internus, latus  
admodum est. Pars cuiuslibet vertebrae anterior,  
qua inter se coalescunt, carum positissimum quæ  
in ceruice sunt, prima excepta, oblonga est. Ner-  
uis autem ab spinæ medulla oriens, ac iux-  
ta vertebrae compages procedunt, vtra-  
que vertebra parem primæ quasi operam con-  
ferat. In cæteris superior aut magna ex parte, aut  
omnino id præstat.

## DE VERTEBRIS DORSI. CAP. IX.

Thoracis vertebrae, quæ maiori ex parte sunt  
duodecim, omnes ad decimam vique processus  
habent permagnos: tum eos qui sursum, deorsum  
que versum spectant, tum etiam transversos, quibus  
costæ annectuntur.

## DE LUMBORVM VERTEBRIS.

## CAP. X.

Lumborum vertebrae quinque, & omnium cras-  
sissimæ sunt: quibus sanè per angustum inest fo-  
ramen, tenuisq; medulla. Earum autem proces-  
sus spectant sursum: atque ab eantantim vertebra,  
quæ præposita est, semper nervus ecumpit. Habent  
singulæ lumborum vertebrae interiore in  
parte foramina nullò disposita ordine, in quæ se  
inferunt venulae, satis manifestæ & conspicuæ,  
cùm in cæteris vertebis, vel nullæ visquam, vel  
per exiguæ spectentur.

## DE SACRO OSSIS. CAP. XI.

Id os vertebis, quæ parte cum superiori alligatur,  
proportionè respondet. Ipsi autem trans-  
versi processus grandes patentissimè sunt, quibus  
in exteriori parte sinus inest quidam leniter ca-  
vus, in eumq; illud ossa ingrediuntur. Id ipsum  
os ex tribus particulis constat, hiarumq; in extre-  
mitate os aliud quartum, quod coccyx nomina-  
tur, additum est. Nervus autem, qui à spinæ medul-  
la per sacri ossis foramina procedunt, iuxta suarum  
vel vti vertebrae compages, sicut per spinam totam,  
profluunt: non tamen ab utroque la-  
tere, sed intrinsecus quidem, atque extrinsecus:  
hiq; omnes tria constituunt pars.

## DE COCCYGE. CAP. XII.

At coccyx ipsum ex tribus particulis constat,  
quæ plus cartilaginis, quam latum os, habent. Iuxta  
earum compages nervi posteriori ex parte  
prodeunt. Gemini priores ex ea oriuntur parte,  
quæ coccyx latè os attingit. Insequens pars inde  
ortum habet, ubi prima huius ossis pars cum  
secunda committitur. Duo alij inde egrediuntur,  
quæ secunda eiusdem pars, cum tertia con-  
iungitur. Iuxta tertiam huius extremitatem, quod  
reliquum est ex spinæ medulla, simplex nullique  
affociatum profuit.

## DE THORACIS OSSIBVS. CAP. XIII.

Os pectoris, costæ, itemq; ex spina dorsii verte-  
brae, thoracis sunt ossa. Costæ ab vtraque parte  
duodecim, singulæ cum singulis vertebis con-  
nectuntur. Ossa pectoris per synarthrosin invicem  
alligantur. Sunt autem numero septè, sicuti

veræ costæ, quæ cum eo alligantur. Nam quinque  
inferiores costæ, quæ notæ dicuntur, in cartilagi-  
nem parum firmam degenerant, & cum dia-  
phragmate, non cum pectore conglutinantur.  
Imò pectoris ossi cartilago triangula adnaci-  
tur, quam enisurionem appellant. Costis omni-  
bus non par longitudo est, sed supernæ internæq;  
mediæ breviores sunt.

## DE SCAPVLIS. CAP. XIII.

Scapulae post thoracem sunt sitæ, gibbæ qui-  
dem exteriori ex parte, intrinsecus autem firmæ:  
ad hæc in ima basi tenues, oblongæq; in summa  
verò crassæ, paræq; existunt. Os scapulae maio-  
ri ex parte cartilagine, sed in imo vberius, con-  
tegitur, à spinæque tenue inclinat, & paulatim  
plenius efficitur, donec ad acromion locum  
pervenit, ubi iugulum annectitur. Hanc enim  
compactionem, nonnulli acromion appellant.  
In ea parte, scapularum ossi processus quidam  
subest, quem scapulae cervicem nominant: isque  
in acetabulum deflexus, cum humeri capite col-  
ligatur.

## DE IUGVLIS. CAP. XV.

Iugula, hoc est, clauæ, ab utroque latere sum-  
mæ pectoralis ossis extremis annectuntur:  
eique fistulosi sunt, figuræq; & crassitie inæqua-  
bili. Pars namque eorum inferior, quæ pectoris  
ossi alligatur, crassior cæteris, rotundiorq; est.  
Huic succedens, longè gracilior. Quod reli-  
quum est, totum rotundum, inæqualibet est,  
quoad cum scapularum osse committitur, ubi  
quasi latissimum est. Medix iuguli tonus par-  
tes exterioris gibbæ sunt, præsertim quæ ad scapu-  
las tendunt.

## DE HUMERO. CAP. XVI.

Maximum omnium os humeri (sæmone ex-  
cepto) est, idq; vtrinque supra infraq; alligatur.  
Summa eius pars grandissimum habet caput,  
paræque cervici contigmentum, à adnaci-  
tumq;. In eo iuxta anteriorem partem sinus qui-  
dam est, cui alicui parula fissuræ similis, qui to-  
tum ipsum caput in duo quasi rubercula bifa-  
ciam dividit. Pars autem inferior, in ruber-  
cula definit inæqualia: quorum ei quod extrinsecus  
sinus est, capitulum radij annectitur. Cum eo  
verò quod est in interiori parte, nullum os proe-  
sus committitur. In ima humeri parte sinus per-  
fissus est concavus trochlearum orbitis. Cu-  
bitus hunc circum movetur. Vbi autem sinus  
hic definit in extremis vtrinque lateribus, duo  
præterea sunt sinus, quorum anterior postero-  
re est minor. Ij coronas cubiti, hoc est, acutos  
processus excipiunt: horumq; anteriorem, quem  
cubitus omnino necitur, anterior sinus: quem  
tenditur, posterior posteriorem recipit. Cæteræ  
humeri partes gibbæ quidem anteriore atq; ex-  
teriori in partem posteriorem, atque anteriore, fi-  
mæ sunt.

## DE CUBITO. CAP. XVII.

Pars omnis quæ inter humerum & carpum si-  
ta est, eiusdemque etiam partis os grandius, cu-  
bitus appellatur. Is alteri fust ossi, quod ra-  
dium nominant. Huiusque pars extrema supe-  
rior leniter caua, exterioris humeri ruberculum  
recipit, eiq; alligatur. Cuius quidem connexionis  
est

Dorsii vertebra-  
rum consideratio.

Lumborū ver-  
tebrarum con-  
sideratio.

Sacri ossis con-  
sideratio.

Os sacri ex tri-  
bus constare par-  
tibus.

Coccyx ossis  
consideratio.

Thoracis ossium  
consideratio.  
Costa vtrinque  
duodecim.  
Pectoris ossis  
descriptio.

Costa vtri-  
usque, medius  
quinque.

Cartilago co-  
stalis.

Scapularum  
consideratio.

Acromion.

Iugulorum os  
descriptio.

Humeri con-  
sideratio.

Cubiti consti-  
tutio.  
Cubitus radii  
descriptio.

Cubiti proxi-  
mi descriptio.

*Cubiti periosus  
sui dicitur.*

est munua, modo in pronu, modo in supinu;  
totam manum adducere. Cubitus duos habet  
processus: quorum anterior minor est, alter ve-  
ro grandior: ab istis cubiti ipsius sinus signat li-  
teræ similis comprehenditur. In hunc sinum, lu-  
meri orbita inferitur. Huius autem nexum, tenen-  
dum, curuandiq; totam manum officium est. Ra-  
dius supra in frangit validis ligamentis cubito illi-  
gatur: media inter se omnino delinunt. Vterq;  
adnaram appendicem iuxta carpi habet partes;  
sed extrinsecus gibbam, intrinsecus autem ca-  
uam: cubitus quidem iuxta minimum digitorum,  
radius vero iuxta maximum. In sinu etiam modo sese  
carpus insinuat, annectiturq;. Inest autem cubi-  
to ex abundantia quadam, processus quem co-  
lumnarem appellant, sique brachiali etiam ne-  
citur. Ad hunc quidem nexum pertinet carpus  
in obliquum ducere: ad alteru vero, in rectum,  
cuius opera summam manum extendimus, in-  
flectimusq;.

*Coloquium pro-  
cessus.*

*Carpi confide-  
ratio.  
Carpus constat  
ex ossibus octo.*

PRIMA pars palmarum carpos dicitur, ex ossibus  
octo, duplici distinctis ordine, constans. Dura  
omnia, & parua, nec medullifera, multiplicisq;  
figure sunt. Cuncta nervis cartilagineisq; nexi  
bus inter se per synarthrosin constructa, non co-  
gnata cernuntur: exteriori quide in superficie,  
leniter gibba, sinuata intrinsecus. Pars carpi su-  
perior ex tribus ossibus constat, quæ in rotun-  
dam quasi formam constructa, cum cubito, ra-  
dioq; & columnari processu annectuntur: hoc  
tamen excepto, quod carpi os, quod minimum  
digitorum respicit, exigui lenisq; sinu, columnare  
cubiti processum admittit. Ex his autem mediis,  
ibi positis sedem habet, ubi cubitus radiisq;  
inter se copulantur. Tertium, quod bipartitum  
est, a radio comprehenditur. Pars carpi inferior,  
quatuor ipsius ossibus metacarpio alligatur. At  
quintum, iuxta carpi partibus insidet, quæ iuxta ca-  
bi processum columnarem sunt fixæ.

*Inter carpi os  
sideratur.*

*Digitorum sin-  
gulis ex ossibus  
tribus constare.*

*Metacarpium  
distat ex qua-  
tuor ossibus.*

DE METACARPIO. CAP. XIX.  
INTER digitos & carpus ossa quæ palmam ex-  
plent, metacarpium appellant: id quod per syn-  
arthrosin carpo, digitorum autem priori pha-  
langi per diarthrosin alligatur. Pollicia tantum-  
modo prius internodium, ex transverso ipsi me-  
tacarpio est annexi. Singuli autem digiti ex tri-  
bus ossibus constant, priori semper internodio  
in subsequens sinum habente, luraque dicen-  
dum est, pollicem ipsum ex triplici osse constru-  
ctum esse: ac primum ipsius internodii, cum  
metacarpio minimè connumerandum. Vnde re-  
cte dixerit quispiam, ex quatuor duntaxat me-  
tacarpium, ipsos autem digitos ex quindecim os-  
sibus constructos esse.

DE OSSIBVS QVAE CVM SACRO  
OSSE COMMUNENT. Cap. XX.

RECTIS ab vtroq; latere magnisq; lani ossia pro-  
cessibus, duo quædam ossa appohta adstructaq;  
sunt: quibus iureq; nullum nomen est indi-  
candum. Nam late ipsorum supernæ partes, illius  
ossia: exteriores post femoris ingressum, inferio-  
resq; coxendicum: quæ inde in anteriora pro-  
tendunt, tenuisq; & forata, atque inter se in extre-  
mo cognate sunt, pectinis ossa appellantur. V-

trique coxendici prægrande acetabulum inest,  
cuius fororis capite uexu validissimo copula-  
tum, cognatumq;.

DE FOEMORIS. CAP. XXI.  
OS femoris magnitudine cunctis animantis  
ossibus præstat: id supra, coxendici: infra, tibiae  
alligatur. Superiori in parte rotundissimum ca-  
put habet, prolixæ quidem crurici ad interiora  
inclinate adnatum. Infra leniter patescens, in  
duo tubercula desinit, adeo quidem grandia, ve  
capita appellari possunt: quæ sanè tibi an-  
nectuntur, non modo membranosis ligamentis,  
sed tribus quoque alia validis, rotundisq; quo-  
rum vnum ab exteriori tonus connexionis par-  
te, ab interiori alterum, a medio posterioris in-  
teriorisq; tertium porrigitur. Tonus autè for-  
mis forma, anteriori in parte exterioriq; tibi-  
ba: in posteriori interioriq; sima est. Sub huius  
crurici sunt duo exigui processus (trochanter-  
as vocant) quorum anteriorem, qui est in alor,  
appellant natem.

DE TIBIA. CAP. XXII.  
TOTA pars cruris, quæ inter talum genūque po-  
sita est, eiusdemq; etiam partis os gradus tibia,  
appellatur. Hæc interiore in parte tibia est, eique  
tantummodo femur ipsum annectitur. Os au-  
tem quod extrinsecus locatum est, sura nomi-  
natur: quæ crassitudini tibiae admodum cedit,  
nec adeo protegitur, ut genu ipsum contingat,  
verum supra in frangit tibi per synarthrosin al-  
ligatur: media inter se penitus delinunt. Tibia,  
quæ femori copulatur, magna quidem adna-  
ta, coagmentataq; appendice, duplicem in sese si-  
num habente, capita femoris sese insinuanna  
recipit. Tibia quicquid anteriori in parte tenuis  
& carnia est experta, Crea dicitur: imò ab vtro-  
que latere tibiae, suræq; partes, malleoli nuncu-  
pantur. Hallucinantur autem qui eos talos ap-  
pellant: nam sub his vtriusq; talus consistit, ac vn-  
dequaq; contegitur, ut ne cum tangere quidem  
possint. Malleoli verò extrema tibiae suræq; pro-  
cessuum partes sunt: gibba quidem exterior ex  
parte, intrinsecus caua.

DE PATELLA. CAP. XXIII.  
QVA femur tibiae annectitur, os extrinsecus car-  
ni nigrum, rotundumq; appositum est: quod  
gibba subiectionum osium aptis finibus com-  
prehendit: paulumq; intumescit, quod inter fem-  
ur, tibiaemq; spatium patet, complectitur. Id ip-  
sum os patella & mola appellatur.

DE PEDIS OSSIBVS. CAP. XXIV.  
TALUS ab imia tibiae suræq; processibus com-  
prehenditur. Eius pars quam *scaphoides* vocant, sur-  
sum vergit. Posteriores levigatæ omnes, mo-  
dicæq; orbiculatæ sunt, & ad superiorem potius  
spectant: anteriores rotundo quidem capite ob-  
longæ crurici adnato, cum osse connectuntur,  
quod scaphoideus dicitur. A dextro & sinistro  
latere, in duo extranea supercilia id desinens, sub  
tibiae suræq; cauis excipitur. Ipsius quoque pars  
interna laevorem fere habet. Huic subest os pe-  
dis maximum, quod calcem vocant: idque ip-  
sum & rotundas partes ex talo recipit, & gemi-  
nos quos habet excessus, in sinum eius percom-  
modè inserit. Pars vero quæ ingredimur, leni-

*Femoris confi-  
deratio,  
Femur os  
maximum aliorū  
maximum.*

*Trochanter.*

*Tibia confide-  
ratio.*

*Sura.*

*Crea.*

*Malleoli non  
viri vocantur  
tali.*

*Patella confi-  
deratio.*

*Mola.*

*Pedu osium  
confideratio.*

*Scaphoideus os.*

*Calc.*

ter rotunda & latiuscula est. Posterior quoque rotunda est, cuius tibiae rectitudinem excedit admodum. Ex paribus eius anterioribus, quæ e regione magni digiti sita est, ipsius tali capiti subiacet, nec cum altero copulatur osse. At eius extremitas quæ minimo respondet digito, cum cyboeide osse per synarthrosin neclitur. Cyboeides autem à parte exteriori iuxta scaphoeides positum est. Verùm hoc, quæ cum talo iungitur, sinuatum, cyboeides verò gibbum existit. Tria deinceps ossa parua inferiori scaphoeidis par ti per synarthrosin copulantur: cum quibus enī exteriorē ex parte cyboeides pariter porrigitur.

Cyboeides os.  
Scaphoeides.

Post hæc quatuor ossa, prima pars pedis quam tarsos vocant, finitur.

Tarsus.

# DE PLANTÆ OSSIBVS.


## CAP. XXV.

PLANTA inde inchoatur, quæ ex quinque ossibus constructa est. Post hæc deinceps pedis digiti sita sunt, qui ex ternis internodiis omnes constant, pollice excepto, qui ex duplici rātur cōstat. Horum dearticulationes membranosis: quæ verò in talo calcē habentur, validioribus ligamentis coarctantur. Sane autem sint hæc tryonibus, prima de ossibus rudimēta addiscenibus.

Planta pedis ex quinque ossibus constat.

## LIBRI DE OSSIBVS FINIS.





**GALeni PERGAMENI**  
de dissectione Venarum & Arteriarum, liber unus.



Cave vena ob-  
sideretur.

Cum omnia ar-  
teriarum origines  
ante consider-  
entur.

Infirmitatem  
venarum con-  
sideretur.

Peculiarium  
Pylori.

Vix in ventrem intestinorum deferun-  
tur venae, veluti radices arboris  
iunt. Ea vero quam caavam appel-  
lant, quidam cum truncis exiit, o-  
mniumque toto corpore spargun-  
tur venarum. Eadem ratione arteriae, quarum  
origo omnium est cor, quae quidem pulmones  
petunt, imaginem radicis ostendunt. Quam au-  
tem Aristoteles aortam nominavit, ea caudicis  
in arbore proportionem subit. Igitur ab ea ve-  
na, quam iuxta caavae iecoris, portas appellant,  
cum ab uno principio prodentes, septem ve-  
nae in regionem ventris descendunt. Quarum  
prima, brevis quidem illa, atque interdum sola,  
interdum aliis associata minutulis, ad dodeca-  
dactylum intestinum descendit, carne quadam  
glandulosa, quam pauciores dicunt, fissilem. Sec-  
unda autem, exigua etiam, ad pylorum, imam  
ventris partem, assurgit, atque in eam regionem  
ventriculi, quae circa & ante pylorum est, disse-  
minatur. idque praeter alios duos insignes ramos,  
qui a portae vena ori, in ventriculum & lienem  
se expandunt. Tertia similiter, ex magna vena

enascitur, quae versus sinistram descendens, ex-  
tremum magnorum intestinorum mesenterium,  
ad sedem usque complectitur. Quarta post hanc  
vena, a dextris partibus ex eadem magna ve-  
na, versus pylorum descendens, ad gibba ven-  
triculi effertur. Quinta deinceps, ex eadem ma-  
gna nascitur vena, in ipsius latere dextro, quae  
coli mesenterium, numerosiori propagine ve-  
narum invadit. Sexta similiter orta, ad ipatium  
pervenit, quod inter duo iam dicta mesenteria  
iacet. Id enim plurimas venas habet, & in ieiunum  
primum, deinde in omne deinceps tenue inte-  
stinum fissura multiplex dividitur. Postrema ve-  
ro eius venae pars, cum caecum intestinum com-  
plectitur, tum quandam exiguum coli partem,  
qua ipsum caeco annexum. Ad hunc sane mo-  
dum venae illius quae a portis prodit, in intes-  
tina, splene, & ventriculi, digestio perficitur. Quin-  
etiam omnes omnes intestinae venae, ab iisdem ipsis  
venis propagantur. Igitur per omnes iam dictas  
venas, cibis ad hepatis portas suggerit. Hinc ve-  
ro per venas ad ipsius fibras pertinentes, in totum  
iecur permanat. Indeque rursum in alias assumitur  
venas, per gibba quidem partem dispersas, ceterum  
a maxima alia vena ortas, quae ob id causam nomi-  
nat. Ab ea etiam aliae propagantur, quae in omnes cor-  
poris partes sanguinem nuant. A iecore enim vtriusque

Omnis vena  
a mesenterio ori-  
atur.

Distributio  
alimentis consi-  
deretur.

Cave vena  
dum sit,

prolapsa, sursum quidem per septum transversum, ad cor attollitur: deorsum verò in spinam dorsii contorquetur, atque inibi super magnam defertur arteriam. Iam verò ab ea quæ sursum tendit, onnuntur primò quidem coniugatio ad septum transversum: deui capillorum modo renoues permulget, in membranas interceptes thoracem, moxq; in pericardium runicam. Post illas alia magnitudine insignis, in dextram cordis aurem fertur, atq; inde ad dextrum ventriculum. Ali hoc alia duplicè, vt arteriæ, tunicam habens, in pulmones progreditur. Quinetiam alia quædam exigua per exteriorem cordis superficiem, in totu eius visceris corpus spargitur. Quis autem corisum præterit vena caua, tamiam se sumans ad iugulum, obiter quoddam sui germen diffundit in omnes thoracis partes, præter primam duo, interduum verò etiam tria, costarum intervalla. Deinde alias quædam prætenues venulas, ad membranas mittit thoracem interficientes, necnon ad thymum vocatum, Quum verò prope iugulum pervenit, in duas dividitur partes: atq; ita oblique in latus utraque pars inclinata, à media paululù regione divertit. De quibus, dum ad sibi vicinam utraq; ascendunt elauicula, in media lanone, quæ ad thoracis anteriorem perveniunt, radices sparguntur. Præter has, magnarum venarum multiplici se fissura scinduntur coniugatio, intercostalia superioris thoracis alit spant, & quæ circa scapulas sunt loca, tum nonnullos etiam ex interioribus colli musculis. Ab his ipsis venis etiam illæ nascuntur, quæ vbi ad sextam colla vertebram pervenerit, in ipsa se foramenta insinuant, ad caput vsque efferuntur. Quicquid aut ex eis superest, ad axillas porrigitur: ac dein fissura multiplici, per manuum excurrit toram in nimis magni musculi partibus, in ipso brachio exporretur. Ex eis autem propagandibus vna, per interna hæc quoq; percurrentes, circa brachium in orbem complicatur, posteriorumque ipsius regionem ita perrepat. Mox in exteriorem partem, eandemq; anteriorem, subit ad cutem, atq; illinc deorsum tendit, donec ad brachij commissuram pervenit. Postrema verò eius pars, aliquando exteriorem brachij nodum excedit paululum: nonnunquâ multò vltius progreditur, sub cute secundum os cubiti deorsum tendens. At omne quod de magna vena reliquu est, ad medium pervenit cubiti articulum, vna cū viciniore neno ramos expandens ad intimas musculorum eius loci partes, vsq; ad intus brachij caput, nihilòq; minus per profundum ad posteriores, anterioreq; musculos. Sedenim priusquam in cubiti flexum ingredietur, in venas scinditur complures, è quibus multæ in superficie exant: omnium maxima profundius demergitur. Atq; magna ex parte vna quidem vena, à magna propagatur, ad interiora magis oblique declinans: ac iubeinde altera ex inferioribus cubiti partibus, multiplici sparsa foveole, ad carpi pervenit: ac tertia deinceps, circa medium maximè cubitur. Cæterum earu fines iuxta carpium miscuntur. Elansimus autem simul & maximus ramus, qui ab ea vena de qua modo in stutus est sermo, propagatur, in medium

pervenit flexum, quâ cubitus cum brachio contigit: etiam oblique confuit alterius venæ, quæ per brachij anteriorem sub cute sira est, nò exigua portio. Duæ enim hæc totius sunt manus venæ: tum ea quæ per axillam in manum fertur, tum ea quæ per claviculam, quam humeranam appellant. Venim non semper deinde harum venarum positus, sicut nec per crassitudo est. At secundâ naturam maximè est, vt utriusq; venæ pars in interiori cubiti flexum quadantenus deferatur: quæ partes postea quâli coherint, venam producant, quæ omnium in cubito exantium fertur amplissima. Secundum hanc præcipua magnitudine humerana est. Ea hinc profecta, quâ cubitus cū brachio coarctatur, perq; radii porrecta, ad extremi cubiti tuberculum, quod carpo adixeret, pervenit: atq; inde mox infimè, eademq; eximæ carpi ipsius parti distribuitur. At illa, quam ex consuetudine duarum venarum omnium in superficie exantium maximam fieri dixi, ab interioribus cubiti partibus incipiens, primum confendit radiu: deinde in extimam evadit partem, vbi in ramos scissa duos, altero ad radii extremum procedit, altero ad summum pertingit cubitum, quâ & ipse colizet carpo: atque imbi venam contingit, quam ab humeraria propagari retulimus. Iam verò, quemadmodu quæ in interiori cubiti parte sunt venæ, ferè iuxta carpum in multas exiles venas, & inter se commixtas scinduntur, sic etiam, multòq; luis magis venæ quæ per exteriorem cubiti partem feruntur. Porro quæ altius per cutem manumq; extremam venæ immerguntur, à duabus magnis oriuntur, hoc modo. Quæ parte ab utraq; magna propagandis quidam ostendimus, quæ ad flexum brachij tenderent, duo rami, ab utraq; singulis, in profundum procurunt, ibiq; similiter mutuo complexu iunguntur. Ex quibus rursum alie duæ insignes venæ exoriuntur, quæ tandem suis germinibus musculos totius manus penetran. Quæ autem ad interioriorem thoracis regionem feruntur venæ, ad hunc constant modum. E medio duarum venarum in quas caavam memoravimus findi, vena oritur, quæ ad dextram ossis pectoris tendit: ab sinistra autem cauvæ parte, altera. Hæc igitur per totum feruntur thoracem, ossi pectoris subditæ, vsq; ad radicem cartilaginis ensiformis: & ad singula obiter intervalla costarum, ramulum ex se mittunt, quo coniunguntur extremis eius venæ, quæ spant intercostalia perrepat. Harum venarum portio extra thoracem emergit, ad subscapulas illic reficiendos musculos. Quæ verò ad mucronatam cartilaginem pertinent, tum in mammis asurgentes, tum in reliquâ pectus dispensare, deorsum procedunt, rectis subscapulis musculis, in quos partem aliquam mittunt. Quæ porro claviculæ adiacent cauvæ venæ partibus, in quas secari ipsam diximus, subiecta est venæ radix maxima, vtriusq; vna. Quæ quidem confestim asurgens, bipartito scinditur, duas ædens magnas venas: quarum altera per anteriorem, aversamq; colli partem, ad interiora magis recedens efferitur: altera in partem anteriorem deorsum quadantenus subscindens, mox sursum sublata, claviculâ ipsam ample-

Axillæ venæ.  
Humeraria venæ.

Media vena  
consideratio

Venarum aliam  
perrepatantium  
cubiti consideratio.

Venarum perrepatantium  
interiorum  
thoracis, consideratio.

Arteria venæ.  
Coronaria venæ.

Thymum.  
Insuper venæ.

Cubiti venarum  
consideratio.

amplectitur, ad modò commemoratam venam  
contendens extrinsecus. Et conueniuntibus, scilicet  
còmiscentibus, gignitur in summo emittis iugu-  
laris vtrinq; vna. At non eodem tempore aut mo-  
do aut loco nascitur. Duo autem hic humifmo  
de venarum solent esse coniugia: obliquum alte-  
rum, còsonnum ipsarum, & sese invicem con-  
tingentium in cauo iuguli: alterum autem mini-  
mè còsonnum. Decubant enim quasi io extimà  
colli partem oblique. Tres autem conspicuæ ve-  
næ oriuntur ab ea quæ circa claviculà còtorque-  
tur. Vna quidem quæ humeraria dicit (quòd ob-  
liquè desceat ad humerum) & sæpe eadem visi-  
tur crassitudine, cum vena ad collum subeunte.  
Reliquæ duæ, radices vtrinq; humeraria mino-  
res habent: quarum altera ad summum ascen-  
dit humerū, ac in proxima quinq; corpora trans-  
iens, ita occultatur: humior altera, per profun-  
da magis surreptans, secundum magnū muscu-  
lū ab oife pectore exporectā, ad caput brachij  
pervenit. Cæterum axillaris vena multò hume-  
rab est maior, & numerosior quàm illa in bra-  
chio sobolem habet prodeuntium ex se ramorū.  
Porro quantum reliquum est de magnis illis ve-  
nis, in quas vena caua diducitur sub claviculis  
recta per collum, gulam habet ante se positam,  
sursum effertur, produens interim varia germi-  
na, sed ab ipsa collo superficie remota: quæ nimi-  
um nutriti musculos altus delitescentes. Nam  
venæ ab extrinsecis in superficie iugularib; pro-  
pagate, plurimæ & tenues sunt, quæ per totum  
ambitum collis, facies, & capitis, vario plexu disse-  
minantur. Quia & lingua magnas accipit ab in-  
timis iugularibus venas, posteaquā ex per ra-  
mos cum externis se coniungunt. Reliqui autem  
omne ex internis iugularibus ad cerebrum  
assurgens, in caluam excedit per extremam futu-  
re labdoedis partem. Coniunguatur autem venarū  
omniū extrema circa ipsum caput, ipsiq; cum  
prima vertebra commisituram. At verò earum  
venarum quæ in partes corporis inferiores  
sanguinem truant, caua in lumbis sita, est origo.  
Hæc enim vena simulatq; e iecore primum se ex-  
prompsit, priusquā in lumbos còsidat, elatior  
adhuc existens, parte quidē dextra, in dexteri re-  
nis tunicā ac circumiecta corpora, varios spar-  
git ramulos. Sinistra autem, notabili magnitu-  
dine venam, quæ & ipsa in ramos cassā, corpo-  
ribus inibi existentibus distribuitur. Ac scapenu-  
mero à caua ipsa ad renem proficiscente, propa-  
gines mittuntur, quæ in rectis tunica intextūtur,  
ac vicinis in ambitum locis: exq; nunc filorum  
araneæ similes sunt, nunc paræ. Nam quæ à ca-  
ua inferuntur in renes, facili sunt omnium am-  
plissimæ. Denique post has ad testes deferuntur  
venæ. Ad sinistru siquidem, ramus mittitur  
ab ea vena quæ in sinistru præfertur renem. Quæ  
aut in dextru testem inferitur venā, ea quidē ab  
ipsa caua producit. Quiaquā hæc vena meli-  
semet obseruata est initia duo habere, sicuti ea e-  
riam quæ in sinistru testem se infinuat, perspe-  
pe. Hæc igitur venæ ad testes deferuntur, siue mas-  
siue faciemina animans fuerit. Habet quippe enī  
fœmina, ad vteri latera testes multò minores &  
densiores, quā visuntur in maribus. Secundū

ear venas, de singulis vertebis ad illa vene mirt-  
runtur, quarum postrema ad musculos qui ab-  
donau præceti sunt, attolluntur. Qui autem su-  
pra los muscoli extra thoracem iaceat, alimen-  
tum ac opitū à vasu circa claviculas exsioribus:  
tum eniam ab us quæ per pectoris os ad manu-  
tas tendunt, sicuti eniam ab us quæ sunt in spa-  
tis intercostalibus. Quænam per singula so-  
ramenta spua, singulæ venæ in medullā ipsam à  
caua lumbos perreptæ inferuntur. Porro in vlti-  
mus lumborum vertebis non amplius videre  
est artemiam venę subiectā, sed elatior quidem  
arteria supra venam eam provelit, vena autē  
per ipsas vertebas. Hæc igitur parte & sese con-  
iungit vtrinq; vas, & in duo membra diuicari-  
tur, initar luteri. Vtraq; autem colatentū va-  
sorum pars ad sibi subiectum crus obliquior de-  
scendit: prius tamē ipsorum vasorum quibusdā  
ramulis, ad alendas lumborum carnes, atq; in-  
terdum etiam ad eam pentionem partem, quæ ad  
lumbos spectat, reuulsis. Vtriusq; autem venarū  
coniugationis extrema, ad exteriores lat ossis  
partes se promūt, inq; musculos eam regionem  
consentientes, distribuntur. Deinde ad vteri  
partes inferiores, aliz venæ feruntur, quæ in cer-  
uicem ipsam disseminantur, & quadam sui parte  
amplexantur testiculos, altera vsq; ad vteri fun-  
dum pertinent: indeq; aliz subcuti velicam: alię  
per pubis os ad exteriora cum eius nervo exten-  
duntur, atq; per inferiores illius regionis muscu-  
los disseminantur: aliz per rectos ascendit mus-  
culos, extremisq; coniunguntur venarum, quæ  
per thoracem ad subcartilaginea descendūt. Ab  
eadem radice veoulæ vtriusque singulæ in vte-  
rum perferuntur, per quas mamma cum vtero  
maxima necessitudo exiit. Insuper aliud extra  
musculos est coniugium earum, quæ ad vtriusq;  
sexis pudenda pertinent. Ab his autem statim  
alia est vena vtriusque, quæ ad internos fumores  
musculos tendit. Post has verò aliz ab inguin-  
ibus ortæ, visuntur per illum regionem ascende-  
re. Aliz eniam obscuræ, à mammarum venis de-  
ductæ, has quas nuper dixi, sinibus suis con-  
iungunt. Reliqua magna vena in crus diuiditur, pri-  
mam iuxta inguina emittens propaginem, quæ  
cum parua arteria in musculos anteriores spargi-  
tur: secundam vtrinq; venam, quæ ex internis  
pambus ad genu vsq; subter cutem dissemina-  
tur, ac alias non paucas ad profundiores scemo-  
rum partes. Cæterum paulo altius quā fecimur  
cum tibia articulo iungitur, in tres partes diuidi-  
tur: quarum media, quæ maxima est, per ipsum  
deorsum ad popliteum fertur, atq; inde per pro-  
fundum suræ procedens, non modicam in mus-  
culos eius sobolem ramorum spargit. Altera  
autem parte quæ in superficie emittit, per exte-  
riorem partem alterius tibiae ossis porrecta, ad  
pedis prætingit articulum. Tertia verò quæ inte-  
rior est, ad anteriorem tibiae partem procedit, ac  
inde ad malleolum pervenit, ad ipsum tibiae ex-  
tremum, ut sanguinē mittat, quā commodissi-  
ma. Enimverò maxima quæ per profundum  
musculos distribuitur, duo cum arteria, extrema  
sunt, quorum alterū quidem manus, à tibia fer-  
tur ad interiora: alterum verò, per mēdā duorū

Abdomini ve-  
na.Thoracis mu-  
sculo externi à  
quibus vena  
alitur.

Vteri vena.

Prodeuntium  
vena.

Cruris vena.



tibix ofisium regionem, ad interiora pedis perducitur, ac propagini alterius venæ immiscetur, quæ ab exterioribus tibix partibus per fibulâ dixi descendere. Irasit vt sint venæ quatuor, quæ ad pedes descendunt: vna quidẽ omnium extrema, per gibbum fibule extremum: altera per partes ipsius interiores: tertia per anteriorem tibix extremi regionem: & quarta, quæ ex interioribus partibus ruberâtes tibix processus completa est. Hoc igitur tibi diffecctionis venarum principium esto. Deinceps de arteriis dicendum.

Harû origo est sinister cordis ventriculus. Hinc autem in pulmones, grana trahendi spiritus, de riuatur radicis instar, vna tenuis simpliciq; tunica constans: tum altera enam hac multo crassior, quæ vel vti truncus omnium artenarum existit. Habet præterea cordis ipsius corpus circumfusa in ambitum arterias duas: alteram quidẽ maiorem, quæ maximam ipsius partem amplectitur, alteram ea maxime regione distributam, vbi tertium ventriculum esse cœsum ait Aristoteles, quum ramen nusquam is reperitur. Has igitur arterias, simulatque maxima de corde se prompserit, ab ea produci vides, ipsamq; mox in membra haudquaquam paria diduci. Ethorum quidem, quod minus est, sursum ferri, ipsamq; cœlestem in partes rursus inæquales findi, ac subinde ipsarû maiorem, ad iugulum tendentem obliquam, de sinistra ad dextram thoracis partem porrigi, alteramq; oppositum habere finem. At verd arterie pars maior, quæ ad iugulum tendit, vbi prope thymû peruenit, primum quidem ad sinistram iugularem emittit ramum: post illum, alterum ad dexteram. Dein de quicquid ipsius restat, ad scapulam axillamq; sinistram tendit. Quinetiam quædam ad pectoris os, alia ad primas thoracis costas, alia ad spinales musculos, alia denique per foramina sex primarum colli vertebrarum deducta, vnâ cum venâ, ad spinalis medullæ membranas, descendit: alia ad summum lumerum, scapulam, axillamq; dextram extenditur. Quæ quidem, si vti & alix omnes, diuiduntur vnâ cum adiacentibus venis: quemadmodum & quæ arterie carotides appellantur: ex quibus vnâ cum iugularis internus, ascendit quædam arteria. At quæ in superficie extrâ iugulares, ex fine arteriis conspiciuntur. Omne autem quod ex carotidibus reliquum est, sursum rectâ procedens, in caluam penetrat, inibi plexû reniformem producit: deinde in duas rursus coeunt arterias, subrad cerebrum. Porro arterie quæ a corde se promitt, pars maior ad spinâ descenderit, quinamq; thoracis vertebram ascendit: & inde per totam spinam, vsq; ad latum os, descendit, primum propaginem quandam reuocem emittens in eas thoracis partes, quibus pulmones adiacent. Extrema autem ipsius ad arteriam vsq; ascendunt: deinde per singulas vertebras rami tum in spina intercostalia, tum ad spinalem medullam exoriuntur. Vbi autẽ egressa est magna arteria thoracem, primò duas in septum transversum arterias mittit: deinde in vterum, lienem, ac iugum vnâ. Interdum ex vna radice bifariâ ducta, ventriculo quidem, & lieni, & hepati al-

tera pars: altera intestinis distribuitur per duo mesenteria, tum id quod ad dextram situm habens, primarium est soli partium: tum id quod est omnium intestinorum medium. Nam tertium mesenterium, quod prope sedem pertingit, in sinistra situm, nullam inde allumit arteriam: sed de imis partibus in ipsum quædam inferitur, quæ propter renes à magna arteria inlusit & ipsa nascitur. Atqui inter hanc & modò commemoraras, duæ magnitudine præcipue ad res tendunt. Cum vasis etiam quæ ad dia & testes ferantur, arterie etiam ad eundem procurant modum. Cæterum arterie magnæ pars extrema, quum ad latera lumborum peruenit, supra positam venam transcendit. Quod postea quum tactum fuerit, itauid aliter quàm venâ scissâ, bipartito arteria partem vtranque in sibi subiectum crus mittit: à quarum vtrâque obiter singuli propagantur ramuli, qui conceptibus per vmbilicum inferuntur: in perfectis autem animantibus, ipsi ad os latum excurrunt. At ipsa cruris vtrinque arteria ad intimas distributa partes fertur cum magna venâ. Nam is vterus quæ in cruribus, manibus, abdomine, dorso, & collo per summam superficiem vifuntur, ne vna quidem subest arteria. Sed enim arterias in solo capite iuxta cutem inueniunt, tum eas quæ post aures, tum eas quæ ad vtrâque tempora extant. Porro in conceptibus venie arteriarum intertextantur, ab extremis venarum osculis procedentes, quæ ad vterum pertinent. Quibus inter se cœsuntibus, concurrentibusq; his, quæ ex coisunt factæ, arteris & venis, contingit ex ipsis fieri coniugium illud vtrorunq; vasorum, quod inferitur in vmbilicum. Arteriz siquidem velut fortis complexæ, ad arterias illas tendit, quæ à magna per spinam porrectæ mittuntur. Venæ autem, simulatque ex vmbilico se proiecerint, cœsunt, vnâ magnam perficiunt quæ ad concauum iecionis tendit, haud procul ab ea venâ, quæ ad portas est. Hæc igitur venâ sine arteria est, ac post illam tota caua, donec ad spinam peruenit. Sic nec septi transversæ venâ, nec illa quæ alit thoracem, nec humeraria item, nec axillaris (præterquam vbi altius coarctantur, vti in cubiti articulo) habet vllam arteriam adiunctam. Omnes siquidem quæ per cubiti superficiem expansæ sunt, carent arteriis, si vti & quæ tum iugulo, tum collo in superficie sparguntur. Omnibus denique superficialis, aut quæ per dorsum, latera, totum thoracem, inferiorem ventrem sub summa cute expanduntur, nullam inuenias arteriam subditam. Quæ autem ab his quæ profundius absconduntur, ortum habent, si quidem ex sublimi deorsum tendant, adiacentem habent arteriam: si vero ex vno subeunt, superne descendentes venis iungantur, siue arteriis ad glandia quædam evadunt. Sed ne illæ quidem venæ cum arteriis cœsunt, quæ in exteriores potentes musculos inseruntur. Arteriz autem sine venis ex sunt, quæ vesicam factam amplectantur in vtero, propagones ea, quæ à magna arteria procedens, in conceptum venam arteriosam se infundit, non substantia modò corporis, sed vsu etiam &

*Mesenterium simplex.*

*Arteria lumbi in crura diuina rectas.*

*Vena quibus nulla subest arteria.*  
*Arteria superficialis vbi cœsunt.*

*Venarum arteriarumque in conceptibus cœsunt.*

*Vena ab ipso arteria quæ sine arteria est.*

*Vena adiacens in arterias habentes.*

*Arteria ab ipso vena.*

*Pedem vena quatuor.*

*Artenarum origo, sinister cordis ventriculus.*

*Arteria vmbilica.*

*Tertium cordis ventriculum non alicui reperitur.*

*Arteria magna diuina.*

*Carotides arterie.*

*Plexum reniformem produci ab arteria carotidibus sub caluaria.*

*In iugum arterias mittit singulas vterque.*

functione existens arteria. In perfectis autem animalibus, sine venis arteriæ videntur, primum magnæ illæ quæ ex corde prodeunt: vna quidē, quæ ad quintam vsq̃ thoracis vertebrā descendit, altera, quæ prima omnium effertur ad iugulū. Post hæc ea etiā quæ ad scapulam & axillā sinistrem se inclinat. Iam arteria sine vena est, ex carotide propaga vna, quæ ad textum retiformem ascendit, quod etiā rete sine vena est. Tum verò, quæ ad septum transversum, earum nulla cum vena iungitur priusquam in extremā incidant venarum, quæ a caua exoriantur, quemadmodum nec primæ illæ propagines: quæ ad iecur, & ventrem, & lienem, & inæstina mittuntur. Nam ne illas quidem adiacent venæ, priusquam incipiant coniungi.

### GALENI PERGAMENI de nervorum dissectione, lib. vnus.



Vid nulla particularum animalis nec motum arbitrarium, nec sensum sine nervo obtruncat: quod si incidatur nervus, immobilis confestim, insensibilisq̃ reddatur particulara, inter omnes constat medicos. Quodd autem origo nervorum quæ spinalis medullæ sit cerebrum, quodq̃ aliq̃ nervi ex cerebro, aliq̃ ex medulla spinali oriantur, iam demonstrandum aggredior. Anteriores ventriculi cerebri in priorem procedentes partem, sensum leuiterque in angulum coarctantur, donec ad principium pertingant nasi, sese contingentes perpetuo, tenui tantum membrana distincti. Horum autem sinuum, ad partem vitæque, vna ex dextra, & altera sinistra, nervus est crassitudine insigni, & aliorum fere omnium nervorum mollissimus, ex ipso quidem prodens cerebro in oculos extracalum, per foramē æquē patens ac latum, quanta est ipsius nervi crassitudo. Videtur porro nervi ipsi, seu quedam oculorum radices. Verque siquidem in sibi adversum oculum sese quamlatissime explicat, ipsumque qui in oculo est, vitreum humorem, in orbem, sphaeræ modo, ambit, inibi etiam narium cerebri retinens. Sed in solis his nervus, antequā in oculos inseratur, sensibilibus quidam meanus inest. Ac prima quidem hæc coniugatio est nervorum qui a cerebro oriuntur, longè aliarum omnium mollissima. Altera post hanc est coniugatio in musculos qui oculos mouet diuturna, durior multo & tenior ea quam nuper memorauimus. Huic, dum per caluam procedit, non etiā quam primū nascitur, adiacet coniugatio nervorum tertia. Sunt autē molliores istæ, tum secundæ, tum quartæ, atq̃ aliarum deinceps coniugationū nervis, multinq̃ circa primā statim radicē apparent. Paululū durior, nervorum ex cerebro prodeuntū quarta coniugatio, statim post exortum, cum tertia miscetur, ac perperat primū quidem crassum involuclum cerebri, deinde etiā ipsum caput obductum os: tum rursus ad palatum recedit. At tertia coniugatio vbi secundam attingit, vna scinditur, atque desinit. Primū igitur singulæ ipsius partes, per commune cal-

uæ foramennum, ad inferiorem capitis partem descendunt. Intelligere autem conuenit, nullum nervum aut a cerebro, aut ab ipsa medulla emitti non coniugatum: sed semper alterum ad dextram, ad sinistram alterum, eadem prorsus vtrinq̃ue magnitudine, firum obtinere. Igitur pars exigua tertiæ coniugationis itatim quā maxillam iungitur, ante aures erumpit. Quod autem veluti truncus est omnium indeidem prodeuntium particularum, bipartitō scinditur primū, deinde membrum vtrinq̃ue in multas rursus partes: & alterum quidem tum in temporum ac superioris maxillæ musculorū dispensatur, tum in gingiuas, dentes, & cutem, quæ faciei preterduntur. alterum verò in radices dentium inferioris mandibulæ, gingiuarū & labra inferiora, necnon linguæ tunica dissemnatur. Quamobrem coniugationem hanc nonnulli gustatoriam appellant. At quarta coniugatio nervorum, à tertia recedens, sese in palatum infundit. Est & quinta coniugatio, cuius nervi non prodeunt ex vna radice, sed sibi inuicem sunt vicini. Sub hac enim auditorium nervus, in priori magis parte ad auditorium meatum descendit, vna cum dura membrana, quæ indeidem, vnde nervus, emergit: cum qua in latitudine sese effundens, meatus leuiter obducitur. Alter verò, ex parte aduersa in alterum quoddam osis petrosi formis cæcum foramen inseritur. Coit autem mox nervus hic cum eo qui progreditur foras, quā maxillam iungitur. Quod autem ex ipso duobus constat, in latum musculum scinditur, qui subiectus cuti, buccam siue maxillas mouet. Ad hunc itaque modum quinta digenerat coniugatio, quam duplicem esse constat. Sexta autem nervorum ex cerebro ortorum coniugatio, foramine vna est, quod ad futuræ labdoïdes extremitatem inferiorem inter patet. Principia autem itatim è cerebro prodeuntium trium nervorum obtinere quæ vbi caluam emerferunt, multas rursus cum inter se commiscuntur, rursus etiam cum adiacentibus aliis. Superest septima nervorum cerebri coniugatio, cuius pars maxima in linguæ musculos dispensatur. Exigua verò quæpiam particula ad musculos pro venit communes cartilaginis in gutture scutiformis, & inferiorum laterum eius, quæ appellatur labdoïdes, atque in alios quosdam non semper. Commiscuntur autem inter sese nervi ad inferiorem capitis tendentes, tum is qui à tertia coniugatione, tum is qui à duabus nouissime memoratis oritur. Ac hæc nervorum qui à spinali medulla nascuntur: prima secundæque coniugatio sicipis foratorem inire cum hisce nervis. Et ubi quidem periepe videbitur, quod de altero in alterū traicit, seu vniculū aliquod duntaxat ambobus esse commune. id verò alterum augeat, alterū exihorem reddat. Porro ignorant vniuersi anatomici, quomodo propriis laryngis musculis nervi è sexta coniugatione distribuantur, terti vtrinq̃ue prodeuntes, ut scilicet numero omnes sint. Laryngis etenim muscula, ab illo nervo quædam accipiunt germina, qui per foramen ad extremitatem labdoïdem futuram intercepti exoritur: qui si laqueo quidem intercepti,

Nervus omnes coniugatus pro dicit.

Chingatio nervorum quatuor.

Latam musculum.

Chingatio mollium nervorum sexta.

Chingatio mollium nervorum septima.

Laryngo nervos omnes sex. Maior animal quatuor interrupto reddat.

Statim murum animal redditur. Aliorum porro duorum, alter ad utroſq; faucium musculos, linguæq; radicem, pertingit: alter ad ſcapulæ muſculum, & ad eum qui latus eſt, alioſq; quorſdam illius loci musculos.

GALENI PERGAMENI  
de anatomicis administrationibus,  
Liber I.

Of course, the  
the first.



piā, quā in aqua extinxerā, detraxissem olim extremam cutem, inveni in illa etiam musculum re-  
nuem & membranosum, eoque omniū inci-  
piens: qui habebat inferius principium, sub-  
ter vniueriam illam cutem expansum. Vt igitur  
exordium sibi manibus, finguli in fingulis digi-  
tis ad extremum vsq; extenditur musculi fibræ  
quasdam exiguas, & telæ araneæ perissimæ, in  
ossa post articulorum iuncturas lita, transmittit-

*Myristicinus costatus*  
var. *costatus* and *hirsutus*.

Musculus digito-  
rum.

Doffenside order.

*Liocassis*

Yndon.

*Myzula campbelli*  
*Myzula*

Vol. 10, no. 10

Traditionen sind  
das Leben.

terquam magno, iuxta secundi internodij priu-  
cipium inferius, à quibus secundus eorum articu-  
lus flectitur. Alterum quod huic subiacet ten-  
dendum caput in quinque discretum particulas,  
in extremam vique digitorum aciem pertingens,  
mibi insensit. Tendines autem vniuersos va-  
lens aliquod munimentum, singulos priuazim  
ambit, multo sanè ipso tendine durius, atq; mem-  
branis craffior simile. Porro si quid caput in ra-  
mos scissum, tendines singulos vnà cum præd-  
icto involucre attrahas, flecti per eos, qui subie-  
cti digitorum ossibus insident, primum ipso-  
rum tertiumq; articulum cernes: hunc quidem,  
tanquam iuxta tendine inserto illum autem, per  
circumiacens ligamentum, quod ossibus adhae-  
rescit. At pollicis nihil neque ex sublimioribus il-  
lus tendinibus, neque ex communi eorum capi-  
te accedit, sed aliunde quidam tendo in tertium  
ipsum articulum ex porrigitur, illumq; similiter  
illius mouet. Nam internodum secundum, per  
tunicam quae ipsum tendinem ambit, mouetur.  
Cæterum aliorum duorum musculorū, qui car-  
pum flectunt, confectioem, paulo supra articu-  
li commissuram exordieris. Quippe secernens  
ipso à circumiacentibus partibus, ad vique su-  
perius inferiusq; extremum, tendines quidem  
inferioribus articuli partibus insinuari videbis:  
capita autem ipsorum, cubiti atque brachij no-  
dum adire. Vnus itaque tendinum in carpo iux-  
ta parui digiti rectitudinem, ossi cartilagineo  
columnarive inhaerescit. Alter tendo itam ab  
articuli iunctura profundum mergitur, vt in  
carpi ossi aliquod putes cum inseri, quum in-  
feratur tamen iuxta principium illius ossis, quod  
in metacarpio consistens, digito præponitur in-  
dici. Hi ergo quinque musculi totam interio-  
rem cubiti occupant regionem, quibus adem-  
ptis, apparebunt radj motores. At externo-  
rum dissectio sic administranda est. Sub cute, va-  
sa neruūq; superficialia extant: quibus cum mem-  
branis exemptis, quatuor ligamina transuer-  
sa clare cōspicis: vnum cubiti radij extremum  
constringens, alterum in cubito dantaxat prio-  
ri subiacer: reliqua duo soli radio inhaerent. Sed  
primum quidem ipsorum, recta linea incidend-  
um est. Deinde duas particulas, ad suam quan-  
que radicem reuelleret, aut penitus præcidere, o-  
portet. Post hoc aut, primum caput quatuor ten-  
dinum digitorum, præter magnum, tendentium, in  
medium aliorum situm, hamo in altum attollere:  
mox id quod exiguus duos digitos ab aliis di-  
scit in latera, in vno scissum tendines. Postea  
reliquum tertium, similem motum gradioribus  
tribus digitis suppeditans, similiter attollere ex-  
pedi. Primum itaq; tendinum caput, sicuti & se-  
cundum, ex vno musculo prodit. Tertium bifa-  
riam tibi incidere licet. Nam quod duos digi-  
tos, indicem & mediū mouet, caput ex vno pro-  
cedere musculum deprehendes: quod verò ma-  
gnū, ex altero. Atq; hac ratione quatuor muscu-  
li prædictis ligamentis suberunt. His succedit  
qui carpum, iuxta parū digitorum, extendit ten-  
dine vnico, metacarpj ossi, quod exiguū digi-  
to præponitur, inserto. Continet ipsum haud va-  
lens ligamentum, quod ex solo cubiti tubercu-

lo oritur. Prope magnum autem digitum, alte-  
rum hic quoq; validum ligamentum caput duo-  
rum constringit tendinum, quorum vnus in os,  
quod ante magnum digitum in carpo colloca-  
tum est, coniungitur: alter in ipsum magnū digi-  
tū, itam à primi articuli iunctura, ingredit. Quos  
duos tendines à duobus musculis in vicem coe-  
nantes genitos dicere, haud inconueniens fuerit.  
Reliquis exteriorum cubiti musculorum, qui  
extendens carpum bifido tendine metacarpio  
se ante indicem mediumq; digitum inserit, caput  
tendinis in radio fixum, iuxta carpi iuncturā ex-  
git. Porro in exteriore brachij nodo, tria muscu-  
lorū capita inuenies: eius sanè qui digitos qua-  
tuor extendit, elasticum: qui iuxta paruum  
degnum, carpum relectit, humilimum: me-  
diū verd inter illa, quod digitos duos minores  
abducit à cæteris. Sub his interius in vno, duo-  
rum digitorum musculi reconduntur, qui ex to-  
to ossis cubiti in vicem coeuntes originem du-  
cunt: qui quidem duobus digitis ferunt maxima  
ex parte: qui verò magni digiti est, prope supe-  
rius extremum. Incumbit huic alius, carpi collic-  
eius musculus, qui maioris digiti caput extollit.  
Idem verò totā profunditatē regionis, quae inter  
vtrūq; os radj & cubiti habetur, occupat. Cuius  
musculi dissectionem, quemadmodum & alio-  
rum omnium, à carpo auspicari cōuenit. Sub eo  
autem, vbi ipsum à ligamine atque à coherente  
musculo auulseris, occurrer quidam alius obli-  
quus, exilisq; de cubito in radium perueniens.  
Prius tamen adonere musculum prædicto adna-  
tum, qui cubitum superiori ipsius extremo artu-  
gu leniter. Deinde elatiorē hoc musculum incide-  
re oportet, qui in metacarpium ante indicem &  
medium digitorum bipartito tendine inseritur.  
Huius musculi finis superior, iuxta sublimem ex-  
terioris brachij nodi regionem, quadantenus  
tam quoque descendit ad superpositam nodo  
brachij partem. Qui verò & huic & radio supe-  
rius expanis, totam manum reddit supinā, ac si-  
mul cum alterius exortu suas etiā mittit propa-  
gines, is musculus secundū extremitatem sui in  
tenues membranas degenerans, seseq; in muscu-  
los brachij insinuans, incisionis cōfundit opus.  
eius rami caput ossi brachij alligari compe-  
ries, vbi huius musculi dissecueris. Exteriores  
itaq; cubiti musculi, talia quædā habent capita.  
Ex interioribus autem, qui quidem carpi iuxta  
paruum inscitur digiti, à nodo brachij interno  
incipit, attingitq; cubitū: qui verò iuxta magnū,  
ex eodem nodo ducit originem. Cæterum in-  
ter vtrūque caput, exortus habetur musculus in  
manus cutem elabentis. Atq; hic rursus subsunt  
capita duorum musculorū, qui digitos mouent,  
& mediam cubiti, radiūque totam regionem im-  
plent. Verum omnibus quos recensui exem-  
ptis, radj peculiare musculi apparent, per quos  
supina pronaque rota manus efficitur. Quatuor  
autem sunt vniuersi: duo ad primas radj partes,  
duo ad propria carpi extrema pertinent. Ex his  
qui ad carpum spectant, alterum ipsorum scito  
esse obliquum, radiū ac cubitum intercedentem:  
per ipsumq; nempe agentem extorsum, fieri su-  
pinam manum. Alter verò qui radium intro cir-

Musculorum in  
exteriori bra-  
chij nodi tria  
capita.

Interioris cubi-  
ti musculorum  
origines.

Radij muscoli  
peculiare, sunt  
quatuor.

cūducit, eam efficit pronā. Reliqui duo musculi  
radius in superiori parte mouentes, & ipsi quo-  
dammodo inuicem opponuntur, obliquum si-  
m habētes: vnus ab interna parte situs, ex bra-  
chij nodo prodiit, capitū flexentis carpi ad  
magnum digitum musculi adhaeret: alter exter-  
nus quidem est, sed hoc minor, atq; ideo tran-  
suerum magis fibrarū sitū obinet. Constat autē  
omnib. interiore tenso pronā manū constitui, su-  
pinam exteriore. Ac dicti mihi iam sunt omnes  
musculi, qui cubitū radiūq; in orbem ambiūt.  
Post quos tu summę manus exiguos aggredere.  
Etenim reperies exiles quosdā musculos, tendi-  
nibus tertium articulum digitorum mouēdus  
adnatos. Quatuor autem vt tendines ipsi, ita &  
digitorū musculi, hi sunt: parui nēpe, annularis,  
medij, & indicis. At magnū, alij mouēt duo mus-  
culi: vnus enim illū longissimē ab omnibus di-  
gitis abducit, ex primo carpi ossis profectus: al-  
ius, inducē versus agit. Alius præterea musculus  
paruū digitū ā cæteris plurimū remouet, ex pri-  
mo ossi carpi, quod secūdu illū consistit, pro-  
cedit. Hi igit septē musculi merito anatomico  
nō laqueantur. Aliorū autē singuli, ipsa quatuor  
tendinibus metacarpi in vno fins quū adhaere-  
scāt, haud mirū si non ita facili conspiciantur. Ex  
quibus bene ad priorē cuiusq; digiti articulū in-  
trinfecus perueniunt, ac ipsius latera iam quosq;  
attingunt: reliqui omnes ex carpi ac metacarpi  
ligamento iuxta ossiū ferē commissurā processe-  
runt. At pollicis musculus clauioem his proces-  
sus exiunt, & ipsi ex ligamento nati, non qui-  
dem ossium dictorum, sed quod musculorū ma-  
ximorum bina capita, vnde mouentur digiti, cō-  
stringit. Porro ligamen hoc ex carpi ossibus v-  
trinq; prodiit, nec cubiti extremum attingēs, nec  
initium ossium quæ in metacarpo habētur. His  
ablatis musculus, neq; in extrema manu, neq; in  
cubito superest vilius alius secundus. Post quos  
ligamēta scalpellō acuto omnia sunt abscinden-  
da. Quorum ligamentorum triplex in corpore  
est vna: ossa quippe cōnectunt. munimēto sunt  
corporibus subditis: ac deniq; indumenta his i-  
pīs tendinibus extrinfecus circūdantur. Appa-  
rebit autem caput musculi qui radio incumbit,  
quom anteriore musculum brachij detexeria.  
Ceterā scētio ipsa prope venam humerariam,  
quæ pertorum fertur brachij, dedius admini-  
stretur, tota quæ inibi adhaeret, cute ablata, & v-  
nueris musculorū membranis. Sētuonem verō  
quæ in superiori humeri parte faciēda est, ad  
ministrabes, fibrarū similitudinem dissimilitu-  
dinēq; obseruans. Ex quibus etiam totam hu-  
meralis musculi circumscriptionem, ad vnum ca-  
cumen peruenientem, cognosces: cuius proces-  
sus tanquam triangularis, in brachium conue-  
nit. Qui musculus peculiaris est humeri articu-  
lo. Verū solus ex mouēdibus ipsum, necessa-  
riū nuncia aufertur, vt anteriores musculi, bra-  
chij caput biceps appareat. Brachij interior mus-  
culus, duo habet suspēsa capita: vnum ad sca-  
pularum ceruicis supercilium, alterum ad proces-  
sum anchoræ similem. Ligamen vtrinq; capita  
abvnde trahens, est paulo minus toto rotundū.  
Quapropter hæc duo capita ipsius deorsum pro-

currētia, sequētia: quippe quæ in idem cōsuntia,  
hunc musculū generāt, qui alteri, sed minor mus-  
culus, subdito (a quo enā cubitus flectitur) iuxta  
cubiti articulum insidet, radiūq; valido tendit e-  
adnascitur, ac totū flectit articulum. At verō vt  
duo musculi anteriores sumi qui cubiti articulum  
flectunt, sic tres alij connexi in vicem, extendunt  
hunc ipsū. Vbi igitur musculum internis par-  
tibus brachij inieciū fulculari, duo principia  
musculorū totam manū extendentū conside-  
rato: quorum alterū ab humeri costa scapularum  
non tota, sed ex dimidio ferē ipsius partis sup-  
erioris prodiit: alterum verō ex posteriori brachij  
regione, subter caput. Hæc itā procedentia, in bra-  
chio cōsunt: deinde per tendinē latum, cubiti tu-  
berculū ingrediuntur. Iam verō si disiunctā vtrā  
que musculi partem attrahis, totam extendi ma-  
nū ab vtroq; videbis, hoc discrimine inclina-  
tionia ad latus factū, quod prior in exteriora, se-  
cundus intro oblique defleat. Ceterū sub hoc,  
alius delitescit tota carnosus musculus, brachij  
os ambiens, qui secundo aduinitur adeo, vt par-  
ticula ipsius esse plane pnter. Quem sitenda  
musculum, iuxta rectā & indinabilis circa  
cubiti articulū in ensio fieri videbitur: non tū-  
quam intro paululum emergere. Dictū itaq; mi-  
hi iam sunt, omnes totius manus musculus.

## GALENI PERGAMENI

de anatomia administrandis.

### Libri II.



Vōd veteres nihil scripserunt de cō-  
sectionibus administrandis, verten-  
dum illis vitiō non est: quidōqui-  
dē erat eis tam frequēta, tamq; in cō-  
muni vīu ipsa anatome, vt domi a-  
pud parentes etis ab ipsa puerina, in illa omnes  
olim exercebant. Postea verō tam præclaro illo  
exercitio intermisso, opus eertē nobis fuit com-  
mentarius, quæ anatomie disciplinæ, chirurgie  
medendi rationi maxime necessariā, integrā cō-  
seruarent. Quæ quidem quod ab aliis hæc vna  
nō vsque adeo accuratē tradita sit, ob id nimis  
ad conscribendos hosce commentarios me accen-  
xi. Ignorāna quippe eorū quæ per exquisitā ana-  
tomē inuestiuntur, in reb. quidē securis nimidos,  
in periculosissimis autem, maxime audaces quo  
tidie reddi. Tonus autem anatomes vtilissima  
pars, circa musculos, nervos, arterias, & venas  
extremarum partium versatur. Atq; ob id ipsum  
manuum & crurium anatomias administratio-  
nes aliis præpositis omnibus, quod ad ea, quæ tū  
vīu hominum necessario, tum etiam maxime cō-  
ducant, ire primū iuuenes oportere præciū sit: de-  
inde verō, quod eundem ita disciplinæ ordinem  
commentarij de vīu particularū obseruem. Quā  
igitur superiori libro, quo modo musculorum  
quā in manibus sunt, scētio administrari debeat,  
tradiderim, hic similis modo & de cruribus ver-  
bo a facere est animus. Ergo priusquā exactē co-  
gnoscas musculos, discere nervos aut vasa, ne-  
que ipse poteris, nec aliū item docere. Quare &  
hic cutis auferēda est: at tendinū diligētē,  
ne in primo plantę exortu iuxta calis ininū vñ  
cum curre tendinē inieciū eo loco avellās: cuius  
explicata

Manus extre-  
ma musculus.

Digitorum mus-  
culi.

Ligamentorum  
triplex in cor-  
pore est vna.

Humeralis mus-  
culus.

Manus extre-  
ma manu ce-  
tenduntur pro  
cipia deo.

Anatomia ve-  
teribus fuisse  
maxime.

Anatomia pri-  
mario vna  
que vñ.

explicati interuentu, cutis depilis rigidāq; mem-  
bro subtenſa eſt. Haſcigitur cute uitaſta, oportet  
reliquam omnē adumere, ac ipſos ſcromoris mu-  
ſculos omniū primos incidere: mox qualeſcūq;  
velas. A facile quidem ſecundum diſtrentiā fi-  
brarū muſculus vniuiſque cognofcitur. Omniū  
itaq; primus tendo, gaulatim in carnem verſus,  
ſub cute ſumma apparuit, qui nōx infra genu  
innatatur. Superius aut huius muſculi iniqui, car-  
noſo exortu ex media maximē illum oſis ſpina  
procedit. Ceterū poſt neruoſam huius muſcu-  
li exilarē, etiam alius quidam ex amuſis tendo,  
ab offe pubis deſcendens, figurāq; teretē repre-  
ſentans, in anteriorē partē oſis tibiꝝ inferatur.  
Atq; hi duo numero muſculi, in verōq; crure v-  
nus, ſeſe mutuō iuxta primos exortus cōtingū.  
Quibus ſane veltus manibus tractis verſus mu-  
ſculorū exortus, in animalib; exinſiſto, tibiā ipſā e-  
larius ſimul & interiūs attollitur. Porro tertia ē  
duabus prædictis inferioſi ſani tendens eſt, nomi-  
natē in anteriori tibiꝝ parte cōſigua. Cuius exor-  
tus & caput inferioſi exterioris coxæ oſis parti  
debetur. Muſculus itaque luc ab externa coxæ  
parte deſcendens, oblique in internā nōx inſer-  
tatur. Nec eſſum aut eſt tibiā hac tractā auſa, re-  
troſum, ſurſumq; ferti, atq; \*omnino in orbē cō-  
volu. Quare nō ſimplex, ſed compoſitus iſe mo-  
tus erit. Sciendum verō eſt, rectos muſculos re-  
ctum motū minuitare perpetuō: ſi vti obliquos  
obliqui. Hi ergo tres muſculi, tibiꝝ tendentibus  
innatantur, ſs auſere oportebit, ſ tibiā prius  
q̃ ſcromur, diſſecare inſtituas. Eſt & alius quartus  
muſculus, qui ab extrema oſis coxæ parte proce-  
dens, in externā tibiꝝ regione inſertitur: ſoliūq;  
quantū ad loci rationē attinet, aliis tibus oppo-  
nitur. Cuius quidē eſt munus, nō iam torā ſimpliciter  
in externam partem abducere, ſam poſt  
quatuor dictos muſculos, quintus alius exiſtit,  
ad inferius ſcromoris caput, & muſculi tibiꝝ prin-  
cipiū, à parte interna deſcendens, ſimiliter à cox-  
æ oſe ortus. Atqui ſi nunc ex tēnis omnes ſcromoris  
muſculos ſam expoſitos, adhuc magni,  
tum in priore, tū in poſteriore, internāq; vnuer-  
ſa ſcromoris parte reſtabūt: ex quibus interiores  
prius diſſecabis. Omnes aut extendunt articulū  
genu: nō tamen vel ſitum eundē habent, vel etiā  
ſimilia capita: quæ quidē in totū quatuor exiſtūt.  
Elaſiſmū quidem ex ſpina illum oſis, pcedit,  
ē dūcēto muſculo omniū primi ducti, idēq; parte  
ipſius inferio. Illic verō ſuccedit aliud multo  
maius ſcromoris regione, quod in extrema po-  
tius ſcromoris regione, propter natū proceſſum,  
eminet: à quo nixum anteriorū ſcromoris mu-  
ſculorū exortus eſt. Hi aut reſectis, alia muſcu-  
lorum capita duo ſubſecta, manifeſtū in conſpe-  
ctum veniunt: atq; eorū quidem alterum, primi  
grandioris in ſcromore proceſſus (Graeci trochan-  
tera vocant) originem attingit, & præterea capitis  
ſcromoris ceruicem: reliquum verō huius,  
infra ex anteriori oſis ſcromoris ſede emergit. At  
quod omnium muſculorū qui genu articulū  
nouent, validiſſimā ſun. cōne obire creduntur  
hi, qui extendunt, cuius uorum eſſe arbitror.  
Nam poplitis flexura, inier leuici inſimiſq; que ec-  
cusi actiōnes referunt. Quamobrem natura nec

magnis, nec multis muſculus ipſam cōmiſit, ſed  
vni ſoli ex cōmemoratis, qui in caput interioris  
furæ muſculi inſertitur: quig non magis tibiā ſte-  
tere quā abducere ad interiorē regionem vide-  
tur. Sed hunc cernere nō eſt, priuſq; à nōia mu-  
ſculos ademeris ſurſ cōſtituentes. Formoſus mu-  
ſculus præter magnū reſectū, iacebit nōx & coxæ  
articulū mouētes, necnon circa tibiā vnuerſos  
deinceps incidere. Maxum igitur ille formoſus  
muſculus, rectis & poſterioribus fibris ſuis cōg-  
articulū ſectur. Ius autēq; in lateribus ad pubis  
oſem pexeniūt, obliquū ad interiora totius ſcrom-  
oris motū adminiſtrari gēpreſtendens. Hunc itaq;  
à toto pcedinis offe reſectū, abſiſneto ab eo qui  
in illius ſoramē inſertitur: necnon ab alio humili  
muſculo, quē in liſce animalibus ſemper liuidū  
vidimus, orientē ex inferioribus pcedis oſis  
paribus, à quo obliquus intro motus coxæ præ-  
ſtatut. Præter hunc eſt & alius muſculus ex ſupe-  
riorib; lumborū, illiūq; oſis partib; ortus, atq;  
deſcendens. Quo circa ſolus lumborū muſculus  
cōſpicitur triplex. Quippe interna ſui parte, per  
validū tendit, in illam partē deſcendit, vbi pe-  
ctus oſ coxæ cōmiſum deſinit. Externa aut, al-  
tero tendine breuiore & tenuiore, illū oſ inſi-  
nuatur. Alia deniq; ipſius pars, quæ media inter  
nerua filamenta deſcēdit, tendiūem quendam  
producit exiguū trochanteri adhxrentē: qui ten-  
do manifeſtē intro ſectur ſcromur, erigitq; Profe-

ctus aut ad exteriores muſculos, vnuerſos com-  
pens, q ſcromoris caput ambiētes, in magnū tro-  
chantera immittuntur. Quorū primus ſub cute  
ſumma poſitus eſt, ex tota tibi oſis ſpina rectā  
procedens: ac partim quidē carnoſus, partim in  
membranā quādam degenerā. Incumbit hūc  
muſculus iſ oſis illi partibus, quæ magis emi-  
nent, & oblique reſtorum ſp cēdit: ceterum ſpi-  
nalium muſculorū extremo cōnexus eſt. Vbi ve-  
rō hoc eius membraneum deſinit, alius exortus  
carnulatus occurrit, ē regione primi, qui ex illi  
offe emergere ductus eſt. Auſerctus igitur iſ ob-  
ruſiori ſcalpello eſt, ſed ita, vt deorū verſus, ſi  
bras ipſas ſequaris: ſimilitēq; circumpoſite car-  
nes circūcūcendū: ſic enim ſcromoris caput dete-  
ges, et bipartitū muſculi ſinē inuenies. Muſculus  
igitur luc, retroſum abducēdo, ſcromur eſt, id  
per inſertionem quæ ē directio ſit capitis, tum ex  
coxæ oſe, tum ex coxarū oſe enaſcētis, idēq;  
ſcromur ipſum paulū in exteriora declinās. Ve-  
rū altero eius extremo dilatato, in latus ma-  
gis ſcromur ſurſum vergit. Ambob; aut ſimul ten-  
tis, perfectiſſimā totius membri extenſionē con-  
ſpicias. Vbi hunc ſuſtuleris muſculum, alius va-  
lens & omnino carnoſus occurrit, qui ex tota  
propemodum illum oſis ſede progrediens, vi-  
cinis etiā oſibus ſimul incumbit. Cuius tendo  
vertici magni trochanteris inſertitur, adeoq; vte-  
rus adhuc ad anteriora procedit. Cuius aut dum  
hunc muſculū incidis, ne cū eo cōſuſus quādam  
modo alium exiguū, qui ab externis inferniſq; la-  
n oſis ſinib; ortus, ſcromur retroſum erigit, cū  
leui ad interiora deſlexu. Porro alius inibi mu-  
ſculus, colore liuido, deſtinctū, grādi quoq; mu-  
ſculo ſubiaceat, ex interiorib; ſimul & lateraliſ  
lati oſis partib; ortus. Atq; hi ſane tres muſcu-

Formoſus muſculus  
obliquus ad in-  
teriora, à quo  
lib; muſculus  
ſect.

Lumborum mu-  
ſculus ſolus em-  
ſpiciat tri-  
plex.

Muſculus vnui-  
que q; cognofci-  
tur ſecundū diſ-  
trentiam fibra-  
rum.

Muſculus rectus  
manuſtrare etiā  
rectus motus:  
obliquus autē,  
obliquus.

Muſculi exten-  
dunt articu-  
lum genu.

Muſculorū qui  
genu articulū  
mouēt, validiſ-  
ſimam ſunctio-  
nem habent quæ  
extenduntur  
tibiā ſcromur  
ab vno mo-  
ſole diſſectari.

Musculi tres in  
magnum tro-  
chantera inser-  
ti.

li in magnū trochantera ingrediūtur. Ab his alijs  
duo cōditi planē, introfius tētoris caput detor-  
quent, p validos tendines in grandioris trochā-  
teris sinū inserti: quorū vterq; ex osse pubis pro-  
cedit. Numerofius aut musculorū exortus a fora-  
mine quod in pectinis osse est, ad vicina loca ex-  
porrigitur. Porro exteriorē musculū faciliē ab os-  
sibus ipsīs dissolues. At interiorē, si rotum voles  
cōtemplari exquiris, osium pectinis cōmissu-  
ram, quæ cartilaginea est, valenti prius scalpel-  
lo dirimes. Nam ossibus a se invicem dissolutis,  
musculus innoteſcet. Cæterū ambo hi muscu-  
li fœmoris caput introfius circumagūt: vnus per  
totius articuli anteriora, alter per posteriora. Ac  
talīs quidem est musculorū coxæ articulum mo-  
uentium cōfectio. Iam verō ademptis iis, qui ex  
fœmore in tibia descendūt, musculis, duo muscu-  
lorum capita in tibia cōspiciuntur manifestissi-  
mē, quæ ex posteriori fœmoris regione, illa post-  
simum, quā no dorum radix habetur, ducūt ori-  
ginem. Dein aut popliteum prætergressa, eo in lo-  
co qui sura dicitur, mīscūtur invicē, vnum gignē-  
tes musculū in quem etiam hanc exigua capitis  
exterioris portio propagatur, quæ musculus per  
fe efficitur, in tendinē latum paulatim cessans,  
qui sublatereſcit pedi. Nec minus ex vtroque mu-  
sculo nuper in sura geniti capite producitur ten-  
do, qui memorato cōiugis incumbit, postero-  
rigi calcis extremo inseritur, quod ad seſpsum  
est trahere idoneus. His recitatis musculis alijs  
etiam cohæret, qui ex lateribus tibijs internis ex-  
ort, omnes ad pedem infimū porrigitur. At v-  
bi tendines primū generant, ibi ligamentū li-  
pis extrinsecus est iniectū, ex tibia ad cal-  
cē pertinenē: quo recta linea diuiso, si tendines  
deinde sequaris, digitis ipsos insertari cōpries,  
ambo osq; mouere primū, secundū, atq; tertiu arti-  
culum, si magnū excipias digitū. Nam ad secun-  
dum ac tertiu, tendo qui ipsum mouet, porrigi-  
tur. Tertius verō alius tendo tibiæ fini adhære-  
ſcit: eiq; innixus, ligamēto iterū peculiari cōſtrin-  
gitur: qui & ipse pedē vniuersum, si vti qui cal-  
cē ingrediūtur, retrorsum flectit. Verū ipsius  
extremū in primū tarsi os interius cōiicitur. His  
singularim recitis, diuertendū est ad exteriores  
tibiæ musculos, qui quantū sanē ad superiores  
exortus attineat, tres existunt: sin autē tendines,  
motuumq; differentijs species, plures. Has itaq;  
membranas adimēs, licet etiam sub cute ligamē-  
tum sitū obliquum conspicies, robustius longē,  
eo quod in manibus cernitur. Oportet autem &  
hoc incidere iuxta longitudinem membri, mox  
partes ad originē suam egerere, capitibusq; ten-  
dinum subiectorū detectis, hinc retrorsū muscu-  
lorum cōſeſſionē auspicari. Ac primū sanē cō-  
tueberis musculū vſq; ad superius caput porre-  
ctum, cuius extremum ligamenti cōtinetur, &  
tarsi ante digitū magnum innascitur, paulū in  
interiorē atq; inferiorē pedis regionē excedens.  
Secundum deus musculū alium spectabis, huic  
adeo vicinū, vt pars ipsius esse putetur. Verū  
tēdo eius in caput primi maioris digiti interno  
dq; insinuat. Huic aut cohæret alius musculus  
gracilis, medio inter tibiā fibulāq; loco situs,  
qui totius pollicis latus ingrediūtur. Porro post

Tibia exteri-  
or musculi  
tres,

musculos quos nominavi, tendinū caput, liga-  
mento subiectū, cōtemplator. A quo deorsum  
versus incipies, tendines quatuor, quatenus di-  
gitos extendentes, inuenies. Sursum verō, mu-  
sculū illum videbis fibulæ ad vſq; superius caput  
adnatū: cuius extremū, tarsum, ppe digitos ma-  
iores ingrediūtur. Hi igitur musculi in prioribus  
magis totius tibiæ partibus cōſiſtant: alijs tres  
ab vno capite in exterioribus. Habent etiā & hi  
prepositum ligamentū ex fibula ad calcē ipsam  
pertinens: quo soluto, tres nervosus musculorū  
spectabis exiliteres, quæ cognatas invicē propa-  
gines obtrinet. Quarum prima, quæ ex supernis  
fibulæ partibus ad infimū pedem pertingit, ex  
tenuibus ligamentis carni cōnexis efficitur. Se-  
cunda, vbi eius quæ prius dicta est, caput definit:  
& ipsa non multū post principii in tendinem ro-  
rundū degenerat, gracilis tota existē. Tertia ve-  
rō quæ totum pedem efficit simū, ex reliqua fibu-  
læ parte procedit. Hæc itaq; pedē eleuat, simul &  
extrorsum declinat. At prior illa, quæ & in ma-  
gnū descendit digiti, introfium ducit. Verū  
vtrq; simul tenſæ, inclinabile pedis eleuatio-  
nem molitur. Hoc modo etiā ex musculis qui-  
pedē retrorsum agunt, vterq; in latus sensim de-  
clinat: ambo aut simul directē pedem ducunt re-  
trorsum. Alius verō incognitus musculus in arti-  
culo poplitis deliſcit, quæ inuenies ablatiſ po-  
ſterioribus musculis ad surā porrectis: cuius ca-  
put si tendas, tibia flectitur. In pede quatuor mu-  
sculorū sunt genera: tria quidē infra pedem, vnū  
supra, in aduersa tarsi parte, quod duos cōplecti-  
tur musculos, qui obliquos motus quatuor digi-  
ti subministrāt. Qui sub pede habentur, septem  
& hi, cum septenis qui in manu videntur, conue-  
niant, singulos digitos in obliquum mouentes.  
Quorū duo enari a tarsi ossib; magnū & parū  
pedis digitos plurimum ab alijs abducunt. Alij  
quatuor in interioribus partibus parui sunt mu-  
sculi, qui extendim; digitos flectētib; priū  
quā exactē ſcindantur, procedūt: quorū munus  
est, medium vniuscuiusq; digiti articulum flecte-  
re. Septimus musculus is est, qui pollicem indici  
adducit. Duo alijs musculi subter pedem ossibus  
adhæreſcunt, atq; cuiusq; digiti primo prepositi  
articulo, leuiter ipsos flectunt, simul quidē parti  
actione & functi, priuam aut vterq; in latus sen-  
sim declinans. Cōſeſſus his musculus, nullus præ-  
terea ex iis reſtat, qui in toto crure cōſiſtunt. Cō-  
ſiderare aut oportet omnium articulorū, quos de-  
xeris, ligamēta. Etenim coxarū articulus vnū  
in orbem ambiens poſiſidet ligamentū, quale ar-  
ticulari omnes ſortitur. Aliud aut in imo recon-  
ditum, ſæmone caput coxæ ſinui cōnectit, vel  
tinerius cartilagineus exiſtens. At genu articu-  
lus vnū ligamentū habet in imo, ac præter id,  
alia duo in lateribus: vnū videlicet interius, atq;  
externū alterū. Quin et ab his alia cartilago-  
ſa ligamenta in ipſo genu cernuntur, vtriq; tibiæ  
ſinu orbicularem circundant. Ad hæc ſunt liga-  
menta nonnulla in pedibus, quæ nihil iuuant of-  
ſū articulos, ſed in aliqua oſis particula prove-  
niētia, tendinū capita firmāt & roborāt. Quæ ve-  
rō ab osse in os perveniūt, vt quod a tibijs extre-  
mo in calcē definit, aut quod fibulæ tibiā vērni-  
ca ſa-

Pedis muscu-  
lō genera quatuor.

Coxarū articu-  
lus inſigū ligamē-  
torū digitorū.

Genu articu-  
lus tria ligamē-  
ta ſortitur.



ea sanè vna tendines subiectos cōstringunt, atq[ue] ossa ipsa committunt. Sunt quatuor ligamenta alia, quæ velut nervi quidam carnaligeni, talem ipsium ambiens omnes colligant, eandem proportionem habentia cum his, quæ coxæ & genu articulum in imo coniungunt. Ita si quidem & in pedetalo quatuor ossibus confirmato, ligamentum carnaligenum creatum est, extrinsecus ad fibulæ os, intrus ad tibiam, inferius ad calcem: sicuti in priori etiam parte ad os scaphoideum. Atq[ue] in universum omnia tarsi ossa valido ligamento in imis comprehenduntur. Nunc verò superest, ut de vngibus aliquid etiam dicamus.

*Vnguem cum  
federat.*

*Orta ab ali-  
quo, simul  
speciei  
cū origine  
sua.  
Nervus ex  
sub-  
stantia  
cervicis  
propagatur.*

*Vnguem ra-  
dix quæ  
infusa.*

*Artus natura  
ex quibus  
constat.*

*Sensum ex  
tanti  
ab  
infusa  
nervi  
dis-  
tincti  
sangu-  
is  
dignus.*

*Mansueta.*

### GALENI PERGAMENI de anatomicis administrationibus, Liber III.

**A**rtuum natura constat ossibus, ligamentis, musculis, arteriis, venis, & nervis, communiq[ue] omnium velamento, cui nomen est cuti. Quo rum cognitio exacta desideratur, ad commode curandos affectus. Quippe ob eorum ignorantiam, contingit inter medendum medicos quamvispissimè hallucinari. quemadmodum illis methodicis accidit, qui insensibilibus cuiusdam digitis frustra adluebant omnem medendi rationem, tanquā in ipsis esset affectus: quem agrum postea ipse relictus medicamentis quæ digitis admovebantur, ad dorsū principitū (nimirum ex casu collisum) in iuxta radicem nervi qui in digitos privatus sensu porrigebatur, trāslatis. Ceterum advertendum est, non ex isdem nervis sensum & motum singulis digitis dispen sari. Interdum si quidem ob inficiā chirurgi, sensus, interdum motus, sicuti aliquando vitæ actio perit. Quamobrem operæ precium fuerit, quemadmodum de musculis fecimus, sic etiam in presentiarum nos, quo modo vasorum, nervo rumq[ue] confectione administrare cōveniat, expo nere, ab ipsa nimirū tora manu auspicatos, quæ ab humeri articulo incipit, usq[ue] secus quā ab ar-

ticulo carpi ipsa manus extrema. In grimis igitur cutim ipsam per se solam acutiore scalpello ad subdram membranam, quā venæ cutem nutriendas permeant, separare oportet, ubi prius eius pilos abradatis: promptius siquidem depilem, quā pilosam, incidens. Detracta cute, venas, nervosq[ue] membranis intestos expendas: nervi tamen in macilentis quā in obesis evidentius apparēt: sicuti et venæ in his qui sanguine abundant. Semper autem radicem nervorum, atq[ue] lationis modum, meminisse conator, ut si quando cogaris incidere, iuxta longitudinem ipsius lationis sectione ducas, & radicibus quamlongissime abscedens: hoc enim pacto, vel vnum, vel nullum nervū interficietur. Sin autem transversum scapellum admoveas, multos simul divides. Exteriorum igitur nervorū qui in brachio sub cute summa versantur, hi quidem a nervio, qui musculum, à luctu o, quā imitatur, Deltoideum dictum, iuxta caput brachii intercurrit, veluti à radice quadam oriuntur, atq[ue] ex imo procedentes, pilorumque modo præcutes, vario plexu, per lumen brachii, paulo ultra cubitum disseminantur. Hi autem, qui illic vsq[ue] ad extremū manum procedunt, à maximo nervorum omnium perti uentū ad brachii, & ad posteriores musculos intertexti, & ad anteriorem membri regionem permeant, cubitiq[ue] articulo inferitur, propagantur. At verò anterior cutis, nervulos accipit, superiorior quidē parte, ex primo ortu secundū nervi, inter eos qui de spinali medulla in brachium porriguntur: inferiore verò, ante cubiti articulū ex alio quopis spinali. Sed internam, posterioremq[ue] brachii cutē universam, ad vsq[ue] scapularū, quæ ibi sunt extrema, alius quidam nervus interteptat, ex secundo intercostali inter vallo per axillam, sicuti & alij omnes, in brachium ipsum porrecti. Ac oportet cum qui clare ipsos contueri velit, musculum parvū anatomicis prætermisum, prius incidere. Nam verò glandibus etia, membranis, vasib[us]q[ue] ab axilla exemptis, ample magnitudinis per profundum exporriguntur nervi. Initū porro sectionis facies propter venā humeralem, eūq[ue] musculū qui inter brachii lacertos anteriores, duo quidē habet capita, nervū verò propaginē in radē principitū mittit. Vbi igitur duo huius musculi capita in vnu contrita sunt, primū nervū brachii os conficere invenies: eo dēq[ue] in loco posterior axillæ musculus magnus in brachii lato tendine inseritur: quō dein prædit etia tendo maximi musculi lortū, qui mittitur à pectore: post hūcq[ue] rursus tendo deltoidei musculi, qui supernam humeri partem cōplectitur. Porro quum in vno coaluerint illius iam dicti musculi capita, scinde separatim directā linea vniūsq[ue] musculi partē: nam iuxta eam nervus quoq[ue] vnus deorū processit. Dū hoc agis, alius quoq[ue] nervus multo hoc inferior, in conspectū occurrit, ascensum molis in brachii. In horū nervorum processu, interim ab altero, interim ab utroq[ue], in caput minoris ex brachii anterioribus musculi, propagines transmittuntur. Deinde secundus nervus primo tantū de se ramum impartit, quantum illic primi reliquū fuisse apparēt. Vnus autē ex duobus nervis

*Membram  
extremam.*

*Sensu quo  
modo  
admonstrā-  
da.*

*Nervorum  
bra-  
chy exten-  
sionem  
origini.*

40

50



gissimè recedendum est ab arteria. In quibus autem id solum quod arterie incumbit, in tumorem attollitur, reliquum verò totum, conspectu effugit, nunquā venam ipsam loco infuso fecerit, sciens arteriam subditam, quæ lara & valida est, ubi intumescit plurimum, simul secum extolere, atque inde quæ circumtendere incumbentem venam. Accidit enim inde, venâ in gibba arterie parte elevatam, adeo penes regionem quæ circumtenditur inaniri, ut scilicet pelliculis mediocriter inaeclis, eam quod subito penetrat, subiectâ verò arteriâ convulneret. Quare consilium est recedere ab hac, ad vicinariū aliquam, maximè ex iis, quæ ab cubiti os deferuntur. Sin autē ex his quæ nulla cernatur, eam adhibis quæ in flexu ex venarum cornu facta, ad radn̄ superiora pervenit. Si hæc occultatur, illam fenes, quæ ab humeraria ab cubiti flexum porrigitur. Quid si hæc non appareat, eam diuides quæ ab ipsa in flexum deducitur. Si nec ipsa, illam quæ sursum ad radium obliquè expanditur. Si nec illa se ostendat, venâ ab axilla ad cubiti flexum procurentem incidas: quæ accommodatissima est iis qui paribus infra claviculas sitis laborant: sicut & humeraria iis qui in superioribus. Ac commemoratæ, secundum tertiumque ordinem post ipsas obtrinet. Communis autem vtriq; est, quæ ad radn̄ superiora descendit: quæ tertium quoque ordinem in ambabus manibus ei attribuitur. Atque hæc nunc de superficialibus usque ad digitos totius cubiti venis: quibus ademptis, videre licet tibi & profundiores, primò quidem multo cōfuentes, mox ubi cōgreffe fuerint, iterū in binos ramos dissolutas: quorum demum quidem, per os cubiti: elatior, per radium vni cōm arteriis in musculos propagatur: atque vterque tandem in propages varias diffunditur, nonnullæ quarum paucis postea germinibus exteriorum venarum inscunt. Porro arteria vna duntaxat in manum proficitur, vicina vniq; ab illam permeat. Vtræque autem thoracem elabitur cum nono pari nervorum à spinali descendenti medulla, & brachium illi cōgregiantur, quò tertius pervenit nervus. Inde omnibus brachij musculis processus notandos mittentes, declines ad flexum articuli, quò brachium inniguitur cubito, excurrit. At vena in brachij extremo in duas diuisa est soboles, quarum altera usque ad cutem effertur, ut antea declaratum est. Quantum verò ipsius per profundiora cum arteria deducitur, id tertiam humerarie partem affluens, bifariam scinditur, & cum vtriq; parte arterie, quæ & ipsa bipartito diuisa est, simul tum porrigitur, eū in vniuersos, usque ad digitos iura, musculos ramentorum sene dispensatur. Itaque elatorem arteriam quæ ad radn̄ usque decurrit, prope commissuram carpi tangimus, pulsum exploraturi. Sensibilem etiam in macilennis motum arteria quoque ædat, quæ mediam indicis & magni digiti regione perrepat, originem ab hac ducent. Humilioris verò motus, haud facile discernere possis. Iam verò in extremis cōvexisq; manibus nullam reperire est arteriâ, quod ne musculum quidem vni. At interea regio, quoniam multis sepe est musculis, adeo multas quoque arterias singulis

ipforum porrectas obtinet. Verum vniuersis arterias internas carpi, vni cum venis coniugibus spectabis, laro amputato tendis. Arterias autē ipsi & venis, pro ratione magnitudinis virtutis iustè, non item neruis omnibus: sed quicubi exiguus nervus haud exiguum obtrinet potestatem, ut qui musculos motores magni digni & indicis, intercurrent: qui soli si seruetur in naturali habenti, ceteris abolitis, non vtiq; mancus homo in torum evasent. Rursus, si quatuor existant incolumes, musculus autem qui magnū flectit, vel tendit digitum, laborant, omnia manus officia interibit. Pariter enim musculorum quibus invicem sunt oppositi, \* altero resolutio, vtriusque semper actio vincitur. At verò iuxta principii formam, separata prius cute à membrana subdita, quatuor radices nervorum in cutem excurrentium apparent, pares numero principis grandium nervorum, qui in musculos dispersuntur, vnde scilicet processerit. Proinde vna est, quæ ab anterioribus musculis deorum versus, in totam cutem ipsi vicinam fertur. Hæc alia interior per inguina longo angustiorq; musculo vehitur. Tertia autē iuxta os quod coccyga Græci vocant, minus cōspicua cæteris. Quarta deniq; adhuc magna condita, in pectinis foramine delitescit. Cæterum exiles superficiei dñs cutis nervus in iura quæ fuerit, incidito omnes femoris musculos, quibus invicē separatis, grandium nervorū distributiones planè apparebunt. Sunt igitur tria nervorum in iura magnitudine sibi invicem cōequalia, quæ primū exquirat. Quartū verò aliud maximū, bifidum ipsi succedit, quo de posterius agam. Itaque ex tribus principis vni in anteriores musculos solos diffunditur: alterum simul cum magnis vas porrigitur, ipsi vas ramos telæ araneæ modo prætenues, ut musculus cōgruus, impartit. Quod restat tertium nervorum in iura, amplum ostis pectinis foramen permeat, duosq; paruos musculos id amplexos, vnum vtriusq; aliorū alterâ, intrinsicè reliquum. Hæc iam tria principia in iura, ad quarum duorum ramentorum grandis, qui in crus deferuntur, mittuntq; ad extremos usque digitos propages quasdam, descendas. Evadet autē & hoc cōspicuum, musculus nam incilis, cum quibus incidantur etiam capita formoris musculorū, qui numero quatuor, ex cōvexis osse exoriantur. Quippe grandes nervi illis subiecti apparēt, qui foras ab interiore latius osse parte cum nervulis tenuibus ex eo productis, emergunt. Verum illi in omnes articuli iuncturæ musculos exteriores diffeminantur: primū ex vniuersis in ipsum superficialiū, qui articulum retrorsum agit: mox in carnosum sub ipso magnū: deinde in paruos infra hanc lateres. Nam grādes soli per formoris regione postremam excurrentes, apparent: qui in varios inde musculos dispergantur. Porro in tibia etiam, duo soli grandes nervi, descendentes per formoris posteroiem sedem, sub vniico lato musculo cōspicui videntur, qui ad tibie principium excurrunt, atque ibidem primū separantur invicem: alter qui minor est, exterioribus ipsius musculis distribuendus: alter, puta maior, in-

Arteria ex venis pro ratione magnitudinis virtutis iustè, non item neruis omnibus: sed quicubi exiguus nervus haud exiguum obtrinet potestatem, ut qui musculos motores magni digni & indicis, intercurrent: qui soli si seruetur in naturali habenti, ceteris abolitis, non vtiq; mancus homo in torum evasent.

Nervorū radices quatuor, in cutem formam disperserunt.

Nervorū in uno scilicet femore disperserunt, iura quatuor.

Tertius musculus quatuor.

Tibia nervi.

Vena quæ facta de.

Arteria vna scilicet, accedens medullarum osse in qua pariter infra claviculas laborant. Humeraria vna scilicet, accedens supra claviculas laborantibus.

Arteria vna cum duntaxat per os scilicet in manum.

Arteriam carpi tangimus, prope commissuram carpi tangimus, pulsum exploraturi. Sensibilem etiam in macilennis motum arteria quoque ædat, quæ mediam indicis & magni digiti regione perrepat, originem ab hac ducent. Humilioris verò motus, haud facile discernere possis. Iam verò in extremis cōvexisq; manibus nullam reperire est arteriâ, quod ne musculum quidem vni. At interea regio, quoniam multis sepe est musculis, adeo multas quoque arterias singulis

terioribus. Sed externus tibiam sulter fibule ca-  
put ingreditur: interior iuxta fure intum pro-  
fundius mergitur. Atq; huius nervi pars reliqua  
non medio cruri in pedis inferiora porrigitur. Al-  
terius autem tenuia extrema supremis tarsi par-  
tibus dispensantur. Porro quidam ipsius etiam  
ad nervum alterum pervenit, qui per sursum, prope  
inferiores tibie partes defertur. Ceterum infimam  
pedis sedem nervus vnius subit haud exiguus,  
ex altero grandum, quem in posteriores tibie  
musculos digerere commemoravimus, propaga-  
tus. At in supernam partem pedis, exiles  
nervi quatuor porrigitur, ab us quos recen-  
sivimus, exorti. Ad hæc verò, exigua quædam ve-  
na cruri per os pectinis adit, modicam ipsius par-  
tem nutriendam. Vna autem alia maxima vena in to-  
tum crur ab interiore parte per inguina diffemi-  
natur. Cuius ramus vnus statim in priorem, in-  
ternamq; femoris regionem perferitur, multam  
summa sub cute in ipsum distribuitur. Ab hoc,  
alix tenues propagines in cutem tres qua-  
tuorve diffeminantur. Vnde alius primo similes  
ramus in femore prope musculum angustum cer-  
nitur, post eumque alix duæ aut tres perpulillæ.  
Ab his alia in signis genu interioris subit: quam se-  
quitur alia duas in partibus diuiscata, cui succe-  
dunt alix complures. Atq; hæc quidem subter cu-  
tem summi omnes constitunt. In imo alix que-  
dam sic se habent. Prima etiam post inguina an-  
terioribus duobus musculis displicat. Mox alia  
penitus grandis satis intra maximum omni-  
um musculi, & ex anterioribus internū por-  
rigitur: à qua plures venarum propagines in om-  
nes propemodum femoris musculis disper-  
guntur. Post hæc alia quæpiam deinceps in gran-  
dem ex anterioribus musculum ingreditur, elatius  
ad externam femoris regionem emergens. Insuper  
post illā alia notari digna profundius in maxi-  
mum musculum eius vicinus inferitur. Atq; post  
hæc, in superficiali enumeratone prædicta, quæ ab  
iunina genu parte ad vsq; nris extremitum  
multipliciter ramorum serie cutem subit. Iam  
verò, præter alias quædam propagines, quæ  
interdum in tibia visuntur, etiā ipsi fibulæ bipar-  
tes venæ soboles apponitur: quarum altera in  
superficie externis partibus fibulæ ad malleolū  
vsq; ramorum seriem spargit: altera, per ima ex-  
teriorum musculorum ducta, ramos communica-  
ns singulis, intra tibiam fibulæq; iuxta infe-  
riorem huius finem pervadat, in imāq; pedis  
regione diffeminatur. Ab hac autem procedunt  
duæ alix venæ, propè exuberantes tibie fibulæ  
q; terminos, conspicuæ fatie: quarum interior  
sanè miscetur ei, quæ iuxta genu descendens, in-  
teriusque supra suram tibiamq; totā ad malleo-  
lus est porrecta: at exteriori societatem init cum  
venis ab illa expoerectis, quæ per exteriores fi-  
bulæ partes declivis fertur. Verum ab his quæ ad  
tibie fibulæq; extrema invicem coeunt, exiles,  
quædam ad tarsum, digitosq; pedis excurrunt,  
maiores autem ipsæ ad imas partes evadunt, ex  
quibus tota pedis regio inferior alimentum ac-  
cipit. Nam posterior pars, quæ ad calcem habetur,  
à proximis intus, forisq; ramos invicè coeunt  
suscipit. Vena igitur per inguina excurrere,

hunc in modū propagatur. Quæ verò pubis os  
perceperat, solis indidit partibus (qui tres muscu-  
li sunt) distribuitur, eaq; nutrit. Porro arteria  
maxima cruri per inguina inferitur, eo nimirum  
loco, quo vena magna. Vtrumque autem vas per  
interna protendit femoris, æquiori ipsius mu-  
sculo incumbens. Ac venæ quidē arteriis in mu-  
sculis insertis coherent: non tamen arteriæ su-  
perficiei venas vnde descendunt, venim aliis  
semper musculis ingrediuntur. Id autem  
inde liquidò constat, quòd carnosus nusquam  
in crure pulvis appareat, nisi in tarsi recte ad se-  
cundum digrum post maximum. Tangimus  
itaque subinde arteriam inibi sitam, quum eam  
que carpo inest, percipere non poterimus. Ar-  
teria autem quæ per osius pubis foramen in sa-  
mur pervenit, penè de ac vena, iisdem tribus mu-  
sculis distribuitur.

Arteria in os  
distribuitur.

Arteria in os  
tarsi recte ad se-  
cundum digrum  
post maximum  
tangimus.

## GALENI PERGAMENI de anatomicis administrationibus, Liber IIII.



Aud temere in his commentariis à  
manibus sumpsi exordium, quòd  
nimirum has partes videre in solis  
hominibus liceat. Neq; absurdum  
fuit statim de cruribus commenta-  
ri nonnulla, quandoquidem beneficio eorū, so-  
lus homo ad amissum rectus incedit. Nunc verò  
de faciei & capitis partibus, opportunum vide-  
tur dicere. Porro duo musculi tenues simul & la-  
ti in buccam & labra descendunt, à colli spina or-  
ti: vnde membraneum, fibrosūq; ligamentum  
procedens, substantiā ipsorum constituit. Com-  
plures etiam fibræ ex scapularum spina regionibus,  
quemadmodum et ex vniuersa claviculæ fe-  
de, in buccā terminantur. Atq; oportet hosce mu-  
sculos, quum visus aliquis postulerit, pro fi-  
brarum natura incidere. Nam si experiantur ma-  
gnam incisionem transversam, buccas ad alterā  
partem reuellunt. At musculosa compages, quæ  
fronti subiecta est, & à qua supercilia extollun-  
tur, & morus frons perficitur, suas fibras habet  
deorsum versus tendentes: quas transversim et-  
iam chirurgi imperiti secantes, in causa sunt, ut  
frontis cutis tota delabatur ad oculos. Iam ve-  
rò aliqui musculi masticatores dicti, expansi infe-  
rioris maxillæ lateribus sunt subiecti, qui variis  
totam ipsam modis circumagunt. Nam tempo-  
rales musculi, non in circumagere, sed dum morde-  
mus, vel edimus aliquid, aut os claudimus, ad-  
ducere maxillam sunt nati. Etenim animalia o-  
mnia, præter crocodylum, inferiorem maxillā mo-  
uere, superiori immobili, natura voluit. Vniuer-  
si autem monis ipsius tres sunt: vnus in manden-  
do, alter in ore claudendo, tertius in aperiendo  
peragitur. Atq; ab his fecerunt laborum ar-  
tes, ubi pilos abstuleris, leuissime cutem incidas  
scapello acutissimo, rectam ducens lineā à men-  
to vsq; ad pectus, iuxta crurici ipsius longitudi-  
nem: statim siquidem sub cute se ostendit latus  
tenuissimū

Maxilla superior  
in solis hominibus  
est.

Homo solum ad  
ambulandum rectus  
incedit. Laborum ar-  
tes solum vult.

Frontis muscu-  
lus habet fibres  
transversas  
tendentes.

Musculi masticatores.  
Temporales  
musculi sunt.

Maxillam inferi-  
orem, superiorem  
immobilem, mouere  
crocodylus, animalia  
omnia, præter  
crocodylum  
Maxilla infe-  
rior non mo-  
uetur.  
Ora functiones  
musculi: quoniam  
genere ambulant.  
Lati musculi  
vniuersi sunt.

Pedu nervi.

Vena in cruri  
cruri diffemi-  
nata.

Vena cruri in-  
ferioris intra-  
dentur.

Pedi inferior  
regio vnde ali-  
mentum acci-  
piat.

*Latius musculus  
invenitur rati-  
one.*

*Latius musculus  
fibra à quibus  
natus oritur.*

*Animalia que  
sunt aptiora a-  
nima adma-  
nistranda.*

*Maxilla homo  
fortior brevif-  
simam.*

*Animalia duo-  
bus incidentia  
cruribus.  
Laborum sub-  
stantia.  
Laboris motus.*

*Laboris nervi.*

*Ditum et quo  
pauca nervi.*

*Manus musculus  
qualis.  
Latius muscu-  
lus inveniatur Co-  
lone.*

*Manus musculus  
qualis.*

tenuis, quod musculus, una cum numerosa serie ner-  
uorum, talem viamque situm habentium, qualem  
fibra quibus adnascitur. Quippe omnes ad la-  
bra declinant, ex variis procedentes initiis. \* Si-  
quid autem vniuersis colla vertebis incipit quæ-  
dam, alia à scapulis, alia ab utraque clavicula.  
Quæ igitur à scapulis ducunt originem, oblique  
omnes per buccas in oris latera portiguntur: quæ  
à vertebis, transverse magis: quæ uero à clavi-  
culis emergunt, propemodum rectæ sunt. Hæc  
autem omnia quamcommodissime discernun-  
tur in iis animalibus, quæ præ senio extenuata  
sunt, quare ad propositum opus tabula sunt deli-  
genda: post quæ, recens nata præstant magnis  
& pinguis. Cognoscere autem extortus singu-  
lorum nervorum, si vbi laqueos inciperit quæ-  
dam, proximè ad ipsam maxillam, absterili quæ  
omnes fibras utrinque eis adiacentes, iam nudos  
ipsos reducas ad propria principia. Postertus ita-  
que musculi huius initium ex spina omnino  
procedit: inde ad occipiti osibus basim defertur,  
mox sub aurem, deinde musculum masticato-  
rium dictum rotam ascendit, osisque superioris  
maxillæ committitur. His igitur omnium primis  
ademptis musculus, licebit vel occipino, vel faciei  
adherentes, ostendas. Iam verò ex omni a-  
nimanum genere, homo brevissimam, pro ro-  
tus nimirum corporis proportionem, maxillæ for-  
tior est. Mox simia: dem lynces & faryri: post-  
ea cynoccephali. Hæc autem omnia & collum tra-  
prolixum, & claviculas hominis modo possi-  
dent. Ac quædam ipsorum magis insistant, quæ-  
dam minus. Insistant igitur recta, gradiunturque,  
alia peris, alia melius. Ad certè gradiuntur omnia  
bis in iis pedibus. Aliud autem nulli (quod  
scimus) animal, duobus cruribus incedit. Labra  
itaque naturam singularem eximiamque obti-  
nent, adhaerescuntque osi maxillæ, ternam quan-  
dam in se, eandemque fungoform substantiam for-  
mata, ut vbi tota ipsorum substantia, ex illa ipsa sub-  
stantia, cute, & tribus lateri musculi terminis, con-  
flata sit. Proinde sanior musculorum beneficio,  
in latera secundum transversas ipsorum fibras  
mouentur. Deorsum verò, sursumque versus, mo-  
tum, tota ipsorum substantia suppediat. Arque  
hos ob motus, nervos ipsius natura, tenuissimis  
foraminibus perforans maxillam, transmittit.  
Per quæ foramina elaborantur etiam reliquæ ner-  
uorum, qui densum sedibus adhaerescunt: à qui-  
bus gingivæ, dentes, & etiam membrana ambi-  
entia, ipsum sensum accipiunt. Trahuntur porro  
deorsum labra, beneficio nervorum qui ex imo  
sursum versus feruntur. Contrahuntur autem  
ab extremis utroqueque musculorum, graci-  
limum, & laterum, ipsi insertis. Sicuti autem his  
nervi ab inferiore maxilla, sic superioribus la-  
bris, à superiori subministrantur. At verò mu-  
sculos qui narium alas mouent, tales natura ef-  
fere pronantiores palam oportet, qualem & latum  
musculum, quem nos invenimus. Hinc paulum  
visum ad malas descendere, currem à vicinis illarum  
partibus auferens. Hoc enim confecto, bis mu-  
sculi masticeteres dicti, singuli proprio ex capite  
in extrema inferioris maxillæ profecti, clare cer-  
tentur: nervi ipsos intercurrentibus, qui ad buc-

cas desinunt, quique hamulis ad initium propriis,  
quod post aures oritur, sunt reducendi, primum  
quam masticeteras, hoc est, masticatorios, inci-  
das. Ex horum musculorum capitibus, alterum in  
malis, ut vocat, alterum iuxta os iugale constitit.  
Post hos musculos, eos qui intra maxillam in ore  
habentur, adhibitis: tum temporales ipsos, quæ tria  
musculorum paria maxillam mouent: temporales  
quidem, cum interioribus sursum conuolentes: ma-  
sticatorum, in latera circumagentes. Visse iugali ab-  
lato, evidenter totus musculus temporalis conspi-  
citur, dictorumque simul trium musculorum socie-  
tas: quorum duo quidem simplices, masticatorius  
autem duplex existit. At verò inferior maxilla,  
ex duobus osibus circa infimam partem coeum  
nibus constitit: quæ diducenda sunt, ut recte omnes  
partes cernantur. Porro vniuersa capitis cute ab-  
lata, delineameura quædam musculorum circa au-  
res conspiciet, quæ in reliquis animalibus non de-  
lineameta solum, sed perfectos etiam musculos  
spectabis. Habetur enim vnus in utroque spinæ la-  
tere musculus. Neuter tamè visus aures mouere  
procurrit, sed tantum uterque abest, quantum ab occi-  
pio procedit. Iam verò à apule magnis aguntur  
motibus, nec minus ipsi caput. Ceterum muscu-  
lus ille duplex, ceruicis, qui in scapulis ipsius in-  
sertitur, non capitis, sed scapularum grana est à na-  
tura cõdatus, ut illas ad caput cõtrahat. Siquid è  
si transversim in ceruice scindatur, confestim  
conuoluntur, deorsum versus, scapule: sursum au-  
tem non amplius moueri queant, idque capitis mo-  
tu minime resoluunt. Sunt tamè alij musculi, qui  
caput agunt in latera. In illum autem scapularum  
musculum, à cerebro quidam nervus descendit,  
quem ignorauit Lycus, perinde ut par illud mu-  
sculorum maxillas mouentium, quod intra os est  
situm. Secundum musculorum par est, quod præ-  
dictis quibus subiectum est, longitudine respon-  
det. Nam ex eadè occipiti osibus regione proce-  
dens, sublimi scapularum basim angulo inuicetur.  
Verùm la trudo ipsi æqualis non est, sed multo  
minor. Hi etiam scapularum basim ceu ad occi-  
pium (unde transversim oriuntur) retrahunt. Priores  
verò musculi, non modò basim, sed totas ipsas  
sursum reuolunt. Vtrique autem, à media occipiti  
osibus regione incedendi sunt. Quibus sublimis,  
alia plerique musculorum coniugia compenes,  
quæ carnosius anulis caput ad posteriora relle-  
ctunt, totius colla longitudinem iniecit, sunt et alij  
musculi, sic ab occipiti osibus oriuntur, ut oblique  
caput in obliquum inclinaret: ut quibus ca-  
pitum fibres ad spinam sunt inclinaret: à quibus ca-  
pitum in obliquum conuertitur. Ab utroque autem  
ipsi incumbendum est, de obliqua hac inclinatio-  
ne, ad rectitudinem æqualem, quæ naturalis est  
figura, reducitur. Exordiens igitur tria horum  
musculorum paria ab occipiti osibus, cui inhere-  
scent, dissecare, perges visque ad extremum in-  
ferius. Quibus ablatis, circa articulum capitis a-  
lia quamor exilium in musculorum paria cernun-  
tur, quæ retrò habentur, absque parvis in articulo,  
iuxta latera primæ vertebree, reconditis. Succe-  
dit aliud quartum par musculorum obliquum,  
tertio obuersim respondens. Hi musculi primæ  
ceruicis vertebree secundæ connectant. Eo-  
rum verò extrema ad laterales primæ processus, &

*Ori musculus.*

*Temporales  
musculi.*

*Ori iugale.*

*Manilla inferi-  
or ex duobus  
osibus constat.*

*Scapularum mus-  
culi et motus.*

*Capitis motus.*

secundæ spinam, evadunt. Porro tria hæc paria, nempe, primum ex omnibus quæ recensimus, tertium, & quartum, triangulū æquis lateribus tibi constitutæ videbuntur. Itaq; in reflexione capitis, occiput os cum ipso primæ vertebrae finibus innititur, atq; secundā præterea cōtingit maxime ipsiq; extremum in renuendo capitis reflexu, hos ipsos terminos obinet. Annuēntibus rursus, in priora caput recedit, & super anteriorem primæ vertebrae processum innititur. Verum extrema sinibus laxa insidēt, à posteriorib; partibus disjuncta: \* alioqui primam caput ver-  
tebram ad anteriora transenderet, & musculi & propria gravitate decussum, nisi in processu anteriori ipsius primæ vertebrae, sic constituto à natura, accuratè innitens confirmaretur. Verum hinc exiguam securitatē, maximam verò inde, qua prima cum secunda committitur vertebra, natura molira est. Nam quum particulam quandam turbini similem, rectam ex hac produxisset, inferiora anterioribus constabuit, primā vertebra leuiter excavans, vbi maxime in anteriora processus exiit. Posteriori quippe ipsius partem, secundæ vertebrae processum acclius, extremū ingreditur, ligamentūq; validum ē verice ipsius ortū, caput inseritur: itē aliud quoddam transversum ex ipsa prima vertebra profectum, secundæ extremum turbinarum ad amulsum cōstringit. Obliqui autem musculi in latera caput convertunt. Iam verò qui torquent caput ad anteriora, i musculi ad pectus & primas clavicularem partes proeundunt, ex duplici ortu principio, altero post aurem, altero in ipsius aurbis sito: quapropter duplici extremo etiam in prius nominatas particulas inseritur. Quod autem & pectus & claviculas cum ipso thorace circumducunt, simul & sursum versus ad capitis latera, aut caput ipsum in priora circumagunt, curvis notū esse existimo: sicuti & ipsos hoc pacto non posse mouere thoracem. Quare caput ab ipsis prorsum circumverti necessum est. Nam qui musculi rectam posituram obtinent (vt qui ad scapulas & ceruicem porrigebantur) ij omnes simplici motui præsumt: qui verò non rectam, composito. Quare musculi qui à regione aurium ad claviculas & pectus descendunt, quum obtineant situm non recto tramæ, situi similem motum sortiuntur. His musculis amputatis, ad eos qui in scapulis habentur, digredi licet. Duo sanè iuxta spina hærent, quos solos scapulas retrorsum agere dicimus. Alius tertius, à prima vertebra oritur, & in extremo scapularū iuxta summum humerum definit. Quartus gracilis, longisque, ab osse in initio laryngis præposito, quod hyoides dicitur, originem ducentis, ipsas illi connectit. Sunt & alij duo musculi vtrinque per spinam dorsī exporrecti, à quibus scapulae spinam versus rendi videntur. Ab latiore siquidem leniter ad ceruicem inclinari: à b altero ad inferiores dorsī partes deduci: ab vtriusque verò simul tensis, rotas scapulas retrorsum, nullam in partem inclinantes, deferri ad primas septem thoracis vertebrae, ad quas protensi sunt, videbis. Atque hi sex musculi peculiare scapularum existunt. Alius autem humerorū articu-

lo communis est, scapulas deorsum versus detrahens: quo de suo tempore agetur. Musculus quos retuli ademptis, apparebit is, qui maxillā inferiorem aperit, incipiens à capite & retro so, sursum autem ad summam maxillam p̄i ostendens: vt vtriq; musculus, & qui à dextris, & qui à sinistris pergit, eodem coeant, ac medio inuicem, ipsorum pars in nervosa ligamenta degeneret. Quod par solum nervorum, tribus ori claudendo creatis natura opposuit.

Maxilla inferior à quo aperitur musculus.

## GALENI PERGAMENI de anatomicis administrationibus, liber V.



Vre quæ pectus contegit à subditis liberata, musculum inibi spectabis in aliorum superficie extantem, qui ex mammarum regione incipiens, sursum versus ad humeri articulum obliquus porrigitur. Ipsum itaque à subiectis partibus dirimēs, hamo quidem primū in ipsius fibrarum finem eleuans, dein vsq; ad humeri articulum totum musculum separās, post hunc ad alium eo maiorem accedis, qui ad eundem nimirū articulum peruenit, ex toto pectoris osse oriens, mammarūq; subiectus. Qui musculi bi partitus quodammodo est, fibris ipsis in similitudinem X literæ, mutuo sibi incumbentibus: aliis ab humiliori ossis pectoris sede ad articulum eminentiorem porrectis, aliis ab elatiore ad demissiora inclinantibus, omnibus autem sese interfecantibus inuicem. Porro ipsa axillæ concavitas à duobus gignitur musculis: vno certè quo de hic agimus, altero ad costas porrecto. Quæ igitur prædicti musculi fibræ ab elatiore pectoris ossis sede incipiunt, brachium thoraci adigunt, non deorsum reuellentes: nam ab humilioribus fibris, os brachij vnā cum obductis à carnibus ad thoracem adductum, deorsum leuiter declinatur. Iam verò alius his tertius succedit motus secundum primi musculi functionē, quem à regionibus propter mammam orti diximus. Ad hæc alius quartus, quo brachium ad thoracis costas expanditur. Post confectionem illius qui sese interfecant musculi, alius tertius nobis se ostendit musculus, qui ex pectoris osse ducit etiam originem, qua secunda, tertia, quarta, quinta, & sexta costa cum ipso coarctantur, eiusque beneficio brachiū elatus thoraci admouetur. Secundum hunc sequitur, qui iuxta eminentiorem scapularum costam, euidenter iam brachium attollit. Omnes autem illi dicti tres musculi, in tendines latos, brachio sese inferētes definiunt. Postquam igitur tres hosce musculi ad vsq; articuli iuncturā secueris, scapulae à pectoris partibus separantur. Verum duo adhuc musculi ab imo sursum procurrētes, ipsas ad thoracis latera continent: quorum alter quidem in superficie tenuis, ex membranis quibusdam gignitur ilium curi connexis: alter verò inter musculi, q ab imo sursum ferūt, magnus, initiumq; sumens ex spina vertebrae, præcipue quibus spinæ costæ coarctantur, cum scapularū basi haud medio cre consortiū obtinet. His verò musculis

Homini motu.

Arilla cavitate à duobus formis musculis.

Brachij motus et musculi.

Musculi scapulae admoventes thoracem.

Capitis motum securitas.

Capitis motus ad anteriora, à quibus erit motus maxilla.

Scapularū motus scilicet.

Os hyoides.

vſq; ad brachii cōfecti, & adhuc ſcapulæ vnus  
grandis muſculi, ipſarum paribus cōcauiſ ſub-  
nari, interuentu, coſtis & oſſe clauiculæ interve-  
deute, pectoris oſſi continentur. Primum igitur  
à clauicularum oſſe muſculum, ſuperiorem hu-  
meri partem amplexantem, amputato: dein clau-  
iculam à pectoris oſſe tollito, membranofa cir-  
ca articulum ligamina interfecans, donec mu-  
ſculum ab interna infernâq; ipſius parte in pri-  
mam coſtam oblique inferuntur, euidenter con-  
ſpicias. Huſ rite peractis, ſcapulisq; reuulſis, va-  
ſa axillam perreptantia, & neruos cum membra-  
nis præcidito. Porro functio illius muſculi qui  
ſcapulari concava ipſis coſtis cōſectur, eſt tho-  
racē vnuerſum reuellerẽ. Sunt aut̃ alij duo mu-  
ſculi, in vtrâq; thoracis parte vnus, hic videlicet  
in anteriori regione, ille in poſteriori, coſtas etiā  
reuellens: adeo vt tres hi muſculi ſint ipſo tho-  
race elatores, prior ſcilicet, poſterior, & medius.  
Quippe medius muſculus eſt ille de quo nuper  
dilexerim, medio amborū collocatus. Ac thorax  
ſolo hoc medioſum muſculorum coniugio motus,  
ab vtr̃ ſans animanti ſubſeruit. Altera prio-  
rum muſculorum coniugatio ex ſecunda cerui-  
cis vertebra incipit, ſed ab omnibus aliis conſe-  
quentibus orta, in quinq; thoracis coſtas per va-  
lada ligamenta inferuntur: quemadmodum & re-  
liquæ coniugatio muſculorum ſubtilium, incipit  
quidem à ſpina extremarum trium colli verte-  
brarum, & primæ ſimul dorſi, ac ſuperneſcitur  
tertiæ coſtæ, in quartam, quintam, ſextam, &  
ſeptimam inferata. Quod ſi caput ipſius prehẽ-  
ſum in ſe attraxeris, coſtas ſurſum conuelli, di-  
ſtendiq; thoracem, videbis. Idem & in medio  
prioriq; motus muſculo, paria ipſorū magni-  
tudinē intervalla thoracis fieri conſpicias. Hæ  
igitur tres ſublimium thoracis muſculorum cō-  
iugationes, ſunt reſpirationis opifices. Quarta  
deinde, quæ in primis coſtis conſiſtit. Nam ad  
priſtinam ſedem eius attollens muſculos, prio-  
rum ſanè coſtarum oſſa retrahi: ſurſum verſus  
deprehendes: partem verò thoracis quæ hic eſt,  
diſiungi. Cæterum alia duo muſculorum paria,  
thorace detecto, iuxta longitudinem appare-  
bunt: hoc quod carnoſius eſt, ſpinæ omnibūq;  
illi à ducentibus coſtis illud quod membranofus,  
pectoris oſſi expanſum. Huius muſculi tẽ-  
do, recto abdominis muſculo continuus eſt, om-  
nibus coſtarū terminis, qui ad pectus pertinet,  
incubens. Etenim muſculus hic in omni animan-  
tium genere, ad primam vſq; coſtam pertendit,  
vbi & carnoſus viſitur, & tenui carni ſupernutri-  
ta tendini, latitudinē quandam accipit. Iam ve-  
rò alius muſculus huic ſimilem habet functio-  
nem, qui per ſpinam porrigitur, & cum thorace  
ſimul incipit, deſinitq; orbiculari circumſcriptio-  
ne. Cæterū finis ipſius inferior, ſpinæ cohæreſcit  
muſculo, obliquo, in poſteriora vergens, vt ſe-  
ſus coſtas intro contrahat, ſtringatq;. Superẽit  
aliud vnū muſculorū par extra thoracem biſidū,  
quod in extremis coſtis, thoracis mihi finem de-  
orſum verſus detrahit. Cuius quoq; caput, vni  
inter ab dominis muſculos admiſcetur. Muſcu-  
lus omnibus quos percuſus ablatiſ, ſitus fibra-  
rum manifeſtè apparebit obliquus, ſi omnes mu-

ſculos intercoſtales reſpicias. Examen autem ip-  
ſarū, à ſpinalibus auſpicaberis muſculis & duo  
cuiuſque fibræ extrema contuere: alius pro-  
pter ſpinales magis ſitum, deſiſſus inde longi-  
us remotum: tanquam ſingulis fibris oblique in  
priora, non recto tramite, deorſum verſus pro-  
currentibus. Spinalibus præterea exemptis, fibras  
quoq; ſimiliter obliquas ibidem ipſis ſubiectas  
ipectabis, nonnunquam cum coſtarum conuerſio-  
ne ſitum ſuum variantes. Non enim vt vnū-  
quodq; coſtæ os à ſpina prodiit, ad pectoris os  
obliquum porrigitur, ab elatioribus animantis  
partibus ad humiliores inclinans: ſed vbi prope  
os pectoris iam cartilago vice oſſis creata  
cernitur, alium obinet ſitum, priori cōtrarium,  
oblique ruiſum, ſed circulatim quodammodo,  
ad pectus cui coarctatur, protendens. Similiter  
itaq; fibræ ex imo ſurſum obliquiſ platur, ſub-  
contrariam poſituram recipiunt. Hoc etenim iu  
coſtis omnibus cernitur, ſi ſpurſas duntaxat ex-  
cepers, quarū extrema, pectoris oſſi non com-  
mittuntur. Vniſormis ſiquidem harum coſta-  
rum ab initio ad vſq; ſinem latio exiſtit. Deſinit  
porro ipſæ non in os pectoris, ſed in cartilagi-  
nem quandam, quæ exortus ſepti tranſuerſi exiſ-  
tit. Ab externis itaq; paribus fibræ muſculorū  
intercoſtalium obliquum ſitum ſortuntur, qua-  
tenus dictum eſt. Quæ verò in partibus internis  
habentur, contrario modo iuxta X literę ſigu-  
ram exteriores ſecant. Conſpicientur autem &  
& hæ facile, coſtis ipſis ad ſpinam reſlexis. Vnus  
igitur adhuc thoracis muſculus ſuperẽit mini-  
mè cōtemnendus, nẽpe ſeptum tranſuerſum:  
cuius munus exiſtimat Plaro, diſtinguere dun-  
taxat animoſam à conſpicibili animæ facultate:  
quam præter id etiam maximè ſit ex vſu ad  
reſpirandi functionem. Ligamenta complura te-  
nuiaq; ex oſſibus prodeuntia, quibus ſimplex  
circunductur caro, hoc ſeptum habet: cuius  
centrum, exiguis quidam circulus & membra-  
noſus exiſtit. Verum totam ipſius naturam mani-  
feſtò prius contemplari nō licet, quoniam octo ab-  
dominis muſculos diſſecueris, ad quorum con-  
ſectionem nunc diuertendum eſt: quāquam tū  
ipſorum, tum viſcerum omnium, quæ in imo ven-  
tre conſiſtunt, primò omnium ſolius eram con-  
ſectionem moliri, ne videlicet diuinus aſſeruat  
computreſcerent: dein verò aliorum anatomen  
perſequi. Nunc autem diſciplinam prædictæ ſue  
cedentē nō deſerēs, coſtas à pectoris oſſe reuul-  
ſas, ruiſus ad pectoris os reducas oportet. Dein  
de quod ex abdominis cute adhuc reliquum eſt  
detrahas: ſub ea ſiquidem, primi & maximi duo  
nbi muſculi occurrēt, obliqui, atq; aliis omnib;  
abdominis muſculis ſuperſtrati, vnus quidem  
à dextris partibus, alter à ſiniſtris portectus:  
quorum muſculorū ſuprema, maximo thoracis  
muſculo circa ſextā coſtam cōmuniſcantur. Nec  
tamen à ſexta coſta duntaxat, ſed ab aliis etiam  
ſpurſis, quæ in cartilagine magnam degenera-  
tæ, hæc prima abdominis muſculorum coniugatio  
oriatur, obliquiſ fibris ad ventris anteriora  
protendens. Cuius vtrq; muſculus tum ad  
ilium oſſa, tum ad inguina cōtraria procedit, ac  
pubis oſſi, per membranā, ſed validè tendit,

*Coſtas reuulſas  
in muſculos.*

*Reſpirationis  
opifices muſculi*

*Fibra muſculo-  
rū thoracis ex  
terna quæ la-  
tentiſſima eſt  
ſua ſortante.*

*Coſtarū ſpurſa  
rū extrema oſ-  
ſi pectus non  
committit, ſed  
deſinit in car-  
tilagineam.*

*Fibræ muſculo-  
rū thoracis in  
terius habere  
latiſſimam cōtra-  
riam externa-  
rum latiſſimam,  
ſepti tranſuerſi  
ſi conſiderat.*

*Anatomen cap  
Cæteriſ ordinis  
ſeſcit ab infe-  
riori ventri.*

*Abdominiſ  
ſolius conſi-  
deratio.  
Obliqui mu-  
ſculi abdomi-  
nis.*



ante inguina ortum, Inferitur. Hoc interdū tendine relaxato (qui & peritonæum, & ea quæ ab iplo ambiuntur permeat) aliquod intestinum, aut omenti pars, propriam sedem egreditur, ac per ipsam laxitatem elabatur. Qui morbus cele, atque raxem dicitur. Pars autem horum musculorum, quæ ad ventris anteriora porrigitur, in tendinem tenuissimum definit, rectis extrinsecus musculis superpositum. Pari modo & secundæ coniugationis musculorum abdominis (qui obliquum fibrarum fibrarum primis contrarium possident) tendo in membranam degenerans, anterioribus musculis insidet. Vterq; verò horum exiliū offe ducit carnosam originē. Hinc deinde oblique sursum proticī, musculis transversis insident: postea quatuor notharum costarū finibus, caenosa intercedente subſtitia, iniiciuntur. Tendo autem ipsorum tenuis, medius inter rectos musculos, & prædictorū tendinem, pergit: uterq; ab ea regione ortus, quæ circa externa rectorū musculorum latera posita est. Porro ipsi recti musculi, qui tertiam coniugationem conſtituunt, tota subſtantia carnoſi, à ſuperius deorsum verſus deſcendūt, atq; in pubis os caenis in terventu inferantur: qua in parte exacte inuicē eſcunt. Nā elatio ipſorū portio adiacet quidē nō aut accuratē advenit. Quarta & vltima cōiugatio tū ex recta illū offis linea, tū ex lateraliſ ſus vertebrarū, q in lumbis videntur proceſſibus, ex oritur. Verūm nō itam ſimulatq; uterq; enaſcitur, eſſicuntur musculi: ſed membranofum ligamē valens ex cōmemoratis oſibus productū, deinde in proceſſu fibræ adactū tranſverſis, in musculi figurā degenerat, partib; ſuis intermiſculisq; ſpuris coſte ſinium ſubhæſcit, necnon rectis miſcetur musculis. Cuius tendo curioſe à peritonæo auellendus eſt, cui vel maxime adhæret. At peritonæum laſis araneorū telis ſimillimum eſt, ſimplex & tenue inſigniter. De octo igitur in abdomine musculis, iuxta primam anatomicæ ipſorum adminiſtrationis ſpeciem, quæ longe faciliſ & aprior eſt, abvnde ſatis diſputatum eſt. Ita verò & coniugationes ipſorum voces licet: primam ſanè maxumorū obliquorūq; qui à ſexta thoracis coſta incipiunt: ſecundam, his ſubcontrariorū obliquorū: tertiam, rectorum: & quartam, tranſverſorum. Poteris etiam ab ipſis musculis anatomicè auſpicatus, vbi recta linea vniuerſum abdomen in dextram & ſiniſtram regionem diſtinxeris, ab eorū ipſam cutem detraxeris, à rectis musculis ſeparare primum ſuperficiarium maximū muſculi tendinem: deinde ſecundum ab ipſo, qui à ſecundo naſcitur. Vbi verò utrūq; vtriq; connexum oſtenderit, rectorum musculorum conſectionem aggredere, ac dein eorum, qui ſubditi ſunt, ſemper fibrarum continuatatem viſq; ad ipſum muſculi caput ſequutus. Sic enim totum opus tibi clarum euadet, ve nihil confundatur. Atq; hæcenus de præcordiorum musculis. Intefinis exemplis, primum ſepti ex ſpurnis coſtis proceſſum indicare expediet: dein quo modo ſpine inferatur, pate facere: poſtea particulas ipſius diſtinguere. Etenim medium ipſarum eſt muſculus, qui in tendinem laſarum omni ex parte à carnoſis comprehē-

ſum definit. Ex vtraque autem ipſius parte, ſuperiori puta & inferiore, tenuis membrana adhæreſcit: quarum elanior, quæ duplex eſt, totum thoracis cauum ſublinat, à dextra parte altera, à ſiniſtra quoq; altera. Non enim vna quædam eſt intra thoracem ſpacioſa laxitas ſibi cōmuna, ſed à prædictis membranarū intercipitur, quæ recta linea ad pectoris longitudinem mutuo ſibi cohærent, niſi quantum ea in parte abſcedunt, quæ cor ſuum eſt. Hoc enim inter ſe medium capientes propria inclufum membrana, quæ pericardium dicitur, ita ad macronatam viſque cartilaginem porriguntur. Totam itaq; vtriusq; thoracis regionem internam, membranæ quædā ſuccingunt, natura ſimplices, telæ araneorum perſimiles. Baſis ipſarum ſuperius ſepti partibus obſecta eſt: quemadmodum inferioribus alia quædam membrana ſimilis huic ſubſtrata, quæ peritonæi vertex iure optimo nuncupatur. Ceterū hæc membrana ſibi continua totam inferiorem ſepn tranſverſi regionem ſublinat: ac vbi illud vſus neceſſarij grana foratū eſt, ibi eis ipſis quæ permeant, circumheret, ſimulq; expanditur. Sunt enim duo foramina ſepitæ alteri grande, quæ vertebris via exhibetur, ſtomacho & magnæ arteriæ præparatum. Reliquum verò minus, venam cauam ſuperius animalis partibus ſanguinem deriuantem, excipiens: quæ vena prius cæteris partibus deſiccant occurrat, ceu & in ſublimi ſuſpenſa, & nūdante ſe continens, muſculus ſublaſis. Deſectis quæ infra ſeptum habentur, nihil mali fuerit membranarum lumborum caenibus ſuperſtrati detrachere. Eſt autem hæc, peritonæum lumbis cohærens, quo auiſ cor carnes ipſorū clare compicies: ſingulos nempe vtriq; muſculos exactos perſpine longitudinem ſibi mutuo connexos, deſuper totū lumborum longitudini expaſſos. Qui quidē quam prope os ſacrum pervenerint, dirimuntur invicem, internis illum adhærentes: in quibus quidem muſculus duo tēdines reperiuntur, quos anatomici neruoſum muſculorum propaginem nominant. Prædictæ itaq; dæ lumborum carnis partes terſæ, deorſum ſtrectunt eam partem ſpine, quæ per lumbos totos habetur, tum eam quæ dorſi continua eſt. Pari modo muſculus ſtomacho ſubditi ſuperiorem ſpine partem in ſtrectunt. Verūm lumborum caenis in ſepſis caput obnēt tendūis, qui ad femoris trochætera pertinet. Iam verò poſt prædictos omnes muſculos, ſpinaliū totorū proceſſus diligenter cōſidera. Incipit etenim ex ſecunda cervicis vertebra, ſinguli duo capita inuicem diſuncta obnēntes. Semper autem magis ac magis compulſi euadunt, quāvis à tenuibus oriuntur capibus. Nā ex vna quaq; vertebra proceſſus aliqui ipſis miſcetur, ac in ſibi collum permeat, tum magnitudine, tum robore inſignes ſunt. Et primum in colli extremo in idem cōeunt muſculi, in ſibi vtra quæ ſpine parte nati, hic dextra, ille ſiniſtra, vt omnia amborum muſculorum capita, quatuor numerētur. Fibre autem ipſorum oblique ſunt: quædam à ſpina ad priora inferioraq; decurrentes: nonnullæ contrā, ex lateraliſ bus orientes proceſſibus, quæ retro, deorſumq; vergēt. Quibus

Membrana ſub  
linat thoracem.

Thoracis capaci  
tatem eſſe in  
duas laxitates  
diuiſam.

Pericardii in  
voluit cor.

Peritonæi ver  
tex.

Sepi forami  
na duo.

Vena caua.

Lumborū mu  
ſculi duo.

Spina partē d  
eius ſtrectan  
tur muſculus.

Spinalium mu  
ſculorum pro  
ceſſus.

Spinalium mu  
ſculorum capu  
ta quatuor.

Spinalium mu  
ſculorum obli  
que fibre.

Cela.  
Raxem.

Reſti muſculi  
abdo minis.

Tranſverſi ab  
dominis muſcu  
li.

Peritonæi ara  
neorum telis ſi  
militum.

Abdominis mu  
ſculorum quatuor  
coniugationes.

Septem tranſ  
verſum naſci  
at ſpurnis co  
ſtis.  
Septem tranſver  
ſi partem.

60

bus diligentem adhibere curam, dum utroque musculo dissecto, ad lumbos devenire. Ibi siquid musculi ex ligamento quodam membraneo, quod a loco spinæ prodit, gignuntur, ex ipsa parte ad postremas thoracis costas fere paulatim oblique tendentes. Atque hi musculi extremas costas detrahunt, ab anatomicis sunt prætermisisti.

## GALENI PERGAMENI

de anatomicis administrationibus.

### Libri VI.



IMIA igitur homini simillima est, præcipue pedibus atque manibus. Quam si conspexeris aliquando currentem figuram erectam, statim ex longinquo eam similem homini deprehendes. Quædammodum ergo præstat, simiarum hominum quidem fieri poterit similitudinem dissecare artus, quam re in exemplo exercere studeas: ita satis est in talis simæ inopia etiam dissimilium aliquam capere: sicuti etiam si in totum simia delideretur, cynocephalus, vel facyrum, vel lyncem, summumque ea animantia, quibus artuum extrema in digitos quinque discesserunt. His animantibus succedunt, versus, leo, & quæ serratos dentes sortiuntur. Ex actionibus autem quas obeunt, & figura particularum, quam singula animantia extrinsece habere videntur, nonnulla & de structura ipsorum nobis indicatio sumetur. Nam quæ animalia similem actionem obeunt, similesque figuræ exteriorum representant, ut similes nimirum & interna tota particularum natura existit. Quippe natura cuius animanti corpus animi affectibus idoneis cõdidit: atque huiusmodi similitudinem natura fuerunt omnia particularia videntur, tanquam à magistro edocet. Quare aliquod animal antea non visum, intuitus, sæpe equidem iudicavi, qualem nam sub cute structura haberet, non aliunde eius cognitionem atque peritiam in deceptis, quam ex firma persuasione, quod singula animantia corporis structura animi moribus facultatibusque propriis haberent. Quinetiam voce animantis audita, de illius instrumenti coniectura aliquam fumere poteris. Sed de his alibi latius dicturi sumus. Nunc vero de cibi instrumentis differere animus est. Quum igitur unus sit usus communis animantibus cunctis, cuius gratia alimento indigeant, reperies instrumenta in singulis ipsorum generibus triplicia. Quædam prima ratione à natura facta, ad concipiendum alimentum, conficiendumque, & in totum corpus distribuendum. Alia secunda ratione, quæ excrementorum sunt receptacula. Reliquas alias particularas reuera ratione extruxit, quæ horum exercitioribus subseruiunt. In quarum itaque particulam cibum animantia recipiunt, ventriculus nominatur. In hoc leonem quandam & primis subeunt mutationem ingesta, ac præparantur iecinori, quod maximam cibi in ipsum permeantis alterationem molitur.

Hinc venæ confecti ipsam, in totum corpus derivant. Ut autem ex iecinore parum, nulliusque superflui particeps, alimentum uniuerso corpori dispenderet, natura instrumenta ad id accommoda cõdidit: idque secunda ratione, non primaria, sicuti

nuper commemoravi. Exclusis instrumentis, alia quod subito & leuiter ipso habetur, expungat: ut bilis meatus, vesicæque bilis exceptæ: alia quod terrestris est & graue, ut hæræ: & ipsa pars antea non recti: alia quod inter hæc duo consistit, aquosum, serosumque, ut vrinæ meatus, renes atque vesica. Cæterum vi pro arbitrio anuuantis superfluorum excreto fieret, musculos natura terminis valorum ea continere adhibere curauit, quæ tertiam ratione inter cili instrumenta habentur. Itaque necessitas tria hæc instrumentorum genera in omnibus animantibus, ad alimendi distributionem naturam cõdidit. Atque hoc est commune & idem in vniuersis. Quoniam verò nonnulla animalia validis aluntur cibis, quædam imbecillibus, cõ natura respiciens, particulares ventris differentias est machinata. Quare si aliquando videris animal ubi nonnullum cõspicetur, quod alimentum ligneum & spinosum edat, magnam huius & asperum notis esse constructum ventriculum.

Si autem etiam superiores dentes non habent, ventriculos ei necessarios plures existere, ut in primis statim pabulum ingerat: innox ex hoc rummians, ore conficiat, ac deinde in alium atque item alium ventrem degluttat, citius iudicandis. Contra vero quibus superior dentium acies concessa est, ea animalia nec ruminare possunt, nec ventres plures habent. Iam cornigeris magna ex parte superiores dentes abesse nouimus, ut quibus terrestris capitis partium recementum in cornua absumuntur. Itaque instrumenta quæ cibum conficiunt, tantam magnitudinem possident, talemque formam, qualis alimento ingerendo requiruntur. Omnes igitur venas quæ per intestina, ventriculum, lienem, omentumque quod veluti congenitum opericulum, calorem grana conditum est, intercurrunt, porrigi ad hepatis portas videbis. Porro musculi vniuersos inferos ventris mucronata carinilagine vique ad pubem usque diuidens, ipse corpus quoddam tenue, & laxæ araneorum tela simile inoder, cui ob id uomen inditum est peritonæum, quod simplex & simile existens, prætendatur omnibus tum visceribus, tum intestinis, tum vasibus, cæterisque aliis corporibus, quæ inter septum transversum & crura habentur. Ipsum autem separare incipies invento loco, ubi per se consistit, nulli musculorum incumbens adhaerens: nempe non multo post regione umbilici, ubi primis à transversis secedunt musculi, atque solum relinquitur. Etiam quum grande satis animal fuerit, liberebit facile peritonæum sibi continuum & intergram ad costas spurias usque feruare: vbi transversis musculis desinentibus, alius excipit musculi, nempe septum transversum. Siquid huius quoque substantia, musculi exactus: figura, circularis existit. Quod in medio ipsius habetur, totum neruæsum est. Quod autem in orbem hoc ambit, vniuersum carnosum existit. Peritonæum itaque carnosæ septi particule oboritur, à qua eodem modo detrahente ipsum conuenit, quo & à reliquis musculis avulsim fuerit. Studiøsè autem incumbens operi, facile liberatur, quoque ad causam venam peruenit sit, propter quam gibba hepatis septo transverso adhaerent, & conuectantur. Ab hoc conuexu versus sinistra regio-

Vesica bilis excreta. Lien. Intestinum rectorum.

Renes. Vesica.

Ventris differentia pro differentiis ciborum, efficitur natura ventriculorum.

Animalia carnis præsertim de cibis, habent ventriculos geminos.

Cornigeris cur magna ex parte superiores dentes careant.

Omentum calorem feruendi gratia conditum est. Mesenteria venas amplexu per portas ad hepatis portas.

Peritonæum præterea omnium notissima est pars.

Septi transversæ substantia exacta: figura circularis existit.

Septi transversæ carnositas.

Similium hominibus simillimum esse.

Animalia faciem apertam ad se habent.

Animalia quæ similia dicuntur.

Naturam cuius animantis corpus animi affectibus idoneis cõdidit. Animalia omnia particularia videntur similia et nata sunt.

Cibi instrumentum triplicia.

Ventriculus cili concipiendi alimentum. Iecur maximum cibi alterationis in melle, quod pulvis per venas digerit.

nem, peritonæum humiliter cum ore ventriculi  
coit, deinde toti capacitati crassius seipso factū,  
obducitur, sic tamē ut non magno negotio pos-  
sit ab illa seungi. Quanto autem inibi crassius  
est, tanto tenuius iecori obtenditur, omnesq; li-  
psum particulas, cea tunica quoddā peculiaris, cō-  
tegit. Quod verō adhæret ventriculo, germinib-  
us venarum, quæ in illum descendunt, involu-  
crum, vallū, firmamentūq; efficitur. At quem-  
admodum exiguae grandium vasorum propagi-  
nes in ventriculo demerguntur, ita in proxi-  
mum, ceu ad vmbilicū, alix parux, magnarū soboles,  
ex alto deferuntur, duabus peritonæi partibus  
comprehensæ. Et hoc corpus ex duplici perito-  
næi, ceu plexu (intra quem continetur vasa) con-  
stitutum, dicitur tum omentum, tum epiplo-  
um. Oportet autem vnam vtriq; gibbum ventri-  
culi intercurrentē persequi accuratissimē. Siqui-  
dem per dextram animantis partem deducet te  
ad processum, quo tenuē intestinū ex ventriculo  
oritur: altera parte ad lienis concavā, in sinistra  
positi. Cuius visceris gibba pars ad extrema no-  
tharum coitarum conuerſa est, & quicquid huius  
ad sinistra illa contiguum est. Concava autem  
ad dextram partem inclinat, contra iecur & par-  
tes inibi sita. Mittit itaque a se vena illa ramos  
quosdam exiguos, partim in lienem, partim in  
omentum. Non tamen vas in lienē absumitur, sed  
quod ex eo restat, vnā cum arterij sibi iunctæ re-  
liquo, deorsum versus, per sinistra illa pertendit,  
sistit omēto generationis principium, penes hanc  
partem. Eodem modo in dextris illis omentū  
portio descendit, cum illius loci vasa, quæ in  
ventris gibbo sese contingunt. Quapropter &  
hic illud, tanquam indicem sequamur, adamus-  
sim ipsius originem, præter iam dictas, conspi-  
cimus. Porro inferiori omenti portio, pauciores ve-  
nas & numero & magnitudine obtinet. Enas-  
citur autē ex ventris finis, vnde & vasa habet, reli-  
quas quasdam simul ipsi deorsum versus abdu-  
centia. Omnes autem hæ particule sibi mutuō  
continuae sunt, corpūq; vnum, nempe omen-  
tum, constitutū, illud figura marisupij, quod orifi-  
ciū quidem ex ventriculo exortū superius & in-  
ferius obtinet: totū verō eius spatium, quatenus  
ex dictis cōstitit principis, deorsum versus pro-  
cedit. Adnascitur autē interdū omentū ipsum ali-  
cui fibræ iecinoris, lienis, atq; etiā colo. Sed quale  
nam sit omentum, & vnde oriatur, si ad prædi-  
ctum modum confectionem molaris, haud re-  
grē inuenies. Quum autē multæ sint coniugatio-  
nes ex arteria, venā & neruo, in singulis orli-  
bus intestinorū: insuper multæ inter eas spā-  
næ, in quibus duplex peritonij habetur: ex his o-  
mnibus consistere mesenterij substantiā, ipsi omē  
to persimilem, intelligito. Hoc siquidē corpus,  
quod mesenterium, mesarsium, & lactes dicitur,  
medium inter intestina habet sitū, & omnes ve-  
nas ex iecore in ipsum descendentes, vnā cum  
vicinis arterijs & venis, in orbem completur,  
quemadmodum ipsa intestina singula. Vbi igitur  
vasis & intestinis obtenditur, simplex est: vbi  
verō ipsi medium interiacet, nō amplius indu-  
menti vsum, sed copulæ exhibet, nimirū duplex  
quum sit. Quod si obesum abvnde animal fue-

rit, eatenus augeri mesenterij pinguitudinē acci-  
dit, ut interdum vasa conſcendant. Quamquā in  
huiuscemodi animalibus etiā alias plerūq; peri-  
tonæi partes pinguedinē habere conspicimus,  
præcipue in quibus non grandia vasa habentur,  
& viscera longius absunt: quippe à calore lique-  
ſcit, à frigore conseruatur: atq; ob id semper in  
neruosis cōstitit paribus, & usque quoniam v-  
tam agunt, abvndat. Talis tantē peritonæi, & eo-  
rum quæ ex eo gignuntur, natura est. Porro me-  
senterij arteriæ ac venę inuicem cōiungentes, ceu in  
arboribus ipsi radices, ad principium vnum om-  
nes perveniunt. Iam verō ea quæ intra perito-  
næum consistunt, præstat singula per se, ex cor-  
pore exempta, inspicere. Læbet etiā, post exem-  
pta intestina, glandulas mesenterij vnā cū vasis,  
quæ ad ipsas perveniunt, ab illis orta, quæ ſer-  
ebantur ad intestina, intueri. Ventriculo igitur, at  
que singulis intestinorū, duæ tunice insunt: vni-  
ca autē tum vesicæ, tum vultus. Habet autē inte-  
rior ventriculi tunica, fibras rectas, exterior or-  
biculares. At intestinis, plerūq; circulares insunt  
fibræ, quibus paucule rectæ superpositæ sunt.  
Omnia igitur hæc cunctis animalibus sangui-  
ne præditis videntur: quibus omnibus etiā & iecur in-  
est. Quæ verō iecur habent, iis & lien omnino  
est, & meatus qui bilem excipiant, etiā fellis vesicæ  
nonnulla careant. Cuius situs idem ipsam for-  
tis in animalibus, sub maxima fibrarum iecoris  
perpetuū est. Non tamen iecoris fibræ pares nu-  
mero, vel genere, vel specie, vel magnitudine, in  
animalibus cunctis habentur. Gulosi enim &  
timidi inest magnum iecur, multitudineq; & di-  
uersum autem, contrario modo affectus. At qui-  
bus magnum est, in plures maioresq; fibras,  
quæ hominibus, scilicet est: quamquā in homi-  
nibus vniuersis, nec magnitudo, nec fibrarū nu-  
merus similis videtur. Occupat autem interdum  
paucis in hominibus partem sinistra iecur, ſicu-  
tū & in multis animalibus aliis. Intestinorum na-  
tura, quatenus intestina sunt, omniū eadem ha-  
betur: magnitudine autem & numero anfra-  
ctū evanat. Primum igitur intestinū est, quod  
exortum, siue superior vocant, pyloro continū.  
Ab hoc secundum, quod à duodecim digitorum  
longitudine, dodecadactylon dicitur: tertium  
autē, quod cibo semper sit vacuum. Tertium te-  
nuius intestinū, est substantia huic simile. Differt  
autem, quod neq; reperitur vacuum, nec tot va-  
sis ſcateat. Quartum est, quod cæcum appellat.  
Quintum, quod colon. Ab hoc ique extremo re-  
ctum intestinum ad sedem vsque porrectum est.  
Sic & lien in sinistra parte consistit, concavo ip-  
sius in dextram conuerſo. Arque vna quædam  
ex iecinore ad ipsum pertinet, cuius processus  
in ventriculū detrahit. Porro iecur venas ex me-  
senterio ad concavū ipsius partem pertinentes,  
excipit. Vocant autem hunc locum, in quem om-  
nes venæ mesentericæ se colligunt, portas. Hic enim  
repentes maximā venæ os, in quam aliquo ſpe-  
cillo immisso, per singulas fibras leuiter ipsum  
propellēs, substantiā in eumbentē scilicet præ-  
cides, donec ad eam venam, in qua latet ſpecul-  
lum, perveneris. Hac detecta, sic ut ipsam nō di-  
ſſecueris, carnē visceri circumdatā vasis inde pro-  
cedentibus,

Omentū quid  
Epiploū.

Lienis positio.

Omenti figura.

Mesenterij sub-  
stantia ex qua  
bus constat.

Mesenterium.  
Laſtri.  
Mesarsium.

Pinguedinē  
à calore liquo-  
ſcere, conſeruari  
nō à frigore.  
Mesenteria ve-  
na.

Vasculū ſin-  
guliq; intes-  
tinorum duæ tu-  
nicæ insunt.  
Vesicæ & vultus  
vna tunica  
ca insunt.  
Fibræ rectæ  
& orbiculares.  
Sanguine præ-  
ditæ quæ in-  
ſunt.

Vesicæ ſellæ ſi-  
tus.

Iecur magnum  
multitudineq;  
excepit guloſi  
& timidi.

Iecur nonnullis  
hominum in ſi-  
nistra parte la-  
cetum.

Intestinū su-  
perius, & cæ-  
cum.  
Exortum inte-  
stinum.  
Dodecadacty-  
lon ſeu quatuor-  
decim digitorum.  
Tertium inte-  
stinū, nō ſit vacuum.  
Cæcum intes-  
tinum.  
Colū intestini  
rectum inte-  
stinum.  
Lienem ſinistram  
parte iecoris.  
Vena à liene  
in ventriculū.

Portæ venæ.

cedentibus intermediis admittit. Siquidē à portis in singulas fibras, quotquot fuerint, venā vnam grandē porrigi deprehendes, qua in exiles multas diffusa, sicut & illis in alias, quantum vasa interiacet, totū visceris carne repletum est, quam tuismet digitis eximere poteris, vā vasa ipsa nuda cernere liceat. Quod autē in vna tibi fibra conspectū fuerit, id compertes in omnibus. Quod si exactē portarū regionem sequaris, spectabis etiam meatū ex bilis vesica, ad intestinorū prodia  
 10 Ethonis initū pervenire, non multo inferius, quā pylorus habetur. Qui meatus, quā huic inferitur, ramulū de se paulo supra pylorū emittit. Omnia itaq; hæc accuratē intuitus, demē hepatis gibbū accedes, illā ipsius fibrā incidens, cuius concava in pane venas detexeris: quippe venas simuliter in gibba sine arteriis propagari cernes. Constat autē vena ex vna dextrā tunica, sicut arteria ex duabus. Sed iam ad renes iret impetū videtur, quorū dexter in omnibus animantibus clarior eminet, nonnunquā grandem icotia fibrā aringens. Porro à spinæ vas, arteria nēpe & vena, inferuntur in eos haud exigue magnitudinis vasa, similes quidem singula utriusque autē quibusdā animalibus, lina. Insuper cōcausa in sese renes cōversa obnēngibba verō ad animantis latera adversa. Evidenter autē renis sinum cernes, corpore quoddā membranco circumdātū: cui quidē haud paulo à vasorū insertione, alterum quoddā corpus in vtroque rene adnascitur, concavū & oblongū, qd ad efferēdo lono, vretica, hoc est, vrinariū meatū nominat: quā vna tantū tunica cōstat, crassiori tamē q̄ quæ inest venis. Hi igitur duo pori, substantia quiddē vesicæ similes, oblique simul in eam inferuntur, in cuius regione interna, tale forsitum operculū, quale in columbaris kypbones dictū. Et si quiddē tam sapienter constructū, vt ab illis solū recludi possit, quæ p̄ meatū deferuntur. Mox autē deprehendes, quā meatus vrinarijs peritonæo (quo obvoluuntur) nudaveris, & arterias & venas simuliter suspensas, ad peritonæi foramina obliquas deducis: has quiddē vt testes nutritas, illas vt generantioni subseruiant. Superest autē vt tertiū tibi instrumentorū differentiam cōtemorem, quæ nimirum musculi sunt, alij in abdomine, nō excrementis tantū egerēdi, sed ad cōlationes quoq; & voces edendas, cōmodi: alij in sede ad strīgendū, claudendūq; meatus extremū, accōmodati: à quibus etiā reuolvitur sedes, si quando per deiectiones crebras, plāpā fuerit. Vbi igitur pubis ossa, cartilaginij iuxta ventū cōiuncta, diduxeris, in exterioremq; partē vtriq; illū os detorsis, conspices sanē ligamentū quod rum ex lato osse, rum ex pectine ontur, in vni musculi corpus degenerare, magni quiddē, sed membranosū, laniq; ad sedis vtriq; partem productū. Eo igitur tempore, quo animal aliā exonerat, octo abdominis musculi pariter cum septo, pro cōmuni omnium musculorū functione tenduntur: orbiculari musculo relaxato, qui circulaum sedē complectitur. Reliqui omni tempore circulares hic rāusculi contracti, sedis os claudat. Similiter dum vesicæ termini musculum, vbi primum ipsius ceruix oritur, detexeris, haud dissimilē eū

esse ab illo sedis orbiculari compertes, tum functione, tum vñ: quippe & hic, sic vt ille, officij, cui præpositus est, constringit.

# GALENI PERGAMENI de anatomicis administrationib. lib. VII.



Oculis quomodo spirituum instrumentorū consuetudine administrare, explicare proposui. Pulmo igitur, cor, & thorax, principaliora spirituum instrumenta sunt. Mox arteriarum genus duplex: vñ à sinistro cordis ventriculo in vniuersum corpus propagatū: alterum quod earum est artēnarū, quas alperas vocant. Quatē quiddē in senice vna maxima existit, quæ frequenter ramorū rēne pulmones adiit. Cuius superioris extremo, veluti caput quoddā, incumbit particula larynx dicta. Hæc itaq; vniuersa, primā ratione natura condidit: quædā necessarij ad vitā ipsam vñ grana: quædā vñlia, non tamen animantibus necessaria. Iam verō aliā quamdam cōstruxit particulā, quæ & substantiæ peritonæo similis compos est, & eundē vñm omnibus spirituum instrumentis, veluti illud cū, exhibet. Est autē particula hæc, ipsa costas succingēs membrana, quæ omnibus intra thoracem instrumentis obducitur, quemadmodū peritonæo vasis quæ infra septū habentur. Ex ipsa autē, membrana thoracem interceptantes nascuntur. Atq; hæc sola res, structura ipsius à peritonæo euanat, quod videret duplici omnino sit, non vna, quemadmodū illud. Porro naturam ipsius accuratē perdiscere, si os pectoris, vbi detectū prius fuerit, secundā longitudinem dissecueris, vñq; ad cartilaginem eniformem, ac dein vtriq; pectoris partem leuiter in exteriora reduxeris, ita vt pericardium, qd ambit cor, minime vulneretur. Quod si id fieri nequeat, membrana tamē thoracē interceptantes, ab affectu immunes permaneant. Sic siquidem vtriq; membrana, tam quæ dextras, quam quæ sinistras succingit costas, quæq; superius partibus, ipsij pulmoni obducitur, sibi cōtinuā apparebit. At cordis tunica peculiaris, pericardio no mine, diuersa ab vtriq; harum existit, in medio ambatū sita, vtriq; ab ipsis cōprehensa. Non tamen ipsi cordis corpori pericardios hæc tunica annexa est: verum circa alias quidem omnes ipsius partes, haud parua quædā regio intermedia existit, motui cordis accōmodata: ad basim verō eas, quæ orbiculata est, produntibus ab illo vasis, à quibus trahit oris, connectitur. Porro quemadmodū pulsans vñs, omnes appellant cor, sic etiā pulsantia vasa, arterias nuncupit. Ceteras igitur omnes artēnas pulsantes, quotquot toto mñnt corpore, sensu discernere, nullus est negotij: & omniū ipsarū cum maiore arteria cōiunctas, idem hoc indicat. Verum in pulmonē pulsantes, sensu admodum euidenter deprehendere nemo potest: inde tamen, quod sinistro ventriculo sint continuæ, coniecturam aliquā fecerit. Etenim quod vas ex sinistro cordis ventriculo in pulmones deferret, tamen corpus quidem substantia, sit vena, hoc est, venæ tunica constet, vñ tamen venosa arteria vocatur.

H uq

Bilis meatus in  
cavum mēsi  
surus defina-  
tionem.

Heparis gibba  
à dextera ar-  
teria vñsa.  
Vena cōstat ex  
vna tunica.  
Arteria ex dua-  
bus tunica con-  
stat.  
Hæc dextera cla-  
rior eminet.  
Vasa in rene  
inferiora à ma-  
gna vena et ar-  
teria,  
hæc vniuersa.

Vretici por-  
tus rāusculi tun-  
ica cōstat.

Vreticos vasi-  
culos intra vñ-  
sam opercula.

Vasa in testis  
bilata.

Abdominis mus-  
culosos vñ-  
culosos musculos  
vñcos.

Bilis vesica mus-  
culus p̄ cōmuni  
fasciā est sedis  
musculus.

Spiritus instru-  
menta prin-  
cipaliora qua-  
rum duplex.  
Arteria arte-  
ria.

Arteria arte-  
ria.

Larynx.

Larynx.

Larynx.

Larynx.

Larynx.

Larynx.

Larynx.

Larynx.

Larynx.

Larynx.

Larynx.

Larynx.

Larynx.

Larynx.

Larynx.

Larynx.

Larynx.

Larynx.

Larynx.

Larynx.

Vena arteria  
duabus tunica  
constat: pro  
pter ad pulmo  
nem ex dextro  
cordis foras.

Vena arteria  
duabus tunica  
constat: pro  
pter ad pulmo  
nem ex dextro  
cordis foras.

Vena arteria  
duabus tunica  
constat: pro  
pter ad pulmo  
nem ex dextro  
cordis foras.

Vena arteria  
duabus tunica  
constat: pro  
pter ad pulmo  
nem ex dextro  
cordis foras.

Arteria veno  
sa.

Vena arterio  
sa.

Arteria arterio  
sa.

Arteria arterio  
sa.

Arteria arterio  
sa.

Arteria arterio  
sa.

Arteria arterio  
sa.

Arteria arterio  
sa.

Arteria arterio  
sa.

Arteria arterio  
sa.

Arteria arterio  
sa.

Arteria arterio  
sa.

Arteria arterio  
sa.

Arteria arterio  
sa.

Arteria arterio  
sa.

Arteria arterio  
sa.

Arteria arterio  
sa.

Arteria arterio  
sa.

Arteria arterio  
sa.

Arteria arterio  
sa.

Arteria arterio  
sa.

Arteria arterio  
sa.

Arteria arterio  
sa.

Arteria arterio  
sa.

Arteria arterio  
sa.

Arteria arterio  
sa.

Arteria arterio  
sa.

Arteria arterio  
sa.

Arteria arterio  
sa.

Arteria arterio  
sa.

Arteria arterio  
sa.

Arteria arterio  
sa.

Arteria arterio  
sa.

Arteria arterio  
sa.

Arteria arterio  
sa.

Arteria arterio  
sa.

Arteria arterio  
sa.

Arteria arterio  
sa.

Arteria arterio  
sa.

Arteria arterio  
sa.

Arteria arterio  
sa.

Arteria arterio  
sa.

Arteria arterio  
sa.

Arteria arterio  
sa.

Arteria arterio  
sa.

Arteria arterio  
sa.

Arteria arterio  
sa.

Arteria arterio  
sa.

Arteria arterio  
sa.

Arteria arterio  
sa.

Quod verò ex dextro procedit, tametsi duas for  
natur tunica, perinde ut arteria, quia tamen nō  
pulsat, appellatur vena, sed arteria sit. Optimum  
quippe fuerit, pulsū, atque eius defectū ipsa vasa  
discernere. Verum quomodo licet sensibus nō adeo  
clare distingui queat, à communione quam cum  
vetroque cordis ventriculo habent, indē nomen  
debet appendi: verò, à corpore substantia. Cæ  
terum iuxta corpoream substantiam arteria qui  
dem est illud vas, quod ex dextro cordis ventri  
culo oritur: vena autem, quod ex sinistro. Con  
trā, vñ ratione, quod ex sinistro prodit, arteria  
est: quod ex dextro, vena. Tonus igitur corpo  
ris venæ, ex peculiari vna tunica consistit: arte  
riæ verò, ex duabus: quarum exterior quidem,  
qualis venæ tunica existit: interior autem, cras  
sior huius fere quintupla, duriorq; & transversa  
fibris distincta: quæ interna superficie habet a  
liam, seu cuticulam quādam araneorū telis: per  
fissilem. At exterior, quam etiam venæ obducit,  
recte fibris, & quibusdā mediocriter obliquis,  
transversis nullis, contexta est. Ex tribus itaq; va  
sis pulmonem intertextentibus, quod à sinistro  
cordis ventriculo proficiunt, nuncupetur arte  
ria venosa: quod à dextro, arteria vena: tertiū,  
arteria aspera, ex cartilaginibus quæ imaginem  
Crescentis, fabrefacta. Quæ cartilagine circula  
res, tum in grandia arteria, quæ in collo caudis  
rationem obtinet: tum in parvis, quæ ab illa  
in pulmones insertæ sunt, in priori parte situm  
habent: in collo quidem, vicinæ œsophago: in  
pulmone autem, vena quam paulo antevoca  
mus arteriosam. Porro vasorum intercapedi  
tes, peculiari pulmonis substantia replentur. Li  
cet autem pulmonem ex thorace exemptum, sicuti  
& cor ipsum, incidere, non tamen ita societatem  
ipsorum, quam cum membrana in eunt, cognos  
cere. Iam verò osium thoracis naturam similiter  
speculabere, quæ evidentior quidem, corde a  
nimali exempto, in conspectu prodit: quanquā  
& infuso adhuc ipso, palam cernatur. Prætereā in  
tali administratione, præter iam commemoratu  
m, hoc conspicies, nempe cor, inter vtrāq; tho  
racis spacia medium, consistere. Motus autem  
ipsius indicat, quasi in parte sinistra sit colloca  
tum: idque duplici de causa. Primum, quia spi  
ritus conceptaculum hic consistit: deinde, quia  
vertex eius ad hanc magis regionem inclinat.  
Porro costæ singulæ: deorsum versus simul &  
prosum oblique feruntur, ex spina ducentes or  
tum. Nam duplicibus inibi articulis cum vna  
quaq; dorſi vertebra committuntur. Vbi verò  
ad pectoris regionem perveniunt, cōtrario mō  
do, sed oblique etiam ad os illius attolluntur: v  
bi cartilago vice ossis genita, diuersam naturam  
obtinēt, facileq; acuto simul & valenti scalpello  
potest incidi. Rectam itaq; vtrāq; parte lineam  
deorsum versus per totum thoracis regionem  
ducent, eam pectoris partem attollas, quam v  
triusq; ductæ lineæ diffinunt: postea verò duc  
tas latera, robore maximo adhibito, ad res  
tendās eas partes costarum, quæ vertebri vici  
næ existunt. Sic enim omnes thoracis partes pa  
lām intrare licebit, ac multo magis septo à co  
stis abscisso: insuper hoc magis adhuc, si duabus

costis diremptis invicem, omnem carnem inter  
mediam præcidās. Sic igitur & venam caui ma  
nifeste ad iugulum vsq; recto tramite percurrē  
te cernes, & cordis processus, quos aures nomi  
nant, peculiarem naturę fontem substantiam,  
quæ in alia nulla particula habeatur, quemad  
modū profectō & cordis ipsius essentia. Quod  
autem corpore cordis substantia, permixtum à  
musculo differat, est illiusdem consistit actione.  
Est enim cordis motus non arbitrarius, nec cess  
sare, quoad animal vita fruatur, potest. Muscu  
lorum autem functio subinde quiescit, ac nar  
sus excitatur, animantis arbitrio subseruit.  
Actiones verò imitantur proprietatem substan  
tiæ. Huius rei gratia, quæ quidem particule ean  
dem speciem substantiæ possident, similiter op  
erantur, et si diuersæ permixtæ animantibus  
insint: quæ verò non habent, diuersa harum est  
functio, quamvis vñus animantis particule ex  
stant. Quapropter nec musculi eandem cū cor  
de functionem habent, quoniam neq; substantia  
Est enim si quis cor & musculum quemlibet  
pariter coctum, vtrūq; gustat, haud medioc  
rem ipsorum gustu differentiam perferent: ut  
quod subtiliariū differentię maxima nota ex  
istat. Hallucinatur igitur qui cor musculum esse  
existimant, aut nō erudit ad suam functionē ege  
rent non intelligentes actionis ipsius excellenti  
am, ex sua visceris substantia necessariō inesse. Cor si  
quidem thorace exemptū, diu moveri videtur  
quare verus ad eum motum non indiget. Qui si  
similem motum præstare possent, cur extera par  
tes cui nemini insunt, non similiter pulsare viden  
tur: Porro omnes nervos vtrāq; facultatem ha  
bere, sensitiuam nempe & motricem, ratio est.  
Verum molles ad sensum aptiores, duri ad mo  
tum existunt. Ab eadem tamen radice pluriq;  
discessit, apparent quidam nervi in musculis, ali  
i in aliis parculas inferi, quemadmodum & in  
tertia ipsorum coniugatione, & sexta nihilo mi  
nus, habere nouimus, à qua cor exilire quēdā  
neruum accipit: vnde etiam pulmo, iecur, ven  
triculus, et mesenterium insuper totum, vni cum  
intestinis, necnō vniuersi laryngis musculi, suas  
excipiunt propaggines. Iam verò cordi, quod a  
nimose virtutis inatum est, ac veluti fontē quid  
dam natium caloris, aures quædam annexæ sunt,  
nervosiores ac magis curiculares ipsa cordis  
substantia. Quæ particule & colore nigriores  
sunt, & corpusculis cuticularibus manifestō si  
miles, sinus cuiusdam ante cor efficiendi gratia:  
ob quam rem, ipsas naturā & concavas & curi  
lares condidit. Dux verò hæ sunt, in vtroq; vaso  
rum materiam inuentum singule. In dextra  
quidem parte, quæ vena in cordis sinum inferi  
tur: in sinisteriori verò, quæ arteria venosa. Hæ  
aures quam aptueris, tum ipsum cordis corpus  
in conspectu erit, tum ex dictis officiis vtriusq;  
deinde membranae insertioni ipsorum incumben  
tes, tres quidem in sinu dextro, dux verò in sini  
stro: quarū structuræ figura, similis telorū cuspi  
di existit. Sed hæc quidem & corde thoraci exem  
pti licet accurate intueri, sicuti etiā reliqua duo  
officia vasorum, quæ materies ex dextro qua  
dem ventriculo in pulmonem educunt, ut venæ  
arteriosæ:

Cordis aures.

Cordis substantia  
tunc permixta  
differt: a mus  
culo.  
Cordis motus  
est non arbitra  
rius.  
Particulari sua  
est arbitrio a  
nimantis subser  
uit.  
Actiones imi  
tantur proprieta  
ti substantiæ.

Gustus differen  
tia, & differentia  
officiorum sub  
stantiæ argui  
t.  
Cor nec muscu  
lus est, nec ipse  
nervus ad ob  
ducit functionē.

Nervi omnes,  
sensitivi & mo  
trices sunt  
infuso.  
Nervi molles  
ad sensum, duri  
esse ad mo  
tum aptiores.  
Viscera vnde  
nervi, nasci  
ant.

Cor animosa  
cultura in  
tuitu  
est.  
Cor in auro  
la.

Cordis auri  
culari nomen.

Cordis auri  
culari incombent  
am membrana  
ri nomen, ex  
figura.

arterioſe: ex ſiniſtro autem in totum animan-  
tis corpus, vt grandis arterie. In quibus iterum  
tres vtriusq; membranas ad C. hteræ ſimilitudi-  
nem factas comperies, extra cor tendentes, vel  
ti inſulas intro. Prius verò quàm cor ex ani-  
mantis atriâ, caue venæ ramos conſidera: ad  
hæc glandium magnum, quod Græci thymum  
vocat: ruſſûq; cordis panniculæ radicem. Inſu-  
per examina, quo modo à dextro ſinu venâ qu-  
dam ad ſpinam porten dat, quintâ dorſi conicen-  
dens vertebrâ. Etenim quæ venæ ipſum cor nu-  
triant, perpetuò in omnibus animantibus, ex il-  
lo etiam ſinu prodeunt: ac vocant ea vaſa, cor in-  
volvunt: quoniam bina numero totum ipſum  
perreperant: quemadmodum à lixa parte duæ arte-  
riæ, maioris ſoboles, poſt primâ extra membra-  
nam proceſſum, in ipſum cordis corpus perve-  
niunt. Reperitur autem os vñ in corde animalii  
omnium, quanquàm non exactum, ſed cartilagi-  
nis inſtar. Cæterum quanto animantis genus fue-  
rit corporis mole vaſtius, tanto plus offeæ ſub-  
ſtantiæ cartilago illa ſortietur. Quare in maximis,  
vbi plus offeæ ſubſtantiæ gignitur, convenit i-  
pſam tunc appellare cartilagineam os, minimè  
cartilaginem offeam: quale nimirum os, ipeſaud  
magno negotio reperi, in illius elephantis corde,  
qui Romæ nuper fuſt iugulatus. Suspenduntur  
autem ex tali offe ipſe membranarum radices, va-  
ſoſumq; arterialium proceſſus, ibidem ſuſpenſi  
corroborentur: quem ſcopum ſibi in illius gene-  
ratione propoſuit artiſcioſa natura. Cæterum  
qui me adminiſtrantem non vidit, ſed edoctus  
libris ad conſectationem accedit, detecto quidem  
ſiniſtro ſinu, aperto autem in longiſſimo toto aortæ  
proceſſu, ſi ſtudio ſe radices aortæ & membrana-  
rum ſequatur, ex facili os ipſum inveniet: ſiquidem  
huius radix, & venæ arterioſæ, membranarumq;  
ipſarum, in offe cordis habentur. Quod  
verò Ariſtoteles ait, triplicem ſinum in eſſe cor-  
di, merum eſſe ſomnium videtur. Toto corde  
nudo, videbis ſiniſtorem eius ventriculum  
ad ſummum pateſcere verticem: dextrum infe-  
rius multò ceſſare, & circumscriptionem ſubinde  
propriam habere. Omne autem animal, vel ele-  
phante grandius, vel alauda minutius, quod æ-  
rem inſpiret, ſimilem cordis ſtructurâ obtinet,  
vel potius ſpecie eandem. Similiter & pulmonis:  
cuius fibræ io omnibus animantibus, de qui-  
bus verba fecimus, quæ quidem in dextra ipſius  
parte habentur, duæ verò in ſiniſtra: præter has  
in dextra thoracis parte alia quædam quinta fi-  
bra exigua, veluti altervtrius ſoboles, cernitur.  
Licet autem cor ipſum, adhuc vivente animali,  
circa thoracis ſinum conſulveratione, detege-  
re, ſi peſtoris os à ſubia ceutibus liberans, te con-  
ſeſtim ad involviturum ipſius cordis diſſecandum  
converteras, membranis quæ thoracem interfe-  
piunt, minimè vulneratis. Quæ quidē ſi, vt dixi,  
corde detecto illaſe permaneant, omnes ipſius  
cordis functiones incolumes in vivo animali  
ſervantur. Siquidē & reſpirare ſimiliter, & clama-  
re animal videtur: ac ſi à vinculis ipſum liberet,  
currere, vt prius cōſuevit. Quod ſi vulnus vinctu-  
lis adhuc cōprimas, etiam cibum aſſumere, ſi ſu-  
riat, cōſpicias: atq; ſi ſinit, bibere. Et quid oportet

mirari, quàm Marylli Mimographi puer curatus  
ſit, viuatq; adhuc, etſi cor illi aliquando fuerit de-  
tectum? Vbi igitur cor intra thoracis perforatio-  
nem detectū eſt, vaſorum exortum ſine excep-  
ere minimè poſſas: cordis autem baſim poſſis, ve-  
rùm animal ſtanim cōmoritur. Porro altervtra,  
vel vtraq; capacitate thoracis forata, omnia quæ  
reſpirantoni ſubſerviant, deſtruuntur. Autē verò  
quàm perforata ſit vna vel altera pars thoracis,  
non licet ipſum pulmonem cernere, niſi forte co-  
ſta exciſa, ſuccingentem membranam conſerves  
integram. Si verò animus ſit vtriusq; thoracis ca-  
pacitatem ſcindere, duas lineas per coſtarum ſe-  
xus ad animalis longitudinem ducito, quibus  
oſſa reſſexa dirimes. Deinde aliam tranſverſam  
lineam tertiam per mucronatam cartilagi-  
nem incidēs. Poſt hæc toto peſtoris offe reſſexo  
ſurſum, pericardiūq; diuulſo, ambos cordis ſi-  
nus æquè pulſantes videbis. Cæterum eviden-  
tius adhuc quàm antea cernes artenas, aut vi-  
ciſſim, aut eodem tempore & numero per totū  
animal elcuari, ſubmitti. Hæc igitur conſeſtim  
ipſo detecto innotescit. Procedente tēpore, bre-  
ves vtriusq; ventriculi motus, longis intervallis  
intercipiuntur. Iam dextri ſinus elcuatione, pec-  
tore ipſius natura perſicitur. Huiusmodi autem  
ſpectabiles poſſimum, vbi ipſi ventriculi immo-  
biles propè evaſerint. Primum etenim, vtriusq;  
ipſorum, quæ ad verticem cōſiſtunt, motum ceſ-  
ſant: mox quæ ſus proxima ſunt: atq; hoc ſit per-  
petuò, donec ſole baſes in mora verſantur. Qui-  
bus ceſſantibus, languidus brevitatis motus ex  
longis intervallis in cordis auribus cernitur. E-  
nim verò qui pollicentur ſe oſtenduros arteriam  
ſanguine vacuam, inania illa, & minimè proba-  
biliter pronunciant.

Marylli pueri  
curatus fuſſe,  
cui detectū cor  
fuerat.

Cordis vtriusq;  
ſinum poſſas.

Arteriam inſſe  
ſanguinem.

## GALENI PERGAMENI de anatomiciſ administrationibus Liber VIII.



Horacem porro nominant, quod à  
coſtis cōprelendus. Sunt autē lix  
omnibus quæ prius retuli animan-  
tibus, in duodenum numerū decora-  
reſ. Rariſſimè ſiquidem ex-  
tertia coſta viſitur: atq; hæc ita rara ſunt, vt inter  
mille vix vñ tali coſtarū numero invenias. Elati-  
or autē thoracis ſinis, ipſæ claviculæ exiſtunt:  
quemadmodum demioſior omni animalii gene-  
ri, ſeptū tranſverſum, quod phrenas & diaphrag-  
ma oominant. Sedes omnibus coſtis duplex  
prior, peſtoris os: poſterior, vertebræ ſunt, quæ  
totidem numero planæ, quot & coſtæ habentur.  
Peſtoris os, vñ quidem apparet, ob ſtructuræ  
concinnitatem. Membranis autē deraiſis, quod &  
plura oſſa ſint, & numero totidem, quot cum eo  
coſtæ cōmituntur, palàm innotescit. At verò ſep-  
tem priores thoracis coſtæ, cum peſtoris offe  
coarctantur. Octava verò ad radicem cartilagi-  
nis enſiformis conſiſtit. Reliquæ quatuor in tho-  
racis latera deſcunt, tantū priori parte deficientes,  
quanto etſi aliis breviores ſunt. Minima in-  
ter ipſas eſt quæ poſtrema habetur. Omnes igitur  
retrò clā dorſi vertebris coarctantur, idq; du-

Thoracem dicunt  
quod à coſtis cō-  
prelendus.  
Ceterum de  
decem nomina-  
tus.

Clavicula.

Septem tranſ-  
verſum.  
Phrenæ.

Diaphragma,  
Coſta omniū  
duplex ſedis.

Peſtoris oſſa tot  
quot coſtæ, cum  
eo cōmituntur.

Coſtarum ſi-  
pam priorem cū  
peſtoris offe co-  
arctant.

Glandium.  
Thymum.

Vena cor nu-  
trienter, vnde  
exoritur.

Arterias duas  
corpus cordis  
volvunt.

Cordis inſſe os  
vñ in corde  
animalii.

Cordis oſſis  
ſuſ.

Cordis oſſis in  
vñ in corde  
animalii.

Cordis inſſe  
ſuſ.

Cordis ſtructuræ  
inſſe os  
vñ in corde  
animalii.

Pulmonis ſtructuræ  
inſſe os  
vñ in corde  
animalii.



*Costas omnes  
vertebris desci  
aliqui dupli-  
ci nodo.*

*Septi transver-  
si origo.*

*Respirationem  
(qua potatur  
esse naturale a-  
er) si solo septi  
transverso sup-  
plicari.*

*Septum trans-  
versum quod mu-  
sculorum in  
intercostalibus fi-  
bris.*

*Costarum singu-  
lae in propria  
quoque arteria,  
venam, &  
nervum.*

*Fibris retrorsum  
que musculari  
intercostalium  
difficili potest  
vocari.*  
*Sicut magnam  
esse aperturam  
ad spiritalia  
organum an-  
timum.*

plici nodo: alioquin quidē, ad ipsum vertebrarum corpus: humiliori, ad lateralem ipsarum processum declivē. Hinc autē in priorem, inferioremq; regionem longius oblique procurrant, & quum iam anteriū fuerint, ab hac latrone cessant: ubi naturā cartilagineā sortitur, sursum ad pectoris os, cōtra priorē motum moventur: quarū finis cartilago exquisita censetur. Ab huius autē rartilagini partibus intimis, septū transversum oritur. Elanior, anteriorque ipsius pars, rartilagini mucronatę subnascitur: quādamodū posterior atq; demissior, ipsi spinę coherescit. Verū superior pectoris ossis finis cū prima semper costa committitur, necnō cū clavicula, in quibus hæc nimis habentur. Cæterū nō omnes musculi, qui thoraci quocūq; modo coherescunt, motus ipsius grātia sunt cōditi. Nam quidā a pectore & costarū spūarū sedibus sursum tendentes, humeri subseruiūt articulo. Quidam ad abdomen descendentes, suos vsus habēt, & thoracē paululum detrahūt. Quēdamodū qui costarū extremis afforis obiecti, iuxta pectoris os prorsum, & vertebra retrosum, iuncturas cōstringunt, & thoracē leuiter cōprimūt. Totū verō ipsius motū manifestē gubernat inferius septum ipsum transversum, dum intenditur, laxaturq; vicissim: dilatans, cōprimensq; indidem terminū, ac attrahēs ab ima parte per mucronatā cartilaginē pectoris os: costas autē spūas sursum leuiter & prorsum. Iam verō respiratiōē (quæ naturale opus, nō animale putatur esse) septū transversum dum taxat suppediat. quod nō modō substantia, sed vsū quoq; musculari est. Vt autē ad intercostales musculōs nos cōuertamus, eorū fibras superficarias ab elanior costa ad humiliorē leuiter oblique in anteriōra pertinētes cōspiciēs. Paulatim verō has diffecit in animalī cōmortuo, tunc in tēta accedes situ has aduersas, vt ambo ad XII tēte similitudinē habitū inter se exigūt, quem vsū que ad cartilagineos singulārū costarū particulas cōseruari videbis, in illis autē variari. Etenim in his exteriores fibrę talem haud dubiē siliū occupant, qualem interiorē sortite erant: cōtra interiores, qualē possidebāt externę. At in musculari costarū, quas nothas vocant, ad finem vsq; ipsorū, eadem fibrarū natura cōsistit: quoniam licet nullo flexu incuruātur. In ipsis porrō intercostalibus musculis, proximē ad ipsas costę os, arteriam, venam, & neruū, in ima cuiusq; ipsorū parte cōperies: proprias tamē ipsū neruū. Quare di ligentiam adhibere oportet, corporis quoque fibrę incidendis subiacēt: nam licet tria mutū se videntur cōnferre, nempe arteria, vena, atq; neruus. Cæterū medio inter summā altāque fibras situ neruum carnes, si fibras ad amussim sequar. Plures tamē superficiarę fibrę ita quæ in alto habentur, esse apparebūt. Porrō animal am plissima voce pręditi, apertissimū est ad cōsecutiones, in quibus vox quædam læditur. Vtriusq; igitur fibras diffecit, vocem simul et efflationē animalis perire, ipsa res persuadet. Quare præstat in huiusmodi demonstratiōe suam magnū adhiberi. Valens enim ei membranā a costas succingēs inest, quam ne perferes, sedulo curandū est. Hæc enim secta, dum thorax attollitur, nō parum a-

ris ambientis, in mediā thoracis pulmonatę regionem trahitur. Dum autē submittitur, hoc ipsum rursum per vulnus egreditur. Notum verō est, ex aere qui per inspiratiōē attrahitur, tantum necessariū ob vulnus perire, quantum videlicet in ipsum thoracē insinuat extrufcus. Quanto autem per os minus quādam necessariū sibi vsū inspirauerit animans, tanto etiam minus efflabit. Cæterū quanto efflato ipsa decreuerit, tanto vocem sequi breuiorē necesse est. Iam verō in quocūq; muscularum intercostaliū, si incidatur costas succingens membrana, idq; liginea notabili, animal semispirans protinus & semivocale redditur. Sin autem in altera thoracis parte æque secta fuerit, spiratio & vox aboletur. Quēdamodum si in cōtractione thoracis vacui aere, qui per vulnē elapsus est foras, plagas obturauerit ipsas, respirabit confestim animal, vocemq; emittet. Quōd autem vtriusq; fibræ sectis in omnibus musculis intercostalibus, non vox modō, sed efflatio quoq; intereat, nostrum inventum est: quēdamodum enim, vbi solis neruus præter dorū medullam sectus, inoffense quidem muscularum fibrę seruantur, actio autem deperditur. Licet verō circa spinā dorū neruus omnes, q; in musculis intercostales perveniunt, lino excepto attollere, non tamen vinculo astringere. Clamar enim sic percussum animal: deinde subito obmutescēs, ob neruus lino cōstrictus, spectatores redit attonitos. Nam miraculum esse videtur, neruus exiguis in dorso laqueo intercepis, vocem perire. Complures tamen in huiusmodi indicatōibus nūi subseruiant oportet, vt quim celerimē laquei omnibus neruis circumponantur. At magnitudo offense hæc haud æqualis in totum omnibus intercostalibus obvenit: sed ne qui costas spūas attingūt, tanto minor, quanto musculari earū elanioribus miniores existunt: quanquā musculari qui ad primā pertinet costam, obfusus, minimū etiam offensam adfert. Porrō in elanioribus costis, neruus ipsi potestus alius invenitur: recedens autem paululum ad imam regionem, in humilioribus. Cavendum itaq; ne quum fibras diuidis, neruum subditum lædas: cuius offensionem immobilitas muscularū intercostalium, colubitio efflationis, atq; abolitio vocis sequitur. Ad hæc, nerui propter arterias carotidas transcurrentes, si noxa aliqua momentanea afficiantur, animal reddunt mutū: non autē ita similiter, qui intercostalia excurrunt. Quippe rancus quidā strepitus in us relinquitur, qualis in somno steretibus fieri apparet. Hic strepitus musculari intercostalibus, resolutis obliteratur. Resoluntur autē cōsecit, aut fibris ipsorū cōsecit, aut costas excisis, aut neruo ad radicē vitato, aut tota spinali medulla propter dorū iniūta: quæ sectione possimū rancus strepitus aboletur, similisq; omnes inferiores particule, quæ ad musculōs intercostales, atq; imū ventrē spectant, cum eisq; etiā & sedis musculari, pudendorū, vesicę, & crurū, subito resoluntur. Vt enim diaphragma, licet infra musculōs intercostales habetur, non resolvitur tamen, quōd videlicet ipsius neruorum origo, tota sit elanior thoracē. Neq; etiam illi musculari, qui

*Spiratio et vox  
quidē potest.*

*Motum quoque  
tunc solui vel  
de posui au-  
real.*

*Motum rudi  
animal, in-  
guis latio ne  
ui quo recer-  
rant propter ar-  
terias caroti-  
das.*

*Intercostales  
musculi qua ra-  
tione resolu-  
tione.*



*Diaphragma-  
tu nervus vni-  
versum originem  
esse claviculæ  
thoracis.  
Sed et transver-  
sa vni animal  
sola, ad parvas  
respirationes.*

*Diaphragma  
quæ ru-  
tione præstat  
motu.*

*Medulla spinæ  
hæc ipsa trans-  
versum, quod ac-  
cedit.*

qui ex cervicæ descendunt, aut tollentes supernam  
thoracis regionem, quæcum inde ostendatur:  
etiam & in hos nervi deferuntur à medulla spin-  
nali cervicis. Vnde aut animal septo transverso  
sola in parvis respirationibus. Quæ verò maio-  
ris respirationis visus ipsi oboritur, aut ob exer-  
citæ, aut febriat, aut vehementem ætatis calorem,  
necessitas quidem est, functioni diaphragmatis  
etiam intercostales musculos subvenire. Sin autem  
magis visus respirandi incruent, vel ipsis es-  
lanoribus musculus illa functionem obit. Commu-  
ne autem hoc de omnibus musculis sciendū  
est, quod siue nervus ipsorum laeseris, siue amputa-  
veris fibras omnes transversas, totos statim mu-  
sculos suo motu priuabis. Quare necessariū tibi  
admodum fuerit, principia nervorum, qui in ip-  
sos distribuuntur, & fibrarū situm, pernoctare.  
Etenim cōstis cuiusq; os, iuxta inferiorem circū-  
ferentiam nudare oportet. Vbi autem iam appa-  
ruerit nervus, vni cum eo venit inspicenda ve-  
na, & arteria, quæ in seipsum magis quàm ner-  
vi extant, humilibus tamen paulatim sitæ. Igitur  
ab elationi parte iuxta costæ cit confertiam ha-  
mulo exiguæ subditi, libet tibi nervum excipe-  
re, citra adiacentia vasa, præcipue citra ipsam ar-  
teriam: quoniam ea, vehementiori sanguinis  
profusio, nervum obscurat. Si verò ipsam quan-  
doque vulneres, scalpello statim prehensio, trans-  
versam totam disseca: hæc panthe communis est  
omnium vasorum sanguinem mittentium prohi-  
bitio. At spinalem medullam totam transver-  
sam incidere, nihil integrū ex ipsa relinqueris: nisi  
forte ex industria dimidium eius tantum velis  
resolvere. Iam verò spinalem medullam, quum iux-  
ta longitudinem deorsum versus per medium  
ad rectam secatur lineam, nullum ex intercosta-  
libus nervis resolvit: neq; eos qui lumbis vel cru-  
ribus insunt. Transversum autem quum dimidia  
duntaxat pars eius diuisa fuerit, siue sinistra  
sit, siue dextra, omnes nervi, iuxta rectum inci-  
sæ partis tramitem, ordine resolvuntur. Quum  
itaque semivocale animal volēs reddere, in hūc  
secabis modum. Vbi autem mutū subitō, totam  
spīng medullam transversam divides. Quoniam  
verò costis etiam excisis, tum efflāno, tum vox  
animalis ostenditur, quemadmodū ob muscu-  
lorum, nervorumq; sectionem: dum animal vo-  
cem edit, transversam aliquam costam dissecā,  
visq; ad succingentem membranam, ita tamen vt  
illam nec convellas, nec vulneres. Vbi verò co-  
stam à subditi membrana deraseris, fasciculum  
erit partes eius diuisas, ad utrumq; terminū, nem-  
pe ad os pectoris atq; spinam, reflectere, ac sic la-  
tionem prehendere. At si musculus altervtri in  
parte, aut dextra, aut sinistra, resolutionē expeti-  
t fuerint, dimidiata efflāno: ac vocis portio  
aboleretur. Sin autem altervtriq; dimidiata, tum  
ambazum functionum pars quarta viciabitur.  
Nam pro musculorum qui resolvuntur numero  
& magnitudine, semper noxa voci succedit. Verū  
si fibris musculorū intercostalium scētis, vel  
excisis costarū ossibus, musculi quidā relinquitur  
ex iis, qui thoracem comprimūt, tum qui co-  
stārarū extremis porrigitur, adeoq; eorū qui in  
imo ventre consistunt, primum atq; tertiu consu-

gium. Quum autē thorax modicē ab his compri-  
matur, modica enā efflāno gignitur, cui vox ipsa  
proportio naturæ. Ac sanē intercostales muscu-  
los, per nervos qui de spinālī medulla ad ipsos  
perant, motu desistunt, in quē dixi modū: dia-  
phragma verò, vbi huius nervorū principia simi-  
liter vt reliqua affeceris. Descendit enim in tho-  
racē hi nervi per cervicis latera inter duas gran-  
des colli venas, deorsum verius obliqui, muscu-  
lis collo subditis inlaxerēt, tres quādē vtrāq; ex  
parte, qui plerūq; in subis habentur: in sinis ve-  
rō plurimum duo. Tertius autē raro in his videt,  
vt in subis quartus. Origo ipsorū omniū est cer-  
uicis spīng medulla. Ex quartē quidē & quarte  
vertebræ intervallo, prima coniungitū procedit:  
ex quintē & sextæ spacio, secunda: ex regione  
post sextā vertebri, tertia, quæ enā exigua admo-  
dum est: quemadmodū si quarta quandoq; acce-  
dar, eius quē post septimā vertebri habetur cōiu-  
ganon, propagat perperillā existit. Igitur omni-  
bus in istis, diaphragma motus sit expers. Pa-  
ri modo si musculorum singulorū ex cervicæ ad  
thoracem descendentiū, qui sex numero habentur,  
nervos affeceris actionē vitias. Affectus autē  
est duplex: vel dum fecit, vel dum intercipiuntur.  
Hoc citatq; in universum de omnibus muscu-  
lis intelligit, q; dissecto ipsorum capite, nō am-  
plius functionem obdunt. Quia verò in quibū-  
dam musculus caputū numerus ne deprehendi  
quidem potest, quū ex pluribus incipit obitum  
procelisibus, tutus fuerit illic ipsos fecare, vbi ca-  
pita in idem primum conspirāt. Atq; hoc quidē  
in anterioribus musculis facilius consecuti, in  
quibus profunda sectione opus est, vt qui peni-  
torem sitū occupant, vbi capita ipsorū coherant.  
Nam in posterioribus expeditissimā diuisio est.  
Aded vt longius possit administrari. At ve-  
rō si in regione media tertie quartæq; vertebriæ,  
persecuteris totam spinalem medullā, spīrationē  
cōfessum totum animal destituitur, nō solum tho-  
race, verum etiam infra sectionem toto corpore  
resoluit. Atqui perspicuum est, quod si post se-  
cundam aut primam vertebriam, aut in ipso spi-  
nalī medullæ principio sectionem ducas, repen-  
tē animal corrumperetur. Verū si post sextā ver-  
tebram, medullā spinā transversam totam secue-  
ris, vniuersū quidem thoracis musculi statim mo-  
tum amittent: solius autem diaphragmatis bene-  
ficio animans respirabit. At inferiores hac verte-  
bra sectione spinālī medullæ, permissis ipsius  
partibus thoracem moveri concedunt. Et quan-  
to magis ad humiliores vertebriæ scētio ipsa in-  
clinaverit, tanto plures thoracis musculos actio-  
nem obedientes habebis. Non tamen sexta ner-  
uorum à cerebro coniungitū, respiratiois muneri  
subministrare videtur: quia ne vel particula  
quæpiam ipsius in viliū thoracis musculū pro-  
pagatur. Quod verò ad pulmonum situm speciat,  
costa excisa, atque vni cum membrana quæ  
illam ambit, quæq; vniq; vocatur, ablata, suc-  
cingens costas simplex solūq; relinquitur, quæ  
adēo transparentem per se inspicionem effi-  
cit, vt omnes facili cernāt illos, pulmones dico,  
in vno animali esse thoracis coniunctos. At ma-  
nifestior adhuc sit speculatio \* per diaphragma

*Diaphragma-  
tu nervus vni-  
versum totus  
prestat.*

*Nervorum affe-  
ctus duplex.  
Medullæ nō ob-  
stant functionem,  
si capita  
eorum dissecantur.*

*Spinālī medul-  
læ scētio inter  
tertiā & quartā  
vertēbrā, spīrationē  
confessum destituit  
animal.*

*Sexta nervorū  
coniungitū  
medullæ partem  
len in aliquā  
thoracis mus-  
culum propa-  
gat.*

nudatum, ubi peritonæi vertex avellitur. Sic si-  
quidem admodum conspicua diaphragmatis ner-  
vosa pars redditur, ut omnes palam fateantur,  
pulmonem semper thoraci appositum esse, siue  
inspiret, siue etiam expiret animal. Ceterum vel  
si etiam id suffocaueris, pulmonem à sepro plu-  
rimum sesumctum videbis: nec secus à thoracis  
lateribus: unde liquet colligere, spiritum in ipso  
contentum, in regionem eius & thoracis mediū  
vacuari. Omnino siquidem in animalibus quo-  
modocunque extinctis, pulmo à thorace distare  
videtur: quod fieri non posset, nisi spiritus ali-  
quid per substantiam pulmonis transiens, in  
amplexum thoracis capacitatem transfret: id quod  
certè Erasistrati opinioni adversatur.

*Pulmo à thora-  
ce distare vidi-  
tur in animalis  
bus quomodocun-  
que extinctis.*

## GALENI PERGAMENI de anatomicis administrationibus, Liber IX.



Vonam pacto ea quæ in cerebro &  
spinali medulla per confectionem  
apparent, optimè quas intueri,  
tum mortuo, tum vivo adhuc ani-  
mante, hoc librò indicabimus. Quā  
autem anatomicæ quæ in cadaveribus celebratur, cuiusque  
particulæ naturæ & situm in dicitur, in vivo autem, in-  
terim functione ostendat, interim autem ad inven-  
tionem huius, ratiocinationes exhibeat, manife-  
stum vitæque est, mortui animantis confectionem  
præcedere eam oportere, quæ in vivo admini-  
stratur. Igitur omnibus caluarie exsepis, membra-  
nam quæ cerebrum in orbem contegit, quæ du-  
ra siue crassa appellatur, ad amissum inspicies,  
iuxta mediā ipsius longitudinem multo crassio-  
rem scipsum apparentē. Pari modo sub futura quæ  
à Græcorum literæ A similitudine appellatur lab-  
dowdes, crassam ipsam membranam, duplici stru-  
ctam plexu, cerebrumque aliquatenus ingredien-  
tem, serues. Venæ porro per ipsam utrinque singu-  
læ iuxta suturæ labdowdis latera excurrunt. Vbi  
verò hæc in eadem mutuo cohererint, altissimus is  
ferè est locus, eorum qui in orbem circumiacet:  
quam regionem Herophilus vocat leonem, à tor-  
cularis similitudine. Non autem æqualis ab ea  
tum prior, tum posterior cerebri pars existit, sed  
anterior est multo maior. Verum ad id quod cla-  
rissimum habetur, alter etiam crassæ membranæ  
implexus accedit, necnon tertia quedam alia ve-  
na, præter duas prædictas, ad longitudinem por-  
rigitur in anteriora excurrentes. In superficie ve-  
rò, alius venarum exitum, quæ leno incumbit,  
cogressus est, iuxta illam partē, ubi futura labdow-  
des omnibus squamatis cōnectitur. Quapropter  
venas has superficiares prius secabis ad leni vi-  
cū summittat. Dum autē fecas, primum vacua-  
bis, si grumus quipiam in ipsis coegerit: deinde  
internā membranæ superficiē intraberis, quomo-  
do sub illius speciem, etsi non tenuitatē, venis ha-  
beat simillimā. Inde tenues venas ab utraque leno  
rum partē orientes spectabis, nonnullas quidem  
admodum graciles, quasdam verò ampliores. Cer-  
nes autē has quidē à parva leno, quæ usque in superfi-  
cie est, in propinquas cerebri particulas superfi-  
carias disseminari: illas verò ab altitudine ma-

igna, tum in posteriorē totius cerebri partem, quæ  
à nonnullis cerebellū: siue parenccephalus dicitur,  
tum in priorē propagari regionē. Cerebello igitur  
venæ se inferentes, & ab his quæ per futura  
labdowdis latera in lenum perveniunt, & ab ipso  
leno exactam venæ tunicam habet. At in ipsam  
cerebrum, quod nonnulli anterioris cerebrum vo-  
cant, per crassam membranam, mediā exactē  
sitam, secantēque cerebrū in duas partes æqua-  
les, sanguis derivatur. Ceterum & hunc venæ frē  
quentes omnino per totam longitudinem, in v-  
triusque cerebri partem, sinistram & dextrā distri-  
buuntur, omnes tamen exiguæ, duabus tantum  
exceptis, una quidem ad lenum, in anteriora pe-  
nitius procedente, ad totius capitis longitudi-  
nem, altera verò multo maiore, neque propinqua  
admodum leni regioni, neque remota, sed in me-  
dio totius cerebri sita. Hæc venæ in alia declinā  
descendit, unde & multifariam propagatur. Spe-  
ctabis igitur omnia hæc, priusquam cerebrū ali-  
qua ex parte diuideris, in sola membrana crassa.  
Nudabis autem ipsam tribus in locis, quoniam  
& triplici plexu totius cerebri secut. Deinde  
iuxta sectiones tuas mer dignis attolles scōtum  
partē ipsius sinistram, atque scōtum dextrā, quib-  
us contegebatur anterioris cerebrum: scōtumque  
similiter reliquam, qua nimirum posterioris: omnes  
que venarū processus in tres totius cerebri par-  
tes disseminari conspicies, nonnullas quidem tū  
superficiares, ut ipsarum ramī in conspectum  
prodeant: quasdam verò altē penetrantes: om-  
niumque tenuem membranā, quam barbari piā  
matrem appellant, & quæ enumeratas venas  
colligat, & cerebro extrinsecus circumdat, cum  
venis ipsis in ventriculum illius descendentes.  
Hæc itaque secundam, qua involuitur factus ut  
ro, referens, cerebro semper, etiam in profundo,  
coheret: crassa verò, ab illo plurimum distat.  
Vbi ea fueris intuitus, quæ cerebrum ambiunt,  
ad opportunum iam erit cerebrum consecare, ana-  
tomē ipsius exoritur à meningē illa tenui, bi-  
sariam anteriorem partem secante. Unde abs-  
cis vel avulsis venarum exortibus, à priori as-  
piscatur termino, sursum tuis ipsius digitis illam  
attollito, donec ad grandem venam perveneris,  
ex ea procedentem, quam in penitiora declinens  
ferri stulimus: atque hic rursus in alium subla-  
tam alteri tenendam dabis: mox ipse iuxta lon-  
gitudinem dissolues, utraque cerebri partem à  
mutuo connexu leniter tuis secernens digitis,  
quovisque ad venam in lōgum inibi porrectam  
veneris, quam prius magnitudinis esse notandæ  
commemoravimus. Postquam verò declinem il-  
lam venam, de qua facta est mentio, videas; atque  
ipsius vsum simul inspiciedo \* cognovis, venā  
ipsam à subiectis corporibus adimes, regionem  
interim quā detexeris, diligenter inspiciens, quæ  
calli imaginem refert, ita ut naturalis quedam  
inibi concavitas esse videatur, quæ ex circumstā-  
tibus partibus portionem alimentum non integrè  
elaborat recipit. Ceterum leniter avellere per-  
gens, effigies etiam meatum renuim, qui ad  
medium usque perveniunt ventriculum cerebri,  
iuveneris. Notinam porro assequeris ventricu-  
lorum cerebri, callosam illam portionem con-  
spicatur,

*Parenccephalus.*

*Cerebri leno  
quæ  
insulat.*

*Meninges tres  
sunt, scilicet  
una in loca con-  
bram.*

*Meninges in-  
terioris cum ve-  
na penetrant  
ad ventriculos  
cerebri.*

*Constitutio ani-  
mantis mortui  
debet præcise  
esse illa, quæ ad-  
ministratur  
in vivo.  
Membranæ  
cerebri conside-  
ratis.*

*Leno.*

*Meninges por-  
tionem ad ven-  
triculos  
cerebri.*

spicatus, quæ manifestæ ad eod. differentiæ à diffec-  
tis cerebri particulis obtinet. Cernes autem in  
his etiam plexus, secundarum modo enforma-  
tos, cum quibus quidem ascendant rum arterig,  
tum venæ, atq; in varios ramos diffeminantur.  
Quare plexus hos inviolatos servare conabere-  
ris. In prima igitur vtriusq; ventriculi confectio-  
ne, plexuum difformium, atque ad eod. callosi cor-  
poris in cerebro aspectus, ubi index fuerit. Mox  
verò corpus illud, quod dextrū ventriculū cere-  
bri à sinistro dispescit, inspicito: quod eandē cum  
roto cerebro subitantiā possidet. Atq; hoc etiam  
facile abruptum, si vehementer extendatur. At  
si hinc quoque totum ipsum simul cum vnitis  
particulis auferas, & ventriculi eius dentis, & ve-  
næ declivis circa corpus quoddam turbatum  
discindi apparebit. Cuius venæ propagines, te-  
nues quædam membrana, quemadmodum alias  
omnes venas, connectit: quæ à membrana subti-  
li, nec substantia, nec connuitate evariat. Atq;  
huius membranæ interventu, corpus illud turbi-  
natum, cui venæ incumbunt, absconditur: neq;  
fieri potest ut prius ipsum videas, quā mem-  
branas aliquatenus divulseris. Quod si à basi il-  
lius propter verticem lineam rectam duxeris, ac  
postea vtriusq; tunicam incisam detraheris, facile  
corpus ipsum detexeris. His peractis sic, iam li-  
cet antequam mediam turbina & ventriculorū  
sedem detexeris, vtriusq; venas considerare cum  
plexu ipso, circa turbina rum tendentes. Siqui-  
dem ubi corpus inter mediu detexeris, manife-  
stus illinc ipsas prode confidescit. Contegitur au-  
tem ab illo corpore, præter iam dictos, quidam  
alius tertius ventriculus cerebri. Itaq; illi positi-  
simū locis ipsum nudabis, per quæ venæ, tan-  
quā foramina quædā irruentes priorib; ven-  
triculis incidit: nam mediam regio simul cum an-  
terioribus patebit ad ipsa foramina. Vocatur  
porro illud corpus *taxadaphis*, qd fornici singu-  
litudinem. Quod si ipsum defeces, callus occur-  
ret ibi, ut in ventriculis anterioribus. Ad basim  
ipsum affirmate sunt venæ, quæ concautem  
fornici permeant, Extrinsecus siquidem gibbū  
habetur, intrinsecus autem cauum, quemadmo-  
dū fastigiu fornici. Ceterum si perpendas quo-  
modo in animali vivente omnes crassæ membra-  
næ partes, calvaria adhæreat: cerebro autem  
sola, quæ ad ipsum implexus est: credes vtrig ver-  
ticem cameræ, siue fornici, sursum versus ten-  
sum servari, ventriculum sub se magnum effici-  
entem. Sic autem quā priores etiam ventricu-  
li grandiores existant, totum septi caput in subli-  
me simul cum continuis corporibus attolli ne-  
cessē est. Ex quo igitur corpora quæ superiacent  
sublimia & suspensa sunt, latam intus trium ven-  
triculorum capacitatē efficiunt, quam in confec-  
tione percire necesse est, corporibus quæ su-  
perstrata sunt delatētib; insuper meatus quida-  
m maximus tertij huius ventriculi basi subla-  
cet, qui ex prioribus superfluitates recipit, nec  
non ex suprapositis paribus. Omnibus igitur  
quæ hic proposita sunt particulis probe dete-  
ctis, tertium videbis ventriculū, inter duos prio-  
res, & quartum posteriorē, mediū. Etenim me-  
dium cui pars turbinata insidet, ad mediū ventri-

culum pertingent cernes, ut foramina haud ex-  
igua duo videantur, vnum ad cerebellum, alter-  
rum ad medium ventriculum pertinens. At præ-  
dictus meatus, qui ex medio ventriculo ad po-  
steriorem pertinet, inter carunculas quādam,  
nates & testes cognominatas, quæ cerebri par-  
tes sunt, consistit, peculiari velatus tunica, qualis  
nimirū est tenuis membrana cerebri. Quinetiam  
alia particula cerebri tali meatui incumbit, eūq;  
contegit, quæ ob similitudinem quam habet cū  
verme, ex cretēna vermicularis vocatur. Cuius  
duplex spectabis extremum: alterum in priori  
parte corpori turbato exporctum: alterum  
retro, ali elatiore cerebelli parte occultatū: quo  
quidem ad anteriora reflexo, nudari prorsus cō-  
ngit quartum vltimūq; ventriculum cerebri.

Nates cerebri,

Vermicularis  
excretoria  
cerebri.

## GAL. ENI PERGAMENI de Vsu partium corporis humani Libri I.



Orpora quæ nec vndequeque pro-  
pria habent circumscriptionem,  
nec vndequeque conuncta sunt a-  
liis, ea omnia particule vocantur.  
Quod quidem si verū sit, multæ erunt animalū  
particulæ, aliæ sanè maiores, sicut & aliæ mino-  
res, atq; aliæ etiam omnino in aliā specie indivisibi-  
les. Vnde adhuc omnes ipsi animæ sunt, quippe  
cuius organum corpus existit: & propterea mul-  
tum differunt à se invicem animalium particu-  
læ, quoniam & ipse animæ. Omnibus verò ap-  
tūm est corpus animæ moribus & facultatibus.  
Equo siquidem fortibus vngulis & iuba est mu-  
nitum: etenim velox, superbum, ac generosum  
est animal. Leoni autem, ut pote animoso & fe-  
roci, dentibus & vngulibus validum. At ceruo  
& lepori, animalibus timidis, velox quidem est  
corpus, sed nudum omnino, & inerme. Timidis  
quippe, velocitas: arma verò audacia bus expe-  
diebant. Neque igitur timidum aliquod arma-  
uit natura, neq; audax quidpiam nudum desti-  
tuit. Homini autem (sapientem enim hoc animal  
est, & solum inter terrestria omnia diuinum) pro  
omnibus simul defensoris armis, manus largita  
est, instrumentum ad omnes quidem artes per-  
necessarium: paci verò, non minus quam bello,  
idoneum. Non igitur in digni cornu, aut vin-  
gula sibi innata, quum meliora illis arma, quan-  
documq; volet, manibus possit accipere. Sed ve-  
locior est homine leo. Quid hoc rādem est? Ho-  
mo sanè equum domuit sapientiā & manibus,  
velocius leone animal: quo utens, & subterfu-  
git & leonem persequitur. Quin & sedens ex al-  
to, humilem illum percutit. Non igitur est nu-  
dus, neq; inermis, neq; facilis vulnerari, neq; cal-  
ciamentorum expertus homo, quum & thoracem  
ferreum, & multiplicem cūm armorum, tum e-  
tiam calceamentorum atq; operimentorū species,  
inter quæ sunt domus, turris, & murus, sua sibi  
parare possit industria. Si autem innatū ei esset  
cornu in manibus, minime posset eis vii ad earū  
rerum omnium compositionē. Iisdem manibus  
homo vestem, rete, nassam, velum, & faginem

Particula.

Animæ organū  
est illud corpus.  
Moribus ani-  
mæ est aptum  
corpus, in con-  
suetudine.  
Eque natura.

Leoni natura.

Timidis expor-  
ctum velocita-  
tem,  
audacibus expor-  
ctum arma.  
Homo sapiens  
animal, & solum  
inter terrestria  
diuinum.  
Manus homi-  
ni tributa esse  
a natura, pro  
omnibus simul  
defensoris ar-  
mīs.Equus velocior  
leone,  
Hominis prorsus  
acrius.Ventriculus de-  
xter atque sinis-  
ter cerebri.Ventriculus ce-  
rebrī tertius.Ventriculus ce-  
rebrī quartus.Crassæ membra-  
næ partes om-  
nes adhæ-  
rent calvaria,  
nec animalis ve-  
mentis.Ventriculus an-  
terior cerebri  
si grandior.Ventriculus ce-  
rebrī tertius.Tertium vtri-  
usq; cerebri  
nates sunt et  
testes, et  
quartum poste-  
riorum, mediū.

contextu. Quare nō solum iis quæ in terra sunt animalibus, sed etiam quæ in mari & aëre, dominatur. Ac talia quidem homini ad formidinem arma sunt manus. Aramen pacificum & politicum animal homo, manibus & leges scripsit, & aras, & simulachra Diis erexit, & vniuersa artium instrumenta construxit, commentariosque etiam speculationis eorum scriptos reliquit. • Vt autem sapientissimum omnium animalium est homo, sic manus sunt organa sapienti animali convenientissima. Non enim quia manus habuit, propterea est sapientissimum: sed quia sapientissimum erat, propter hoc manus habuit. Non siquidem manus ipsæ hominem artes docuerunt, sed ratio. Manus quippe ipsæ sunt artium organa, sicuti lyra mulici, & forceps fabri. Virgitur lyra non docuit musicū, nec forceps fabrum, sed est uterque ipsorum artifex, per eam, quæ prædictus est, rationem: agere autem nō potest ex arte absque organis: ita & vnaquælibet anima, facultates quasdam à sua ipsius substantia obtinet, effi-

Manus esse organa sapienti animali convenientissima.

Manus esse artium organa.

Animam habere facultates quasdam à sua ipsius substantia, non posse tam optime fieri organa. Particula non impeditur animam ad agendum.

Animalia praefectio sua anima facilius absque facultatibus, non potest. Animalium natura à nullo sunt destituta. Animalia cetera natura potius quam ratione sunt destituta. Vt enim si corpus nudum, sic anima artibus destituta habet.

Manum esse organum ante rationem. Rationem esse artium antea habere.

Apprehensio organum optime constituitur, primum si caput quodlibet.

Nam si indiuisa mansisset, contingere tantummodo sibi æqualem corporis cuique ad motum magnitudinem posset. At in multis partes diuisa, moles sepius multo maiores faciliè amplectitur, & minimas quasque res exactè etiam venatur, colligit. Quum autem eadè circum corpus sphaericum posuit in orbem contrarii, rectum autem & cauum fideliter etiam amplecti, manifestè vti que omnem comprehendit figuram: quæ nimirum omnis ex tribus lineis constat, aut curua, aut caua, aut recta. Ceterum quoniam corpora non pauca maiori mole sunt prædita, quàm quæ manu vna comprehendere queat, adiutricem alteram, alteram naturam æqualem manum adiunxit, ut ambæ ex oppositis partibus ea corpora complectentes, vna manu maxima nihil sint in feriores. Nec verò ad firmiter comprehendendum far erat manus esse diuisam, nisi etiam digitus vnus, alius quatuor oppositus fuisset, ut cum eis actionem ipsam absolueret: quum nimirum aut vndeque circulo, aut omnino ex duobus locis contrarius integra fiat comprehensio. Quinetiam digitos ipsos tum molles, tum rotundos, tum vnguibus iuxta summitatem munitos \* esse expeditabat, si ad omnem corporum magnitudinem & consistentiam firmiter comprehendendum erant futuri ex visu. Etenim qui immo dicē prolixū sunt vngues, ac propterea multo se se supergrediuntur, tamen ad excoriationem, & auradendū sunt viles, minuta tamen corpora ægrè apprehendere possunt. Qui verò propter paruitatem ad fines vique digitorum non extenduntur, naturam carneam firmitate priuantes, eam ad apprehendendum admodum invalidam reddunt. Qui autem summitatibus digitorum æquantur, si omnium solius utilitatem quæ gratia sunt conditi, perfectissimè complent. [Pulchrè igitur monet Hippocrates (sententia cuius nobis est diuinum oraculum) particulas corporum vniuersas sibi invicem consentire, hoc est, conspirare in ministerium vnus operanonis. Manifestum nanque est, manūs apprehensionis grana constructas esse. Quod verò omnes earum particule & tales & tantæ sint, ut in vnā organa totius actionem conspiciant, hoc nondum omnes cognoscunt. Porro ipsa particularum constructio, earum actionibus iuncta, optimè habitudinis, vterque pulchritudinis discernendæ regulam, mensuram, iudiciūque præstat. Vera siquidem pulchritudo, aliud est nihil quàm confusio optima, quæ actionibus exploratur: non albedine, non mollietate, vel id genus aliis, per quæ nec nana, nec vera, sed fucata pulchritudo ostentatur. Deinceps itaq; omnē manus fabricam persequamur: quæ tunc corporibus insunt obiter distinguunt. Insunt autē primū & maximè temperamenta: quippe quæ propriis particularū substantiam complent. Nam singulis id esse quod sunt, ob quatuor qualitatū primarum certam quandam temperiem contingit. Hæc igitur res secundum substantiæ rationem insunt. Consequuntur autem necessarij odores, sapor, color, dunties, atque mollietates. Alia verò necessarij accidunt, ut positio, magnitudo, connexio, confirmatioq.

Manus omnium comprehendit figuram. Figuræ omnium consistit ex linea curva, aut caua, aut recta.

Manus cor bini.

Pulchrè expedit ut quatuor reliquis digitis. Comprehensio vniuersa quomodo fiat.

Vtque apertis ad apprehendendum, debent fieri mutationes digitorum.

Particula vniuersa sibi invicem consentire.

Manus apprehendere gratia tendit.

Pulchritudo vera est confusio optima, quæ actionibus exploratur.

Temperamentum complent particulari substantiam. Essentiam singulis à temperie quatuor qualitatū primarum accidunt.

*Actio omnis  
magis ex par-  
te à propria or-  
gani substantia  
procedit.*

*Manus actio  
est apprehensio.*

*Motus volun-  
tarius amari à mu-  
sculis sunt.*

*Vagum op-  
us gratia eius  
quod nullus  
est, conditum.  
Vagus cur me  
ducatur datur.*

*Vagus retrah-  
it facti similitu-  
dinem gratia.  
Vagus in so-  
la rotunda pa-  
tenti acri.  
Vagus cur sic  
augentur.*

*Vagus an-  
gustia in len-  
gum tantum.  
Ostium genus  
in digito. gra-  
tia eius quod  
necesse est.*

*Digitorum sen-  
sus est ex tri-  
bus ossibus eius  
factus.*

*Figurarum co-  
mplexio digito seu  
voluntatis dis-  
tinctio circa  
vsum apprehen-  
sionem.*

matione. Ceterum maiori ex parte omnis actio à propria organi substantia procedit, licet interdum fiat propter aliquod consequentium, ut visio propter colorem. Debet autem ipsa actio esse in proposita indagatione, principii simul inquisitionis, & inventorum examen. Quoniam igitur actio quidem manus est apprehensio, apprehendere aut nihil possit ipsa immobilis permanens, & utque præcipua ipsi actionis pars ea erit, per quam movebitur. Quum autem omnes voluntarii motus, quales manus sunt, à musculis fiant, hi vique, primum motionis organum manus erant: alia vero vniuersa, hæc quidem, ut melius actio fieret: alia, ut sine quibus fieri non poterat: sicuti & alia, pro custodia omnium horum condita sunt. Ac genus quidem vnguium, gratia eius quod est melius, videtur factum: quibus illis manus apprehendere possent, at non æque feliciter. Eorum autem securitatis natura prospiciens, medio ceteris ipsos duros efficit, ut neque utilitati, cuius gratia facti sunt, quicquam decederet, neque ipsi facile paterentur. Omnes siquidem animalium particulas prominentes & nudas, ex tali substantia creauit, qualis neque quasiari facile propter mollitiem, nec rumpi propter siccitatem possit. Enim securitatis gratia rotundi constructi sunt vngues. Sola quippe figurarum rotunda ad vix patiendū exquisitè comparata est, ut quæ nullum expositum angulum frangi potentem habeat. Sed quoniam scalpando, vel aliud quodvis vnguebus agendo, exteri debebant nobis eorum extremitates, solas has animalis particulas ita construxit natura, ut semper augeri possint, quatinus iam totum corpus augeri desierit. Augentur autem, pilorum instar, in longum tantum, subnascentes aliis semper vnguibz nouis, & veteres propellentibus. Ossium vero genus in digitis, quod & hoc ipsi gratia eius quod est melius, factum sit, hinc discas licet, quod moueri quidem multiformiter inesse eis, vel sine ossibus, sicuti polydodibus: firmitatem autem in actionibus nunquam habemus, carentes dura & obfistente particula: & quod incit propter morbum tremantibus, id nobis inesse semper natura. Ad hæc, si sine ossibus facti essent digni, illas actiones solas probè perficerent, in quibus eos circulo implicari oporteret, circa comprehensibile. Si autè vnicum eos haberent, illis actionibus solis rectè seruirent, in quibus eis egeremus extensis. Quia vero nec sine ossibus, nec ex vno solo creati sunt, sed ex tribus inuicem per singulos connexis articulos vnusquisque est factus, ob id saue ad omnem actionem promptissime figurantur. Plerumque enim quum neque omnibus extensis, neque omnibus curuatis egeamus, aliquando quidem primum solum, vel secundum, vel tertium articulum: aliquando autem, vel primum simul & secundum, vel secundum & tertium, vel primum simul & tertium extendentes aut flectentes, hoc modo sex figurarū vniuersales differentias exprimus: particulares aut secundum magnitudinem & minus, innumeramus. Est autem mollitia carnis generationem natura, nō quidem in externa digitorum regione, quod illic esset futura oneri,

sed sub internis partibus, ut quum eius consistentia sit mollis, & occurrantibus cedat leuiter, ossium rectitudinem corrigat, quando est aliquid circulo comprehensura. Proinde in articulis quidem perpaucam, plurimam in partibus inter articulos mediis carnem produxit. At lateribus digitorū, tantum carnis adnasci fecit, quanta medium inibi spatium repletura erat. Hæc igitur tot & talia commoda, manus à carne obtinet: præterea etiam, ut fricat, & molliat, quæcūque moderate in mollibus instrumentis egent, quæ in omnibus artibus plurima existit. Proprie igitur hæc sunt carnis manus utilitates. Communis autem utilitas, quod veluti propugnaculum quoddam & tegmen sit, aduersus omnes ram frigidas, quum calidas iniurias extrinsecas, calidam in se quandam humiditatem possidens eaque vtrique intemperantia resistens, ut balneis. Si quidem nihil inuenias quod valido assu occu-  
patos præsentius refrigerare, aut rigentes frigore, promptius calefacere queat, quam balneum. Quum enim natura humidum sit, & moderatè calidum, humiditate quidem, natam ex calore siccitatem irrigat: caliditate vero, ortam ex gelu frigiditatem persanat. Quum igitur omnium digitorum actiones, per ossa tria compleantur, quæ sunt sanè quod nec pauciora, nec plura tribus illa fieri expediebat: quando si plura essent, minus firmam extensionem præstarent: sicuti si pauciora, tam diuersas particulares figuras digiti non haberent. Manifestum præterea est, possitatum os minus esse debere, quum prælocatum, à quo vique vehitur: & quod in valde paruum atque rotundum definire digitorum summitates oportuit, ossium magnitudine decrecente paulatim, ad optimè apprehendendum. Quod autem vnusquodque os extrinsecus quidè exactè convexum sit, intus verò & in lateribus non exactè, id melioris gratia factū existimo. Internis siquidem partibus suis ipsi digiti molliuntur & retum, ac breuiter omnia accipiunt: quæ quidem detentæ fierent, si ossa inibi convexa fuissent. Externis verò, quum nihil agant, reliquum fuit ut ad solam patiendi difficultatem exquisitè constructi essent. At in lateribus, ut nullum in medio spatium vacuum, dum adducuntur, relinquerebatur, hæc parte eos minime curuos fieri expediebat. Quare merito magnus digitus supernam, si cum & paruis inferna circumfrentiis exactè convexam obinet, quum ab hac parte acuter illorum aut ab aliquo custodiri, aut alteri adiungi debeat. Sed neque simpliciter, neque à casu aut temere, ex tribus ossibus vnusquisque digitorum est factus: sed veluti anarum cardines, ita & articulorum vnusquisque eminentiam cauitati appositè immisit, & æqualem sortitus est. Quas quidem cauitates ossium, quasi suspensilia eminentia circulo ambiunt: ad maximam firmitudinem articulorum, ne aliquando excidant. Ad facilitatē autem motionis, atque ossium securitatem, auxilium duplex exogigant natura: vnum quidem, cartilagineo os vtrunque subvngens, obliuiscens: alterum verò, ipsius cartilaginibus humorem vntuosum & viscosum, veluti oleum quoddam, suffundens, per quem facile mobilis, & attri-

*Caro cur subit  
in interna digi-  
torum regione,  
minime autem  
externa.*

*Saluti vsu.*

*Digitorum om-  
nium actiones  
per tria ossa ad-  
pluri.*

*Os postlocatū  
preloso mi-  
nus esse debere.*

*Digitorū ossa  
cur cōvexa quā  
di extrinsecus,  
intus verò ne-  
quaquam, sicut  
in nos in lateri-  
bus.*

*Ossium firmitas  
raus digitus.*

*Supercilia em-  
bientia cauita-  
tes ossium qua-  
bus coluntur.*

*Nationi arri-  
bus in digi-  
tis auxiliū dis-  
plic.*

Ligamenta articu-  
lorum sunt talia.

Labia ossium  
in digitis.

Digitorum ossa  
qualia, et quae  
sunt talia.

Nervi principii  
cervicis, et  
cor, et  
arteriarum prin-  
cipium.

Nervi  
voluntarii  
motus.

Ligamentum ab  
ossibus transire  
in articulum, insin-  
abile penitus,  
nec posse quic-  
quam moveri.

Extremo arti-  
culi sit ab ex-  
terno tendone.

Pollicis tendone  
in articulo.

tu cōtūmax omnia articulationis ossium est facta. Vt verò longe adhaerentius articulus omnis in-  
conculsus custodiretur, ligamenta quaedam ex-  
vtriusq; ossis produxit, ab vno videlicet in alterū  
pervenientia: maxima quidem crassissimāq; ad  
principios articulos continendos: minora verò,  
ad minores. Ceterū labia ossium, extrinsecus  
quidem maiora sunt, intrinsecus verò minora,  
tum propter firmitudinem extensionis, tum pro-  
pter flexionis diuersitatem. Sunt autem dura, den-  
sa, medullarū expertia digitorū ossa: quia nuda  
sunt omnia, & propterea facile patibilia. Nō po-  
test tamen recte inueniri vtilitas parvis, antequā  
eius actio noscatur. Quod igitur principii ner-  
uorum omnium cerebrum sit, atq; spinalis me-  
dulla: & quod ipsius rursus spinalis medullae cer-  
ebrum, arteriarū verò omnium cor, vti hepae venarū:  
et quod nervi quidem a cerebro anima-  
lem virtutem, arteriae autem a corde polsatilem,  
sicuti venae ab hepate vegetatiuam accipiunt, de-  
monstratum alibi a nobis est. Erit itaq; vñs quē  
praestant nervi, facultates sensus & motus a prin-  
cipio in partes deducere. Arteriarum autem, cu-  
sio dire a naturalem caliditatem, & nutre ani-  
malem spiritum. Sanguinis autem generandi, si  
mul & in omnes partes ferendi gratia, factae sunt  
venae. Quum igitur digitorū ossa ex se moueri  
motu voluntario non possent, natura ex cubiti  
musculis productos tendones, secundum recti-  
tudinem digitorum deduxit, eosq; inseruit in ar-  
ticulos singulos, hoc est, in caput secundū ossis,  
quod nimirū mouendū erat. Quorū generatio  
tendonū, ex nervis & ligamentis in musculis di-  
spersis, rursusq; invicē cōiunctis, est. Sentiant  
itaq; & mouentur motu voluntario tendones,  
ratione nervorum ex quibus constant: colligant  
autem musculi ossibus, ob ligamenta quae in  
se recipiunt. At ligamentum ipsum album, exan-  
gue, & cōcauitatis expertum quum sit, nervus esse  
videtur. Verum nou est natum ex cerebro, ne-  
que a spinali medulla, sed ex ossibus ad ossa trā-  
sit, nervusq; multo durius, ac penitus insensibile  
est, nec mouere quicquam potest. Ossa igitur om-  
nia quae sublocantur, circa praelocatum sibi sp-  
is os immotum manens, mota, extendūtur quidē,  
quando exterior trahit tendo: flectiūtur autē,  
quādo interior. Ne verò per longam viam  
& nudam carne, facile colliderentur tendones,  
membranis vestiti illos natura, eosq; a muscu-  
lis vsque ad articulos, vt patenter agrius, ex  
visque rotundos creauit. Nam quā applicantur,  
ibi vñsq; ipsi fori: inditur, vt facilius mo-  
ueatur, trahens apprehensionibus pluribus. Sed  
quoniam quatuor motibus, vñsq; digito-  
rum moueri debebat, vno quidē, flexis, alio verò  
extensis, duobus item ad latera: quadrisia-  
m illis applicantur tendones, orti partim a cu-  
biti musculis, internis quidem flectentibus, exter-  
nis verò extendentes, mouentibus autem ad la-  
tera, deducentes ad paruum digitum: partim a  
paruis in manum musculis, qui reliquum ex obli-  
quo motum, pollicem versus operantur. Atq; is  
sanē maximus digitorū, internum quidem ha-  
bet vñm tenue tendone, duos verò externos,  
eosq; robustos admodum: at ex lateribus, parte

quidem quae est versus indicem, paruum & te-  
nuem habet musculū: altera verò parte, vbi ma-  
nus affurgit, hoc multo maiorē. Reliqui omnes  
quatuor digiti, intrus quidē duos tendones ma-  
gnos, foris verò vñm fortius, alteri illorū,  
scilicet minori, aequalem: tenuiorem autem hoc,  
eum qui ad latera exteriorū partium peruenire  
liquum verò omnium tenuissimū ad latera par-  
tium interiorum atinentem. Ac sic quidem re-  
ctē natura, molem ipsorum tendonum, actiōnis  
& vñitatis excellentiae respondentem construxit.  
Quum enim quatuor digiti flexus plurimas  
& vehementissimas actiones obeamus, nō ma-  
gnos tantum ipsos tendones internos, sed etiam  
duplices erat nobis opus habere. Contrā res ha-  
bet in magno digito. Ad nullū enim aliam actiō-  
nem nobis flectendus est, nisi quando alius tam  
curuatus illum desuper iniicere oportet. Quia ve-  
rō primus eius articulus otiosus est, ad eum nul-  
lus in interna parte tendo applicatur, sed ad secun-  
dum & tertium duntaxat eius articulum, vñus  
exiguus peruenit. Porro duo illi tendones qui  
extrinsecus apparent in magno digito, si ambo  
quidē tendantur, digitū tendunt exactē: si verò  
alter eorum, partem alterā sibi proximā ad latera  
trahit. Atq; actionem quidem tendonis ad indi-  
cem perducentes, musculi parui suscipiunt, ad  
hoc ibi locatus. Contrarium verò, magnus, qui  
in palmæ alion parte, quam thenar vocant, con-  
sistit. Atq; vñsq; tendo ad suum caput tra-  
here particulam natas est, quae a seipso mouetur.  
Tendo igitur qui magnum flectit digitum, ab ea  
denervationis, quae in carpo est, parte, ducit ori-  
ginem, a qua nimirum oritur etiam qui ad me-  
dium peruenit digitum. Oritur enim super hanc  
multo spatio, & colligatus membranis fortibus,  
tum primū decedens recedit ab eo, quum ad  
manus cauitatem accessit, modo per similes iugo-  
rum habentis, quae per aliquos annulos super iu-  
gum locatē excedunt. Et quemadmodū exte-  
rior tendonum illi quidem qui ad alios digitos  
pertinent, in superficie locantur, subiacent verò  
ipsi qui ad magnū spectant, sic & conuerso, qui  
interni ad digitos quatuor perueniunt, per pro-  
funditatem manus feruntur: superuehiunt au-  
tem qui ad magnum deferuntur digitum. Semper  
enim natura, in profundo quidem id quod pre-  
cipuum est, in superficie verò id quod non est  
principium, collocat. Porro musculorum dener-  
uationes apparent duplices, quo maxime loco  
ipsum carpum flectimus, sibi invicem superposi-  
tae: maior quidem ea, quae est in profundo: mi-  
nor autem quae in superficie: idq; diuisa planē ea  
quae subiacet quidem, in quib; tendones: quae  
verò supergreditur, in quatuor: & omniū sp-  
is recti per latis ad digitos, superuehiunt quidē  
minores maioribus, membranis verò for-  
tibus quae libet quatuor coniugationum per to-  
tam viam munitur. Quando autem descende-  
runt ad primos digitorum articulos, ibi quisque  
subiacentium tendonum diffusus, caput primae  
acne flectit, per ambicū cum membranoso li-  
gamentum. Reliqui verò omne in vnaquaq; coniu-  
gatione fertur vterius, secundum viam a prin-  
cipio capta, rectā ad digitorū extremitates. Vbi  
verò

Digitorum vñi  
tendone.

Pollicis tendo  
in carpo magno  
duplicesq; ten-  
dones sunt.

Pollicis tendo  
in carpo talis.

Thenar.

Natura prae-  
dentia.

Maximū de  
nervatione de  
plici.

Tendonum in  
articulo digi-  
torum inferio-  
ri talis.



verò ad secundos articulos pervenerunt, ibi rursum tendo superiorem bifariam diuisus, & vtrique parte ampliflima circa subiectum tendonem involutus, in ternis partibus capitis secundæ aciei inseritur. At ille qui subdatus est, solus iode ad tertiam articulationem ascendens, ad caput tertij & vltimi osis digitorum, enam ipse implantatur. Flechitur quidem vnusquisque qui iuxta ipsos est articulus à dictis tendonum implantationibus: extenditur autē ab externis carpi tendonibus. Sed tendones interim, qui per profundum feruntur, primū & tertium articulum vnusquisque quatuor digitorum mouent. Qui autem per superficiem, hoc est, exiui, ad vnum, nempe medium, implantantur diuixat. Quia verò nulla caro ex se ipsa sensum habet, & absurdum erat apprehensorem organum insensū tegi particula, non partem nervorū portionem in carnes manuum natura diffeminauit. Ex quibus sic factis musculis, produxit tendines, lateralibusque vnusquisque digiti partibus eos implantauit: dextre quidem manus, his partibus quę versūs sinistram; sinistrę verò, eis quę versūs dextram sunt sitę. Reliquos verò tendones, qui ad laterale vnusquisque digiti partem perveniunt, ad cubiti musculi generauit. Ceterum oriuntur ipsi tendones ab eodē principio, quod iuxta carpi est, omnes: feruntur autem ad digitos secundum rectas lineas, æquales angulos ad caput ipsum efficiunt. Quare principij ipsum, summities tendonum flecti ad seipsum cogit. Nam si cessantibus moribus his qui sunt ad latera, potius extenderis, vel flexeris digitos, extendente quidē te, distabant. flectente autē, in idem mutuo coibit. Ad hæc, tensos eos coniungere possumus, si dextri quidē digitorū eum, qui est in lateribus, sinistrū tendonē, sinistri verò, dextrū tendamus. Rursus plurius à se inuicē abducemus, si ipsius quidem dextri, dextrum, sinistri verò sinistrum similiter distenderimus. Si vero neutro laterali tendonum agamus, sed externis tantum, mediam prædictarum continuationē habebūt digiti. Enimvero in vnoquoque articulo, vnica quidem nobis figura est iodoless, media videlicet: alia verò omnes vtriusque doleat, sed magis quę longius à media recedit. Omnino autē dolorificę sunt extremę figurę, post quas nimirū nec flectere, nec extendere licet. Merito igitur inter omnes figuras ea est maximē dolorifica, quā dux quidē motus oppositus, perfectā extensione cruciatur. Si guram verò mediam vtriusque circumstantes operantur, aut ambo musculi, aut alter omnino: potest tamen aliquando in ipsa ocuter eorum operari. Ceterum pariorū tendonum motus non poterit vnquā magnis agentibus apparere. Nulla autem ex parte offenditur digitorum flexio aut extensio, etiam si abdicantur laterales tendones: quorum is quidem imbecillior est, qui est interior: vtriusque autem operatur tensus digiti, quicquid verò flexus. Quum autem in vtriusque manus digitis articuli triginta habeatur, quorū vnusquisque in locis quatuor implantationes tendonū habet, præter primū magni digiti articulum, qui secundū quidē latera, extrinsecusque ap-

plicationes tendonū recipit, intus verò nullam erunt vtriusque omnes applicationes ad digitos pertinentes centum & duodeviginti. Porro similes, vtpote secundum animam animali ridiculo, ridiculū quoque corpus natura tribuit: id quod maxime licet cernere in formatione pollicis, qui & parvus & ridiculus est, parimque ab indice distans. Quod autē si pauciores digiti essent, multæ aciones imperfectæ absolverentur: pluribus autē ad nullam rem indigeamus, id ad eodē perspicuum est, vt demonstrari non debeat. Quare pulcrē quidem natura quinq; in vtrique manu digitos fabricet: quæ vt est ne quid deficiat sollicita, ita nihil frustra operatur. Cur autem inæquales digiti omnes sunt facti, atq; medius omnium longissimus? Sanē quod eorum summities ad æqualitatem venire melius erat, quum magnas aliquas moles in circuitu comprehendunt, & quū in seipsis limumidum vel paruum corpus continere conantur: ad quod quidem inæqualitas digitorum vtilitatem præstat manifestissimam.

### GALENI PERGAMENTI de vsu partium lib. II.

VNumquemque autem musculum, ex his qui radium & cubitum circulo comprehendunt, adeo adornauit natura, vt ne constructio quidem melior illa posset excogitari. Porro musculorum omnium cubiti & manus numerus, ad vixit tres perueit. Septem namque parui sunt in manu: alij totidem magni totam interiorem regionē cubiti, vt reliqui no uem totam exteriorem occupauerūt. Parui itaque manus extremæ musculi, duces sunt alterius obliquorum motuum. Eorum autem qui sunt intra cubitum, duo quidem maximi, digitos flectunt: magnitudine autem lioc secundi, duo etiam numero, totum carpi: obliqui verò duo, primū quidem radium, cum eo autem & totam manum, ad pronam figuram circumagunt. Reliqui eorum septimus, qui minimus est eorum qui in longum extenti sunt, nullum digitem mouet, sed alterius vilitatis graui factus, est, quam procedente sermone enarrabo. Ex his verò nouem musculis qui in cubiti exteriora parte consistunt, vnus quidem digitos omnes, præterquam magnū, extendit, duo autem alij eodē quatuor digitos ad transuersum abducunt. At quartus alius musculi, solum magnū digitem mouet, altero motu exteriorum duorū, scilicet obliquorum: alius item vnos reliquum magni digiti motum præstat, moderatēque carpi motum extendit. Fortiter autem lioc circa carpi emittunt alij duo musculi: reliqui verò duo conuentes ad figuram supinam radium, cum eo & totam manum, ad eandem ducunt figuram. Ceterum in tres magnas partes tota manus diuiditur: quarum vna brachium, alia cubitus siue vlna, tertia appellatur extrema manus. Sed de brachio quidem nunc sermo non est futurus. Cubitus dicitur totum membrum, quod est inter struculationem carpi & anteoum medium. Antea autē est pars illa cui manus nunc, & quam etiā totus nomine, appellant cubitum.

Implantationes tendonū ad digiti partem et duodeviginti. Similium radii cubiti coram tributus

Naturam nihil frustra operari. Digitorū inæqualitas ad quod tendens est.

Maximi cubiti & manus magni m.

Musculi manu am vsq; Muscularum cubiti vsq;

Manus totius diuisio. Brachium. Cubitus. Extrema manus.

Antea.



Cæterum osium cubiti, alterū quidem maius, cuius pars est ancon, specialius vocatur cubitus, quod in media manus figura, osi alteri, nempe

*Radius.*

*Processus cubiti.*

*Digitorum singulorum proprium adesse musculos.*

*Manus musculi septem.*

*Tangendi vim in manu a quo perficiatur tendere.*

*Carpi musculi, nec quot, & a quibus proficiscuntur.*

radio, subiacet. Cubbi vero processus osium radii & cubiti, qui carpo inferuntur, vocatur quidē & id ipsum quod fuit, processus, & interdū capitula, & tubercula. Vnicuique igitur digitorū proprius vnus parvus musculus inest: duo autē alij maximi in manu thenara generāt, per quorum carnosa pars manus altera, media vero caua efficitur: tum digitorum vterque maximus & minimus, plurimū abducuntur ab alijs. Qui autē inter magnū & indicē cōstitit musculus, eam partē replet, pollicemque adducit ad indicē. Inferuntur ramē in ipsum pollicē alij fortiores tendones, a musculis vlnæ producti. Quare quū quatuor quidē sint qui quatuor digitis infunt, duo autē circa magnū, alius verō vnus ad parvū digitū, rationabiliter omnes manus musculi septē sunt facti, a quorū singulis haud ab re vnicus est tendo productus. Iam verō duo illi musculi, qui intra cubitū sin, ipsos digitos flectunt, mediā exquisitē regionem obtinent: quoniam & capita tendonū flectentiū digitorū, ad mediā regionē pervenire erat melius. Vtriusque verō vnus est flectēs carpi. Alij autē duo intrinsecus in vlna consistūt, eam ad obliquū ducentes. Reliqui extensorū secundū longū muscularū intra vlnā, tenuissimos omnēs, in superficie consistūt, a quo quidem vnus tendo productus, sub interna cute manus disseminatur, nullū quidem articulum mouens, sed ipsam perficiens tangendi vim, quæ ad apprehensionem requiritur. Exteriori verō cubi musculorum, qui quidem extendit quatuor digitos, in superficie sub ipsa cute locatus est, mediā maximē totius membri regionem obtinens. Alij autem post eum, obliquē ad mediā descendentes regionem, tribus quidē maioribus digitis, duo: reliquis verō minoribus, reliquas explanationes mittit. Reliquorum verō trium, vnus quidē qui in vlna est, carpum tendone simplici extendit: qui autē sunt in radio, alter quidem condylum eius transcendens, obliquus, in duobus diuisus, extendit simul carpum, & magnū, digitum abducit ab alijs: reliquis autem extrinsecus, ad pronum circumducit extremam manum, atque ipsū carpum extendit. Sunt & alij duo in vlna, ipsam circumverentes: obliqui quidem, quoniam & motus quē efficiunt, obliquus est: pervenientes autem ad radios os, quoniam hic motus est actio dearticulationis huius osiæ, quæ ad brachium consistit. Apparent itaque novē quidē externi, septem autē interni musculi, si annumeres duplices illos musculos, qui circumagunt obliqui vlnā. Nam qui manus gratia sunt conditi, septem quidem externi, quinque interni habentur. Quam autē quatuor sint motus carpi, extensio, flexio, ad pronum circumductio, & ad supinum: duo quidem tendones & musculi sunt duces flexionis, duo autem alij extensionis. Hi verō ipsi etiam conversiones laterales concitant ad pronā figurā, simul adiuuante quippiā eo musculo, qui in externa vlna locatus, desinit in medium ponsissimū metacarpium, per tendonem duplicem. Flectentium igitur carpum tendonum, alter quidem ad

eam quæ supra paruum digitum, alter autem ad eam quæ supra magnū est, regionē internā pervenit. Ad eundem verō modum extendentium vterque, hic quidem supra paruum, ille autem supra magnū digitum, superna parte implantantur. Ac si vtriusque tenis fuerint, flectūt quidem interni, tendunt externi manum: tenso verō alter vtro ipsorum, altero quidem qui ad magnū digitum, parte interna, altero autem qui ad parvum, parte externa est, ad pronum sensim quodammodo manus circumducitur: eo verō qui ad parvum digitum, tenso intrinsecus, vel eo qui ad magnū est, extrinsecus, ad supinum. Si verō simul tenis fuerint, & qui ad magnū digitū intrinsecus est, & qui ad parvū extrinsecus, non amplius sensim, sed quamplurimum sic ad pronum circumagitur manus. Ita etiam & eo qui ad parvum digitum intrinsecus est, & simul eo, qui ad magnū extrinsecus, tenso, adductum manus supina fit. Distinguere autem oportet carpi motus, a motibus totius vlnæ. Sunt vnum & huc quatuor motus, proportionē quatuor motibus respondentēs, qui ab iis, quæ ad brachiū sunt, dearticulationibus fiunt. Etenim extensam, & flexam, & circumductam ad pronū & supinum, videbis totam vlnam, quiescente manu. Sed extensionē quidē & flexionē, vlnæ dearticulatione, quæ est ad mediā brachii, efficit circumductio nem verō ad latera, articulo brachij ad externum eius caput. Ad duo quidem musculi ad pronum circumducunt, duo autem ad supinum convertunt radium: nam satius fuit duobus musculis, quā vni talem motum cōmittere. Eorum autem musculorum, hic quidem in superas partes quæ iuxta brachiū sunt: ille in inferas, iuxta carpum inferitur: fertur verō vltra amplius vterque, nec in ipsas solum inferuntur extremitates, propterea quod carnosus partibus immittuntur, antequam in tendones desinant. Ab eis siquidem nullus tendo prodicitur, quum impossibile sit ita propinquis sibi osibus, incipientem ab vlna musculum, in nervo sam tenuitate mutari, inferi radio. Nervus quippe & ligamentis in carnes musculi disseminatus, postea paulatim in idē acceruat, generatio fit tendonibus: paulatim autem illud longiori eget via, & maxime quando ex magno musculo acceruat fit. Verum autem esse id quod dicitur, ostendit qui radio incumbit superius musculus, a quo solo inter quatuor prædictos musculos, quod minimus & longissimus sit, membranosus iuxta finē explanatur tendo, etiam a partibus radio interinis, prope carpum. Collocatur autē natura, eos quidem, qui ad pronam figuram membrum circumducunt, ex internis partibus, omnium primò securitatis gratia, quum plurimas & maxime necessarias, & vehementissimas, in hac figura, actiones obeamus: eorum verō qui ad supinū abducunt, alterum quidē occurrat in regione inter vlnam & radium media, eum ab vlna in radiū producent: alterū verō imposuit de super ipsi radio, longissimū faciendo hunc omnium, qui circa membrum hoc sunt musculorū. Pervenit itaque eius superior quidem extremas ad externam brachij partem: inferior autem,

*Vlnæ quatuor motus.*

*Musculi vlnæ tenent radium ad pronum, supinumque.*

*Tendones generatio.*

*videt.*

per

per quam mouet radium, in membranofum tendonem definens, applicatur intrinsecus eius partibus, prope ipsam cum carpo articulatione. Porro ubi quæ videtur, quando nervi aut tendones aliquem præterferri opus est magnam oleis convexitatem, vnum horum trium fieri, aut cauci articulam, aut perforari, aut omnino circa basim eius, nervum involvari, nullam autem audiam, aut non minutum vel per convexitatem, intel-

*Natura sollicitudo circa partem articulationis.*

*Carpi et olei articulationis.*

*Metacarpi et olei articulationis.*

*Carpi et olei articulationis.*

*Metacarpi et olei articulationis.*

*Metacarpi et olei articulationis.*

ofibus, quoniam quatuor tantum digiti in ipsam articulationem debent. Ceterum quia in carpo multa fieri ossa sunt nichil, conipponi vero sunt eorum cum vna non similiter ut cum metacarpo, in duos ordines ea digerit natura. Quum, igitur necessarii sunt quatuor metacarpi ossa, adiacere autem eis in vno ordine prout magni digiti os (quod sancti nominant propter hoc triplicem metacarpi attributionem) & hic vnicuique ordo manifestatur inferiori parti ipsius carpi, conveniunt ex quatuor quidem lex pars, altera autem quæ vix articulat, ex tribus ossibus facta est. Quum itaque tres sint ordines inter vnam & scissuram digitorum inter quos quidem est ad vnam, ex tribus ossibus quædamque sunt lucis: qui vero deinceps est, ex quatuor laxius compositis: tertius denique hinc articulat, ex quing compactus est, quorum vnum quidem est magni digiti, alia vero quatuor, metacarpi. Videbitur itaque sic quid carpi sepe, omnino consistat ossibus, præter quæ est aliud prælongum, quod velut per internas vias patens, in quibus & articulat ad tenuem vix præcelsum. Quoniam igitur carpi oportet articulare vix, ac radii sinibus, conveniunt horum os vtrumque epiphysium habuit, gibbum quidam & rotundum extrinsecus, concavum vero intrinsecus, sed epiphysis quidem radii, vnde glabium habet circumpositorium, a quo exacte distinguitur terminus carpi, qui ad vnam spectat: vix autem epiphysis, ob amplius similiter, fed interna quidem sua pars, & quæ spectat ad radii, est similis: alia vero extremitas, quæ secundum longitudinem & rectitudinem totius membri exstat, in rotundum caput hinc, quod circumdatur locatum ibi os carpi, edacitate leuiter profunda: ut duplex sit articulationis in carpo; altera quidem finium ipsius carpi ingreditur edacitate inter epiphysim radii & vix medii: alia autem parva, ossis, hæc quidem grata verticis manus ad pronum & supinum facta, est propter alia vero magnam extenditur & flexitur carpi articulus. Ob hæc sane gibbositates factæ sunt sinibus vix & radii. Quia tam extrinsecus quidem magna erat altitudo ipsi extenitas vix, interne vero partes imo & demissæ, propter apophysim, eius parva extrinsecus & inferius locata, posuit hic natura, veluti quoddam vallum, præ longum os, intro nutans rectum, è quo ea quæ ibi sunt sita, muniantur. Atque hoc est os carpi octavum de quo discere discitiam. Cuius finis quidam inferior, subulis & cartilagineis est, validis quibusdam membranis alligantur circumiacentibus ossibus, atque in ipsum radii de inferius ille tendit, qui carpi flexit. Quæritur aliam quandam inter ossa parvi cartilaginei ossis natura creavit, per colligationes fortiter copulan, partim huic nunc dicto ossi ipsius carpi, partim et quod est post ipsum, articulo ad primam aciem magni digiti, ut & ibi edingat parte altera tendonem, a quo magnus digitus atque carpi mouentur. Nam aliam partem hoc os numerare, sed parva est numeranda ab anatomicis, licet nec aliq. quod eorum quæ carpi vocantur, quæ multis manuum & pedum

*Carpi articulationis.*

*Carpi articulationis.*

*Carpi articulationis.*

*Carpi articulationis.*

*Tendones exten-  
dentes atq. fle-  
cuentes carpū.*

*Vlnæ positi-  
o recta.*

*Radix dearticu-  
lationis.*

*Radius cur vi-  
na recumbat.  
Radius cur vlnæ  
quod portans ad  
figuram &  
dearticulationem  
discurrit.*

*Corvina.  
Vlnæ extremi-  
tatis figura.  
Brachij epiphy-  
si.*

*Radius bra-  
chij.*

*Brachij capiti.*

*Brachij osi fi-  
gura.*

articulis natura velut auctarii circumposuit, se-  
curitatis gratia. Iam verò ex quatuor tendoni-  
bus extendentibus & flectentibus carpum, qui  
quidem extensorum sunt, manifestè apparet obli-  
qui, & pervenienti, licet quidè magis ad externa  
partes aciei, quæ est ante parvū digitum. At inter-  
ni, obliquiores quodammodo sunt, ut non so-  
lùm extendant, & flectant, sed etiam circundu-  
cant manū ad latera. Ad hæc posito ipsius radij  
obliqua meritò fuit, quemadmodum vlnæ posi-  
tio recta: hæc siquidè extensionibus & flexioni-  
bus, ille verò cōversionibus ad latera subservit.  
Ob eam causam ad brachiū vtriusq. ossis dearti-  
culatio, dissimilis fuit. Porro superiorem extre-  
mitatem radij, ad caput brachij externum pro-  
duxit natura: inferiorem ad magnum extendens  
digitum, quod videlicet talis obliquitas multo  
paratior sit, ut moribus ad pronium obediat, qui  
ad plures ac magis necessarias actiones sunt vi-  
tiles. Cur autem incumbit vlnæ radius? quia hoc  
illa longior est, & plurimum articulationis ad  
brachium ipsa obtinet. Sed cur vtriusq. partes,  
quæ in medio quidem sunt, tenuiores: quæ in cu-  
bito autem & carpum, multo crassiores existunt?  
quia illas musculis locū præbere oportebat, has  
crassescere per epiphyseas. Cur ex ipsis finibus,  
ille quidem vlnæ, qui in cubito est, crassior: ra-  
dijs verò, is qui ad carpum consistit? an quod v-  
triusque est ad carpum dearticulatio? In ea verò  
dearticulatione quæ est ad brachium, tantum su-  
peret vlna radius necesse est, quanto vlnæ dear-  
ticulatio cunctis manus actionibus cōmodior  
existit. Sunt sane hoc loco quidam processus i-  
psius vlnæ duplices, gibberosius quidem foris, cavi  
autem intus: vnus ex posterioribus & internus  
ipsius partibus, qui certè & maior est: alter ex an-  
terioribus & supernis, multo minor priore. Con-  
versis autem ad se invicem eorū cōcurantibus,  
vna ex ambabus cōstituit magnā cauram, si-  
milis literæ græcæ  $\theta$ . Sui quidem exortus vo-  
cantur *apophyses*, atq. hæc vlnæ extremas talem ha-  
bet figuram. Brachij verò extremitas hoc mo-  
do secundum laterales partes capitis epiphysin  
habet: hanc quidem foris, illam autè intus: qua-  
rum in medio cauras quædam est, levis & rotun-  
da, similis rotularum vocatis cauritis, circa  
quam vlnæ corvinae moventur. Vbi autem ipsa  
desinit, vtriusq. *radius*, hoc est, brachij cauritates  
constitunt, quæ extendentibus toram manum,  
& flectentibus, vlnæ *apophyses* ingrediuntur, suntq.  
licet extreme extensionis & flexionis terminus.  
Quæ dearticulatio tura simul & accommoda a-  
ctionibus facta est. Porro brachij caput, alterum  
quidem externum & minus, ob radij ad li-  
psum dearticulationem est factum: alterum ve-  
rò maius, qd intro spectat, nullum os sibi cōiun-  
ctum habet, sed nodus prominens, vasa munus  
quæ illac percipit, in ipsūq. annectuntur capiti  
musculorum vlnæ internorum, qui secundum  
rectitudinē eius sunt sit. Non solū autè radius  
& vlnæ brachio, sed etiam radium vlnæ validis  
ligamentis natura cōiunxit, ut omnia quamfir-  
missimè cohererēt. Os igitur brachij rationabi-  
liter quidem extrinsecus magis est gibberosius:

interna verò partibus magis simi, ut ad se invicem  
converterentur manus, id quod longè erat  
melius. Talis etiam constructio brachij effectus  
apriora, ad comprehendendū cōvexa corpora,  
preparando simul locum vasæ, quæ ad totas ma-  
nus feruntur. Quam autè vlna duobus prædicta  
modis esset, extensione & flexione, necessarii  
erat interna quidè ipsius brachij parte flexionis  
ducem musculū, externa verò extensionis, loca-  
ri, ut tum ipsam motionē vlnæ, tum brachio te-  
gumentum præstarent. Ne autem regio illa quæ  
inter ipsos musculos media futura erat, super-  
na nempe & inferna, omnino nuda relinque-  
retur, aut onosa vestita carne, forniores simul ac  
ruronos motus natura addidit, duplicata multi-  
tutine musculorum. Ex vtriusque siquidem parte  
duos obliquos musculos in ipso membro pro-  
duxit, figura simili  $\chi$  græcæ literæ, sese mutuo  
secantes, prope dictas regiones: positiōne quo-  
rum recto esse vndiq. brachio cōiungit. Hoc autè  
est dignū admiratione, quod bins obliquos mu-  
sculis, vnu rectū cōiungit, quemadmodū car-  
pum moventes tendones. Atq. vnus quidè mu-  
sculorum flectenti vlnam, ortū habet ab inter-  
nis partibus loci, qui ad humerū vergit: inde au-  
tem perferitur ad anteriores brachij partes: alter  
autem minor, explanationem quidem ab inter-  
nis brachij partibus habens, intro illic paulatim  
sele convertit. Maior porrò musculo agen-  
te, manus tangit internas regiones articuli, ad  
humerum spectantis: minore verò, externas his  
oppositas. Eodem modo & posteriores brachij  
musculos triperies factos, oppositum scilicet v-  
triusq. vtriusq. interiori, idq. parti servata similitu-  
dine. Ambo namq. inferiorem cubito, sed huius  
quidem maxima pars, ad internas cubiti regio-  
nes: illius autem, ad externas: & prioris quidem  
dictorum superne explanationes, in interna  
brachij magis: alterius autem, in posterioribus.  
Ergo musculi duo interni, secundum rectitudi-  
nem quidem exactè tendunt vlnæ, si ambo ten-  
dantur. Sin autem alter quidem eorū zigat, alter  
verò quiescat, parum ad rectitudinem versus alterv-  
tram partem delectant. Eadem ratio est habenda  
in extensione quam molliuntur hia oppositi  
musculi. Iam verò laxiora & caernosiora, magis  
q. concaua semper sunt ossa maiora cunctis  
minoribus, ne maximo grauent onere. Sed intra  
cauritates eorū medulla reposta est, familiare os-  
sibus nutrimentum. Enimvero in cubiti & carpi  
articulis, non crassa modò, sed etiam dura quæ-  
dam hgamētra vndiq. contranitena, & prohibi-  
bentia, ne articulorum ossa plurimum à mutuo  
connexa resiliant, ac distent, sunt facta. Quapro-  
pter et si sæpe violenter moveri cogantur, minus  
tamen quam in humeri, articulorum luxatio  
accidit. Non enim fieri potest, ut os aliquod suo  
articulo aberret, nisi plurimum à reliquis distet.  
Non autem omnes articulos natura firmos cō-  
struxit: quoniam pugnam habebat necessariam  
varietas motuum, cum securitate cōfirmatio-  
nis, nec poterant in idem cōvenire ambq. Sequi-  
tur enim illa quidem laxitatem dearticulatio-  
nis, hæc autem stabilitatem, & omni ex parte  
cōstructionē. Quare cū duo sint quæ stabili-  
tem

*Musculorum fle-  
sionum atq.  
extensionum vi-  
nam, quæ sunt.*

*Musculi obli-  
qui in brachio.*

*Rectum mu-  
sculi fieri à musculis  
obliquis in bra-  
chio, dum obli-  
qui simul motu  
moventur.  
Musculi vlnam  
flectentes vnde  
oriuntur.*

*Ossa maiora  
cur semper ca-  
verunt os in-  
terioribus.  
Modum ossi  
familiare os-  
sibus nutrime-  
tum.*

*Motuum varia-  
tatem pugnare  
cum cōfirmatio-  
nis securitate.*

*Yerminalia ad  
articulorum ac  
efficiant.  
Humorum care  
re evalla com  
positione, et for  
tudine ligamē  
torum.*

tem articulorum efficiant, fortitudo videlicet li  
gamentorum, & exacta compositio, vtrique qui  
dem est in cubito & carpo, altera vero in digito:  
in humero autem ocutra exacte invenitur.

**GALENI PERGAMENTI**  
de vsv partium, lib. III.

*Manus solus a  
animalium homo  
habuit.  
Homo solus in  
ter pedes tria li  
ges, erecti his.  
Naturam non  
posse mutare  
corpora varia  
manu differē  
tia.*

*Canis canem non  
mutat, vnde  
fuisse Galenum.  
In panem concep  
te ex cane.  
Canem conope  
te ex lupis et ex  
vulpis, nec a  
cane velle.*

*Egrediens aut ad  
recipere homi  
nem, sunt, aut  
recipiens cor  
rumpit.*

*Homo solus so  
dere potest.*

*Animalibus  
herbivora qua  
insunt.  
Carnivora  
qua insunt.  
Tendit ani  
malibus qua  
adinsunt.*

*Carnivora a vi  
tutem habent pe  
dum vici ma  
nibus.*

*Exanguia ani  
mali a cor por  
to et summa  
si cibum man  
tur.  
Insipienda.*

*Quadrupedi  
bus qua com  
dant ad insu  
ta corpora so  
luta.*

**M**ANUS homo omnium animalium solus  
habuit, organa animalium sapienti conven  
nientia. Bipes vero ipse solus inter pede  
stria factus, & erectus, quia manus habuit. Cur  
autem non habuit quatuor crura, & prater ea  
etiam manus, sicut centaurus? Quoniam primo  
quidem impossibilis est ipsi naturae, corporum  
adeo differētium mistio. Nec enim si costus  
quidam veneretur homini cum equa fiat, perfici  
ent matricis sperma. Quare quod de centau  
rus fertur, omnino fabula est. Equa siquidem asini,  
& asina equi poterit sperma recipere, perficeret  
ad animalis mixta generationem. Ita & lupa me  
scali canis, canis vero ipsa non lapi solum, sed &  
vulpis, sicut & vulpes canis. Equa autem huma  
num semen forte ne receperit quidem in sinu  
matricis: longiori enim pendendo opus fuerat.  
Quod si quando id suscipiat, corrumpet vni  
psum vel mox, vel non multo post. Iam vero si ho  
mini quatuor adessent crura, esset inestimabilis  
ad vniuersas humanas actiones, ac ne sedere  
quidem posset. Etenim ut solus homo erectus sta  
re, sic etiam solus sedere potest. At animalia cete  
ra, quae destrutura sunt manibus, oportuit hęc qui  
dem anterioribus tibis cibum ad mouere ori: alia  
vero, inclinata sumere. Ceteris quoque herbis vesci  
tur, alia quidem solidas, alia vero bifidas habent  
vngulas: carnivora autē, habitu feroci quā sin  
nō solum habent multos pedes, sed etiam cur  
uos vngues, firmisimōsque fortitū. Porro qua  
cumque omnino sunt timida, his neque solida vngu  
la, neque cornu, vice pro pugnaculi, inest, sed vngu  
la tantum tenuis bifida: atque hęc quidem incli  
nata pascuntur. Carnivora autem anterioribus  
pedibus pro manu utuntur, & ad rennendū ani  
mal quod venata fuerint, & ad cibū ori afferen  
dum. Quaecūque vero animalia exanguia, ea sanē  
frigidiori temperie sunt: quapropter imbeci  
liora omnino, & ad motus pignora, paruis &  
multis utuntur tibis. Quaedam autem etiam ob  
id prælonga totis corporibus facta fuerunt, sicut  
& iulus, & scolopendra, copiose tibiarum pro  
ductio non natura locum suppeditante. Omnibus  
sanguineis pedes tribus, quæ maxime hominibus  
asimulantur, quatuor sunt pedes tributi. Tutius  
siquidem erant ipsi, quatuor ambulare tibiis,  
quā rectis stare super duabus. Nam sic ambu  
lantibus, vti ambulant, partes ventris, quæ sunt  
offensis magis obnoxie, occultantur, & custo  
diuntur in superacantibus: expolita autem sunt,  
quæ sunt panibiles minus. Etenim vero accide  
re prius contrarium. Nec enim manibus &  
ratione vtenia, quemadmodum homo, opposi  
tura erant ventri externum aliquod propugna  
culum. E contrario autē horum, homini melius  
fuit esse bipedi, ut qui ea velocitate, quā ex tibia  
rum multitudine habent animantia cetera, neu  
tquam indigeret, & ad multa, nisi bipes fu  
set, deterior futurus erat. At bipedes quidem &  
aues sunt. rectus tamen solus animalium est ho  
mo. Soli enim ipsi secundā rectitudinem crurū  
spina est, ceu corporis quidam carina existens:  
ad quā crura ipsa, in aubus quidem, ut & qua  
drupedibus, angulum rectū efficiunt: solus autē  
hominibus, insit recta linea extenditur. Quare  
eorum animalium nullum vniquā stare potest.  
Sed nec sedere, quod ad sedendum oporteat cru  
ra coxis copulata, in femoris ad tibi dearticula  
tione, retrorsum flexū, id quod fieri in illis non  
potest, quum omnia nimirum anteriorum postē  
riorum crurum habeant flexiones, quemadmo  
dum priorū retrorsum, contrā quā in homini  
bus certamus. In eis siquidem manus ad antici  
pū cubiti parē flexum trahit, quod melius sit eas ad se  
cōverti. crura autē flexionem in genu retrorsum  
obtinēt, nam hoc solo modo pulchre licet sede  
re. Vbi igitur vna rectam lineā efficit spina cum  
cruribus, ad tres differentias figurarum agi ani  
mal potest: quæ si ipsam quidem spinā humi  
reclinauerit, supinum omnino fiat: si vterque  
pronus: si firmetur pedibus, tum exacte stet rectū.  
Si vero aliquem angulum crura ad spinam fece  
rint, constāt nullam earum figurarum exacte ef  
fice rectam. Solus igitur omnium animalium ho  
mo & rectus stare & sedere potest: etenim om  
nes manuum in opificiū actiones, duabus his e  
gent figuris: hęc namque erecti, hęc sedentes con  
ficiunt manibus. Nemo autem aut pronus, aut  
supinus molitur quicquid. At opinari ob id recte  
stare hominem, ut prompte ad cælum suspiciat,  
hominum est, qui nunquam videntur *eporax*  
apicem: hic namque vel inuitus semper cælum  
aspicit: quō homo, nisi collum rederet, cælum  
nunquam videre posset: qui reflexus etiam asi  
mis inest. Id autem non est sursum apicere, quum  
quis supinū supinum reclinare oserit, sed quan  
do mente naturam rerum considerat. Postea igitur  
quā in ut manus apprehensionis, ita cras am  
bulatorius erat futurū organum, præstitit nō ro  
tundos & duos, sed oblongos, largos, molles,  
multisimōsque subici ipsi cruribus pedes: quum  
videlicet talis constructio, ad omnes locorū diffi  
cultates, & sicut oporteat sublimis muros, aut  
arbores, aut petras scandere, maxime opportu  
na videatur. Etenim equis & bobus, aliisq; id ge  
nus animalibus, quibus duri & vestit sunt pe  
des, melius fuit quovis modo ad pandendi diffi  
cultate eos cōparasse, ut quæ nec manus, nec ar  
tes habeant homini vero: qui idoneis sibi calca  
mentū invenire potuit, sæpe etiam nudis pedibus  
vni, opus habuit prorsus esse eos tum detectos,  
tum molles. Porro ambulatorio fit, altero quidem  
crure in terra firmato, altero autem circumlato.  
Sed firmari quidem, pedis: circumferri autem,  
tonus cruris est actio. Nec vero ambulantibus  
tantum, sed currentibus etiam, alter quidē pedum  
in terra firmus est, alter vero simul cum toto cru  
re profertur. Ceterum mutare quidem loca, be  
neficio quorū quod mouetur cōtingit: quod ve  
ro non cadamus, hoc per in terram fixus efficit.  
Iam stare quidem possunt, duobus munis pedi  
bus homines, moveri autem non possunt. Vidi  
etiam quosdam, quorum digiti soli a nunc mor

*Bipedi sunt a  
ant.*

*Rectus est solus  
homo.*

*Spina est ceu  
quandam cari  
nam corporis.*

*Crura in solis  
hominibus ad  
rectam lineam  
subiecta spina.  
Quadrupedi  
tur nequā se  
dere.*

*Figurari posse  
tripliciter ani  
mal, si rectam  
lineam efficiat  
spina cum cru  
ribus.*

*Homo solus &  
rectus stare, &  
sedere potest.  
Actiones omnes  
manuum fieri,  
aut saltem  
aut sedentibus  
nobis.*

*Obpaxit rati  
pōtū porpore  
afficit cælum.*

*Seriem appre  
re, aut mentis ad  
torem rati co  
siderare.  
Crus ambula  
torius organū.*

*Pedum constructio  
ita valde op  
portuna.*

*Pedi homini  
præstita esse  
iura detestis,  
tum molles.  
Ambulatorio  
quomodo fiat.*

*Stare possi  
homines duobus  
munis pedibus  
moveri autem  
non possunt.*

tificari excedant: sed hi quidem, neque stando, neque ambulando, neque item currendo, in planis saltem & leuibus, vincebantur a satris, inuiles tamen & impositos, ad peruadendum aliquem præcipitem locum. Quibus autem non solum digiti, sed quæ ante digitos est, etiam planta com-  
 putruit, fallax his gressus est, etiam in planis locis. Si verò tarsus etiam corruptus fuerit, non solum hi non possunt ambulare tutò, sed ne stare quidem constanter. Constat igitur linc ad firmam stationem amplos & oblongos pedes esse appositos: quibus accessit multiplex illa fissura, nemon conspicua in medio cauitas, ad securitatem in gibbosis locis vtræque maxime congruentia. Humanus itaque pes, quammaximè fieri potest, manum imitari videtur. Quare si apprehensorii organum manus fuit, fuerit vtrique & pes ipse, alio quodam modo, huiusmodi. Non autem habet oppositum aliis digitorum magnum, sed in vno deinceps ordine constitutos omnes: nam sic ad firmitudinem expediebat. Iam verò quod in humano pede *superius* dicitur, carpi manus similitudinem refert: metacarpi autem, *medius*, hoc est planta: nam digitus in pede, digiti manus sunt similes. He igitur tres partes pedis sunt, quales & manus, digiti, tarsus & planta. Subiacens verò ipsi tibie pars pedis, ex tribus ossibus constat, talo videlicet, calcaneo, & naviformi osse. Atque itis quidem solis, nulla est in manu particula quæ proportionem respondeat, sed sunt simpliciter basis solis instrumenta. Aliæ verò omnes particulae, basis simul & apprehensionis. Quæcumque igitur pes, ut apprehensorium instrumentum, manul simula est foris, ea ad sermonem de manu habitum, remittenda sunt: quæcumque verò, ut ambulatorium, hic enarrare oportet. Quod itaque ex multis ac variis ossibus constituti sunt, invicem quidem multifariam dearticulatis, per membranosa vero ligamenta cœnexas, id ut apprehensionis instrumentis, pedibus accidit. Quod verò & minores quàm in manibus, digiti, similique omnes serie positi eis insunt, hoc proprium est pedibus, tanquam firmationis organis. Tutoris autem apprehensionis ambulationisque grata, aliores & magis caute factæ sunt pedum partes internæ, externis: quæ quidem si fuissent æquales versus crus elevati pedis, alter semper pes inclinarer, ac sic ambulatio facili evteretur. Internæ autem pedis cœcauitatis grata, calcanei anterior pars, tenuior est & angustior, magisque recedere ad digitum patium videtur. Propterea astragalus, siue talus, intrò magis vergere apparet, licet eius pars posterior, ad medium sint calcaneum firmata. Quæ autem coniunguntur his ossa, quod calcaneo quidem coheret, cubiforme vocatum, ab externis partibus pedis firmum in terra statuitur: quod verò astragalo, scaphoides dictum, similiter ipsi astragalo sublimè est, & sublatum à terra, interna regione pedis locatur. Pari autem modo tria tarsi ossa huic coniuncta, & ipsa sublimè apparent, & internis pedis partibus posita sunt: quibus externa parte firmum ac humile os cubiforme appositum est. Sed calcaneum quidem ad exteriora pedis maximum quidem est factum, quoniam ad perpendiculum subia-

cer toti membro: latæ autem partibus inferioribus, firmationis stabilis grata: rotundum, ut non facile pateretur. Porro astragalus altus, alto naviformi coniungitur, formici similem perficiens figuram. His deinceps adiacent ossa tarsi, tria quidem naviformi coniuncta: quantum verò calcaneo. Post hæc sunt plantæ ossa, terram post astragalum contingentia, & naviforme, & continua huic tria ossa tarsi. Deinde sunt 10 digiti, quorū maximus est nō amplius ex trium ossium ordinibus, ut reliqui, constitutus, sed ex duobus. Ceterum ossi quod magno digito præpositum est, duo videtur subiecta esse inferiori parte, veluti sustentacula quedam, & stabilimenta. Ac planta quidem, proportionem omnino metacarpio respondet. Verum in pede, seu vno ordine omnibus iacentibus digitis, quantum est illorum numerus, tantus mento est & ossium plantæ, quæ præponantur illis. Sed nec carpi quidem ad tarsum proportio constructionis obscura exsistit. Si quidem ex quatuor ossibus tarsus constitutus est, ex duplicatis autem carpus, seu ex duobus ordinibus cōstitans. Nam ex pluribus & minoribus componi particulis apprehensorium instrumentum erat expediens: ut ex maioribus, sed paucioribus, ambulatorii. Anteriores igitur partes pedis adamusim per similes comprehensoris, ex æqualibus illis numero ossibus constant. Posteriores verò, quæ instrumenta omnino sunt gressus, nullā habent in manu proportionem respondentem particulæ. Reliqua pars media ambarum, qualis existit tarsus, vtriusque imitatur naturam. Os itaque quod ab externis ipsius partibus est locatum, quod sanè & cubiforme dicitur, in articulum cauitati calcanei, ad finem adiacent. Reliqua verò tria cubis naviformis ossis obsequant. Hoc autem ipsum tarsus circumambit caput astragali, qui iacet inter adnata tibie & fibula, superne à lateribus, & præterea à tergo ab ipsis comprehensum. Superiacet autem calcaneo duabus eminentiis, ibi in duabus caularibus eius firmatus. Atque extendere quidem & flectere pedem, superne astragali dearticulationis est opus: ad latera vero circumferre, opus est dearticulationis quæ fit ad os naviforme. At pedem & crus firmari, scilicet & sustinere vniuersum corpus, ad ipsum præcipue calcaneum pertinet: quod os, ea de causa nō solum cætera ossa, sed ipsum etiam astragalum magnitudine superat, cum quo etiam habet articulationes firmissimas. Vtræque firmus dearticularetur, in medio ipsius & tibie astragalus est locatus, coherens illi validis ligamentis cartilagineis. Dure porro calcanei nature, dura cune subducta est, ut occurreret violentis occurrerebus. At cauitas pedis, trium gratia constructa est, nempe internæ altitudinis, apprehensionis, & leuitatis grata. Ad hæc, in semore quidem est vnicum os, quemadmodum & in brachio: duo autem in tibia ista familia, quæ in vna cernuntur: quorum vnum quidem vocatur tibia, alterum verò fibula. Maximum omnium corporis ossium femur merito fuit. Primum namque hoc, firmatum est cauitate, primumque omnem corporis molem superiacentem vehit: curvum quidem, priore & externa parte refectum

Stationis firma  
 amplius & ob-  
 longos pedes ef-  
 fi appositus.

Pes hominis i-  
 mitatur ma-  
 num.  
 Pes enim app-  
 prehensorio orga-  
 num.

Tarsus acqui-  
 ratore carpi,  
 Pedus, siue plā-  
 ta, sit quid me-  
 tacarpi simi-  
 le.

Talus,  
 Calcaneum,  
 Naviforme os.  
 Basis instru-  
 menta.

Pedum consti-  
 tutio.

Pedum parti-  
 interna, et al-  
 ternis. & ma-  
 gis crura exten-  
 sio.

Astragalus.  
 Talus.

Cubiforme os.

Scaphoides.

Tarsi ossa tria.

Calcaneus sub-  
 sacro ad per-  
 pendiculum se-  
 li curv.

Astragalus con-  
 iungitur mani-  
 formi ossi.

Planta ossa.

Pedis magnus  
 digitus ex duo-  
 bus tantum os-  
 sibus consti-  
 tutus.

Planta propor-  
 tionem metacar-  
 pi respondet.

Tarsus propor-  
 tionem carpi.

Cubiforme os.

Naviforme os.

Astragalus.

Pedis motus à  
 quibus deorci  
 calcaneum  
 proficiantur.

Calcaneum of-  
 se maximum in  
 firmisimè de  
 articulatione.

Calcanei cur-  
 vatura,  
 Pedis cauitas  
 trium omnino  
 dorum gratia  
 formata est.

Tibia, Fibula  
 Femur esse o-  
 mnium osium  
 maximum.

*Blas ad genu  
qui sunt.  
Venerunt partē  
superiorem pro  
sede istius cor-  
poris foris.*

*Venerunt stru-  
ctura istius  
ad se ipsas in  
his.*

*Digitorum pe-  
dis manuum.*

*Tendendum mo-  
ventis digitis  
pied, duo can-  
tem genera pro  
ducuntur a ma-  
jore tibia.*

*Tendendum qui  
invenitur pro  
ductis amplius  
manus.*

refinim verò, partibus his contrariis. Quibus enim femur fuerit natura rectius, quod convenit, blehi sunt omnino ad genu. Superior ipsius femoris parti, isthuc corylem præparant natura sedem. Eius autem collum, istam ex coryle obli-  
quum foras abscedit, ut relinquatur locus inter-  
nus femoris vasis & musculis: postea autem in-  
trò rursus revertitur, versus genu. Ad hæc, ma-  
gis quidem summa retrorsum, antrosum verò ma-  
gis curva quum sit structura femoris, ad lesio-  
nes idonea existit. Quin & tibiam ipsam circa su-  
pernas partes magis curvam extrinsecus natu-  
ra fabricata est, firmiusque & velocitatis ratio-  
ne. Nam inferiores partes illius, quæ sunt ad  
malleolos, intrò se reflectunt. Quemadmodum  
igitur singuli in manu digiti, à duplicibus qui-  
dem maximis flectuntur tendogibus: ab aliis  
autem simplicibus minoribusque extenduntur:  
atque ab aliis adhuc minoribus ad paruum digitum  
abducuntur: ac deinde ab aliis illis minoribus re-  
liquis motus internus ad pollicem oblique agi-  
tur: ita dicamus etiam, & in vnoquoque pedum di-  
gitos hos quatuor motus merito inesse, quum à  
maximis quidem tendonibus digiti pedis flectan-  
tur, à minimis autem parte interna cōvertantur  
oblique. Porro media inter utroque est magni-  
tudo extendentibus, & parte externa circa-  
gentibus. Non tamen æque magni sunt in pedi-  
bus flectentes, ac in manibus: quia non itidem ut  
manus, pedem constituisse oportebat instrumē-  
tum apprehensivum, sed basis firmandæ orga-  
num. Quanto igitur pes manu est maior totus  
tota, tanto huius digiti, illius digiti, & tendon-  
es tendonibus sunt minores. Non ergo fuit æ-  
quum, quatuor genera tendonū moventiū digi-  
tos pedis à musculis tibiæ produci, quemadmodum  
in manu à musculis vlnæ: sed duo sola, nempe al-  
terum, quod eorum extensione efficeret: alterū,  
quod flexionem primi & tertii eorum, qui sunt  
in quatuor digitis, articulo. Motus itaque  
cuiusque articuli digitorum pedis mollia est quatuor  
natura, & quinque principia ipsorum, ut in manu:  
non tamen omnia ex locis proportionē respon-  
dentibus procedunt. Tria siquidem ab ipsis pe-  
dibus motus principia oriuntur, duo verò defe-  
runtur ex tibia. Et enim in ipso qui ad plantam  
est loco, musculos obliquo motui interno præ-  
tuitos constituit: in reliqua verò ipsius parte tota  
vis ad calcaneū eos locavit, qui secundum arti-  
culum cuiusque quatuor digitorum flectunt, ma-  
gno digito excepto, qui à maioribus tendoni-  
bus germinationem inferant secundo suspensus  
& tertio articulo habet, ut is qui est in manibus.  
Pariter & ex superioribus pedis partibus alios  
posuit musculos, motui externo obliquo infer-  
vientes. Quare superne quidem ex tibia, duo  
principia motus descendit inferiori verò parte  
prodeunt ex pedibus tria. Tendones in pedes  
inferni, modo quodam similissimo nervi à spina-  
li medulla colla in tota brachia productis, im-  
plicatur, cōmiseruntque inter se, ut offensibus  
multo fortius resistant. Ob id ipsam namque, vel  
vbi magnitudo intervalli magna fuerit, vel lo-  
cus periculofus, ibi missionē huiusmodi machi-  
natur natura. Musculi autem valde parvi, ab anat-

micis non animadverti, primum articulum cuiusque  
digni flectit, pariter in manibus, pedibusque. Iam  
verò fines tibiæ, fibuleque simul inter se vniū &  
coniuncti, femori exacte in genu ipso adaptantur.  
In tibia porro tredecim capita sunt tendonum,  
retrosum quidem sex, antrosum autem septem,  
mouentque pedem secundum omnes con-  
venientes eius motus. At conveniunt tōn pedi  
abique digiti, motus quatuor, ut carpo. Et enim à  
musculo tibiæ superterno antrosum, ex aforat  
quidam tendo robustus, qui in duas partes divi-  
sus, partibus circa magnū digitū pedis inseritur.  
Ab eo verò musculo qui fibulæ circumdenditur,  
prodiens tendo alius, us inditur partibus, quæ  
ante paruum digitum sunt. Qui duo si vtrique  
tensi fuerint, atollunt, remanentque reddunt pe-  
dem vniuersum: altero verò actionem obeunte,  
motus ad obliqua fiunt. Quin etiam ex postero-  
ribus partibus, proportionē eorum qui sunt in  
manu, opposuit natura duas musculorum ger-  
minationes, quæ contrarios dictis motus pedis  
efficiunt. Quarta minor à musculo, qui per pro-  
fundum fertur, orta, in eum, qui est ante magnū  
digitū, locum inferne implantatur. Altera verò  
maior est, conspicuus ille tendo, qui in calcaneū,  
fortissimum omnium pedis osium, & principa-  
lissimum ambulationis instrumentum, retro-  
sum superne inseritur: qui vel si solus aliquando  
paratur, pes necessariū claudicat. \* Is tendo so-  
lus, ex tribus aliis in ipsum venientibus, atque à  
maximis musculis ortis, conficitur: ut si vel vnus  
ipsorum, aut etiam duo afficiantur, reliqui, aut  
reliquas ipsam actionem obeat. Vbi enim hic  
tendo calcaneum ad seipsum trahit, sic membrū  
vniuersum obfirmat, ut si altero pede stare ali-  
quando velis, non possis facile everti, neque la-  
bescere. Meminisse autem in vniuersum con-  
venit, obliquos quidem in membris musculos,  
obliquos motus præitare: rector autem exactam flexi-  
onem, aut extensionem moliri. Quum igitur  
tres furæ musculi calcaneum moueant, &  
depilem pedis partem constituent: post illos au-  
tem, tres alij digitos flectant, & in pede con-  
venientem motionē edant, iure optimo postero-  
ris tibiæ partis sex omnino musculi fuerint, v-  
nusquisque secundum rectitudinē particulæ quam  
est moturus, locatus. Quin etiam anteriores mu-  
sculi tibiæ, sex aut septem censentur. Nempe vnus,  
qui quatuor extendit digitos. Ex vtraque verò i-  
pilius parte, rursus alius vnus, qui in triplicia ten-  
donum capita definit. Quibus tum ipsi, tum i-  
psorum vtilitatem, si quis intendat animum, i-  
psos sex, aut septem vniuersos statuet. Quod au-  
tem vnguibus pedes proportionē respondentē  
manibus, quodque eis hoc ut apprehensoris or-  
ganis vniat, verbis nihil est opus. Curæ ipsam, non  
laxā, aut subilem, aut mollem, sed contrictā  
& medioeriter duram, sensilemque, ut non facile pa-  
teretur, subdidit pedis sapientissimus ille condi-  
tor nostri: cui commentarios hos ceteros hymnos  
quosdam compono, in eo veram esse pietatē exi-  
stamus, non si taurorum laudibus ei plurimas  
quispiam sacrificat, & casias, aliaque sexcenta vn-  
guenta suffragant: sed si nouerim ipse primus,  
deinde exposuerim alius, quæ ad sitipsum sapien-

*Maximè parvi  
in pede ab ana-  
tomis ignora-  
ti.*

*Tibia laesse tre-  
decim tendonū  
capita.*

*Pedi cōueniunt  
motus quatuor*

*Calcaneum for-  
tissimè omniū  
pedis osium, &  
principale in-  
strumētum am-  
bulacionis organū.*

*Obliqui muscu-  
li obliquos mo-  
tus præstare.*

*Rector musculi,  
nam aut rector  
fuerit mollior.*

*Tibia posterior  
in parte musculi  
fuit iussu.*

*Tibia anterior  
musculi sex,  
aut septem.*

*Curæ pedi quæ  
la subdita.*

*Commentarius  
huius Dni, cuius  
huius quosdam  
conscriptis Gal-  
lenus.*



ria, quæ virtus, quæ providentia, quæ bonitas: ignorantia quorum, summa impietas est, non si à sacrificio abstinemus. Quod enim cultu cõvenienti exornant omnia, nullig bona inviderit, id per fecissimæ bonitatis speciem esse statuo. Invenisse autè quò pacto omnia adornarentur, summæ sapientiæ est: ac efficisse omnia quæ voluit, virtutis est in victa. Ne igitur mireris, vniuersa celestia corpora summo esse artificio disposita neve eorum ordo vel pulchritudo adeò reattonum reddat, vt si interiora lux comparaueris, parua tibi esse videantur, et omni ornatu carere: siquidem sapientiæ, virtutem, & providentiæ, hic quodque invenies. Nam tamen si ex sanguine menstruò & semine, immortale animal, sicut im-

parabile, aut semper mobile, aut splendidum & pulchrum, quæ ac sol est, non potuerit constitui, in ipsa tamè virtute materis, conditoris ars splendescit. Atronium enim facit, idiotam quidem, materis: artificem autem, pulchritudo arti-

ficij. Etenim sol & luna, diuina quidem & celestia sunt corpora: nos autem terrex statuer: opificis tamen industria in vtroq; æqualis. Paruum & abiectam esse partem animalis pedem, quis inficitur: magnum verò & pulcherrimum omnium quæ sunt in mundo esse solem, ne hoc quidem ignoramus. Neutrum tamen corpus commodius potuisset locari, q̃ est locatum. In mundo enim medium esse solem inter errantia fydera, infimum autem in animali pedem, necesse fuit. Maximum & pulcherrimū rerum omnium esse mundum quis tandem negat? Sed & animal, vel vni parvū quendam mundū esse, aut veteres naturæ periti: eandem nanq; in ambobus invenies sapientiam Creatoris. Quod si solem quidem ostendere in corpore animalis non liceat, licebit certè oculum, organum lucidissimum, & quamissimum soli. Sed neq; oculo, uec cerebro deterius est pes constructus, si vtroq; pars ad actiones cuius gratia facta, se habere optime. Neq; cerebrum siue pede se probè haberet, neq; pes siue cerebro: eget enim, opinor, illud quidem veliculu, hic autem sensu. Veliculu enim cerebri est pes, ac totum corpus reliquum: sensum autem ipsius cerebrum præbet. Etenim illius tendonis triplicis qui ad calcaneū descendit, superficialis porro ad inferiorem partem pedis prætergressa, cum ad innemsecum vestigium subducitur: profunditati autem pedis, quæ est sub cute, in qua etiam duo parui musculi sunt, distribuuntur parua gemina erum neruorum, quæ à spinali medulla oriuntur. Per quæ organa pars pedis inferior facultatem sentendi suscipit. Vt autem neq; admodum sensibilis sit, neq; promptè patitur, excessus vtroq; vitæ aut naturæ, median exatè fabricata infernam pedis curam, inter mollem & duram. Porro si fibula extrinsecus tibiæ est attentæ, tenus admodū os, & multò minus quam tibia. Atq; vna quidem fibula vitilis est, id est articulationis ad astragalum, si qua extenditur per pes, atq; flectitur. Altera autem, quod omnia vasa & musculi tibiæ custodiat ad iniurias extrinsecas. Tertiā vitilitas est in externo femoris capite, quod tibia sustinet. Ad id enim loci adsiemata, firmitudini & securitati non pa-

rum confert. Cæterum quælibet tibiæ portandi femoris gratia præstaret esse maiorem, vt autem ipsa moueretur facili, minorem, essetq; necessarium alterum eligere, quum ambo simul conuenire nō possent: rano quidem fuit eligere quod vitilis, alterum verò non omnino negligere. Propterea igitur minorem fecit femore tibiæ, non tamen vix in minorem, vt non postea in tutò ipsum portare. Ad hæc, si abiq; articulus fuisset constructum crus, nec extendi posset, nec flecti: in multas autem articulationes diuisum, lubricum ac fallax esset adeò, vt nunquam constanter vno crure stare possemus, quin confestim circumverteremur, & caderemus. Quare ipsa prudens natura, tantum ex vtroq; accepit, quantum neq; motus facilitatem, neq; firmitatis securitatem vitaturū erat. Iam verò adnata ossis ipsius femoris, adeò congruentes in tibia cavitates sortiuntur, vt neq; laxus sit incessus ipsorum, neq; motu difficilis propter loci angustia.

Circumposita quoq; ligamenta continent articulationem, adeò vt flectentibus nobis aliquando, aut extendentibus plurimum, femur à tibia non excidat. Patella quoq; vocata, os cartilaginolum, anteriores partes articulationis omnes cõfcerit, prohibens quidem & ipsum fymur probaliter ad anteriora, atq; ne nos cadamus haud modicam præbens vitilitatē. Quatuor enim quum sint regiones circa articulum genu, anterior, posterior, dextra, & sinistra: anteriori quidem, cum magis fallaci, cæterisq; magis laboraturæ, appositus patellæ: externæ, quæ periculis magis obnoxia est, quam interna, vnum ligamentum rotundum, validissimq; simul cum sinetrali cuiusdā musculari applicuit: internæ alind ididit ligamentum. At posteriori, plus nimirum laboraturæ, quam passuræ, neq; os neq; insigne ligamentum appositus, præter lata illa & tenuia, quibus omnis articulus copulatur. Omnes porro musculi in femore, fenario numero ambiuntur. Tres quidem maximi, qui in anteriori sunt femoris parte, recti ad genu feruntur: quorū vnus quidem implantatur patellæ, duo autem reliqui, vnum maximū gignunt tendonem, qui dilatatus, inheret enā toti patellæ, cõnstringens ipsam prorsus, & coniungens subiectis. Postea verò, præterfectus articulum, inseritur anterioribus partibus tibiæ, ipsam, si tensus fuerit, attollens sursum, & totam extendens genu dearticulationē. Alij verò duo musculi vtroq; prædictorū trium partē, hic quidem externus, ille autem internus, ad laterales tibiæ inseruntur partes, oblique motui vtroq; præfectus. Qui nanq; externus est, foras abducit: alter verò, crus intro adducit. Enastitur autè hic quidem, ex cõmissura ossium pubis: ille, ab extremis partibus coxæ. In medio inter hos spatio, aliz tres sunt musculorum explantationes, ordine posite, parvis moribus ipsum genu mouentes. Flectit enim genu, & ad interiora adducit tibiæ is, qui est interiori coniunctus. Abducit autē foras simul flectendo, is qui tangit externum. Reliquus verò, qui & medius omnium est, in femoris caput internum insertus, flectit quidem totum quoq; femur, cum eo autem simul & tibiā attrahit. Qui super est alie

Tibiæ esse motorem femoris.

Adnat a femore.

Ligamenta femoris tibiæ ut struunt, Patella vj.

Quæ regiones quatuor, quæ hinc prædictis sollicitantur.

Femoris vnica h. fen.

Impietas summa quæ sit, bonitatis diuine spemini perficiamus. Virtutis tibi flagit.

Conditoris aris splendescere etiam in virtute materia. Idem reddat artionum pulchritudo materia.

Artificem reddat stupidi pulchritudo artificis.

Hominis esse interea statum. Solem esse pulcherrimum omnium quæ sunt in mundo.

Solem esse medium inter errantia fydera, infimum autem in fydera.

Maximum esse mundum, & pulcherrimum rerum omnium.

Animal esse veluti parvū mundum.

Oculum esse organum lucidissimum, & quamissimum soli.

Pes est veliculu cerebri. Cerebrum pedis veliculu.

Plantæ pedis vasa famulati vniuersum sensum.

Fibula extrinsecus tibiæ est attentæ. Fibula vitilis.

Fibula vitilis.

Fibula vitilis.

Fibula vitilis.



novem musculorum articulationem ipsius genu moventium, strictus & longius ex ossis ibum ortus tollit sursum tibiam, in illa maxime figura cras totum statuens, in qua emollescentes & subigentes sursum ferimus pedem ad inguen alecticus cruris. Præter hos omnes, est parvus musculus popliteus, qui spectat genu. Porro primus actio cruris, cuius gratia factus est, ambulare est: ad quam tribus illis magnis musculis ipsum cras extendentibus (quibus debetur robur totius ferè motus qui fit in genu) maximè obvis est opus, quò nimirum toti cruri extensionem rectam suppeditent. Tribus autè his tres opposuit retrorsum in sura, non equè robustos tamen, neq; in tendo nec, vt illi, validos desinentes, quum non fit æqualis dignitas extendendi genu motus, & spectentis. At motus cruris ad latera, ex abvoluta est. Descendant autè musculi scemoris semper ad caput tibie, præterita articulatione. Nam què admodum qui per quosdam funiculos ligneos si mulachra movet, vltra articulos ad caput membri movendi, eos applicant, ita & natura multo prior quenz articulum fabricata est. Ex dictis igitur constat liquidò, eandem còvenientia animi moribus & potentis vniuersis corporis par ticulas cunctis animalibus contraxisse.

## GAL. DE VSV PARTIVM LIB. III.

Quandoquidè nutrirì necesse erat animalis particulas: ingressus vero cibariis in corpus, vnus adest per os: communis sanè & maxima, primarij omnium via est, quæ ab ore ipso fert ad ventriculum, quasi ad promptuarium quoddam, omnium particulari commu-  
ne, in medio animalis positi. Cuius vitæ, nomen quidè propriu, œsophagus, seu gula est: commu-  
ne autè, stomachus: at promptuarium ipsum, ali-  
mentum vniuersum excipiens, illud accuratè ela-  
borat, quod iu eo quidè reperitur in vite, atq; re-  
crementum, in infernè pellens: quod verò beni-  
gnum, vtilèq; per venas quæ tum ad ipsum ven-  
triculù, tum ad intestina perveniunt, distribuens.  
Porro venæ alimentum ipsum, prius in ventricu-  
lo elaboratù, & suscipiunt auidè, & ad aliquem cò-  
coctionis locu communem totius animalis de-  
ferunt, quem nominamus hepar. Ingressus autè  
iu locu hunc, multis angustis diuisum via, vqus  
est, quem appellamus portas. Nec verò solum  
deducunt ex ventriculo nutrimentum venæ, sed  
attrahunt etiam illud ad hepar, præparantq; mo-  
do, quo ipsum, simillimo: quippe quæ natura  
sunt illi similes, & primum germen ex illo du-  
cant. Ipsum autem hepar, postquid id nutrimen-  
tum acceperit, à familiarè iam præparatù, obcu-  
ramq; sanguinis speciem referens, inducit ei pos-  
tremu omniun, ad sanguinis exacti generatio-  
nem. Ac velim impresentiarum intelligas, distri-  
butu à ventriculo ad hepar dylum, à visceris ca-  
luditate, veluti vinum iu dolio mustum, ferue-  
re, concoqui, alterariq; in sanguinis boni gene-  
rationem: iu ebullitione autem hac, ex ipis ex-  
crementis, quod feculentum quidem ac cras-  
sum est, subsidere: innatare verò, quod tenuis

ac leue existit, & veluti spumam quandam in su-  
perficie sanguinis fluat. Quorù excremento-  
rum, huic quidem quod statum & leue est, exci-  
piendo, natura ad hepar velicam quandam ap-  
posuit: illa autè, quod crassum & limosum existit,  
lenem in sinistris ventris paribus subdidit, &  
quandà veluti stomachu ex limæ regione ipsius  
splenis producit, venosum vas, ad portas ex-  
tendit, vt in nihilo minus hepar certe purgetur, si  
prope ipsum esset splen locatus. Postquam igitur  
humor, qui in cauis hepatis ad animalis nu-  
trimentu paratur, prædicta duo excrementa de-  
posuit, & ab innata caliditate coctionem exacti  
indeptus est, ruberum & purum sursum ad gib-  
bas hepatis partes ascendit. Excipit autè ipsum il-  
lic vna vena maxima, ex gibbis hepatis orta, quæ  
veluti quædam sanguine plenius, ad vtriusq;  
animalis partè fertur, superiore simul & inferiore.  
Vnde per totu corpus, in ramon scilla varios  
disseminatur. At in hac quoq; vena, multo adhuc  
humore tenui & aquoso, qui vehiculù nutrimen-  
ti existit, pleuius est sanguis. Eundè, què ille, vtrum  
præstat animalibus aqua. Siquidè ex ea vtriusq;  
nulla particula potest: distribui verò ex ventre,  
quod nutritur est, non poterat, nisi deductum  
fuisse à quoq; iu ita liquido. Hæc igitur tenues hu-  
miditates, postquid suo officio persanctè fuerint  
expurgatæ, instrumeta concava, stomachis  
aliis quidem trahentia, aliis aut eas emittentia.  
Adiacet enim vtriusq; ipsi vena caue (quæ paulo  
antè diximus maximè) paulu sibi hepate, vt quid  
quid in ipsum sanguinem assumatur, confestim  
purgetur, solisq; postea in purus eat per totu cor-  
pus, pauca omnino ipsi aquosa humiditate per-  
mixta. Inferitur autè ipsius venæ superior pars,  
ad cordis ventriculù dextru, saltem in quibus in-  
est. Porro ventriculo inest facultas quèdā pro-  
prie qualitatè attrahit: in est & quèdā alia re-  
ceptorum retentrix: & rursus alia excretrix su-  
perfluum: sicut & ante hæc omnes, alteratrx  
quedam, propter quam illis quoq; ventricularis  
eguit. Sed aliis quidem omnibus animalis patri-  
culis, quanquid eandem facultates habeant, non  
indistincta sensum eorum quæ desunt: sed in  
plantarum modum nutriuntur hæc, assidue ex ve-  
nis alimentum haurientes. Soli verò ventricu-  
lo, & maximè eius partibus, illæ quæ ad officiu  
pertinent, sensum indigentia còsulit, ad sumen-  
dum cibum animal exorantem. Quum enim  
tius corporis partes nutrimentum ex venis à ca-  
ua prognatis trahant, ipsa rursus caua ex venis  
hepatis, hæc rursus ex eis sursum ad portas  
feruntur, illæ rursus ex ventriculo & intestinis:  
certè vbi nulla iam superfit amplius particula, à  
qua ventriculum capere oporteat, necessum est  
animalibus, extrinsecus ipsum repleri: in eoque  
differuntiam animalia à plantis. Siquidem hæc,  
est quam maximè illas quatuor facultates, paulo  
antè memoratas, habere còtingit, eis tamen  
sensum eoru, quæ sibi desunt, nō inest. Non enim  
per os nutriendæ erant, promptuarij copiosi ali-  
menti subsistia habentes terram, cui collarentur  
atq; vntis semper alimenta addidit. Ipsi ve-  
rò subsistant animalia, præterquam quod mul-  
tum à terra differt, iusuper etiam motus volun-

*Velut felix seu  
canis repargere  
se vole.*

*Lenem in fini  
pro locatu sui  
more velut  
lucum iucum  
de sanguine.*

*Vena caua di-  
sternat.*

*Sensu esse vehi-  
culi sanguinis*

*Aquam hanc  
quæquid nutri-  
trix, deducere  
tamen etiam  
in per corpus.  
Serum repargi  
aut, vnde à  
sanguine.*

*Vena tenuis in-  
feritur in cen-  
trum ventriculi  
dextrum.  
Ventriculo inest  
facultas natu-  
ralis potens  
sua fundere  
tates.*

*Ventriculo felix  
sensum adven-  
tis còsulit  
nutrimentum.*

*Animalia à  
plantis quæ dif-  
ferunt  
Plantis vna in  
esse sensum eor-  
um quæ sibi  
desunt.*

*Animalibus  
ad esse arbitra-  
rium motum.*

tarius adeit, & loci ex loco mutatio: vnde impossibile fuit ipsis, plantarum ritu, fugere humorem ex terra. Opus igitur erat vñ quoddam familiaribus sibi nutrimentis nutrir, eaq; id temporis edere, quo ventriculus indigentiam perciperet. At quum nulla animalis particula ex se sensum habeat, affluere ventriculo huiusmodi facultate aliunde oportebat, veluti per canales à principio sensifico. Cuius rei grana ad cum par venientium haud mediocriter superne defertur, & disse-

*Nervorum partium diffinientia in ventriculo.*

*Thoracem efficitur ex eo ventriculo.*

*Fundum ventriculi consistit in dextra animalis parte, iuxta que finem ab hepate. Lumen ventriculi subter fundum ventriculi partem. Ventriculus est rotundus. Figura ventriculi quae nuda. Figura ventriculi cum maxilla. Ventriculus est oblongus.*

*Ventriculi orificia superiora, cum inferiora latera.*

*Gulae efficitur partem ventriculi.*

*Tunica ventriculi & gulae quae sita est intra.*

*Intestinorum ambobus tunicis habere vellet testis.*

*Intestina ut in dextra facilius attrahantur.*

*Tunica ventriculi gulae, et omnium quae in ore consistit, cum sit una et eadem.*

*Intestina efficitur ad distributionem coadacta.*

tiem eorum quae transglutinantur. Ob id ipsum tunica quae communis ori, stomacho, & ventriculo existit, rarior & mollior fit paulatim, vique ad fundum ventriculi. Neq; ob aliam rem quamplurimae quidem ad singula intestina immittuntur venae: paucae autem ad inferiora ventriculi, paucae etiam ad eius oris partes: & omnino ob id quod ad esophagum hic liquidum via erat ciborum tandem: ventriculus vero, coctionis organum ut intestinum, distributionis. Ambit autem ventriculi hepar, amplexaturque quibusdam locis seu digine, ut ille quidem ab hoc, cibaria vero ab eo calefiant. Habet etiam ventriculus ut ex sinistris longum lienem proterfium, à quo sinistrix illius partes calefiunt, sic retrosum ipsius & spinales mucus: illam quidem eum propugnaculum quoddam densum: hanc autem veluti subfisterniculum molle, à quibus eius calor fouetur. In reliqua vero ipsius anteriori parte, calefactionis gratia, generavit natura omentum, corpus denium, simul & leue, ac praeterea calidum: cuius argumentum est, quod facile in flammam vertatur. Nihil siquidem frigidum prompte comburitur. Id igitur corpus, ex duabus quidem tunicis densis atq; subnibus, sibi ipsis incumbentibus, quampulchrum vero arteriis & venis, pinguedinem non pauca constant, per totum ventrem extenditur, ut illius caliditate foueat. Quare quibus pars liuius, ob vulnera, adempta est, omnes infelicitate concoquant, plurimisque foementis egent. Est & alia membrana peritonaeos dicta, quae viscera omnia, quae in regione ventris sub septo transuerso sunt, contegit, ab eisque musculis incumbentes distinguit, cuiusque excretionem aridorum excrementorum, ac breuiter impedimento est, quo minus facile stantibus (quo rum tamen pars ruit) pars crepitu ventris solet saepe vacuari, sicut & halitusiosior pars concoqui, ubi viscera sunt valentia) distendantur intestina & ventriculus, singulis priuam firmissimum tegumentum existens. Siquidem anterioribus ipsorum omnium partibus est praetensum: procedit autem illinc ad dextram: & sinistram per illa, vique ad lumborum vertebrae: quo fit ut singulis in refectis ac viceribus, praeterea tum arteriis omnibus, venis, & nervis circumdantur. Quod vero ad reliquas eius extremitates pertinet, superior quidem se pro transuerso inferne adhaerescit inferior autem omnibus pubis, & praeterea ilium. Porro in instrumentorum in illis duabus sitorum partibus, quae superiores quidem parte sunt (cuiusmodi est ventriculus atq; hepar) peritonaei portione septo transuerso inferne adnata: quae vero inferiori (ut tum vesica tum intestina) ab ea quae omnibus pubis haeret, vestiuntur. Quod autem a septo transuerso adnascitur ori ventriculi extrinsecus, vntur in quae vntur à dorso ascendunt: est id principium generationis tunicae ventriculi, extrinsecus ipsum vndique ambiens: quae sane operimentum quoddam ad propugnaculum fecundae tunicae carnosae circumposuit natura, eaq; existente crassa pro ligamento vntur, ad ventriculorum cum corporibus quae iuxta spinam sunt, colligandum. At vero omentum oritur ab eis peritonaei partibus, quae à dorso vnturque

*Ventriculi orificia superiora & inferiora.*

*Ventriculus cum amplexatur hepar.*

*Lien. Spina.*

*Omenti natura.*

*Prigulum nihil propter cibum. Omentum constitutum ex vntis.*

*Peritonaei constitutio & vntis.*

*Peritonaei constitutio.*

*Ventriculi tunica tunica.*

*Omenti origo.*

ascendit, sibi invicem occurrentes ad aliusimam partem ventriculi. Quum enim ex illa dorsi regione produxisset natura venas & artenas quam plurimas ab utroque magno vase, simul produxit cum eis vtriusque peritoneas particulas, vniuscuiusque prædilectorum vasorum partem ad sefe attinentem, circumventientes & colligantes. Mediā autem inter vasa regionem contineant peritoneas portiones, veluti filamenta quædam, sibi invicem incumbentes, ibique plurimum adipis

Omentum pinguedinem vscum.

Epiploon. Hepatis corpus.

Hepatis corpus primum sanguinis vscum vtriusque principium.

Materia in contraria aduol per totum corpus meum. Sicut enim esse multum in corpore hepatis. Vnde non solum sanguinis corpus.

Pori vscum solus.

Hepatis tunica. Hepatis vscum. Hepatis arteria.

Hepatis vena.

Materia materiam in contraria materiam diffundit. Vnde quod sit in hepate, ab eo non esse vtriusque. Porro in bilem corpus contrarium situm.

Vnde quod sit in hepate, ab eo non esse vtriusque. Porro in bilem corpus contrarium situm.

Vnde quod sit in hepate, ab eo non esse vtriusque. Porro in bilem corpus contrarium situm.

motum, neque ad sensum futuro ex vscu animalis: quare cum autem non omnino in vscus, aut non in totum inseruit. Eiusmodi liquidum facultatis hepatis principium est, ex quo actiones sunt tum ipsi, tum eius vscis conceditur, cuiusmodi & plantis insunt. Non licet autem recte invenire viam vllum cuiusvis particule, totius organi actione ignorata. Porro hepar facultatis nutritivæ principium, copulatio oportuit duobus principis aliis, sicut & illa sibi invicem. Hepar siquidem, pecus quoddam (ut inquit Plato) est agreste, ipsamque nutrice colligatur necesse est, si modo hominum genus sit duraturum. Ad ratio, quæ homo est, sedem in cerebro habens, veluti famulam quandam atque aduicem irascens ad accersit, quæ sibi ad vtriusque hoc pecus auxilio sit. Quo sit, ut ipsa principia tria, per processum, vituta, nervos, venas, & arterias, coniuncta, ceditor no sit sit machinatus, ut sibi vicissim obsequerentur. Ad hæc vero hepar, ventriculo, intestinisque omnibus per venas, & colligantem ipsa tunica inunctum, proprio etiam tegmine membranosio, quod oritur a peritoneo, a proximis corporibus colligatur. Omnia siquidem tunica hac obvolvuntur. Magno præterea alio vinculo, septo transverso: atque alius quibuscumque membranosio, & parvis, costis nostris connexum est. Copulatur etiam & cordi hepatis intercedente septo transverso, vitute medio inter vtriusque vscus. Quippe vena causa, septum transversum permeans, ab hepate ad cor ascendit. Cuius vena induratum crassum, tum venam ipsam, tum totum vscus, ad septum transversum alligat. Quum autem vena ipsa eo in loco læsi, omnibus quæ in toto animali sunt venis, esset futura communis (vulnerata enim ea, aut diuisa, subito velox sequitur mors) haud ea re natura, in anterioribus quidem eius vena iuxta dictam regionem partibus, ad maiorem securitatem, crassissimum inducuntur: in posterioribus autem tenuissimum, apposuit. Ille enim his facilius laceratur. Quia vero septum transversum non solum d naturalibus distinguit vscalia, sed etiam organum nec minimam respirationis existit, vtriusque vicino vscum, ne videlicet aliquid comprimerent, quantum fieri potuit adduxit cæditur nosse. Porro lien limosus & melancholicos succos in hepate geutos trahit per venosum meatum: attractos autem, non protinus in ventriculum cernat, sed ipse prius per multum ocium conficit atque immutat, vena ad hanc actionem possimum ipsis arteriis, quæ certè multæ & magnæ per totum vscus feruntur: quarum assidua motione simul & innata caliditate, frangi & elaborari crassi illi succi possunt. Quicquid igitur eorum in succum huius visceri maxime convenientem translatum fuerit, alimentum spleni efficitur. Quod autem prius in vscu elaborari non potest, hoc ad ventriculum per alium venosum stomachum splen eruat. Est autem splenis corpus rarum admodum atque laxum, spongiosum, sic ut crassos & melancholicos succos facile trahat, excipiat. Cæterum splenis caro, tametsi laxa sit, à pulmonis tamen carne magno spatio relinquitur. Laxissima siquidem ea est & le-

Hepar cum se colligatur peritoneum. Vnde pars in vscu non potest actione de se ignorata.

Hepar agreste est pecus.

Ratio (quæ est homo) est ovibus colligatur.

Principia animalis tria: vituta, nervos, venas, & arterias, coniuncta, ceditor no sit sit machinatus.

Hepatis corpus colligatur.

Septum transversum intercedente septo transverso, vitute medio inter vtriusque vscus. Vnde causa inducuntur.

Septum transversum intercedente septo transverso, vitute medio inter vtriusque vscus.

Septum transversum intercedente septo transverso, vitute medio inter vtriusque vscus.

Septum transversum intercedente septo transverso, vitute medio inter vtriusque vscus.

Septum transversum intercedente septo transverso, vitute medio inter vtriusque vscus.

Septum transversum intercedente septo transverso, vitute medio inter vtriusque vscus.

Septum transversum intercedente septo transverso, vitute medio inter vtriusque vscus.

Septum transversum intercedente septo transverso, vitute medio inter vtriusque vscus.

Septum transversum intercedente septo transverso, vitute medio inter vtriusque vscus.

Septum transversum intercedente septo transverso, vitute medio inter vtriusque vscus.

Septum transversum intercedente septo transverso, vitute medio inter vtriusque vscus.

Septum transversum intercedente septo transverso, vitute medio inter vtriusque vscus.

Septum transversum intercedente septo transverso, vitute medio inter vtriusque vscus.

Septum transversum intercedente septo transverso, vitute medio inter vtriusque vscus.

Septum transversum intercedente septo transverso, vitute medio inter vtriusque vscus.

Septum transversum intercedente septo transverso, vitute medio inter vtriusque vscus.

Septum transversum intercedente septo transverso, vitute medio inter vtriusque vscus.



par ab intestinis, in vnam omnia venam coëgit, quæ ad portas est sita: quæ etiam, vena quæ tum ad ventriculũ, tum ad splenẽ fertur, enascitur. Simuliter & arteriæ omnes in vna magna dorso incumbenẽ, pari modo cõtrahit. Ne autẽ venæ ipsæ longo ductu perumprentur, tunicæ colligant ac vestiente intestina, similes peritoneo membrana, hoc est, mesenterium, produxit quæ vasorum singula induit. In spatis sed inter vasa inanibus, eandem hanc tunicam, sed tantũ duplicem, applicans, ad angulosq; vasorum, quæ in vnum coeunt, carnosam quandam naturã, quas glandulas appellamus, apponens, quod ea nimiam regio iniuriis magis obnoxia sit, valdissimum sic vinculum, præsidium, & munimentum ipsis vasis constituit, quod sanẽ totum mesenterium vocatur.

**GALENI PERGAMENI**  
de vsu partium, lib. V.

**L**ongè autem fuit satius, vnam venam portæ ab hepate ipso produci, ac deinde in varias mesentericas discissam, quemadmodum dictum est, in nutritoria membra disseminari, quàm si statim à multis paribus hepatis multæ venæ orti, in illa tandem deducerentur: id quod maximè obesset, quum ipsarum venarum, tum etiam integritati iecinoria. Vt verò æqua quidam venarum distributio esset omnibus nutritoris organis, vas autem id descendens ab hepate, sedem habere stabilem, inter ventriculum atque intestina ipsum oportuit \* ductum, incumbere ac parte subiaccnibus vertebris. Cum ipsis autem venis per totum mesarẽ arteriæ diuisæ sit etiam natura, necnon neruum vnum. Quum igitur oporteret venis, arteriis, nervis, & quartum cum eis bilis meatum, pervenire eò loci, sanè ad fulciendũ & roborandam regionem illam, in qua primũ diuiscantur & diuisuram prædicta vasa, vitæ periculo expositis, glandulosum quoddam corpus, quod *mesenterium* appellatur, fabricata natura, subtrauit simul illud, atque in orbem omnibus circumposuit, diuisioneq; omnino repleuit, ut nullum ipsorum faciliẽ iam findatur, aut concussum possit labefcisci. Quin etiam membranas fortes tum priuatis singulis vasis, tum communiter ipsis omnibus circumdedit, vestientes ac iungentes ea circumsufa omnibus instrumentis. Ad hæc autem peragenda capax ipsarum requireretur: quare primũ omnium intestinum, quod ventriculo coniunctum est exortuq; dicitur, natura quidem minime in circumvolutiones reuertitur. Quod autem hoc consequitur, circumvoluitur atque flectitur: vocaturq; ieiunum, quod semper reperitur inane, nec tantillum quidem in seipso alimentum continet. Tertium autem est intestinum quod vocant tenue: quatum cæcum: quatum *æcolum*: sextum deniq; rectum, in cuius fine sunt musculi, qui cõstringunt ac retinent excrementa. Porro exortus ipse ex ventriculo fundo descendens, per dextram partem ad spinam deducitur, atque supra illam firmatur. At verò in nino ieiuni ex eis est, quæ nullum præstant vnum, sed alia necessariò sequuntur, quæ propter ali-

quam utilitatẽ sunt facta. Siquidem & quod primum omnium intestinorum ieiunum, ipsum chylum excipiat, & quod secundum iuxta hepatis, vasorum in sefe malorum officia continens, & quod etiam bilis meatus paulo suprà implantetur ad ipsum ventriculi exortum: ob hæc inquam causas, inane semper ac vacuum cernitur. Nam præter cetera quæ citissimam ex ipso distributionem faciunt, etiam bilis ipsa nondum excrementis permixta, sed sincera & pura in id intestinum confluens, sua mordacitate illius tunicas ad celerem excrementonem excitat. Oportuit autem sic insinuari talem bilis meatum, quia breuior illi viæ erat commodior, cœu eorum etiam futuro participi, quæ natura ad tunciam vasorum eò pertinentium construxerat: & quia talis etiam eius possum expediret exceptoris bilem omnibus instrumentis, in quibus necessariò ac naturaliter indies maxima pituitosorum excrementorum copia colligitur: quam diuideret, incidere, comminueret, atque abstergere est opus. Merito itaq; natura excrementis id genus præsidium maximum est molita, acrem atque absterforum hunc succum, quem omnino oportebat vacuari e corpore, non in intestinum aliquod ano proximum, sed in primum exortum demittens, ne quod inferiorum intestinorum, externo aliquando indigeret auxilio: quam certe vbi ex prauo corporis habitu, copiosius pituitosum excrementum colligitur, leões, licitæritas, anæmicosq; omnium qui ventri contingunt morborum grauissimos, inducere solet. At verò nullam bilis portionem in ventriculum immisit natura, quamvis & ipse non pauca gignat pituitosa excrementa: quia visum quidẽ id adeo est exule, ut præsidio externo abundè corrigi possit: mala verò quæ in ventriculum confluens bilis induceret, essent tanta, ut functiones ipsius funditus deturbarent. Flaua siquidem bilis, acrem, mordentem, atque omnia abradentem, obneret facultatem. Cuius succi vomitus copiosiorum, morsus intestinorum, cardiacalgiaq; solent semper præcedere. Ventriculum itaq; quàm ieiunum, sensu exactiori præditum, bilis in ipsum confluens, cogeret alimentum prius deorsum tradere, quàm planè concoctum esset. Siquidem ventriculi propria actio est concoctio: postulant autem quæ concoquuntur, temporis diuturnitatem, quam sanè biliosus humor non parit. Rectè igitur veteres medici, vomitus à cibis in singulos menses repeti præcipiebant, alij quidem semel, alij verò bis: omnes tamen h, qualitates ipsas comedendõrum in vnum vsum acres & absterforias deligere consulentes, ut pituita omnis e corpore purgaretur. Nam quæ mordent & abstergit cibaria, biliosa omnia sunt & cacochyma. Quod autem bilis ab intestinis in corpus naturaliter sese habens non transmutatur, ipsa indicat excrementorum varietas. Siquidem in ictericia, comestorum colorem referunt, bile videlicet maximè deorsum subeunte, sed sursum in totũ corpus perlata. In sanis verò, quod humor eis biliosus in intestina cõfluit, flauo colore sunt tincti. At melancholicum excrementum in ventriculum excreuit natura, cœu nullam

Meatus bile implantatur in ventriculi exortum.

Bilis crassa excrementum excipiendo aptissima.

Pituitosum excrementum col leuissimum, quæstiferat. Bile nulli portionem deusit natura in ventriculum.

Bile flaua facit vomitus. Bile vomitus quæ præcedere solent.

Ventriculi propria actio est concoctio. Concoquenda egent tempore. Vomitus quæ ratione etiam singula mensibus veteri præcipiebant. Mordentia & absterforia ei hærere ipsi bilio sa, cacochyma quæ. Ictericis excrementis a cur videntur colorem icterici. Excrementa faciem, flaua. Melancholicum excrementum in ventriculo excreuit natura.

*Atra bilis qualem, faciliusque.*  
*Atra bilis inuasi alihum ventriculi.*

*Renis capax, quae latius.*  
*Vesica esse subditam renibus, vel ut quoddam ostendat.*  
*Vesica muscular.*  
*Vrinarij musculi.*

*Arteria in inferi in reui.*  
*Arteria sanguinem circum.*

*Ren dexter, qui superius sit.*  
*Hepar in dextro loco.*

*Tractus omnis, expulsiuus ex dextro oppositi trahere.*  
*Vrina purgan da est natura da instrumenta da instrumenta: singula aliorum excrementorum, vna cum.*

*Renū spissitudo causa doli.*

*Renis vici cū leui attritu bilem et sanguinem.*

*Sanguinem asperum renem iugulauit.*

noxam illi allaturum. Acerba siquidem, acidūque quum sit atra bilis, contrahere ipsū, constituereque, non vti dicit, sub ventre, est nata. Quare nō modo nō ledit, sed actionem ipsius etiam inuat. Nam ventriculū intendit, contrahitque in seipsum, ut cibos ad vnguem circumplectatur, renēque, quovisq; fuerint percussio. Porro ad se ceruendam vnam, natura etiam renes prope hepate constituit: quibus veluti quandam cisternam, ipsam vesicam subdidit, ad cuius finem musculū fabricata est, custodem, ne superflua intempēstue effluerent. Renes autem ipsi vesicę connectunt meatus quidam praelongi, validiq; quos *iprēnes* Graeci, nos vrinarios vocamus. Sic igitur vrina vi rectū segregatur a sanguine, & illinc per vterque ad velsa demittitur, indeque excremitur, quo tempore ratio iussit. Ceterū quum arteria, parū magnitudine qua & ipse vena, inferantur etiam in renes, indicū certē est sanguinem similiter in eis contineri, qui nimirum purgari possulet. Atq; alter quidem renū superiorē, alter inferiorē positiōe sortitur. Nam quum serum trahēdo, ita demum purgant sanguinem, certē ad vterum haberent situm, alter tractū suū in contrarium, alterius tractū moram adferre. Nuic autem vterq; agit trahē, solūq; attrahit, quum nihil sibi ē regione habeat oppositū. Est itaq; dexter quidem ren, superior ac primus, sinistēr verō inferior ac secundus: quia viciū ipsū quod purgatur, in dextero locarum erat, & plurima caux venę germina in dextram partem suā orificiū delinunt, ex ymbra hepatis ad eam venam sanguinē demittunt. Omne autem trahens, expulsiuū ex dexteē oppositū attrahit. Sed nēq; locus pariter vacuus in sinistra erat similis reui, ob splem in hepate in se reus locarum. At verō serosa humiditas expurganda, natura duo instrumenta constituit: alio nam autem excrementū singule, vnicū tantum: nam paucissimū quidem est melancholicū excrementum: copiosius autem ipso, biliosum: vtrūq; aquosius, multo cumulatus. Sed & crassissimū quidem melancholicū: tenuissimū verō serolum: atque amborum mediū, biliosum exsistit. Iam verō ipsius renū spissitudo fuit causē doli: facilius scilicet huiusmodi humiditā attrahit, atq; ex ipso necessaria reum nutritio. Si quidem orificiorum angustia, stipendiū in causa est, ut familiaris succus, syncretus, impermissusq; ad partes, quibus talia orificia vacuunt, trahatur. Quanquam nec hinc, nec renes, accommodatū sibi duntaxat eliciunt succum: verūm splen eliciat, cum illo trahit etiam aliquid sanguinis: renū verō vterque sibi plurimum bilis coniciat: multum etiam tenuioris & humidioris sanguinis. At biliosi quidē excrementi, quicquid non admodum crassum fuerit, cum vrinis permeat: sanguis verō, carni ipsi renem aspergitur, in ista fecis cuiusdam. Inde iam vaporis modopaulatim in totam ipsam dispergitur, ad laxare sitiq; etiam alimentū sibi renibus. Ne igitur cum vrinis, per abquod foraminū quae habentur in renibus, quemadmodum tenuē biliosum, ita & sanguis daberetur, densum esse eorum corpus praestiterat. Eis autem ad sui nutriti-

tionem tertio quopiam aliq; vase opus non fuit, praeter duo magna, quorum alterum oritur ab arteria quae spinæ incubat, alterū a vena caua. Verū vtrūq; bilis & vrinę velsa, purum atque ab aliis fecerunt quum attrahant sibi familiare excrementū, vasa alia, alimentū sibi suppeditant, iure optimo flagiatur. Quum autem copiosius multo serolum excrementū, quum ipsū biliosum, elicit, maiori certē receptaculo indiguit, cui ob id vena, arteria, & nervus, multo maioribus haud iniuria fuit opus. Vesica igitur quae vrinam excipit, nervos a spinali medulla, qua parte situm latū esse, inseruit natura: venaq; & arteria, a propinquis ipsi vasis. Alteri verō vesicę, quae ad iecur positionem habet, arteriam quidē & nervum, aliusque in viciū ipsū inferuntur, deducens, parū vtrinę admodū ac vix cōspicuum: at sensilem atq; conspicuā venam ab usque sunt ad portas, producit, hac tria in tra collū eius infixit: vnde vsq; ad fundū perveniunt. Pari modo & in vesicā alia maiore, ad collū ipsū vasa sex, vtrūq; videlicet tria iolent: quae quidē nuda gratia membranas quibūdā tenuibus obvoluit, ac per easdē ita sibi mātū cōiunxit. Eorum autem in ipso stant primū ingressū duoslorum huius, pars quidem in totam vesicam distenduntur: pars verō aucta fertur de orisum, secūdu collū, exiguū quidem in feminis, magnū verō in masculis, quod huius particula quadam insigni, ad extremū collū vbiq; sita, exsuperant, quae dicitur coles. Alia itaque per ea vasa, quae excrementa fecerunt, nutrantur, ut lien & renes: alia aliis quibus alerentur, eguerunt, ut ipsa vesica. Habent autem & renes ipsi, nervum, quantum hepate, lien, & bilem excipiens vesica: quibus omnibus exiles omnino sunt nervi, in suis ipsorum tunici conspicui extrinsecus, sentiendi gratia. Tres namq; scopi nature ipsi in ne uorum distributiōne exstiterunt: primus quidē, vrsensorius instrumentū sensum impertit et: secundus, ut motorius motum: tertius, ut omnibus aliis facultatem daret, qua sibi infesta dignoscere. Porro sensus causa, linguae, oculis, auribus, maximi sunt nervi tributi: necnon partibus manuum interius, atque adeo ipsius orificio ventriculi. Sunt enim quodammodo & haec sensoria. Si quidē per manus ex tactu est digno certifici ma. Orificiū autem ventriculi sensum habet alimentū deficientis ipsi animali, quae fames nuncupatur. Secundo autem loco, in muscularis, moras voluntarij instrumenti, reperire est nervos maximos. Ad discernenda verō quae dolorem adferunt, nutritoris organis aliis quidem liberalius, aliis autem parcius, pro cuiusq; nimirū constitutione nervos largita est natura. Nam si quibus afficiuntur in iuriis, eas non sentirent particulae, animalia vtrig breuissimū evertentur tempore, facile ab acerbis excrementis exca. Ob id in singulas circumvolutions in teinorum, singula diffeminantur nervi, perinde ac vena, & arteria. In hepate autē, nervus insertus est minimus, ut quod musculari ritu haud quaquam moveatur, neque ut in testina, sensu exquisitiore egeat: haec quippe acrimonia retrinētorum exasperantur: vnde dysenteria, si ab atra bile inciperit, letalis est.

*Renis ad sui nutritionē nō egere alius vasis, quare quā conueniens sit.*  
*Vesica vtrinę cor ad sedū nutrantur alia vasa, praeter portam, delatant.*

*Vesica vtrinę quae vasa, vnde excremitur.*

*Vesica vrinariae sex vasa.*

*Coles.*

*Nervi exilib, quae sunt practica.*

*Scopi natura propoliti circa nervos distributiōnem suam tenent.*

*Nervi quibus gratia sensus tribuit.*

*Tactu sum per volem manus expulsiuū.*  
*Fames finis.*

*Nervi ad prius pceda castra.*

*Dysenteria incipit ab atra bile letalis.*



Hepar à qua  
bus instrumentis  
se purgatur.

Trabi excre  
menta non posse  
ab organo ab  
que conservan  
tibus aliqua.  
Nihil à simi  
liari insulari.

Vesica vrinaria  
ad maiori  
sensum, plures  
ex materia ner  
vis notata tri  
bus.  
Vesica vrinaria  
tunica.

Tunica instru  
mentaria inter  
na à interna.  
Fibrarum dis  
tinctio à refu  
sa.

Intestinum mag  
attrahere, nec  
retinere neces  
sum esse.

Vesica verine  
sentiam similem  
esse, foris  
peritumens  
distinctionem  
fibrarum.  
Ventriculi mu  
cosa omni gra  
tu fu duplex.

Brachium com  
mune in qua  
invenitur fusi  
londo.

Ventriculorum  
membrum in  
se aduicte.

Instrumenta  
alimenti pri  
mo adfusa.  
Instrumenta  
alimenti fusa  
da.  
Instrumenta  
alimenti ter  
tia.

est, ut inquit Hippocrates: hepar verò à qua  
tuor instrumentis purgatur, duobus quidem re  
tibus, tertio autem spicis, atque adeo quarta ip  
si inherente vesica. Quæ instrumenta quatuor,  
quod à propriis excrementis nihil acceptura es  
sent incommode, sensum maiorem non posside  
runt. Nec enim trahere huiusmodi excremen  
ta potuissent, nisi qualitatibus communitas quorundam  
cum excrementis ipsis intercessisset. Nihil autè  
ab eo quod cognatum & familiare est, dolore a  
liquo afficitur. At maior vesicæ, quæ lori recept  
aculi est, uti lotiud, quod biliosius acrisque  
est, repente excorietur, magnas sæpe noxas adie  
ret. Quare ut sensu prædicta effertur, plures,  
& eos quidem maiores nervos, ipsi natura tribuit:  
sicut & validiores quam alia tunica, quod pas  
sum distendenda & evacuanda esset. Porro tuni  
cæ quæ prædictis omnibus instrumentis extrin  
secus sunt cinnauectæ, nonnullæ quidem re  
tinent ipsæ, omnes tamen simul figura existunt  
araneis similes: quando quidem earum nulla in  
fibras insit internarum dissolvitur, quæ ipsorum  
instrumentorum sunt proprie. At interne, quæ  
corpora ipsa paricularum continent, in ven  
triculo quidem ac stomacho ducit, fibras quide  
m orbiculares externa, expellendi videlicet  
gratia, & obliquæ interna, gratia attrahendi re  
tenuendi, habuerunt. Intestina autem (ut quibus  
nec attrahere, nec retinere necessum erat, sed co  
tractus vadique prorsum pellere) quum simplici  
et motu, simplices quoque fibras foris sunt.  
Ceterum vesicarum tunica, rectos, & circula  
res, & obliquos possident villos. Vna enim quæ  
sit vtriusque vesicæ tunica, ut omnes species motus  
consequeretur, omne genus fibrarum ob  
tineat. At verò in ventriculo tunica ducit con  
structæ sunt, triplicis vis gratia: variarum scilicet  
actionum, patiens difficulatis, & crassitudi  
nis. Quippe ad concoctionem ciborum, oportet  
crassum esse atque carnosum ventriculum.  
Quæ cuncta sanè est, cur quibus corpus ventriculi  
est gracile, si deterius concoquant, quum quibus  
corpulentum. Ergo vtriusque vesicæ, dantes ad ver  
sus iuvantis data est, quæ tunicarum tenuitatem  
pensaret: coquendi verò instrumentis, crassities,  
quæ mollitiam emendaret, ac obos calore fove  
ret suo, obtigit. Iam ut meatus bilis, eam susci  
pientis vesicæ, sic poro vtreteris, substantia corpo  
ris, maiori vesicæ sunt similes. Et quemadmo  
dum ille quidem in intestinum, ita hic oblique  
intrò in laxiore sinum vesicæ inserti, veluti mem  
branam quandam ab interna parte succidunt,  
quæ ab excrementorum quidem intrò intrumpen  
tum impetu evectur, ac patefit: reliquo verò  
tempore omni concludit, ac cõtrahitur, meatuique  
operculum tam exquisitum efficitur, ut non so  
lum humoribus, sed enà statibus, reditus omnis  
si interclusus. Etenim prima & principalis  
nutrimenti instrumenta sunt, quæ conco  
quunt, vniq; alimentum aliis transmutant. Sec  
unda verò quæ purgant, quæ deducunt, & ex  
crementum excipiunt. Tertia, quæ excrementis  
excrementis finem destinata: quorum alia quide  
m effluuium intempestivum ipsorum cohibent,  
ut musculi sedem constituentes: alia verò tem

pestivum incitant, ut musculi epigastri omnes.  
Eorum igitur quæ sunt ad anum, vni quidem  
est sine parte, transversus extrenus ipsius oræ cir  
cumfusus, ut rectum in intestinum ad amicum &  
foriter claudat. Cuius musculi substantia est in  
ter cutem ac musculum media. At reliqui duo  
musculi obliqui, vtriusque vni, supra ipsum rectum  
dum insident sarum reventum, ubi in contrari  
bus ipsa magnus probabunt. Ceterum octo ab  
dominis muscularia, reu quidem duo, fibris  
similibus, per medium omnem ventrem rectos ab  
bras foriter, ab osibus peitoris ad pubis os  
ita extenduntur, ibique sese marae contingunt. A  
lii verò duo transversus, & ipsi per omnia similes,  
vniuerum peritonæum circumtegerent, rectum  
cum antedictis efficiunt rugulum. Reliqui qua  
tuor sunt obliqui, super hos incipientes: quoru  
duo quidem, fibras ab hypocondriis ad alium  
osia extensas habent, alii autem duo, hos in spici  
em & gratia htere interfocantes, ab ipsis ad  
hypocondriorum partes descendunt. Omnes  
tamen introitos ac medios musculos desinunt,  
fius tenuioribus nervis, producentes semper  
equales ac similes fibras. Ergo quum fibrarum  
positiones omnino sint quatuor, musculi quoque  
vtriusque eorundem merito fuerunt, à quibus opo  
rantibus simul, alia excrementa, cru manibus  
quibusdam cõpressa, foriter expelluntur, conse  
rente ad id plurimum septo transverso, musculo  
magno, & rotundo, qui spiritus instrumenta, à  
naturalibus membris distinguunt. Si quid si  
prior est omnibus illis autè subcurat, exitus  
enim respirationis organum. Hic muscularis, ab ip  
sius peitoris ora inferiori (vnde etiam capita ma  
sculorum rectorum abdominis pendent) superpo  
ris exortus initium ducens, atque hinc ad fines co  
strum northar vtriusque descendens, posteriori  
parte ac in seipso obliqua admodum sit. Sine  
hoc ligitur musculo, aliorum octo, qui in abdomi  
ne sunt, cõpressio, nã magis ad inferiora, quàm  
ad superiora ventris excrementa propelleret. Si  
ius autem cõtrahitque illorum compressionis ad e  
dente, necessum est retinimenta ipsa, veluti dua  
bus cõpressa manibus, applicatis quidè subipsis  
ad carpum, distantibus verò inferne plurima, ita  
deorsum trahit, ut ne tantillum quidam ipsorum  
sursum ad stomachum remeet. Ne autem vnicus  
existens hic muscularis ab octo abdominis mul  
tis & magnis in thoracem suum magnè evertet  
tur, natura in subsidium eius, musculos interco  
stales construxit, qui thoracem ipsum cõtende  
re, atque intrò contrahere possint. Ne verò intro  
primendum: efflationes contingerent, nimirum  
larynge aperto, musculos non paucos cir  
cumposuit laryngi, quorum alios quidem clande  
dere ipsum, alios verò aperire insinuat. Abvntur  
autè natura ipsis abdominis muscularis (quos, ut  
propugnaculum subicetiarum partium existens,  
excretionisq; instrumenta, construxit) tum ad  
magne efflationis ac vocis generationem, tum  
ad partu edendum, atque adeo ad spiritus cohi  
bitionem. Porro musculus qui extrinsecus in ve  
sicæ collo consistit, priori quidem ratione, ubi  
constringitur, pellit quicquid in meatu conti  
netur: posteriori autem, cum claudit: quanquam

Inducimus  
musculi  
trahit  
abdominis  
musculi

Octo abdomi  
ni musculi  
Reu abdomi  
ni musculi

Transversus abdo  
minis musculi  
Obliqui abdo  
minis musculi

Excrementa ad  
ni à quibus ex  
crementis ma  
scula.

Septem trans  
versum distin  
guunt instru  
menta à naturali  
bus membris, cui  
stus respirationis  
organum.

Septem trans  
versum distin  
guunt instru  
menta à naturali  
bus membris, cui  
stus respirationis  
organum.

Septem trans  
versum distin  
guunt instru  
menta à naturali  
bus membris, cui  
stus respirationis  
organum.

Septem trans  
versum distin  
guunt instru  
menta à naturali  
bus membris, cui  
stus respirationis  
organum.

Septem trans  
versum distin  
guunt instru  
menta à naturali  
bus membris, cui  
stus respirationis  
organum.

Septem trans  
versum distin  
guunt instru  
menta à naturali  
bus membris, cui  
stus respirationis  
organum.

Septem trans  
versum distin  
guunt instru  
menta à naturali  
bus membris, cui  
stus respirationis  
organum.



*Vesicam claudi posse alioq. tum-  
fieri.*

*Vtreum obli-  
qua inferiorem  
vtr.*

*Fibra que qui-  
bus alicuius  
ferunt.*

*Collis vesicae fi-  
tur.*

vesica ipsa claudi etiam sine musculo possit, quum praterquam quod meam habet angustiam, omnia etiam ei fibrarum species insit, vt ventriculo atq. matrici. At verò, ne quid denuò à vesica sursum ad renes remeet, facit ipsorum vtreorū obliqua in vesicam insertio: ne verò continua fiat vrinæ excretio, præstat fibrarum ipsius vesicæ varietas, sed obliquarum præcipue. Quum enim omnes intendit, vndiq. circum ea quæ continet, vehementer astringitur, donec supra modum referta, grauetur pondere. Quum verò excretioni accingitur, cæteras quidem fibras laxat, solas autem intendit transuersas. Quo tempore musculi quoq. suppetas feruntis quidem qui ad meatum est vrinarium, suum ipsius principium, quo vesicæ adnectitur, laxans: tunc verò omnes abdominis musculi, vt intro propellant vesicam, & comprimant: contra illarū postremò vndiq. ille idem qui circum collum est, premensq. foras id locū quod in meatum subient, atq. ipsam deniq. excretionem accelerans. Subest autem vesicæ collum, ipsius pubis ossibus: subiacentq. et inferne, rectum intestinum, os sacrum, atque in foemina collum similiter vteri: quolo co omni, secundum animalis longitudinem fertur deorsum, quo vsque extra ossa emicuitur. Inde aut secundum peritonæū fertur sursum, vsq. ad virgæ vniū exortum: post, hinc rursus per ipsam virgam, instar S. Romanæ literæ, obliquum. Sed in mulieribus vnicam habet meatus luc in collo vesicæ flexionem: in viris autem secunda, veluti auctanum, accessit. Nam quid igitur in ipso subsisteret, musculus ille multis transversis prædatus fibris, circūsus est, qui simul vrinā à vesica ad pudendum vsq. deducat.

## GALENI PERGAMENI de vsu partium, lib. VI.

*Thorax quid.*

*Pulvis esse om-  
nes inter, quid  
carneis pulve-  
re.*

*Pulvis vocis et  
respirationis est  
instrumentum.  
Respiratio, cor-  
dis causa est in  
venis.*

*Inspiratio  
vtrius.  
Expiratio  
vtrius.  
Cor dilatatum  
trahit.*

*Vocis materia.*

*Pulmonis vtrius.*

Quod à costis vtrinque circūscribitur, pertinetq. anteriore quidem parte ad pectus, ac septū transversum, decumbit verò posteriori ad spinā, hoc omne spatium medici appellant thoracem. In cuius amplo sinu, piscibus quidem cor solum continetur: ob eamq. causam genus ipsorū vniuersum est musci, quod pulmone ad vocis generationē necessario instrumento caret. Nam omnibus, quæ aër inspiratur, animantibus, ac rursus ipsum ore expirat, pulmo impleuit thoracis capacitatē, vt qui vocis simul ac respirationis instrumentū exiit. Cæterum à thorace illi motus in initū accedit. Porro visus respirationis in animalibus, cordis causa est inuentus, & quod ipsum aëri subitanti requirit, & quidd simal etiam calore effluens, vt refrigerio defideret. Ac refrigerat ipsum inspiratio quidem, frigidam ei qualitatem affundens: expiratio verò, quod in ipso feruet & quasi combustum & fuliginosum est, ex eo profligans. Atq. attrahit quidem dilatatum, in anitū verò, contractum. L-  
60 pulmone autem quod cui inuile expirandum erat, materia vocis efficiatur. Trahit igitur cor aërem externum, non protinus per fauces sed vtrinque medium pulmonem, quasi spiritus promprium quoddam statuit natura, qui ambabus si-

mul actionibus seruire possit. Nam si cor dilatatum ex faucibus traheret, rursusq. astrictum in illas aërem emitteret, eundem esse concentum repationis, & pulsus cordis, esset necesse: id quod certè nō solum ad perfectè viuendum, sed ad viuendum etiam incommodaret. Nam nec verba diu continuare possemus, nec mergi in aquam, metu suffocationis, nec deniq. sine inspiratione sumum, aut puluerem, aut pestiferā aliquam aëris qualitatem percurrere. Vnde necessum esset, vel aërem pestilentē intemptuē inspirare, vel omnino nihil inspirantes, suffocari contentum. Quo circa natura cor ipsum, non tantummodo respirandi instrumentū fecit, sed ipsi extrinsecus pulmonem ac thoracem circumdedit, qui spiritum illi simul appararent, & vocem animanti efficerent. Quum autem ex pulmone cor spiritum ducat, eimq. rursus in pulmonem reddat, licitum est nobis alia voce vti, & quidem diu sume: alia etiam nihil omnino spirare, cor de nihil impedito. At verò pulmone quidem, veluti subfultus cordis mollitudine sua exceptum, thoracem autem, tanquā septum prævalidum tutelæ gratiā, nō cordi modo, sed pulmonibus circumdedit natura. Cor autem in medio omnino thoracis sinu, secundum omnes dimensiones ad æquilibrium consistit, loco quum ad securitatem aptissimum, tum ad æquilibrium ex toto pulmone refrigerationem opportunissimo. Exiit tamen illi ad laeuam regionē sinum, ob finitū ventriculi pulsationem, quæ circa finitram mammam sentitur. Verum ad eius dextram, ventriculus etiam alius exiit, ad venam cauam atq. hepar conuersus. Totus autem thorax secundum mediam sui longitudinem, à validis quibusdā membranis (quæ anteriori quidem parte, ossi pectoris: posteriori verò, spinæ vertebri inseruntur) in duos ventres distinguitur: vt si fortè magno vulnere in alterutram eius partem accepto, respirationis munus eius partitis perierit, reliquas venter in columis, dimidiū saltem actionis retineat. Nam si vterque venter consocius fuerit, voce simul & respiratione plane destitueret animal. Ad hæc verò, arterie quæ in ipso thorace sunt, & venæ, & nerui, & ophiogastri, ac deniq. totus pulmo colligantur toti thoraci, teganturque omnia, hisce membranis obducta. Ne autem vena caua (quam necesse erat per medium septum transversum sursum ad cor ascendere, atque inde rursus ad nuncupatum iugulum) à respirationis organis, quæ in assiduo motu versantur, quicquam collideretur, dictæ etiam tunice præstant, quæ tum illam, tum germinā illius, adacennibus particulis colligant, ac totam tunice molem robustiorem efficiunt, ipsam venam sursum veluti manu ducentes. Auxilium autem eius vix partibus singulatim paratum, est triplex. Nam in medio quidem thorace, cor porrigit illi fortem productionē atq. neruosiā, ranquam dextram quandam. Parte verò inferna quintus pulmonis lobus (qui in dextra parte consistit, quig. propter eam duntaxat venam, quæ per dextrum latus ascendit, exco gitatus est) sensim illi excauatus subicitur. Superna deniq. maximum & molissimum adena, quem vocant thymon,

*Respiratio  
et pulvis non  
ferens emittit  
concentum.*

*Cor respirandi  
instrumentum.*

*Cor trahere ex  
pulmone spiritum.*

*Thorax veluti  
morum est cordis  
& pulmonis po-  
situm.  
Cor in thorace  
medio ad æ-  
quilibrium lo-  
catur.  
Corda ventri-  
culi sunt.*

*Thorax cui in  
duos ventres di-  
stinguitur.*

*at*

*6*

*Vena caua fi-  
curatur.*

*Pulmonis quin-  
tus lobus cuius  
gratia etiam in-*

Thymos.

Vena cava  
proprie ad  
fofsum.Glandula ad  
que videtur ad  
tota.Cafophagi finis  
et vfu.Arteria ma-  
gis proceffus.Arteria ma-  
gis proceffus  
ad finem cordis  
ventriculo.  
Arteria magna  
inferiora. Ca-  
va et fupio-  
ria maiora.Mamula, fua  
afophagi de-  
finitio.Cafophagi in-  
finitio in vfu  
ventriculo.Cor ventriculi  
finis.Cor in medio  
confertur: a pul-  
mone latus co-  
probat.

thymon, ipſa natura ſubdidit. Porro duo magni  
lobi in vtraque pulmonis parte exiſtunt: quoniam  
verò ille parvus, in dextris, vena cava grana, &  
transverſo ſepo vix ad cordis aurem pertingit.  
Hinc autem altera quidem pars vena cava in li-  
pium cor in ſentur: altera verò, eadēque maior,  
recta ad iugulum fertur, deducta quadam tenas  
a productionibus cordis, deinceps adena, quem  
thymon vocant, invecit. Id verò naturæ eſt per-  
petuū, ut quoties ſublime vas aliquod dandit,  
ibi mediam glandulam, diuſione oppleturam,  
interferat. Sunt autem hoc in loco venarum ger-  
mina maximarum, ad ſcapulas, & brachia, &  
mammas pertinemens: quibus ad munimen-  
tum & firmitudinem, ex predictis glandulis na-  
tura commoditate maximam conſiliorum. Cava  
autē vena, oppoſita ductus via, criſtophagus  
deſcendit, per quem ad ventriculi umbilicus ab o-  
re delabatur. Ipſe igitur ſpine vertebra ſiunctus  
& colligatus, roritur ita permeat thoracem, quo-  
dammodo oblique poſitus, tutiſſimamq; ſedem  
forſitus, ut neque ipſe ſpiritus inſitum cutis ali-  
quod negotium faciat, ocy ab illis etiam quic-  
quam lædatur. Per medias enim ad perpendiculari  
quatuor vertebraſ dori extenſus, ubi ad  
quintam pertingit, deerrat quidem à recto curſu,  
digrediendo ad dexteram, ut ſedem præbeat  
meliorē, ac cedat inſtrumento magis præcipuo,  
maximæ omnium arteriæ: quæ ut firmitudinem  
nancifcatur, per viam omnium breuiſſimam, il  
cor ad illum ſpine locum fe recipit. Hanc eni-  
m ex ſiniſtro cordis ventriculo exortam, in totum  
autem animantis corpus diſtribuetam,  
æquum ſui primam quidem in duas partes im-  
pares diuidi, eorumq; eſſe maiorem, quæ  
deorſum fertur, quod totius animalis partes,  
quæ ſubiiciuntur cordi, multo plures ſuperiori-  
bus ſint, ac maiore: deinde per optimam verte-  
brarum partem fertur. At in vehitur quidem ipſa  
arteria mediis vertebraſ: non tamen imperioſe  
admodum, nec ſuperflue ſtomachum deprimit,  
ſed paululi quidem & ipſa cedens, ipſum recipit  
& admittit ſocium vertebraſ ſedis. Ventricu-  
li itaq; ſtomachus, quatuor quidem thoracis pri-  
mis ſpondyliis præteritis, propter reliquos oc-  
cto, ad dexteram fertur. Cumprimis verò ſep-  
tum tranſverſum contigerit (quod eſt ſanè ora  
inferior thoracis) membranis tortibus admo-  
dum ſublimē elatus, ſupra magnam rurfus arte-  
riam tranſit in alteram partem: quo loco præ-  
ter ipſum ſeptum tranſverſum, ori ventriculi in-  
feritur: ſublimis quidem, ne in aſperiorum ci-  
borum tranſitu arteriam comprimat: in læuam  
verò declinans, quod eo in loco ſatius ſuit con-  
ſtitit: os ventriculi. Adde huc, quod nervi, qui  
à cerebro in ventriculum iuxta ſtomachum de-  
ſcendunt, obliqua via multo tutior futura erat,  
quæ recta. Molles enim quō ſint hi, & tenues,  
ſi longo intervallo ſecundum rectitudinem ten-  
derentur, habentes ventriculam à ſeipſis ſuſpen-  
ſam, quæ ſubinde impleri cibo oportebat, vix  
diſtumpſerunt facile. Coſtat igitur iam ex dictis,  
cor in medio thorace poſuiſſe locum, pulmones  
ei vndiq; circumfundi, ſuis lobis, cæu digli-  
tis quibuldaſq; orbem id coſpectantes, vtrique ve-

ro curiſſe circundariſſe thoracem. Eſt au-  
tem cor non rotundum, ſed turbatum, ex baſi  
cuius, cæu parte aliarum omnium principalifſi-  
ma ſimul atq; tutiſſima, ipſa vaſa exoriſtur. Quæ  
verò ex vtraque parte coſequentur ad inferiorem  
finem, quaſi latera quædam, ventriculorum ge-  
nerationi ſui deſtinata. At ipſe ſinus inferior,  
proceſſus quidam eſt forſis & denſus, qui veluti  
operculum ventriculorum, propugnaculumq;  
tonus cordis exiſtit. Atque hæc quidem cordis  
pars, ſi cum alias eam conferas, longe abieciſſi-  
ma eſt. Etenim quoniam triplex ſit partium vni-  
tate aut enim referretur ad vitiſſimam, aut ad com-  
modiorem vitam, ſuper ad horum duorum con-  
ſervationem: quæ ſanè ad vitam ipſam particu-  
lariter conferunt, ex principis ſunt habenda: reli-  
quorum verò duorum generum, à primi gene-  
ris præſentia diſcedentium, æ minus aliis diſce-  
dere ſunt putande, quibus hæc principes facile  
comparantur. Quoniam igitur cor caloris nativi,  
quo animal regitur, quaſi ſons quidam ac domi-  
cilium ſit, omnis eo modo ipſius pars principis  
diſcreta fuerit magis lux, quā vſus toti ani-  
mali vitam conſervat: id quod facit duorum va-  
ſorum: oriſcia in ſiniſtro ipſius ventriculo, quæ  
medici ſpiritaſum appellant. Horū enim duo-  
rum oriſciorum, per manus quidem cor, quæ  
in pulmone ſuor, arteriis: per maius autem, o-  
mnibus quæ in toto animali habentur, connuſi  
eſt. Minus autem his præcipua ſunt ea quæ in vo-  
luto ipſius ventriculo, quem aſanguificum vo-  
cant, inſunt. Sunt tamen quādam alia hæc quoque  
preſtantiora: quorum alterum quidem, ſanguinem  
in ipſum cor intromittit: alterum autem, ex  
ipſo in pulmonem deducit. Atq; ob magnitudi-  
nem duorum vaſorum, cor ea parte ſuit adeo  
magnum, & in media regione thoracis ſinum.  
Cor autem ipſum eſt caro dura, & ægrè panibilibis,  
multiplicibus ſibiſ conſtata: quo nomine ad  
muſculo diſſert. Muſculus quidem vaſi tantum  
ineſt ſibrarum genus, rectariſ ſcilicet aut tranſ-  
verſarum. Vtrique autem cor, & præter illas, e-  
tiſm obliquas forſitur, dextræ, contentionē, &  
pandendi difficultate plurimū ab aliis omnibus  
diſſerentes, ob actionis continuitatem, & ve-  
hementiam, in qua ſemper cor ipſum verſatur.  
Porro ſinguli muſculi, ſingulos habent ac ſimpli-  
ces motus, ob idq; multiplici ſibrarum varietate  
nec egent, quemadmodum cor, ventriculus, ma-  
trix, atq; veſica vtrique. Quippe horum ſingulari,  
rectis quidem ſibiſ attrahunt, excernunt tranſ-  
verſis, retinent autem ſimul omnibus cooperan-  
tibas. Quam omnium actiones in corde ipſo,  
vel iamam ab animali avulſo, ac pulſante ad-  
huc, vel detecto per anteriorē regionem pec-  
toris, contemplari licet. Nam qui rectis quidem  
ſibiſ contrahentibus ſe, reliquis autē diductis &  
laxis, contrahor ſanè fuerit facta longitudo, la-  
xior verò vniuerſa ipſius latitudo, hoc ſtatu cor  
totū videbis dilataſ. Contra autem relaxantibus  
ſe ſiſ quæ ſunt ſecundum longitudinē, contra-  
ctis autem quæ ſunt ſecundum latitudinem, eo  
caſu rurfus contrahi ipſum perſpicies, ac de-  
primi. Medio porro inter has motiones interval-  
lo, exigua quædam quies intercedit, cor de qu-

Corde figura.  
Corde reſe-  
ctio ab illis  
baſi aliarum  
partium prin-  
cipalium.  
Corde partem.Vitiſſima pars  
triplex.Particula prin-  
cipalis quæ diſ-  
tinet.Corde caloris  
ſinum.Similiſ corde  
ventriculo.  
Similiſ corde  
ventriculo orſi-  
cia duo.Dextri corde  
ventriculi ori-  
ſcia duo.Corde caro  
quæ.  
Muſculo rectariſ  
vniſ tantum  
ſibrarum genus.  
Cor ſerius a-  
mota ſibrarum  
genera.Muſculo ſingo-  
liſ rectariſ ſingo-  
liſ & ſimpliſ  
motus.  
Sibrarū attri-  
bus vna.Corde dilata-  
ſ quæ ſtatu.Corde contra-  
ctio quando  
ſit.Corde quies  
antidū, obli-  
quo operanti-  
bus ſibiſ.

**Cardis contra-**  
**Abus** quod ad-  
inuenit, vel totū  
potius efficit.

dem circa ea que continet, vndiq; ad vnguē affri-  
cto, fibræ autem tunc æquantur omnibus, & ca-  
rum maxime obliquis. Adiuuant autem, imò to-  
tam ferè contractionem efficiunt, quæ in iun-  
ctis ipsius cordis ventriculi nitidissima liga-  
menta tenduntur, definita in illud, quod in-  
sternit inter ipso ventriculo, septum. Ob eam  
igitur causam, tam fortia ligamenta, tum om-  
ne fibrarum genus cor habuit, vti facili dilaretur,  
quando quod aurtur suæ est accommodatur,  
trahere appetit: adstringatur verò vndiq;, quan-  
do is que traxerit, frax impellitum fuerit: con-  
trahatur deniq;, quando superfluum excernendis  
scie accinxit. In ergo que ærem per fauces,  
nares, & os inspirant, pulmo, & dexter cordis  
ventriculus auit. Reliquis verò omnibus neq;

Palmaris inter-  
quarta, interre-  
vorum, & dexte-  
ræ cordis veni-  
triculorum.

Dextrum cor-  
du ventrali  
gratia pulmo-  
nis 1 pulmonis  
gratia vocat  
respirationis ut  
dicitur esse.  
Pulm respirare  
per brachias.  
Pulm frigidus  
est, quia  
in magna respi-  
ratione nec su-  
fficit indiget.  
Pulm aerem  
infrangit.

*Cardu cum pul-*  
*monis collum-*  
*etum.*  
*Vasorum tunc-*  
*et in pulmo-*  
*rum collum-*  
*etum.*

**RECEIVED**

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

Pulmo ex se non  
tam expertus, mo-  
uerur ad motu  
theriacu.

402 46744-

— 10 —

1997-1998

Jerar 1987:195

*Jaegeria* nra,

prius venæ arterioſæ, quantu miſimum ſanguinem: per laxa vnde venoſæ arteriæ, copioſiſſime recipiunt ſpiritum. Quare nutriendi ratio pulmoni planè contraria eſt, ac cæteris omnibus partibus, quemadmodum & ſubſtantia corporis. Maximas autem venas in eo natura conſtituit, vt quæſitæ propter rariſſimæ craſſitudinē ſuæ nutritioni detraxatur, id magnitudinē ipſarum expleatur. Atque autem violentè pulmo diſtentione ſua, vnde ex denſiſſimis inſtrumentis, erit aliquid nutrimenti, quod vehemēti calore ſuo in minimas partes comminuit. Porro quum venæ arterioſæ, ad nutriendum diſcreuerint à cauâ oris non poſſent, ſicque ipſarum adnata: reliquum ſua, vt à dextro cordis ſpecu oriuntur, vnde ſanguinem elaborat à corde ad ſe inferius, pulmoni conſtituitur. Eiusmodi vnde ab his

plum pulmonis videretur. Quod vero vena  
raro motu non vinceret vena arteriosa, con-  
fessionis illi illius orbi quales quasdam adu-  
tas esse, quos, & quales nunc sunt: sine quavis  
perfidio, in contrahione pulmonis, ille sanguis  
semel ad ipsum missus, rursus rediret ad cor,  
necellet sic arteris & venis esse seu vicem san-  
guinem spirantem transmutare per anastomoses  
ac osillorum adaptiones, quæ lex in corpore  
venero obstat. Nunc autem redit i-  
psius sanguis, per os magnum vena intercla-  
sa, dū vides ipsa vena cōprimatur, deßillat quip-  
piam per exigua illa orificia in arterias. Quare  
igitur rhoras contemdit vehemens, sanguis  
per contrahitionem velius cor exprimitur, tantò  
membrane exactius os ipsius vena claudunt.  
Quippe ab inferiore parte extrinsegergentes, &

Palmerston North  
 1911  
 1912

Venue arrivée-  
se en à dix-  
sept heures.

Vena arteriaſe  
oxy membranar  
quafiſda adven  
tiſſim.

Vras antierigla  
adunat marea  
brava din 1904  
fata fetei "de-  
gustat."

Vasculum an-  
natum profecto-  
rum a corde o-  
riscitur, quod si  
membra non ef-  
se videtur.  
Corde oriscitur  
quatuor.

Corda venter-  
calum dextra  
fuisse gravis  
pulmonis fa-  
flum.

Palmones autem  
tis anatomicis.  
habere singulos  
sanctos cordis  
nuncius in lū.

*Grass carp*  
*Cyprinus carpio*

nam speciei singula quæ sunt, effingit: arterias quidem pulmonis, raras: venas autem densas efficiens, propter eam quam diximus causam. Quorum vasorum efformationi, seu materiam quandam subiecit humidam & siccis miscellam, visus calido & frigido invicem temperario, tanquam instrumentis efficientibus circa ipsam materiam. Quia in missione, partim quidem materiam exiccare à calido constituit, partim autem frigido crescere, atque ex horum denique mixtura, spiritui oppressum temperat gigni: quem postea flans in latum extendens, diducensque materiam, cavum vas ac prælongum efficit, copiosius quidem materiam assumens, cui melius erat esse crassioris partem autem, cui tenuiori. Nosse siquidem conditor in efformandis particulis, hunc perpetuo scopum sequitur, nempe ut quod melius est, semper eligat. Quam igitur quatuor in corde sinuosa, tres quidem singulis aliis insunt membranis, duæ autem duntaxat arteriæ venosæ. Oriuntur sane omnes ex orificiis ipsis: unde profectæ, aliæ quidem intro progrediuntur in cordis ventriculos, ad quos etiam ligamenti fortibus annectuntur: aliæ vero foras vergunt, quæ primum utrumque vas è corde emergit. Sunt itaque in vena interiosa, quæ alit pulmonem, membranae tres intra foras spectantes, quas à figura literæ *sigma*, sigmaeodæ appellat. In ea autem vena quæ sanguinem introducit, tres quoque foris intro pertinentes insunt membranae, sed quæ multum transsit, robore, ac magnitudine illas antecant. Præterea etiam orificio illius maxime arteriæ, quæ à sinistro ventriculo orta, principium est arteriarum omnium, tria quoque membranarum *sigma*is intra foras vergentium adnata insunt. Reliquum vero arteriæ venosæ, quæ in pulmone è distribuitur, orificium, duarum membranarum foris intro pertinentium, habet adnata. Cordè igitur dilatato, omnia ipsius ligamenta pertinet, trahunt ad seipsa, & veluti relapsæ membranas ad corpus cordis: membranas inquam vasorum inducentium materias. Quibus membranis reflexis, vasorum orificia patefunt, ut facillime possit cor materias ipsas attrahere, nimium causis omnibus, à quibus celerissima sit materiarum attractio, eodem aspirantibus. Nam quod suo loco transferret, aut trahi ipsum oportet, aut mitti ab aliquo, aut deduci. Quæ omnia simul adfunt materis, si cor dilatetur. Cor siquidem trahit: mittunt præpositæ ad aures cavitates, atque ipsa vasa deducunt. Quorum omnium unum est motiois principium, cordis ipsius dilatatio. At aures (quæ sunt adnata quodam iterum, & caua, ante orificia) laxæ quidè reliquæ tempore sunt, & idcirco concave: quum vero cor dilatatur, eodè quo membranae modo tenduntur, & contrahuntur, ob idque materias ex seipsis expressas præmittunt cordi, spiritum nempe ad refrigerationem, sanguinem ad nutritionem illius. Etenim quia vasa quæ materiam cordi suppeditant, si dilatato eo tracta violentius fuissent, quæ tenues ac molles habeant tunicas, facili negotio diuellerentur: ob id aurium concavitates extrinsecus ad orificia singula excogitavit natura, ut ex illis, veluti ex promptuariis quibusdam,

cor ipsum traheret, citra vilius vasorum discrimen. Vtrumque autem auris substantia tenuis facta est, & nervosa, ut & contrahatur facilius, & etiam riores sint ab iniuriis extrinsecis. At vero membranarum ipsarum, earumque vasu adiacentem materias introducentibus, rariorem fortiores & maiores oportuit esse us, quæ inducentibus insunt, quantum maior in dilando, quam in contrahendo via est. Vt autem puiores membranas tribus, minus exactè ac rarioris officia vasorum clauderent sic etiam si plures fuissent, imbecillitatem actione aderent. In solo tamén arteriæ venosæ officio, merito sunt duarum tantum membranarum adnata. Solus siquidem huius officij intererat, ne ad amissum clauderetur, propterea quod solum ipsum oportebat esse transitu à corde ad pulmones, excrementis fuliginosis, quæ in illo ob copia innati caloris necesse est gignuntur, quæque etiam & per reliqua trium vasorum officia, aliquid retrahitur & effluit. Nam quædammodum in ipsa aspera arteria fieri non potest quod minus transgredientibus nobis exiguum quiddam humidum transcoleat, sic membranae illæ non possunt adeo accurate occludere illorum orificia vasorum, quin vitro ceteroque aliquid sanguinis & spiritus permeet. Sunt enim omnia in omnibus, atque arteriæ quidem tenuem & pituitum & vaporosum continentem: Venæ autem paucum, eundemque caliginosum ærem. Similiratione per stomachum spiritus transgredientibus atque inspirantibus nobis ad ventriculum permeat: nihilque est syncrurum in corpore, sed omnia commercium habent cum omnibus. Etenim ipsius cordis ventriculus pulsare quidem utrumque videntur, non tamen pari mensura utrumque sanguis & spiritus adeit. Copiosior quippe est, in dextro quidem sanguinis, in sinistro autem spiritus substantia: vacuatur tamen sanguis per vulneratas arterias, quem à venis per communionem orificiorum exugunt: ad apertio quorum hic etiam efficit, ut respirationis atque pulsus utilitas, venis communetur. Porro cordis sinistra pars admodum crassa est & dura, ut quæ ventriculi spirituosius tegumentum esset futura. Dextra vero tenuis & mollis, simul quidem ut materis utrobique esset consecratus locus, simul autem ne cor in alterutram partem propenderet. Quare cor ipsum, in medio illius duræ tunice (quam *pericardij* appellat) rectè firmiterque libatur. Quæ tunica ex capite ipsius amplissima exoritur, postea secundum figuram eius paulatim in mucronem contrahitur, veluti vallum quoddam ac domicilium ei circumiecta, tantumque inter se ipsam & cor ipsam circumscribens, quantum cordi dilatato suscipiendo erat satis. Est autem substantia ipsius tunice mediocriter crassa & robusta, ut neque collidatur, neque etiam pulmones læderet. Cæterum quo tempore cor dilatatur, membranarum radices trahens, aperit quidem orificia vasorum introcurrentium materias, claudit autem educit. In vniuersam autem leuiora omnia expeditius obsequuntur trahentibus. Iam vero quæ in corde apparent foramina, pertinentia potissimum ad medium ipsius septum, prædictæ communionis gratia exstiterunt. Est autem au-

*Aurium cordis substantia.*

*Arteria venosa auris, cur de ea rariore membrana adnata sit.*

*Omnia esse in omnibus.*

*Syncrurum nihil in corpore. Cordis ventriculus utrumque pulsare videtur.*

*Tunica communis pulsus et respirationis usum. Cordis sinistra pars crassa est & durior dextra.*

*Pericardij septum.*

*Pericardij substantia.*

*Leuiora expeditius obsequuntur trahentibus. Septum cordis fissum.*

*Vasorum generatio.*

*Arteria venosa dicitur membranae iugis.*

*Sigmaeodæ membrana.*

*Vena cana dicitur ad eam sanguinem per membra esse trahentem.*

*Arteria aorta iugis membranae tria intra foras vergentia.*

*Translatio materis quæ pergitur.*

*Aurium cordis iugis.*

*Animalis spiritus  
est exhalatio  
benignissima  
sanguinis.*

*Arteria cor  
nunc duplex.  
Cordis rursus  
que maiora  
merita.*

*Cor exeat  
fieri alioquin  
quam sit  
fieri.*

*Similiter  
vult  
quod; utrius.*

*Cor à qua  
na alatur.*

*Nervus nobis  
videtur in cor  
distribui, neq;  
in hepar, re-  
nes, lienis.*

*Cor nullum a-  
lium animalis  
fuerit.*

*Hepar anima  
appetitiva si-  
det.  
Cor principium  
negligibile fa-  
ciunt.  
Cordis quale  
est.  
Cordis et ad  
quod vult.  
Fieri in vtero  
distributio.*

malis spiritus, exhalatio quædam benignissimi sanguinis. Quare merito sanguis purus & tenuis cōtinetur in ipsis arteriis, utpote qui animæ spiritui sit alimentum futurus. Ob cuius tenuitatem spiritus, necnon propter motū perpetuum, valida & duplici tunica fuit ipsis arteriis opus. Ad hæc, quæ vena in cor infigitur, maior ea est, quæ ab eodem in pulmones iucitur, quum nimirum velat sanguinem, qui per hanc defertur in illos, & qui in sinistram cordis speciem ad gignendos spiritus vitales transmutatur. Ad eundem autem modum arteria etiam, quæ ex pulmone ad cor perducit spiritum, multo minor est magna arteria, quod hæc quidem à dextro ventriculo aliquam sanguinis portionem assumat, omniumque arteriarum, quæ toto animali insunt, sit futurum principium. Quia verò corpus ipsius cordis crassum erat ac densum, alimentum egerebat crassiori, ob id sanguinem ducit à vena causa, quo nutriatur, priusquam ea ad cor immigret. Cor itaq; pulmōni alimentum præparat, sibi autem nequaquam. Quum enim quale est vnumquodq; tali ipsum nutrum alimentum opponat, iure opinio cor quidem crasso, pulmō autem vaporoso sanguine indiguit. Quæ causa est, ut cor non alatur ex seipso, sed priusquam vena causa dextro inferatur ventriculo, pars eius tanta, quanta cordi nutriendo erat sans, seiuncta circa cordis caput, extrinsecus obvolvatur, & in omnes ipsius partes diffundatur: cum qua enim tanta arteriæ magnæ portio dispergitur, quantæ ad prædictam venam refrigerandam, conservandamq; probum temperamentū caloris innati externarū cordis partium, esse videbatur sufficiens. Nullus autem videtur nervus in cor distribui, quemadmodum neque in hepar, renes, lienemq;. Solum namque pericardium propagines tenuium nervorum recipit: à quibus diuisis, sensibiles alias ac manifestas in cordis ipsius tunicas etiam inseri, in maioribus saltem animalibus, constat. Quemadmodum enim musculis omnibus, quod actionis animalis instrumenta essent, magnis nervis fuit opus: ita & cordi nullam actionem animalem habenti, tantis nervis opus fuit, quantis prædictorum viscerum lingulis: addam etiam & pulmōni. Cōmuniter enim opinia hæc, ne sensu omnino careret, nervos etiam habuerunt: priuatim autem inter ea hepar & cor, quod illud quidem animæ appetitoræ, hoc autem irascibilis esset principium. Ad hæc, in magnorum quidem animalium corde, os quoddam reperitur cartilagineum exiguū vtero admodum, corpus ex cartilagine & nervo constatum: quod quidem tum ad ligamentorum principia tuius colliganda, tum ad rotas cordis firmitatem, est constitutum. Hæc igitur sunt in perfectis item animalibus cordis particule. In his autē quæ adhuc formantur in vtero, animæ adiens natura pulmōnem, qui neq; absolutus est, neq; motus perfectus, non eandem postulare dispositionem, atq; is qui perfectus quum sit, mouetur etiam, vnum quidem vas validum, crassum & densum, ad arteriam magnam: alterum verò, imbecillum, & tenue, & rarum, ad venam causam anastomosi applicuit. Quum igitur arteriam magnam, ad

crassum illud ac densum pulmōnis vas, ad tenue verò & rarum venam causam per anastomoses \*aperuisset, pulmōni quidem vitæque materias iuste largita est, & cor nihilominus à pulmōnis servitute liberavit. Quocirca non oportet mirari, si quum in illis nec sanguinem, nec spiritum mittat pulmōnis cor: nec totius corporis arteriis suppediet, vti in perfectis: ad solam propriam vitæ quam paucissimo indiguerit spiritui, quem maxime etiam, ut opinor, ex ipsa magna arteria ducere poterat. Quinetiam licuit cordi per id orificium, cui soli tunicas duas foris intro pertinentes diximus adhiæscere, ex pulmōne sanguinem ac spiritum sibi mista attrahere: Vas siquidem hoc in fœtibus ea causa quidem vena sanguinem per quandam memorandæ magnitudinis anastomosi recipit: quum sanguis aliis in perfectis quidem, ex sanguine: in fœtibus verò, ex spirituosissimis instrumentis sumatur. Etenim si signa adhuc vtero matris hærente, per ipsius matricē penetrant, arterias quæ in vmbilico sunt, vinculo exceptis, quæ in secundis sunt arteriæ omnes, pulsū desistunt, quum tamen quæ ipsi embryo quæ sunt, adhuc pulsant. Quod si venas etiam quæ in vmbilico laqueis complexus fuerit, laudquam quæ in embryo sunt arteriæ amplius pulsauerint: quod videlicet vis illa quæ mouet secundarum arterias, à corde ipsius factus proficiantur: à venis autem per anastomoses arteriæ recipiant spiritum, à quo calor natus, saltem aliquantisper, seruari potest. Fieri igitur potest in corde, ut ex vase sanguinem continente, commodum aliquod calori, qui in sinistro eius ventriculo est, accedat, cuius causa animalia & respirant, & pulsibus egeat. Cor itaque non modò in perfectis animalibus, sed in fœtibus etiam, vim illam arteriis suppediat, qua mouentur: nō tamen ipsas ceu vites flatu replet aut inflat. Non siquidem ob id dilatantur quod implentur arteriæ, sed quia dilatantur, implentur. Porro natura, quemadmodum venam illam quæ ab vmbilico pertinet ad iecur, & arterias quæ sunt ad spinam, tandem exiccat, & veluti funiculos quosdam tenues efficit: ad eundem modum & prædictas, quæ ad cor pertinent, vasorum anastomoses, in animaliam nato abolet: quæ viti animalibus in lucem æditæ futura non sunt, ea ne esse quidem permittens.

## GALENI PERGAMENI de vsv partium, lib. VII.

Cæterum quemadmodū hepar, citi etiā pulmō, quiprimis est vas cōtextus: quorum intervalla molli carne replentur. Vasorū porro ipsius proficiuntur, hoc quidē ex sinistro cordis ventriculo, illud alit ex dextro: restū deniq; ex faucibus. Deinde illinc progressi diuiduntur in quatuor lobos pulmōnis. In quintū autē lobum (quam parvis sit, ac veluti subitriculū venæ causæ, in dextra thoracis regione) propagines quædam exiguæ, à vasīs in lobum magnum illi propinquū distributis, disseminantur. Ambit autem lobos omnes extrinsecus renales quædam membrana, portiones qualdam eorum

*Cor in vtero  
accipere spiritum  
à magna arte-  
ria.*

*Secundarū  
arterias moueri à  
cordis factis dis-  
tinctis vtero.  
Arterias factas  
per anastomoses  
viti recipere à ve-  
na fœtibus.*

*Arteria imple-  
tur, quæ dila-  
tantur non dila-  
tantur quæ  
implentur.*

*In vitiis ani-  
malis natura  
ne esse quidem  
permittens.*

*Pulmōnis vasa  
vnde oriuntur.*

*Pulmōnis quatuor  
lobos.*

*Pulmōnis tunc  
ca.*

eorum nervorum, qui iuxta stomachum inferre ad ventriculum tendunt, accipiunt. Porro tertium illud vas, quod à faucibus in pulmonem descendit, quoddam aspera arteria, neque bronchus dicitur, ex corpusculis quibusdam cartilagineis circularibusq; constatur, per totam longitudinem colli optimè inter se ordinèq; singularem compactas. At verò, quia parte contactura subiectum erant stomachi luvulicemodi corpora, amplius cartilaginea non sunt, sed C. Latinam

literam referunt, ut videlicet cibus qui deglunetur cedant. Venit autem intrinsecus ipsam arteriam aspera, cuius partes omnes subvngit, quædam tunica penitus circularis, densa simul & hollida, fibras habens secundum longitudinem rectas: ac brevitè, continua illi, quæ ab ore in ventriculum ducitur. Quare per hanc membranà dū animalia deglununt, cartilagineus cum larynge ad ipsas fauces trahuntur. Extrinsecus etiā alia circumducitur tunica, veluti totius asperæ arteriæ non vulgare indumentum. Per hanc igitur arteriā asperam, quæ in omnes pulmonis partes est distributa cum vasis quæ à corde proficiunt, inspiratio & exspiratio, vox & flatu perficitur. At quæ hoc solum in pulmone vas omnino vacuū est sanguine, quædam animal secundum naturā se habet. Fuit autem instrumentum vocis omnino cartilagineo opus, quā molliora quā pro ipsius naturæ præimbecillitate aërem tenuissimè percurrant: duriora autem, facile ipsum evertant, sic ut fluere potius, quā percuti aër ipse videatur. At cartilago est simplex quædam particula, vtilissimum omnium durissima, sic ossè duntaxat mollior, ob idque ad elidendam vocem instrumentum aptissimum. Non est autem ex via simpliciter cartilagine & sola, constructa aspera arteria, sed membranosam quoq; assumptam substantiam, quæ circularis eius annulos colligat, ut per animalis inspirationes, expirationesq; facile possint tum dilatari, tum contrahi, atque etiam longior, & breuior reddi. Si quidē mutationes pulmonis in longitudinem ac brevitatem, à ligamentis cartilagineis inter se connectentibus, tensis quidem per inspirationes, per expirationes autem laxis, atq; in se coincidentibus, proficiuntur: Incrementum verò in latitudinem & coincidentiam, ab his quæ interrupta annulorum complent, gibbis quidem factis extroflum per ipsas inspirationes, laxis autem per expirationes, prodegit. Ac proinde cartilagine ipsæ, vocis sunt instrumenta: quæ verò eas ligamenta coniungunt, respirationis. At pars illa quæ cum faucibus asperæ arteriæ connectit, & quæ sursum nobis transfluentibus fertur, cuius vocem aspera arteria præparat, larynx vocatur: qui totus cartilagineus cūctis, primum & principalissimum vocis est instrumentum. Quanquam vocem ab ipso editam, palatum, veluti refractoriū quoddam, & columella, tanquam plectrum, adaugent. Porro ipsius vocis materia exspiratio est, à thoracis muscullis facta. Pulmonis itaq; propria particula est hæc arteria, quæ merito pikes caruerit, atq; etiam pulmone, quod ne voce quidem egerent, ut potè in aqua resedentes. Erat igitur ipsa aspera arteria respirationis simul & vocis organum. Ansthi-

ciosè autem natura cartilaginosa quidem partem arteriæ, ad anteriora colli: carnosam verò, quæ à stomachi contactura erat, ad posteriora convertit, ne facile afficeretur, stomachus quidem ab ipsa arteria, hæc autem rursus ab iniuriis extrinsecis. Quare quum alio quidem tempore respiratio, alio autē transglutitio fiat, (nunquam enim simul contingunt) mutis vicissim adaptatis arteria stomachiq; vtrunq; capere ut tempore exiguo plurima, per vtroq; meatus, ferat propria materia. Ob idq; constructum est rotundum vtrunq; organum, ut per locum minimum plurima pervadat materia, vtrūq; ab iniuriis sit tutius. Enimverò tunica illa (quam diximus) obtenditur interiori parti ipsius asperæ arteriæ, ut destitutæ tum cibi tum portus, nec non fuliginosi spiritus, atq; etiam humorū aciei (quorum omnium delapsus prohiberi interdum non potest) excipiens, cartilagineus eius tueatur. Quarum quidem affectus aut insanabiles sunt, aut sanari quindisicillumi. Ac ipsius tunicæ incommode facile refanguntur: nisi forte aliquando à magna putredine, ipsius portio quædam erosa, cartilagineam penitus destituerit nudam. Ceterum tenuis simul & densa facta est illa tunica, ut neque sibi capacitate sua mole angustiorer redderet, nec facile desuentes succos imberberet, vocemq; sic efficeret raucam. Melius enim sonant sicca quā madida. Quia verò si extremè sunt sicca, his quæ talia sunt moderate, vocem deteriore elidunt, ob id tunc quæ cartilagineis subest, natura medioenter sicca efficit, vtrunq; excessum declinat. Verū nec asperæ arteria habet sanguinis copiam quæ alatur, inquitam venæ quædam à corde ipsi fuerint connexæ: neq; ipsum cor fructum viliū ex respiratione percipit, priusquā per alias arterias hæret, quæ tenuem, purum, & vaporosum continet sanguinem, nec solius spiritus instrumenta sunt, coniunctum & colligatum, huic succi. Quarum leuolum arteriarum oscula, à natura nihil agente temere, eò commodè rationis adducta sunt, ut vapor quidem ac spiritus sine pervia sanguini verò, & crassus similiter substantiis, iuvia. Quod si forte aliquo tempore patula, naturalē commodationē amiserint, portio aliqua sanguinis ex lauibis in asperâ arterias effunditur, quem casum repente tuistis cōsequitur, & sanguinis per os profusio. Ipsa porro caro pulmonum non solum diffusionem vasorū longe in istissimā reddit, sed etiam quemadmodū si patitur ad cibi, sic ad aëris ejectionē cū fuit comparsa: ob idq; molles, foridissimulenta, & spirituosæ existit. Non enim confertim nec repente aër quæ inspiramus, nutrimentum spiritus animalis evadit, sed paulatim cum immutari est necesse, diuturniore tempore spiritus istius familiarer qualitate acquirere. Cuius alterationis pullos nō raro primum est instrumentum. Spiritus igitur qui trahitur ab asperâ arteriæ extrinsecus, primum in pulmonis carne conficitur, deinde autem in corde ac vniuersis arteriis, sed in eis præcipue, quæ in plexu reiformi consistunt: at vltimum ac perfectissimè in ventriculis cerebri, ubi vtrūq; efficitur animalis. Cur autē nos huiusmodi

Aspera arteria  
cartilaginea  
fuit.

Deinde hinc  
respirationis  
quæ nonquam  
eodem tempo  
re fieri.

Aspera arteria  
membranosam  
tunica vtrius.

Cartilagineum  
asperæ arteriæ  
tunica san-  
guinea

Aspera arteria  
tunica interna  
carnea, dicitur  
fieri mollior  
constricta.  
Itaque quum  
madida mor-  
bus faciat.

Cartilago cor  
ad elidendam  
vocem in instru-  
mentum aptis-  
simum.

Aspera arteria  
tunica vnde  
proficiuntur.

Artemia cor-  
dis ad pulmonē  
eunda.

Tuistis quando  
excussit,  
etiam

Pulmonis caro  
qualis, & quæ  
vtrius præstet.

Pulmonis caro  
qualis, & quæ  
vtrius præstet.

Pulmonis caro  
qualis, & quæ  
vtrius præstet.

Pulmonis caro  
qualis, & quæ  
vtrius præstet.

Aspera arteria  
tunica interna  
bronchus.

Cartilagineum  
asperæ arteriæ  
tunica.

Aspera arteria  
tunica interna.

Aspera arteria  
tunica exte-  
rior.

Aspera arteria  
quædam aspe-  
ram in instru-  
mentum.

Cartilago cor  
ad elidendam  
vocem in instru-  
mentum aptis-  
simum.

Aspera arteria  
tunica vnde  
proficiuntur.

Cartilagineum  
tunica interna  
tunica.

Larynx primum  
& principalis-  
simum instru-  
mentum vocis.  
Tunica.  
Columella.  
Tunica interna  
asperæ arteriæ  
& pulmonis.

Larynx primum  
& principalis-  
simum instru-  
mentum vocis.  
Tunica.  
Columella.  
Tunica interna  
asperæ arteriæ  
& pulmonis.



*Spiritus enim  
nullus fuit in  
ventriculo de-  
relin.*

*Altera arteria  
fuit inter ve-  
nam & leuem  
arteriam.*

*Veni arteria  
fuit cur tunica  
dura tributa  
fuit.*

*Arteria vero  
fuit cur tunica  
retra infusa.  
Respiratio  
fuit.*

*Arteria leui  
infusa efficitur  
ad finitru  
ventriculo.*

*Fulgurium cor-  
dis expellit in  
fide per leuem  
& per magnam  
arteriam.*

*Pulmo ad pho-  
raci meatu  
impulset.*

*Arteria*

*Pulmoni vasa  
que ardeat pro  
prou materiam  
implantant.*

*Spiritus trahi  
a corde in dia-  
phragma, expelli in  
finitru  
Corde matu-  
a natura,  
Thorace matu-  
a anima.  
Respiratio  
fuit arbitra-  
rium.*

plani substantiam animarum, cum animalium vocemur, non est dicendi nunc locus. Fuit autem aspera arteria in medio laevis & venae locata, quod per mediam quendam laevam, respirantis villitatem cordi exhibitura erat: à venâ autem, necessarii debebat nutriti. Ad hanc, à dorso quidem habet aspera arteria venam: ab anteriori autem parte, arteriam: quia longius à corde producere ipsam arteriam, quae tenuis atque imbecilla fortitur tunica, non erat tutum. Quare illam naturâ sub-  
10 bito à corde ortam, in pulmone disseminavit. Alterum vero vas quod foris erat, abduxit longius. Facta est venarum tunica dura, tum quod eas comprimi facile ac dilatare in respirantibus non oporteret (vi videlicet ipsa thoracicae capacitatis spiritus instrumentum esset perpetuo patens: & ne sanguis ad cor ex eis violenter recurreret) tum etiâ quod sanguine vaporoso & tenui quum crasso, pulmone ali erat melius. Arteriarum contra tunica est rara, ut liberalius pulmones fouere suo tenuissimo sanguine, cordis trahenti spiritus, longe facilius cedant. Quum itaque visus respirantis primus & maximus sit, ut caloris symmetriam conseruet: secundus autem, nec minor, ut nutriat animales spiritus, tum ad hanc, tum ad vocis generationem, pulmone accedendi natura. Applicuit autem omnes arterias laevis finitro cordis ventriculo, in quo calore nativum est principium, percutit illi refrigerationem hinc comparat. At vero quod fuliginosum ac fumidum in ipso corde est, in illius compressionibus per has ipsas laeves arterias explodit, multoq; adhuc magis per magnam arteriam ad alas. Pulmo igitur totum implens thoracis, capacitatem, ad ipsiusmet thoracis motus movetur. Consequenter autem id quod vacuatur, prius semper leue quam graue, attrahente instrumenti sequitur: quæ per ampla osticia multo facilius implentur. At asperam arteriam omnium vni est maximum os, pertinens ad pharyngem: laeuam autem aliud vnum ad finitrum cordis ventriculum, ut venarum etiam ad dextrum. Sed ex pharynge quidem, aer solus ad arteriam asperam: ex dextro ventriculo sanguis solus ad venas: ex sinistro, mixta quid ex ambobus pervenit. Pulmone igitur dilataro, primo quidem externus aer asperam arteriam implet: secundo autem, quod ex sinistro cordis ventriculo effertur, laevis: postremo denique ac tertio horum omnium, sanguis implet venas. Antè vero quam asperæ arteriæ re-  
10 plantur aëre, ad quodvis aliorum nihil transmutatur. Fuerunt enim asperæ arteriæ à natura institutæ, ut pulmone in maximam distensionem agerent. Ac proinde in inspirationibus aer exter-  
15 nus in has solas necessario ingreditur. At spiritus in cor ipsum attrahitur, dilataro quoque ad modum rursus compresso, excernitur. At laevis quidem arteria, cordis motibus: asperæ vero pulmonis, insensuunt. Verum ut cordis motus à natura, sic thoracis ab anima, perficitur: melius siquidem fuit ipsam respirationem in voluntariis  
20 sequere animalibus, iam pulmo nervis tantum præditus, ut totus facile dilatarer & comprimeretur, in lobos dissectus est, quibus tanquam quibusdam digitis cor accuratè complectitur. Larynx

porro ex tribus magnis cartilaginibus constat. Mouetur autem à musculis, propria quidem sua compositione, duodecim: quatenus verò commercium habet cum vicinis particulis, ab aliis octo. Harum igitur laryngis cartilaginum, anterior est maxima, extrinsecus quidem convexa, intrinsecus concava, prælongo scuto persimilis: quare scutiformis vocatur. Secunda verò cartilago, quanto minor est prima, tanto maior quam tertia est: internis partibus, qui consistit stomachus, positionem habet. Ceterum quantū maxima deficit à perfecta figura circuli, hoc ipsa perficit. Etenim ubi desinit vltima cartilago asperæ arteriæ, ibi primū quidem hanc secundā incipit, omnibus partibus totam illam continens: hoc est, anteriore, posteriore, & obliqua. Paulō verò supra anteriores ipsius partes cartilago scutiformis incipit: secunda videlicet retrocurvum cedente. Articulantur autem & com-  
10 mittuntur inter se partibus obliquis. Atque etiam paulō superius ligamenta quædam membranosa & nervosa, ex prima pertinent ad secundam. Verum ubi minor quæ intus est, desinit, dñx quid dem superiacent parux convexitates. Incipit autem illius tertia cartilago, quantū arytænoideum appellant ob formam vasæ, convenientes ad amulsi emittentis illius cavitates habens, aded ut commissio harum duarum cartilaginum, duplè dearticulationem efficiat. Est autem striatior, quàm inferna basis, secunda cartilago: ob eamque causam totius laryngis ora infima, quæ asperam arteriam attingit, amplior est superiori osticio, quod in pharyngem desinit. Atque etiam tertia cartilago in angustum valde & ipsa desinit. Conuersa autem est huius quoque cartilaginis cavitatis ad meatum spiritus, ut veluti fistula quædam fiat, quod ex tribus illis est compositum. Parte verò interna, in ipso meatu laryngis, corpus quoddam incumbit membranosum, adiposum & glandulosum, figuræque linguæ fistulæ referens. Quod igitur primum in larynge vox efficiatur, quodq; dilatarer plurimū, & copiamur ad vnguem superiorem eius osticiū, alibi demonstrauimus: ob quas numerū motiones necessarium fuit laryngem non ex simplici vna, sed ex pluribus simul comissis cartilaginibus consisti, motūq; ipsius non naturalem, ut arteriarum, sed voluntarium existere, ad quem perficiendū musculi instituti fuerunt. In animalibus igitur magna voce præditi, in quibus homo etiā annumeratur, quatuor sunt musculi, qui cum secunda; cartilaginem primam connectunt. Alij verò quatuor in omnibus animalibus sunt, qui secunda tertiz; & alij duo, qui primam tertiz; committunt. Deriuantur autem ex prima cartilagine scutiformi ad secundam, hoc pacto. Secundum sinem inferiorem vtriusque cartilaginis, ubi tracheam attingit, & seinuicem tangunt, ex magna cartilagine perveniunt ad secundam, extrorsum quidem duo musculi, introrsum autem duo, vtrique parte externi externis, & interni internis omnino æquales. Hi igitur exactè coarctant, angustitatem efficiunt oram laryngis infernam, primam cartilaginem secundæ simul applicantes. Alij verò quatuor, qui secundam cum tertia iungunt, fluem

*Larynx ex tri-  
bus cartilagi-  
nibus constat,  
monetur a  
proprio ductu  
omnibus, &  
scutiformis &  
prima cartila-  
go laryngis,  
quam postea  
non habet.*

*Larynx carti-  
lago secunda.*

*Larynx ter-  
tia cartilago  
arytænoideus.*

*Ligulae omni-  
bus.*

*Vocem primo  
in larynge for-  
mari.*

*Larynx cur ad  
ex pluribus  
cartilaginibus  
constat.*

*Larynx carti-  
lago primus  
scutiformis  
monetur a  
proprio ductu  
omnibus, &  
scutiformis &  
prima cartila-  
go laryngis,  
quam postea  
non habet.*

*Larynx carti-  
lago secunda.*

*Larynx ter-  
tia cartilago  
arytænoideus.*

*Ligulae omni-  
bus.*

*Vocem primo  
in larynge for-  
mari.*

*Larynx cur ad  
ex pluribus  
cartilaginibus  
constat.*



finem laryngis superiorem aperiant. Quorum qui parte sunt posteriore, cartilaginem arytenoidem retrō dēcturi: ad obliqua verō plurimum diducunt, qui situm ibi habent obliquum. Porro reliqui duo, iis quatuor actionem & positionem contrariam habentes, claudunt ad vnguem os superium laryngis, ad internam capacitatem os superium claudentes adducunt. Decem igitur dictū musculi, trium cartilaginum sunt cōmunes: alij verō duo sunt in basi arytenoidis. Ceterū alij sunt his multo maiores, scilicet scutiformis proprii: quorum duo quidem, ex inferioribus ossis hyoidei lateribus habent originē, indeq; secundū longitudinē omnē primæ cartilaginis produciuntur parte anteriore. Alij verō duo, ab ipsa quidem cartilagine exorti, sed ad pectus tendentes, alius duobus miscetur. Reliqui duo transversi musculi, ex obliquis scutiformis partibus eunt, deinde in orbem stomachum cōplectentes, simul inter se cōcunt. Quoniam igitur duaplices genere oportebat ipsis cartilaginibus ineire articulationes & motus, alios quidem, qui eas dilatarent, & comprimerent: alios autē, qui clauderent & aperirent: ad primum quidem motum constitutionem, primæ ad secundam facta est articulo: ad secundorū verō, secundæ ad tertiam. At motus alio tertio genere præterea quā minime egeret larynx, neque articulatione tertiā, & provide neq; particula quarta indiguit. Illi igitur primi musculi decem, in larynge ipso cōsistunt, cum nullo adiacentium iustrum eorum connexi. Alij verō octo musculi, colligantes ipsum cum circumfusus corporibus, alterius motus sunt duces, quo nimirum totius spirationis meatus amplificatur, contrahiturq;. Quorum qui ab osse hyoide ad partes anteriores ac superiores pertinet, cartilaginē primam trahentes, & posterioribus eam cartilaginibus abducunt, meatumque amplificant. Musculi verō obliqui, contraniam huius actionem habentes, ac positionem, qui ex scutiformi cartilagine deorsum feruntur, partes cartilaginis inferiores contrahunt trahuntq; infra, cum hoc leniter asperam arteriam contrahentes, & constringentes. Reliqui autem, qui ex obliquis scutiformis partibus procedunt, hias partes primæ cartilaginis protrahunt, secundæq; applicant, quo meatus constringatur. At pharynx, substantia & figura ab aliis corporis partibus differens, principalissimum vocis est instrumentum, linguam alicuius fistulæ referens. Melius autem sit corpus hoc fistularum linguæ minime assimilare, sed eas huic potius: quā quod quidem natura & prætereptore, & in operibus sapiens magis quā ars ipsa exiit. Quare si corpus hoc natura est opus, illud autem quod in fistolis est, artis inventum, nimirum hoc ad illius imitationem ab aliquo sapienti viro excogitatum fuerit, qui intelligere ac imitari naturæ opera potuit. Ceterū quod si lingue in vitulis sit fistula, res ipsa indicat: si fieri etiā vocē fieri nō posse, nisi trāsitus sit angustior. Etenim ad eadē vocē, opus est motione spiritus, quæ ab infernis repente simul erūpat: nec non angustiori transitu, eōq; non simpliciter, sed qui paulatim quidē ex amplo adstrictus

tendat, paulatim rursus ex strictiori amplificetur: id quod peritus efficit ipsis laryngis ligula, quam epiglottida vocant: quæ non modō ad vocem est necessaria, sed etiam ad cohibitionem spiritus. Nam particula ipsius tum dextræ, tum sinistræ, adeo in idem cōcunt, vt sub ipsis incidat, claudintq; exactē meatum. In utraque autem ipsius ligulæ parte dextra & sinistra, natura foramen vnum, vel potius rumpam ac fistulam quandā efficit, cui parte interna ventriculi etiam vni minime paruum appositum. Quare si dextræ ac sinistræ spiritus intro præterfluat, nullam habet causam, cur aut rimam ipsam aperiat, aut etiam ventriculum oppleat. At quom pilus ab interioribus quidē violentè spiritus fuerit, sed superne, quo manus rectā feratur, inhibetur, ibi refluat, & factō veluti vertigine, ad latera meatus cōvertitur, quibus magna vi incidente, membranas vniūq; fissuræ, ad subiectas vsq; cauernas diducit: totam autem opplet ligulam, atque instat, quam rem subsequitur necessariō exacta meatus ipsius obstruatur. Porro corpus ipsius epiglottidos membranofum quidem existit, vnde ab spiritu impletum, aut a moribus laryngis commotum, rumpatur. Humidum autem simul & viscidum, & quodammodo pingue est, vt propria humiditate, eōq; non facile dissolubili (qualis est vinctuosa & viscosa) mædeat perpetuō. id quod maxime ad vocem desideratur. Vnde necesse ē q; qui ex ardentissimis reficatur sunt febribus, nec qui per magnos fluxus fecerunt iter, loqui prius possunt, quā perflus larynx eis fuerit. Quom igitur musculi laryngē claudētes, qui ipsam quoq; ligulam comprehendunt, quib; resistit musculis vniuersis thoracem ipsum contrahentibus, ex media basis scutiformis emergant, recti verō protendantur, tantum spatij parte posteriori atque obliqua circumscribentes, vt proximè tertix cartilaginis articulationē pertineant, necessariū fuit in partes eius inferiores aliquot nervos inferi. Siquidē musculis omnibus, aut in ipsum caput nervus infigitur, à cerebro, vel spinali medulla facultatem sensitiuam ac motricem ad ipsos perferens: aut omnino in partē aliquam, quæ sub caput sunt, aut certe vbi infra mediū corpus ad caudam verō nunquā: alioqui principium ea esset musculi, non finis. Omnibus autem commune est musculis, vt ad eam partem diuisi extendantur, ad quā vergunt ipsorū fibræ. Necessariū est etiam, reliquis quoq; duabus nervorum coniugationibus, à quibus laryngis os referatur, ex parte inferiori nervos immitti. Non tamen æquales magnitudinem, aut æquæ pollicites robore nervos postulat duo musculi aperientes laryngē, & alij duo qui eundem claudunt: hi siquidem omnibus thoracis musculis, in spiritus cohibitione obstant: illi autem per expirationes eisdē obsequium præstant. At verō quom satis constet nervū omnē manare vel à cerebro, vel à spinali medulla, ceteris quidem musculis omnibus, quæ ad caput sunt & collum, motus est facilis. Siquid in eos qui superne feruntur deorsum, à cerebro nervus manifestè inferitur: in obliquis verō, à spinali medulla colli, ex septima coniugatione, quod & ipsa exortum habet

Epiglottis ad vocem & cohibitionem spiritus maxime necessaria.

Ligula fissura & rumpam.

Epiglottida argum quale.

Voci necessariū est maiorem spatium.

Musculi omnes in inferiorem aut in partem aliam quā circa medullam sunt.

Musculi ad eam partem trahuntur diuisi, ad quam vergunt ipsorum fibrae.

Nervus omnis vel à cerebro vel à spinali medulla est.

Musculi decem communes trium laryngi cartilaginibus.

Laryngis cartilaginibus musculi duplices articulationes & motus.

Laryngis musculi decem. Laryngis alios partibus colligantes musculi octo.

Pharynx principalissimum instrumentum vocis.

Natura est prius artem superaretur.

Artis imitator natura opera.

Vox fieri nō potest, nisi transitus sit angustior.

Laryngis mus-  
culi unde sunt  
nervei recipi-  
ant.

obliquum. Videndum igitur est, unde nam sex  
illi prædicti musculi, qui recti, secundum laryn-  
gis longitudinē, à partibus inferioribus sursum  
tendunt, suos nervos fortiantur. Enim verò à ce-  
rebro posteriori nervorum est recta productio  
per totum collum deorsum, & vtrique aperi-  
ter procedens: cui parva quædā alia se iungit.  
Ab hac productione reliqui laryngis musculi  
(præter sex illos) atque enim eorum nonnulli qui  
in collo sunt recti, distributiones accipiunt. Ver-  
rim quum sexta hæc nervorum coniugatio sit  
maxima, non parva etiam eius propago totum  
collum præterlapsa, decedit in thoracem: & pri-  
mam quidem nervorum coniugationem producit  
ad thoracē ipsum, & radicem costarum pertinen-  
tem. Alias autem præter has multas, partem ad  
cor, partem ad pulmonem, ac stomachū, partem  
denique ad omnia viscera inferiora, delegat. Dum  
igitur nervi hi per thoracem deferuntur, propa-  
go quædam vtrinque enata, per eandem reuer-  
titur viam, qua prius descendit, seu cursum re-  
ciprocans. Siquidem ubi uterque nervus visque  
ad regionem cordis percessit, finis est quidē lon-  
gus progressus, circum maximā arteriā, veluti cir-  
ca rotulam aut merā quandā sortem atque trans-  
versam obvolvitur, potissimum ea in parte, qua  
primum à corde emergens, sese ad ipsam inle-  
cit. Dexter verò, quum nullū haberet in ea tho-  
racis parte, per quam fertur, ascensum similem,  
circa illam arteriæ partem, quæ obliqua à corde  
sursum ad dextrā axillam fertur, obducitur. Sed  
quia flexio hæc erat multo deterior, quàm illa si-  
nistra ad cor, vtpote obliqua, partem multitudine  
productionum nervi in vtrinque partem, ab  
eadem regione emissā, partim etiam ligamentorum  
vi corroboravit ipsam naturā, cuius opera non  
modò laudibus, sed sunt etiam hymnis maiora.  
Nervus itaque vterque (quatenus dicti est) circū-  
ductus, sursum ad aperiens arteriæ caput recurrit,  
idem quidem iter consciscens, ac prius: nulli verò  
amplius musculo, ne minimam quidem sui por-  
tionem distribuens, quod nullum alium muscu-  
lum principium motionis suæ ex partibus in-  
ferioribus necesse erat accipere. Dispergitur au-  
tem eorum vterque in laryngis musculis sibi cor-  
respondentes: qui dextra quidē est parte, in tres  
illi ē directio positos: qui autem sinistra, in reli-  
quos tres, ambò uerò in sex, à quibus aperiri &  
claudi larynga contingit. Conciliantur autem  
sibi prædicti nervi, robur non mediocriter, ex in-  
neris longitudine: quum in productionibus pri-  
mis, nervi omnes sint molles, & cerebro ipsi ad-  
similes: progredientes uerò, magis agrestibus sel-  
pibus duriores evadant. Iam inter respirandum, in  
meum spiritus non potio modò, sed etiam etiam  
repentē incideret, nisi natura providē officio la-  
ryngis epiglottidem, veluti operculū, admouisset:  
rectam quidem alio tempore omni quo animal  
respirat stantem: quum autem quidvis transglu-  
tit, laryngi ipsi assidentem. Siquidē ipsum quod  
transglutitur, seu primum ipsius radici inci-  
dens, post autem dorso invecitum, inclinari ip-  
sam cogit, ac collabit, ut cuius substantia cartila-  
go sit, eaq; prætenus. Figura autem epiglottidis  
rotunda est: at magnitudine, paulò maior orifi-

Recurrentium  
nervorum laryn-  
gis consideran-  
da.

Natura opera  
esse longi hym-  
ni maiora.

Nervi qui ma-  
gis deorsum  
a cerebro, et  
magis deorsum  
recipiunt.  
Epiglottidis  
figura.

Epiglottidis  
substantia, ma-  
gis dura, sicut  
que.

cio laryngis. Vergit porro ad stomachum, posi-  
tionemq; habet tertie cartilaginis *aperturæ* cō-  
trariam, vtpote ex adversa illi regione exorta. Ve-  
rim quem admodum à cibariis epiglottis in la-  
ryngis meatum compellitur, ita ab eis que evo-  
muntur, cartilago *aperturæ* ostendit. Spectat enim & il-  
la m laryngis capacitatem: quo fit, ut eorum im-  
petus quæ sursum à stomacho suggeruntur, dor-  
so ipsius incidens, totam cartilagineam facili in  
locum sedentem evertat. Nec tamen ita clau-  
dunt meatum laryngis huiusmodi cartilagines,  
ut nihil prorsus transilire possit, sed ne multum,  
neve confertim. Siquidem exiguum quidam  
portionis semper in asperam arteriam dela-  
bitur, non per mediam laxitatem iter suum fa-  
ciens, sed in orbem secundum tunicas eius invē-  
ctum, quo minurum madescit atque fouetur pul-  
mo. Quin & glandulæ ipsæ quæ laryngi adiacēt,  
laxiores & fungosiores quum sint, portionem  
eius humoris excipiunt, ut eo videlicet partes o-  
mnes circumstantes perfundat. Quod aut trans-  
glutientibus nobis cibos, æstophagus à larynge  
toto cartilagineo minimè coarctetur, ob id fit,  
quia tunc committitur positio eorum: quippe  
stomachi iniunum, ad asperam descendit arte-  
riam, larynx verò sursum ad fauces recurrit. Por-  
rò bona pars muscularum linguæ, necnon non  
musculorum laryngis coniugatio anterior, aliquæ  
nonnulli qui ad omoplasas feruntur, præterea  
robustus alius geminus, qui ad os pectoris fer-  
tur, postremo alio duo musculi perimētes ad ge-  
nas, sicuti & reliqui parvi, qui sunt ad radices  
propaginum, quos columnarum appellat, hi inquit  
omnes musculi, ab osse hyoide ob similitudinem  
literæ sic appellatur, oriuntur. Ad musculi vlti-  
mo omnium dicti, & qui ante illos sunt, gene  
ipsius sunt proprii, quam movent obliquis moti-  
bus sibi oppositis. Qui autem ab osse hyoide in-  
feruntur linguæ, illius grana extiterunt: qui-  
bus oppositis simul estis, qui duplex ad pecto-  
ris os descendit, ut deorsum hyoides detrahat,  
si forte à superioribus muscularibus violentius sur-  
sum tendatur: existens etiam cartilagini scutiformi  
propaginaculū quoddā, quemadmodum & ipsum  
hyoides. Huc adde, quod os musculis tracheam  
arteriā simul coarctet ac dirigat. Quin etiam & qui  
ad omoplasas feruntur musculi, tum laryngis,  
tum osis hyoidis morum versus collum effi-  
ciunt. Invectū igitur gibbis ipsius laryngis hoc  
os, à multis muscularibus oppositis sibi invicem &  
quipollentibus committitur, atque in medio fir-  
matur. Verum ad maiorem secutentiam, non so-  
lum duobus ipsius osis lateribus applicuit natu-  
ra ligamenta quædam robusta, sed etiam car-  
tilaginosā quædā alia & rotunda producent, ea  
vtrique lateri inseruit. Connectitur autem nihilo-  
minus per membranas quædam, non modò ad la-  
ryngem & epiglottidem, verum etiam ad stoma-  
chum, à quibus firmiter connectuntur annexi cap-  
ti, his quidem osseum magis, aliis cartilagineū,  
pro ratione muscularum qui ab eo exoriantur.  
Quod pertinet ad thoracem, alibi demonstravi-  
mus, multa esse illi motus principia: respiratio-  
nemq; aliam omni carere vi, aliam violentam  
existere: atque vtrique proprios inesse musculos.

Arytenoides  
cartilago.

Asperam in ar-  
teriam illam  
semper natura  
bil potuit.

Glandula adia-  
cent laryngi.

Laryngis nervi  
unde sunt  
transglutina-  
tiones.

Hyoides os cui  
sunt propaga-  
tiones cartila-  
ginis scutiformis.

Hyoidis osis  
gemina dupli-  
cia.

Respiratio du-  
plex.

Porro

Musculorum  
transversum fi-  
bra quasi in-  
ter se persump-  
tibus habent.

Septa transver-  
sa subtilia et  
tenuia.

Diaphragma  
est vlti-  
ma et munda  
est ad fuit  
tallagena.

Pectoris os.  
Cartilago in-  
tercostalis.  
Costarum, si-  
militer ossi-  
bus, et quoniam  
distant.  
Principia ani-  
malium.

Cerebrum non  
quodvis muscu-  
lus est, sed  
larynx inter-  
costalis.  
Cranii im-  
mobile, prop-  
terea movetur.

Thorax cum os-  
sibus simul et  
musculis constituitur.

Lac esse recte  
nunciam vult  
aliqui.  
Lac, quibus a-  
nimalibus col-  
ligitur in pectore  
nascitur.  
Mammam inef-  
ficacem plures  
nunciant, quia  
parva prolem  
alunt.

Mamma qui-  
bus non prole-  
da.  
Mammam sym-  
metricam esse cor-  
da.

Lac gigni ex  
gemma elabo-  
rata.  
Mammam va-  
la vnde res-  
tantur.

Porro musculorum, qui inter costas sunt, fibræ;  
ab una costa ad aliam perveniunt, cum parva ad  
obliquam declinatione: quin etiam internæ fibræ;  
externis situm contrarium habent: necnon illæ  
quæ ad os pectoris in partibus costarum carti-  
laginosis consistunt, contrariæ sunt illis, quæ in  
ossibus sunt, usque ad vertebra. Propria septi trans-  
versi substantia, musculus est: tunice vero ipsi  
distantius: inferior quidem, peritonæa tunice  
sacramenta: superior aut, hanc tunice succingen-  
tis costas. Consiat aut diaphragma, non solum  
ad pellenda excrementa alia, sed etiam ad ipsam  
respirationem. At cartilago multa non habet costas  
rum extremitatibus circumfusa est, quod tutiores  
sunt ipsæ ab iniuriis extrinsecis, ac per eas subie-  
cta corpora. Nam pulsata cartilago minime contu-  
muitur, aut frangitur. Et verò pectoralis osculum  
vini a parte est cartilago eniformis, oris ventri-  
culi, septi transversæ, cordisque similiter propugna-  
culum: ex septem ossibus constat, quod septum  
in ipsius costas verè inarticulare sint: nam reli-  
quæ mendose sunt quinq. Quoniam enim tria est  
septem principia, quæ animal ipsum dispendit, os  
quidem immobile sine musculis primo princi-  
pio circumiecit natura: Solos autem musculos  
tertio elargita est. At medio inter utrumque positi-  
ti, et ossis & musculi. Cerebrum namque in nul-  
lo visus in digitu musculi, et solum motus vol-  
untatis & principii. Quo fit, ut cranium immo-  
bile, quasi murus, ipsi sit circumdatum. Quod  
si hepatis aut ventriculi septum eius generis ali-  
quod circumfusi fuerit, ubi cibis & potus ex-  
ciperetur: ubi factus moles reconditur? Quæ  
denique excerneretur superflua, si nullus illis præ-  
est musculus? At thorax motu penitus amissi-  
let, si ex solis constaret ossibus. Sin vero contra  
ex solis musculis, incidenter hi pulmoni & cor-  
di, nemine eos explodente. Virginitatem qui-  
dem sparium in utero esset, simul autem totum in-  
strumentum moveretur, musculi alteritatem sue  
tunt ossibus interpositi. Quod verò ad mam-  
mas spectat, quoniam lac vtilis alimentum superfluum  
sit, iure optimo quibus animalibus in cornu  
& alia id genus, in partibus superioribus copia  
superfluum absumebatur, in his quidem ad  
thoracem non poterat accerari aliud vtile re-  
crementum. Vnde ad ventrem eorum, ex thorace  
natura maximas deduxit: atque illi numerosam  
quidem viro partem prolem ædennibus, multas:  
contrariis autem binas tantum apposuit. Porro  
quibus animalibus in partibus superioribus super-  
fluum nihil absumitur, his in pectora eas colloca-  
vit. Et si vni aut duo concipiant, duas: sin vero  
plura, duas quidem in pectore, alias vero inferius  
adhibet. At in homine merito mammæ pecto-  
ri adherent, ubi & cordi tegumento esse possunt,  
ut pote glandulose existentes, crassius in du-  
ctis persimiles, & multo melius quam alibi, ex san-  
guine in venis elaborato, copiam optimi lactis  
conficere. Siquidem ex vena caua, ubi iam præ-  
pæ claus peruenit, natura duas venas cômemo-  
rabilius, ac duas item cum eis arteriarum propa-  
gines, quatuor simul eas infra per totum pectus  
deduxit: eorum modo binas demum utriusque mamillæ  
inseruit, in tæ longo isto itinere id molitæ, ut plu-

simè in venis esset sanguis percoctus. Qui quoniam  
ferretur fursum, per cor tunc iter facit: rursumque  
deorsum tendens, occurrit: ex gigniturque semper  
quidem in motu thoracis, & in his cunctismodi va-  
ganonibus incalcescit, parti perpetuo motu præ-  
dictæ diu immoratur: quæ omnia simul ad per-  
fectum ipsi cōsuetudinem conferunt. Porro quibus  
animalibus maxime in pectore sunt, seruantur  
& in masculis: quibus verò in ventre solis insunt,  
non adhuc seruantur, nisi partus similitudinem  
corporis cum matre potius quam cum patre ob-  
tineat. In vniuersum autem constat, omnium fa-  
minam esse masculo frigidiorem.

**GAL. DE VSV PARTIVM LIB. VIII.**

**A**t collum fuit constituta vniuersa asperæ ar-  
teris gratia, videturque ob id semper vni-  
cum pulmonem interire. Quam ob rem plures  
omnes, quod pulmonem non habemus, collo-  
carent: contra autem, quibus animalibus inest  
pulmo, ea & collo predicta sunt. & ipsa attra-  
hant in pulmonem per arteria asperæ, rursumque  
eiciunt per eandem. Ad hæc efflans, quæ vocis ma-  
teria est, euulsum arteriæ est ætio, ita quam nec  
vox efficitur. Estque primum & principalissimum  
voci instrumentum (cui larynx nomen est) sinus  
superior asperæ arteriæ, quam etiam pharynga  
nominant, quemadmodum & ligula, quæ laryngi  
incombunt. Ideo, si pulmoni aspera arteria est  
affinis, tantosque animalis vius præstat, eas sanè  
grana collum formatum exitit: ob idque priuata  
collo animalia, sunt mura. Etenim quum in  
thorace continetur pulmo, asperæ arteriæ ex ip-  
so emergens, ad os, magno intervallò immota,  
necessario peruenit, sparium sanè quod os &  
thoraci interuenit, quum asperæ arteriæ sit trans-  
itus, eorum etiam exitus via, quæ tum superne  
deorsum, tum inferne sursum feruntur. Ac super-  
ne quidem feruntur deorsum nervi, rōmō sursum;  
musculi, & spinalis medulla: inferne vērō sursum  
venæ, arteriæ, atque ipsa pharynx. At spinalis me-  
dulle munimento sunt circumpositæ vertebrae:  
vasorum verò diuisiones glandula replent: mem-  
brana item æligamenta quædam, muniant si-  
mul predicta & colligant. Quibus omnibus  
cuius commune operimentum existit? Anima-  
lia quæ alimentum sibi a terra ore suppeditant,  
collum habent longitudine cruribus simile. At  
homo, & quæ similia ei animalia sunt, quum  
propter pharyngem collū, & illam vocis & respira-  
tionis gratia possideat, magnitudinē etiam col-  
li formatur tantā, quantā pharyngi necessaria ad  
predictas actiones erat. Ad hæc etiā, quā opor-  
tet partes eas quæ ad humerum, brachium, vi-  
nam, extremū manū, ac denique septum transuer-  
sum spectant, & spinali medulla collis nervos acci-  
pere, horum nervorum grāia, in spatio inter ca-  
put atque thoracem medio, alii generati sunt spon-  
dylæ, ex quibus collum constituit. Caput autem  
plurimis visum est propter cerebrum factum  
fuisse, ob cūque causam sensus omnes in se con-  
tinere, ranquam seruos quosdā: & magni re-  
gis stipatores. At cæcis & aliis molli crusta in

La. La. elaborata  
tunc quæ con-  
ferant.

Mammæ quæ  
ad hanc ad  
pectus majus-  
la.

Faminiæ con-  
suetudo est mas-  
culo frigidiore.

Collum fuit  
constituta vni-  
uersa asperæ ar-  
teris gratia.

Collum fuit  
constituta vni-  
uersa asperæ ar-  
teris gratia.  
Collum fuit  
constituta vni-  
uersa asperæ ar-  
teris gratia.

Collum fuit  
constituta vni-  
uersa asperæ ar-  
teris gratia.  
Collum fuit  
constituta vni-  
uersa asperæ ar-  
teris gratia.

Collum fuit  
constituta vni-  
uersa asperæ ar-  
teris gratia.

Collum fuit  
constituta vni-  
uersa asperæ ar-  
teris gratia.  
Collum fuit  
constituta vni-  
uersa asperæ ar-  
teris gratia.

Collum fuit  
constituta vni-  
uersa asperæ ar-  
teris gratia.

Collum fuit  
constituta vni-  
uersa asperæ ar-  
teris gratia.

Collum fuit  
constituta vni-  
uersa asperæ ar-  
teris gratia.

estis, caput quidem non est: particula tamen quæ sensum dux est, ac motus voluntarius, omnino certe est in thorace constituta, ubi quævis plis sensibus instrumenta insunt. Itaque quod in nobis est cerebrum, id in illis sanè animalibus erit pariter, ad quod prædictorum quodque refertur. Cæterum existimare, caloris qui corde inest refrigerandi gratia, cerebrum fuisse constitutum (quævis fuit sententia Aristotelis) omnino absurdum videtur, nec ablimile, ac si quis dicat, calancum cordis causâ existisse. Nam qui obiecto fieri potest, ut cor assidua respiratio aeris commo- dissimè refrigeratum (vapore repletum, antequam & venis, quibus nulla est calidior in corpore animalis particula) à cerebro quod remotissimum est, crassissimè interceptum obsistat, ac temper ipsolentè calidius, aliquod refrigerum deficiat? Et tamen ubi cranium est fractum, id curam præcipue, ut quædam cunctis à fracta extricandus, ne videlicet ipsum cerebrum, occurrentis aeris refrigeretur: id quod certe esset malorum vltimum, illi cui fractum est caput. Atque si ac cerebrum esset calidior, hæc quæquam refrigeraretur ad eo. Nunc autem videri potest fuerit, refrigeratur ipsius, indigetque etiam tum sopora custodire, tanquam non solum id ipsum sit frigidum, sed ne circa molem quidem occurrit substantiæ frigida toleret. Aut quomodo de lata corde refrigerando esse potest, cor autem non multo magis cerebrum supra se positum posset excalescere, quæ quæ calor omnis leatur? Cur etiam, ad cor quidem obscura quædam apophysis ab ipso pertinet, sensibus vero indurata à cerebro portione immensam recipiunt? Et tamen in vltimo autem insignis nervus vni cum meningibus inseratur. In vltimo etiam nervus portio cerebri pertinet, multo maior ea, quæ ad aures pervenit. Similiter in vltimo oculum, vnius quidem molliis nervus in radice ipsius, vnius autem duntaxat in musculis moventes inseritur. Ad linguam vero, nōque quatuor, duo quidem molles per polatum tendunt; duo autem duri, secus vltimum autem sepiuntur. In vltimo autem omnia cum ipso cerebro communionem habent. Quod quidem quom longius quidem refrigeret, proxima autem non afficiat similiter, monitum quoddam esse mihi videtur. Fieri autem non potest, ut particula alacris vtilitatem rite exponamus, nisi totius instrumenti actionem prius invenimus.

Cerebrum igitur principium existit nervorum, sensusque & voluntarius motus. Cor autem, arteriarum atque caloris insit. Porro etiam cerebrum (quod vltimum, hoc est, in capite situm, dicitur) in animalibus capitis experibus iuxta pectus collocatum cernitur, non ob id tamen aliud quippiam cerebro proportionale, dicemus illis inesse, sed idem ipsum, licet vetus motus ei non conveniat. Siquid quod sensus ac motus principium est, vnum atque idem est in omnibus animalibus, enanti in locis diversis inveniantur. Quum igitur in animalibus capite destituta, cerebrum atque etiam os sint ad pectus: sicut & aures & nares, manifestum vni que est, propter molliam earum particulam caput conditum fuisse à natura. Cæterum eisdem animalibus capite

destituta, ut canes, balani, scariæ, oculi sublimes, ut qui duri & robusti futuri erit, recondi prælongis cervicibus insunt, quod illorum atque hoc ipsum aditum postulat. Quæ causâ etiam fuit, ut qui hostium aut predonum longe infestas incursionis speculantur, muros aut turres altas, aut montes quosdam conspiciant. Homini autem, cæteris animalibus et similibus, totos oculos molles necessario habuit, prælongis cervicibus. Oculos imponere erat periculosissimum. Quum igitur ne quæ in uno constitui eos, et respiciant illas, natura invenit quæ arte faceret aplos particulam, quæ alia simul esset, & eos taceri satis posset: supra quidem supercilia constituit: insuper quoque alas appellamus, at tollentes interque præterea partibus nalam applicans: ut ex tenuis, ovis processum, quod iugale appellamus, iam verò sensoria omnia nervum postulat mollem: nervum quidem, quia in sensu est instrumentum: mollem autem, quia sensorium, ut similitudo panis & affici debet: verum quod molle est, ad parandum: quod durum, ad agendum est aptum. Proinde sensoria quæ motu voluntario aguntur, ut oculus ipse & lingua, duplex habuerunt nervorum genus, non vnum duntaxat molle, perinde ac aures & nares. Quod si quando alterum eorum laxum fuerit, ea facultas vltimatur quam laxus nervus præstat. Videre namque sæpe est linguam, alius quidem ad mori, alius autem ad saporem dignonone, esse impletam. Oritur autem nervi molles, ex molliibus cerebri partibus: duri autem, ex duris. Rursus illi quæ recta ad sensoria, in verò per circuitum tendunt. Nervorum itaque descendunt ad linguam, illi quidem ex inferiorem & anterioribus orti, statim insinuantur in ipsam: illi autem ex posterioribus, obliquisque emergentes, circum colium prius obvolvuntur. Cæterum molles quidem, in extimam linguæ superficiem ad sapores diuidentur, in musculosa vero ad motum duri descendunt. Eadem porro ratio est & in oculorum nervis: duri quippe in ipsorum musculis inseruntur: alii verò in primum & principalissimum visus instrumentum, humorem scilicet crystallinum. Quorum mollium nervorum nullus vitra sensoria progreditur: alioqui facile rempererunt progressi. Ob hanc igitur causam sensoria omnia prope cerebrum esse oportebat. Quod quidem si verum est, constat vni cerebrum propter oculos in capite collocari esse: reliqua autem sensoria omnia, propter cerebro. Similiter etiam de ore liquet, quod hoc quoque adiacere capiti erat necesse: aut potius se obtinere linguæ, ut quæ ad iudicandos sapores, concinnandum sermonem, ac denique ad masticandum & transigendos cibos, neutquam alibi quæ in ore commodus collocari potuisset. Est autem cerebrum substantia quidem nervis simillimum (quorum ipsum principium erat futurum) nisi quod illis est mollior. Nam id etiam illi expedire debet, ut quod sensus quidem omnes recipit, omnesque imaginationes, & intellectus cōplectatur. Quia verò nervorum oportebat duplicem esse naturam, duplex etiam cerebrum exiit, molliis quidem anterioris, ad producendos molles: posterioris autem durus, quod propriam

animabibus  
pro destituta  
molli oculi  
insunt.

Oculorum sunt  
longe transi-  
tum.

Sensoria polle-  
ant nervum  
mollem.

Sensoria sunt  
sensu, partem  
molli ad pa-  
tendum apta-  
ra.

Duri, ad agum  
dum aptiora.  
Sensoria, quæ  
voluntario aguntur,  
duplex nervorum  
genus habent.

Nervi mol-  
les, duntaxat  
ad agum apti  
sunt.

Lingua nervi  
molli ordine.

Oculorum nervi  
sunt.

Crystallinum  
humorem, princi-  
palissimum vi-  
sus instrumentum.

Cerebrum pro-  
pter oculos in  
capite colloca-  
tur, propter  
nervorum autem  
sensu, partem  
molli ad pa-  
tendum apta-  
ra.

Lingua nervi  
molli ordine.

Cerebrum vni-  
us in capite  
collocatum est,  
propter nervorum  
autem sensu,  
partem molli ad  
patendum apta-  
ra.

Cerebrum vni-  
us in capite  
collocatum est,  
propter nervorum  
autem sensu,  
partem molli ad  
patendum apta-  
ra.

Cerebri parti  
anterioris est  
molli, molli-  
bus posterioris  
duri, duri  
nervi proprio-  
da.

Artemidorus  
de somniis  
lib. 1. c. 1.

Artemidorus  
de somniis  
lib. 1. c. 1.

Artemidorus  
de somniis  
lib. 1. c. 1.

Artemidorus  
de somniis  
lib. 1. c. 1.

Artemidorus  
de somniis  
lib. 1. c. 1.

Artemidorus  
de somniis  
lib. 1. c. 1.

Artemidorus  
de somniis  
lib. 1. c. 1.

Artemidorus  
de somniis  
lib. 1. c. 1.

Artemidorus  
de somniis  
lib. 1. c. 1.

Artemidorus  
de somniis  
lib. 1. c. 1.

Artemidorus  
de somniis  
lib. 1. c. 1.

Artemidorus  
de somniis  
lib. 1. c. 1.

Artemidorus  
de somniis  
lib. 1. c. 1.

Artemidorus  
de somniis  
lib. 1. c. 1.

Artemidorus  
de somniis  
lib. 1. c. 1.

Artemidorus  
de somniis  
lib. 1. c. 1.

Artemidorus  
de somniis  
lib. 1. c. 1.

Artemidorus  
de somniis  
lib. 1. c. 1.

Artemidorus  
de somniis  
lib. 1. c. 1.

Artemidorus  
de somniis  
lib. 1. c. 1.

Artemidorus  
de somniis  
lib. 1. c. 1.

Artemidorus  
de somniis  
lib. 1. c. 1.

Artemidorus  
de somniis  
lib. 1. c. 1.

Artemidorus  
de somniis  
lib. 1. c. 1.

etiam durum aut, ad duriorum nervorum gene-  
 rationem. Quum autem molles cum duro non  
 adeo minus convenire futurus esset contractus,  
 dicitur cerebrum partes duplicata dura continere,  
 quae complexa partes totum cerebrum, dixerunt;  
 & per mentis solum, qui sub capitis vertice est, &  
 corpora nervorum ipsius ambientia, coniunguntur.  
 Ad hanc, ipsius anterioris cerebri, quae partes  
 duras, in meningem coniungunt, medius duriores  
 sunt, quum ad partem de sensu sit, tum ad pro-  
 duccionem duriorum nervorum, quales sunt, qui  
 oculos moventem ad medullam commovent molles  
 oriuntur. At ex ea parte cerebri posteriori, mol-  
 les non penitus nullus producit. Hinc nervi  
 omnes confluentia cerebro sunt duriores, specu-  
 les autem exceptis, quae cerebro densiores quae  
 sunt, duriores eo non apparent, seu foli ex cere-  
 bri substantia veluti concreta, non tam exco-  
 la, coacta. Quae soli enim sensibiles quosdam  
 poros non seipsum habere videntur. Quum igitur  
 in capite quatuor sint instrumenta sensoria, quae  
 ad cerebrum sensus principium habent, et hanc ra-  
 tionem. Cerebrum non percipit nisi tantum, et secundum

etiam. Quum autem in cavitates quæ superius  
libant incident, ampliuscitur plurimum, prius  
namque naturam recipit, sic ut cerebrum esse vi-  
deatur. Postea vero ad pupillam coalescit, eadẽ  
ipsa propago quæ oculum itat, ad quam nimis  
propaginem cornæque (cui humor crystalli-  
nus incumbit) tenuis, alba, & pura quum sit, faci-  
le colorum exteriorum alterationem transmutat.  
Quia vero etiam ad vires propagine quidẽ-  
dam à cerebro erat necesse descendere, ex-  
spiratam occurritur sensibile (quo erat foris  
& vox, aut repercutio aeris) os durum ac densi-  
sum auribus oppositum, debibus obliquis inter  
labirynthi namque ipsa perit, quo frigidi quẽ-  
dam acris vires integras, flexuum varietate, sen-  
sum exolueret: aliorum aut corporem exiguum  
impetu propulsores. Igitur propter panem di-  
fficultatem ita constructa sunt auditorij membra:  
necno iterq; auditorium tectum, durior effectus  
est, quam ut ipsa à thoro cõveniat. Langue autem  
neruus, (qui quatuor hoc sensorij dixerimus esse)  
est mollior: & qualem esse oportebat: quia naru-  
m illi poterat omni regimine ad maximũ fecerit  
tunc consilire. Auditorium vero, ad parendi diffi-  
cultati, potius quam ad sensendi promptitu-  
dini, fuit comparatum. Ad solum sensorio obsta-  
tibus intra transitu consistit, nempe in ipsis ventri-  
culis anterioribus cerebri, qui est vaporosum  
quendam spiritus continens. Ad cuius quidẽ sen-  
sibile transitum ducunt libat, & considerandum,  
oportebat reperire viam tantò rariore atq; leni-  
ore auditorio meatu, quanto sensibile huius, q̃  
audire, transiitior erat parali. Ferè enim, quan-  
tũ parum renouat à luce relinquunt, tantum  
vapor etiã ab aere. Quum igitur cerebri ventri-  
culi loco inferiori sint, et per paritib; q̃ sibi pro-  
prium necessarii etiam excrementa assuetitã  
excipiant, ne melior quidem illa via excogita-  
ri non posuit, quæ amplissima atq; declivis esset:  
Ac talis quidem est naturæ meatui, per quem  
intus foras excrementa excurrunt: foris au-  
tem intro, penetrant sensibilia olfascendi. Qua-  
nuis vultus autem, alia ad vitam necessaria est, ali-  
tera ad commodiorem vitam. Sunt tamen &  
alia canali duo, qui per palatum in os, totius ce-  
rebrĩ excrementa eruant, quo soli purgan-  
do sufficit cerebrũ, quando animal omnino  
affectu habet. Quare propter odorum dignatio-  
nem potissimum atq; hac adiuu annuquirent,  
& necessariam ad vitam inspirationem in cere-  
brum, facta sunt illa in nares foramina. Ex ab-  
stant vero cerebri male affecti excrementa repur-  
gatio Opposuit autem natura ipsi olfascendi sen-  
sorio, os quoddam variè perforatum, veluti spon-  
giam quandam, simul ne aliud corpus durũ ex-  
trinnecus incideret, simul ne viribus integris aẽr  
frigidus inspirandus nobis restit in cerebri in-  
tampat ventriculos. Quia ratione animi, quẽ  
sunt ante meningas ossa, illius ad cribri similitu-  
dine dicti, spongiorum instar admodum forami-  
nulentia videntur, meatib; tortuosis distincta.  
Quoniam & dura meninx, quæ cerebrum con-  
tingit, similiter perforata est. Ceterum non facili-  
per foramina illius expurgantur puriora ex-  
crementa cerebri, nec illis magno negotio ipsi

General medical  
exam.

*American Profits*

André Gide

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

1887.

—

Österreichischer Anzeiger  
für die Kunst und Wissenschaften

ក្រុមហ៊ុន ប្រតិបត្តិការ

Other, Inc.

rum partium,  
quam Angli

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

see winter.

Palati for anal.

servatū esse ne-  
cessarium ad

Office relations  
with

*Illegible text*

1941

பாடல் எழுதின  
பாண்டிநாட்டினர்.

Crabro anter-  
nata à poste-  
riorib. larvis,  
intercedente  
thura mancipi.  
Oculorum impo-  
suerunt vnde  
de circumstantiis.

Optici nervi se  
in cerebros nō ap  
parit ducere.  
Optici nervi se  
in, sensibiles  
motus ferunt  
eae.  
Semper in ca  
pitae quatuor.

*Facilius fuit  
esse quadrupla.  
Prodromus à  
ceteris ad sim-  
plici discrimina-*

Martes dorei  
cyfura ptaf  
femalms. confet  
vix. ed ea qua  
maffatum fuit  
a. m. m. m. m.

[illegible]

justas ab imagina-  
cionalmente. Po-  
tencia, e me-  
morias, debere  
participa.  
Visto que modo  
6.4

Орденъ св. Анны  
1-го ст.

Olorum digue  
to promittit  
ab infirmitate  
et rebus.  
Extraventricu  
expulsi à cere  
bro expirant in  
aëre.  
Olorum digue  
to amict pluri  
mum totum re  
spirant in aëre.  
Instrumētum  
vancum pluri  
bus alio modis  
fessum.

Meninge in  
venit vasa.  
Crassa menin  
ga vasa.  
Meninge ten  
nat sunt cere  
brum & cras  
sam consistere  
crassam, inter  
venit et cras  
sa.  
Medium natu  
ra quid sit.

Pericranium à  
crassa meninge  
ortu, cranio il  
lum amictit.  
Cerebrum amicti  
tis inspiratione  
nem, per spirati  
onem, per spirati  
onem efficit.  
Sensorem effi  
ciunt esse genit  
um.  
Geminum v  
tilitate.  
Cerebrum alteru  
ventriculo vul  
nerato, fuisse  
quondam for  
matum.

vapor ascenderet, qui est sensibile olfactus, nisi  
vtriusque opus inspiratione simul & expiratione,  
cerebri natura proderet. Quare il lapsu quidē  
inspirationis, quae sit à cerebro, promouetur o  
dorum diagnosi: expirationis verò impetu, su  
persuorum excreto: nempe vehementer. Spiri  
tus, vti à seculum excrementa pertinaciter trahente.  
At quae in motu animi impacta sunt, ea est an  
tione expurgantur. Ipsa verò rursus odorū digno  
tio, non parum iuuat totam respirationem: non  
sine vaporibus prauis, qui alioqui nos laterent,  
vni cum puro spiritu ingredi. Porro vni cum sic  
pe instrumentum multis actionibus sufficit: vt  
videlicet tenuis meninx, quae secundae persimi  
lis cerebrum habet ac tegit, vni cum ipsius o  
mnia colligat. Sed in omnes etiam cerebri partes  
haec membrana se insinuat, totum ipsum con  
textens, extendensq; se vsq; ad ventriculorū ca  
pacitatem. Est tamen & tegumentū cerebri crassa  
meninx, aut potius propugnaculum quoddam,  
propulsandis oppressoribus cranij oppositum.  
Tenuis autem meninx, naturae operimentum  
vni exiit. Nam crassa certe ab ipso est seuncta,  
existentibus autem vasis cohaerens. Quod si te  
nuis illam meningem non interposuisset natu  
ra, cerebrum cum crassa meninge vicinias non v  
lueret dolore. Sola autem si fuisset illa, adhuc  
haud citra noxam cranio. Quā igitur id natura  
dicendum sit medium, quod eadem proportio  
ne ab extremis distat, incuta verò meninx ad  
portionem à cranio & cerebro distet, merito cer  
te, ne cerebrum aut eius operimentū quicquam  
afficeretur, prior quidem tenuis meninx, post  
ipsam autē, crassa locata est, quae quantū offe  
sit mollior, tantū tenui membrana est durior: quan  
tū autem hac tenuis est mollior, tantū tenui  
cerebrum mollius etiam existit. Duobus itaq; me  
dis & vinculis natura ipsa totū inter cranium  
& cerebrum cohaerentē conciliat. Quemad  
modum igitur cerebrum tenuis meninx, sic il  
lam crassa, atque hanc densq; cranium ambit, &  
cohaerendit, etq; per multa vincula annectitur  
quae quidem ab ipsa meninge, membrana rē in  
star exorta, extenduntur singula versus partem  
cranij sibi dē directae correspondentem: unde per  
futuras progressa, sibi mutuū occurrunt, co  
aptantur, & coalescunt, cōmunemq; ex se ipsis o  
mnibus pericranium procreant membranā,  
quae cum cranio duram meningem cōnectit.  
Iam verò duo anteriores ventriculi cerebri (qui  
cerebro spiritum animale prius & cōficiunt, &  
præparant) inspirationem, & expirationem,  
ipsamq; cōtationē efficiunt. Eos autem praestit  
esse duos quā vnum, quod esset infernus cana  
lis duplex, & sensorū omne, cerebrūq; ipsum  
sit geminum. Prima tamen, maximēq; commu  
nis geminorum instrumentum vtilitas est, vt  
si alterum eorum lesum fuerit, subsisteret reli  
quum. In Ionia siquidem vidimus quendam adol  
lescentem vulnere in alterum anteriore cerebri  
ventriculo accepto, fuisse perspiratū: ne  
momentum quidem temporis potuisset vni  
vni vulnus vtrūq; simul violasset. Itaq; tenuis est;  
in quibus licet, quod geminum est, quā quod  
simplex. At in vno animali duas facere spinas

non licuit, quare nec duas spinas medullas: ne  
proinde nec duplex esse cerebri posterior ven  
triculus poterat, quā ex ipso spinas medullas  
ortur. Sed quoniam nervi omnes qui sub capi  
te in totum sparguntur corpus, aut ex postio  
re cerebro, aut ex medulla spinali oriuntur, ven  
triculū hunc oportuit maximum esse, & ven  
triculisq; anterioribus per meatum insignē, animā  
lem spiritum antea in illo elaboratum, exciperē  
per quem nimirum meatum, procedentem ab  
extremitate communi anteriorum ventriculo  
rum, quem nonnulli quartum ventriculum voc  
cant, cum cerebro, hoc est, anteriori cerebri par  
te, quae postica maior est) parencephalus, hoc est,  
cerebellum cōiungitur. Pars autem cerebri quae  
supra communem illam cavitatem est sita, veluti  
domus testum, in sphaera superficie cōcauam  
circumdūctā, haud ab re appellatur *unipolus*, &  
quod testudinis aut fornicis instar  
sit fabricata. Quae quidem partem omnem ce  
rebri incumbentem, sine labore sustinet. Vndiq;  
enim sibiq; simillimum est, quod rotundum est,  
atq; orbiculare: ob idq; omnium figurarum ad pa  
tendum est difficillimum, omniumque etiam est  
capacissimū, earum quae equelem dimētionem  
fortiuntur. Hic autem commodum id minime  
contemendū in organis vniuersis, quae ad con  
tinendū substantias quasdam fuerunt comparatū:  
id quod re ipsa constat, etiam in illo meatu, qui  
à ventriculo, quem cernaturum diximus, ducit  
ad parencephalid. Omnes etiam meatus cor  
poris, quem admodum & vniuersi ventriculi, se  
cundum ipsorum mediū, omnino sphaerici sunt,  
quod si capaciores existant, ac difficilium etiam  
pariantur. Quam autem ventriculos qui mate  
riales magis substantias recipiunt, expedit esse  
maiores: minores verò, qui materias maiorum  
vniuersum ac facultatis, hoc est, elaboratas magis  
& absolutas, continent: sanē ventriculos post  
erioris cerebri, minor merito fuit anterioribus.  
Iam cerebellum ipsum minime quidem ex ma  
gnis flexibus tenui meninge interceptis, vt cere  
brum, sed ex multis quidem, & his à dorso  
paruis, aliōq; modo structis, consistit. Quia ve  
rò nō in solis ventriculis, sed in toto cerebri cor  
pore continetur multus animalis spiritus, existi  
mandum est plurimum etiam in posteriori cere  
bro contineri, vt quod omnī qui in totum cor  
pus distribuatur nervorum principium futurū  
sit: mediūq; illa intervalla, quae partes eius con  
nectunt, spiritus esse vias. At intellectus sequi  
tur non compositionis varietatem, sed corporis  
cogitationē, intelligentieque, bonam temperiem.  
Neq; enim bonitas ac perfectio intellectus mul  
titudini spiritus animalis potius attribuenda vi  
deretur, quam qualitati. Ad principium autē illius  
meatus qui ventriculos anteriores cū cerebello  
cōiungit, oppositū est glandulosum corpus, à fi  
gura con *unipolus* dictum: quod quidem cerebri  
pars nō existens, diuisionē illius magnē vni  
plet ac firmat, à qua omnes ferē anteriori ven  
triculorum plexus *unipolus* constanter. Exten  
ditur praeterea secundum totum meatū inter am  
bas eminentias cerebri, quae *unipolus*, hoc est, par  
uas naves; appellant, epiphyis quaedam vni  
similis,

Ventriculus in  
rebus posterior  
omnium meatu  
m, ab ante  
rioribus per a  
lium meatu  
animalis spi  
ritum recipit.  
Parencephalus.

Ventriculus in  
rebus posterior  
omnium meatu  
m, ab ante  
rioribus per a  
lium meatu  
animalis spi  
ritum recipit.

Ventriculus in  
rebus posterior  
omnium meatu  
m, ab ante  
rioribus per a  
lium meatu  
animalis spi  
ritum recipit.

Ventriculus in  
rebus posterior  
omnium meatu  
m, ab ante  
rioribus per a  
lium meatu  
animalis spi  
ritum recipit.

Ventriculus in  
rebus posterior  
omnium meatu  
m, ab ante  
rioribus per a  
lium meatu  
animalis spi  
ritum recipit.

Ventriculus in  
rebus posterior  
omnium meatu  
m, ab ante  
rioribus per a  
lium meatu  
animalis spi  
ritum recipit.

Ventriculus in  
rebus posterior  
omnium meatu  
m, ab ante  
rioribus per a  
lium meatu  
animalis spi  
ritum recipit.

Ventriculus in  
rebus posterior  
omnium meatu  
m, ab ante  
rioribus per a  
lium meatu  
animalis spi  
ritum recipit.

Ventriculus in  
rebus posterior  
omnium meatu  
m, ab ante  
rioribus per a  
lium meatu  
animalis spi  
ritum recipit.

Ventriculus in  
rebus posterior  
omnium meatu  
m, ab ante  
rioribus per a  
lium meatu  
animalis spi  
ritum recipit.

Ventriculus in  
rebus posterior  
omnium meatu  
m, ab ante  
rioribus per a  
lium meatu  
animalis spi  
ritum recipit.

Ventriculus in  
rebus posterior  
omnium meatu  
m, ab ante  
rioribus per a  
lium meatu  
animalis spi  
ritum recipit.

Ventriculus in  
rebus posterior  
omnium meatu  
m, ab ante  
rioribus per a  
lium meatu  
animalis spi  
ritum recipit.

Ventriculus in  
rebus posterior  
omnium meatu  
m, ab ante  
rioribus per a  
lium meatu  
animalis spi  
ritum recipit.



similis, ex particulis quamplurimis, cōnexis per membranas tenues, composita: quæ quidem cerebri pars existens, altera parte sui, posteriori cerebri ventriculo annectitur. Inde autē paulatim adaucta, ac secundū meatum porrecta, ipsū totum planē obstruit. Cæterū ubi contracta reflectitur, idq̃ transversus flexus, meatum totum in tantum aperit, in quantum retrorsum cesserit. Etenim cū sic in seipsam cōfident rotundetur, quantum minuitur longitudo, tantum latitudo eius augetur. Quare constat ea sic paulo magis amplificata, in solas meatus partes, quæ ad basim sunt, stricctissimas, nequaquam ingredi posse fines ipsius inferiores. Semper autem tantum de meatu aperitur, quantum de illius convexitate, in ipsum ingressura, minuitur. Quibus quidem motionibus hoc ipsum corpus transitus spiritalium præest, dominaturq̃. Alligatur autē eminenti cerebri, ligamentis quibusdam, à quibus vtrinq̃ restricta & coarctata, cōnectitur, ne diuagari possit: cuius quidem epilepsij cōstructione, alia nulla melior potuit excogitari. Nullam siquidem invenias cōstructionē bonitatem ad actionis perfectionem, meliorem ea, quæ ad eō exquisita existit, vt si vel tantillum immutes, tota cōfessum vincetur.

### GAL. DE VSV PARTIVM LIB. IX.

**Q**Uum autē succi eius quod ad partē cōfluit, hoc quidē, ceu vtile, assimiletur illi: hoc verō, tanquam alienū, omnino ex cerni conveniat: certē ad hanc excretionē natura meatus opportunus desiderat. Quos nisi natā fuerit, acuatū ibi excrementum, primū quidem insitit oneris grauat, deinde prolebat quo minus succi benigni illuc cōfluant, illorū vias preoccupans: quo fit vt membrū nutriti nō sinat: sed quemadmodū animalia esurientia, lūrum, aut aliud quidvis simile vorant, ita partes accommodatō sibi alimento carentes, cogantur aliquē vel ex ipsis prauis succis attrahere. Vnde postea in ipsis collecta excrementa, putrescent tandem, ac sic acriora simul & calidiora reddita, inflammationes, erysipelata, hæpætas, carbunculos, febres, innumerabilesq̃ aliorum morborū turbam exuscitant. Quare magnam semper curam natura adhibuit, vt excernerentur superflua. Quæ cum genere sint duplicia, alia enim vaporosa & humida, naturaliter ad sublimia feruntur: alia autem aquosa & limosa, motu suo deorsum decumbūt, vacandas quidem his quæ ad superna volitant, meatus quosdam tenues in altū duxit: declues autē & amplas eis subdidit, quæ suo pondere delabuntur ad inferiora. Cæterum declues cerebri meatus, rum per palatum in os, tum per corpus nariū, sensibilia excrementa eruant. At vaporosæ excretiones, præ tenuitate sensum nostrum effugiunt. Porro in humidis quidem & mollibus corporis partibus, nulla est præscripta recta quædam tali excretioni via, quā humidum omne ac molle corpus, cedere quidem expedit: his quæ impetu concitatore per ipsum feruntur: trāmissis verō his, rursus core

atq̃ coalescere soleat. At in duris corporibus, nisi via quædam prius parata sit, trāsire per eam nihil potest. Idcirco in cranio, quod cerebri ceu galea quædam existit, cōspiciuas ac sensiles vias natura vaporosissimas fuliginosissiq̃ excrementis aperit: simul quidem ipsū cauernosum efficiens, simul & variis futuris coarctatū. Alioqui nec posuisset caput ipsū purgari, quod quidem quum à subiectis partibus omnia quæ sursum feruntur fuliginosa excremēta excipiat, largiori eget evacuatione. Ossium autem quæ ada plantur ad futuræ generationem, vtrunq̃ eminentiam habet & cauitatem, non vna serie, sed situ alternantes, vt duarum ferrarum sese invicem ingrediturum insit, mutuo inter se coherescant, vtroq̃ nimirum osse cavitatibus suis excipiente eminentias alterius. Quæ structura maximum ad securitatē & firmitudinē videtur habere momentum, præter id, quod etiam per futuras fit transpiratio. Non sunt autem foraminibus pertusa capitis ossa, sed intus cauernulas cōplures forantur, quod oportet vtriq̃ eorum superficiem læuem & æqualem existere, ne videlicet aspredine suā, quam vtriq̃ foratæ obnuiscent, colliderēt tum pericranium, tum ipsas meningē cerebri. Crassiora igitur fuliginosorum excrementorū per futuras solas vacuantur: nam tenuioribus, vel cranium ipsū est peruiū. Nec verō ad transpiratum duntaxat, sed ad exadentia etiam vasa tenuia futuris ipsis natura est abvsa. Non est factum capitis os tenue simul & densum, sicuti neque densum & crassum, sed rarum, cauernosum, & crassum, quod sic neq̃ granularum esset, nec viam in cerebrum breuem, vulnerantibus se, daturum. Meatus porro qui ad palatum descendunt, alter quidē profectus ex fundo mediū ventriculi cerebri, fertur deorsum: reliquos verō emergit à meatu qui cerebrum cerebello connectit. Fertur autem obliquus deorsum, versus alterum. Quum verō primum simul in idem conuenient, locus quidam cōmunis, constitutus à tenui meninge, vtroq̃que excipit, cauus ac decliuis, veluti quædam lacuna, cuius labrū superiū absolutus est circulus. Inde magis ac magis arctatus descendens in subiectū adnē, manifestam cauitatem habentem, excrementa q̃ transcolantem, immittitur. Excipit autem hunc, os cribro simile in palatum desinens. Quum igitur locorum omnium quæ in toto sunt corpore, longē tutissimū sit, qui circa adnē prædictum versatur, inter cerebrum & os palati constitutus, meritō retiformis plexus, omnium quæ illic videntur maxime admiranda particula, inibi collocatus est, completēs quidem in orbem & ipsū adnē, pertingens autem retrō longissimē. Tōn siquidem cerebri basi propemodum hic plexus subicitur, ex maxima portione eorum arteriarum quæ à corde sursum ad caput feruntur, contextus. Est autem non simplex rete, sed cuiusmodi vulgana hæc piscariorum retia, si plura alia aliis cumulata superiniicias. Reliqua porro arteriarum pars, quæ rectā ad caput ascendit, ubi cranium sunt prætergressa, medio inter hoc & crassam meningē loco, primum quidem diuiduntur in crebras, rariq̃ admodum

Cranio insitit meatus sensiles per quos fuliginosa excrementa eruant.

Suturæ crani quædam esse debent.

Cerebri excrementa crassiora, per futuras erigunt.

Cranium crassum, rarum & cauernosum.

Cerebri meatum ad palatum descendunt.

Lacuna cerebri, adnē subiectum cerebrum.

Os calatorium. Locum omnium tutissimum.

Retiformis plexus ubi locatus.

Retiformis plexus ex plerumque arteriarum contextus.

Vermiculare corpus transitus spirituum præest.

Partes destitutas familiaris alimentum recipit per vias tenuissimas.

Excrementa per insensibilia quæ mala inferant.

Excrementorum duo genera.

Cerebri meatum decliuis via. Locum ubi præcipue sensum effugiunt. Corpus humanum auctum.



tenuis arterias: quarum alie in capitis anteriori, alie in posteriori, alie ad leuam, alie ad dextram feruntur, inter se mutuò cõplexæ. Postea verò ex ipsis, veluti radicibus in truncum suum coalescentibus, coniungunt alia arteriarũ enascitur, ei quæ initio à corde sursum ferebatur, æqua bilis: eodẽ modo iam per crassæ meningis foramina subit ad cerebrum. Etenim vbi natura vult exactè materiã conficere, diuturnũ ei moram in coctionis instrumentis comparat: id quod licet planè videre in flexibus illis variciformibus, qui ad testiculos pertinet. Venæ liquidæ & arteriæ in primis flexu partibus sanguinem syncerũ continent, qui certè in vltimis flexibus ad ipsos testiculos, nõ amplius ruber est, sed iam quodammodo albacet, exigui adhuc requirẽs ad substantiæ seminis generationẽ, quod ei à testiculis cõsiliatur. At quanto spiritus animalis cerebri exactiorẽ semine concoctionem desiderabat, tanto plexus retiformis flexuosior variciformi existit, 50 vt in eo immoratus diutissimè, pro dignitate coquatur. Generatio aut animalis spiritus, materiã propriam spiritui habet vitalem. Quis igitur anima ratiocinatrix residet in cerebro, per quod quidem non ipsi ratiocinamur, necessum fuit in eo contineri plurimũ animalem spiritũ, qualitatẽ proprietatẽ ex sui ipsius concoctione adeptũ. Quare totũ cerebrũ in arteriis multipliciter diffusus contextum est, multatq; ipsarũ diuisiones, à basi in ipsius ventriculos desinũt, quemadmodò & venarũ, ex eius vertice descendunt. Verũ vt hæc quidem in illos excurrent superflua, sic arteriæ largiter spiritum ipsũ respirant. Fruitur autem vniuersum cerebri corpus, tum ipso venarum sanguine, tum arteriarum spiritu. Si quidem partes omnes facultatem habent, propriam sibi materiã trahendi. Porro in ceteris corporis partibus adeo propinquæ sunt semper venæ & arteriæ, vt mutuò sese contingant, ac venæ semper arteriæ incubant. At in cerebro, quod satis esset ex locis diuersis, aut potius omnino contrariis, vasa in ipsum inferi, à corde sursum per collum venæ atque arteriæ ad ipsum vsq; caput simul productæ, inde hæc quidem ad plexum retiformem, illæ autem ad summum capitis verticem diuerterunt, cõmuniter crassæ meningis, quæ quidem duplicata, venas in seipsam mediam recipit: idq; vasis tutissimam præbens viam, similisq; vtraq; sui parte, altera quidem cerebrum, altera verò cerebellum complectens: ac deniq; ex suis ipsius duplicatione hac, valida ligamenta producens, quibus caluarii annectitur. Quia verò ligamenta ea emergere per futuras erat necesse, natura illis futuram a specie A græce literæ labdo-dem dicitam, adhibuit. Postquam aut facta hæc fuerunt, quam plurimis, in transitu sanguinis per crassam meningẽ, foraminibus factis, per ea venas, alias quidem magnas, alias verò paruas produxit: sursum quidem, ad cranij duplicationem, quæq; \* ex ea oritur, pericranij membranam: infernè autem, ad subiectam tenuem meningem. Coeuntes autem in vertice capitis, quæ sanguinem deducunt meningis duplicationes, in locum quandam vacuum, quasi lacunam, quem rotularum appellat Herophilus,

ibiq; relinquentes bonam portionẽ sanguinis, inde veluti ab arce quadam, omnibus subiectis partibus, quæ innumeræ sunt, nuos numerosissimos mittunt. Reliquũ verò sanguinis, riuulus ex ipsius crassæ meningis cõfectus partibus, in regionem anteriore deducit, à quo quidem medium accedente ventriculũ, magnæ exoritur veng, quæ in plexus tenuis meningis disseminatur: cum quibus etiã securitatis gratia ad eam semper glandulosus extenditur. Quod reliquũ est, rectè secundum longitudinem, vt inino ceperat, prorsum longissimè fertur, multas producens venas, quæ in totum cerebrũ disperguntur. Atq; huic quidem crassæ meningis portioni, quæ prædictum sanguinem riuum efficit, cerebrũq; in binas partes dispescit, aliam quoq; futurã natura addidit, quæ à vertice ad frontem rectè per caput medium fertur. Ipsius autem ad frontem pertinentis meningis, pars illa quæ meatui distinguenti anteriori cerebrum à cerebello, necuð epiphyssi vermulari incumbit, cũ sursum ad seipsum tendit propinqua corpora, impedit quo minus ab eis productio meatus premunetur. Part modo & duplicatio illa quæ inest futuræ labdo-di, corpora posteriora incumbẽtia ventriculo, sursum trahit. Nec minus tertiã & coconalis sutura, quæ per medium anteriorum ventriculorum transversa fertur, ab omni compressione subiectos ventriculos liberat, incumbẽtia corpora in sublimè reuelans. Igitur ex productionibus cerebri, maxime quidẽ sunt quæ ad oculos pertinent: quarum parte vtraq; pori sunt oculorum, iuxta quos sunt nervi, qui eorum musculos mouent. At poris opticus coeuntes prius quàm ex crassâ meningẽ excidant, ac separatim rursus post eam, qua parte quidem vniuntur, est peluis, quam arteriæ vtrinq; tangunt. Cæterum lingua duplex quæ sit, quemadmodò & reliqua omnia sensoria, partemq; omnem dextrũ sitũq; habeat: qualem (qua ambax ram molendi transglutendũ cibi, quàm etiã loquendi gratia coalescunt) meritò in vtrang; eius partẽ, à posteriori basi ipsius cerebri, natura pccipui neruũ deduxit. Quum aut omnibus quoq; oris partibus ab iisdẽ locis sensum gustatoriũ esset melius tribuere, & ad has etiã nervos illuc produxit, vicinatis atq; situs ratione obseruata: quibus etiã adiunxit comitem, ipsam tenuem meningem, vt simul illos nutrit et cõtegeret. Vt verò crassâ meningis has productiones admitteret, in modũ fistulæ dilatauit ipsam vsq; ad ossa anteriora, quæ illic perforauit, & cum vtraq; meningẽ, partem quidem ipsorum neruorum in ipsam linguam, partem in superiorem, partem in inferiore maxillam infixit. Ante quorum distributionem, obiter quandam neruũ vtriq; productũ musculo temporali inseruit, diutiorẽ certè illis omnibus, quod non ad gustum, sed destinatus ad motum esset. Verum quod nerui maxillæ inferiori, necnon & linguae infixi, decliues ducantur, eorum partũ posino fecit. Qui autem in superiore maxillam feruntur, eos natura versus anteriora deducit, nõ per oculorũ foramina (sic enim offendisset mollissimos opticos nervos, propter quos totus factus est oculus, vt in quibus præ-

*Natura recta.*

*Cerebralis sutura per medium anteriorum ventriculorum cerebri, ferat transversa.*

*Cerebri ea productionibus sunt maxime, quæ ad oculos pertinent.*

*Peluis inest à griffum opticum rum nervorum conficiens, Lingua duplex.*

*Lingua vtraq; parti à posteriori basi ipsius cerebri nerui post fides.*

*Oris partes vni de nerui ad ossa poris diffunduntur recipiant.*

*Temporales muscoli quales nerui sunt.*

*Maxilla superioris nerui, quæ parte in ossa inferiatur. Oculi est fistula propter opticos nervos.*

*capua*

*Concoquendum ex illis humoribus procurat natura morã ad sternitatem in vasis. Varicosities testicularum sunt.*

*Animalis spiritus generatur ex vitali. Anima rationalis habet sedem in cerebro.*

*Arteriæ effundere animalium spiritum in ventriculos cerebri.*

*Partium singularem sufficiens tatem propriam materiam trahendi.*

*Crassæ meningis vna.*

*Labdoide futura.*

*Testicular.*

cipua pars conficitur) sed per aliud, tertium prælongum, nec vique adeo rotundum, quod iuxta magnum oculi canthion est, per quod nervi oculorum musculi inferuntur, trahunt. Plura namque fecisse foramina, similitudinis olisium non expediebat. Vbi igitur prædicti nervi ad oculorum cavitatem perveniunt, vterque eorum ad, nuncupatum malum fertur, perforatus rursus illic, quæ sub oculis sunt, oculus, transiuntque præbentibus, ne contingens musculis, aut offendat illos, aut ab eis collidatur: ac sic denique in regionem sibi e directo correspondentem dispergiunt. Ergo si exortus illos, qui ad nares feruntur, non numeremus, cetera quibus nullæ nervorum productiones oriuntur, Prima coniugatio erit, mollium nervorum qui ad oculos tendunt. Secunda, eorum qui oculorum musculis movent. Tertia, de qua nuper differrebamus, quæ illinc oritur, vbi pars cerebri anterior, cum posteriori connectitur. Quarta nervorum coniugatio, paulo posterior his est locata, magis quidem quam prioræ à basi emergens. Propagines autem eius omnes sunt sibi ipsi propinquæ. Ac cōnificetur quidem statim nervus tertie coniugationis, cum quibus fertur longissimè: postea tamen seungitur, totique palati rursus inferitur. Exigui porro admodum sunt hi nervi, nervisque tertie coniugationis paulo duriores: quia tuncia quæ os veitit, durior est, non lingua modò, sed etiam aliæ propemodum omnibus faciei partibus. Ob id etiā producuntur ex paulo duriori regione cerebri, quam nervi tertie coniugationis. Quanto enim magis retro progredimur, tanto seipso durius effectum cerebri cernimus. Atque etiam partes quæ ad basin ipsius pertinent, aliis duriores existunt. Quinta mollium nervorum coniugatio, productiones eas continet, quæ à lateribus capitis, versus ossa lapidea extenduntur. Earum autem utraq; dividitur in ipso per ossa trilinea, in duas partes: quarum maior quidem in meatu auditorio inferitur: minor verò extra cranium in circum nuncupatum foramen, quod tamen cæcum non est, licet existimetur tale, ob suam flexuosam obliquitatem. Est & sexta alia nervorum coniugatio, à basi cerebri productior, quæ nondum etiam sunt duræ: omnibus tamen prædictis tanto duriores sunt, quanto spinæ medullæ propiores. Hæc enim durorum nervorum principium est, ob idque cerebro est multo durior & quo magis deorsum progreditur, eo durior semper seipsa evadit. Descendunt autem hi nervi vsq; ad os latum, quæ spinæ extremitas est, in omnia fere intestina & viscera distribuit, quod nimirum ex, mollia quum sint, voluntariosq; motu priuata, molles nervos desiderant, ne omnino sensus maneant expectati. Ventrículo tamen præcipue tales erant ex vfu, vt cui adesse exactissimum sensum deficientes cibi, & ponione maxime conveniebant. Quare horum nervorum pars maxima in ipsum distributa videtur, & postquam in partes oti eius circumcinctas, quæ ob id sensu acutissimo præditæ sunt, atque ut qui vehementer esuriunt, contrahi & convelli sentiantur. Ne autem nervi hi, molles qui sunt, per longum iter deducti, perclauderentur atque in discrimen venirent, membranis for-

tibus ipsos obduxit natura, corporibuscq; propinquis connexit, quæ multa descendebus illis occurrunt. Quæ connexio plerumque illis etiam corporibus cōmōdum adfert non contemnendum: quemadmodum & septimæ coniugationis nervi, quos quidem copulatos illos qui à sexta coniugatione oriuntur, simulatq; capitis offe excesserunt, membranis foribus circumdedit natura, ad vnguemq; vndiq; cōmunivit, vtriusq; cōmune hoc cōmōdum machinata. Quippe nervi coniuncti, copulatiq; quum simplices, multo tiores ab iniuriis existunt. Postea verò quum nervos septimæ coniugationis ab ipsis (vbi paululum erant vna cum illis progressi) seungere ad linguam esset necesse, rursus eos cū arteriis carotidibus iunxit, per totumq; cum illis collum traxerunt, cōmunibus colligatos membranis. At iuxta illas, quæ arteriæ ad finistram cordis ventriculum tendentes, rursus eos separavit, ac dextris quidem in brachia, finistram autem in dextram ventriculi partem, vtriusq; obliquo ductu inferavit, id quod longè erat tutius, quum si recta descenderent, postea in ventre diuisi fuissent. Porro illinc nervi septimæ coniugationis oriuntur, vbi & cerebrum definit, & spinalis medullæ est initium, progressi quadantenus vna cum nervis sextæ coniugationis. Post autem ab ipsis seuncti, parte quadam sui, eademq; minima, rectos laryngis contextum musculis: maiori verò, in totam linguam disseminantur. \* In vniuersum autem, ex nervis hi existit primi, qui exquisitè sunt duri. Nam prædictorum omnium nervorum, nullus similiter durus est, ac hi nervi. Iam verò iu musculis oculorum, etiam prorsus minimis, magni tamen nervi inferuntur, quod consistit in hi sunt molliores, quam motorios cum veniat. Vtriusq; est musculi temporalis, tres insignitur nervi: duo quidem à tertia coniugatione (de quibus loquimur sumus) tertius autem durior, de quo mox verba faciemus. Musculi quoque genarum, narium, ac labiorum, vt mole, sic etiam duritia, mediocres nervorum productiones recipiunt. Quum enim per ossa longius ferantur, ex via longitudine ipsi durities accedat. Nervus igitur qui linguam mouent, nec produci aliunde cōmodius potuissent, nec via vti opportuniore, quam qua nunc vtruntur. Etenim sensibiles nervi, simulatq; inferuntur, amplificati, tuncq; linguæ externam contextum, subiectos musculis ne attingentes quidem. \* Hi autem motorij, qui ad septimam coniugationem pertinent, tenues quidem, sed validi, atque in multas fibras soluti, omnes linguæ musculi os texunt, idq; merito. Illis quippe sapores diiudicat, his autem lingua mouetur: quæ actiones duas nō poterat altero genere nervorum prestare. Quam igitur quinta illa (quam memorauimus) nervorum copula, ex obliquis capitis partibus in ossa lapidea emergens, à duobus foraminibus inæqualibus duplex facta excipitur, cuiusque grandior portio per foramen linguæ recta ad aures feratur: minor verò, in angustius, quod cæcum vocant, illa per foramen quoddam, quod iuxta aures est, penetrat, vbiq; omnia media inter huiusmodi principium inferuntur, atque buem externum, variè instat labyrinthi tot-

Septima coniugatio nervi, cum illis qui à sexta oriuntur, copulati sunt.

Arteris carotides.

Nervorum septimæ coniugationis in ventriculo obliquo implantatio.

Septima coniugatio nervi vnde exoritur, et in quæ partes diffunduntur.

Septima copula nervi, iuxta primum exquisitè duri.

Temporali musculo tres nervi insiguntur.

Lingua nervi sensibiles.

Lingua motorio musculo à septima coniugatione nervi.

Quædam nervi.

Quædam nervi.

Prima copula mollis nervorum, secunda, tertia.

Quarta.

Oculus tuncia durius est omnia, fieri lacum partibus.

Cerebri quæ partes duriores sunt, quinta mollis nervorum copula.

Circum foramen.

Secunda mollis nervorum copula.

Spinalis medulla est origo durorum nervorum.

Oculorum, spinæ extremitas, tertia copula nervorum mollium, quæ partes diffunduntur.

Oculus ventriculi partem, cui foramen excipitur præditæ.

10

20

30

40

50

60

queatur, sane per hunc labyrinthum, durum illi  
parte nervum produxit, qui maxima quidem sui  
partem larum buccarum aperit musculum: exigua  
verò, quæ reliqua est, nequæ à tertia coniugatio-  
ne, ad temporales mûculos pertinentibus, opi-  
ratur. Ad cuius quidem generationem & de-  
ductionem, os illud lapideu fuit maxime & op-  
portunum, & aptum. Duos porro nulli nervos  
conspicias, vnum quidem omnium durissimum,  
alteru contra mollissimu, ac deniq tertium in-  
ter vtrung, medium ad æquilibrium. Qui igitur  
inter medium hunc sunt & durissimum, omnes  
simul duos: rebusq verò alios, qui ab eodem  
medio sunt vsq ad mollissimu, appelles molles.  
Ac duos quidem ad motu esse opime compa-  
ratos, ad sensum contra ineptissimos, iudices.  
Rursus mollior esse ad sensum aptitudinẽ ex-  
actiorem: sicut imbecillitatem ad robur actio-  
nis. Nervorum igitur omnium duorum principiu  
est spinalis medulla, durissimoru autem, eius fi-  
nis inferior. Cerebrum verò est omnium nervo-  
rum mollium origo: vt mollissimorum, quod in  
medio anteriorum eius partiu consistit. At sub-  
stantie mediocrium nervorum principium ea re-  
gio est, quæ cerebrũ & spinalis medulla iungun-  
tur. Cæterum mollium nervoru, alij quidem  
procedentes siccificant, ob idq motu evan-  
dent: alij verò perpetuo propriam naturã reti-  
nent, vt qui ad venticulu deferuntur, quos sen-  
sificos semper manere oportebat. Rursus, nervo-  
rum tertis coniugationis, qui ad ossa quidem  
maxillæ inferioris \* descendunt, magnosq den-  
tes \* prætergrediuntur, & excicati, & duriore  
effecti, iuxtaq dentes caninos elapsi, in labioru  
mûculos disperguntur. Qui verò per oculorum  
cavitates ad malum ossa pertiunt, adeo etiam  
duri redditi in crassa sita, vt eos mûculos mo-  
neant, qui in superiori maxilla, & in narium alis  
consistunt. At gingivæ, dentefq omnes, necnon  
tota cutis faciei, cum tunica narium interna, à  
tertia nervorum coniugatione recipiunt propa-  
gines, sed molte quidem cõspicuas & magnas,  
per eam viam, quæ per genam deducitur: gingi-  
væ autem & reliqui dentes, tenues & vix conspi-  
cuas. Ab his verò nervis, qui ex regione oculo-  
rum ad mûculos temporales ascendunt, palpe-  
bre, & quæ circa supercilia sunt omnia, & frons  
tota nervo recipit. A nervo autem qui ex cæcis  
foraminibus excedens, temporalibus obscuram  
mittit dissindionem, feruntur quædam propa-  
gines ad gl'ndulas & partes illas quæ iuxta au-  
res sunt, arguendo ad partes maxillariu tenues.  
Maxima namq eius nervi pars maxillariu motum  
ad latera efficit per latum musculum, de quo pos-  
tea dicendum est. Ipsa verò ante pillosa, sensus  
gratia distinxit, propagines plures & tenues,  
instar araneæ filorum, ex omnibus libiculis re-  
cepit partibus. At cutis frontis, quod motus vo-  
luntarij stirpitriceps, cõdæq cum subiecta illi  
mûcolofatur, eodemq cum illa motu mo-  
ventur, fibras nervorum conspicias adepta est.  
Porro labioru cutis adeo cõalescit cum mûcu-  
lis, vt nec mûculum, nec curim vocare queas,  
quod & vtriusq constans est: quæ constructio  
ad illorum exactam cõmunionem & viciu

nem requirebatur. Tam verò per foramen illud  
quod cernitur in maiori oculi angulo, nervus  
haudquaquam exiguus ad oculoru cavitatem ena-  
rus, in internam nanum membranam, atq in pala-  
tam etiam (cuius tunica à crassa meninge prola-  
pla, per foramina oris & narium orta quum sit,  
ori ac narium membrana est cõmunis) dissemi-  
natur. Porro crassa meninx, tum futura, tum for-  
tissimis ligamentis, cum supernis cranij parti-  
bus atq obliquis connectitur, vt minimè cere-  
brum comprimatur. Partibus verò anterioribus  
per exigua quædam ligamenta, atq imbecilla co-  
hæret: vbi nullam membranam producit, qua-  
lis partibus superioribus est pericranios tunica.  
Ad basim autem, vbi crassior est, paucis etiam il-  
li & imbecillis ligamentis fuit opus, quum suo-  
pte nutu deorsum semper feratur. Cæterum in  
eadem basi portione quandam à se productam,  
reniformi plexu substravit, ne scilicet à subiectis  
ossibus comprimeretur. Constitit autem ex mul-  
tis ossibus cranium, vt si quando contractum  
fuerit, rupturæ eius per totum non progredian-  
tur. Venit cum caput velut per longa quædam  
sphæra sit, iure vna quidem futura recta per me-  
dium ipsius à posterioribus ad anteriora est ex-  
tensa: duæ aut transverse hanc excipiunt: qua-  
rum posterior quidem labdoades, anterior co-  
ronalis vocatur. Sitq ex illis tribus futuris figu-  
ra \* litteræ similis. In acuta tamẽ & turbinatis  
capitibus, non omnes ex futuræ cernuntur. Sunt  
autem in vniuersum tres capitum acutorum fi-  
guræ. Prima est, vbi caput anteriorem simul &  
posteriorem eminentiam amisit. Duæ verò alie  
figuræ sunt, quaru altera quidem in fronte, alte-  
ra turris in occipio nullam eminentiam habet.  
At future capitum rotundi & sphærici, & græcæ  
litteræ sunt per similes. Vbi caput in occipio nul-  
lum habet tumorem, perit labdoades futura, re-  
cta & coronalis manent, ex quibus constat fu-  
tura instar litteræ T. Similiter cum frontis emi-  
nentia perierit, dispungitur coronalis, relictæ re-  
cta & labdoades, quæ litteram J reverfam con-  
stituunt. At verò quæ à media futura aquidi-  
stant, & ad vtranq autem constitutæ, secundum  
capitis longitudinem deferuntur, rectæ squamo-  
se agglutinationes vocantur: quum non licet  
ita futuris ossa sese mutuo ingrediantur, sed ex-  
ternæ in subtilis quasdam squamas, ad maiore  
firmitudinem earum partium, supra ossa desce-  
dentia applicentur. Ossium autem in tempori-  
bus compositiones atq structure, sicut & quæ  
in superiori maxilla cernuntur, futuræ illi pla-  
ne esse videntur.

## GALENI PERGAMENI de vsv partium, lib. X.

Quod autem in parte corporis anteriore,  
in quam inuenerunt, præstint oculos co-  
locari, cõp geminos esse, nemini obscu-  
rum existimo. Cæterum non insunt oculi poste-  
rioribus etiam capitibus partibus, quia ab illis ori-  
netur molles non poterant, quales in vtrung  
mirum in oculis: ad quos quidem dum per os-  
sa cõtendunt, desinant & compinguntur. Vbi  
verò

Lapideus os.  
Nervorum mol-  
lior ac duri-  
or affirmanda  
methodus.

Nervus durus,  
ad motum: mol-  
lior ad sensum  
esse optimi com-  
parati.

Cerebrum est  
nervorum omnium  
mollium origo.

Labiorum ner-  
vus tridens.

Dentes omnes  
à tertia nerveo-  
rum coniuga-  
tione accipiunt  
propagines.

Gingivæ.

Latæ muscu-  
li.

Frontis cutis.

Crassam men-  
ingem esse om-  
nem crassam

Ratiformi ple-  
xum vtriusq  
prodest. Quam-  
vis quondam à  
crassa menin-  
ge.

Sicute arboris.  
e. t.

Capitum ac-  
utorum figura

Squamosa ap-  
pessimæ.

Opticorum ner-  
vorum progressus.

*Vitreus humor  
Crystallinum  
humor primum  
videndo organiza-*

*tionem  
Suffusiones gi-  
gias inter cry-  
stallinum &  
corneam.*

*Crystallinum  
humorem  
nervus à vitreo.  
Crystallinum  
quale.*

*Producentis  
oculi in ocu-  
lo, vti.*

*Produco cho-  
roidis tunicæ  
in oculis.*

*Opticus insti-  
tus in crys-  
tallino.*

*Producentem  
optico nervo, ut  
si videri aut  
cum affectu  
crystallini hu-  
moris, ad cor-  
neam.*

*Concrevissem  
ad maximum  
oculum esse  
transmutatum, &  
tamen, quæ  
vis remanet  
imperfecta.  
Crystallinum  
humorem vi-  
sum, veluti  
fibra trans-  
sit in aqua.  
Corneam primum  
quæ humoris  
oculi.*

verò ad illos pervenerint, amplificati denique, in orbemque humoris vitreum complexi, sese in crystallinum humorem inferunt, qui exiit primum videndo organum: id quod planæ suffusiones ostendunt, quæ inter humorem crystallinum & corneam interaccitens, impediunt visum, quoad deprimantur. Humor autem crystallinus, qui albus est atque splendeat (hac enim sola ratione, & coloribus immutatus) ab humore vitreo nutritur, qui quanto crassior & candidior est sanguine, tanto à crystallino humore relinquatur humiditate & albedine. Hac enim albus est planissimus, ac mediocriter durus: vitreus verò, humidus quidem est, inftar vini cuiusdam fusi: albus autem, albedine quadam adulterata. Quum igitur in neutro horum humorum sit vera, verissime est vitrumque per transumptionem nutriti: crystallinum quidem à vitreo, vitreum autem ab amplificatione illa reformitque productione, quæ ipsum ambiens, duos vius præstat: primum, ut crystallini alterationem persentiat: secundum, ut plurimis arteriis & venis (quas ducit portio tenuis meningis) refectus, vitreo humori alimentum adferat. Ipsa autem productio choroidis tunicæ, non solum corpus illud reforme alit, sed quibusdæ filamentis tenuibus à se productis etiam textit & colligat. Cæterum ubi primum nervus in oculum ipsum inseritur, natura ab eo vitæque productionem membranarum abducens (quod nunquam in alio nervi molitæ est) eaque crassas ac duras efficit, duram quidem meningem oisibus alligant, choroidem autem solum diuagari permittit. Quæ quidem tunc destituta suis vasibus, ac paulo post à supernis omnibus locis, quamplurimas vasorum immissiones recipiens, revertitur tandem, immensam quandâ vasorum tenuium, sibi ipsis propinquorum, copiam, veluti ex foro adferens: cum quibus omnibus rursus in superiorem productionem inseritur. Vbi autem productio ipsius nervi in humorem crystallinum se inferat (cuius nimirum grata descenderat) neutquam amplius progreditur: quandoquidē illic lætetur, affectu illius verax crebro esse nuncius potest. Verum invero quum ipsa insertio in medium crystallinum humorem (qui sphaericus est) vndique facta sit, necessarii maximus in crystallino circulus describetur, illi in duas partes diuisa. Omnium siquidē quæ rotundis corporibus connectuntur, ad maximum in ipsis circuli connexio est tutissima. Ad hunc igitur circulum consentanum erat humorem vitreum motu violento inlubere. Quocirca medius \* in ipso vehitur crystallinus humor, quasi semisecta quæ piam sphaera in aqua. Ab altera etiâ interna parte ipsius crystallini humoris, quæ illius veluti hemisphaerii exiit, firmitatis gratia \* humoris ipsos circulus vnus maximus omnium coniunxit: qui quidem vitrique terminus existens communis, ligamentum huius efficitur, & præterea corpori reformi, & quarto ipsi choroidi tunicæ: quæ etiam ut ægrius afficeretur, à crassæ meningis tunica, ut in cerebro, ita hic quoque circumvestitur. Nam quæ hæc ab ea in aliis omnibus partibus, præterquam in vasorum productionibus, dicitur, cum illa tamen in hoc memorato circulo

lingitur. Quæ quidē quinta coniunctio, præter illas quatuor in vno loco productas, subiectas partes munit, tegit, & roborat. Dura igitur tunica tunc choroidi est applicata: hæc verò reformit: retiformis denique vitreo & crystallino humoribus illi quidem, per totum ipsum: huic autem per solum iridem. Itaque per corpora media humor vitreus illi tunica omnium extrinsecus, durissimæque est vnus. Propæd à illum eundem circuli extrinsecus alia quædam tunica accedit, quæ seu duram illam membranam iuuuans, sextam insertionem facit, hæc est durior (hoc est, dissolutior cræta) musculari oculi mouentium, & extensis. Septima autem præter has omnino est alia, scilicet periostræ insertio, quæ totum sanè oculum cum oisibus colligat, sinuque mouentes ipsum musculorum operit. Accertitur quidē membrana hæc, candida: desinit verò in circulum cui alie omnes subiectæ sunt, ubi albi nigro consurgit: qui locus tum iris, tum corona appellatur. Quod si hæc dissecueris probe, circulus videbis hic septe, libris deinceps mutuo insidentem, crassam tamen & colore discrepantem: vnde si velis quidem, locum hunc aliter quam irim appellare queas. Ac primum quidem circuli circa mediū crystallinum, vitreus humor facit. Secundum, retiformis membrana. Tertiū, choroidis tunica. Quartus circulus est, qui illa simul comprehendit & colligat. Quintam addit tunica orta ex crassa meningis. Sextū, quam diximus aponeurosim esse. Septimū denique circulum circumscribit tunica quæ à periostræ deducitur. Hæc verò ipsam meningem durior, quæ choroidem (vt dixi) comprehendit, ad anteriorem crystallini humoris regionem ipsa natura producens, partem eius maximè mediam, longè tenuissimam ac densissimam fecit, cornibus extenuatis perisimilem: vnde ex ceratoidibus, hoc est, corniformis vocatur, existens instrumenti visorij fortissimè propugnaculum. Tenuis igitur, dura, & densa cum esset facta huiusmodi ceratoides tunica, prout utique erat futura splendida, ad splendorem transmittendū opportunissima, perinde vt cornua ad amissionem polatæ & derasæ. Quod summum artificium nature, ut cuiusvis admirari licet, sic imitari nemini. Quamquam multo facilius est inuenire aliquid, quod animaduersum non fuerat, in his quæ facta iam sunt, cauilari, quàm inculpari omnia à principio construere. Quia verò periculum erat, ne ipsa tunica cornea laboraret alimeni penuria, aut duritie sua humorem crystallinum collideret: aut denique immixtum oculis superne visoriam facultatē (cuius substantia est splendida) in splendore descenderet, his incommodis omnibus natura perfidio vnico occurrit, quod declarabimus postea. Quod autem vehementer splendore oculi nostri offenditur, duocuerunt id quidē milites Xenophontis, qui per multâ niuem iter facientes, vehementer lesi oculis fuerunt. Experti sunt etiam id illi miseri, qui ex obscurissimo carcere in splendidissimam domum, calcæque illam, & lauragatam, à Dionysio tyranno repente ducti subito & cœcabantur, minime repentinum illum occursum splendide laticis secretas. Quare merito sanè pictores, quum

*Oculus humoris  
duo quæ produ-  
centis inueni-  
unt.*

*An iris per  
musculari me-  
ningis insidet.  
Periostræ inser-  
tio.*

*Irms.  
Circuli ad irim  
subiecti sunt,  
quæ firmat  
oculum, & à  
quibus extrin-  
sur.*

*Ceratoidem  
tunicam quæ  
à crassa men-  
tingis tenuiori  
reducitur.*

*Natura artifi-  
cium admira-  
ri, non imitari  
possimus.*

*Oculi offendi-  
tur à vehemē-  
ti splendore.  
Xenophontis  
milites,  
Dionysij tyran-  
ni insidentia.*

*Diffusi sunt  
in corneis colo-  
ribus extrinsecis  
atq; reflectis vi-  
sibus.*

*Ophthalmia  
laborantes ef-  
funde lux et  
conspiciunt.*  
*Altra videtur  
a nobis per defi-  
ctus solis in-  
signi: quoniam  
extrinsecis et  
profundissimis  
pulis.*

*Flammulae sub  
ardore sole mar-  
cescunt, extrinseci  
tunc, prope ma-  
iores flammulae.*

*Choroidis tuni-  
ca atq; cor-  
nea.*

*Choroidis tuni-  
ca vfus.*

*Palpebrae cor-  
clauduntur, v-  
bi splendore nat-  
lesit.*

*Rapides tuni-  
ca.*

*Choroidis tuni-  
ca foramen.*

*Splendore o-  
culi interius, cum  
exteriori inspec-  
ta.*

*Albuginea hu-  
moris vfus.*

*Suffusio per  
glandulas rati-  
on.*

*Oculo non clau-  
so, ampliatum  
alterius pupil-  
lam.*  
*Mortui anima-  
lis cor se laxa  
pupilla.*

pungunt in coriis albis, à quibus visus offenditur, colores fuscus ac cæruleos opponunt, in quos subinde intuentes, recreant atq; resiciunt oculos. Similiter ophthalmia laborantes offendit lux & redarguit: qui tamen fusca & cærulea sine dolore intuentur. Percipere etiam clara nos à longinquo cupientes, ad supercilia manus obtendimus. Quare in magnis solis defectibus stel-  
la nobis apparet, quas cernimus etiam ex profundissimis puris, potissimum quando non est  
sol in meridie. Quod si solem ipsum explicatis oculis intueri velis, illos celeriter perdes: quem-  
admodum contingit mulis, qui post eclipsim solis, fixis oculis ipsum quò intuerentur, nosse asse-  
ctum eius cupientes, prorsus sunt occæcati. Ete-  
nim si flammulam quandam exiguum in sole lu-  
culento constituas, marcescet: imò extinguitur  
etiam, si eam prope aliam maiorem flammam lo-  
caveris: quum minor lux à maiori vincatur sem-  
per, ac dissipetur. Ne igitur crystallini & vitrei  
humoris splendor, à splendore cornæ discate-  
retur, natura ipsam choroidem tunicam, à tenui  
meninge ortam, ex iride vna cum cornea pro-  
mouens, multis partibus illam tum nigrâ, tum  
fulcâ, tum cæruleam, extrinsecus autem den-  
sam efficit, quod videlicet tres predictos vfus præ-  
staret: nimirum corneam sibi vicinam alens, ean-  
demque ne humor crystallino incideret, prohibens:  
ac visui deniq; affecto spectaculum medica-  
mentosum existens. Quæ causa est, ut omnes  
natura duce, quum lucis splendore offendamur,  
palpebras repente claudamus, properantes ad  
naturale remedium. Cæterum humida & mollis  
insistat spongiæ quum sit, qua parte humor crys-  
tallini cõtigit, ipsa choroides tunica impedi-  
mento est quo minus aperitis retiformis mem-  
branis, aliqua ex parte illi noccat. His omnibus  
admirabilior est tunice huius cæruleæ (quâ ra-  
goidem etiâ, hoc est, visiforme appellât, idq; ac-  
ino vix leuitate eius externam, & asperitate in-  
ternam, haud perperim comparantes) pupillam  
versus, foramen. Ea siquidem in centro suo est  
pertusa: & quâ hoc duntaxat foramen consistit,  
nulla tunica alia est inter cornæ & crystallinum  
media: sed veluti pertene admodum & candi-  
dum cornu, splendor internus cum externo cõ-  
municat, commisceturq;. Vt autem quâ foramē,  
hoc est, cornea tunica nequam humorem crys-  
tallinum contingeret, portione ipsius natura  
longius foras abduxit: simul autem humorem  
quendam syncerum & tenuem (cuiusmodi inest  
omnis) crystallino ipso obduxit: spiritum aëreo &  
splendido, omnem pupillæ locum oppleuit. Id  
quod ex suffusorum compunctionibus discis.  
Nam quum suffusiones omnes loco inter cor-  
neam & crystallini medio consistant, instrumen-  
tum quod deducendum eam per externum angu-  
lum oculi immittitur, in orbem & quoquo ver-  
sum circumactum, neutrum illorum corporum  
tangit, tanquàm magna à se invicem distent inter-  
capedine. Porro si alteri oculorū clauderimus,  
alteri aperientes, amplificat & dilatatam, ac ve-  
luti inflat pupillam cernemus, quod illuc maior  
copia spiritus cõfluat. At in mortuo animali, vel  
si humor tenuis evacuatus non sit, laxa tamen

pupilla videtur, quod nimirum spiritus quidē ipse  
leuior & tenuior existens, facili ante anaromen  
evacuatur: humor autem adhuc remaneat, sen-  
sibilem evacuationem postulans. Is præterea  
qui maximè sunt atque provecti, ob spiritus su-  
perne affluents inopiam, adeo cornea tunica  
conrugatur, ut aliq; quidem prorsus nihil, aliq;  
verò malè, ac vix adhuc videant. Affectus autē quē  
appellat, quily alteri oculorum vti plurimum  
accidit, solus est imminutæ pupillæ, nihil  
cornea priuatim affecta. Spiritus igitur ipse, lu-  
cidus omnino quū sit, ad oculorum etiam actio-  
nem confert: humor verò, præter dictum à no-  
bis visum, hoc etiam præstat, ne crystallinus hu-  
mor ac portio vna interna exsiccentur. Siquidem  
crystallini exsiccatio præcipuum morbum inducit,  
à quo cecitas vel maximè oritur. Propria ipsius  
crystallini humoris tunica, & quæ partem illius  
anteriorē velat, araneis tenuibus est subtilior  
& albior: in qua quidem ipsius pupillæ imago,  
veluti in speculo quodam conspicitur: quan-  
doquidem levis est hæc tunica & fulgens, supra  
omnia specula. Quod verò naturali huic crys-  
tallini operimento est proximum, venosum, mol-  
le, nigrum, atq; pertusum est. Venosum quidem,  
quod cornæ aliunde nutriet. Molle autē, ne con-  
tractu suo humorem crystallinum affligeret. Ni-  
grum, ut splendorem colligat, atq; ad pupillam  
transmittat. Pertusum deniq; ut quem transmi-  
sit splendorem, foras emittat. Quod autem om-  
nium est extremum operimentum ac propugna-  
culum, reuice, album, ac durum est, quasi cornu.  
Tenuē quidem & album, ut splendoris promp-  
te transmittat: durum, ut tunc conferret. Porro  
crystallinus humor nō fuit factus omnino spheri-  
cus, ut & circulos coalescentes in iride facili  
admitteret, & per violentas plagas aut motus,  
minimè exturbaretur à vitreo. Cõnexiones quip-  
pe ac sedes in absolute rotundis, sunt fallacio-  
res, quàm in planioribus. Quia verò cornea tu-  
nica maximè exposita erat iunioris extrinsecis,  
ob id illam naturâ, quamvis ex se robustissimâ,  
palpebris, aliis, circumiacentibus ossibus, atq;  
etiam cute munivit. At cilia quidē, quasi vallum  
quoddam pilorum propulsandis exiguis corpori-  
bus, ne faciliè oculis apertis inciderent, primo lo-  
co constituit. Palpebras verò ipsas, tanquam scu-  
ta quædâ, ut simul cõrret atq; cõplicarentur, ocu-  
lūq; clauderēt, si quod forte maiorū corporum  
in ipsum illaberetur, apposuit. Porro aduersus  
maiora ad hoc molū incurfus, superne quidem  
supercilia locavit, infernè autē malas: ad maio-  
rem angulum, nasum: ad minorem deniq; pro-  
ductionē osis iugalis. A quibus omnibus oculis  
in medio comprehenditur, atq; illæque feruat,  
cuius moru ad patiendū difficultatē non me-  
dio citius conferente. Quum igitur ex dura qui-  
dem omnino substantiâ, sed quæ moveri facili, &  
cum cornea versari sine eius noxa posset, palpe-  
bras fieri esse consensit, atq; etiam connecti oſi-  
bus: membrânâ quam *synchysis* vocant, à superci-  
lorū labilis natura abducentis, in longitudinem  
tantam producens, in quâ palpebras exren-  
di oportebat, rursus eam per partes palpebrarū  
infernas, internâsve reduxit, illamque non ad  
principium

*Palpebris oculi.*

*Spiritus oculi.*

*Crystallini,  
Arachnoidea  
tunica.*

*Choroidis tuni-  
ca natura et  
vfus.*

*Cornea tunica  
vfus.*

*Crystallini  
humor cur an-  
te factus omni-  
ne sphericus.*

*Conuexitas  
in respectu  
tunc esse fal-  
laciorem quam  
in planioribus.*

*Ciliarium vfus.*

*Palpebrarum  
vfus.*

*Superciliarum  
vfus.  
Mala.  
Nasum.  
Os iugale.*

*Palpebrarum  
confectio.*

*Papillæ.*

principium vnde emerit, sed ad subiectos tali principio musculos, qui vtrique oculo movent, applicuit: indeq; ad iridem vsq; produxit, vbi i-  
ptam in cornem tunica insertavit. Spatium vero inter duas portiones perioistii corporis me-  
dium, viscosa atque viscidiosa occupant, cum  
membranis quibusdam à maculis ipsis exten-  
sis: quo loco quas vocant *Adusis* gigni contin-  
git. Ad portionē autem luvius constructionis, pal-  
pebræ inferiores constantur, à malarū perioistio, 50  
quadantenus quidem extenso, revertente autē  
rursus ad cornem. Qua parte verò laxa perio-  
istio remeare incipit, substantia quædam mem-  
brana durior adtena est, quam *reperis* nominat,  
constringens quidem & comprehendens quod  
convexum efficitur ex eius duplicacione: sedem  
autem atq; extensionis rectitudinem palpebra-  
rum pilis suppeditans, propter innatam sibi du-  
ritiem. Nam quemadmodū superciliorū pilos,  
vtpote excepturos quod à fronte atque à capite 50  
deflunt, sibi pilis inodere mutuo præstitit, ita  
hos & rectos, & tenos, pariq; & cōvenienti in-  
tervallo dispositos, necnon antroriorū vergen-  
tes, semper conservari expediebat, vt qui pulve-  
rem, & animalcula volitantia, vt minus illa be-  
rētur oculis, essent prohibitori. At quō oculi nō  
ex qua vis positione visibilia omnia cernere pos-  
sint, sed illud duntaxat cernant, quod ipsi pupil-  
læ est directum, ob id natura sic disposuit eos, vt  
possent plurimum circumagi: & cum ipsis to-  
tum collum ad motū habile fecit. Quæ de causa  
enī, non vniū, sed geminos oculos cōdidit. Post-  
quam igitur oculorum motus voluntarij sunt  
quatuor: vnus quidem quo sursum, alius autem  
quo deorsum, ac duo etiam quibus adducuntur  
ad latera: consentaneū fuit, & musculos qui mo-  
tum illorum duces essent, totidem esse nume-  
ro: duos quidē à lateribus, nempe vnum vtriusq;  
consistentem: alios autem duos, quorum vnus  
est inferius, alter superius. \* Dissoluti namq; hi 40  
omnes in nervosa filamenta, oculum vnum ef-  
ficiunt lani tendonis, in iridem definitis. Quum  
verò oculi circumagi essent melius, natura duos  
alios musculos, positione oblique effecit: sin-  
gulos in singula palpebris, versus minorē angu-  
lum suprà atq; intra extensos: quorum beneficio  
oculum, quoquo versus torquemus. Est & alius  
quidam musculus magnus circa eorū radicem:  
construens quidē ac muniens nervi illius mol-  
lis immisio nem, ne disrumpatur: oculum autē 50  
attollens sursum, ac deorsum contrahens, nonni-  
hilq; etiam cum vertens. Cæterum quum partes  
omnes quæ motu voluntario sunt præditæ, duo-  
bus vt minimū egeant musculus sibi pilis op-  
positis, altero scilicet extendente, atq; flectente  
altero (nō potest enim ab vno vtique motus præ-  
stari) superiores autem palpebræ motu volunta-  
rio moueantur (inferiores quippe ne mouentur  
quidē) natura duos exiguos musculos singulis  
eorū applicuit, sub membrana quæ cū subiacet, 60  
atq; à nervosis tenuitatibus tarsī extenditur, de-  
litescentes. Quorum sanè musculorū, alter qui-  
dem in maiori angulo apud nasum constitutus  
oblique, ad tarsī partē dimidiam, quæ illis est, per-  
tingit: alter verò rotus & ipse obliquus, & ad mi-

norem extensus angulum, ad reliquam tarsī par-  
tem dimidiam sibi propinquā prorumpit. Dum  
igitur prior musculus agit, quum caput eius ad  
maiorē angulum conitet, partem palpebræ si-  
bi contrariam deorsum trahit. Dum verò alter,  
reliquis sursum attollit: vt cuius caput ad superci-  
lium spectet. Trahunt enim musculi versus pro-  
prium principii. Quod si vterq; eodem tempo-  
re tendant, oculus nō magis erit apertus, quā  
clausus: quā eversionem palpebrarū in morbis,  
Hippocrates *de morbis* nominat, illam dicens esse fi-  
gnum perniciosissimum. Fit autem affectus in v-  
troq; muscularum convulsio, partemq; tarsī con-  
tinuā ad seipsum trahente. Cæterum si alter qui-  
dem musculus agit, altero prioris cessante, ape-  
rin & claudi totam contingit palpebram, quum  
pars altera tarsī, quæ mouetur, semper vni se-  
cum trahat & reliquam. Cuius causa est durities  
quam illi dedit natura, dursi ipsū & cartilagi-  
nosum efficiens, in omnib; vtriusque musculi fi-  
nem inferens. At palpebra inferior minor superi-  
ori est constructa: nam si maior fuisset, compli-  
caretur, atq; in seipsam recideret, plurimūq; ex-  
crementa colligeret. Non indiget autem motu,  
quia pusilla & exigua est. Porro ad vtriusq; fora-  
men, quod iuxta magnum angulū est, per quod  
oculorū excrementa expurgantur in nares, natu-  
ra carunculam quandam veluti operimentum  
apposuit, cuius beneficio contingit, vt excremen-  
ta oculorum minimē quidem vacuentur per an-  
gulos, ad proprios autem impellantur meatus.  
Confluunt siquidem per foramina illa, in ipsū  
os atq; in nares ab oculis excrementa. Vnde me-  
dicamenta ocularia, non multo post inuentionē  
tuent, alij quidem expauerunt, alij verò emunxe-  
runt. Quam ob rem qui carunculam illam ner-  
uosam, quæ iuxta vtriusq; angulū est, pharmaci-  
cis acerbis colligunt, aut resciderunt, hī chir-  
urgi effluxum excrementis ex parte aperuerunt:  
quem affectum vocamus *pudus*. Sunt in palpe-  
bris paulo extra maiorē angulum, tenuia quæ-  
dam alia foramina, pertinentia vsq; ad nasum:  
quæ quidem tenuem humorem dant vicissim,  
accipiuntq; ad symmetriam naturalem seruandam,  
quæ motuum præstat agilitatem: ad quam  
similiter perficiendam, glandule etiam dux ite-  
vtriusq; extiterunt oculo, altera inferius, altera su-  
perius partibus hærens: quæ meatibus non ob-  
scuris, humidū in illos effundūt, perinde vt glan-  
dula, quæ lingue radici adiunget, salivam in os  
deriuant. Humectandū etiam eos gratia, pingui-  
tudē est oculis circumfusa. Nam ipsi nervi sensiti-  
ci (quibus solis viæ spiritus conspicuæ ac sensibi-  
les insunt) ex diversis quidem locis cerebri pro-  
ficiuntur: progressi verò (essent enim in diui-  
tissimū quidē instrumentū iniquus, impius aut  
in conditorē ipsius, si hæc prædictis non addere-  
rem) sibi mutuo cohærent: ac postea rursus à se  
invicem digrediuntur, & in ista literæ X separari  
tunt, idq; minimē commutari, aut intersecti à se in-  
vicem, sed cohærentes primō, ac post vterque ad  
regionem propriam diducti, sic, vt ob aliud ni-  
hil cōventisse videatur, quā vt meatus suos con-  
iungerent. Vt autē modū quo fit visio percipias,  
intelligito circulum ab vno tantum oculo cer-

Palpebrarum  
motus.

Musculi semper  
trahunt versus  
proprium prin-  
cipium.

Quædam que pa-  
lpebras.

Palpebra inferi-  
or cur superio-  
ri minor, & motu  
difficile expari.

Oculorū excre-  
menta qua parte  
expurgantur in  
nares.

Pudus.

Glandula larynx  
oculorum vsus.

Glandula lin-  
gua adhaeret.  
Opticus nervus  
sola iacta ma-  
tu infertur.  
Opticorum ner-  
vorum conspi-  
cua in vno, di-  
ductio.

Visionis mo-  
dus.



*Circulus quid.* ni. Est enim circulus figura quæ à medio vndiq; distat æqualiter. Ab eius autem puncto medio (quod centrum dicitur) visq; ad pupillam videntem id, rectam duci lineam exultima, quemadmodum plures alias & similes duci à pupilla ad ipsam circumferentiã. At figurã quæ ab his omnibus rectis lineis circuli circũscribitur, conum nomina: cuius verticẽ pupillã-basim effe circuli tene. Lineam verò rectam quæ à pupilla ad centrum circuli extensa est, totius figuræ axem appella. Dum autem intelligis convexum & concavum, intelligis etiam amborum medium, videlicet lævæ ac planum, cui nihil nec caustatus, nec convexitatis inest: cuius superna pars, plana superficies exultat. Quemadmodum igitur si ex axe ipsius coni, qui à pupilla ad centrum circuli per ærem protenditur, min⁹ granū aliquod pendeat, conspectū centri pupillæ eripiet, ita quodvis corpus, quod in medio visus & rei videndæ positi fuerit, phibiturũ est, quo minus id quod ante oculos est, amplius cernatur. Quandoquidem vt aliquid conspiciatur, opus est id careat omni caligine, nullamq; interfe & pupillam habeat impedimẽtũ. Siquidem per rectas lineas fit visio: quæ haud dubiẽ ipsius loci radii ex eodem tibus per angustum foramen, prorsũq; semper rectã & citra flexionẽ tendentibus, assimilatur. Sciendum autem est, vnumquodq; corporũ quod videtur, nec videri solũ nec nudũ, sed quippiam circum ipsum etiam omano cerni: quoniam visiones quæ corpus id complectuntur, accidant interdum eis, quæ vltra corpus videndum sunt. Secundũ etiam discẽ, corpus quod à solo dextro oculo cernitur, id si propius sit, in sinistris magis paribus esse putari: siu longius ab sit, magis quodmodum in dextris. Quod verò à sinistro solo conspiciatur, in dextris situm videtur esse, si id est propinquius: magis autẽ in sinistris, si est remotius. Quod autem ab utroq; in medio. Tertium præter hæc ubi discendum venit, alterius oculorũ pupilla compressa, sursumve aut deorsum adducta, apparere duplicia, quæ antea simplicia apparebant. Ceterum si deorsum quidem fuerit pupilla deacta, humilior id apparebit, quod intruere: contrariũ autẽ, si sursum sublata fuerit. At dum pupillã à maiore aut minore candium adducimus, facimus vt quod cernitur, sinistrum magis, aut dextrum appareat, nõ tamẽ duplex. Est autẽ necesse axes conorũ visoriorum in vno eodẽque plano positionem habere, ne quod est vnum, duplex appareat. Verum prædicta axiomata tamenẽ rationibus philosophicis, mathematicisq; sicillimẽ comprobant possunt, quia tamen experientia æ omnia constant, breuitas grãtia ab illorũ accurata demonstratione superfluo. Iam verò quod porũ illa opri intra cranium quidem iungantur, atq; in vnum conspirent, postea autem diuicẽtur, vilitates due in causã existerunt: quarum prima ac maxima necessaria est, ne quod extrã intuemur, appareat duplex. Secunda, vt si quando alter oculo sit clausus, aut omnino mutus, in alterum, per illum porum communem, vnuerfus spiritus confluat. Quippe facultate visoria duplicata eo modo, longe acutior futurus est visus, Quam igitur

tur quæ videntur, secundũ rectas lineas videantur: ante humorem autem crystallinum, foramen vix situm, per quod cum suis obiectis erat habiturus commercium: perspicuum certẽ iam est, quod si figura exacte rotunda, paucioribus sui partibus, plana autẽ pluribus, cum suis obiectis communicabit. Quocirca diuinus ille architectus, rotundũ ipsum, sed paulo oblongius, crystallini corpus coniegit, vt tutior ab ipsis iniuriis esset, ac simul pluribus sui partibus, species rerum videndarum exciperet.

*Crystallinum humore cur rotundum simul & oblongum sit scilicet.*

## GALENI PERGAMENI de vsu partium, lib. XI

**P**orro musculi temporales, quum gratia inferioris maxillæ à natura sint constituti, secundum magnitudinem cuius, atq; in mordendo robur, suam magnitudinẽ atq; structurẽ contrahunt: merito in animalibus quidẽ eis, quæ serratos dentes formentur, maximi simul & fortissimi habentur: quandoquidẽ non solum magnũ, sed valudam etiam maxillam obnunt. Maxima autem, sed nec neruosi, nec in agẽdo præpotentes, in asinis, bubus, & suisbus, ac breuiter in iis omnibus: quibus magna quidem inferior maxilla inest, in minime tamen robusta ad mordendum. Homini verò, cui genam paruaui habent, dentesq; ad solum efum idoneos (non enim in morsu, hominis fortitudo consistit, nec dentibus domiturus est animantia cetera, sed ratione & manibus) musculus temporalis, haud inuaria, debilis simul & minimus extitit: nimirum ipsa natura non modo inueniente quæ oportet, sed ea etiã cuiq; pro dignitate tribuente: id quod diuine iustitiæ est propriũ. Lynceus etiã, sicut & ceteri, & similes, similiter habent musculos temporales exiles simul & imbecillos. Est autem simia homini quamissimilima, illiusq; velut imitatio quædam ridicula: vt quæ rotundissimam habet faciem, dentes caninos paruos, latum pectus, clauis longiores, miuumum hirsuta, quæ recta etiam ita bellẽ, vt & gradiri sine errore, & currere celeriter possit. Iam verò quæ animalia pronare cibum assumunt, ea vt collũ manus, sic prolixiores habent inferiore maxillam. Verum enim verò quũ inter omnes musculos, si temporales potissimum laesi fuerint, convulsiones, febres, sopores, deliria, symptomataq; letalia inducant, vipote cerebro existentes proximi (neq; enim reperitur ipsis quicquam propinquius cerebro, sicut neq; vilis musculus, qui per plures neruos ipsi cerebro hæreat) merito natura eos propemodum totos, ne faciliẽ afficerentur ab iniuriis extrinsecis, in capinis osibus abdidit, ossa quidem ea quibus ipsi incubant, excusas admodũ, exculpẽsq; alia autẽ dura, ac præcipue quæ illas præposita, firmantur nominantur, rigida, & medullæ expertia, in orbẽ quasi septũ quoddam eis circumdicionis: ita vt exigua quædam eorum pars tantũ, ad finem frontis emineat. Vterque autẽ musculus temporalis in vnum tendentem defluens, curuo maxillæ inferioris acuminẽ insiguit: qui si tenus fuerit, sursum eam trahit: ac sic os animalis claudatur. Sunt tamẽ aliq; duo musculi

*Temporales maxillæ gratia inferioris maxillæ iuncti sunt.*

*Temporales maxillæ quibus. huius maxillæ.*

*Homini fortitudo non consistit in dextris, sed in ratione & manibus.*

*Homini debilitas & minimus ille musculus maxillæ inferioris inest. Iustitia diuina quid propriũ. Simia est homini maxillæ iuncta.*

*Collũ quæ pronare cibum habet.*

*Temporales maxillæ laesi. quæ symptomata inducant.*

*Temporales maxillæ ubi reperitur quædam et cetera.*

*Temporales maxillæ ubi reperitur quædam et cetera.*

*Septem.*

*Os quæ ratione claudatur.*

*Læu, medium efficitur conuexum & concavum.*

*Visum fieri per rectas lineas.*

*Visum fieri radiis assimilari. Videtur nihil scilicet, aut audiri.*

*Visu habet maxillam.*

*Pupilla alterius oculi compressa, apparet duplicia, quæ antea simplicia erant.*

*Optici nerui qui intra cranium iunguntur, postea autem diuicẽtur.*



Maxilla inf.  
notu muscoli.

Columnae  
processus.

Os quæ ratio-  
ne operatur.  
Maxillam infe-  
riorem circum-  
agere maxilla.

Masticatorum  
musculi.

Temporales mas-  
sili inferiores  
etiam masticato-  
res.

Linguae con-  
fusi plerumque  
ad osium mas-  
ticatorem.

Buccarum fi-  
ni inferiori.

Os maxilla-  
re musculorum  
genera definitio-  
is, operatio-  
nis, clauden-

sculi in inferiori maxilla, vtriusq; vnus, ambo ve-  
ro in per dictis oppositi. Qui quidem ex poste-  
rioribus oritur capitis partibus, quo loco sunt  
quos vocant columnares processus. Maxillæ au-  
tem inferiori infiguntur statim post flexionem,  
ad cum visq; pervenientes locum, qui est ad me-  
rum: vnus vtriusq; ex internis partibus adhaere-  
scens. Qui certe si tensi fuerint, os recidunt, quæ-  
dam modum temporales claudunt. Alij autem qui-  
dam duo muscoli, ad mandibulæ in masticatori-  
bus circumactione à natura fuerint comparati,  
qui carnosam quoq; genarū partem cōstituunt.  
Quorum vtriusq; nonnulli non simpliciter muscu-  
lum, sed tripliciter esse existimant, quod tres ipso-  
rum in maxillam sunt insertiones, instar princi-  
piorum quorundam. Vterq; enim triangularis  
existit, habens vnicuique iuxta vocatam malam,  
vbi nervosior est atq; ex lateribus ipsis, hoc qui-  
dem ad zygomatis extremitatem hinc exporre-  
ctū, illud autē versus inferiorem mandibulam: ter-  
tium namq; vel vtri basia quædam, prædicta late-  
ra partibus inferioris genæ coniungens, secun-  
dum longitudinem ipsius extenditur. Mouet  
autem ac circumagat maxillam, aliis aliis fibræ  
& insertionibus, vt moribus aliis aliis vicissim  
exipientibus, multiplices fiant actiones in ma-  
sticationibus. Opare laud incepte hi muscoli ma-  
sticatorum vocantur: tamen si ad musculos tempora-  
les hæc quoq; appellatio pertinet, quod dicitur  
inter se vehementer committant, vt si quid inter  
eos fuerit, cōminuatur. Ceterum cibū læuigari,  
atq; in partes minimas redigi à molaribus, qua-  
si à molis, masticatorum muscularum est actio;  
ad quam etiam lingua nō minimum confert, in  
ore cibos assidue voluens, & transferens, quod  
parte ipsorum omnis tandem conteratur. Maximo  
etiam ad eam rem ei sunt auxilio fines buccarum  
inferiores, qui coraceli sunt, spectantes ad labia,  
ad quos pervenisse tenues ac lati muscoli, vtriusq;  
parte vnus, toti collo circumiecti. Mouentur e-  
nim ab his buccæ, cum labiis, etiam si gena im-  
mobilis omnino fuerit. Temporales porro mus-  
culi, quibus eis infra oppositi sunt, os aperientes,  
omnibus aliis musculis hac ratione sunt dissimi-  
les, quod ex ipsis quidem temporalibus medijs,  
tendo ille nascatur, qui in coronem sublimē in-  
ferioris maxillæ inseritur: oppositorum autē il-  
li musculorum partes, carnosæ in principio ac  
sine existentes, nervosæ in medio cernitur: quod  
in nullis aliis reperis musculos. Etenim quā me-  
dium temporalium muscularum, coronæ quo mo-  
tu indigebat, esset directum, tendonem iam hinc  
emergere fuit necesse. At quod pertinet ad os  
aperientes musculos, quum ab eo loco product  
deberent, qui multis instrumentis referuntur, esset  
eorum vterque tendo exarum cōta non fillas est  
factus. Quandoquidem si crassiores essent, pe-  
netrare præ locorum angustia non possent. Vbi  
verò natura eos extra angustias deduxit, tunc  
iam paulatim ipsos carnes circumvehens, mus-  
culos rursus efficit. Tris itaq; hæc musculorum  
genera, natura ad os movendū adhibuit: quo-  
rum aliq; quidam aperit, aliq; claudunt, aliq; variè cir-  
cum agūt. Suntq; claudentes quidē, maximī om-  
niū: aperientes autē, minimi: magnitudine verò

medij, qui mediam etiam positionē sortiuntur.  
Alij musculi duo ex internis genæ inferioris parti-  
tibus, qui ipsa est maxime eandē, situm habentes,  
superius extensi versus os capitis, musculis tem-  
poralibus adiutores sunt dati, vt qui etiam genarū  
superius trahere queant. Ceterum in nervorum  
principiū omnibus faciei musculis, aliisq; propemodum  
omnibus ipsius partibus, tertia nervorum  
est coniunctio, qui à cerebro proficiscitur. Quo-  
rum sanè distributio tam recta, sicuti & aliorum  
omnium æquissima dispensatio, non fortuito  
aut casu, sed arti ac providenti debetur. Quod  
verò ad dentes pertinet, duos & triginta in vni-  
versum habemus, vno ordine, in vtriusq; maxillæ  
sexdecim collocatos: parte quidem anteriore,  
quos incisores appellat, acutos aciatos, qui mor-  
su possunt incidere. Proximos autem his caninos,  
inferiori quidem basi latos, parte autem su-  
perna acutos: ut si quid propter duriciem ab inci-  
soris minus scindi potuit, id possint ipsi conscin-  
gere. Hos maxillares sequuntur (quos etiam mo-  
lares appellant) asperi & lati, duri ac magni: vt  
incisa ab incisuris, ac fracta à caninis, læuigare  
planè ac terere queant. Ad hæc inter eos, parvū  
quidem vna, due autem tres maiores, quatuor  
verò maximis insunt radices. Quorum  
omnium si vnumquodvis mente immutaveris,  
utilitatem repente eorum cernes labefacturam.  
Præterea ipsorum molarium dentium, medijs  
quidem maximis sunt: qui autem vtriusque ipso-  
rum parte locantur, minores existunt: quod mi-  
nimè congruum videatur, angustis quidem oris  
partibus magnos, amplius verò dentes exiguos  
inferi. Quinctiam quum linguam ad radicem ef-  
ferre oportere amplius, magnos illic dentes mi-  
nimè locari præstitit. Habet autem vtriusq; ge-  
næ tenues quosdam processus, quorum singuli  
cautaribus suis, singulos dentes excipiūt, eosq;  
validis ligamentis adeo constringunt & con-  
nectunt, præcipue circa illorum radices, quibus etiā  
nervi inferuntur, vt non facile econtingant. Porro  
quod inferni quidam dentibus omnino æ-  
quabiles sint, quodq; dextra sinistris, accuratius  
quidē cautaribus, quodq; numerus vtriusq;  
sit idem dextris ac sinistris vtriusq; maxillæ par-  
tibus, nonnec id est etiam æquitas cuiusdam spe-  
cimen, artiusq; ponius quim fortuitæ opus? Ad  
hæc, quod fortibus animalibus acuti multi dentes,  
ac fortes sint comparati, quemadmodum etiam  
vngues: nihil aut in nimis sit huiusmodi, sed vt  
fragiles dētes, ita lati, molles atq; obusii vngues,  
hoc est magis adhuc admirandū. Verum quum  
leones, canes, & lupi, vtriusque multos habeant  
caninos dentes, homo certe vnicuique parte vtra-  
que caninum dentem produxit: cogitante nimirum  
natura, se animal civile atque mansuetum  
effingere, cui robur ac vires essent ex sapientia,  
nō ex corporis fortitudine. Quæ ita igitur ad fran-  
gendū quippiam duriorum videbantur necesse,  
id ipsum duo satis erant præstituri: proinde inci-  
sores plures numerum duplo efficit, quod ipsorum  
utilitas latius patebat: & his adhuc plures mola-  
res, q; ipsorum vnus patet latissimè. Horum tamē  
dentium numerus definitur non est sed qui lon-  
giore quidem habent genas, his quinq; insunt

os & circum-  
agant.

Facies muscu-  
li omnes reci-  
pere acies à  
tertia coniunctio-  
ne.

Dentes in vni-  
versum insunt  
trianguli inesse  
dant, q; vtriusq;  
maxillæ sexde-  
cim.  
Incisores dētes.  
Canini dētes.

Molares dētes.

Dentium ra-  
dices.

Molarium den-  
tium magnos  
dētes.

Quarum pro-  
cessus.

Dentes infri-  
ori superius,  
esse per omnia  
æquabiles.

Fortibus ani-  
malibus insunt  
dētes fortis ac  
molles, quoniam  
admodum etiam  
impugnanda  
sunt duricia.

Caninus dētes  
hominis vtri-  
que vniui an-  
est, in vtriusque  
maxilla.

Hominis ani-  
malis, manifeste  
videtur compa-  
rari ex sapientia.

Incisores dētes  
esse plures du-  
plo caninum.

Molarum den-  
tium numerus  
definitum non  
esse ut plan-  
ta in ambo ha-  
beret vtriusq.  
Lingua den-  
tis feritibus, car-  
nibus homini-  
bus.  
Lingua in an-  
nem parit mo-  
tus liberi: ef-  
fugit genas, et  
frustra reli-  
qua.  
Lingua arte-  
ria, vena, et ali-  
quid.

Musculi vni-  
versales trahunt  
partes versus  
proprium pars  
apertum.

Glandularum  
lingua et ducit  
tionem vsum.

Lingua vincu-  
li inferius vsum.

Naturam satis  
et etiam et vi-  
ta vsum, qui  
non procrea-  
rant.

Genitura prin-  
cipium vni-  
versis ab  
generis non  
temperantiam.

Generatorem  
primam neg-  
ligenter tractari  
ab universis  
hominibus.

vtriusque: qui verò minores, quatuor. Maxima ta-  
men ex parte, sunt vtriusque latere quinq., inferio-  
res superioribus semper magnitudine & nume-  
ro aequales. Porro lingua, quum animalibus non-  
nullis, vtriusque serpentinus, sit diuisa, in homine  
partes eius coheruit, quod tum ad sermone-  
tum ad comestione, id esset longè commodius,  
Mouetur autem in omnem partem, idque libere:  
quod requiritur ad percipiendum oris actiones li-  
beras. Quod si ipsa est gemina, quemadmodum  
& reliqua instrumenta sensuum, non alieni fuit  
vtriusque ipsius parte numero ac magnitudine mus-  
culus esse aequales. Pari modo enim & duas  
habuit in seipsum insertas arterias, vtriusque vide-  
licet vnamque duas inde venas, ac nervorum com-  
iugationes duas: vnam quidem mollem, alteram  
verò duram: atque illam sanè in extremam  
ipsius pelliculam distribuit, hanc autem disper-  
sam in musculos: quandoquidem illa coniuga-  
tione sapores discernere, hac motu voluntario  
moueri ipsam oportebat. Porro quod sedis ac  
firmitudinis gratia, magna ac fortis ad basim  
fuit: celerris verò motus causa, ad extensibilitatem  
tenuius: quod ab aliis quidè musculorū sursum,  
ab aliis deorsum, ab aliis denique trahatur ad late-  
ra, musculus vniuersis partes ipsas versus pro-  
priū principii trahentibus, nulli certè hæc quocum-  
que cuiuspiam esse providentia videntur. Sed ne ip-  
sa forte aliquando exsiccata, ad motus tardior  
efficeretur, quemadmodum ad laryngem, sic na-  
tura illi glandulas spongiosas similes, vnam vtrius-  
que apposuit. A quibus meatus ducti per obli-  
quas atque inferiores partes, in eam limorem pi-  
uitosum eruant, non ipsam modò, sed omnia  
etiā quæ infra illam, in eiusque lateribus sunt, hme-  
ctantes. Superiora siquidem à mentu descen-  
dente à cerebro perluuntur. Iam illius ligamenti  
quod partibus eius inferius inest, quod ipsam  
linguā, velut quoddam frenum, coercet & tempe-  
rat, ne aut nimis cōvellatur à musculo, aut plus  
quam par sit soluta divagetur, quis non admi-  
retur symmetriā, atque cōmoderationē? Ad eod enim  
mensurata est, & certa ipsius cōnexionis cōmo-  
deratio, ut si vel tantillū adieceris, aut ademeris,  
totius instrumenti actionem vitiaueris. Est verò  
& hoc summè in natura admirandū, quod pecca-  
ta & vicia eorū qui nos procreant, ipsa sua in-  
dustria refarcit. Ebrj siquidē cū ebris cōcunt:  
& qui præ crapula, vbi terrarum sunt, nesciunt,  
cum mulieribus ira affectus consuecunt. Quo  
fit ut genitura principium, itamque ac ratione vi-  
tiosum sit: postea verò ob omnimodam intem-  
perantiam illius quæ concepit mulieris, in vtero  
longè deterius reddatur. Atque aduersus  
tot errores natura obstitit, eosque plerumque corri-  
git, sic ut partus mentis compos & datur. Etenim  
quum vnuerſi agricolæ primum quidem, cu-  
iusmodi terræ sua committant femina, diu mul-  
tissimeque provideant: postea autem admodum et-  
iam caueant, ne multo humore demersa putre-  
ſcant, aut extrahant frigore, nullus sanè ex ho-  
minibus eam in serendo diligentiam adhibuit,  
neq. in eo quod conceptū iam est, educando, sed  
quemadmodum in omni vita aliis rebus omni-  
bus seipſos ducit posteriores, alij quidē insana-

bilibus voluptatibus, ab dominiq. inferentibus:  
alij diuitiis, aut magistratus, aut denique poten-  
tiam ambientes: ad eundem modum & ipsam  
posthabuerunt primam generationem. Tuni-  
cam quæ omnis oris partes subiungit, et cerebro  
etiā recipere nervorum mollis momentaneā  
portionē, ut quo modo lingua ipsa sit etiā diu-  
dicatrix saporū, iam diximus. At verò vna, quæ  
gurgulione & columellam vocant, ad magnitu-  
dinem atque elegantiā voci auxiliatur. A qua  
quidē acringrediens, inciditur prius, impetibus  
ipsius violentia, & frigiditas frangitur. Vnde  
nonnulli quibus ad basim vtriusque illa fuit ampu-  
tata, non modò deterius loquuntur, verum etiā  
frigidiorē senserunt respiratiōē. Pleriq. eius-  
modi, pulmone & thorace nimis refrigerant, pe-  
nitiur. Ac proinde nunquā ita temerè abscinden-  
da est, ut pars quæ dā basim nō relinquatur. Scri-  
psimus autem prius & de foraminibus narium,  
quo pacto misceat ea os quoddam excipit, vtri-  
culus cerebri prælocarum: tum & de ipsorū in  
os perforatione, quæ est in palato. Quæ quidem  
extant, ne inspirationis initium sit secundum re-  
ſtrictum tracheæ arteriæ, sed quæ dā deflexio  
habeatur, ac veluti ambages, præuicquim spiritus  
ad arteriā perveniat. Proinde fit, ut spiritus qui-  
dem obiter per hunc flexum contemparatus, vi-  
terius tandem feratur: hæreat autem corpulca  
la exigua, aut si quid forte ad os vtriusque perme-  
arit, sistatur etiam circa palati columnam: sic nanque  
vnam ipsam appellant. Hinc fit, ut qui in multo  
pulvere colluctati fuerint, hi paulo post emun-  
gant puluerem, expunxiōē. At nisi prius quidem  
nāsi por rectā ad caput sursum ferrentur, postea  
autem obliqui ad palatū reverterentur, vtriusque  
ibi sese excipientē haberent, quid obstitaret quo-  
minus in arteriā hæc omnia delaberentur? Nam  
id etiam accidit, si quis per os inspirant, magna  
indigens inspiratione. Ceterum vbi sani homi-  
nes sunt, ore ad respirandum nullus est opus, ni-  
si qui assidue multo ac vehemēti vigeatur.  
Quare nāsus, primum ordine respirandi instru-  
mentum est: os verò, si nullus affectus infestet  
animal, nullo pacto respirandi instrumentum  
exiit. Quum autem nudæ ac eminentes parti-  
culæ, quæ externis iniuriis expositæ sunt, ex  
ea oporteret esse substantia conditas, quæ nec  
contundi, nec frangi faciliè posset, mento qui-  
dem aures ipsas natura cartilaginosis effecit.  
Nam si duræ penitus ut ossa existissent, faciliè  
frangerentur: si molles ut carnes, contunderen-  
tur paruo negotio. Nunc verò mediocriter mol-  
les quum sint, eorū faciliè incidentibus cedant,  
vim illorum exoluant. Ceterum prominent aures,  
ut meatu auditorio operimentum ac murus  
existant, similique & ipse aliquem sonum resun-  
dant. Quippe Hadrianus Romanus consul,  
quum haberet lætum auditum, manus, causas,  
quæ audiret facilius, à posterioribus ad ante-  
riora spectantes, auribus obtendebat. Aristote-  
les etiā dicebat, animalia grandes aures habentia,  
semper eas agitare, ac circumvertere ad sonos  
& voces, vsum partū à natura edocta. At in  
hominibus, quū parvas eas esse oporteret, nihil  
aut certè parū iuvare poterant si mobiles ac ver-  
santes

Oris vniuersi  
duodecim fere  
vires, quæ aliam  
dent lingua de-  
ducunt.

Vnam confere  
ad vocis emissi-  
onem.

Gurgulione si-  
ne columella  
vsum.

Gurgulione non  
esse aliam  
dracmam radi-  
catis.

Narium fore-  
mina, per quæ  
quæ in os ducit  
quædam.

Sensu ad respi-  
randum non  
esse opus.

Aures aut sunt  
cartilaginæ.

Aures aut pro-  
mouentur.

Hadrianum Ro-  
manum consul,  
quæ audiret fa-  
cilius manus  
causas à poste-  
rioribus ad ante-  
riora spectantes  
obtendebat au-  
ribus.

Aures homini-  
bus aut sunt  
mobiles.

*Aurum aut in-  
artificum quod-  
dam, autem con-  
vexa.*

*Artificum huius  
modi.*

*Natura carnis.*

*Particularum  
ornamentum ob-  
servari a splen-  
dore ipsius res-  
ultare.*

*Pulchritudo ve-  
ra ad quid re-  
feratur.  
Scopus primus  
construendi  
particulari, est  
utilitas.*

*Utilitatem menti  
ipsius  
Natura glori-  
bre.*

*Utilitas ad finem  
per opus venera-  
da finis, quan-  
do quidem nec  
utilitas reman-  
et postea.*

*Utilitas dari  
improvisi semel  
in genere.  
Capitulum ge-  
nerale.*

*Vere adesse o-  
mnemque de  
placem fulgore  
fieri excremen-  
tum.  
Primo pilis in-  
dica.*

*Pilis palpebra-  
rum aig. super-  
nari cur eam  
de majore  
dum semper de  
min.*

lites fuissent: ac proinde immobiles sunt, aut ob-  
scuro motu moventur. Porro quod extrin-  
secus quidem convexa, intrinsecus autem caute  
existerit, factum id propter est, ne quid me-  
ritu incidere, neve ipse facile afficeretur. Vtraque  
autem est flexuosa, vt complicata, ac in seipsas re-  
plicata facilius possint. Iam vero quemadmodum  
boni artifices, prater opus institutum, artem  
suam odierant, sic natura ex abundanti tum au-  
re ipsas, tum omnia humana membra exorna-  
uit, ita vt primo quidem actionibus, vilitati-  
busque partium incumbere: postea vero cohone-  
staret illas, in eisque veluti operis additamenta,  
ac ludica quaedam faceret, vt in ipsis natum car-  
nibus consistat. Evidenter quippe partes ipsius  
turpitudinem, si uida carnis fuisset, finiam  
conspicuas agnosceret. Obscurantur tamen orna-  
menta particularum, a splendore ipsius vilita-  
tis. Pro nihilo siquidem ducitur oculi pulchritudo,  
sicut & nasi, & labiorum ornatu, quod ipso-  
rum vilitas valde sit admiranda. Ceterum partes  
aetio, vt constructione ac generatione prior  
est, sic dignitate quam ipsa vilitas est posterior.  
At vera pulchritudo, ad vilitatem successum, &  
bonitatem refertur: primisque partium omnium  
constructionis scopus, vilitas est. At pili qui in  
mento oriuntur, non modò genas operiunt, verum  
etiam decus menti, ornamentum, & severi-  
tatem cõciliant. Male autem & natus deserviunt  
pilis, pulchritudinis gratia. Etenim mulierum  
torum corpus molle atque depile, puerorum in-  
star habent, ipsius faciei glabriorum plurimum ad  
pulchritudinem addit. Nam quum mores non  
habeat atque venerandos vt masculus, nec forma  
quidē ei veneranda opus erat. Semper quippe  
natura, moribus animae, formam corporis ap-  
tiam & congruentem effingit. Praterea quum  
ex humoribus ipsa salubritas semper quidam sar-  
sum ad caput feratur, crassioribus excrementis  
illius, ad pilorum alimentum præcipue natura ab-  
vinitur, pilorum inquam, ornatum & tegumen-  
tum capiti conciliantium. In viris autem, quòd  
hi mulieribus sunt calidiores, tantò hæc quoque  
excrementa sunt plura: proinde duplicem his na-  
tura invenit evacuationem, alteram ex capitis,  
alteram ex genarum pilis. Pilos nō habet frons,  
quòd tegi possit a pilis capitis, quantum volu-  
mus: quòd si eos produxisset, tondere ipsam  
nobis assidue fuisset necesse, quia oculis nimirum  
incumbat, propter quos etiam motu voluntario  
mouetur. Motus siquidē cutis vndique oculis cir-  
cumsus, ad oculos exacte aperiendos & conclu-  
dendos, maxime opitulatur. Porro quum pili ca-  
pitis & maxillarum augeri ac minui plurimum  
possint, secundum sexus, ætatis, temporum,  
& locorum naturam: qui supercilii & palpe-  
brarum insunt, eandem semper magnitudinem ser-  
vant: vapore quorum hi quidem, ne quod cor-  
porum exiguum oculis patefactus incidat, veluti  
vallum quoddam, ipsi appositi sunt: hos au-  
tem instar muri cuiusdam, propulsare oporteat,  
ac primos omnia que a capite desiliunt, excipe-  
re. Si igitur eos aut minores, aut rariiores, aut lō-  
giores, aut densiores efficeris, tantumdem eorū  
vilitatē vitaturus. Postea vero quum cuiusmodi

facere pilos constituit Deus, his quidem durum  
corpus subiecit, illis autem cutem duram, carti-  
lagini per superiora connexam. Non enim sat e-  
rat, eos duntaxat velle tales esse. Neque enim si la-  
pidem repente vellet facere hominem, efficiere id  
poterat. Atque in hoc opinio nostra & Platonis a  
Mose dissidet. Omnia enim ipse Deus facere  
posse arbitrar, etiam si ex cineribus equum aut  
bouem facere velit. Nos autem non ita senti-  
mus, sed confirmamus quædam naturam neutri-  
quē facere posse, eaq̃ Deum ne aggredi quidem  
omnino: sed ex his quæ facere potest, quod me-  
lus est eligere. Etenim quum pilos in palpebris  
sanus esset æquales semper esse magnitudine ac  
numero, non ipsum id quidem voluisse affirmamus:  
illos autem mox factos fuisse (neque enim  
id facere potuisset) sed contentum esse ponere eos,  
etiam si milies voluisset, nunquam tamen tales  
futuros, si ex cute molli producti fuissent: quum  
nec recti quidem stare possent, nisi in duro fini-  
essent. Vtraque itaque attribuiamus Deo: tum eius  
quod est melius, in ipsis opticiis electionem,  
tum etiam materiam delectum. Quod si substitui-  
turi cupiam molli & carnosæ pilos eos infixis-  
set, non Mose modo, verum etiam aliquo malo  
duce videretur interior, qui murum in palade,  
aut vallum iaceret. Nam quemadmodum herbe  
ac plantæ, quæ ex terra humida & pingui proveni-  
unt, altissime crescant: quæ verò ex petrosa,  
squalentē, parua ac dura, nullius incrementi  
permanant, quæ autem, opinor, modum & pili,  
qui ex humidis ac mollibus emergunt partibus,  
plurimi sunt incrementi, cuiusmodi appa-  
rent in capite, axillis, pudendisque: qui verò ex du-  
ris & aridis, exiles atque incrementi nullius. Quo-  
circa duplex ipsis origo existit, quemadmodum  
herbis ac plantis: alia quidem a conditoris pro-  
videntia, alia verò a loci natura. Ordo autem  
æqualitatis ortus ipsorum, discernim facit. Atque  
a loci quidem natura oriuntur pili tum axilla-  
rum, tum aliorum membrorum, nullis certis li-  
neis descripti (quemadmodum sunt hi, qui in pal-  
pebris sunt, supercilii, & capite) sed inæquales  
habere terminos, nullisq̃ prædicti ordinis: quan-  
do quidem a loci humore proveniunt, ut qui sunt  
ipsis opticiis opera. Quo fit vt calidus quidem  
natura sint plurimi, frigidis autem nulli om-  
nino, aut pauci gignantur. Quorum autem  
opifex curā habet, in omnibus naturis insunt,  
calidis, frigidis, humidis, siccis, nisi quòd pro-  
fus fuerint interperat, cuiusmodi est petrosa  
atque arenosa terra. Nō desiliunt aut palpebrarū,  
aut superciliorum pili, nisi in magis partū asse-  
ctibus. Sed neq̃ a capite desiliunt, nisi etiam in eius  
affectibus quidē, verum quum prædictorū, mi-  
noribus. Nam plantæ quæ in terra dura aridique  
proveniunt, vt generationem habent difficilem,  
multarūq̃ providentiam requirunt, ita non fa-  
cile intereunt. Ad eundem vñq̃ modum & Ac-  
thiopum capita, paruos quidem, nulliusq̃ incre-  
menti habent capillos, prae siccitate caris: verum  
saluascunt ægrè. Quæ omnia quum opifex pro-  
videret, in palpebris quidem & supercilii sanus  
esset ratas exiguos quidem & nullius incrementi  
pilos, verum stabiles, gignere, in cute dura &

*Mosaica a sym-  
one reuelatur  
Galeno.*

*Natura non ef-  
fi potest huius  
modi.*

*De qua attri-  
buit Galenus.*

*Pilorum origo  
duplex, qui ad-  
modum humida et  
plantæ.  
Pili etiam a loci  
natura.*

*Pili naturæ ca-  
lida plerumque  
fieri nulli,  
aut pauci gignuntur.*

*Pili a conditi-  
oris, pro viderentur  
enim, singula  
naturæ siccis.  
Alpicis quas  
de accidet.*

*Anthropi ad  
facilem cutem  
habent pili par-  
uos, & incrementi  
nullius, colore  
sunt tamen æ-  
gri.  
Palpebrarū cu-  
tis cur dura car-  
nosa.*

*Pudendum  
pili cuius gra-  
tia oris.*

*Frontis cutis.*

*Cutis totius a-  
nimalis.*

*Laboris cutis.*

*Periclitum est  
membrana cra-  
ssius adhaesit.*

*Labiorum sub-  
stantia.*

*Labii infimo-  
rum musculorum  
principia qua-  
tuor.*

*Labiorum mo-  
tus rectus fieri  
a duobus obli-  
quis.*

*Labiorum mo-  
tus in vniuer-  
sum sicut oculo.  
Lati musculi  
origo.*

*Nasi alarum  
medulla.*

*Nasi alarum  
musculi.*

cartilaginosa radices eorum, quasi in lapidosa quadam atque argillacea terra, desunt. Iam vero & circum pudenda pili quoque necessarii proveniunt, (calida enim & humida sunt haec loca) operimentumque ac ornamentum eius loci partibus praebent, ut nates ano, atque praepuniu pudendo. Frontis cutis cum muscularia quadam & tenui substantia, quae illi subdata est, unitur: ut partes manuum internae, & plantae pedum, cum tendone coalescunt. Tertia vero praeter has differentia cutis est, quae in toto animali videtur, substantiae quidem subiectae haeccene, non autem coalescens cum illa. Quarta deinde est laboris, cui musculi per totum miscentur. Quod autem frons a subiectis quidem ossibus per membranam periosam distincta sit, solusque duabus curvis mobilibus constans, ac breviter totam se laxa, ob id certe motu voluntario mouetur. Ceterum laboris substantia, quam moueri etiam motu voluntario oportebat, eiusmodi existit, ut eam, aut musculi pro cute, aut cutis musculam merito vocet. Quatuor autem sunt musculorum ad labia perveniendum principia: perspicua quidem antequam miscantur: obscura vero, & quae substantia illius separari non possunt, ubi semel in unum conuerunt. Quare totidem etiam erunt musculi, utriusque solcentur: unus quidem, qui ad laeuam; alter autem, qui ad dextram, ipsa circumagat. Capita autem sunt appensa, alius quidem superius, versus alas, ut qui motus obliquos utriusque labii parti essent praebitur. Inferiorum rursus obliqua quoque posita est, quoniam & obliqui sunt motus. Ac per hos quidem quatuor musculi opes octo motus insinuat: quatuor sane obliquos, in utroque labio duos: ac totidem etiam rectos: duos quidem omnino rectos, quibus labia plurimum a se tunc distant, tum etiam in se conuertuntur. Nam quemadmodum in carpo & brachio ostendimus, ex obliquis motibus rectos fieri, sic & in labiis accidit. Quare si musculi solum utriusque labii agat, motus sit ad obliquum. Sin vero tensi utriusque fuerint, eo modo iam totum simul labrum sursum quidem a muscularibus superioribus trahitur: deorsum autem ab inferioribus. Atque etiam tensi fibris externis, labia foras deflectere: intro autem cedere & complicari, ab infernis accidit: ut si duos hos motus, ut qui plani sunt recti, adnumeret, octo omnino laboris motus reperiat. Ut autem maximi non solum hi, sed cum eis etiam illi qui in genere sunt, motus efficerentur, musculum latum ac tenuem naturae extrinsecus subdidit, unum in parte utraque usque ad colli spinam pertinentem, ex omnibusque teretibus collis paribus nervorum maximam vim recipientem. Qui musculi ad sermone & masticationem valde confert. At vero quum ad inspirationes paulo maiores & subitas, item ad expirationes, nasi alae non parum conducant, oportuit certe eas mobiles esse, idque pro voluntario imperio. Cartilaginosa autem fuerunt, quod ea substantia non facile contrahi nec rumpi possit. Verum musculi in illas inserti, subitus alas oritur exigui, iuxta principia muscularum qui ad labia descendunt. Cum quibus quadamtenus coniuncti musculi, semper magis magisque obliqui digrediuntur ad nasum, recipiuntque a nervis qui per maxil-

lam superiorem feruntur, exiguas quasdam propagines. Interna autem ipsius nasi tunica fuit constructa, tum ut illum intus succingeret, tum ut illi sensum tribueret: quandoquidem necque os eius, nec cartilago, sensum habere poterat. Porro constructio ossium, aut motus gratia, aut perspiratus, aut transitis cuiusdam, aut partium distinctis, aut securitatis, & patendi difficultatis, existit, ut liquet in ipsarum particularum propositionibus nobis exemplis. Vbi os medullam habet in se, eius finibus utrinque caput insitit operculi cuiusdam, ut plurimum videmus adnasci. Nullum tamen paruum os habet medullam, quod finem nullum habet commemorabilem, sed caeteras nulas angustas & exiles. Nam si exiguum & canuum fuisset, caretet robore: quemadmodum si quodvis magnorum densum fuisset ac sine finem, grauissimum foret, ac gestu difficile. Omnibus autem imbecillioribus animalibus ossa sunt laxiora & concava magis: fortioribus vero densiora, magisque compacta. Quin & leo, qui omnium est ferocissimus, ac formosissimus, ossa omnia medullae expertia habere creditur. Natura quippe, muscularum imbecillitatem atque robur insinuat, ad ipsorum portionem, ossium pondera efficit. Quis igitur ad propriam securitatem, duritiam: ad animalis vero motum leuitas ossium requireretur, (nec adesse simul duo haec esset facile) id oportebat eligere, quod erat commodius. Commodior porro animalibus motus est, ut qui fit ex ipsorum substantia. Non enim quatenus est animal, omnino ab iniuriis est tutum: at ex seipso mouetur. In quibus tamen propter musculorum robur, ac tonus corporis fortitudinem, utrumque comparare erat licitum, his omnibus densa ac dura, insitit lapidum quorundam, ossa compingit, ut in leone. Quia vero homo non est aequale factus, iure optimo, quae ossa in eo sunt maxime, ea non tunc modo, verumetiam laxa exterrunt, plena tamen medulla, quae proprium alimentum est ossibus. Nam quibus caritas nulla inest, ut ossibus tale quid in eorum cauernulis continetur. At caput pro processu quos Graeci vocant *zempromi* non protinus omnia quae medullam habent foriuntur. Quandoquidem maxilla inferior medullae quippiam in seipsis continet, ac processum nullum foritur, quem fit densior, quam ut processum in digerat, atque ita facile possit medullam sibi sine ulla externa epiphyssi claudere. Causa autem cur si rhinoceros brachio & humore densius, est nuditas. Vbi vero laxitas simul & cauitas adiungit ossibus, eorum capibus ossa densa ac dura, cartilaginosis glunosisque interuent, adeo fuerunt accurate apposita, ut commissio eorum non facile erui queat, nisi ossa ipsa coniecta, aut excicata fuerint. At superior maxilla omnino medullae fuit experta, quod prorsus non moueretur, ob idque illi necessaria non esset leuitas, quemadmodum inferiori. Quare ad solam patendi difficultatem, ex ossium multitudine fuit copacta. Nam quae villaribus habet et diuersas, ex diuersis quoque substantia ossibus manifeste constructa. Maxilla siquidem ossa, crassissima sunt: nasi tenuissima: reliqua vero durissima. Quum enim ossa nasi, si laxa fuerint, minimam animalem adferat

*Nasi tunica interna, in qua ossium facta.*

*Ossium structura, cuius gratia.*

*Ossibus medullae infusae utrinque caputa. Cuius parua cauitas medulla.*

*Leoni ossa omnia medullae expertia. Cuius sunt de quodammodo tenuitatem imbecillitatem corporis.*

*Motus est ex substantia animalis.*

*Ossa humana qualia.*

*Ossium intermedium, medulla.*

*Inspiratione.*

*Maxilla inferior nulla processum foritur, etiam si medulla in seipsis continetur.*

*Maxilla superior cui fit delata medulla.*

*Maxillae ossa crassissima. Nasi ossa tenuissima.*

adferant noxiā, multum ab aliis principalioribus duntē & crafine vincuntur. Repentur autem futura vna secundum longitudinem in vtraque maxilla, quod nimis vtrique corpus sit geminū. Obscura tamē ea in densissimis ossibus est: cuiusmodi est occipitis, frontis, palati, & summæ maxillæ. Quum igitur ossa que ad verticem capitis pertinent, nec plagis similiter essent obnoxia, vt ossa frontis & occipiti, nec non quæ in lateribus sunt, evacuatione eę indigerent copiosa: hæc autem vulnera sæpenumero exceptura essent, vacuationemq; non postulerent: natura rectē illa quidem rara simul & cauerosa, licet verò dura & densa cōstruxit. Palati autem os durum etiam ac densum extitit, q; ad basim capitis sit: quodq; ab extremis quæ per ipsum transiunt, breui extrahisset, si fuisset laxum. Ossium porro alius similitum productū, ex ipso facta est, sedem simul atq; operimentū musculis oris & lateribus exhibitura. At ossa bregmatica (quæ duo laxa sunt in capiti desuper incumbētia, ac vndiq; a duris ac densis ossibus circumdata) partē quidem posteriore ab osse occipiti, anteriore vtrōq; frontis, vtriusq; verò ab ossibus temporū, mentū lineis fuerunt distincta. Septimum est os palati, quod nonnulli superiori maxillæ, nonnulli capiti attribuant. Reliqua omnia maxillæ superioris nō sūt sunt numero: duo nati: tertium, cui hærent incisores dentes: vtriusque autem duo, quæ molares ac reliquos dentes excipiunt: supra quæ alia duo sunt, quæ ad anteriorem zygomatis productionem, atq; internā oculōrum cavitatem spectant. Reliqua duo sunt iuxta nasi in os meatus. Porro articulum inferioris maxillæ, alteri quidem, qui apertē dicitur, zygomata circumposuit basura, maximūq; musculi temporalis tendonem, à quo nimirum os clauditur: alteri verò mamillares capitis productiones apposuit, ne quando in violentis motibus, à subiecta cavitare elaboraret. Apertum autem os ipsum tum posterior articulus, qui est ad mamillares eas productiones: tum musculi articulum mouentes, oppositi temporali bus musculis.

## GALENI PERGAMENI de vsu partium, lib. XII.

**S**unt autem partes collo & capiti cōmunes: per quas caput in omnē partem mouemur: id quod sine articulis, ligamentis, ac musculis agere nobis non licet. Porro articulo, ossium est composio, propter motū voluntarium comparata. Cæterum quæ componuntur, pauciora duobus esse non possunt: oportetq; vt musculi ab vno esse producti, inferantur in alterū. Motus autem fieri non potest, nisi ossa articulum simul, ac per musculos cōnectantur. At ligamenta, quæ ossa in suis articulationibus exactē contineant ne excidant, ad rectē etiam momentum conferunt: adeo quidem dura existētia, vt in motibus vehemētioribus minime disrumpantur: in tantū autem mollia, ratione curusdam humiditatis viscida, quæ articulis innutritur, vt tractis ossibus faciliē & obsecundēt, & cedant. Quæ igitur cartilagine, ligamento, & nervo, corpo-

ris machina indigeat: ac cartilago quidem sit durior, nervus autem mollior: medium verò sit ligamentum: mirabiliter sanē natura singulis vitatur in omnibus animalis partibus: nunquam loco vnius constituit alterum. At verò cartilago subiungit quodammodo articulos: nervus, quantum habet mollitiē, tantumē & sensus habet. Verū imbecillior est, quā vt totos artus mouere & transferre queat. Ligamentū autem valde colligare potest, nec impedit quo minus membra moueantur: motorium tamen instrumentum esse non potuit, quum nec sensum nec motū habent, nec ex principio animal mouente, sed ex offe exoritur. Convenienter igitur, vbi membrum solo vinculo indiget, ibi solum est ligamentū: vbi verò sensu solo, nervus: vbi motū voluntariū est opus, vtriusq; ibi reperias: nervū quidem, qui missum à ratione imperium perferat, motūq; principium præbeat: ligamentum verò, quod robur ad ea quæ à nervis mouentur gestanda suppeditat. Proinde missum quoddam instrumentum motus ex ambobus, primum quidem in tenues fibras solatis, postea verò coalescentibus, intercapedinesq; medias molli carne repletas habentibus, efficere oportuit, quod omnino nervo quidem durius, ligamento autem mollius existēte, reliquarū etiam contrariarum affectionum quæ illis insunt, medium locum teneret. Atq; hoc quidem instrumentum est tendo, qui ex iisdem illis fibris inter se committis consistat. Tendo igitur primum instrumentum est motus. Musculus autem, ad constituendum ipsum fuit comparatus, carnisq; coagmentare & composere animalis contra iniurias extrinsecas præberē vilitatem. Porro articulus capitis adeo magni est momenti animalibus, vt omnium solus, non dico laxationē magnā, sed ne deflexionē quidem, vel temporis momento ferre queat. Repentē liquidē respiratione ac vocē, morāque simul & sensu, totum priuatur animal, ipse nimirum nervorum radice affecta. Est enim principium omnium nervorum cerebrum, in ipsūq; veluti in arū quoddam anima raciocinatrix semen mittit: germen verò inde, veluti truncus quidam in arbore exurgens, medulla spinalis existit: à quo truncus per totam spinam extēso, deducti nervi quamplurimi, inilar ramorum quorundā, in sexcentas propagines distribuuntur. Corpus autē vniuersum, per eos sumit primum quidem & maximē motum: dein verò, sensum. Cæterum articulus capitis rursissimū omnium constructionem sortitur, quod in scipso radicē nervorum omnium, partes inferiores mouentium, continet. Accedit ei hæc securitas à ligamentorum crafinitie, musculorum multitudine, & ossium exacta compositione. Fortissima enim ligamenta ossa ipsa cōnectunt: quorum vnum maximum ac latum, in orbem totam articulationem complectitur. Alia autem sunt duo medio erit, inilar nervorū, forunda: quorum alterum quidem, sinem productionis prælongæ, verberis secundæ, cum capitis osse cōnectit: alterū verò transversum, veluti angulum rectum efficiens: à partibus primi spondyli delatris, ad leuam pertingit. Octo autem musculi

Corporis machina que destituta.

Cartilaginei vsus. Nervus quantum mouet: & tantum sensus sortitur.

Ligamentū aut sensum, nec motum præstat: nec rursum autem ab offe.

Tendens generatus, ex ligamento & actus. Tendo primum est instrumentum motus. Musculi vsus. Articuli capitis laxatio, qua inferat malis.

Cerebrum esse omnium nervorum principium. Spinalis medulla veluti truncus arboris.

Nervi longi corpori motum & sensum. Articuli capitis constructionis & securitas.

Capitū articulus octo spondyli delatris in leuam pertingit.

Maxillæ superioris.

Verticis ossa: occipiti, frontis, palati, & summæ maxillæ.

Palati os durum & densum.

Ossium alius similitum vsus.

Bregmatica ossa.

Maxillæ superioris ossa nonnulla.

Epiphyse. Zygomata. Mamillares productiones.

Os à quibus dicitur priuatur organo.

Articulus qui est compositus: quibus quæ componuntur. Motus qui per articulum fit & cōnectitur.

ex ipsis duntaxat partibus posterioribus, articulationi incumbit, ipsam regentes simul atq; moventes. Quum igitur capitis totius motus duos genere esse deberet: vñ quidē, dum deorsum inclinamus, ac sursum attollimus ipsum: alterū verò, dum ad latera circumagimus: nec ex duobus simplicibus monibus rectus vnus illic effici posset, vniūque priuam præstitit musculos atq; articulationes efficere. Quocirca de articulationibus ipsis, duplices, musculorum autem moventium ipsas, genera duplicia extiterunt, quatuor differentiis comprehensa. Alij enim caput attollunt, aliq; deprimunt: aliq; ad dextrā, aliq; ad lae uam circumagunt. Igitur motuū in vtrāq; partem grana, primo spondylo natura duas cauitates indidit, alteram in sinistrā, alterā in dextrā, capitis cōuectantibus, quæ ibidem sunt, proorsus æquales. Nam tamen potuisset natura vnum maximum processum, atq; rotandum vndique, in primi spondyli maximam cauitatem inferens (quemadmodum in humeri articulo fecit) capiti omnes motuū differentiās præstare, quia tamen sine laxa articulatione & fallaci fieri id non poterat (ob quam nimirum omnium maximē articulorum, luxationi humerus est obnoxius) maluit paucissimos capiti motus, eosq; turō tribuere, quā vltimos simul, atq; periculosos. At verò secundo spondylo vtriusque vnus dentiformis processus inest, acclius atq; prælongus, qui robustissimo ligamento capiti connexus est. Atq; cius quidem beneficio caput attollitur, deprimiturq; quemadmodum per articulos cum primo spondylo ad obliqua mouetur. Quū autē ex partibus anterioribus secundæ vertebræ, ille dentiformis processus exortus, inuēi deberet secundum supremam sui oram partem primæ vertebræ anterioribus atque internis, merito natura, vertebræ partem eam excavauit, dentēque ipsum ibi indidit, validum ligamentum atq; transversum extrinsecus ei circumdans, quod simul ipsum à spinali medulla abducat (ne videlicet illam collideret) simul autem ad primæ vertebræ cauitatem alligaret. Quinetiam supernis primæ vertebræ cauitatibus, quæ capitis eminentias excipiunt, aliæ quædam cauitates parte inferna cōsimiles subiacent, quæ eisdem primæ vertebræ complectantur convexitates. Quarum beneficio neq; vertebræ secundæ cum capite connexio (cuius actio erat caput sursum attollere, deprimereq;) à prima quicquam habet negotij: neq; reliquus motus ad latera, propter articulationē cum prima, impeditur quicquā à secunda. Verum qui quatuor & viginī totius spinæ sint vertebræ, quod in nulla quidē alia eiusmodi ligamenta, qualia in prima, cernantur, neq; in hac etiam secundum aliam partē, quā sit expediens, sint facta, nemo opinor audebit decere id accidisse fortiter. Musculi qui caput movent sunt octo & viginī, aut plures, ipsum in orbē circumuehientes: quorum alius aliam habet actionem. Sunt autem ipsorum, octo quidem partibus anterioribus, quatuordecim autem posterioribus, ex diametro bisulcis oppositi. Alij verò, vtrāq; parte duo, quorum hi quidem ex dextris, illi autem ex sinistris, oppositi & ipsi inter se, primum

quidem & maximē collum ad seipsos trahunt, cum illo autem & totum caput: natura semper singulis motu prædictis musculus opponente alios contrarij motus autores. Musculorū caput attollentium & inclinantium, octo quidem, idēq; parui, retrō, circum articulum ipsum sunt siti: quibus maiores alij in toto collo extensi, per primas quidē fibras, solius capitis motibus inferuientes, eos obeunt, qui ad primam sunt atq; secundam vertebram: per proximas verò, movent quinq; reliquas colli vertebra. Cæterū ex octo musculis, quos paruos esse diximus, quatuor sunt recti motus autores, qui ex offe occipitis exoriantur, paulō supra articulationem: inferuntur autem in secundo spondyli posteriorem processum, atq; in partem primi proximā. Reliquorum verò quatuor, duo quidem, quo modo prædicti, ab offe occipitis nati, foras tamen obliqui digredientes, obliqui primi spondyli processibus inferuntur, motū totius capitis obliquum præstantes. Reliqui autem duo, primum spondylum secundum coniungentes, obliqui, positionem habent duobus prædictis contrariam, ac motum oppositū. Illi enim caput habentes obliquum, vñ cum eo secundam vertebram ad primam adducunt: hi autem in rectum & naturalem statum, inclināti caput reducunt. At tres musculorum magnorum cōiugationes, eundem cum dorsalibus musculus habent motum, quem paulō post explicabo. Movent autem per primas quidem fibras (quæ in primū & secundum spondylum inferuntur) solum caput per reliquas verò, primum quidem reliquos colli spondylos: simul autem cum eis, caput retrorsum agunt. Obliqui tamen, sensim motus obliquos efficiunt. Anteriorum verò, qui stomacho quidem subiacent, per primas fibras (quæ in primū ac secundum spondylum defixæ sunt) caput duntaxat secantur, ac simul obliquis fibris, ad obliqua deducunt: per quas musculorum etiam paruorum propriam habent circumscriptionē: per reliquas verò collum secantes, simul cum eo caput cogunt nutare. At reliqui sex, non rectum, vt hi, capitis nutum, sed sensim obliquū efficiunt: cum quo etiam caput in anteriora convertunt. Quatuor autem alij musculi robusti & magni, vtrāq; parte duo, dextra & sinistra, locant, collum ad latera cum parua declinatione movent: atq; antrotrium, anterior ipsorum coniugatio paululum inclinans, reliqua autem retrorium: illa sanē ex perforata secundæ vertebræ apophysi productionem habet, hæc autem ex primæ obliqua eminentia nascitur. Fit autem omnium musculorum actio pro fibrarū positionis modo, quæ vt plurimum habent secundum sui longitudinem expositas: raro autem obliquas, vt spinales musculi, qui quidem recti secundum spinā extensi, fibras in obliquū producant. Securitas itaque articulis capitis, ex iis quæ diximus, accessit: motuum autem detrimentum, quod tam sequebatur, musculorū multitudine, magnitudine ac sita vtriusque natura ita pensant, vt nullus capiti desit motus. Cæterum omnium musculorum sunt minimi, posteriores, vt qui ipsi exactē articulationē comprehendunt.

Acque

Capitis totius  
duos motuum  
genera.

Spondyle pri  
mo duas cauita  
tates infuse.

Humeri o  
mnium maxi  
mi articulo  
rum laxatio  
es est obnoxia.

Capitis motus  
fortis de  
vixit, et in ob  
liquum, vnde  
proficiantur.  
Dentiformis  
processus.

Vertebrae spi  
nae totius esse  
vixit, quatuor  
et.

Musculi capitis  
ambitus esse o  
cto & viginī.

Musculorū mo  
uentium singu  
la natura oppo  
siti esse alios  
contrarij mo  
tus autores.

Capitis muscu  
lorum actio  
vna.

Musculorum ac  
tio pro fibrarū  
positionis modo.  
Musculi man  
ri ex parte mus  
si fibrarū secun  
da longitudi  
ne non expositi  
sunt.



Aequè autem opportunam cum his positionem  
 habet prima portio musculorum stomacho subie-  
 ctorum, quæ ad flectendum caput est compa-  
 rata. Verum quod ipsorum est reliquum, pro-  
 grediuntur vsq; ad quintam thoracis vertebra-  
 m, flexionem rectam efficiunt, nõ modo vertebra sub-  
 ditis, sed etiam cum eis vnicuique capiti. Postquã  
 verò ex musculis octo exiguis & posterioribus,  
 qui caput ad obliquam inclinant, rectam quidem  
 erectionem efficiunt, quum coniunctum ac bini  
 agunt: obliquam autem, quando alter eorum so-  
 lus agit: similiterq; etiã qui maiores ipsis in cum-  
 bunt, vsq; ad collum extendi: ob idque necessum  
 erat quoddam illis parte anteriori opponere mu-  
 sculos, obliquam flexionem ædentes: ideo mu-  
 sculi sex qui ad clauem & pectus perveniunt, fue-  
 runt comparati qui caput possunt flectere, atq;  
 etiam anteriorum circumagere. Pari modo, &  
 musculorum quatuor qui collum flectunt ad la-  
 tera, si vniui solos egerint, ad illum inclinatur. To-  
 ta verò anterior coniugatio, exiguum quiddam  
 flectit anteriorum, nullam præterea flectens ad  
 latera: quemadmodum & quum posterior ag-  
 git, paulatim quidem attollitur, in neutram par-  
 tem se inclinans. Omnibus verò quatuor simul  
 agentibus, in nullam omnino partem propen-  
 sum perit. Quum autem nusquã alibi tantum  
 alterum os, alterum superet, quantum capitis os  
 primorum spondylorum ossa, quibus iungitur,  
 magnitudine superat: (præter enim inferiorem  
 maxillam sedem insunt capiti ossa) certè opus  
 fuit multis ac robustissimis musculis, qui pen-  
 dentes omnino à capite, infererentur, non o-  
 mnes quidè in primas vertebra, sed illi tantum  
 quibus licitum esset. Erat id autem tantum li-  
 citum eis, qui motum rectum ad vnguem suppedi-  
 tant capiti, aut alci eorum, qui ad obliquum de-  
 flectunt. Merito igitur nõ omnes qui caput mo-  
 uent, in primos spondylos insignitur musculi,  
 sed parte quidè posteriore, parui soli: anteriore  
 verò, prima portio musculorum stomacho subie-  
 ctorum: à lateribus parui aliq; musculi, qui capiti  
 vertebra primam coniungunt: ac proinde par-  
 uas vertebra nõ oportuit esse maiores. At verò  
 spinam naturam animalibus veluti carinam quan-  
 dam corporis ad vitam necessariam, non ex vno  
 simplici ossis molta, intus eius omnes vertebra  
 excavauit: viam hanc præparans opportunam  
 portioni cerebri, quæ per ipsam erat descensura.  
 Non cõstruxit autem eam simplicem (quanquã  
 ad sedem tutam, & patiendâ difficultatem, talis  
 structura erat longè commodior) quòd multis ac  
 variis moribus animal esset vitium, quibus spi-  
 na ex vnicuique formata osse, minimè obsecudaret.  
 Quare natura quidem rectè vitruq; scopum si-  
 mul considerans, iudicâsq; priorem quidem  
 dignitate, actionem: post illam autem, securita-  
 tem: sicvi rursus, ad sanitatis diuturnitatem, se-  
 curitatè esse quidem priore, posteriore autem  
 actione: vitruq; scopi, actionis scilicet & incolu-  
 mitatis, in spinæ vertebra exquisitam fecit mi-  
 seellam. Quòd autem necessum fuerit spinalem  
 medullam veluti fluuium quemdam ex cerebro,  
 tanquam fonte, manantem, locis omnibus quæ  
 præterit, neruam semper immittere, tanquam

sensus ac motus riuulû: longèq; melius sic in vni-  
 uersas corporis partes transmitti eas facultates,  
 quàm si nullus intervênt, à cerebro per tenuem  
 aliquem neruum dispergerentur, neminem opi-  
 nor latere. Ad hæc verò, spina, quòd sit veluti  
 quoddam carina, totiusq; animalis stabilimentû, ex  
 duris ossibus est cõstructa. Quòd autem medul-  
 la spinalis sit via, ob id intus est causa. Quia ve-  
 rò ipsi, & visceribus iustar muri est, ea de causa  
 multis propugnaculis in orbem est cõmunita.  
 At quia motus est instrumentum, ob id ex pluri-  
 bus & paruis ossibus per articulos cõmissis in-  
 ter sese consistit. Consistat enim ex quatuor  
 & vigin ossibus, præter os latum, quod extrema  
 ipsi subiacet. Maxime igitur partes spinæ sunt  
 quatuor in vnicuique: collum, dorsum, lum-  
 bus, & sacrum os. Ex quibus collum quidem sep-  
 tem spondylos, dorsum duodecim, lumbi quin-  
 que, os deniq; sacru aut latum, quatuor ossibus  
 consistit. Iam verò latio spondylo, motus simul &  
 sensus omnium partium quæ illi subdite sunt,  
 hæduunt. Quare, vt rectè monuit Hippocrates,  
 si multi quidem spondyli ordine sese consequen-  
 tes, emoti fuerint, malum id est. Sin verò vnus  
 quisvis ex ceterorum harmonia & compage ex-  
 tulerit, ex uno sum: quòd illa quidem prima, spi-  
 nalis medullæ sit circularis, hæc autem secunda,  
 angularis perversio, quia maxime ipsa medulla  
 comprimitur, sustinere magnam simultaneamq;  
 flexionem non potens. Quia igitur per magnos  
 ac laxos articulos, multarumq; distans, moueri  
 spina sine molesta non poterat, melius fuit ex  
 multis, paruis, singulis paulim conferentibus,  
 totam ipsam consisti, vt secundum circuli cir-  
 cumscriptionem, citra angularem medullæ perversi-  
 onem, rota flecti & moueri posset. Quò itaq; ne-  
 cessum sit plures esse in spina spondylos, consen-  
 taneum etiam rationi fuerit, cuiq; ipsorum mo-  
 tum iuste proprium: id quod fieri non posset, si  
 duo illi musculi à capite vsq; ad os sacrum exten-  
 si, haberent fibras secundum longitudinem ex-  
 pectas, quæ nimirum omnes indem traherent.  
 Nunc verò, quum oblique in quosq; spondylo  
 fibre fuerint, tum ad latera circumagere, tum li-  
 cere, atque erigere, nunc hæc, nunc illam spi-  
 nam partem possumus. Sed quum mouere ipsam  
 spinam sigillatim possumus, poterimus & ro-  
 tam simul mouere, fibrisq; muscularum omni-  
 bus simul agere. Quòd si fibras secundum spinæ  
 longitudinem tenderemus, simul quidem totam  
 promptè moueremus, singulos tamen spondy-  
 los non item. Melior igitur habenda est construc-  
 tio, quæ vitruq; simul probè præstare poterit,  
 necnon conversiones ad latera, quàm quæ alter-  
 rum tantum. Quòd autem propter instrumen-  
 torum copiam, quæ locanda ibi omnino erant,  
 primi spondyli magni esse non poterant, nõ ob-  
 scurum existimo. Sicvi necq; etiam, quòd expe-  
 diebat subiacentibus quidem semper superio-  
 res esse minores: siquidem quod gestatur, mi-  
 nus esse oportet eo quod gestat. Quæ causa fuit,  
 cur natura omnium spinæ ossium iustissimam,  
 fecerit maximum, ipsum veluti fundamentum  
 quoddam, ossibus omnibus subdens. Secundû  
 magnitudinis locum habet spondylus illi secun-

Spina vna con-  
 sistens, à con-  
 structa.

Spina consistit  
 ex quatuor &  
 vigin ossibus.  
 Spina extre-  
 ma, os latum.  
 Spina maxima  
 partes quatuor  
 est: collum, dor-  
 sum, lumbi, &  
 os sacrum.

Laxationem  
 spinæ, quæ possi-  
 ma.

Circularis per-  
 versio.  
 Angularis per-  
 versio spinæ.

Spondylii sui  
 solum car-  
 tæ obliquis.

Gestata ossa,  
 minima esse de-  
 bere in, à qui-  
 bus gestantur.  
 Os latum, cui  
 omnibus spinæ  
 ossium sit ma-  
 ximum.

Capiti ossa  
 sedem, præ-  
 ter inferiorem  
 maxillam.

Spina quæ est  
 pars veluti  
 quodam car-  
 inæ est, construc-  
 ta.

Spina cur ex  
 pluribus sit co-  
 structa ossibus.

Eriguntur pri-  
 mi spondyli, pro-  
 pter copiam in-  
 strum. quæ  
 ibi locanda erant.



10 dus coniectus. Reliqui autem, quantum situ ab infimo discedunt, tantum & magnitudine distant. Veruntamen quum spinalis medulla transiens per primas vertebrae, longè corpulentior exsistat, quàm vbi vterius progreditur: consonum fuit rationi, eorum spondylorū latitudinem esse omnium maximam. Quod si laeves etiam debebant esse, ut omnibus aliis incumbere, periculum est, quod eas tenues etiam esse par erat. In hoc tamen videtur natura summè admiranda, quod tantā à cerebro produxerit spinalem medullam, quanta maximè partibus omnibus infernis suffectura esset. Siquidem quū in nervos octo & quinquaginta spinalis medulla dividenda esset, tantam ex cerebro produxit, ut distributionem in nervos planè esset æqualis, neq; in ipsa quicquam deficeret, nec redvnderet. Ceterum loca unde emergit, adeo omni ex parte sunt tuta, ut neq; ledantur quicquid, nec in tot, ac eiusmodi spinæ monbus, afficiantur. Moles verò cuiusque est tanta, quantum pars recipiens postulat. At via omnis quæ est inter primam productionem, & inferiorem ipsius, mirabiliter ad cuiusque securitatem est comparata. Quum igitur spinalis medulla veluti alterum quoddam cerebrum, partibus sub capite suis futura esset: & spina ipsi via simul indueretur, necnon firmū præsidium, destinaretur: ob eam causam tum alia multa in spondylis est machinatura, tum quæ

Vertebrae primæ, ut latendo sit omnino maxima.

Spinalis medulla distribuitur in nervos quos quinquaginta octo.

Amplex.

30 amplex, hoc est, spinam vocant, ex medijs postremisq; eorum produxit partibus, quæ esset veluti vallum quoddam ante spinam totam oppositum. Quantū autē os ipsum, quod hic spinā vocamus, versus posteriores partes extenditur, tantum illi, tegumenn grana, cartilaginei circumducitur. Quæ autem rursus cartilaginei ligamenta nervosa, crassa, lata, fortia, & mediocriter dura uatura indidit, scuturata simul, ac totam spinam colligatura. Productionum autem spinæ, quæ quidem sinum superiorem habent, deorsum: quæ infra, sursum spectant, ut ipsarum figure radices aut testudines referant: quarum forma figurarum omnium ad patendum est difficilima. Non debet autem esse mirum, si soli spondylo qui in medio est spinæ, productio posterior, quæ acantham efficit, in neutra partem inclinet: hoc est, neq; in collum, neq; in lumbos, sed omnino sit recta: quandoquidem non potuisset natura similem formam toti spinam contruere, nisi productiones omnes tam infernas, quàm super-  
50 nas, in terminum quandam communem rectum, ac nusquam inclinantē iunxisset, qui veluti fornicis summities quædam esset futurus. Iam verò quum in thorace cor esset locatum, magnāq; arteria spinæ incumbere, natura longissimas fecit illis productiones, quæ spinam constituunt: in aliis autem partibus omnibus, quam breuissimas. Quemadmodum verò productionē cuiusque spondylis parte posteriore, quæ spinam efficit, propugnaculi vim ostendebamus præstare: ita & alie productiones transversæ spondylis sunt duæ, quæ simul quidem laterales ipsorum partibus simile præsidium, simul etiam veluti sedes quædam sunt, musculus spinæ internis atq; externis subditæ. Prædictarum autem pro-

Spondylus nec dicitur in tota spina, nec productionem possidet in neutra inclinæ parti.

Productiones spondylorum transversæ.

ductionū fines, quemadmodum & acanthæ totius, sunt ad mediam spinam converti. Cur autem crassæ sint productiones laterales spondylorum thoracis, tenues autem in spondylis lumbi & magni osis, in colla verò spondylis crassæ & bifidæ? An quod in thorace quidem, quum costæ non solum eis essent in articulatione, verum etiam per totum incumbere, consentaneum fuit, firmas atque stabiles facere productiones? Lumbi autē & osis magni productionibus, quæ vasa solum ac musculi incumbere, utilis erat robore opus? Quæ verò sunt in collo, mentisimè existerunt bifidæ & crassæ, ut quod secutatus, propter acantharum brevitatem eius spondylis deerat, id ex transversis compensaretur? Porro spondyli omnes, præter duos primos, partibus quidem anteriorum rursus inter se colligati, posteriori vero articuli, similitudinem simul sunt atq; ad motum facilitatem indepti. Atq; ob eam causam anteriorum quidem plurimū flexi possumus, retrorsum verò non item: quemadmodum certè expediebat ad omnes humanas actiones. Siquidem facile rumpereunt multa & præstanna vasa, si extensa plurimū ac refracta, dum spinam totam retorqueremus, essent.

### GALENI PERGAMENI de vsv partium, lib. XIII.

30 Q Uum autē spondylorū locus posterior, in tres dividatur partes: primā, quæ exactè posterior est, & loco sunt spinæ: duas, quæ utraque huius parte sunt, quas productionum transversarum radices terminant, merito ex utroque harum duarum posteriori loco, inter se articulantur ipsi spondyli: quandoquidem aliunde id fieri nec hecbebat, nec erat expedienti. Ceterum quum ipsorum spondylorum quisque, parte superna & inferna, his qui vtrinq; & regione sunt, committatur, merito duæ quidem acclues, rondem autem declives productiones eis existerunt: hæc siquidem omnibus sunt communes. Ex abvndanti autem, veluti cumulus, magnis spondylis alie duæ declives insunt. Quum enim ex declivibus productionibus, acclivibus invecis, spondyli articuletur, ad securitatem maiorem natura alteram declivium totam articulationi subicit, ligamentūq; vabidum ex ipsius sine productum, sub acclivem totam submisit. Verum si prædictis tribus productionibus (quarum una est omnium maxima, quæ spinam constituit, ac duæ transversæ) duas quidem acclues, quatuor autem declives adiunxeris, non uem omnino ipsas reperies, quot sanè & quales in lumbi spondylis cernuntur: quemadmodum in collo vndecim, præter mediā illam quæ anteriorum consistit. Porro dorsi spondylis singulis, productiones septem existerunt, tametsi oon omnes formā habent similem, quod spondylorum eiam, novem superni, productionem superiorem habeant maximam, transversas verò crassissimas, tum acclives ac declives, crassas simul ac laticas. Decimus autem qui hos sequitur, cetera quidem est similis, non tamen productionem posteriorem, vtrius, habet longam, de-

Spondylus, quæ parte anteriori consistit.

Productiones spondylorum quæ habentur.

Lumbi spondylorum productiones novem. Ceteri spondylorum productiones non vndecim. Dorsi spondyli singuli septem productiones habent.

diem & tenuem: neq; etiam ipsa quatuor, per quas cum alia vtriusq; spondylia articulantur, habet similes: sed superni quidem dux, prælocato rum nouem spondylorum productionibus accliusbus: relique verò dup decliues, reliquis sunt decliuisbus similes. Huic enim soli spondylorum omnium id est eximium, quod vtrique articulatione propinquo sibi spondylo vtrique inuehitur. Reliquis verò omnibus qui sub hoc decimo sunt locati, id inest, quod acclius quidē productiones sint causæ, decliues verò convexæ. Ob id convexis quidem, subiectis spondylis inuehitur: accliusbus autem, superiores excipiunt. Qui verò supra hunc in dorso sinit & collo, hi omnes recipiunt simul, ac decliuisbus productionibus ambiuntur accliusæ, quæ sensim sunt convexæ. Postremi autem duo dorsi spondyli, productiones duas reliquas decliues ex partibus inferiis ad tutandæ articulos summifissas, atq; ab aliis seiunctas habent: qui soli spondylorū omnium obliquas vtriusq; productiones, quas appellauimus trauersas, non possident: pro quibus decliuis illas habuerunt. Per decimum igitur illi dorsi spondylum, qui immotus in medio manet, natura totū spinā in partes omnino squales diuisit, in ole spondylorum æstimata, non numero. At verò superioribus ipso decimo spondylia fecit productiones natura, cōvexas quidem accliusæ, causas verò sensim decliues: inferioribus autem contrā, causas quidem effecit accliusæ, convexas autem decliues. Quæ structura tum ad flectendā spinam, tum ad erigendā requireretur. Est autem vtriusq; figuræ terminus, ut quum flectimur, spondyli, quā possunt longissimè, à se invicem digrediantur, perinde ac si spina tum longior esse deberet. Quum verò erigimur, contrā, ut cuncti cōstant, ad medium spondylorum accedentes, ac si spinam expediāt esse breviorē. Quod autem cauitates quæ circū osium inter se dearticulatorū convexitates vtriusq; vertitur, sint ad motus obliquos aptissimæ: quodq; motus ex duobus obliquis, parum à motu medio partem vtriusq; simul circumagentibus constitutus, necessariō vnus rectus fiat: necnon quod in spina satius fuerit, ex obliqua rectos efficere motus, ac dictis facile constat. Porro primus colli spondylus posteriorem productionem non habet, quod recti musculi & breues, qui caput totum erigunt, omnem ipsius regionem occupant. Cui soli primo spondylo non insunt obliqua foramina, per quæ nerui à spinali medulla excurrūt, & qualia omnibus aliis colli spondylis natura insculpsit, quæ parte inter se coniunguntur, sic vte ex ambobus vnus foramen insit semicirculi, nervo aptum, oriatur: ita enim non modò foramina ipsa, sed nervi etiam, qui per ea emergunt, sub productionum accliusum ac decliuis radicibus (vbi primū ipsorū spondylorū latera desinūt) sita, ad eōm iunguntur vndiq; ut alibi melius ea minime collocari poterint. In lumbis autem, si alterā productionū decimū accuratius consideres, non ad ligamenti firmandi duntaxat vsum reperies vtilem, sed multo etiam magis, primū nerui productionis gratia comparatam. Si quidem

exporrecta post neruum, murus reuera efficitur, & propugnaculum adversus ea quæ illi quoquo modo incident. Hanc igitur productionem in lumbis spondylia videas magnam (quod ipsi maximi sint) & duobus postremis thoracis similem. In alia verò spondylis decem, eandem utilitatem nerui præstant productiones laterales, quibus costarum ossa inuehitur, atq; in articulantur. Reliqui etiam, præter primū, colli spondyli, neruorū productiones ab vtriusq; spondyli finibus lateraliibus prominētes, habent à transuersis productionibus (quas bifidas esse diximus) tectas atq; stipatas. Etenim in lumbis spondylus, apertè neruis lateribus a partium infernarum inuehitur. In spondylis autem dorsi, inuehitur etiam huc quidem fini superni spondyli evidenter, sic tamen ut infernum attingere spondylum videatur. In colli verò spondylis, quod omnium minimū essent, vtriusq; spondylus æquale portionem ad vtrumq; nerui consulit. Quum autem spondyli singuli, primū constructionis scopum haberēt duplicē, sedem scilicet tutam spinæ totius, atq; etiam motum, aliorum quidē omnium qui sunt sub collo spondylorum vias in securitate est maior: superiorum verò, in motione. At quia nec inferni spondyli, alij aliis incurrere tutō poterant sine lara basi, ac forti ligamento: nec superni moveri facile, sine longo processu, aut ligamento laxiori, vtrique spinæ parti natura congruente structura consuluit, prælongas quidem in infernū, causas verò supernæ colli vertebrae faciens, non modò ad motum facilem, sed ad tutum etiam obendum: alias aut omnes in planum, larem, atq; vndiq; æqualem, solidemq; circum, terminans. Quæ vbi primū spondylus crassissimus est, ibi ipsum prope supernas articulationes foraminibus percutit tenuissimā, quibus omnibus rebus potius, patiendi difficultatem tum ipsi spondylo, tum neruo producendo comparans. Cui spondylo crassities illa ob tutam perforationem fuit comparata, & ut parte quidem inferna, secundi spondyli convexitates, superna verò, capiti eminentias excideret. Quæ enim ipsius spondyli partes maxime erant laboraturæ, has præter ceteras, satis fuit fortes efficere. Vtrunque autem excidentium neruorū, in musculo ipsi primo spondylo incumbētes, natura distribuit. Verum quia prima coniugatio sit tenuis, ob idq; ipsa potius capiti distribui nequeat, ex secunda coniugatione natura id efficit. Nam per superiores musculos nerui vtrique perlabitur, qui obliquas quidem primū in partem posteriorem ac inferiorem tendit: obliquas autem rursus post hæc, prorsum ac sursum progressus, in caput totum demum dispergitur. Quod autem ex secunda ipsa coniugatione in infra superaret, in propinquam omnes musculosa est distributum, à quibus primorum spondylorum motus, tum inter se, tum cum capite sunt. Cæterum egreditur secunda hæc coniugatio, ab vtraque ipsius acanthe parte, ex regione inter primū & secundum spondyli media. Tertia verò neruorum, qui à spinali medulla oriuntur, coniugatio, ex cōmuni forami ne secunde & terti spondyli emergit, musculisq;

Colli vtriusq;  
spondyli, æqua  
lem portionem  
ad vtrumq;  
conferre.

Natura indur  
stra omnia for  
mandas verteb  
ras.

2. 17. 1. 1.

Prima coniug  
tio neruorum à  
spinali medul  
la oriuntur.

Secunda.

Tertia.

Spinam totam  
esse densam in  
partem anteriore  
equalem, per de  
cem spondy  
los.

Colli spondyli  
primū produ  
ctionem posteri  
orē capiti, for  
aminibusq; obli  
quis.

genas mouentibus, & illis qui collū totum cum capite retrō erigunt, distribuitur. Pars verō ipsius quæ prorsum fertur, secundæ & quartæ coniugationi miscetur. Nam tertia & quarta coniugatio, nervos communibus colli & capitis musculis suppeditat, ac præterea muscula genas mouentibus, quemadmodum certè & paribus omnibus quæ sunt post aures. Quinta coniugatio productionem habet, qua quartus spondylus cum quinto coniungitur. Distribuitur autem quemadmodum & prædictæ. Pars tamen ipsius quedam retrō per profundum fertur in communes colli & capitis musculosa: alia verō pars antrosum in musculos genas mouentes, & caput inclinātes: sicuti alia & tertiā, in medio prædictarū partium, sursum, versus scapulae summam, fertur. Iuxta radicē autem nervorū, pars eius vtrius vicinarum coniugationum, sextæ videlicet & quartæ, miscetur: & qui a neruis à quartā ad ipsam descendit tenuis, is manifestō cernitur parti eius misceri, quæ maximam portionem ex eius loci spondylis, nervus diaphragmatis colligit, vtriusque vna, qui sub membranas thoracem sapientes fertur. Sextæ post hanc coniugationis, sub quinto spondylo exidentis, multo firmiter magna cum propinquis vtriusque, sed plurima eius pars ad sima scapularum extenditur. Auget autem quodammodo partibus anterioribus & diaphragmatis neruum, quemadmodum & aliis omnibus eius loci spondylis propagines quasdam exiguas mittit. Septimæ coniugationis, quæ ex communis sexti & septimi spondyli oritur foramine, magna fit permixtio cum proximis. Ea tamen partem sui maximam extendit ad brachium: quemadmodum certè & ab octava coniugatione, quæ post septimū spondylum oritur, maxima pars in vlnam pervenit. Sic ita nona coniugatione, quæ post octavū spondylum præcedenti miscetur, pars non exigua ad minus extremā pervenit: qui nervi circa primum intercostale spatium minimū locum occupant, quod primæ etiam costæ finem habent. Ob idly post septimum spondylum natura cœpit thoracem effingere, quod ex coniugatione, quæ est post octavum spondylum, ad vtrāque vtrius poterat, ad primum scilicet inter costas spatium & manum. Ad diaphragma etiam mirabiliter admodum nervos ex spinali medulla colli, & ad musculos intercostales ex singulis propinqua spondylis, deduxit. Est autem septi transversū figura rotunda, situs verō obliquus, partibusque anterioribus ac superioribus ad pectus prætingit: inde retrō semper ad dorsum fertur, donec spinam contingat, cui adhaerescit ad lumbum. Caput autem eius, ad quod annexatur fibre, & in quod ipsi nervi descendunt, in medio eius consistit. Quam ob rem diaphragma solum, eorum partium quæ sunt sub clavis, nervos ab spinali medulla colli recipit, membranas thoracem dissepcentibus, stabiliores: aliarum verō inferiorum nulla. Melius siquidem fuit spina sem medullam thoracis, nervorū propagines ex propinquo omnibus quæ illic sunt, suggerere. Ob eamque causam à nervis qui singulis in sunt spatis intercostalibus, portio non exigua per om-

culos ad externa excidit. Iuxta radices autem costarum, in instrumenta quæ sunt ad spinam, dispergitur. Post verō, prope convexa maximè singularum costarum, in corpora thoraci circumfusa, veluti & prope pectus, a paribus quæ illic sunt, disseminantur. Homini igitur, ac similibus, collum ex septem spondylis surē est compactum: quum eiusmodi magnitudo laryngi, primo instrumento voci, conveniat, ex eoque partes omnes, quas à spinali medulla colli præteritæ nervos recipere, recipiant quod factū est. Quia aut nec respiratio, nec vox posset sine thorace fieri, cuius præsidio indigent cor ipsum atque pulmones, in illius certè structura hos quatuor scopos sibi natura proposuit, vocem scilicet, respirationem, ac rum cordis, tum pulmonis magnitudinem. Sequitur quippe per arteriam asperam generatio pulmonia, sic magnitudinem huius, magnitudo thoracis. Quin & cor positionē & magnitudinem in thorace sibi rongruentē forantur. Nec minus thorax, qui quidem ex duodecim vertebis constat: quæ verō has deinceps sequuntur quinque spinæ vertebæ, eadem ratione sunt factæ, quæ illæ quæ sunt in collo. Nam quæ nervi qui à spinali medulla proficiunt, in spinales atque hypochondriac musculos diuidantur, primas quidem productiones oportuit ad eas partes mittere: post autem, & ad crura: ac tum os sacrum eriri, quod simul quidem veluti fundamentum quoddam spinæ futurum esset, simul autem ossa coxendicum atque ilium incumbētia sibi, excepturam: sine quibus nec pubis ossa consistere poterant, cruribus ad ischion dearticulatio omnino non fuisset. Horum enim primorum gratia, tum autem vteri, vesicæ, atque intestini recti os latum, siue sacrum molita est natura. Per eam quidem foramen primum qui nervus excidit, usque ad crura feruntur, miscetur. Promde coniugationes quæ sunt sub diaphragmate, nervorum à spinali medulla proficientium, qui ad musculos prædictos & crura feruntur, quinque quidem spondylis eguerunt: sextæ verō quæ eam excipit coniugatio, primis ossis magni foraminibus. Sunt autem & alie tres in eo coniugationes, quæ in partes superiores distribuuntur. Constat itaque collum merito ex septem spondylis compactū, thoracē ex duodecim, lumbum ex quinque. Porro os sacrum cum vltimo articularum lumbi spondylo, ad finem cartilaginei habet quandam epiphysim, ut multè gravioribus panatur. Ac verō valdum ligamentum anteriore omnium spondylorū partes vltimissimè colligant, definit posteriore quidem parte in tunicam medullarum spinalis medullæ ambientem: anteriore verō, paulum progreffum, vtriusque parte inseritur in cartilagine, quæ spondylis iungit. Ceterum spondyli omnes ab ea connexionē per partem anteriore habent retrō progressā, paulatim à se diducuntur, locum omnem medium repleti habentes humiditate crassa & viscosa, quæ ad motionis facilitatem conducit. Meninges autem vestientes spinalem medullam, cerebri volvere similitudine referunt, nisi quod crassa medulla spinalis mening, vndique tenuem ransgit & comprehendit. Sunt enim communia spinali medul-

Collū ex septi spondylis cōstit.

Larynx primū instrumentū cōstit. Thoracem effici necessarium vti atq. respirationi. Scipi quæ propinqua sibi natura thoracem fingunt.

Thorax ex duodecim vertebis constat.

Cyrius sibi sibi.

Epiphysia est.

Epiphysia est.

Lumbi ex quinque spondylis constunt.

Vertebæ cum ligamentum.

Humiditas viscosa.

Quarta.

Quinta.

Sexta.

Septima.

Octava.

Nona.

Costa prima sibi maxima.

Septi transversū figura, et sibi.

Ad vtrā.

tem

*Spinalis medulla quae sita est in cerebro, & quae etiam vtriusque propria.*

*Cerebrum polare.*

*Spinalis medulla non polare.*

*Spinalis medulla nervosa nuda. Spinae infima pars, quae non infirmitur.*

*Spondylorum singulis quilibet nervus proprius.*

*Scapularum tria.*

*Thorax & spiracula organa. Cor vix principium.*

*Angustia.*

*Claviculae tria.*

medullae cum cerebro, quod corporis substantia fit illi haec similes, & nervorum etiam principium exiit. Propria aut, quod quod cerebrum pulset ac moveatur, quamquam osse immobili desitescens, ipsa tam non moveatur, tamen si mobilibus vertebribus contineatur. Non ab re igitur dux meninges ipsas similiter fuerunt dare: altera quidem ad vasa quae ipse infans, colliganda, totamque eorum substantiam, quae mollis est admodum, confringendam: altera vero quae tegat, & adversus ossa circumfusa muniat. Ossae etiam ipsae extrinsecus sunt attributa, vel uti propugnaculi atque murus, contra iniurias extrinsecas. Priusquam vero vtriusque quod cerebrum quidem pulsabat, crassa meninx tantum ab eo discessit, quoad ipsi, dum dilataretur, suscipiendo esset satis. Quod vero spinalis medulla non pulsaret, crassa meninx cum tenui vndique se coniungit. Quod etiam capitis ossibus conspicuus nullus motus inesset, spinalis autem medullae ossibus vehemens, cerebro quidem nullum extra crassam meningem aliud operimentum fuit circumdatum: spinali autem medullae, tertia illa fortis atque nervosa tunica: cui etiam viscidus ille humor est circumfusus, ne assidue motu exiceretur. Singulis autem spinarum partibus ab adiacentibus vasis, per foramina quae nervos ipsos deducunt, propagines natura suppeditavit, vnam singulis spondylis coniugationem tantae magnitudinis, ut in corpora omnia spondylo circumiacentia, diuisi planè queat. Sed quoniam coniugatio nervorum vna ex singulis spondylis nascitur, planum est, quod ipsorum numerus, venarum & arteriarum numero aequalis erat futurus. Ceterum parvis quidem spondylis praedita duo foramina satis esse possunt, per quae intro quidem venae & arteriae, foras vero nervi ferantur. Magnis autem, non hac modo, verum etiam quae vasis nutrituris servient, natura decenter est machinata. At vero scapulas ipsas, primum quidem propter humeri articulationem, dein autem ex abvndanti, propter partium thoracis, quae illic sunt, custodiam, excogitavit natura. Thorax siquidem respiracionis est instrumentum, non minus quam pulmo: cor autem vix principium. Quia igitur thoracis partibus protectionibus non aderat nobis oculi, quibus providere nocitura liceret: ne omnino negligenter, natura regionem illam vallo quodam spondylorum, atque productionum spinarum, munivit, quibus sursum porrectis, primum quidem scapulas vtriusque applicuit, dein carnis copiam apposuit. Ad haec leuiter superiorem spinarum finem adaugens, rectumque illum attollens, atque ibi clavi coniungens, *angustia*, quod vocant, effecit, tum humeri articulationi, tum brachij, capiti, atque adeo scapulae ipsi praedictum, & firmamentum futurum. Quod si inter os pectoris & spinarum finem, quae ad scapulas est, connecta clavis non fuisset, nihil vique prohiberet, quo minus os latum scapularum, nusquam stabilium, thoraci incederet, coarctaretque ibi humeri articulum, multoque motus brachij impediret. Non tamen natura in homine quidem humeri articulum longissimè à thorace ab-

duxit in quadrupedibus vero, proximè collocatur: quod in illo quidem manus ad varios usus servientes, spaciosum locum desiderant: in brutis autem nequaquam, quod in eis anteriores artus ranteam ambulacioni habuerunt. Merito itaque homo, ut si velut quidem ambulare quatuor artibus queat, quod in ipso scapularum articuli longe sint à thorace abducti. Merito etiam simia, ut in ceteris est hominis imitatio ridiculitas, ita & in artibus. Ceterum quemadmodum simia, quod animam habet ridiculam, corpus ob id habuit: duculum: ita homo, quod animam rationalem habere, ob id etiam corpus solum inter ea quae sunt super terram, habuit diuturnum. Porro iuxta iugulum ipsum est clavis, convexa quidem foris, intus vero caua: quod videlicet locum in instrumentis praebat, quae per illas partes ferantur. Vbi vero à iugulo caput discedere, tantum paulatim antrosum redit, vique ad humeri summum, quantum finis particulae ipsius clavis intumescens, retrò secesserat. Colligat autem ibi ipsam spinarum, os parvum & carinatosum scapulae. Quum autem manus tota ad multos ac varios motus comparata esset, caput quidem brachij rotundum habere ipsam oportuit, cautatem vero ei subditam, nec magno pere profundam, nec in magna speculcia fluenter. Quia quidem structura ad varias motiones apta, quomodo conister humeri articulus, parè abest quin assidue brachij caput luxetur, quippe quod cauitate adeo exigua vehatur, ut pars ipsius magna extra sit, nulloque innoxia sublimis penderet. Cui discrimini occurrente natura, tria ligamenta valida, os brachij cum scapulae cervicis iungentia, praeter commune omnium articulorum, rotundum est machinata: duos praeterea scapulae processus recurvos, qui articulum munient, atque ex vtriusque horum parte, musculos ipsum maximos confringentes. Quorum trium ligamentorum quoque quidem profus sunt rotunda, tertium vero leuiter latum. Enascitur autem, primum quidem ex fine apophyseos, quae anchoram refert, internisq; brachij attenditur partibus. Alterum vero, quod hoc est maius, ex ceruice scapulae, qua parte supercilium cauteris illius est altissimum: atque hinc caput brachij sedem praebet firmissimam, sua lara fissura. Reliquum denique & tertium, ex eodem loco, quo secundum, oritur: obliquum autem sub eo inseritur & ipsum in primum capitis brachij initium, quo modo latum ligamentum, quod in orbem articulum totum complectitur. Quae ligamenta duo, ad musculum brachio incumbente perveniunt, quem roborant. \* Munitor humeri articulus, à scapulae etiam processibus superioribus, nempe ab illo qui est ad summum artum humeri (quae coniformem appellant) & ab externo, qui anchorae est similis: necnon à maximis muscularibus tendonibusque, qui totam movent articulationem, confringitur vndique: quorum muscularum fines ossi brachij unguuntur. Ceterum ad pectus brachium adducit, leuiterque trahit deorsum, is musculus qui iuxta mammam oritur, magnitudine mediocri. Alius autem contrarius, ex adne enatus pectoris partibus, adductionis sursum est

*Humeri articulus cor in homine quod hominem à thorace abductum.*

*Simia est hominum imitatio ridicula.*

*Simia, quod animam habet ridiculam, corpus solum est duculum.*

*Hominis solum inter animalia terrestria, cor diuturnum corpus tribuit.*

*Clavicula colligata.*

*Humeri articulus carnis iugum.*

*Humeri ligamenta tria.*

*Scapulae processus recurvi.*

*Brachij motus à quibus oritur tum musculi.*

autoe. Tertius præter hos geminus, aut ex duobus coalescens, à toto pectoris osse exortus, æquabiliter ad illud totum brachiū adducit, si uterq; tendatur. Nā altero solum agente, aut deorsum, aut sursum, modicè motus brachij inclinabit. Porro musculus ille, qui à sublimi pectoris parte iuxta clauas oritur, duo habet capita, inter nās quidem paribus epomidi inferius, externus autem adhærens inferius scapulae partibus. Ac solius musculi huius tensi actio, brachiū extensorium extendit: alterius verò, qui ad clauē peruenit, versus interiora conuertit. Tensis autem æque fortiter ambobus capitibus, brachium rectam planè ac mediam extensionem assumit. Atque atq; etiā duo musculi, vtrique spinæ, quæ est ad scapulam, parte, similem prædicto habent actio nem. Octauus verò alius vitra prædictos est musculus, qui ortus \* à maxima parte inferioris, qui in scapula est, lateris, brachium extensorium abducit, iis qui sunt ad pectus, oppositus, qui brachiū sursum attollunt. Dux sunt post hanc muscularū motiones, brachium extensorium ac deorsum circumagentes: verūm amplius quodam extrā adducit musculus, \* qui ab inferiori ora lateris, quod in scapula est, proficiscitur. Nam qui scapulae partem simam complectitur, minus qui dem extrā, sed deorsum magis brachium circum agit. Reliquus verò alius vnus est musculus, qui deprimat, ipsumq; retrò agit: cui prædictus musculus paruus succedit, qui efficit ne brachiū dum deprimatur, villam in partem inclinet. Con tenta autem fuit hoc natura, ramentū omnī mi nimo, propter naturalem manus ad inferiora impetum. At qui musculi brachium attollunt, actione indigent vehementiori, ob idq; tum ip si, tum qui brachia circumagunt (est enim hie motus violentissimus omnium) in omnibus articulis robustissimi sunt, ac tendones maxime neruosis\* fortuntur. Verūm scapulam deorsum trahit musculus, ex inferiori quidem thoracis spondylo enatus, inferioribus autem partibus scapulae insertus. Trahit autem eam sursum musculus latus ac magnus, qui à spina enatus, sue sum ad os occipitis peruenit. Trahit enā sursum & musculus tenuis, qui ab iisdem capitis os sibus ortus, ipsi ad spinæ basim inseritur. Retrò autem aliq; duo musculi abducunt ad totam ani malis spinam: quorū editor ipsam insilect sursum, ad colli spondylos: reliquus autem abducit ad spondylos dorsi. Tensis verò ambobus simul secundum propriū situm rectitudinem, fertur ad \* dorsum. Quum autem tensus est is musculus, qui ex laterali primi spondyli apophy si exoritur, scapulaeq; subius, qui sunt ad summi tatem humeri, inferunt, maxime quidem ipsum humerum trahit: cum eo autem & scapulam to tū, ad partes colli laterales, vt ad anteriores mus culus tenuis, qui à labdoide oritur, conuertit. Quinetiam ex musculis qui è pectore ad eam sur sum feruntur, qui est editor, non solum mihi vi detur caput brachij trahere, fed etiam scapulam, vt qui ligamento articulationem to tam continenti inferatur.

# GALENI PERGAMENI de vsu partium, lib. XIII.

Quum ipsarum animalis partium, non ulz quidem ad viuendum sunt necessariæ, vt cerebrum, cor, & hepaz: aliz ad viuē dum commodius, vt oculi, nares, & manus: atq; aliz deniq; ad instaurandū genus, vt puden tia, testēs, atque matricēs: de his quidem vitimis hoc libro agendum est, quandoquidem superio res illas iam explicauimus. Ergo natura, si fieri potuisset, maxime opraisset suum opificium esse immortale. Quod quum per materiam minimè illi liceret, subsidium quod potuit ipsi ad immoe talitatem est fabricata, sapientis cuiusdam vrbis conditoris exemplo. Quamquam per materiam compertus adeo floruisse, vt non ipsa excedens veritatis, memoriam conditoris deleuerit. Naturæ verò opificium iam multis annorum milibus constitit, atq; stabit perpetuū. Nam mira bilem quādam rationem inuenit, qua in demor tur animalis locum, nouum aliud sufficit. Om nibus siquidem animalibus natura concipendi instrumenta congruēna tribuit: ipsiq; instru mentis eximiam quandam vim voluptatis effe cticem: animæ verò ipsis vsuræ, incredibilem vtendi cupiditatem cōiungit: à qua animalia in scitata, stimulatq;, etiam si rationis expertia, æta tēq; tenera sint, provident tamen non secus, ac si prudentissima essent, vt genus suum sit super stes. Porro in femineo sexu matricis ventri sub iecit, qui locus est tum ad vsum venererorū, tum ad recipiendum sperma, necnon ad incrementū factus, & perfecti enixum, opportunissimus. E tenim collum matricis, in pudendum mulieb re definit: quod quum animal concepit, adeo ad ynguem clauditur, vt ne minimum quidem aut inus foras laxet, aut foris intrò recipiat. In coi tu autem eomq; patet ac tenditur, vt semen per laram viam progrediens, facile in matricis sinu perveniat. Plurimum enā & in partu disten ditur, sic vt totum embryonem facile ea via expel lat. Quare merito à natura factum est ut vao rum simul ac mediocriter durum, vt citra noxam plurimum contrahatur & dilatetur, dirigarūq; ad excipiendum semen. Nam si præ molli tie in seipsum concidens, plexus quoidam efficeret, ab is semen proliberetur, quo minus ad sinus matricis perveniret celeriter, ac sic humor spiri tuūq; à se mutuo separarentur, quos tamen co ire est necesse, hunc quidem vt motus principii, illum autem vt materiam ad factum generatio nem appositam. Cæterum sanguis menstruus ne utquam prima est materia, atq; gignendi ani malis propria: sed quum feminis humiditas à calore infuso \* ducta, tunica matricum incide rit, non secus ac pinguitudo facile agglutinatur. Atq; inde vno temporis momento multa fiunt, eaq; admirabilia naturæ, circa animalis genera tionis principii, opera. Nam matrix ipsa quā celerissime vndique femini adhæret: collum au tem totum coniungit, & eius maxime officium internum. Qui igitur humor matricis asperi tates alinit, toti superficiē internæ subtenfius, membrana tenuis efficitur, interea autem spiri tus

Particularia tria genera.

Natura opificis proprias.

Concipiendi instrumenta. Conueniētia capellæ vnaus iis auranti bus infusa.

Matricis fructus opportunus sumus.

Matricis collum.

Matricis collum cor arrofum, ac mollior duntaxat.

Spiritus efficitur principii in ipsa generatione.

Sanguis immo struus non est prima materia, gignendūq; animalis prop ria.

Generatio nis ordo.

Brachium attollens et circumagites non fuit esse robu stissimus om nium.

Scapulae motu à quib; pro ficiantur non fuit.

tus vndeque ad vnguem recensus, non elabitur, sed motus naturalis primus oritur. At vero quo tempore nec semen intro, nec fetus exte fertur, matricis collum in flexu & contortio- nes coadit: quæ ne matricis regio perfingeretur, plurimum habent momenti. Neq. enim alia ratione io mensura purgationibus partubusq. mulieres refrigerantur, quin quod tuoc matricis collum sit rectum, referatimq. Porro io ani- malibus numerosa factus gestantibus, oatura fecit sinus matricis plures: in homine verò, ac- cuiusmodi, quemadmodum corpora totum est go- minum, ita & matricis sinus est duplex, alter qui- dem in dextris, alter verò in sinistris locatus. Si quidem quæ ob corporis imbecillitatem, bre- uiora vitæ futura erant, aut etiã præda fortiori- bus, iis animalibus omnibus assiduè interita re- medium excogitavit natura, secundam scilicet generationem semper receptaculorum matricis numerum, æqualem numero mamillarum præ- ferens. Mammis autem lac runcacedit, quo- 30 tempore iam absoluta est factus. Nam quum- renera adhuc sint atq. imbecilla recens oata ani- malia, nec possint solidos cibos conficere, ali- menti ob id natura etia comparauit, peninde ac si vtero adhuc gestarentur. Quibus verò anima- libus propter corporis ficitatem superflua lu- mors subintrari non poterat, vt volucibus om- nibus, iis oatura præcipuum quandam amorem in ea que procreantur, ingenerauit: quo impul- 35 sa, bellum pro pulis cum ferocibus animalibus, quæ antea declinabant, suscipiunt intrepidè, vi- ciamq. illis conuenientem suppeditant. Vt igitur matricis duo mulieribus in vnum collum desinentes sunt factæ, ita & vbera duo, vtrumq. fux matrici, iustar minuit boni, subferuens. Vn de Hippocrates ait: Si malen geminos gerenti, mammaru altera gracilefcat, i dextra quidem, masculi: sin sinistra, femine abortum faciet. Se- quidè mares in dextra, facinoræ in sinistris maio- ri ex parte locantur. Etenim exigux, dum fetus 40 augentur, sunt mammx, quo modo etiam matricis. Quum autem perfecti fuerint, & pa- riendi tempus inuiterit, simul cum matricibus, quod satis est intumescunt. Matricis itaq. partes sunt, sperma recipere, atque factum aboluere: mammarum verò, quod iam natum est educa- re. Quod si animalia attentius dissecueris, repe- res in iis quidem quæ adhuc augentur, vesicas matricibus multo maiores: in perfectis autem, 50 mammx vesicas. Vesica namq. ad portionem om- nium aliarum partium augetur, vt quæ omni- bus ætandis æqualiter seruat: matrix verò, nec dum augetur adhuc animalia, nec quum iam consensuerit, ritè actionem suam potest obire. Si quidem alimentum benigno abundantiq. facti- bus opus est, cuiusmodi in folis florentibus ad- vidualare potest: quum in declinantibus quidem, alimentum non ritè coquatur: in iis autem quæ augentur, quamvis rectè concoctum sit, in nu- tritionem & auctiorem totum id absumitur.

Et autem fecunda mare imperfectior, vna qui- dem & prima ratione, quia frigidiior. Si quidem in animalibus calidum est magis actiui frigidus. Cæterum omnes quæ viris iulant partes,

in mulieribus etiam reperias, eo discrepantes duntaxat, quod in mulieribus quidem ipse in- trus sunt condire, in viris autem extra pendere, iuxta nuncupatum penurum. Quod si mulie- bres quidè partes evertas extrorsum, viriles au- tē intro reuertas, replictis, inuenies omnes io- ter se similes: cuiusmodi & in talpæ oculo si- mere licet exemplum. Hæ enim vitæum & cry- stallinum humorem, & præterea nimidas his cir- cundatas, nō minus habent, quàm animalia quæ vtriusq. oculis. At neq. eis aperti fuerunt oculi, nec foras prodierunt, sed imperfecti fuerunt re- lecti. Sunt enim animaliu nature varieg. Alia quip- pe non longè recesserunt à plantis, suntq. ea ani- malium omnium imperfectissima, sensu vnicor- tactus prædita: vt olerum plurima: Hæ re- 10 cesserunt amplius, quibus gustus mest: his adhuc amplius, quæ odoratus instrumentum sortun- tur. Quibus adhuc multo magis, quæ instrum- to audiendi sunt prædita. At perfecti proxi- ma sunt, quibus præter hæc omnia, adest vi- sus. Sola autem hominibus ratio inest, quia di- uina nihil mortali animali est concessum. Sic vt igitur homo animal est perfectissimum omniu, sic tantò est formosa imperfectior mare, quāto frigidiior. Genitalia autem eius, formata intus fuerint, dum ipsa vtero adhuc gestaretur. Quum enim exare & foras propullari præ calorem imbecillitate non possent, ipsum quidem animal: quod cōformabatur, imperfectius eo, quod v- 15 diq. est abolutum, reddiderunt: quā in imperfe- ctionem tamen consequuta est valutas nō asper- nanda, ad instauridum humanum genus. Nam quum factus ipse materiam copiosam posset, tam ad primam sui constitutionem, quā ad o- mne incrementum, si calidissima quidem ipsa 20 femina esset, vtiq. dicatetur talem materis, nec fineret coaceruari eam: quemadmodum si im- pensè frigida, ne humorem quidem ipsum con- coqueret. Frigidiior in igitur eam eodiq. fieri fa- tius fuit, quoad alimentum quod concoctum & cōfecisset, discutere totum non posset. Hæc ita que est frigidiataris feminæ valutas, quā mox 25 sequutura erat partium imperfectio, quā ip- se præ caloris imbecillitate prorumpere foras non possent. Quod commodum ad instauran- dum genus, est secundum ac maximum. Nam si extra prodissent, scrotum vtiq. exnisset: quod quum intrus iam delatfecat, matricem substantia- 30 est factum instrumentum femini recipiendo, ac retinendo, factus præterea alendo, ac perficien- do, aptissimū. Stratum autem & testiculor forma- na erat habitaria minores, imperfectiorq. ac sperma in ipsis, rum parcius, tum frigidius, humi- diusq. Sequuntur enim hæc quoq. necessarii cal- oris penuria. Non igitur semen cuiusmodi, gene- 35 rando animalis satis esse poterat, licet in eam rem fuerit & ipsum vtile. Mas verò quantò est cali- diior, tantò ipsis testiculis exteriùt maiores. Pa- 40 men autè quod in ipsis gignitur, quum sit sum- me coctum, principium effectiuium est anima- lia. Ex vno itaq. principio, ab opifice sapienter invento, iuxta quod femina mare fuit imper- fectior, nata sunt omnia, quæ ad animalis ge- 45 nerationem pertinent: rum quod mulieres par- 50

Stallitri pan-  
in pedes, vi-  
rib. esse femi-  
les, uti quid  
fuit murela.  
Talporum oc-  
imbricatum:  
perfectib.

Nature anima-  
lium varie,  
Arenula em-  
nam improp-  
chama, et

Ratidit fide  
hamas, per de-  
minu nihil a-  
nimalis mortu-  
le est effusum.  
Genitalia femi-  
næ fuisse  
intumescunt,  
quæ in vtero  
fuit imbecilla-  
te caloris fuit  
propulsi  
hæc, quæ  
poterant.

Frigiditatis fu-  
micea valutas

Testiculi femi-  
nae et femi-  
næ quibus.

Testiculi ma-  
sculæ calidi-  
res femineis.  
Sæpe masculis  
esse principium  
effectiuium ani-  
malis.



*Pudendum virile quale. Semen virile quale.*

*Sem quod imperfectum videtur, si fecerit, ut quod perfectum, masculin.*

*Semen verumque necessarium esse ad fecunditatem. Ovis, abstrata non animalia excludendo inspicit.*

*Animalia ab his que communio maris, una generantur.*

*Mul ab his, ut concipi a muliere non possit. Semen masculini esse motus principium. Vena cava.*

*Ren sinister de arteria inferior. Vasa emulgentia.*

*Spermatica vasa dextra, arteria magna dextra vena & arteria, tam aut ab emulgentibus dextra. Spermatica vasa sinistra, i. sinistra arteria emulgentibus.*

*Testiculum sinistrum in vena, & matricem sinistram in sanguine impurum, utrumque sanguinem.*

*Partes matricis dextrae sunt calidiores sinistram.*

res intus reconditæ sint, quatenus dictum est tum quod virile pudendum, extra oblongum promineat, ad venerem, atq; ad sem en excernendum aptissimum, quodq; semen ipsum virile sit multum, & crassum & calidum. Quod quidem non alia quadam ratione ad maris, alia ad feminæ procreationem modetur (sic enim principium animalis non esset simplex, si motus omnino repugnantes haberet) verum quod imperfectus quidem movetur semen, sit femina: quod perfectus autem, masculus. Ipsum autem motum perfectum aut imperfectum, inæqualitatem quæ in calido & frigido est, iure tribuere, ad quod vnum principium, particulares omnes revocabat actiones. Iam ipsum semineum semen gignere per se factum non potest, sed maris semen omni no flagitat, cum quo oportet misceretur, ita ut vtrumque semen in vnum motum conspiret. Nam tamen gallinæ circa gallinæ operam, ova sub ventanea concipiant, ex illis tamen animalia excludere nequeunt: quandoquidem ut ea perfecterentur, masculi caliditatem desiderabant. Sed eo id quod in gressibus animalibus vnumquodque continere. Solum nam quod animalis est genus temperatura covig siccum, ut humoris frigidi redundantiam in semineo semine quadatenus possit absumere, id factum eius modi, qualis in gallinis sunt ea ova, sine mare potest efficere. At mulierem nemo vnumquodque sine viro vel molam, vel eiusmodi quippiam coconceptisse. Quamobrem satis fuerit maris semen motus principium exstimare: feminæ vero, ad animalis generationem aliquid etiam ipsi conferre. Porro vena cava, quæ primum ad huc ex hepate emergens, sublimis ad spinam deflectitur, dextrum habet renem, ad dextram sibi adiacentem: tum deinceps paulo infra ad lævam, sinistram. Prodegit autem ex ipsa vena venosum maximum in vtriq; renem, sicut & arteriosum, ex maxima arteria que dorso incumbit. Quoniam verò genitalia organa his vasis subsident, hinc iugis venarum & arteriarum ad ea proficisci erant occellio. Quocirca vasorum quæ ad ipsa fecerunt, quæ ad dextram quidem matricem atq; ipsius testiculum progrediuntur, a magis ipsis vasis, quæ sunt ad spinam, proficiscuntur, vena quidem a cava vena, arteria autem ab arteria magna: etsi raro à vasis quæ in dextrum procedunt renem, oriatur, ubi dexter ren sinistro propinquus fuerit. Quæ verò ad sinistrum testiculum in masculis, aut ad matricem sinistram in feminis tendunt (sunt autem hæc etiam duo, arteria scilicet vna, atq; alia vena) non amplius a magis vasis, sed ab eis quæ in renes feruntur, emergunt. Ex quo intelligi potest, testiculum sinistrum in masculis, & matricem sinistram in feminis, sanguinem impurum adhuc, & excrementosum, humidum, ac ferolum recipere. Quæ ex accedit, ut ipsa quoque recipiant in instrumentum, temperamentum habeant diversum. Quemadmodum enim sanguis purus excrementosus est calidior, ita & partes dextre quæ ex ipso nutriuntur, sinistris sunt calidiores: id quod principio ena erant, vel ratioe n hac, quod secundum hepatis rectitudinem locarentur. Quod quid si verum

est ac præterea masculus est calidior femina, probabile vti que fuerit, partes quidem dextras masculorum: sinistras autem, feminarum esse generatrices. Eodem pertinet & quæ ab Hippocrate dicta sunt: Si dexter quidem testiculus attollatur, hoc est, si valentior sit, masculum gignet: sin vero sinistrem, feminam. Cæterum pars aliqua dicitur fortior aut imbecillior altera, blunders: vno quidem modo, simpliciter: atq; ita concipere, arteriæ venis, nervi caribus, ac denique omnia dextra sinistram in omni animalium genere sunt fortiora: alio autem, secundum humani individui constitutionem. Leoni siquidem potest esse sinistrem testiculum fortior, si præcipue in prima compactione, dextro aliquis affectus acciderit: quomodo nimirum quælibet pars, morbida magis atq; imbecillior in omnem vitam reddetur, si quod vinum vel exiguum, in prima cõformatione contraxerit. Cuius vitii culpa, tum in primo maris cum femina coitum intempestivum, tum in grauidæ vitus rationem sequentem, est referenda. Quum igitur duplex sit masculorum generationis principium, in feminis quidem dextra matris, in masculis verò dexter testiculus consentaneum est masculum in dextra matrice, femina in sinistra maiori ex parte inventi. Fieri tamen potest, licet rareretur, ut sinistram matris calore feminis victa, pro femina masculum in seipsa gigni permittat. Quemadmodum contingit etiam interdum, ut semen quod feminæ erat generaturum, caliditatem à dextra matrice factum efficiat masculum: contra, quod masculum erat geniturum, à sinistra refrigeratum, in contrarium mutetur. Ipsorum autem fecundum causam, ex utroque principium venarum, matricis ipsas nutritivum, ac mammæ cum eis colligantur. Sola enim hæc instrumenta per vasa cõiugis expediebant, ut quando in matricibus augeretur factus, atq; conformaretur, illi soli venæ communes, ex vtriq; partibus alimentum affunderent: quando verò in lucem editus esset, mammis rursus totum alimentum surreperet. Quæ causa est, cur eodẽ tempore menstrua belle procedere nequeant, & femina ipsa lactare. Porro ante coconceptum in muliere ex parte florente, quicquid sanguinis superflui colligitur, natura singulari mensibus per venas ad uterum pertinentis excernit. Quum autem iam conceperit, ex eisdem vasis factus trahit alimentum copiosum. Quod verò reliquum est, ad pectoris regionem suggeritur. Itaq; merito dixit Hippocrates, hæc germanum esse sanguinem menstruum. Cæterum qui factus imbecillior effectus, sufficiens alimentum non trahit, ante tempus lacte intumescit vbera: gracilescunt autem, quum matricis alimentum penuria laborant: quam constitutionem abortus sequitur. Iam verò non ob id tantum, quod dextro voluerit genitalibus quidem voluptate maximam esse cum viro venero: coniunctam, siorentibus aut in infans quandã atq; immensam venæ cupiditate ingentiam, protinus voluptas atq; cupiditas animalibus accesserit: sed ex materia atq; instrumentis ad ea ipsa cõparatis, vtriq; affectu exoritur. Si quidem arteriæ & venæ prædicte, quæ ad partes genitales feruntur, matricem

*Dextra potior, masculis sinistram, feminarum esse generatrices.*

*Fortius vnum alteri, lesari debet.*

*Principium generationis masculi potior duplex.*

*Vena cava matricem nutrit, nam colligitur, semine genitæ confert illa.*

*Lactans femina, mensis potest non fieri.*

*Menstrua coacta.*

*Lat germanum esse sanguinem menstruum.*

*Abortus quoniam constitutionem implet. Venæ voluptatis, appetitus, causam, in materia & instrumentis consistit.*



cum quod ipsudum prætervehuntur: laterales vero ipsudum paribus postea inveſcere, in duo diſiſcantur. Tum autem pars alia illuc à lateribus ad ſemina teſtes ſecedat, qui & ipſi ma-  
tribus adiacent. Altera vero in fundū progredi-  
tur, multipliciter tota in ipſum diſtribuitur. Com-  
mittuntur autem hic fines vaſorum, quæ in ſinu-  
atū ſinū matricis cauſa ſunt, cum ſinibus eorū,  
quæ in dextrum euſdem ſinum ſunt diſtributa.  
Quo ſit vt dextra eiuſdem matricis affluat ſeruaſam  
humiditatem, quamvis exigua. Si quidem ad  
ſolūm augeat in ſiniſtris partibus frigiditatem ea  
ipſa humiditas, ſed etiam cum ſpiritu iuſta, ubi  
incaleſcit, atque evacuari poſſitat, acrimonia &  
mordacitate ſua, omnium maxime poſſet partes  
ipſas excitare ad agendum, voluptatemq; incre-  
dibilem interim dum agunt, præbere, acium  
humorum exemplo, qui deſectentes ſub cuney  
maximum etiam pruritum inferunt, ac ſuo mo-  
tu voluptatem non exigua inducunt. Sane au-  
tem generales particule longè, quàm cunæ ipſa,  
ſenſibiliores, ac proinde maiori voluptate affi-  
ciuntur. Semen igitur (cuius humiditas craſſa,  
viſcoſa, ſpumofa, ac vitali ſpiritu plena emittit)  
quando in propriū locum inſident, principium  
ſit animalis generationis. Quum autem in alie-  
rium, excutatur & contabefcat: nimirum expiran-  
te quidem repente ſpiritu, conſidente autem hu-  
miditate viſcoſa. Cauſa generationis ſeminei  
ſeminiſ, eſt huiuſmodi. Ex iſis vaſis quæ ad ma-  
trices accedunt, pars illa quæ ſertur deorſum,  
involuitur, modo perſimili iſis vaſis, quæ in teſti-  
culos maſculorum perveniūt. Itaq; ſuperiacens  
quidem vena, ſubiacens autem arteria, vtraq; in-  
flexus numeroſos atque æquales torquent: in  
quibus plexibus ſanguis & ſpiritus qui ad teſtes  
deſcendunt, diſtinctiſſimè cōcoquantur. Teſtes ve-  
rò quī ſint laxi, cauemofiq; , excipientes humo-  
rem qui in vaſis cæptus erat concoqui, rariſ-  
ſimum & ipſi percoquunt: perfectiſſimum autem ad ſec-  
tus procreationem, viriles teſtes, maiores & cali-  
diores quum ſint, geniturūq; magis elabora-  
tam excipiunt: imperfectiſſi autem muliebreſ,  
vtpote minores, & frigidiores, excipientesq; hu-  
morem non viſqueſcentem concoctū. Quum igitur  
omnes particule alimentum ſibi ipſis aſſimilent,  
mirum eſſe non debet, ſi tunica vaſorum albe  
exiſtentes, ſanguinem in formam ſibiſpū ſimilem,  
propter longam moram, immutent. Quum  
autem marem quidem ſemen foras etiaculari, ſe-  
minam verò in leiſſam, oportere: ob eam cauſam  
& vaſa quæ ad teſtibus ſemen excipient, in  
maribus quidem ad pendendum exporrecit na-  
tura, & ad meatū per quem etiam lonum emitti-  
tur, oriſicio adaptat: in ſeminis autem tum in  
ipſas matrices inſeruit, tum conſtituit, vt in ca-  
pitulum internam ſemen excernerent. Ad hæc e-  
tiam, virile vas ſpermaticū, latum ac longum exi-  
ſtens, quum iam prope pendendum acceſſerit,  
contrahit veluti quosdam ſinus: at muliebre, ſi-  
mul eſt anguſtum ac breue, quodd nec multū, nec  
craſſum ſemen deduciturum, vt illud, eſſet. Ad  
excernenda ea quæ conueniunt in vaſis, ipſa par-  
tium genitalium veluti conuulſio quædam, quæ  
in coitu venereo accidit, haud exiguum habet

momentum. Nam quod in morbo comitiali, &  
gonorrhæa, contrahantur vaſa teſticularia, ob  
id etiam coguntur ſemen ipſum exprimere. Iam  
verò muliebre ſemen, præterquam quod cou-  
fert animalis generationi, etiam ad voluptatem  
in coitu excitandam conduct. Eſt autem virile  
ſemen membranatum atque vaſorum omnium  
origo. Ipſum quippe ſtatim concoquitur, atq;  
iniſto ex muliebre nutritur ſemine, tanq; id nati-  
ra ſit familiare magis quàm ſanguis. Quicquid  
enim nutritur, à ſimilibus augeri facilius poſſet.  
Porro qui humor in illis corporibus glandulo-  
ſis gignitur, quæ vtraq; parte colla velice locata  
ſunt, uſ in meatum vtriuſque inſunditur: atq; in  
maſculis quidem, vnā cum ſemine in matrice  
deſabitur: in ſeminis autem, & foras, & in mulie-  
bre pendendum erumpit. Vtilitates autem eius  
in ſexu vtrouque ſunt, quod ad venerem excitet,  
in coituque deſectet, ac denique meatum vtriuſque  
in maiore ſuo perfundat, habilioremq; ad ve-  
næ tranſiſum reddat. Cum ſumma virtute  
etiam ipſi ſpadoſes voluptate inter cōeundum  
fruuntur. Eſt autem tunc ſeminiſ, quum ve-  
hementer oblectantur in coitu. Quo tempore  
qui concumbunt, circa pendendum ſibi eum cō-  
ſuetudine percipiunt. In maſculis autem propria  
& præcipua eius vtilitas eſt, quatinus ſeminiſ exiſtit  
in ſeminis. Sunt enim inter leſpecie ſimilima, mu-  
liebre ſemen, & humor qui glanduloſis marium  
corporibus inſeſt: quum & robur & calor ma-  
ſculorum, detentum in iſis paribus humorē ita  
concoquat, vt nihil ei ad ſeminarum ſemen de-  
ſit. Vnde & meatus qui ex iſis corporibus proſi-  
ciſcuntur, non dubitant nonnulli vaſa ſperma-  
tica nuncupare, & aſites glanduloſos: ſicvti &  
varicoſos aſites, eos quia teſticularis explanan-  
tur. At in ſeminis ille humor, tenuis atq; crudus  
exiſtit, ineptuſq; ad gignendum. Verum enim ve-  
rū quē ſemen matricibus ſit ſuccus familiaris iſi-  
mus (cuius recipiendi gratia exiterunt) diſtinctiſ-  
ſimè duplex habeatur, ad virile trahendum, ma-  
tricis collum eſt deſtinatum: quidem autem ad  
propriū trahendum teſticularis, comparata ipſa  
coma ſuerunt: quæ propterea ſurſum ad illa  
ſpectant, paulatimq; arcuata deſcendunt in anguſtiſ-  
ſimos ſines, teſticularis qui eſt directo ſunt, coniu-  
cta. Quod autem eo pertingit vas, marium ſperma-  
ticis vaſis quadam proportionē reſpondet.  
Cui inſunt etiā & muſculofa corpora, quæ ad  
teſticularis ipſos deſcendunt, qualia in maſculis à  
muſculis hypogaſtri oriuntur. Quī aut vtrū-  
culos, ſic vaſa ſpermatia, in maribus oportere  
eſſe maiora, ac teſtes ipſi utriusq; pendendi radici  
adhærent, longum quendam viæ circuitum i-  
pſis vaſis excogitauit natura: ea primò duces ſur-  
ſum ad diſtantiſſimum autem per interna deducens,  
ad eum viſq; locum vnde pendendum enaſcitur,  
vbi ſemen erant eructatūra. Quo loco multa ſe-  
xibus ea controuerſans, varicoſiq; efficiens, plu-  
rimūq; amplificans atq; dilatans vndiq;, pro-  
uentu ſeminiſ ſic præparauit quamplurima re-  
ceptacula. At ſeminarum teſticularis, quum parui  
penitus exiſtentes, vaſa etiam exigua productiu-  
na ſunt, loco, quæ nunc poſident, opportundiſ-  
ſimo ſunt locati: vtraq; quidem maris parte po-

*Testium ſemi-  
nentium ſitus.*

*Proſtam humi-  
ditatem qua in  
matricem con-  
fluat, vbi inca-  
lescit, partes  
excitare ad ag-  
gendum, volu-  
ptatemq; maxi-  
mam concitare.*

*Semen ſub-  
ſtantia.*

*Semen ſemi-  
nū quo poſſe  
generare.*

*Teſtes viriles,  
quum vnde-  
bunt, car ſemina  
exaltum con-  
coquant.*

*Partes omnes  
alimentum ſi-  
biſpū aſſimi-  
lant.*

*Semen cur can-  
didum.*

*Semina in ſei-  
ſſam etiaculari  
per ſemina.*

*Diſtantiſſimū ex-  
plicitum ad ſe-  
ſſum ſeminiſ  
plantam.*

*Cōuulſio or-  
ganorum ſperma-  
ticorum ad ſemi-  
nentem conuulſi-  
onem.*

*Semen virile eſt  
membranatum  
& vaſorum om-  
nium origo.  
Semen virile à  
muliebre eſt.*

*Humor ſeminiſ  
in glanduloſis  
corporibus, vtrius-  
que colla velice,  
vnde.*

*Spadoſes inter  
cōeundum qua  
ratione volu-  
ptate fruuntur.*

*Aſites glandu-  
loſi.  
Aſites vari-  
ciſi.*

*Semen eſt ſuc-  
cus maris ſa-  
miliaris iſi-  
mus.*

*Collū matricis  
Cōuulſum ma-  
tricis vnde, &  
ſemina.*

*Spermaticū  
vaſum ſeminiſ  
& progreſſum  
in maioria.*

*Teſticularis ſa-  
miliaris po-  
ſſus.*

Meatus à pri-  
mario descendit  
in vasa.

Meatus à pri-  
mario descendit  
in vasa.

Vesicae fusi.

Meatus locu-  
m inter vesicā  
et intestinum  
rectum.

Genitalia ner-  
vi, vasa, arte-  
riae, quales.  
Vasorum in te-  
stis implantatio-  
nes.

Scipi in nervo  
distributa du-  
tri.

Nervi paucissi-  
mi fuisse opus  
matricibus, et  
paribus, quae ad  
marium infu-  
culos pertinet.

Virga virilis, et  
cuius materiam  
cur plura ner-  
vi infertantur.  
Matrix autem  
unica in vasa ci-  
lit.

Intestini autem  
duplex tunica  
est.

Vesicae utriusque  
tunica tunica  
est data.  
Matrix tunica  
autem infert  
omnes grana fi-  
brarum.

Matrixe conu-  
muni ad vici-  
na corpora.

liti: paulo autem supra cornua, abducti. Preterea quo meatu descendente à peritonæo, veluti fistula quadam, nutritia viriles testica vasa deduxit natura, eodē est ad spermaticū vasū ascensum abvsa, communem tribus vasorū generibus securitatem, vnum lumen meatum in viciis. Illic autem rursus deducens, coarctandū quidem ostibus, illic testibus pubis verō, ex anterioribus: ostē denique lato, ex posterioribus, ipsū muni ut. Ceterum vesica prima pubis ostibus subiacet. Post hanc autem, sunt matricēs in feminis. Post matricēs intestinum rectum, tanquam subinterticulum molle. Quum autem masculorū vasa spermatica, tendi contrahiūque magis quā femininarum in ipso conuō portare, ob id ea etiam robustiori tunica constant. Porro ad genitalia particularia, nervi quidem mediocres, venae verō & arteriae maximae, duplicē, feruntur. Siquidem alterum iugum earum, ex locis propinquis testibus in testiculos & matricēs fundum (ut diximus) proficiunt: alterum autem ex vasis, quae sunt ad os sacrum, seu iunctum, infernis partibus infertantur, ubi primum in feminis quidem matricēs collum, in masculis autem virga, exoritur. Quandoquidē ex hac copula, inferiores illae partes nutriuntur. Sed nervorum etiam iugum quoddā medio cre, ab illa osis magni regione, simul cum vasis ipsis natura ad partes eisdē deduxit. Quum enim tres sint scopi in nervis partibus singulis distribuendis: sensus quidē in instrumentis sensibus in motibus, in motoribus: dignon omnis doloris in reliquis omnibus: matricibus quidem totis, & paribus quae ad maris testiculos pertinet, paucissimis opus fuit nervis, qui in ipsas distribuuntur, ut quae neq; ad sensum exactiorem, neq; ad motum aliquē voluntarium infertant, nec sint inter extremos mearum. At virga maris, & collum matricis, ceteraq; quae ad pudendum spectant, quod sensum absolutiorem possunt, venerēorū rāpōne, mēro sanē sunt plures nervos in depra. Constat autem matrix vna duntaxat tunica, quod sanguine puro atq; benigno alatur, nec periculum sit, ne exvli, ceretur ab acerbis succis, quemadmodū ventriculus & intestina, quibus nimirum ob id est tunica duplex tributa. Quinetiam vesicę utriusque tunica est data, dura tamen & robustissima, & grēp; partibus, quum videlicet ea instrumenta, ad excipiendā tantū excrementa sint destinata. Verū genus omne fibrarum tunicae matricis est inditū, quod rectus quidem fibris ad sese trahere, transversis excernere, retinere autē simul omnibus possit. Quae verō membrana intersecula circumdata est matrici, vtriusque illius finis in idem iungit. Alligantur autē matricēs corporib; circumiacentibus per quendam ligamentā ita soluta & laxa, ut tensioni quidem ipsarū & concidentiae facili cedant & obsequantur, eas tamen minime avelli aut derubari permittant. Iam verō quum collum quidem matricis, deorsum in pudendum inclinēt, reliquā totā capacitātē in ventre esse sitam oportuit. Quia autem laxi admodum testes & carnosī & molles, cum spermatica vasis, densis, duris, & fortibus, coalescere natū non poterant, ob id natura, non in ipsos tes-

tes, sed in vocatam *testiculi pedicula*, mediam ambo-  
rum, spermaticū vas infertunt. Epididymides  
tamen in formatarū testiculis maximē sunt ob-  
scure; quia & testiculū earum, & etiam vasa sper-  
matica, admodum sunt exigua; subitanter quo-  
rum inter se nō magno distans & distans. Por-  
rō marium testes humidiores sunt ac molliores  
femininarum testibus, & vasa spermatica duriora.

Epididymides.

Testes marium  
humidiores  
sunt ac molli-  
res femininarum.

## GAL. DE VSV PARTIVM LIB. XV.

Quum igitur duo facere animalia quae  
creatur, esset melius, quā vnum, pul-  
chre mea quidem sententia, ipsarum par-  
ticularum alias quidem ad recipiendum, alias  
autem ad excernendū semen, natura fecit accom-  
modatas: quarum nulla aut perfectius consti-  
tuta; aut melius vquam locari potuit. Ipsius au-  
tem transmutatio tam subita, quā pudentū  
virile in cōtrarias dispositiones mutatur, quum  
venae in causa esse non possent (sanguinis enim  
substantia nō potuisset tam celeriter aut seple-  
re, aut vacuari, sed ac vel ipsius) nec arteriae  
etiam, ob perpetuam illam dilatationis & con-  
cidentiae necessitatem: nec nervi qui à cerebro  
aut spinali medulla oriuntur (nullam enim ha-  
bent causam conspicuam, nec distanti aut  
contrahi naturaliter possunt) nec denique liga-  
menta, aut tendones, aut carnes, aut ossa, aut  
cartilagineas: necessarium vique fuit illud cor-  
pus nervosum, quod à pubis ostibus nascitur,  
canum simul & omni vacuum humore (id quod  
ceteris ligamentis nō congit) ut vicissim aut  
intumesceret, nam mole deprimetur. Quo pa-  
tē autem id corpus talem constructionē susce-  
ptum, si nimis anxie cōtraheris, convinceris qui-  
dem non intelligere, neq; tuam imbecillitatem,  
nec tui facultatem creatoris. Oportuit autem ip-  
sum ex mediis superiorib; osium, quae in pu-  
be sunt, partibus, exoriri. Nam sic plurimum ab  
ano erit ipsum pudendum distans, ad contriungē  
locum opportuniorem habebit. Etenim quan-  
documque pars aliqua caret coniuge, maiori ex  
parte positiōne mediam requirit. Vbi verō dua-  
rum partium coniugium adest, utraque pars ex-  
quālibet vult à media recedere. Porro non so-  
lum ipsius coitus causa, per venem oportet ef-  
fē exactē sensum pudendū, sed etiam quod meatu  
diductio ac directio, semen evibretur longissime.  
Siquidem si concideret aut fleteretur ipse me-  
atus, haerere semē. Quam ob rem quibus ob vin-  
culum quod ad virgē glandem habetur, meatus  
contortus est, nō generare non possunt. Faci-  
endum autem reddendum, vinculo abissio. Ceterū  
extenditur penis, atq; in tuniorem amollitur,  
dum spiritu nervus ille canis repletur. Iam  
verō in partibus pudendū inferioribus, feminis  
meatus secundū longitudinē exporrectus, me-  
dius est constitutus. Incubat autem huic nervus  
causus. Vtrāque verō horum partium, masculi duo,  
quod meatus ceu à manibus quibuscūq; in vtran-  
que partem distrahatur, quāmaximē dilatetur,  
toto pudendo stabili permanente. At quum ve-  
fica etiam propē constituta esset, non erat opus  
ad ex-

Meatus à pri-  
mario descendit  
in vasa.

Meatus locu-  
m inter vesicā  
et intestinum  
rectum.

Genitalia ner-  
vi, vasa, arte-  
riae, quales.  
Vasorum in te-  
stis implantatio-  
nes.

Nervi nō infu-  
erantur, sed  
percan.

Excellens, de-  
prescens, ga-  
dendi velle  
necessaria sed  
se querebant  
illius nervi  
corpora, quod  
pubis osium  
nascitur.

Coniuge car-  
tem partem  
requirit pos-  
tione modis.

Testis pudendi  
causa.

Generare qui  
nascantur.

Penis quando  
intendatur.

Seminaris  
meatus positi-  
o, pudendo vero  
non canis.

Pudendo meatus  
liber.

Collis vesicæ  
positus.

Pudendi mulier  
hæc positus.

Pudici viri  
que epiphyse  
omnis cratis cō  
structa.

Nympha.

Aquina mem  
brana.

Pericrinialis  
membrana.

Strandum  
osum.

Vasa que in  
tra matricem  
sunt aliud ge  
nerantur.

Venam præter  
gressam vmbili  
cam in sinu he  
patis inferantur.  
Arteriam præ  
tergressam vmbi  
licam in lumbos  
inferantur.

ad excernendum lotiū alium meatum cōstruere,  
sed semini vti meatu. Quare mentō collis vesicæ  
totum peritonæum occupat, vtpote sursum ab  
ano (cui incubabat primò) vsq; ad pudendi exor  
tum se extendens. In mulieribus autem, pudendū  
quidem ipsum ano incumbit: in finem autem eius  
superiorem, collum vesicæ desinit, vnde  
locum profunditur. Quod verò ad cutis epis  
phytes, quæ sunt in finibus vtriusque pudendi,  
pertinet, in mulieribus quidem tum ornamenti  
gratia extiterunt, tum ne matricem refrigeraren  
tur: viris autem, præterquam quod ornamenti  
adferunt, carere ipsi omnino iis non poterant.  
Cuiusmodi autem plaryngi vas est propugnacu  
lum, tale est matricibus, quam nympham ap  
pellant. Artusque desinens in vtero, tenuis  
quædam membrana, quam agniti vocant, vadi  
q; est circumiecta, ipsius veluti sudorem exci  
piens. Huic autē extrinsecus alia tenuior incum  
bit, fasciminialis dicta, ad vesicæ vsq; factus per  
rursus, quæ vsq; ad horum partus in leipa lotium  
illius colligit. His rursus in orbem chorion, hoc  
est, secundæ, sunt circumfusa, matricē totam in  
trinsecus subvingentes, vt per eas matris factus  
matrici auneatur. In singulis porro officijs va  
sorum, quæ intrinsecus ad matricem pertinent,  
(per quæ etiam sanguia menstrua in ipsam dese  
rebat) quo tēpore vtero geritur, aliud vas gi  
gnitur, arteria quidem in arterie, vena verò in  
venæ officio: vt sint ea quæ generantur, nume  
ro æqualia iis officijs, quæ intro in matricē desi  
nunt. Colligat autem ea inter se tenuis quidam,  
sed fortis membrana, quæ extrinsecus vasīs o  
mnibus circumhæret, partibus verò matricis in  
terna infertur. Exiguū sanē est illorum vasōrū  
quodque, quam primā in matrice exoriuntur,  
cuiusmodi sunt arboris radices extreme, in ter  
ram defixæ. Earum progressū paululum, per  
coniugationem coalescunt, ex duobusq; vnum  
procreatur, rursusq; illorum singula cum singu  
la eiusdem generis cōeunt, siquid perpetuū, do  
nec paria omnia in duo magna coalescant, quæ  
veluti stipites quidam, facti per vmbilicū inter  
tantur. Quatuor itaq; omnino sunt iam hæc va  
sa, dux scilicet arterie, & vesicæ tondē, nullis di  
uersi generis inter se cōmixtis, sed venis semper  
cum venis, arteriis cum arteriis in idem cōeuntibus.  
Quod autē venæ ipsæ vmbilicū prætergressæ,  
in partes hepatis finas, arteriæ verò in partem  
arteriæ magnæ, quæ ad lumbos est, inferantur,  
quomodo non fit dignum admiratione? Siqui  
dem venas videre est, statim vt vmbilicū super  
runt, inter se se mutuo coire, vniq; effici, quæ pos  
tea membranis foribus cōveluta, vicinisq; cot  
poribus colligata, recti ad viscūs vsq; progredi  
tur. Opotebat enim ipsam prius ad venarū prin  
cipium in fetu accedere, postea illuc in omnes  
partes distribui. Arterias autem expediebat & ip  
sas sanē in arteriarum principium, sinistram vi  
delicet cordis ventriculū inferi. Verum quam  
hic ventriculū & loca vmbilici sit dissimilia quam  
longissimè, nō erat tutum eas veluti pendentes,  
tanto itinere sursum ducere. Quare gratia maio  
ris securitatis, primò quidem ad propinquā ve  
sicam produxit illas: dein verò per totam ipsam

(cui vinculis alligantur) rursū ad magnam vs  
que arteriam, quæ à corde fuit exorta, deduxit.  
Quatuor itaq; sunt prædicta in vmbilico vasa,  
dux scilicet arterie, & tondem venæ, in medio  
sunt habentes hanc, hoc est, vrinarium meatum,  
qui ex fundo vesicæ exoritur, lotium in fascimi  
nali membrana derivat. Ceterum super  
rioribus ipsius meatus partibus, venæ: inferio  
ribus arterie adhaerescunt. Per quæ vasa, veluti  
per truncos quosdā, ex matrice trahit factus san  
guinem & spiritū. Inter hæc verò omnia, & vasa  
illa exigua, quæ in matricem seruntur, media est  
quædam seu trunci radicatio, quam chorion ap  
pellant, existēs pro digiōsa multitudo vasorum,  
quæ à membrana tenui quidem, sed forti & du  
plici, amittuntur, connectantur, & colligantur.  
Est autem vtilitas minimè cōtemnenda illius lu  
moris, qui intra amiculum, hoc est, agnitā con  
tinetur membrana. Fortia siquidem in eo qua  
si innatans, sursum tollitur ac velutur, vt minus  
sit grauis iis vinculis, per quæ matrici cohaere  
scit. Ad hæc etiam cum partus initiat, eo humore  
perfusis, facilis collo matricis elabitur. Veran  
tamen si acerbata, quæ sunt ad matricem perue  
nientium officia vasorum, mucore referta fu  
erint, nequeunt totum gestare. At verò vt matrici  
capacitas tota facti cederet, ipsique grauida  
ponderē premeretur minus, atq; in partu etiam  
facile rumpetur, iure natura membranas om  
nes, quæ ad factum spectant, efficiendo perfo  
rantes, ex mutua inter se connexionē securitatem  
eis comparavit. Quam autem fiat excreto vrin  
æ, dum vesicæ motu naturali circum humores  
quos in seipsa continet, vndique tota contrahit  
ur: addit verò infansulo delitescens in vtero ad  
ipsum collum vesicæ vrinarius meatus: quid po  
test in causa esse, cur per eum nihil loti redda  
tur, sed totum sursum ad vrinaculum dictum a  
scendat? In causa certe sunt, tam latitudo vrina  
culi, multis numeris maior ea quæ collo inest  
tum rectitudo maxima eiusdem, quæ ad educa  
dam vrinā, colli obliquitate est præstantior. Tac  
eo nullum musculū esse extrinsecus vrinaculo  
appositum, qui effluxum excrementorum prohi  
beat, cuiusmodi reperitur ad collum vesicæ. At  
verò maiori mensura, quam pro aliarum par  
tium portione, hepar in primo conformationis  
tempore excedit: excedit etiam non mediocri  
ter vsq; ad partum. Secundum ipsum, cerebrum,  
& cor, excellunt magis quam pro aliarum ratio  
ne particularum. Causa autem eius rei est, quod  
hepar quidem venarum principij existit. Quia  
igitur factus dum formatur, atq; augescit in vte  
ro, magis eo vsu indiget, quem venæ præstant  
(vt qui diuissimè plantarū more regantur) prin  
cipium harum mox à prima generatione natura  
robustissimum fecit. Cerebro quippe & cordi,  
& instrumenta quæ ab illis emergunt, vtilitas  
quæ à venis proficiscitur, necessaria erat, quod  
ea sine sanguine, nec generari, nec augeri pos  
sint. Hepati verò ea venis, artenarum quidem ve  
nus erat exigua: nervorum autem nullus, ante  
quam absoluta essent. At cur pulmo in his qui ge  
runtur vtero, est tuber: nō ait vt in perfectis ani  
malibus, albicet? Quia tūc nutritur per vasa vni

Vmbilici vasa  
quatuor.  
Olym, &  
Vrinaculo v  
sa.

Chorion.

Flamini mu  
tatis in equi  
na membrana  
vsa.

Acetabula.

Vrina excreta  
que fit media.

Vrina facta  
car per vesicā  
collum non ex  
creatur.

Hepar est ve  
narum principiu.

Venarum vni  
formissimè au  
ferunt cerebrū  
& cordis principiu.

Hepati ea ve  
na nō fuisse vsq;  
quædam opus  
arteriam aut nec  
in prima ge  
neratione.  
Pulmo car in  
is qui gestan  
tur vtero, ad  
modo tuber fit.

cam tunica, & eam tenuem habentia, ad quæ quidem ex vena caua fluit sanguis: in nata vero, occiditur quidem vasorum referatio: ær autem copiosissimus tunc incidit, sanguisque parvisisimus, atque idem tenuissimus. Quinetiam pulmo tunc motu perpetuo agitur, animala nimirum tunc respirante. Quo fit ut sanguis à spiritu incisus, motuque agitur duplici, altero quem ex arteriis habet, altero quæ ex toto pulmone acquirit, tenuior adhuc seipso & mollior, ac veluti spu

*Venam cauam in scrobis in arteriam venam partem, atque hinc in magnam arteriam.*

mosus reddatur, pulmonisque carnè sibi similem reddat. In scrobis itaque vena caua est in arteriâ venosam pertusa. Quum autem id vas, nempe arteria venosa, venit officiû pulmoni præstaret, necessum fuit vas alterum in arteriæ vium accommodari: quocirca natura id quoque in magnam arteriam pertudit. Verum quum hic vasa aliquantulum inter se distarent, aliud tertiû vas exiguum, quod vtrunque coniungeret, efficit. In reliquis vero duobus, quum hæc quoque mutuo se contingerent, veluti foramen quoddam vtrig commune aperuit: tum membranam quandam in eo, inlata operculi, est machinata, quæ ad pulmonis vas facile resupinaretur, quod sanguis à vena caua impetu asilueni cederet quidem: prohiberet autem, ne sanguis rursus in venam cauam reverteretur. Quod foramen, quamprimum animatus est in lucem emissum, aut certe non multo post, coalescente membrana, conglutinetur. Pari modo id vas, quod magnam arteriam venit, quæ fertur ad pulmonem, connectitur, quum alie omnes animalia particularæ augcantur, non modo non augetur, verumetiam tenuius semper efficitur, adeo ut tempore procedente penitus tabescat, atque excidatur. Quod igitur hæc omnia natura asilabificat, declarat singulorum usus. In ventre autem facultatem qua talia efficiat, humani ingenij nõ est. Iam vero quod os matricis, quo tempore foemina in vtero gerit, adeo constructum sit, ut ne specilli quidem cuspidem in matricis collum immittere queas: quum tempus autem pariendi appent (nempe quum fetus iam ita perfectus est, ut possit per os nutrir) adeo aperitur & dilatur, ut integrum animal reddat: quoniam pacto id accidat, mirari quidem possumus, intelligere autem non item. Caput autem fetus in ipso paritu natura primû collo matricis indidit, tum per id alius ipsius partibus viam muniuit, intelligens nimirum contrarias huic alias pariendi formas longè periculosissimas esse. Exterum hoc omnem admirationem superat, quod natura animalia quæ in lucem eduntur, actiones omnium partium docuerit, facultatem quandam sapientie ipsa à sese doctam ingenierat, qua instructa, subit ad alimentum subspis familiare festinant. At homini recens aditum proprium alimentum est lac in mamillis contentum, ad quas suoapte conatu mouetur. Prodeuntur autem postea dentes infansulo, ne iam semper matri molestus sit. At quid denibus mandendi actio accedit, quæ & ipsa à nemine docta est, reliquæ deinceps actiones omnes sequuntur. Sed de musculis articuli scij mouentibus, pauca impræsentiarè dicamus. Natura solis hominibus inter pedes tria omnia, duorum crura tribuit, quæ essent ambulationis organa.

Simix verò quatuor, sed talia dedis, qualia adfunt infanti, nunc primû eis vi conatu. Etenim quatuor artubus, quæ drupedè instat, graditur: & præter ea anterioribus tanquam manibus vitur. At vbi homo increuit, non amplius anterioribus artubus, tanquam pedibus, vitur. Simia vero perpetuò inter vtrigq ambigit. Ad hæc, quos musculos nanum ridiculos ac decurtatos simia fortitur, eisdem homo habet sitos bellissimè, tum ad decus partium necessariorum, tum ne anus contundatur sedendo. Quû igitur articulum coxæ flecti quidem oporteret crure sublatò, extendi vero eodem depreffo, in usque actio eius præcipua constaret, musculos crus extendentes quæ flectentes, fecit natura tum maximò, tum plurimos: secundum illos, magnitudine ac numero, eos fecit qui crura circumagunt. Prima itaque musculorum differentia est triplex, quarum singule in alias duas diuiduntur. Nam flectentes, extendentes magnitudine & numero sunt minores: sicuti adducentes intro, foras abducenibus.

*Infantes quatuor artubus quadripedum similis graditur.*

*Simia grossa. Naturam musia hoc esse simia in diculis, & de cortatissimæ autem hinc constructas.*

*Musculos crurum extendentes ac flectentes, quæ flectentes ac adducenibus sunt & maxime.*

*Crurum actio triplex. Ambulatio, cursum, statum, quomodo sit.*

*Crura flexa extensio, quæ de extendens.*

*Musculi crurum extendentes.*

Potè quæ semur in orbem circumagunt, quodammodo sunt æquales. Est autem crurii actio, ambulatoria, cursus, & statio. Verum ambulatoria quidem & cursus, cruribus ipsis contrario inter se modo affertur: statio vero, inde habentibus, hoc est, fixis in terra perficitur. Flectitur autem crus ad inguen, quum ipsum attollimus: extenditur, quû id ad terram deprimimus. Summâ vero extensionem & statum vltimum habet, quum statera. Proinde natura fortibus, multis, ac magna musculis hanc actionem comisit. Primû quidem ei, qui totû articulum ex posterioribus partibus tegit. Põst autem illi, qui ipsum excipit, quicquid officium exortus, in altissimâ magni trochanteris partè inseritur. Tertiò ei, qui post hanc ab externis & inferioribus ossis alium emergens partibus, in primas internas magni trochanteris partes infigitur. Quartò præter hos ei, qui ab ossè loco profectus, inferitur omnibus posterioribus partibus, vsq ad summam, magno trochanteri. Sed primus omnium commemoratus, inclinabilem extensionem fortem efficit, dum semur duobus finibus sursum trahit. Nam si altero rannim agat, paululum deducet ad latera. Secundus extendit simul, & femoris caput intro retrahit. Reliquorû vtrig, sursum quem tendit paululum, sed alter quidem semur extè circumagat, alter autem intro paulò magis tendit, quum iursum. Alius præter hos est quintus musculus, omnium qui sunt in corpore, maximus, internis & posterioribus partibus vsque ad genu, toti ossi femoris circumhærens. Cuius musculi posteriores fibre, quæ à coxendice emanant, crus firmum stabiliunt, extendentes articulationem. Potè quæ prædictis quing musculis sunt oppositi, ipsamque articulationem flectunt, illis sunt inferiores, tum numero, tum magnitudine. Quorum superius est rectus, vnicuique tendone, ex duplici exorta, constato, in summam parui trochanteris inferitur. Sed qui cum eo in ipsum quoque trochanterem descendit, inferitur inferius. Musculus item alius, ex partibus anterioribus ossis pubis enatus, obliquus attenditur, similem actionem cum eo habens. Tum quartus, qui

*Facile etiam invenire, quæ natura sanguis efficitur, hominibus ingratum nõ esse.*

*Caput fetus in ipso paritu primû collo matricis indidit, tum per id alius ipsius partibus viam muniuit, intelligens nimirum contrarias huic alias pariendi formas longè periculosissimas esse. Assuetudo est in lucem, statim della actio, ut animalia particularia. Lac esse alimentum proprium hominibus rectis in lucem adit.*

*Alitern reliquæ quæ sunt in eam alitern post alitern modo danda.*

*Crura duo sunt hominibus danda, scilicet inter pedes omnia.*

*Musculus omnium maximus, qui non sit.*

qui articulationem quæ genu inest extendit per aponeurosin, quæ patellam genu supergreditur. Verum hic quidè per accidens femur flexit, vè potè mouende hñz grana productus: alij verò tres, prima actione. Qui verò intrò femur abducunt (sunt enim duo, à partibus ossis pubis anterioribus orti) nò modò crur intrus trahere, sed flexere etiam medio crure possunt. Cui etiam à flexione inferuit tertius alius prælongus musculus, qui productus ex pubis ossis anterioribus partibus, in caput internū genu inseratur. Quæ etiam actionè præstat, primi quem diximus musculi pars interna. Extensorum autè femur abducit, tum pars altera huius eiusdè musculi qui primus omnium fuit numeratus: tum etiam musculus ille, qui ab osse lato emergens, paululum circumagitur femur. Reliqui autem alij sunt duo musculi, qui femur mouent, vnius quidem ex internis, alter verò ab externis ossis pubis partibus ortus: qui ambo circa articulum coxæ obvolunt coalescunt. Atque hi omnium prædictorum musculorum soli, vterq; versus seipsum trahens, femur inverte, ac circumagitur. Nam quemadmodum ex superioribus quidem partibus oportet musculus in descendat, qui crur sursum trahat: eorum verò qui ad latera mouent, intrinsecus quidem exoriri est necesse eos qui intrò crur abducunt, extrinsecus autem qui foras: sic etiam qui musculi femur torquent & circumducunt, si in orbem conuoluantur est necessarium.

## GALENI PERGAMENI de vsv partium, lib. XVI

Quum satem cerebrum principij nervorum, cor arteriarum, ac deniq; hepatis venarum esset futurum, atq; hæc quidem instrumenta, æquissimè simul & rursus in singulas corporis partes distribuì oporteret, satis exiuiam aut natura, nec tot numero producere, quos ipse existunt particula: nec profus multa, sed vbi maximū vnum organum, seu truncū, ab vnoquoq; produxisset principio, tum demū ab eo progrediente, velv ramos quosdam disperire in partes propinquas, secundum dignitatè cuiusq; quemadmodum aquam porabiles, qui huius rei sunt periti, in totam vrbe distribuit. Merito igitur vena caua, quæ ex gibbis partibus hepatis sursum ac deorsum procedit, truncò bifido est similis, propterea quòd corporis nostris, alia quidem pars hepate est alior, alia verò humilior. Ad eundem modum arteriæ, quæ ex corde enascitur, carnes pronius imparibus sectionibus bifariam esse diuisam: altera maiore, quæ fertur deorsum, quòd ibi corpus sit maius: altera minore, atq; nobis corporis partibus distributa. Simile quippiam prædictis, à cerebro etij productur spinalis medulla, quæ partib. omnibus quæ sunt sub capite, nervos immitit. Nullus tamen nervus neq; in ossa, neq; in cartilagine, neq; in ligamētis, neq; in quavis glandula, quare duplex natura exiit, inferius: quandoquidem supervacaneū erat illis motum voluntarium, aut sensum tribuere. Nec verò adepa, quo-

que villa in re nervos desiderat, quæ ex parte pinguiore sanguinis per tenues venas affusa, partibus animantis membranosis, tenuibus atq; siccis, instat olei pinguis, adhaeret, & vti eas videlicet per diuturnas inedas, excrucietur vechementes, atque calores improbos, ocysimè effleat, nana sua purgitudine lumet. Glandulæ verò, quæ sunt velv stabilimentū diuisionis vasorum, nullis sanè ad id nervis indigent, quum nec sensum, nec motum voluntarium ad id desiderant. Quæ autem ad succos animantis viles fuerunt comparatæ, quemadmodum venas & arterias nouumquam perspicuas, ita & nervos habuerunt, vnius sensus grana. Siquidem ad voluntarium motum obeundum, natura in animalibus vniū genus instrumentorū construxit, quos musculos vocant. Proinde quamquam nervi omnes motū habent & sensum, nulla tamen pars alia, quæ nervos recipit, motu voluntario est prædata, sed sentit diutaxat: ut cati, membræ, maxillæ, arteria, vena, intestina, matris, vesica, ventriculus, ac viscera omnia, & glandularum species altera. Quid verò & sensuum organa, nervos ad sensum flagitabant, quid opus est commemorare? Ceterum quibus sensu exactior erat opus, iis nervos molles natura tribuit: viliis quæ motum voluntarium possidebant, duros omnes: quibus autem vtriusq; actione erat opus, nervorum genus vtriusq; inferuit: ad sensum quidem, nervi qui pateretur facilius, accommodant: ad motum autem, qui valentius ageret. At nervus mollis semper in ipsa sensoria inferuit: durus autem, in musculos qui ea mouent. Porro inest mollis nervus ventriculo, hepati, intestinis omnibus, ac visceribus, quemadmodum & ex ossibus omnibus, solis dentibus, tum quòd hi, iis quæ sibi occurrūt, nudi sunt expostum, tum q; ipsos vni cum lingua sentire oportet: sapores atq; diiudicare, nò alter quàm ceteras omnes particulas. At verò in cutem ipsam à subiectis partibus hñz quædam nervorū perveniunt, quæ simul ipsam cum subditis corporibus colligant, simul etiam ei sentendi facultatè suppeditant. Soli autem oculi, propter vilitatè dignitatem, maiores & molliores, quàm vlla alia pars, sunt nervos fortiti, q; videlicet eorū sensus sit aliorum omnium certissimus. Quum igitur sensus quidem in panendo sit: motus aut quò nervi & musculi mouent, in agendo: optimo sanè in re ipsi quidem primo videnti instrumento in oculo nervus mollis, mouentibus verò ipsum musculus, durus inferuit est. Ad eundem modum & lingux ipsi natura duo nervorum genera tribuit: alterum quidem molle, quò sapores diiudicet: alterum verò durum, quò multiformiter moueretur. Ad aurem etiam vtriusque, nervum mollem induxit, alijsq; duos auribus iis immitit, quæ habuerit motum aliquem erant. Mollem quoque nervorum nasus etiam fuit particeps, & dentes, & totum palatū: nam hæc quoque sensu exactiori indigebant. Quum nervi oppriri meatu habent sensibiles, per quos ad cerebrum ventriculum perningentes, ad oculos spiritus sensibilis defluit: quæ etij causa fuit, cur crassif existerint. Etenim vbi vterq; anterior ventri-

*Adipi quibus adhaeret.*

*Adipi vna.*

*Glandula flabunt diuisionis vasorum.*

*Glandula nec in prædata.*

*Musculi, vbi nati sunt u. e. t. nati sunt u. e. t. nati sunt u. e. t.*

*Musculi solis voluntarii motu esse prædicti.*

*Nervi molles quibus tribuitur natura.*

*Nervi duri quibus tribuitur.*

*Nervi molles semper in ipsa sensoria inferuit.*

*Dentes capite esse caetera, soli sit molles nervos tribuitur.*

*Oculi fortissimi maiores et molliores nervos, quia vlla alia pars.*

*Oculorum sensum esse aliorum omnium certissimum.*

*Sensus in partibus consistit. Motus in aliorum vterque.*

*Lingua duo nervorum genera habet.*

*Optici nervi molles habent sensibiles.*

*Femur autem abducuntur musculo.*

*Femur extensorium agitur musculo.*

*Femur circumagitur musculo.*

*Cerebrum principium esse nervorum.*

*Cor esse arteriarum principium.*

*Hepar esse venarum principium.*

*Vena caua esse truncum bifidum.*

*Arteria magna demeritur.*

*Spinalis medulla velv quidam nervorum truncus.*

*Nervi partes carnes.*

*Glandularum natura duplex.*

*Opticus ner-  
vorum ortus.  
Nervus duri-  
quibus tribu-  
tur partibus à  
spinali medul-  
la.*

*Vou principa-  
lissima est co-  
muni animæ  
actuum.*

*Vou respiratio-  
nis mentis est  
nuncia.*

*Laryngis mu-  
sculorum & compo-  
sitis.*

*Laryngis mu-  
sculorum situm  
& positionem.*

culus ad latera definit, illinc optici nervi exo-  
riuntur, ipsique ventriculorū ceu thalamus, pro-  
pter illos nervos existit. Ob vehementiam autē  
actionis, consistunt durissimi, atque situm remo-  
tum, ceteris omnibus partibus, quæ sub facie  
constitunt, suggeruntur nervi dum à spinali me-  
dulla, præterquam intestinis, visceribus atque in-  
strumentis vocis. Quorum nonnulla quidem, ut  
cor atque os ventriculi, cum cerebro colligari o-  
portet: alia vero, quæ prope ipsum sita essent, so-  
lō sensui indigerēt, nervos molles habuerunt.  
Porro quoddam principissimum sit omnium a-  
nimæ actionum (nam cogitationem mentis est  
nuncia) oportuit eam quoque fieri per instrumenta  
quæ nervos à cerebro assumerent. Quum igitur  
larynx sit primum & principalissimum in-  
strumentum vocis, ex tribus quidem constaret  
cartilaginibus, habens autem in medio sui epi-  
glottidem, ac musculos circiter viginī, et ferē  
vsiu servientes, quorum muscularum nonnulli  
transversam magis quodammodo, alij obliquā  
habent positionem, alij denique rectam: sic tamen  
ut eorum quidam superne ori, sinibus suis infer-  
nis partes quasdam laryngis moveant alij con-  
trā, oriantur quidem inferne, ac superioribus si-  
nibus agant: æquum certe fuit, his qui superne  
deorsum feruntur, nervum superne immitti: eis  
verō qui sursum ex inferioribus partibus, inde-  
dem esse nervorum principium, quemadmodum  
obliquis atque transversis, etiam secundum posi-  
tionis figuram. Ac superne quidem deorsum fer-  
runtur, tum hi qui ab hyoide ad cartilagi-  
nem scutiformem perveniunt musculi, tum qui  
ab amboibus ad pectus proficiunt. Ab infer-  
nis autem partibus sursum se attollunt, qui ary-  
tenoidem cartilagine mōvent. Recti itaque  
sunt prorsus quatuor, duo ad obliquum incli-  
nati. Quamquam leuiter etiam obliqui sunt, qui  
sines inferiores cartilaginis dependunt, siue scuti-  
formis, cum cartilagine, quæ nomine caret, con-  
nectunt. Quin & hi musculi qui trāsu cartilagi-  
num maximam connectunt stomacho, fibras  
transversas, sed in obliquum spectantes, sortiun-  
tur. Atque his certe natura, à sexta coniugatione  
nervos immittit, quorum alter quidem ad verti-  
cem cartilaginis hyoidis, intrō in ipsū laryn-  
gem pertinet, alter autem ad transversos accedit  
musculos: à quo etiam ad musculos ad pectus  
perfectos, fines quidam pertrahunt. Dux itaque  
sunt hæ coniugationes nervuorum, ad posi-  
tionem obliquam spectantium. Tertia verō est  
alia eorum, qui ad musculos cartilagine sur-  
sum tollentes perveniuntque quum altius prin-  
cipium postulare, nō potuit à sexta coniugatio-  
ne produci. Quare à cerebro per totum laryn-  
gem utraq; parte duo nervi recti extenduntur,  
vnius ad levam, alter ad dextram. Quī verō tres  
superfunt in larynge muscularū coniugationes,  
maximè quidem necessarias ad vocis genera-  
tionem, rectam autem positionem habent, ita  
ut capita sint inferne, fines autem ipsorum su-  
perne, quibus necessum erat à cerebro per par-  
tes inferiores nervos ipsos immitti: natura ex  
sexta coniugatione, à qua oportuit cordi & ven-  
triculo & hepatis nervos etiam distribuis, nervos

quosdam carotidibus arteriis stabilitos, ad infer-  
nam thoracis partē deduxit. Vbi verō pervene-  
runt illuc, unde germina arteriæ magnæ exoriri-  
tur, quum aliqui ipsorum partem reverti ad la-  
ryngem esset necesse, duo ab aliis atque à se invicem  
separati & deducti, finiter quidē paulō longi-  
us progressus, ad radicem maximæ arteriæ se  
inflexit, veluti circa aliquam rotulam, atque illinc  
denuō ad laryngem revertis est. Dextrum autem  
dorso laryngis arteriæ impositum, quæ in dex-  
tra thoracis parte obliquam positionem tue-  
tur, & à qua acclivis carotis oritur, circa eum an-  
gulum natura inflexit, qui sit in ipsius carotidis  
productione, ac rursus versus laryngem produ-  
xit. Quia verō talis inflexio erat lubrica, natura  
apophysiū quandam à sexta coniugatione, ei  
tanquam manum porrexit. Quæ quidem cum  
magno nervo eum colligant, flexionem simul &  
reditum quantumvis illi efficit. Portio enim  
nervorum quorundam à cerebro ad viscera mit-  
titur, exigua quidem ad partes ceteras, magna  
autem ad os ventriculi, quod natura partē hanc  
fecerit instrumentū appetitus ciborum, ad por-  
tam (ut sic dicam) situm, omnium organorum  
quæ ad alimenti dispensationem fuerunt com-  
parata. Quare natura in id nervum quendam  
syncerum, & cum nullo duro mīstum deduxit.  
Ex quo portionem exiguam in ipso transitu de-  
cidens, stomacho, pulmonī, & alperæ arteriæ il-  
lam communicavit. Ex eadem etiam coniuga-  
tione syncerum nervum cordi & hepatis indidit.  
Ad alia verō omnia quæ sunt sub diaphragmate,  
intra peritonæū, ab his quoque nervis pars quæ-  
dam accedit, non amplius syncera, sed his nervis  
qui à spinali medulla oriuntur, permixta. Quare  
partes in quas deferuntur, robur quidem ac vi-  
res, ex spinali medulla: sensum autem ceteris  
exactiorem, à cerebri miscella recipiunt. Porro  
ubi natura per longum iter nervum est ductura,  
aut motui musculi vehementi ministraturū, ibi  
substantiam eius rorpare crassiori quidem, ce-  
tera autem simili intercepti: beneficio cuius con-  
tingit nervo ipsi crassescere atque corroborari. In  
primos autem eosdemque lotos scapularum mu-  
sculos, qui ab occipitio oriuntur, ac desinunt in  
dorsum ossium scapularum (quod sursum tra-  
hant) à cerebro magnus nervus inferitur, emer-  
gens vni cum aliis, quos diximus oriri à sexta  
coniugatione. Maximo enim nervo erat opus  
his musculis, nō modō propter magnitudinem,  
verum etiam propter actionis vehementiam, ut  
qui totam scapulam sursum trahant. Post hos  
autem nervi rommomeabiles, musculi à pri-  
mo quidem spondylo oris, in sublimem autem  
scapulæ partem insertis, à natura sunt dati.  
Primæ verō productioni muscularum circum-  
agentium caput, à nervis ad magnos musculos  
utriusque scapulæ pertinentibus, propago quæ-  
dam inferitur: deinceps autem à colli spondy-  
lis, ut quodque principium ad seipsum trahens  
musculum vicatim motum efficiat. Quin & mu-  
sculis duobus qui sunt ad tonsillas, & his qui ad  
imam partem hyoidis perveniunt, nervus à ce-  
rebro datur. Alia præterea nervorum tenuium  
coniugatio, quæ à sexta oritur, ad linguæ radice-  
m

*Os ventriculi  
instrumentum  
appetitus ciborum,  
ut sic dicam  
situm, omnium  
organorum  
quæ ad alimenti  
dispensationem  
fuerunt com-  
parata.*

*Loti scapulæ  
musculi vo-  
de nervos sus-  
cipiant.*

*Recurramus  
nervorum ortus,  
progressus, &  
reditus.*



cem pervenit. Nullus autem alius à cerebro infra faciem descendit. At à secunda copula eorum, qui à collo oriuntur, nervi ad caput ascendunt, duo quidem ex partibus posterioribus, duo autem à lateribus in eam faciem distribui, atque autem vitantur. Quum autem musculus latus, qui buccas & oris latera movet, multa principia fortatur, definit in buccas ipsas & labia, on apertens ad latera, idcirco fibras omnes etiam à colli spondylus recipit, ad eas partes tendentes, & cum eis nervos transverso, maximosque & plurimos. Fibris vero que in scapulas & clavum sursum feruntur, nervi minores insunt, qui cum fibris procedunt. Que vero ipsius latis musculi partes à radice auris per buccas, super musculum manfore naty, nervus vitur per foramen excidentibus oculo, positionem habent fibris, que ei parti insunt, similem, & principium propinquum. Quemadmodum autem ad musculum colli nervi ab inferioribus partibus sursum feruntur, quod non caput antrosum mouet ita & duobus musculus qui retrò ad dorsum totam scapulam contrahunt, iuxta positam apophysem, quam acanthiam vocant, nervorum principium est constituta. Pari modo & reliquos circa parulàr nervos, & eos qui ad costas perveniunt, reperias secundum ipsas muscularum fibras dissematos. Nam his musculus qui sursum feruntur, ex partibus thoracis intercostalibus nervi excidentibus distribuntur. Qui vero à collo deorsum ad thoracem descendunt, his spinales medulla colla nervos demittit. Quum autem musculus qui ad epomida sunt, totum brachium sursum tollentes, validum nervum desiderarent, à regione inter quartum & quintum colli spondylum sira, ex ipsa spinali medulla duplicem nervum produxit, quem ad partem epomidos externam simul & superiore extendit, ita profundum vitrunt, vt ne appareant quidem. Solet etenim le caritatis grana non solum copulare nervos natura, sed etiam per interna deducere, quemadmodum arterias & venas. Sic etiam nervi qui ad extremas manus perveniunt, per internam brachii partem, imò ad vlnam veliuntur, prope vlnæ articulationem prætereuntes. Deinde uterque musculus internis vlnæ occultatus ad carpum extenditur, ac sic tandem in digitos distribuitur. Tertium præter hos nervum ad externam vlnæ partem deduxit natura, musculo carnosissimo, qui illic est, vsa vice propugnacula. Maiores enim nervos merito internis partibus manuum distribuit, quod manuum actiones omnes, per eas nimirum obeat. Differunt autem nervi manuum à nervis crurum, in his quæ feruntur ratione, eo quod nervi omnes ad manus per internum brachii accedunt: ad crura vero, omnes, præter paucissimos, per partes femoris posteriores deorsum feruntur, à sacro osse, lumborumque vertebra, propagari: in ipso autem eorum descensu ad popliteum, obiter distribuitur nervum naturæ singulis musculus femoris, pro vt cuiusque ratio postulat. A poplite autem, per suram, que tota est carnosa, alios quidem in externâ tibial, alios in internam duxit, alios per mediam ipsam porrexit, musculus qui illic trahit, ipsos distribuens.

Eos igitur qui per internam suram feruntur, ad talum ac tibiam occultans, ad inferiorem pedis partem deduxit illos vero qui per externam, ad talum & fibulam abdens, ad anteriorem simul & superiora pedis porrexit. Nullum itaque nervum nec ad curvaturam cubiti, nec ad genu & tibiam anteriorem reperias: sed vbiq; omnes, in profundo, inter osium propugnacula, ac carthiginum, aut ligamentorum, aut deniq; carum, letefcentes. At vero per magnum osium pubis foramen, cum alius vas, nervi quædam propago penetrans, in internos eos semioris musculos, qui ab eodem osse pubis oriuntur, ad ipsorum capita inferunt, atq; ad ipsum visq; genu descendit. Ab illa eadem propagine, cura tota que illic est, productiones recipit: quemadmodum certe & à foraminibus que sunt ad os latum, parvi musculus qui iuxta os ipsum consistunt: tum qui ad anum, vesicam, atq; pudendum pertinet: ad hæc etiam membra que illic sunt, nec secus matrix, & peritonæum, nervos fortificant. Semper quippe solet natura, nervos, venas, arterias, à partibus propinquis immittere, modo nihil aliud prohibeat. Quum autem de nervis ab vnde dexterimus, temperius iam est ad arteriarum atq; venarum distributionem transire. Est igitur vas quoddam maximum, quod à sinistro cordis ventriculo, veluti sipes enatum, in totam corpus distribuitur. Ceterum vbi primum à corde emergit, statim in duas partes diuiditur: quarum altera que maior est, ad spinâ descendit, partibus omnibus inferioribus arterias dispensatur: altera vero sursum ad caput fertur, & ipsa omnibus que sunt supra cor, vasorum propagine prælitur. Porro pars illa que fertur deorsum, ad locum productioni suæ è directo oppositum, fertur: à quo nusquâ deducens trahit, sed recussima & cõpendiosissima via progrediens, quantum thoracis spondylum confendit: altera vero pars statim post productionem primam, portionem quandâ à se mittit sursum, ad sinistram scapulam & axillam: que pulmmoni invecit, & membranis fulta, sursum visq; ad primam costam producit, nusquam diuisa. Illinc autem iam quandam à se partem mittit ad primam intercostalia spatia, dein ad hypochondrion ac mammâ mittit alteram, que toto pectori est subdita: tum tertiam ad spinalem medullam colla, que per sex spondylorum foramina penetrat, mittitq; etiam obiter musculus propinquis propagine. Reliquum autem latus arteriæ, in totam manum sinistram, & scapulam distribuit. Altera vero maior pars totius arteriæ, maximè mollissimæ glandule præfido firmata, vbi in dextrum brachium germem emisit, sursum ad iugulum tendit, que & ipsa celerrimè osi medio pectoris iungitur. Per quam regionem vena caua & stomachum transientes, hic quidem spinæ spondylis adhæret, illa autem pectori subditur. Ex quo etiam arteris positio cõparatur opportunissima: vt quum per collum diuisa feruntur, arteriæ quidem in profundo sint, vena autem ipsis incumbant. Quum autem arteris magna trahit per thoracis partes infernas, obiter mittit portionem maximâ in eos qui illic sunt fin, mu-

Arteria maxima  
osium, distributa  
visq;

Latus musculi  
latus fibras  
non recipere à  
colli spondylis.

Musculi retrò  
ad dorsum totam  
scapulam  
contrahentes  
vnde recipiunt  
nervos.

Epomida musculi.

Nervi manuum  
et crurum, quod  
desunt.



sculos intercostales non exigunt tamen in musculos thoracis externos, quemadmodum & in septum transversum. Sed nec ventriculū, nec lienem, nec hepatis, nec intestina, nec renes, præsterat arterias aliunde recipere, quam ab hac sola maxima, quæ primū ad loca, quæ sub pleuribus sunt, pervenerit. \* Productio tamen arteriæ, quæ in dextrum renem prorumpit, superiorem habet exortum, quā ea quæ ad sinistrum tendit, quoddam renū positio sit inæqualis.

Arteriæ autem quæ ad testiculos deferuntur, eas ordine consequuntur, quæ accedunt ad renes. Nam quæ à petribus sinistris proficiunt, omnino aliquid perpetuū ex ea quæ fertur ad renem affluit: quæ verò à dextris procedit, semper quidem ab ipsa magna arteria exoritur: interdu autem affluit etiam aliquid ab ea quæ ad renem fertur. Quum autem lac & semen ex sanguine exacte coctio gignantur, quæ absoluta coctio fieri citra moram sanguinis in vasibus ipsis non potest: ob eam causam, non solum à longinquo natura venas & arterias ad testiculos atque mammas porrexit, sed præterea multipliciter eas, prius quā in inferat, involvit: diuturnam, opinor, eam, cum vase ferente, consuetudinem ipsi materię comparans. Sed venæ quidem in hoc solo loco involvuntur: arteriæ autem, etiam in testiformi plexu. Numunt enim hæc spiritum animale cerebri, qui certè multum ab aliis spiritibus distans, elaboratissimo alimento indiget. A magna item arteria, alix sunt, post prædictas apophyses, ad musculos epigastri: alix etiam manuturum vasorum propagines, in spinalem prorumpentes medullam. Quarum pars quidem non contemnenda, per commissuras spondylorum penetrat in dextros spinæ musculos, pars autem in sinistros diffeminatur. Quæ germina sunt nervi qui ab ipsa spinali medulla oriuntur, numero equalia, obducunturque tenui meninge, quæ spinalem medullam ambit. Ob has igitur productiones crassitudo semper minuitur arteriæ. Porro ad vitimum spinæ spondylium arteriæ subiacet vena, quæ antea supra eam ferebatur. Postea verò quā peritonæum prætergressæ, in crura diuidende erant, rursus venæ incubuerunt arteriis, quò tumor esset ipsarum per crura delatio. A quibus vasibus transeuntibus, vesica quidem exiguas, magnas verò duplicesque propagines acceperunt matrices, ut quæ non eas solas, sed fertum in ipsis matricibus concipiendum, nutrire essent.

Quæ igitur à regione renū in testiculos perveniunt, usque ad matricum fundum diffeminantur. Quæ verò tum ad partes, quæ ad collum pertinent, tum ad eas quæ sunt infra, post testiculos, perveniunt, à vasibus quæ ad crura feruntur, productæ sunt, eodem loco, unde in masculis ad virgam accedunt. Ex his autem locis rursus vasa venosa sursum feruntur, quæ propter commercium, cum eis copulantur vasibus, quæ deorsum à mammas descendunt. Ab usdem locis vasa coniugatio exiguorum vasorum, ad ea quæ ad pudendum pertinent, accedit. Ad inguen autem natura, magnas glandulas diuisionibus vasorum veluti fulcimentum, & aduersus iniu-

rias externas operimentū, indidit. Vbi igitur arteria magna quæ ad superius partes perrepat, iis quæ in thorace sunt; distulit propagationes, quod ex ea reliquum est, vna scilicet vtriusque arteria, sursum ad caput fertur. Quorum productiones vasorum, omnes facies & colli partes continent. Ex eis autem quæ in scapulas diuiduntur, dorsales musculi suas recipiunt propagationes. Ab his etiam ipsis, quum primū ad collū extra thoracem iam emicuerint, feruntur germina per foramina cuiusque sex primarum vertebrarum, quæ sunt ad latera, usque ad caput. Verū quæ parte nervi qui à spinali medulla proficiunt, exortus est, eadem ceteræ ab arteria & vena, quædam exigua propago in spinalem medullam infertur. Finis autem vasorum, quæ sursum ad caput usque feruntur, postquam egressus primū est spondylium, bifariā diuiditur: atque altera quidem parte ad cerebrum posterius intrō fertur: reliqua verò ad musculos articulo capitis circumfusos disseminatur, sinibus vasorum quæ in tenui meningē sunt locata, seipsū coniungens. Nam musculos qui sunt in superficie, & cutem, vasorum propagationes quæ in scapulis sunt, continent. Nulquam enim in corpore illam reperies musculi, qui vena & arteria careat. Iam verò arterias quæ in axillis ad manus diuariantur, validis quibusdam glandulis natura (ut non facile rumpentur) iuxta diuisiones corroborauit. Est præterea iugum arteriarum carotidum, quod fertur sursum rectum ad caput, in profundissimis colli partibus additum. Cuius quidem vtrique arteria quum diuidatur bifariam, & altera sanè pars retrorsum, altera verò magis antorsum vergat, rursus harum vtrique in duas alias diuiditur. Deinde altera pars eius quam antorsum tendere diximus, ad linguam accedit, & internos maxillæ inferiores musculos. Altera verò magis quidem in superficie, quā illa, est locata: magnis tamen & ipsa glandulis tecta, sursum ad interiora aurium, usque ad temporalem musculum, fertur: ibi diuiditur, atque à posterioribus sursum usque ad verticem tot illis. Reliqua verò arteriæ carotidas partem, quam retrō magis ferri dicebam, diuiditur & ipsa in duas partes maximas. Quarum minor, retrō magis ad basim cerebelli ascendit, magno ac prælongo ipsam excipiente foramine, quod est in fine suturæ labdoidei. Reliqua verò, anterioribus partibus per foramen quod osi lapideo inest, sursum fertur & ipsa, ad plexum testiformem, qui ton basi cerebri subiacet, & ex memoratis arteriis textitur. In cerebrum autem ipsum, arteriarum laud exiguum iugum ascendit, ex quo plexus *xephele*, qui est in illius ventriculo, gignitur. Ut verò summam dicam, natura in facie & toto capite, arterias quidem quamplurimas cum arteriis, venas autem cum venis, tum à dextris à sinistris, tum ex sinistris ad dextra, tum à posteriore parte ad anteriorem, & rursus ab anteriore ad posteriorem, & ab externis intrō, & ab internis foras ducentes, committit. Committuntur autem arteriæ venis, & venæ arteriis, & vtrique hæc nervis, & his ambobus iunctis, in toto animalis corpore. Etenim cuiusque

Renem possit  
nem esse inae-  
qualem.

Lac & Semen  
ex sanguine  
exacte coctio  
gignantur.  
Vixit vasibus  
citra testis &  
mammas, co-  
municata sit  
solam.

Testiformis plexus  
est.  
Arteria nutriens  
spiritum animale  
feruntur cerebri.

Arteria subiacet  
vena circa  
vltimum spon-  
dylium.

Matricis vase.

Intestinum glan-  
dula quæritur  
producta feruntur.

Musculum mol-  
lem diffinitur  
arteria, nec ve-  
na.

Carotidam ar-  
teriarum dicitur  
propositis.

Testiformi plexu  
nem esse tunc  
basi cerebri sub-  
iacentem.

Complicari in-  
ter se omnia in-  
strumenta in  
corpore.

## GALENI PERGAMENI

de vsu partium, lib. XVII.

cuiusq; partis arteriæ & venæ sunt omnino sensus expertes, siue illas frangere velis, siue vrere, siue incidere: id quod cognoscēs, neruū eiusdē partis vinctulo exceptis. Inserunt autem ea vasa in partes sibi circum vicinas, tenues quāddā propagines: venæ quidem numero interdū quam plurimas, & magnitudinē insignis: arteriæ autem, tum pauciores, tum modicæ inferiores: mittunt tamen & ipsæ. Causa huius est, quod partes omnes alimento indigent, calidæ, frigidæ, duræ, & molles. Vt autem caloris natui modus ad vinguem ferretur, non amplius similiter omnes possunt. Nam partes naturali temperamento frigidæ, vel si ad vinum aliquando frigiditatis pervenerint, sustinent tamen & viuunt, & rursus sine dolore, pristino calori restituntur. Quare sine arteriis venas quāddā reperire licebit: sed arteriam nullam sine sua coniuge venā. Coniugem autem intelligo, quæ propter eundem usum existeret. Quum igitur nutriti corpora sit necessesse, quod ea vacuetur, alimentum si æquale est necesse, copia substantiæ effluunt. Desunt autē plurimum a calidis, molliorib; corporibus, & his quæ assidue aut vehementer moventur: minimū verō a frigidis, atq; duris, & quæ moderatas obiciunt actiones. Frigus enim corpora dēst, cogit, confringit, ac prohibet substantiæ defluuium. Calor autem contrā, corpora rarefacit, liquat, renuat, & digerit. Rursus, quod ad ipsam substantiam attinet, quæ diuor quidem est & lapidæa, permanens est, nec facile dissipatur: quæ verō humida & mollis, celeriter quidē a calore in halitus soluitur, cōg. citō exhalat, ac perit. Pulmoni igitur omnia insunt, quæ ad celerem vacationem pertinent: nam & molliissimus, & calidissimus est, motūq; agitur perpetuo. Oribus vero insunt, veluti ex diametro, cum eo pugnantia: etenim frigida sunt & dura, bonāq; totius vitæ partem quæscunt: ob quā nimirum causas perdat ipsorum substantia, neq; soluitur facile. Ne igitur mireris, si his natura iustissima exiguas ad dēdō tribuit venas, vt ne clarē quidem cernantur: pulmoni verō, vena maxima sit a corde implantata. Duas itaque partes inter se comparari, quarum altera quidem plurimo, altera verō paucissimo alimento indiget. In medio autem harum sunt reliquæ omnes, quarum alig quidem magis, alix verō minus vacuant, naturiq; postulant. Nusquam autem vena ab arteria relinquitur: sed vbi vas arteriosum videris, ibi necessum est venam etiam adesse: paucis tamen venis in corporibus, quæ ad cutim pertinent, sine arteriis diuisis. Porro quæ vena causa primum fertur sursum a gibbis hepatis, iam inde propagines magnas ad sepeum transversum mittit. Vbi verō ipsam cor attingit, ibi eam quæ octo costas vtrinq; alit, producit. Quemadmodum autem in crunibus, ita etiam in externis & anterioribus brachij partibus, natura sine arteriis proprias disseminavit venas per superficiem. Et quemadmodum ipsam brachium & crus vena vna abvndat, ita in superficie colli altera vena singularis sine coniuge cernitur.

At verō partis actio, ad eiusdē vsu differt: quod actio quidem motus actiuus sit: vbi verō nihil aliud existat, quā spūitudo ad vtrūq; dicitur. Porro duxi actionē in esse motum actiuum, quod pleriq; motus sicut patientis, quos sine passiuos nuncupant. qm tum partibus quibusdā accidunt, quum ab alio mouentur. Atq; motus sanē in eis oñibus, quæ in brachijs & cruribus sunt, sicut a musculis illa mouentur: & extēdū si ad primū mouens (quod est princeps animæ facultas) ipsos musculos cōpātes, rationem instrumenti habebunt: si verō ad id os quod mouent, non modō hanc, sed opificis etiam rationem formentur. Idcirco primarietas animalibus ab actioibus ipsis accedit, secunda a partibus. Nullam siquidem partem propter seipsam habere cupimus. Supervacanea quippe esset, si actione esset orbata, & abscondenda potius, quā opanda. In omnibus autem animalium partibus, vni cum actione ipsarum, vsus etiam adest coniunctus: quem admodum, exempli gratia, videre est in elephantis proboscide, quæ parte, essi aliquando ea missa visa fuerit ociosa, animal tamen ipsum, cernuambus quamaproximis, vtrius: ac per eam etiam, perforata quonvis, veluti per nares quasdam respicit. Sunt igitur in vniuersis opera nature admiranda, quæ præter partium omnium æqualitatem, actiones etiam exhibuit, ac præterea statim vt fuit genitum animal, ipsum eorum vsu edocuit: ac breuiter, non solum proportionē omniū membrorū extrinsecus, more statuariorū, sed in profundo etiam seruauit. Si quidē Polycletus canonem illum suum tam celebrē affabre faciens, naturæ est imitatus, in quibus posuit eam imitari. Poruit autem in solis externis partibus, in quibus artem considerauit. Sunt itaq; opera nature digna quæ suspiciantur: cuius tumurum arte & industria, ex multis omnia ferē optime sunt: quum tamen a fortuna ipsa, ex innumeris contingat fortē fieri rectē vnum tantum, aut alterū. Quis igitur ex ortu & structura animalium non statim concipit animo, mentem quandam esse, quæ vim habeat admirabilem, quæq; terras omnes pervadens, in omnes orbis partes extenditur? Vbiq; certē animalia procreant videas, quæ constructionem habent dignā admiratione. Quamquam quænam vniuersi pars ignobilior est terra? Attamen mentes quedam cernunt ad ipsam a corporibus superioribus pervenisse: quæ si quis contemplantur fuerit, statim substantiæ pulchritudinem admirabitur: primum a cernimē solis: post ipsum, lunæ: deinde syderum: in quibus par est, quantō corpora subitanea eis purior, tantō etiam mentē inhabitare, quā in corporibus his terrestribus, & meliorē & perfectiorem. Quum enim in limo, in colluie, in paludibus, in plantis deniq; a fructibus putrefcentibus, animalia gignantur, quæ mirificis conditoris vires ostendunt, quid de corporibus superioribus est putandum? Licet autem & rationi natricem quandam naturam, etiam nūm vel in

Actio partis, est motus actiuus. Vbi pars, est quædam ad vtrūq; dicitur. Motus passiuus qui.

Vultatem primam ad animalium ad alium accedens, secundam a partibus.

Partem nullam propter seipsam habere cupimus. Supervacanea quippe esset, si actione esset orbata, & abscondenda potius, quam opanda. In omnibus autem animalium partibus, vni cum actione ipsarum, usus etiam adest coniunctus: quem admodum, exempli gratia, videre est in elephantis proboscide, quæ parte, essi aliquando ea missa visa fuerit ociosa, animal tamen ipsum, cernuambus quamaproximis, vtrius: ac per eam etiam, perforata quonvis, veluti per nares quasdam respicit. Sunt igitur in vniuersis opera nature admiranda, quæ præter partium omnium æqualitatem, actiones etiam exhibuit, ac præterea statim vt fuit genitum animal, ipsum eorum vsu edocuit: ac breuiter, non solum proportionē omniū membrorū extrinsecus, more statuariorū, sed in profundo etiam seruauit. Si quidē Polycletus canonem illum suum tam celebrē affabre faciens, naturæ est imitatus, in quibus posuit eam imitari. Poruit autem in solis externis partibus, in quibus artem considerauit. Sunt itaq; opera nature digna quæ suspiciantur: cuius tumurum arte & industria, ex multis omnia ferē optime sunt: quum tamen a fortuna ipsa, ex innumeris contingat fortē fieri rectē vnum tantum, aut alterū. Quis igitur ex ortu & structura animalium non statim concipit animo, mentem quandam esse, quæ vim habeat admirabilem, quæq; terras omnes pervadens, in omnes orbis partes extenditur? Vbiq; certē animalia procreant videas, quæ constructionem habent dignā admiratione. Quamquam quænam vniuersi pars ignobilior est terra? Attamen mentes quedam cernunt ad ipsam a corporibus superioribus pervenisse: quæ si quis contemplantur fuerit, statim substantiæ pulchritudinem admirabitur: primum a cernimē solis: post ipsum, lunæ: deinde syderum: in quibus par est, quantō corpora subitanea eis purior, tantō etiam mentē inhabitare, quā in corporibus his terrestribus, & meliorē & perfectiorem. Quum enim in limo, in colluie, in paludibus, in plantis deniq; a fructibus putrefcentibus, animalia gignantur, quæ mirificis conditoris vires ostendunt, quid de corporibus superioribus est putandum? Licet autem & rationi natricem quandam naturam, etiam nūm vel in

Polycletum in canone suo esse celebrē, si quæ imitationem naturæ.

Fortunam rationem quædam esse operari.

Terra infusam esse rem superioribus corporum.

Mentem habitare in superioribus subitanea eis purior, tantō etiam mentē inhabitare, quā in corporibus his terrestribus, & meliorē & perfectiorem. Quum enim in limo, in colluie, in paludibus, in plantis deniq; a fructibus putrefcentibus, animalia gignantur, quæ mirificis conditoris vires ostendunt, quid de corporibus superioribus est putandum? Licet autem & rationi natricem quandam naturam, etiam nūm vel in

*Ita ut inveni-  
ent naturā in-  
esse homini-  
bus.*

*Dispositam men-  
tem esse exten-  
sam per aërem,  
arbitratur Ga-  
lenus.*

*Opus de vfu  
partiu esse con-  
stituenda per-  
fectissima thro-  
logia verbi prin-  
cipis, qua lan-  
guage medicina est  
maior.*

*Opus de vfu  
partium philo-  
sophia esse lan-  
guage vtilissimū.*

ipsis hominibus cernere, si Platonem, Aristote-  
le, Hipparchum, Archimedem, & complures al-  
ios contempleris accuratissimē. Si igitur in tan-  
ta colluise (quo enim alio nomine quis appellet  
id quod ex carne, sanguine, pituita, ac bile vtra-  
que est constilatum) mens gignatur adeo eximia  
& excellens, quantum eviudem putandum est  
esse excellētiā, in sole, luna, aliisq; etiam syde-  
ribus? Multi quidem dum hac mecum voluto,  
non exigua quēdā mens talis, per ipsum etiam  
nos aërem ambientem, esse extēsa videtur. Fie-  
ri enim non potest, quā lucis ipsius Solis sit par-  
ticipes, quin vim etiam ab ipso assumat. Quæ  
omnia qui exquisitē perpendit, tum sapientiā  
topici, tum humanæ mentis prerogativam in-  
telligit: ac deniq; hoc opus de vfu particularum,  
quod prius despiciebar, tanquam exiguum, per-  
fectissimæ theologicæ verum principium consti-  
tuet, quæ theologia multo est maior atq; præsti-  
rior tota medicūa. Idcirco non solum medico, o-  
pus de vfu partium est vtile, sed multo certē ma-  
gis philosopho, qui totius naturæ scientiam sibi  
cōparare studeat, circa cuius indagatiōē nos  
confensere oportet. Nec verō in solo homine  
videre est ipsam summā artem naturæ, sed quod-  
cūq; animal discere velis, parē in eo indu-  
stram opificia, & sapientiā repenes. Et quantō  
ipsum minus fuerit, tantō maiorem tibi excita-  
bit admirationem. Quod declarat opifices, quā  
in corporibus parvis, aliquid magnum sculptū:  
quemadmodum is, qui nuper in annulo exiguo  
Phætronta quatuor inuestit equis sculptis, spe-  
ctaculum certē incredibile. Quanquam hōrum  
nihil structuram cruris pulicis superabat. Quum  
igitur tanta opificis ars veluti actuarum atque  
paregon quoddam in tam abiectis animalibus  
ducelcat, quantā eius vim ac sapientiā, in præ-  
stantioribus inesse putabimus? Vnum igitur ex  
hoc opere ac maxum, non vt medicus, sed vt na-

turæ studiosis, hoc nobis accedit cōmodum, ne-  
pe facultatis (quæ inest conditori) cognitio. Se-  
cunda autem vtilitas est, ad affectus partiu, quæ  
in eis in alio corpore delirelunt, cognoscēdos:  
quam ad rem, actionis cognitio magnum habet  
momentum. Quandoquidem qui iam explorā-  
tum habet, quod actio crurum est ambulatio, si  
quem videt qui ambulare non potest, statim in-  
dicat partem cruris aliquid esse affectā. Sed  
quemadmodum in actionibus, ita & in vilita-  
tibus res se habet. Vt enim ambulatio tollitur, si  
nerui ac musculi qui cruribus insunt, affectu fue-  
rit ita tollitur, si os aliquid fuerit fractum, aut  
sua fide dimotū. Si vero neciusus, quod per os  
sua cruribus innitatur, ita d quāquam scire pos-  
sumus, quod osibus latus animal etiam lēda-  
tur. Eōq; modo sit, vt ad cognoscendum quæ illi  
pars sit affecta, non minus conferat vilitatum  
quā actionum cognitio. Eadem est ratio, & de  
futurorum prerogative. Nam qui affectus in-  
sunt cruribus incurabiles (vt luxationes quæ cū  
vicere incidunt, aut perversiones coxendicum)  
insanabilem in futurum tempus significant am-  
bulationis usum. Tertia, præter prædictas, lu-  
ius operis vtilitas est ad verius philosophas, qui  
nobis non concedunt crises morborū a natura fie-  
ri, quib; ipsam viliam animantium habere ratiō-  
nem pernegant. Iam verō in partibus quibuscūq;  
scindendis, aut circuncidendis, aut abscindēdis,  
quemadmodum & in eximendis sagittis, vel iacu-  
culis, qui partium vilitates probe calluerit, præ-  
scribet quas nam audacter & securē, quāvis tre-  
pide & cautē incidere oporteat. Hæc atq; totæ  
tantæ huius, quod ad vmbilicum iam perduxim-  
us, operis commoda, liber iste, veluti bonus  
quidam iuvālis, explicat.

GAL. LIBRORVM DE. VSV PAR-  
TIVM LIB. 17.

## ILLVSTRI AC GENEROSISSIMO

VIRO, D. D. FERDINANDO, COGNOMENTO A'  
Mendoza, literarum patrono, Andreas Lacuna, Sec. Doc.  
M. Miles Sancti Petri, &



Commentarios Galeni de placitis Hippocratis & Platonis à me haud ita pridem elabo-  
ratos, atq; (vt ita dixerim) ad meliorem frugem redactos, multis de causis adductus  
sum, ubi vt dicarem, Ferd. generosiss. Primum, quod rationi esse consonum ducerem,  
vt aliquoties ad te rediret mearum meditationum fructus, qui fouere iudices illos atq;  
pro vehere non desinus. Dein, quod te conspicerē dummo quodam affectu prædū, sapientiæq; ardē-  
tissimo amore inflammatū, diu noctūq; ipsi philosophiæ incumbere, eiq; nauare haud instrenuū ope-  
ram: ac prinde eorum philosophorum dogmata fore tibi non minus accepta, quā tuū studiū apta,  
sperarem. Quocirca vt officiū meum obseruantiamq; erga T. Dignatione testarer, simulq; lucubra-  
tionibus meis conciliare patronum optimum (qualem hac vtilitissimā aetate omnes in genia ar-  
tes & discipline desiderant) non alia fieri posse ratione apud me existimaui, quā si nominis tui  
præfatione illustretur, laborem quod est, ederet in lucem. Tuum igitur est, Vir clariss. ha-  
scere neglitas nostras ne cuiquam paritendas, vultu hilari in tuos sinus excipere, exceptasq; contra vi-  
ros malē feriatos defendere: vt verē sis id quod diceris, Philanthropos, iuxta orā-  
torem philalethes, quæroq; Vale. Venetiis,  
XII. Calend. April.

GALE-

## GALENI PERGAMENI

de Hippocrati &amp; Platonis placis, liber. I. L.

Non primus desideratur etiam in greco exemplari.



Orro Chryſippus his friuolis aſſumpſionibus animam rationalem deſeſcere in corde perſuadere conatur, quod dum animi ſententiam exprimimus, atque indicantes noſtipſos, hanc vocem,

Ego, proferimus, in priori ſyllaba, E, os & mentu inferus velu ad peſtora deducamus: quodque etiam manum interdum admoceamus peſtori ſimiliter indicantes noſtipſos: vt cum dicimus, Multi hoc conuenit. Ceterum quod etiam naſum ſimiliter homines quandoque attingunt, dicentes, mihi hoc da, tamen in eo anima non reſidet, omnino eſſe obliuſ videtur. Cur autem, dum cōcedimus aliquid annuētes capite, in qua partem ipſum deſcimus, in illa principiu animi eſſe potius oſtendimus, quam in ea que mouetur?

Etenim que primu in nobis mouetur particula, dum annuimus, eam nimiru probabilius eſt animi principiu in ſe cōtinere, quā aliaru illarū, ad quā motu perſectur: vt interim illos homines non cōmemorem, qui capite renaiūt, cum aſſentuntur. Oportebat itaque ab ipſa rei ſubſtantia, quā traſtabat, Chryſippi oriſum, tum per cōuenientes, tum per proprias aſſumpſiones inueſtigare. Nam que demōſtrationes ad ea rei ſubſtantia recedūt, vt minimē ſcientificę ſunt, ſic eas aut exercitatorias probabilēſue, ſue dialecticas, aut rhetoricas, aut deniq ſophiſticas nominaueria.

Ac traditum ſanē i veteribus de ſingulis eſt: de ſophiſticis quidem, in elenchis: de rhetoricis autē, in rhetoricis artibus: in topicis, de dialecticis ſicvū in libris de demōſtratione (que dicuntur ſecunda aanalytica) de ſcientificis: in quibus omnibus, qui recte demōſtrationes eſt, ſeſe oportet exerceat. Quia igitur propoſitu eſt nobis cōſiderare, num anime principatus in corde conſiſtat, omnia que cordi inſunt, & a quibus demōſtrationes deſumi poſſunt, dinumeremus. Cordi ſanē inſunt, ſitus, magnitudo, plexus, cōformatio, diſpoſitio, & motus. Situm autem eſt cor, thoracis quidē ratione, quodāmodo mediū māgis: totius verō animantis reſpectu, tantū ſuperius medii partibus eius, quānto ab vmbilici regionibus (que ad amuſum ſunt medix) diſtat. Verſus ipſum enī arteriā aſperam, per quā reſpiramus, ita quodammodo ſitum eſt, vt per mediū pulmonē ei cōmittatur. Nā ex ſiniſtro cordis ventriculo arteria quardā venoſa in pulmonem ſibras diſſeminatur, ad cuius quidē numeroſas propagines, ſines aſperę arterię perueniunt, quod & ipſa in totū viciu ſimili diſtribuitur modo, quod arteria venoſa. Quinetiam iuxta pulmonem ita locatū eſt cor, vt extrinſecus ab eo vndiq cōtegratur. Verūm neq ex ſitu, neq ex cōiunctione cordis cum illis partibus, licet eius quod petimus ſcientificū viliu argumentū diſcere: quādoquidē

dem nondū per ea colligitur, cor ſenſus motuſque voluntarij principium eſſe: quādamodū neq etiam quod cor vocis opexiſ ſit, qualis eſt quorūdam ſententia. Etenim vocis inſtrumentū & primum & peculiare, eſt ſumma pars gutturis, quā Greci laryngē vōcant. Si igitur intra ipſum aſperam atteriſ incidieris, non amplius animal vocaliferari audies, eſt reſpirare ipſum ſine impedimēto, etiammū videas. Iam verō thoracis muſculos, vñ cum illis qui in abdomine ſunt, quum animal vocem molitur addere, velamentem extendi conſpicias, cor de nullā nouam inſuper actionē interim acquirere. Non itaq iam ſpiritus qui ab imo ſurſum eſſetur, priuſquam ab ipſo concineretur larynge, vocis habet ſpecimen, ſed ſolus tantūm ſibilis. Iſta autē a ſuperiori aſperę arterię ſinis cartilaginibus, veluti plectris quibuſdam, eſſatio hæc, vox eſſicitur. Ceterū cōpoſita eſt ſumma gutturis regio, larynx diſta, ex tribus cartilaginibus, quas complures muſculi mouent, etiam quā motu voluntarij inſtrumenta. At muſculi, vt ipſi moueantur, nervus i cerebro oriens requiritur. Ex quibus ſi aliquem ſine interceperis, diſſecueriſue, ſtatim immobile illū muſculum reddes, in quem inferitur nervus: immobile etiam animantis membrū, quod prius a muſculo mouebatur, quūm nervus eſt inciuſ. Ac ſi quidem ab aliis inſtrumentis, muſculiſque & nervis, inſpiratio libera, qualis ſanis adeſt nulla forma aggras: ab aliis aut violenta, quā eſſationē appellare ſolemus: ad quā perſicienda videbis omnes ſcapularū particulas ſimul atollere. Eſt tamen proprium vocis inſtrumentum larynx, ac tum eius motoreſ muſculi, neruiſque i cerebro in muſculos ipſos deſiſſi: deinde lingua, que non vocis modū, ſed loquelę inſtrumētum exiſtit. At verō pulmo, i thorace motus, diſſentus quidē, externum aërem, id quod eſt inſpiratio, attrahit: contrahit autē, eundē in aſperam arteriam, atq in os ipſum, extrudit: quod opus eſt expiratio. Atqui, ſi vox ab eo, qui in corde eſt ſpiritu, ſicret, nō aboleretur ſtatim, nervis quibuſdam vel in collo, vel in capite ſectis: multoq minus aut conſiſto aut vulnerato cerebro, aut ſpinali medulla diſſecta: ſed potius obliſſo corde, id quod non accedit. Etenim ſi nudaretur cor, contuderis ipſum atq depreſſeris, nec voce, nec ſpiratione, nec vlla priuſ voluntaria actione impediri animal cerues. Quod ſi licetibi etiam vniuerſum ac ſemel cor ipſum eximere, illis voluntariis actionibus: id quod in nonnullis ſacriticis contingit, in quibus animantia cernuntur, corde iam aris impoſito, non reſpirare tantum, aut clamare fortiter, ſed etiam fungere, quo vſque perſuſione ſanguinis cōmorianatur. Cerebrum autem oſuſus ſi detexeris, aut quencunq eſt ipſius ſinum cōmpreſſeris, nō mutam duntaxat, ac protinus ſpirationis experte eſſiſciſ, ſed etiam omnino ſenſu, omnibuſque arbitariis actionibus animal ipſum priuabis. Porrtauris, quibus ſpinalis medullę origo iuxta primam vertebra diſſecatur quoridie, ſimul cum ſeſtione ipſa, motus, reſpiratio, & vox exoluantur, illiſſo motu cordis & arteriarum: quod ipſa

Larynx eſt pri-mū inſtrumen-tum vocis.

Thoracis muſculi. Abdomen muſculi.

Vox que ratio ne eſſicitur.

Larynx ve nri-bus cartilaginibz conſiſtat.

Muſculi muſcu voluntarij inſtrumenta.

Nervus plectro-in a cerebro, larynx ſui ſano motum.

Inſpiratio libera.

Inſpiratio violenta.

Lingua, vocis & loquelę inſtrumentum exiſtit.

Inſpiratio quid.

Expiratio quid.

Cor de nudato & conſo, nō la priuſ voluntaria actio ne impediri animal.

Corde iam aris impoſito, animantia reſpirare, clamare, & ferve.

Cerebro deteſto ſiſſiſciſ, aut cōmpreſſiſ, aut vnticula, motum acci-dant.

pulsandi vis, à cerebro non descendat. Vt enim pulsatio ipsa motus alterius generis est, sic etiam principiorum alterum non indiget altero.

*Cor quoque respicitur, ut quæ voca. gerimus, prout est.*

*Arteria, solum in corde efficitur, quibus argumentum probat bene veteri.*

Quare neque respiratio, neque vox, cor exiit principium: tametsi propter illud maiori ex parte coniungatur respiratio. Argumenta autem Zenonis, Diogenis Babylonii, & Chrysipti, quibus scien, in corde rationalem animam habitare, ab eoque emitti vocem conuincunt, in hoc vnum se se conspirant omnia. Vnde vox à sermo eliditur, illic necessum est fiat, ratiocinatio, intelligentia, & meditatio omnis, ibidemque etiam mens delitescit. Est enim sermo veluti mens nuncius, qui ex ea procedit, nec illa cuius sit vocis origo, alia animæ pars præcipua. At qui vox & sermo, qui vox articulata est, à pectore proficiunt, cum per asperam emittantur arteriam, id quod non fieret si à cerebro emitterentur. Mens igitur & omnes eius actiones, in pectore, ac præcipue circa cor, non in capite, delitescunt. Quæ quidem argumenta facile reddargui potest. Primum siquidem, dum sensus obferuantes propinquitate, aiunt, si ex cerebro sermo oritur, non per asperam arteriam procedere, perperam hallucinantur: cum nimirum mens ipsa, aut voluntas (sive eam in cerebro, sive in corde posueris) quolibet instrumenta, etiam longissimè sita, actutum mouere possit, nihil ex intervallo, ad celeritatem, impedimentum recipiens. Vt enim nullum sensibile tempus est, interea quod particula vulneratur, & ipsum animal sentit: ita nec interitum dum homo respirare aut loqui vult, atque ipsam actionem obit. Quare nihil prohibet, quò minus voce per asperam arteriam emissa, cerebrum motus asperæ arteriæ sit causa. Falluntur etiam secundum sermonem procedere ex mente dicentes? Sermo quippe, aut vox significatiua, à mente (quemadmodum voluntaria omnia) non tam ex mente, sed ex summo gutturo, quod larynx dicitur, proficiunt.

*Mens, ubi non sit, quælibet instrumenta, vel longissimè sita, laborem mouere possit.*

*Sermo à mente non ex mente, sed ex summo guttore proficiunt.*

*Ratiocinationem esse prout animæ actionem. Mens nemine elatura.*

*Cor per quod valet cerebrum conuincitur.*

Prius autem non dum vox, id quod efficitur, existit: sed materia quædam vocis (quam esilano-nem aut sibilum vocamus) ex asperis arteriis profecta, quarum nulla cor attingit: id quod certe sensui manifestum cum sit, si dem ex seipso facit. Ergo non dicemus, ut illi, vnde sermo emittitur, illas etiam ratiocinationem fieri: sed, à qua parte sermo emittitur, secundum illam quoque, & in illa fieri ipsam ratiocinationem, quæ principis animæ est actio. Licet namque pro mente, principium animæ partem dicere, sicut & dominantem, imperantem, præcedentem, ratiocinantem, atque intelligentem. Iam verò cum tria videretur genera, venæ scilicet, arteriæ, & nervi, cerebro cor connectant: si primum quidem ea in superiori & inferiore ceruicis regione funiculis exasperis validis, ne sanguinis perfusio magna sequatur: dein autem, vinctulorum medium secures: videbis plane, ipsius quidem nervus qui iuxta arterias consistunt in ossibus, statim obmutescere animal, illasque aliis vniuersis actionibus: at teris autem solis aut scilicet, aut interceptis, minime reddi animal mutum, prius tamen pulsus omnes quæ supra vultus aut vinctula sunt, eius particulas: ut quæ infra consistunt, semper eodè

modo pulsantibus: venis denique aut incisis aut interceptis, nullam manifestè aboleri functionem. Vnde liquidum constat, nec cor, ad pulsū motū cerebro egere: neque cerebrum corde, ut sentiat animal, operetur pro voluntatis imperio. Porro si intelligēdo, discendo, docēdoque, nullis insignis motus in corde appareat: in omnibus autē perturbationibus is manifestè innotescit (quod etiam Chrysiptus confirmat) clarum vix evadit, ratiocinatricem animæ facultatem non esse in corde: irritationalem autem, & affectibus obnoxiam, in ipso comprehendere. Ceterum qui per cardiacam cor dolere autumant, vocis æquivocationem non sentiunt, quæ nimirum os ventriculi veteres cor appellabant. Quæ pars cum ab acerbis humoribus immar, tali sensu tristite afficitur, quod maxime his contingere solet, qui impendū diutius à cibo abstinentur, præcipue post exercitationes vehementes. Nam exceptatis valentius, in ventriculo suus bilis colligitur: à quo mors, cardiacalga laborant. Ad hoc autem, etiam si concesserimus, cor primum omnium particularum fuerari, non ob id tamē inferre oportebit, cor in totam facultatem existere, sed secundum generationem. Quod autem cor primum omnium particularum moueri incipiat, atque vinctum cesset, ostendit quidem, & motus instant esse, non tamen omnis, sed solius qui in pulibus est: qui genere à voluntario differt, cuius cerebrum origo exiit. Quod si nobis obiciant, in corde copiam nervorum conspici: respondebimus, non nervos, sed uernas quædam esse corpora in corde, quæ specte solum nervis respondent, ad actionem & vñ. Dicant præterea, in corde consistere nutritionis animalium origines, ac proinde in eo vim ratiocinatricem esse debere. Verum vi utroque mentiumur lemmate. Nam primum nutritionis principium sunt os, stomachus, & ventriculus: alterum, mēseræque venæ, in quibus primis fit sanguis: tertium iecur ipsum: quartum post igitur, venæ causæ, in quæ prima purus à recrementis sanguis relinquitur: ab hac enim, quemadmodum alie omnes animalis: particula, cor alimentum recipit. Sed nec si cor nutritionis esse principium admitteremus, consequens esset, in qua parte id genus principium est, in eadem ratiocinatricem facultatem haberi. Præterea ubi aiunt, vnde spiritus suggeritur, ibi dem esse animæ principatum: cogimus id obcedere, si quidem de animalis spiritu intelligat. Vbi vero postea subdunt, ex corde spiritum suppeditari, vitalem quidem sibi haberi, animalem autem non item. Quid si neutrum horum spirituum intelligere se fateantur, sed naturalem, qui sicco lumbigero alimentum proportionem et respondet, ad diem dicentem Hippocratem: Principium alimentis spiritus, os est, nasus, aspera arteria, pulmō, ac reliqua perspiratio: quibus sanè instrumentis initium motus à capite nos transmitti fatemur. An verò animæ substantia sit evaporatio siue ex alimentis, siue ex spiritu, hac de re nihil ad præsens in dubium veritatis, ne per omnia Diogeni videamus infestè esse, qui sanguinem esse animam, ut Empedocles &

Crinas, existimavit.

*Cor ad pulsū motum ad eum cerebrum non egi, ut sentiat animal.*

*Animi sensus naturæ, affectibus obnoxia, in corde comprehendere.*

*Os ventriculi veteres cor appellabant.*

*Os ventriculi quibus præcipue vinctum.*

*Cardialgia.*

*Nutritionis principia.*

*Majoresque venæ prout conficiunt sanguinem.*

*Causæ venarum, quæ ferunt alimentum vinctum corpori.*

*Spiritus vitalis à corde nascitur.*

*Spiritus naturalis.*

*Principium alimentis spiritus.*

*Animam esse sanguinem quæ palariis.*

GAL.

**GALeni PERGAMENI**  
de Placitis Hippocratis & Pleron-  
is, lib. III.

**Q**UOD sanè necessarium existat, non solum medicis, sed philosophis etiam, nosse, & genere sint, & quales secundum speciem singulas, quàmvis positissimè animantis partem occupent, facultates corporis nostris regentes, primo libro demonstratū à nobis est. Secundo autem, de sompno non differemus sermonem habui: quæ quidem in vniuersum sunt quatuor. Nonnullæ quippe ipsarum, ab his quæ particulæ insunt, iuxta problemata substantiam sumuntur: alix vero ab us, sanè quæ insunt, non tamen secundū id quod propositū est, ac de quo questio habetur: alix ab externis testibus, vt rhetorice: alix denique à principis philosophici, vocularū ambiguitate, & impostura obarrata. De quibus cum iam differuerim (idque illorum qui eis vtuntur, exemplis propositis) operæ precium videtur nunc in tertio hoc commentario, numerum & substantias facultatum docere, numerumque etiam atque discrimina eorum quæ illis accidunt. Sans autem mirari non possum, videns Chrysippum, qui deberet ostendere, animam rationalem in corde domicilium habere (est enim hoc illius dogma) sese nimis anxie torquentem, vt tum rationibus, tum innumeris poetarum exemplis (quæ breuitatis grana præterea) irascibilem facultatem, perturbato rubisq; obnoxiam, in thorace habitare demonstraret: id quod ipsamdem est à veteribus demonstratū: quod quidem feruorem innari caloris aliquem in corde per iracundiam oriri dicunt: cuius ratione accidit, vt tota facies infletur, corpus vniuersum rubefcat, incallescaturque, & vehementer cor vnā cum animantis arteriis subsiliat: quæ omnia pulchre describit Plato in Timæo. Ad hæc vero, cum debuisset Chrysippus, quæ suam quidem fouent sententiam, ea tantum testimonio poetarum eligere: quæ evertunt autem, & labefaciunt, explodere: ille sanè ex quo omnium meminit: imò verò maxime præcipua, & quæ ipsi patrocinebantur, omisit. Qualia sunt illa:

*Iuppiter eximit tunc ipsi ex pectore mentem.* &

*Consilium Neptunæ meum, hoc in pectore nasci.* &

*Non mihi stat solis sententia pectore.*

Hæc igitur testimonia sola, & similia alia, quæ rationalem vim in corde sitam esse portendunt, scilicet conueniebant Chrysippum, si omnino testibus litem dirimere statuebat. Nam numerosa illa quæ adduxit, tamen vera sint, eius tamen prioris opinionem deiciunt, præsertim quæ iracundia manifestè ad veritatem facit rationem: veluti hæc sonant:

*Pectore sed ferens ipsam cor intercepta ira:*

*Suffert & hoc cor, non quæritur aliquando testis.*

Hæc igitur quidem Vlysem ad se dicentem introduxit Homerus, cum ob ea quæ ab ancillis domi agi videret, calor in corde ipsius efflueret: & animus, siue iracundia, ratione devicta, ad inceptum mulierum punitionem, ipsum iam vi præcipitem actura esset. Nam quam eques ad equum, aut venator etiam ad canem, rationem

obtinet, hæc ratio ad animum, siue iracundiam. Etenim imperare in omnibus & prævalere usus est, id quod natura præcellit: equitem sanè equo, venatore rem autem cani, necnon iracundie rationem. At non semper accidit, vt tale coniugium, lege administraretur natura. Verum quoniam admodum equus, nonnunquam refractarius & contumax, non pro, decore clarus, iuseflore virtum imbecillitate, aut equitatis scientia ignorantia victum, simul secum rapit, trahitque longius: sic iracundia effrenis, & ad præcipitem viam ductam erumpens, rationem intercedum imbecillitate, ignarāque, vnā secum solet præcipitare. Si igitur robur suennāque habet, vincet nimis: & ratio itam, (quale exemplum in Vlyse proponitur) & auriga equum. Sin autem aut alter vtro, aut vtroque priuatur, periculum ibi est, ne id quod præsummus est, à deteriore vincatur: id quod certè in Medea contingit. In qua quidem, priusquam filius occidendis admoueretur uoluptas manus, diu multumque ratio telicitata, cum iracundia est. Nouerat eum quim impium facinus perpetraret. Ceterum postea tandem à perturbatione devicta, ipsi iracundie concessit, dicens:

*Non equidem cuiusmodi faciem medæ,*

*Sed feror iracundia consilium meum.*

Non ut itaque magnitudinem malorum, quæ irrat perpetratura, à ratione edocita. Versum iracundiam longè fortorem esse ratione ait, ac propterea se ab illa violenter ad scelus perpetrandum abduci. Vlyses autem contrā, ratione iracundiam coërcuit. Super igitur in alio irascibilem animæ partem ratio adeo superat, vt ne pugna quidem vnquam ipsi inter se oriatur, sed hæc dominetur, illa obtemperat: quod sanè us adeit, qui ad summum philosophare pervenerunt. Rarius iracundia subinde ira rationem vincit, vt imperet, ac ducat perpetuo: quem admodum in malis barbaris, & pueris natura iracundia, necnon in seruum non paucis, & hominibus belluinis videre licet. Est quum ne alterum quidem vique adeo valens sit, vt statim alterum trahat: sed aduersantur invicem, pugnantque, & temporis spacio alterum vincit: vt in Vlyse quidem ratio, in Medea autem iracundia. Quas animes aut partes aut facultates maxime inter se differentes, Chrysippus quum in vnum confundat, carum tamen Vlysis & Medæ meminit, qui eviderent ipsius opinionem subvertunt. Taceo etiam Chrysippum, qui leonibus iracundiam ademit, carmen illud Tyrtæi inter alia adducere, Leonis animum continens in pectore: quod leonibus maximam interesse iracundiam suadet. Et quum pronunciet, ideo nonnullos vocari excordes, quod vniuersi homines animæ principatum in corde statuunt: miror sanè quod non intelligat, nullum solidum ad imprudentē, excordem dici sed illos quidem omnes, vacuos cerebros: meniculosos autē, excordes: sicuti & evisceratos eos, qui nullo affectu mouentur: omnibus nimis putantibus, in cerebro quidem rationē, in corde iracundiam consistere. At quia tertio quoque visus iecur exurit, in quo appetitio animæ vis consistat, hinc etiam

*Rationi præfere animo, vt equo præfere ratione equo.*

*Medæ faciem.*

*Medæ iracundiam, superat rationem.*

*Rationi præfere iracundiam, ut in quibus ad summum philosophare pervenerunt.*

*Cerebros vacuos, excordes, evisceratos.*

*Iecur iugum, in animæ appetitionem.*



commodationem quandam propriorum motuum inesse oportet, si homo in totum ornari anima debet. Quas quidem tres animæ facultates Euripides in Medea vehementissimas esse describens (appetitric enim ardentissimus ille amor quo Iasonem ardebat irascibilis, immanis eius furor in liberos: rationalē denique, suadela qua se ipsam à tanto scelere dehorrabatur, sans avndē declarant) eam magnis visceribus donatam fuisse ait. \* Quamquam neque Euripides, neque vilius alius poeta (quorum testimonia præter motum recitare, me Chryssippi garrulitas cogit) imò vero neque ipse etiam Hippocrates, omnium medicorum calculo, præstantissimus, quemadmodum neque Plato philosophorum princeps (cuius nec opinione sectatores Chryssippi superare vniquam poterunt, nec imitari demonstrationis ornatum) de proposito placito fidem facere possit, citra demonstrationem. Chryssippus autem cum nullius demonstrationis meminerit, interim non erubescit Tyræum & Stesichorum testes nobis citare: quos si etiam viuos aliquis interrogaret, an de horum dogmatibus scientia ambigerent, farentur vtiq; voce vna, nihil se ipsorum sensisse: ipsi potius à Chryssippo nonnulli discere, quam de illis demonstrare (vt arbitror) mallent. Ratiocinari igitur, & quæ dicantur considerare, item pugnam, aut consequentiam rerum nouisse, rationalis facultatis (quæ cerebro inest) est opus. Ob cōvicia autem, aut minas, neque irasci, neque esse dolere, aut mori (quæ cordi luere) est proprium. Etenim dum ea quæ in homine sunt, convenienter admistrantur, cerebrum quidem imperat: cor autē

re conatur, hinc figmentum illud habuisse originem dicens, \* quod artes quidem vniuersæ concipiantur & consistant in corde: à ratione autem per caput, hoc est, per os (quæ capitis particula existit) emanant sermone. Ceterum (vt figmentum fecit interpretemur) quemadmodum cordis corpus virtute sua distentum & contractum vicissim, proprias materias attrahit, expellitque: pari modo cerebrum, vbi statuerit spirituum animale, in suis contentum ventriculis, particule cuiuspiam transmittere, motu ad id idoneo incitatum, distribuit ipsum. Hunc autem spiritum qui in ventriculis ipsis est, fortassis quidem paucum, etiam venæ ad ipsos pertinentes generant: copiosissimum verò & principalissimum arteriæ, plexum reticularem, qui ad cerebri basim est, perperantes, suppediant, quæ à corde sursum feruntur. Quare si quis fabulam veris velir connectere, in partibus inferioribus prudentiam conceptam (hoc est, animale spiritum) in capite natura perfici \* dixerit, præsertim in vertice: quandoquidem in eo medius & principalissimus cerebri sinus habetur. Verum si scientias demonstrationes sequar, omisisset Chryssippi fabulas, etymologias, declinationes, declinationeq; capitis, manuum motiones, laboriorumq; figuras, vna cum molliculis, & aliis idioris, vniq; veritatem ipse invenisset, nec nobis perisset tempus, ostendentibus ipsum nihil ex his quæ adducit, iuvare.

### GAL. DE PLAC. HIP. ET PLAT. LIB. III

**A**T verò vbi Chryssippus affectum definiens, cum esse ait irrationalem, & præter naturam animæ motum, hoc est, relictantem rationi: tectē sanē ipsum qui in affectu est motus, ab iuanis in irrationabilibus distinxit. Mouetur siquidem lapis & lignum, sic tamen vt nō relucētentur rationi. Cuius enim vti quaquam interest vt obtemperet, sequaturq; rationem, hoc quomodo repugnare rationi poterit? Merito itaq; id nō vti ratione dicitur: sicuti relictant rationi, quod naturā quidem habet sequentia, obtemperandiq; sed iaterim præter sui naturā, alio modo fertur. Vnde liquet, nec inanimato cuiuspiam, neq; irrationali animanti, affectū inaffici posse animale. Perdecet etiam ab erroribus affectus ipsos distinguit. Quādoquidem errores, praua sunt iudicia, & ratio veritatem mentis, implicitiq; erroris. Affectus contrā, nullum quidem erratū, neq; prætermisum in ratiocinatione: sed est animi motus rationi inobediens. Nam qui vt patram seruet, liberorū virū cōtemnit, vel iugulandos tradit, non est in imaginatione id facit, ac ratiocinosi vltus. Medea autem, quæ sciebat qualia perpetraret flagitia, non errore, vt ille, sed perturbacione ducta, irabebatur. Quin etiam, vbi eliceret currentem, qui ne si sistere quidem velint, statim id possunt, Chryssippus meminit, aperte illo exemplo aliam vim præter rationalem, nobis possit ob oculos, à qua affectiones ipse absoluntur. Etenim eorum qui per acclia currunt, nulli adeit ex difficultate

Cerebri motus duplex. Spiritum animale contentum in ventriculis cerebri. Spiritum animale partem à vena spiritus partem & præcipue ab arteria. Ratiocinatio placito ad basim cerebri. Ventriculus est vterque principia spirituum, vterque in seipso caput.

Rationi vniuersi, quæ sunt dicenda. Affectus animalium non possunt inaffici inanimato abesse. Erroris sunt praua iudicia. Affectus est motus animi, rationis inobediens.

Corruptio per acclia, declina. & plana. Confusio.

Medea fuisse magnam deinde irascibilem, ait Euripides, quod possidet tres illas animæ facultates vehementissimas.

Hippocrates Placitum, eam.

Rationalis facultas est, quæ ex rebus inest, quæ ex rebus inest, quæ ex rebus inest.

Cerebri esse originem nervorum, quæ motus voluntarij & sensus sunt instrumenta. Cor esse arteriarum principium.

Cerebri affectus symptomata. Cordis affectus symptomata. Arteriarum placentia animalis facultates diversæ in vno corde constitutæ. Chryssippi de partibus animæ opinio. Appetitrix à nimium inest iuvare. Tyræus apud iosephum legat excedit à voluntariis.

Minerva ex suis cerebro fuisse, ait, fuisse poeta.

60



*Curritur per  
accidens, delin-  
ens, et plana,  
consideratio.*

sistendi: sed iis tantum, qui per planam quandā  
aut declivem feruntur viam. Quippe composita  
inest ipsorum sanonis causa: una, tanquam ani-  
malium, quæ animæ impetu moventur: altera,  
tanquam inanimatorum corporum, quæ corpo-  
re inclinant. Ceterum qui in plana regione re-  
toriorum corporis inclinationem inter curren-  
dum molitur, sistendi potens est: & sui iuna: qui  
verò in anteriori partem, vniq; ab illa impedi-  
tus. Quæ de causâ hoc passio omnes currit, ab  
ipsâ rei nativâ edocet, corporis inclinatio nem  
in anteriora, celeritati motus conferre. Quem-  
admodum ignitatis, qui nudi à corporis ponde-  
re ad motus celeritatem iuvantur, in promptu  
est ut simantilis verò quæ ex duplici causâ celeri-  
tatem generant, non amplius voluntas est satis:  
eodem modo in animi impetu, quum ratiocina-  
tio sola causam habuerit, promptum est propter  
ipsam cessare impetum: vbi verò aut iracun-  
dia ei, aut cupiditas quedam accessit, quæ sunt  
vires irrationales, & corpora gravitatis per simi-  
les, statim quidem nequaquam posse consistere,  
verisimile est: estis itoris: ipatio forte hoc quo-  
que fiet, quemadmodum in currentibus. Nam  
quum ratiocinatio, & iracundia, movent ipsam  
impetû possint, si quidem à sola ratione fiat, &  
compelescere ipsum, & rursus excitare sola volun-  
tate licebit. Sin ab iracundia quadam & cupidi-  
tate, quum illæ cessaverint. Sin ab utriusque o-  
perantibus fiat, ratione simul, & facultate qua-  
dam irrationali: ratione quidē renitente, quod  
valentius est: propeccet: simul autem concurren-  
tes, nunquam cessabit. Quocirca affectus ratio,  
quum quæ ille facit, etiam ratio opinatur: quem-  
admodum in interperantibus & protervis ho-  
minibus, qui summum bonum in voluptatum  
frustione collocant, vltro ratio ipsam cupidita-  
tem sequitur. At renuit ac repugnat affectus ra-  
tionem dico, quum homo non opinatur propo-  
sita voluptatis frustione, honestum aut bonum  
esse: trahitur autē quodammodo ad eam,  
propter valentem appetitum virtutis motum.  
Verum si ratio superaverit, talis homo tum sui,  
tum suorum affectuum continens, & est, & di-  
citur. Sin autem cupiditas, contrariam huic ap-  
pellationem sortitus, incontinens nominatur.  
Quum verò à ratione sola ad suaviū vsum du-  
citur, talis vocatur temperans, hoc consilio ea  
deligens, non ut fruatur, sed ut iuvetur: quem-  
admodum etiam protervus, qui à sola cupidita-  
te ducitur, ratione tanquam famulo quodam  
eam subsequente. Eiusmodi ergo causam, im-  
petus animi exicantium, complexui attestatur  
etiam Chrysippi exemplum. Etenim adversus  
accidit currens, sola vi rationali ducuntur. Qui  
autem inuisi feruntur ad precipitium, irratio-  
nali: quam sanè corporis esse pondus diximus:  
in declive currentes, utique: perinde ut qui in  
plano currunt, si prorsum tendant. Nam si re-  
nirantur retrorsum, current quidem alius mi-  
nus, sed vbi voluerint, sistetur. Quare nihil Chry-  
sippus vniq; ad definitionē expositionem veteri-  
bus contrarium pronuntiat. Maxime autem ab  
eis recedit, ac sibi met adversatur, dum affectus  
esse iudicia existimat. In summa verò, Chrysip-  
pus semper veluti in vnda fluctuat: nunc quidē  
sine omni ratione fieri dicens affectus, nunc ad  
solâ rationale pertinere animæ facultatē: ac pro-  
inde eos, iudicia quum sint, irrationabilibus ani-  
malibus non inesse. Oblitus autem esse videtur  
interim, quod à virtutis oppido quidē decenter af-  
fectus ipsos distinguat. Ratio siquidem, etiam  
ex Chrysippi sententia, siue sana & vera, siue pra-  
va & mendax existit, ita secundum ipsam  
mouetur, nunquam in affectum incidit. Quan-  
doquidem secundū veram, recte & venuste mo-  
uctur: secundum falsam, pravè & vitiōse. Vbi  
enim ratio dux est, aut virtus sequitur, aut virtū:  
affectus nunquam itaq; putare voluptatem bonū  
existere, quemadmodum Epicurus existi-  
mabat, peccatis, vitiōsis & falsis ratio est: omnesq;  
actiones & particularis animi motus, qui volu-  
ptatem, tūquam finem respiciunt pravè, pravos  
sine necessitate, & aberrantes facit, ac vitiōsus:  
non tamen iam affectus quoque. Quippe pro-  
prium affectus hoc ipsum est, ut anima citra ra-  
tionem moueatur: id quod pulchre ait scriptis  
Chrysippus. Quum aut nihil sine causa oriatur,  
ratio verò minime prestat affectibus, iustum est  
iam nobis Chrysippus respondeat, quidnam af-  
fectus ipsos producat. Nos siquidē affirmamus,  
interim quidem ab irascibili, interim ab appeti-  
toris animæ facultate illos ducere originem. At  
Chrysippus nulli firmiter harrens sententiæ, mo-  
do eos prater rationem orti ait, modo secun-  
dum rationem, modo temerè atq; à casu proce-  
dere: quocirca reprehensionem vltro passio effu-  
gere nequit. Nam si dicat affectum insultum ab  
ipsâ ratione oriri, discernere iam vitium ab af-  
fectu non poterit. Si verò rationem adimar, in mo-  
tum quandam causæ expertem incidit: quum li-  
ceat illa ex facili ambas absurditates vitare, si cō-  
sistatur irrationales quasdam facultates in ani-  
mâ, affectum ipsius causas existere. Quanquā  
vlti ea quæ nō recte homines faciunt, partem qui-  
dem ad pravū iudiciū refert, partim ad infirmia-  
tem animi, imbecillitatemq;: quemadmodū vbi  
rursus iis quæ recte administrant, rectum iudi-  
cium cum bono animi robore præesse aut illis fa-  
nē diuersam à ratione cantrice vim quandā esse in  
animis hominum, causam talium affectuum fa-  
tere, velut nolit, cōpellitur. Si quidem ut iudiciū,  
facultatis rationalis est opus: ita firmiæ, robur  
virtutis, facultatis est diuersæ à ratiocinatione.  
Porro ut scientiam habere (secundum quam, ex  
Platonis sententia, nemo vlla in re potest hallu-  
cinari) non est affectus: ita neque obliuio illius  
affectus dicenda est, sed infamia ponus, aut igno-  
rantia. At si quis iracundia, aut voluptate dece-  
pserit, ab iis quæ initio statuerat recesserit, im-  
becillis quidem huic anima & infirma est: mo-  
tus autem ipsius, est affectus dicendus: ut con-  
stat in Menelao, qui quum Helenā occidere de-  
creuisset, eimq; distincto gladio invasisset, pro-  
pius accedens, ac mamma illius caudissimā  
conspicatus, atromitūsq; ob pulchritudinē eius,  
propter infirmitatē imbecillitatemq; animi, nō  
solum gladium abiecit, sed mulierem etiam  
oculatus, etque seipsum mancipium obtulit, et  
tra iudicium, citraq; rationem, impetu ad cōtra-

*Inclinatio nem  
corporis in an-  
teriora, celeri-  
tati motus con-  
ferre.*

*Impetum posse  
et à ratione, et  
ab iracundia  
moueri.*

*Ratio quando  
concurrentes af-  
fectus.*

*Ratio quando  
vincitur affectus.*

*Concurrentes qui  
ducitur.*

*Incontinentes qui  
vocatur.*

*Temperans qui.*

*Protervus qui.*

*Irrationalis a-  
nimæ in corpore  
in pectus con-  
sistat.*

*Affectus distin-  
gui à virtute.*

*Ratione dux,  
venit aut vi-  
tium sequi: af-  
fectus non itaq;  
voluptatē non  
esse in bono po-  
nendum.*

*Affectus pro-  
prium,  
nihil sine cau-  
sa oritur.*

*Ratio non præ-  
stat affectibus.  
Affectus vnde  
proferuntur.*

*Remota  
quidam irra-  
tionalis in ani-  
mâ, affectuum  
causas existit.*

*Scientiam ha-  
bere, nullo in  
re potest hallu-  
cinari.*

*Menelai imbe-  
cillitas, multi-  
tudo animi.*

ria ductus, eorum quæ initio decreuerat. Quem admodum igitur in Medea iracundia oppressit rationem, eamque ad perpetrandum scelus pertraxit: sic animam Menelæ ipsa decipiens captivitas, revocavit illam ad instituto. Quæ quidem exempla ab ipso Chrysippo adducta, maxime illi adversantur, quum ex eis constet, res facultates diutius in esse hominibus: nec esse affectus ipsos iudicia, ut qui præter iudicium oriantur. Nec verò à veteri placito illa carmina abhorrent, quæ, ut suam opinionem teneatur, citat etiam de animantibus.

Veneri speridem advenit levat nesci.

Si namq. cogit, amplius intedere appetit.

Advenit autem amor, magis preceat.

Quibus postea subdit, affectus ipsos amantium declinare semper rationem, tanquam intempestivum in creporem. Reperies & alia innemera in libro De affectibus, ab eo prodita, pugnantia quidem his dogmatibus, quæ ipse statuit: consentanea autem & manifestò apparentibus, & opinionioni Platonis. Quum autem Chrysippus dixisset, tristitiam esse opinionem recentem presentis mali: ab eo Posidonius exigit causam, cur mali quidem opinio, si recens sit, tristitiam inferat: inveterata autem, nequaquam, aut non pertinet ad angustiam. Quam causam, quod eam ignoraret Chrysippus, ipsimet Posidonius reddens, ait, omne immundum & peregrinum subitò irraens, animum permurture vitiarum verò

Iam verò sunt qui nolentes plorant, lacrymas colubere impotentes. Sunt contra, qui plorare cupientes, protinus cessant, ob motiones affectibus subditas, vehementer ira inherentes, ut non evincantur à voluntate: aut ita omnino cessantes, ut ab ipsis excitari nequeant. Quoniam causas investigantes, invenimus quo pacto ratio cum affectu pugnet, atque ab eo differat, similiter scrutabimur animæ facultates. Consuetudines itaque & tempus, ad affectuum morus plurimum posse videntur. Consuetudine quippe mollescit animæ irrationabilitas, in quocumque educetur. Tempore autem affectus conquiescunt, repletis irrationabilibus potentibus animæ, iis quæ antea desiderabant. At rationales cognitiones, iudicia, & summa animæ severæ omnes, & artes, neque difficiles ad dissolutionem fieri apparent propter solum tempus nudum (quem admodum consuetudines secundum affectum) neque transponi & cessare, sicuti tristitia, aliiq. affectus id genus.

### GAL. DE PLAC. HIPP. ET PLAT. LIB. V

Quum igitur sectatores Chrysippi ostenderint, quænam admodum ipsi quidem existimant, vniuersos affectus in corde consistere: ut autem veritas habet, solos eos, qui circumscribibilem facultatem versantur: ac deinde assumpserint, vbi cum animi affectionibus sint, ibidem quoque rationatricem ipsius facultatem haberi: ita demum concludunt, in corde rationatricem existeri. Nos verò, quod inde ra-

cundia nascatur, vni cum ipsis fatemur: quod autem in loco eodem detestantur vis irascibilis & rationatrix, non item: neque quod vnius opera facultates existant. Porro affectum animi, monitionem quandam esse præter naturam, rationis expertem, quæ consilium animis non innascatur, non veteres tantum, sed Chrysippus quoque fateatur. Est autem inter animi constitutionem, & eam quæ corpori inest, quædam similitudo & proportio. Quare Posidonium laudo, quod prauorum animas, quum extra affectus constituerint, sanis corporibus similiter se habere prædicat: non probo autem, quid eiusmodi constitutionem morbum nominet. Oportet

bar nanque, si rectè sapientium animas vellet assimilare, dicere, eas similes esse corporibus iis, quæ ab affectibus sunt immunis. At providorum, bono habitu prædine. Medioerum verò virorum, sanis sine bona habitudine. Vulgarium & iniquorum, iis qui vel ex occasione leuissimam morbos incurrunt, irascendum denique, aut furibundorum, aut lugentium, amantiumque, aut obfessorum aliquo affectu, iis quæ iam egrotant. Siquidem quocumque tempore vel dominiat, vel ad aliud mentem hi transferunt, extra affectum feruntur. Paulo post ubi ipsorum meminerint, in constitutionem perveniunt ætrem sanis infolubis similem. Quem admodum autem febriunitas corporis, est comoderano simplicissimarum etus particularum, quæ iam elementa vocamus:

Tristitia quid.

Tristitiam esse inferat opinio recentis presentis mali in tristitia aut, nequam aut non perinde.

Inmodicum animi erroris subitò, permurture animi, confusum vero, non quodam.

Immunis ab affectu esse, quo non præstat, tanquam præstat, ut non.

Anaxagora dicitur horum.

A sapiente aliquo proditus ego,

In curas animos & calomias redidi.

Atque eodem me proposui à patria mea ad mores

Immortales, & vias melius ditas.

Vi si quid patitur ex ipso quæ putarent

Aliquando, animos non morderet recentia.

Eodem pertinent & illa.

Si bene primus esset admodum dicit mihi,

Et non diu uiciner in laboribus,

Vorsum reverter, ut pulvis iugo reteret

Subdita, exardescere frenum serpentis nuper.

At nunc malis obdura, & occidit.

Hæc interim mollescit longo tempore,

Mali non præstat mihi.

Affectus fieri tempore, nihil opinio ipsorum permanens.

Affectus quomodo componantur.

Tempore itaque affectus cessant, etiam si opinio eorum & iudicia permanent. Ut enim pars animæ obnoxia affectibus, peculiaria quædam concupiscit appetibilia: ita etiam ipsi, quum accidunt, repletur & saturatur, atque in hoc ipsum morum sistit, qui animæ imperi præerat. Nihil autem tam clarum est, quam vires quædam in nostris animis inesse natura conspicientes, hanc voluptatis, illam dominij & victoriæ

Consuetudine mollescit animæ irrationabilitas. Tempore affectus conquiescunt.

Chrysippi & Platonis de sensu.

Affectus quid.

Animi constitutio rationis corporis dissimilium est se similes.

Animarum cum corporibus comparatione de corpore.

Sanitas corporis quæ.

Sanitas animi.

Morbus animi.

Anima partes  
sunt, irascibilis,  
passiva, &  
appetitiva.  
Chrysippus error  
duplex.Anima & ratio  
non sunt idem,  
quoniam ratio  
in anima  
contineatur.  
Idcirco ex pro-  
pria constituitur  
Chrysippus.Pulchritudo  
corporis, in par-  
ticularum cum  
moderatione  
constituitur.  
Sanitas est ele-  
mentorum cum  
moderatione.  
Pulchritudo a-  
nimae ad docen-  
tem non motum  
refertur, ut corporis.  
Ad audientem  
autem ad affec-  
tum refertur.  
Anima nostra  
constat ex par-  
tibus omnino  
inter se differenti-  
bus.Partis irascibilis  
affectus, quoniam  
ad iram pertinet.Anima multi-  
tudo est, quoniam  
temperamentum  
natura  
transcendit, et  
si animalia  
qua laetiora sunt,  
& calidiora  
sunt, laetiora in  
veteribus, differunt  
in moribus suis.

nam: eodem modo esse erit animi sanitas, com-  
moderato quodam simplicium particularum in-  
fusus. Quin etiam morbus animi similiter immo-  
derato quodam est, & discordia ipsarum harum  
particularum inter se, quarum comoderatio e-  
rat animi sanitas. Sunt autem hae particulae iux-  
ta Platonis sententiam, irascibilis, rationalis, &  
præter has etiam appetitiva. Etenim concordes  
des invicem, & in nullo discordantes autem & con-  
tinentes, morbum. Vbi autem Chrysippus ait,  
unamque partem esse, per quas ratio in ea constituitur  
intelligens animam, notandum & præsumptio-  
num quandam collectionem existere, deperit  
errare. Primum enim non animi, sed rationis  
has dicendum erat esse particulas. Quippe non  
idem est anima & ratio, quum hæc in ea con-  
tineatur. Quod si hoc etiam aliquis irreprehensum  
permiserit, certe noniones & præsumptio-  
nes, non particulas animæ, sed actiones animæ  
dicere oportet. Nihil autem ex propriis functio-  
nibus constat. Ad hæc etiam Chrysippus sanitatem  
animæ & pulchritudinem in unum atque idem  
confundit. Porro corporis pulchritudo, in parti-  
cularum comoderatione (qualis in Polydety  
regula certatur) secundum omnes medicos philo-  
sophosque placet. Sanitas vero, elementorum,  
quæcumque illa sit, inter se est comoderatio. Ceterum  
animæ pulchritudo, ad moderatos ac de-  
centes ipsius animæ motus (qualis est Platonis  
sententia) refertur: ad immodicos autem & effe-  
ratos, turpitudinem eiusdem. Si quidem in comoderatione  
motuum particularium, pulchritudo actionum  
est cognita: si vero turpitudinem in immoderatione.  
Quod autem anima nostra composita ex  
partibus diversis generis, & substantiæ &  
sede inter se differentibus sit, quodque innumeras  
vires fortiorum, Hippocrates et atque Platonis Pla-  
citur. Quare neque in una particula animæ, neque  
in una ipsius facultate, tum iudicia, tum etiam af-  
fectus fient, ut Chrysippus existimavit. Iam vero  
pueris multo plures & vehementiores quim  
adultis oborjuntur affectus: quum si nullo docti  
magistro, sed naturali ductu illi omnes ad volu-  
ptates declinantur, avertentur autem labores. Vi-  
demus enim ipsos & irascientes, & calcitrantes,  
& mordentes, & prævalere cupientes, ut nonnulla  
animantia, nullo premio proposito, præter ip-  
sam victoriam. Neque vero à ratione impetus  
eorum coerceri dicere possumus, ut qui rationem  
nequum habeant: neque quod non innumeris af-  
fectibus implicentur. At ubi processerint, quoniam  
ad honestum, naturalem quandam propen-  
sionem habent, & erubescunt peccantes, &  
iustitiam, aliisque virtutes amplectuntur, facientes  
plurimam secundum earum noniones: et si prius,  
quum essent parvi, ex affectu viverent, nullamque  
preceptorum ex ratione curam haberent. Ceterum  
animæ constitutiones, ex diversis corporis  
temperamentis oriuntur: quum videamus ani-  
malium, quæ sunt pectoris & calidiora sunt, omnia  
fortiori naturam trahere diorem: ut timidiorum,  
quæ sunt latius coxis, & frigidiora. Ac secundum  
varietatem regionum, hæc parum etiam moribus  
homines ad timorem & audaciam, vel vo-

luptatis laborumque studium, differunt. Quare, mea  
sententia, curatio animi affectuum, in nonnullis  
quidem prompta & facilis est, eo quod neque  
affectuum motus ipsi infirmo validi, neque ratiocina-  
trix pars, imbecillis natura & imprudens, sed  
propter infirmam præteritis consuetudines, id ge-  
nus hominum vivere ex affectu cogantur. Non-  
nullis vero difficilis, quum motus affectuum,  
qui ex corporis constitutione necessarii obve-  
niunt, magni & vehementes extiterint: ratiocina-  
trix autem facultas imbecillis, imprudensque.  
Huc: quippe veritatem in duplici oportet, ac  
affectuum motus retundere, probis institutio-  
nibus assuescentem. Sicut itaque & ab initio homi-  
nem ad optimum conformare oportet, ante om-  
nia quidem, ipsorum seminum, denique victus quo  
gravidus vitetur, ac præterea cibi, potus, exercitio-  
rum, atque ad quævis & somni ratione habita.  
Oportet autem (ut inquit Plato) pueros iam edo-  
tari, ideo etiam & minui, ut reddant partem ani-  
mi affectibus opportunam & irrationalem, mo-  
tibus comoderatam, ac rationis iussu audien-  
tem. In pueritia tamen exiguum & imbecillum  
& hanc ipsam rationem esse verisimile est: ma-  
gnam vero & valentem evadere, circa quartum  
decimum ætatis annum: quando iam dominari  
& imperare ipsam convenit, tanquam aurigam  
quendam pari conatorum equorum, nempe  
cupiditatem, iracundiamque, dum non valentes  
nimium sunt, neque imbecillæ, nec pigre, nec effe-  
rentes, nec contumaces omnino, aut indecoræ, aut  
contumeliosæ, sed in omne promptæ, rectæ sequi,  
tum obsecrare rationi. Huius autem institutio-  
nem, virtutemque, scientiam esse oportet rea-  
rum naturæ: quemadmodum aurigæ, speculatio-  
num artis aurigandi. Nam in irrationabilibus  
animæ viribus, scientiæ non solent innasci, sicut  
neque quisque habet sanæ propria virtus, ex con-  
suetudine quadam irrationali proficiatque, au-  
rigis autem ex disciplina rationali. Quemadmo-  
dum igitur irrationali animæ partium necesse  
est irrationales quoque virtutes esse, ita ratiocina-  
lem, solius ratiocinatricis. Quapropter merito  
illarum virtutes, facultates dicendæ sunt: solius  
autem ratiocinatricis, scientiæ. Quum itaque in  
nobis alia potior sit animæ pars, alia deteri-  
ori: qui potior sequitur, consentaneam naturæ vi-  
tam dicetur agere: qui deteriore, repugnan-  
tem. Hic enim ex affectu, ille secundum rati-  
onem, vivit. Quum igitur hæc tres propensiones  
nobis natura insint: ad voluptatem sanæ, pro-  
pter appetitum: ad victoriam vero, propter  
irascibilem: ad honestum denique, propter rati-  
ocinatricem animæ facultatem: Epicurus quidem  
infirmæ animæ partem tantum proportionem con-  
spexit: Chrysippus autem, optimæ, quam dixerit  
peculiariter nos affici erga solum honestum. At  
vniuersas tres proprietates perspicere solis ve-  
teribus philosophis licuit. Porro qui ex affectu  
vivit, hic irrationalem & attonitam animæ par-  
tem: qui vero sine affectu, rationalem atque divi-  
nam sequitur. Quare affectuum causa cognita,  
plurimum ad remedium invenionem confert. Idcirco  
Damon musicus quum esset apud tibicinem  
Phrygium modulantem, ebriis quibusdam

Hominem ab  
nature, que pa-  
cis fructus ve-  
ritatem firmare  
atque instituire  
oportet.Pueri rationem  
ipsam esse imbe-  
cillam: valentem  
autem evade-  
re, circa quar-  
tum decimum  
annum.Scientiam non  
innasci irrationa-  
libus animæ  
facultatibus.Irrationalem  
animæ partem,  
irrationales  
virtutes effrica-  
tionalem autem,  
solum rationis  
naturæ.Vivere qui ex  
affectu, & qui  
secundum rati-  
onem dicatur.  
Propensionem  
quibus motus  
naturæ,  
sunt tres.Affectum cau-  
sa cognita plu-  
rimum ad re-  
medij inven-  
tionem confert.

adoleſcentibus, & inſana quædā peragentibus; Doncū canere iuſit: illi verò ſtatim à motu inſuſſo ceſſant: non quòd opinionis rationnatricis facultatis docerentur à canionibus tibicinæ, ſed quòd affectibus obnoxia pars animæ, quæ eſſet irrationalis, excitaretur, mitigareturq; monibus irrationabilibus. Siquidem irrationali, ab irrationabilibus & còmodum & noxa obvenit: rationali verò, à ſcientia bonæque diſciplinæ. Verùm pars animæ affectibus obnoxia, temporis ſpatio partim repletur propriis cupiditatibus, partim diuturnis laborat moribus. Quapropter amborum nomine ea conſeſcente, & mediocriter mora, ſuperior eſſe ratio iam poſteſt: quemadmodum & equo crenis inſeſſentem violentem excitante, deinde elaboriſe ſummiſſum, ſi, præterea ſanarò uſque concupiſcit, ruſſus aunga ſuperior evadit. At Chryſippus neq; diverſam animæ partem affectibus deditam, à rationali arbitratum: & affectus tollit à brutis animalibus, quum tamen libidine & iracundia regantur. Poſidonius autem reſtiſus, quæ animantia agere moventur, & ſtirpium modo adhaereſcunt petris, ea cupiditate ſola gubernari pronuntiat. Reliqua verò bruta vniuerſa, vniſq; facultatibus vti, & appetitoria, & iracibilia. Hominem autem ſolum, tribus: quippe rationale principium, hunc ſumere. Quòd igitur pars animæ appetitoria, diverſa ſit à rationatrice, hinc colligere licet, quòd pueri dum ſumus, uſitatorum animalium promptè ad repletionem ſentimur, neq; an id conducatur, aut obſit, conſideramus. Aetate verò & ratione provecſi, ſæpe ne bibimus quidem omnino, vbi perſuiſum habuimus, ex potu noxam ſubſecuturā: ſæpe minus quàm appetimus, ſi & hic copia obſcure eſt. Inrem aquam bibimus, vinum conſpicientes. Rationis autem expertes homines, ſimiliter inſanantibus atq; ſeris, neq; tempus expectant, neq; quantitatē, qualitatēve corporis inſpicere ſuſtinent. Quòd ergo nec ſeræ, nec infantes, ratione vrantur, etiam apud Chryſippum in conſeſſo eſt. At quòd vbi alia præter rationē ad fruendum uſque conſpicitur, alliciantur, modò aut, modò negat. Etenim irrationalis in nobis facultas, ad ſingula quæ deſiderantur, requerentem alliciarano retrahit, & inopportunā còmotionem continet, ac pugna frequenter vtriſq; valida inter ſe ſuboritur, evidentem indicans duplicem eſſe in nobis naturam facultatū invicem diſſidentium. Si enim vna eſſet ſola, quemadmodum in pueris, nihil fanè prohiberet intempetivè nos frui appetibilibus. Quemadmodum etiam ſi ſola eſſet ratio, nullum eſſet negotium, ſinentem non bibere, aut eſurentem non eſſe: neq; continens, neq; ſobrius, qui non bibit, nominaretur: ſicvni nec qui non vadit, niſi velit. Simentis itaq; nolentis autem bibere, anima, vna quidem ſcalulate, aut parte, potum conſpicit: altera verò, fugit, & averſatur. Vni enim & eidem appetere aliquid ſuggerit, non licet. At verò ratio iracundia, vti ſubſerniat & auxiliatur illi, perit de ac venatori canis, contra tertiam animæ ſpeciem, à natura tributa eſt. Quare vbi vitro ſequitur ratio appetentiam, conſequitur & iracundia

rationem. Vbi autem adverſatur illi, atq; reſiſtitur, iracundia à ratione ſtat, atq; illa ſere opem præcipue cum ratio ipſa ab aliquo vel intro, vel extrinſecus ſe affectu inveniatur, & vi compelli, mutant. Siquidem animum ſe inveniatur affectu, rationalis eſt facultas, eam autem, victiſi, animòſe propoſum exiſtit. Quum igitur appetitoria ſcietas, immoderate ad aliquid intrinſe, inuitam rationem eo ſecum aterat, amolibilis contrarietam rationis ſupprenat ſere. At vbi à nullo affectu iniuria putatur ratio, minime fanè iracundia eſt ſervetur, eui quilibet animi tunc corpus iuſte poſiſatur ab aliquo, vel algere, vel fameſcere, vel ſitire coactum. Unde loquit, iracundiam naſcitur à ſtatu præditam, opinionis rationis ſequi. Meri tamen quandocq; porebit, hæc quoq; præſe affecta, umongerat rationi monentur. Quòd fanè iracundia à ratione diverſa ſit, hinc docet Plato: quòd pueri, perinde vtriſq; maxime iracundi exiſtentes, ratione careant. Eodem ſiquidem modo iracundiam pueri, quo & ætate provecſi: hoc interſeſe diſcrimine, quòd luſane in multis, ratione continent iracundiam, quemadmodum illi generoſum canem, ſerocius proximis inſiſtentem aliquis paſtor: in pueris autem, nihil euiſmodi accidit, quemadmodum deſe in beſtis: quòd in illis quidem, nò dum, in hiis autem nunquam, ratio impetus animi inbibet.

# GAL. DE PLAC. HIP. ET PLAT. LIB. VI

de placit. Hippocrati & Platoni, lib. VI.

Si autem actio, motus quidam efficiens, hoc eſt, qui ex ſe exiſtit, affectus verò, motus in altero, ab altero, vti neceſſario ſæpe in vno ſubiectum cum affectu quòd conveniat. Nam à ſecante facta diſſiſio in eo quòd ſecatur, vna & eadem res quum ſit, ſecantis quidem à ſectio: eius autem quòd ſecatur, affectus eſt. Ita fanè & iracundia, actio quidem eſt iracibilia animæ: affectus autem, reliquarum ipſius duarum partium, & præterea totius noſtri corporis, quum ab iracundia violenter ad actionem ducitur. Atque hoc vnum eſt ſignificatum vtriuſque nominis. Alterum autem, ſi actionem quidem, motum quendam naturalem intelligamus: idq; primò à ratione: affectum autem, præter naturam. Etenim primaria ratione illa ſci à natura dictum, quæ velut ſcopia à natura amplectitur: nec ex alia quæ ſeſcopia, alia neceſſario ſequitur: Vt autem res magis innotet ex exemplis, cordis motus, \* qui in pulſibus quidem ſit, actio dicitur, qui verò in palſationibus, affectus: pro ſecunda huius dictioſis (affectus) ſignificatione. Atque ita non omnis pulſus eſt actio, ſed is tantum, qui naturalis exiſtit. Iracundia igitur & omnes animi affectus, actiones quædā ſunt, ſecundum primum ſignificatum. Quatenus autem efrenes & immoderate exiſtit, neq; ſecundum naturam, affectus eſſe dicitur, ex ſignificatione ſecunda. Qualis enim res in arteriarum motu magis eſt pulſus, talis in iracibilibus animæ motus, iracundia. Qualis ruriſus parvus pulſus, talis timiditas. Porro iracundiam ipſam frequenter alia duo

Bruta, libidine & iracundia reguntur.

Animalia quæ à quibusdam facultatibus diſpoſuntur.

Anima partem appetitoriam, diſpoſitam à rationatrice ex ſere.

Naturam ſecantem naturam in ſeſe duplicem.

Iracundiam eſſe ſi à natura tributam reſtuitur contra cupiditatem, non vero naturam.

Iracundia ſe naturaliter habet opinionis rationem ſequi.

Propter rationem rationem.

Affectus quid, affectus quid.

Iracundiam eſſe ſi actionem & affectum ſecundum naturam dicitur.

Affectus eſſe ſi actionem & affectum.

Primaria ratione quæ ſit à natura dictum.

duo sequuntur: saepe verò concupiscentiis, tanquā abstracta, compulsiq; iugalibus equorū instar, quorum alter valenus impellens, alterū secum trahit, vñ cum auriga & curru. Tunc enim in ef freni equo motus, actus & affectus eius dicitur: priori quidem significatio, actio (motus enim ex seipso est) secundo autem, nō actus, cū sit motus ei prater naturam, sed iam affectus. Aurigæ verò motus, nō secundum naturā quidem significatum actio est, sed secundum utrumq; affectus: cū neq; ex seipso, neq; secundum naturā ei ad sit motus. Iam verò facultates illas tres corpus nostrū regentes, rationalem, irascibilem, & appetitoriam, tum species, tum partes animæ recte aliquis nominant. Quarū appetitoria quidem, bel lue varig, multipinū: irascibilem autem, leoni homini deniq; rationalem Plato interdum comparat. Quāvis idem in Phaedro, priores quidem illas equinam quandam formā referre ait: aurigam verò, tertiam. Quamobrem Plāto locis ea esse distinctas, & substantiis permultū variare arbitrat, meritis illas tum species, tum partes appellat. Aristoteles autem & Posidonius, facultates eas esse vnius substantiæ ex corde proficiscētia, affirmant. At Chrysippus, tanquā ad vñ substantiam, ita & ad vñ facultatem ratio cinatricem diducit tum iracundiam, tum ipsam concupiscentiā. Porro in stirpibus solam speciē appetitoriam habitare, professus est Plato: in diis autem ratio cinatricem. Irascibilē verò in hominibus creatam esse ait, rationali animæ auxiliatricem, tanquā canem quē endā, cōtra multiplicē illam & agrestem ferā, cupiditatē. Plato item nos docuit, quoddā quæcūq; fuerit species, hinc, pars nominari etiam posse: nō tamen quolibet pars, statim species erit. Cū igitur ex iis quæ superius à nobis sunt tradita, constet iam ratio cinatricem quidem animæ partem fontēq; voluntariarū actiōnū consistere in cerebro: in corde autē tum irascibilem, tum pulsificam facultatem (crenim si

lum: quod vniq; rumpirur quidem primū, mado re sensus in aërem converso: deinde protenditur iuxta rupturam superius quoddam tenue, & vtrobiq; molle: ac superior feminis portio ceu ad aërem, inferior in terrā vergit. Atq; hæc quidem continuū videntur augescere, ac semper ferri in quæ ab initio inclinabant. Processu temporis, si arboris cuiusdā magnæ sit semen, pars quæ in aërem fertur, caudex ipsius evadit: quæ in imū terræ declinat, radix: & utraq; portio variis scissuris diuiscatur, si multitudine arboris ipsum semen exiterit. Vnum itaq; principium generatio nis & incrementi omnibus stirpis partibus est locus ille, vnde sursum quidem caudex, minum verò radicis nascitur: ac apparet veluti ex loco quodam, virtus dispensans arborem, illinc procedere. Quale autē est animantibus or, tale stirpibus extremū radicationis videtur, osculis pluribus ex terra alimen tum trahentibus, fabricari. In hūc igitur arboris modum licet magnā arteriam cer nere, quæ caudicis instar ex corde procedens diuiscatur, altera quidem parte minore ac caput perreptans, altera verò maiorē per spinā sese de torquent: id quibus propagines omnī corporis arteriarū oriuntur. Cōtemplare rursus alterā arteriam ex ipso cordis sinu profectā, quæ in pulmōnes, nō secus ac radicis pars in terram, diffunditur. Quemadmodū enim ex terra per radice torū alimentū trahit arbor, ita ex pulmone cor per dictam arteriā haurit. Quare arteriā quæ veluti caudex apparet, maximā est omnium quæ in tota animalia habentur: quæ in pulmōnē inferitur, omnīū maximā est: quæ insibi existunt: ipsum verò cor, medium ambarū est, & origo facultatum eas gubernantiū. Constat namq; maiora minorum esse principia, sicuti & fontem, riuorum in quos dispensatur: quāvis nōnulli eō veniunt absurditatis, vt principia ea quæ post ipsum sunt, esse maiora existunt, decepti ob flumina, quæ exigua planē cū prope fontes existat, progressu augentur. Non videt tamē id sic accidere, quod in se alios decursus aquarū exceperint. Quippe nullū flumen ex vno procedens fonte, minus caput obtinet iis quæ subsequitur. Effer autē summa impudentia, aliud viscus à cor de statuere arteriarū principium, cū hoc solum viscus animalis corpore exempti, diutissimē naturalem functionē retineat, ceu initium motus tum sibi, tum iis quæ ab ipso proficiuntur, arte riis. Hæc autē ab eo segregatæ, aut funibus intercepræ, aut diuise sectionibus, vñ cum affectu ipso, motum etiam amittunt. Porro venæ quæ à iecore ad ventrem pertinent, similes sunt radicibus. Nam vt arboribus terra, sic est animalibus venter. Cæteri vena quæ truncus quidam existens, atq; à gibbus partibus hepatis orta, in superiorē & inferiorē corporis regionem excutrit. Cuius latissima portio est, quæ infra iecur descendit: minus autem lara, quæ sursum per septū transuerfum adit: his vero duabus mistor, quæ in cor inferuntur: quanquā si esset cor venæ causi, sicuti arteriæ magnæ, principii, maximā esset (opior) portio venæ ei cōnūa. Est itaq; rō venarum, tum sanguinis, tum nutritiis facultatis ini tiū hepatis: quod viscus in vniuersas corporis par

Arteria magna  
est, diuiscatur  
trig.

Arteria vena  
sa.

Cor haurit spi  
ritum à pulmō  
ne per arteriā.

Maiora mino  
ra semper esse  
principia.

Venter anima  
libus est, quod  
arboris terra.

Vena tana  
(quæ ab hepate  
nascitur di  
uisa, per septū  
transuerfum  
adit.)

Venter est vna  
venarum, tum  
sanguinis, tum  
nutritiis fa  
cultatis ini tiū.

tes benignum alimentum distribuit. Quod autē sanguis perficitur in leipate, argumētū sunt recrementorum purgatoria instrumenta, quæ natura illi fabricata est, reus videlicet, lien, ac rector bilis vesica. Nam quātū aliud alimentū excrementū, vel materiam quāvisquē a calore mutatz, ne cogitare quidem licet. At in corde, nequē aliud quoddam purgans instrumentum natura fecit, nequē aliū macinata est humorē. Similia namq̃ sanguis est, & qui in dextro cordis sinu, & qui in omnibus venis per totum animal cōtinetur: quemadmodū & qui in arteriis habetur, ei responderi, qui in sinu sinistro existit. Maxima facit fidem, nec nullū humorē preparare ipsi cordi, ad particulārē nutritionē (quemadmodū nōnulli putabāt) sed ipsum vniuersum eius speciem absoluerē, quod cum vna sit vena quæ ex iecore in cor procedit, alia nullā ferat ex altera ipsius cordis parte, quæ elaboratum humorem in totum corpus educat: et si alia quidam arteria inferat alia educat spiritū. Videtur quidē

neq; esse initium sanguinis totū corpus nutritū  
et opifex, neq; inftrum totius ipsius. Quā v-  
tē necessaria sit animantū vīte, ipsa sanguificatio,  
lūc dīcas licet, quōd cūm polimū vīvere, etiā  
si cibos venter non cōterat (interdum enim fū-  
cōs tantū, aut ipsū lac propinamus) nēcēssariō  
moriendū sit nobis, sanguinis generatione pe-  
rūnte. Quōd autem ipse venter non procedat  
ā corde, vel in ipsa in vitro factūm cōforma-  
tione, facīle percipere est: Omnes liquēdī secū-  
darium venter, quā vtero conceptū annectunt,  
propagines sunt vīte venter maximū, pro dū-  
tus ab hepate. Siq; videri cōstet, et, maximā vā-  
sā vicinorū esse principia. Quarū vītarū ex-  
tremā, velū radicā in vitro, sanguinem ex eo  
ad iecur, reliquū totius sēpis principū, hūmū  
videntur transimīre. Vena stāq; procedēte ex  
iecurē, venarū omniū quā secūda pēripiant,  
initium exhibet: sicut dī arteriarū, arteria quā  
ad cor trahit oriūtur. Etenim lūc quōq; omniū  
quā in secūda sunt, propriā facultatē sup-

Cui neque  
 initium operis  
 sanguinis, neq.  
 iustitiam  
 habet.

Vivere licet  
nobis, etiam si  
viter ebor ni  
constrat: per  
ant ante fan  
guificatione.  
non dico.

Secundum  
fapt. app. illi.  
quodam modo, d  
vna casa, c  
magna illa  
ra prodca.

Vmbilico arteri-  
rij, nunculo in-  
terceptis, et  
qua in foci de  
h. plurimum. Agiti  
cul in foci.

Virtu non pra  
stare matris in  
tatione secunda  
rium amara.

Hep. et cur me  
gis p[ro]p[ri]etatem  
restituendi  
dandi sit, quoniam

*Candus ventriculorum dicitur  
pulvere, non non  
vinum illi dicitur  
non non non*

Artemisa non de  
latrone qui  
implantur: sed  
de idem.

Care hepatis  
Sanguinem  
in propria  
pan carne

Venerum rui:  
cas et fua ipfa  
rū matura au  
poffe fanguin

Non



Venerum a-  
tritis vada.

Ventriculus sui  
ipsum sanguinem  
gratia cibis co-  
quere.

Iecur nullius  
partis gratia  
alimenti per-  
mutat.  
Distribuit ali-  
menti.

Instrumenta  
sua parat.

Vasum a lo-  
cum nescimus  
invenire ratio-  
nem corporum  
quibus inserta  
sunt.

Sanguis inesse  
proprium ali-  
mentum, propter  
proprietatem  
sanguinis quod  
viscous est  
viscous quod  
viscous.

Gravitas ge-  
neratio.

Cor est ficcus  
atque calidum  
hepate.

Sanguis inesse  
cori ruber,  
prima in acie  
re generatio  
sanguinis. Ra-  
tio spiritus ali-  
menti in san-  
guine coram  
est ergo: vis  
anima trahit  
in habitum.

Arteria.

Vena.

Arteria rubra  
necesse est  
quod videtur.

Non enim rubrum illum lumore, sed album & viscosum reddere idonei sunt, unde & generatio ipsius est, & incrementum, & nutritio. Porro ventriculus circa cibos sui tantum plus gratia co-tractus, peculiarem sibi ex ipsis lumorem sugit: quo quidem ubi fuerit expletus, superfluum totum ad ieiunum intestinum propellit. Inde rursus iecur trahit ipsum, atque elaborat. Sicut autem ventris reliquum iecur non fit idoneum, ita huius rursus ipsius superfluum, ita quae post iecur habentur omnibus, cum neque iecur ipsum, eorum causa alimē-<sup>10</sup>ti permittit. Quemadmodum igitur iecur per venas ex ventriculo & intestinis alimentum attrahit, quod simpliciter, hoc est, suae carni assimilatur, ita quae post illud constituitur sunt partes, per alias ad se venas alliciunt, deinde rursus alias, donec in omnem animantis particulam alimentum sit distributum: ac preparat semper praecognitis vna-<sup>20</sup>queque particulam, quae sequitur, secundum distributionis connituitatem. Singulae autem anima-<sup>30</sup>lis in instrumentis partes cum ex aliis simplicioribus consistunt, omnino peculiari quadae eiusmodi substantia sunt praeditae, quali non aliud totum animantis corpus. Arteriae vero, necesse est, ut in instrumentis inseruntur communis in vsum gratia: quorum actio nunc quicquid ex corporis loco immu-<sup>40</sup>tatur, sed ubiqueque sunt, semper illi vsum commu-<sup>50</sup>nem praestant. Quin etiam proprium cuiusque cor-<sup>60</sup>poris, sine illis ipsis existit: ac proinde actionem propriam, eximieque diversam ab aliis, si sua possident, propter proprietatem substantiae. Nihil itaque mirum est, iecoris proprium corpus secundum ipsius naturam esse gignere sanguinem ap-<sup>70</sup>osimum, ut quod ruberrimum sit, tanquam sanguis, & solum hoc, quod coagulatum sit, ab eo differens. Crumi siquidem coagulatio, ab ambiente sit, extinguente quidem calore ipsius: denigrante autem substantia, propter refrigerationem. At boui ita etiam in hepate accidit, sed ab insita caliditate, quae exonerat in magis, quam corruptat. Alteratur enim vitrosus modum sanguis, siue gra-<sup>80</sup>vis evalescit, siue iecoris caro. Verum alteratio in grumum, via ad corruptionem est: in iecoris autem substantiam, actio naturae. Cor etiam rubri coloris est particeps, ac non quantum iecur: quippe hoc viscus, corde est humidius, coque rubrius, molliusque: cor autem ficcius, calidiusque iecore existit. Ita enim futurum est simul durius, & duplici mo-<sup>90</sup>tu, arteris similiter, agitur: ut eiusmodi agi-<sup>100</sup>tatione, conferretur caloris natui symmetria. Igitur sanguis humidus & ruber, prima in iecore generatio consistit. Rursus autem venit eam in totum corpus distribuunt. At sanguis ille, tenuis, subtilis, spirituosus, calidissimus, & qui rapidi per omnia membra ferretur, ut inquit Plato, prima in sinistro cordis sinu est origo: de quo irascibilis anima ibidem habere ostenditur. Sanguinem autem hunc arteriae in universum corpus dis-<sup>110</sup>perunt: quas vetustissimi medicorum similiter appellaverunt venas: et si ab aliis, quod quidem vas pulsatur, arteria: quod autem pulsus est experta, vena communiter appellatur. Porro cum motus arteriae quae cubitum, ac praeterit finisium, excurret, ex generatione est corpus, & magnus, validusque, robustum in corde vni irascibilem innuit: calo-

rem vero in eo vigentem, & frigidum, quem no-<sup>120</sup>minare funosum iracundumque mos est. Eam au-<sup>130</sup>tem arteriam appellat venam Hippocrates, ait: Cui celeriter vena in cubito pulsatur, iracundus & iracundus erit: cui autem lentē, torpidus. Quod autem in iecore collocatur Plato eam animae par-<sup>140</sup>tem, quae effulcentia potenterque expetit, illi maxime significare videtur, ubi ait: Verum eam ani-<sup>150</sup>mae partem, quae cibum potumque, & reliqua om-<sup>160</sup>nino quibus corpus indiget concupiscit, media regione inter septum transversum, & umbili-<sup>170</sup>ci terminum collocatur: quod dū quasi prae-<sup>180</sup>tepe ad totum corporis alimentum fabricatur, ac ibi-<sup>190</sup>dem illam animam, cui feram agrestem illigant: quam sanē corpus suum alere necessarium est, si mortuum genus aliquandiu sit perman-<sup>200</sup>sium. Et paulo post: Quod, inquit, Deus perpen-<sup>210</sup>dens, hanc ipsius iecoris speciem constituit, &c. Nihil autem refert, venarum principum dicas iecur, aut sanguinis, aut appetitorum animae: fami-<sup>220</sup>liarius tamen est medico, de corporis instrumen-<sup>230</sup>tis: philosopho, de animae facultatibus discipli-<sup>240</sup>nam institueret: id quod facit Hippocrates, di-<sup>250</sup>cens: Venarum radicatio, iecur, arteriarum cor-<sup>260</sup>est. Etenim de corde Plato hic dicitur: Cor, & ve-<sup>270</sup>narum, & sanguinis, qui per omnes partes vehe-<sup>280</sup>menter circumferuntur, fontem, in domicilio mu-<sup>290</sup>nitionum constituerunt: ut cum iracundus vellemus  
na serueret, ratione horrat, si quid inique in eis  
sit exstiterit, vel etiam ab internis cupiditati-  
bus, itam per omnes angustos meatus, quic-  
quid sensus est particeps in corpore, iusta mi-  
raculis sentiens, fiat morigerum, & vndeque obse-  
quatur, praestantissimumque in ipsis omnibus prin-  
cipatum gerere sinat. At Hippocrates, dum pra-  
uo coloris corporis, gratulanti in habitu persi-  
gerato medetur, iracundiam dicit studiosē exci-  
tandam esse, tum coloris recipiendi grana, tum  
effusivus humorum. Iracundiam porro esse defini-  
unt philosophi, caloris effervescens in corde.  
Quod autem vel testimonio Homeri possumus co-  
firmare appetitoriam vim in hepate delitescere,  
facile cognoscunt, qui apud illum Tityis fabulā  
legunt: cui nimirum finxit a vulturibus liepar  
exedi, quod Iaronam cōpellasset insuper. Quem-  
admodum nunc facillime solent, quae peccantes  
famulos putant: eorum sanē qui fugitivi sunt, cru-  
ra exvrentes, sacrificantes, atque serientes: eorum  
qui sunt in furto deprehensi, manus: gulo forū,  
ventrem: garricennum, linguam: summam ve-  
rō eas plecuentes particulas, quibus illi pravae  
obeunt actiones.

# GALENI PERGAMENI de Hippocratis & Platonis pla- ciris, liber VII.

Quemadmodum autem affectus ab ipsa tolluntur anima, si sit sola rano cinatix facul-<sup>10</sup>tas, nulla tamen appetitoria, nec ira-<sup>20</sup>scibilis, praeter ea, extinguitur: sic & vires omnes, praeter prudentiam, exterminantur. Quia verō (ut prius est demonstratum) alia vis rano cinatix, alia irascibilis, alia demig appetitoria existit, vna-<sup>30</sup>quodam in singulis eorum existit virtus: quan-

Hippocrates.

Appetitorum  
animam Plato  
in hepate collo-  
cat.

Venerum vada  
coram hepate.  
Cor radicatio  
arteriarum.  
Platonem de cor-  
de fontem.

Irascibilis qui-  
bus sit omnino  
da.

Iracundia  
quid.  
Homerus.

Particulas cui  
plecti solent,  
quas qui pro-  
ne obli actione-  
ret.

Anima faculta-  
tis rano cinatix,  
rano cinatix,  
rano cinatix.



Vni esse, quod  
prostat, quod  
est.

Rationalitatis  
autem virtus  
prudens, iustitia  
autem virtus, iustitia

Appetitionis  
autem virtus,  
si temperata,  
iustitia nati-  
uit ex iustitia  
iustitia autem  
iustitia

Habitus quia  
virtutes dicuntur

Solus compositus  
dicitur sola ratio  
autem pars animae,  
iustitia de virtute  
iustitia

Philosophia  
reddidit a peccatis  
ita communi,  
Principia tria  
differunt animae,  
Rationalis  
principii opera

Iustitia prae-  
cipue opera,

Appetitionis  
principii opera.

Nervus non a  
dura nervorum  
cavitate, sed a  
medulla illius  
nervus,

Cerebro rectis,  
animi sui pro-  
prie motu, nec  
sensu, praequod  
ad aliquem ven-  
triculorum ip-  
sa sensu perve-  
nerit.

doquidem quod praestantissimum est in singu-  
lis, vnum tantum existit: sicut et perfectio vna,  
quam virtutem vocamus. Eam igitur quae in ra-  
tione nativae est, sapientiam, aut prudentiam, aut  
scientiam appellare licebit: eam quae in irascibili  
rursus habetur, fortitudinem, aut virilitatem: sic  
vires et eam quae in appetitione oritur, appellare  
poteris temperantiam. Ex quarum quidem ani-  
mae trium particularum mutua comoderatione,  
ac venustate decente, quarta virtus iustitia nasci-  
tur: ac proinde merito totam animam dixeris ius-  
tam. Ceterum virtutes ipse in partibus animae  
irrationabilibus, habitus quidam sunt, & facul-  
tates solummodo. In rationali autem, non habi-  
tus modus, sed etiam scientia, aut virtus. Sola enim  
haec animae pars, scientia compos est: aliae autem,  
facultates sane quaedam, habitusque, aut melio-  
res, aut peiores comparare possunt: scientia au-  
tem fieri participes, non item, quatenus neque etiam  
rationis. At Plato scientiam omnes recte, mea quidem  
sententia, vnam esse virtutem ait, cognitio-  
nem videlicet bonorum atque malorum: hoc est,  
eligibilem, & eorum quae declinari debet. Cum  
autem in omnibus virtus actionibus, deligamus  
id quod videtur bonum: quod autem apparet ma-  
lum, vitiumus: habeamusque naturam impetus hos  
ad horum utrumque: philosophia, quae verè bonum  
malumque docet, et peccatis immunes reddit. Offen-  
dimus igitur dispensationem animalis in lucem  
reddidit, a tribus administrari principibus: vno in ca-  
pitate collocato, cuius opera per se quidem, imagi-  
natio, memoria, intellectus, cogitata non: in rela-  
tione autem ad aliud, sensum partibus animalis  
sensibilibus impartitur, motumque arbitrarium illis  
quae moventur: secundo autem in corde consis-  
tente, cuius opera per se quidem, robur est ani-  
mi, firmitudoque in illis, quae cumque ipsa ratio ius-  
ferat: atque etiam in ventriculo animus: secundum affe-  
ctum autem, veluti feruor natui caloris, anima  
tunc cum qui in iunioribus inferre est visus, punire de-  
siderante: at relatione ad aliud, iniunium esse par-  
ticularis caloris, singulis corporis partibus: sic-  
viti pulsanis motus, arteriis. Tertio vitiumque vir-  
tutis in hepate collocare opera sunt, quae ad ani-  
malis nutritionem spectant omnia: necnon suavi-  
um fructus: per quam vehementius, quam par-  
sit, mora, intemperantiam atque libidinem gignit.  
Demonstrato autem quod nervorum principii  
in capite deliteant, simul etiam cognoscitur ner-  
vos ipsos non a cerebri dura meninge, quemad-  
modum aliquis opinatus est Erasistratus, sed  
ab eius medulla oriri: est enim primo quidem, tenuis  
membranae procella, secundum autem crassioris,  
sunt involati. Porro ex capitis ossis, vinea ad  
huc animalis, & crassioris detecta membrana, si vi-  
tribus medio sectidinis, quod cerebro hanc ple-  
xa duplici incumbit, per hamulos elevatam, aut  
solum ipsam incidere, aut totam excideris, neque  
inensile, neque immobile ipsum evadet animal:  
quemadmodum nec si obtergentem ipsum par-  
tem totum posterius cerebrum, aut solum inci-  
deris, aut excideris: imò verò ne si cerebrum ab  
ipso quomodo cumque excideris, si quoque animas  
motus aut sensus expers reddetur, prius quam  
ad aliquem ventriculorum ipsius, talis sectio per-

veniat. Maxime autem ventriculus posterior of-  
fendit animal: deinde medius: minor vero an-  
teriorum utrumque noxam adfert. Cum igitur con-  
iunctus ventriculus cerebri diffusio quorum abitu-  
lerat motus & sensum paulo post rursus sentiat  
ac moveatur animal, dicendum est in ipsius quid-  
em cerebri corpore animam habitare: primum  
autem eius organum, tum ad universos animan-  
tis sensus, tum ad motus voluntarios, esse ani-  
malem spiritum: qui quidem si animae substantia  
esset (quod aliquis posset existimare) simul cum  
eo, dum evacuetur, periret anima: cuius contra-  
rium contingit. Nam evacuetur, donec recolli-  
gatur, sensu, motusque, non vix destituit animal.  
Merito igitur generatur hic spiritus: iuxta ven-  
triculos cerebri, atque ideo illuc definit arteriarum  
venarumque non exigua copia, ex qua sunt plexus  
choroides formant. Nam ex arteris continen-  
tibus caput, ac postea sese ad cerebri basim tor-  
quentibus, conficitur plexus reticularis, in quo  
elaboratur ipse animalis spiritus. Etenim arteria-  
rum spiritus, vitalis & est, & dicitur: sicut & a-  
nimalis, qui consistit in cerebro: non tanquam ani-  
mae substantia sit, sed veluti primum ipsum  
organum, habitantis in cerebro, qualescunque illa  
substantia existat. Quemadmodum autem vitalis  
spiritus in arteriis & corde gignitur, ex inspira-  
tione & humorum vapore, ita animalis ex vitali  
accuratius elaborato ducit originem: ad quod  
idem elaborationem reformatum ille plexus fuit fa-  
breca. Nam si exacte semen ipsum & lac na-  
tura elaborare desiderat, fecit ut diutius ea in co-  
clitionis instrumentis immoraretur: ac propterea  
femini quidem anfractibus quendam autem testicu-  
los preparavit, laeti verò longitudine vasorum  
ad mammae tendentium: merito etiam ad efficien-  
dum animalem spiritum ex vitali, veluti labyrin-  
thum varium, praedictum illum plexum constru-  
xit. At verò cum nervi ipsi ex cerebro & mem-  
branis illi ambulationes contrahantur, per eam  
ipsorum partem quae ex cerebro oritur, sensus  
omnibus membris atque motus suppeditatur. Quae  
autem utriusque membranae propago est, eundem  
nervi usum praebet, quem cerebro ille exhibe-  
bat. Quare vel si ambas exemeris, nihil laederet  
particula, in quam nervus inferebatur: quemad-  
modum neque si ipsi cerebro exteriores mem-  
branas abstuleris, in praesenti quicquam offen-  
des, nisi processu temporis aliquid sequi possit  
in commodi. Quod autem ad facultatem, quae  
a cerebro descendit, spectat, non licet nobis promp-  
te affirmare, an quemadmodum ex solari splen-  
dore qualitas quaedam profecta, in omnem aë-  
ris ambientis partem disseminatur, ipsa solis  
substantia in loco suo permanente: sic etiam ex  
cerebro virtus quaedam membris per nervos in-  
fluat: an potius substantia spiritus visus ad sensibi-  
les mobilesque particulas proficitur: aut aliqua  
ex parte in nervos incidens, ita ipsos immutat,  
ut alterant eorum in mobilia membra distribu-  
tur: cuiusmodi quippiam fieri in sensu visorio con-  
tingit. Siquidem per opticos nervos, qui ab an-  
terioribus ventriculis cerebri (qua parte versus  
medium ventriculum in obliquum & angustum se  
contrahunt) oriuntur, & manifeste cōcavi sunt,  
splen-

Cerebri ventri-  
culi quatuor.  
Animam huius  
tate in ipso cere-  
bri corpore,  
primum autem  
illius instrumentum  
esse animale, per hoc  
animalis spiritus  
tum non ab alijs  
placita anima.

Choroide  
plexus.  
Retiformis  
plexus.  
Spiritus vitalis.  
Spiritus animalis.

Semine ex la-  
ci elaborato.

Sensus ex ma-  
tribus membris  
quae via suppe-  
ditatur.

Cerebro unde  
est a membra-  
na animalis  
huius offensa.  
Facultas a cere-  
bro descendens  
per nervos, sit  
ne corpore, ex  
incorporata, Ga-  
lenus ambigit.

Opticus nervus  
nervi nervos.

Oculo vero clauso, dilatari alterius pupillam.

Opticorum nervi in oculis confusos.

Diffusio laboris, quoniam nervi pupillam.

Nervi omnes non in oculis.

Spinalis medulla eorum per se.

Distributio nervi in oculis.

Videtur fieri extra oculos.

Videtur per pupillam foramen.

Air ambiens oculi non in oculis.

Videtur per pupillam foramen.

Videtur per pupillam foramen.

Videtur per pupillam foramen.

Videtur per pupillam foramen.

Videtur per pupillam foramen.

Videtur per pupillam foramen.

Videtur per pupillam foramen.

Videtur per pupillam foramen.

Videtur per pupillam foramen.

splendens spiritus ad oculos fertur: id quod ipsa structura docet: & præterea quod vno quidam oculo clauso, dilatari alterius pupillam apertam esse, statim rursus in naturalem magnitudinem redeat. Ceterum quod inanitionis repletionisque celsitudo, non humoris cuiusdam influentia, sed solus spiritualis substatum sit opus, haud negotiosum est cõructu. Quoniam verò in idem vtriusque meatus perveniunt, veniuntque eòdem munere regionem ex vtriusque meatibus spiritum recipientem, dum alter oculus claudatur, alteri totum ipsum transmittitur. Quare si is qui suscipiunt laborant, dilatatur pupillæ foramen, clauso altero oculo, in oculum visus visioa fertur: si autem hoc eis non eveniat, perierit omnino: ac proinde licet probe suscipi curata sit, ipsi non vident. Alius verò quibuscumque accidit, ut non vident, vel circa susceptionem, ob visiois obstruendum meatum. Verum enimvero mutum quidem arbitror necis omnibus esse meatus, sedis tamen qui copulenter exsunt: quemadmodum est processus ille spinalis medullæ, cui corpus ita sensus inest ut visus nervus, ad vehementiorem virtutis distributionem. At verò quod ab omnibus vocatur distributio virtutis, altera quædam quædam est imparitio: qualis etiam in aere & solari splendore accidit. Sic vtriusque consentaneum est, etiam spiritum qui in oculis proficitur, primo illic vtriusque cum aere ambiente, & simul ipsum in suam ipsius usuram malterare, non tamen extendi plurimum. Corpus siquidem quod videtur, aut mittens de se aliquid ad nos, cum illo etiam propriam indicat dignonem: aut si ipsum nihil mittit, expectat aliquam ad nos ab se venire facultatem sensibilem. Vtrum igitur ipsorum sit nervus, hoc iudicabitur modo. Per pupillæ foramen sit visio, quod quidem si expectaret portionem aliquam, aut facultatem, aut imaginem, aut qualitatē corporis extrinsecus subiectionis, ad se proficit, nūquam eius quod videtur, magnitudinem cognoscere mus: ut montis, exempli gratia, maximum alioqui tanta imago eius oculis nostris incidere, quæ quæ est ipse mons: quod omnino ratione caret: quemadmodum & si quis dicat, eam vna temporis occasione, ad singulos videntes, etiam si fuerint mille, permeare posse: cum visorius etiam spiritus nequeat fluere suo tantum extendi, ut toto corpori quod videtur, circumfundatur. Relinquitur itaque adhuc, aërem ambientem tale nobis instrumentum fieri, quo tempore videmus, quale in corpore nervus perpetuo exiit. Eiusmodi autem quippiam accideret videtur ambientem nos aëri, ab excidente spiritu, cuiusmodi etiam ab splendore solis. Ille siquidem supersuper aëris extremitatem attingens, in totum virtutem comunicat. Visus autem per nervos visorius exiens, cum substantia habeat spiritalem, ubi in ambiente incidit, primo incurrit alterationem efficientem, ac se quamlongissimè extendens, illuminat quod illi continui est, nempe quod ambit corpus, sic ut in momento temporis alteratione in totum ipsum transmittat. Apparet autem similis quidam affectus vtriusque accideret, & nervo, & ambientis aëri. Nam quemadmodum si interponatur aliquod solidum corpus in medio subiectionis aëris, statim

videmus eius splendore perire, seu qui dam immutatur evadat lucidus, non autem quod permixtus fuerit (sic enim lumen perpetuo servaret, vel si ablatum id quod illuminat esset) ita & nervo selecto, quantum se habet a continuitate cerebri separaverit, tantum in insensibilis statim reddetur. Sed in arteriis etiam eadem natura, que in nervis, cernitur. Difficile siquidem, interceptis funiculis, non pulsant, delectant, non ut hauriantur putat, eo quod a corde mittitur, sed facultate illa quam tunc ipsam, corpori cordis continuat, influentem ab eo semper obtinent. Comune igitur omnium est sensus facultatem, que a cerebro originem ducit, per nervos visus ad propria instrumenta deferretur quod nervus substatum cerebro est similis, nisi quod quantum, ne esset ad parandum facilius, statim condensationem est, tantum a cerebri natura recedit. Quantum igitur singuli nervi proprie dicuntur sensum, cerebri natura recedunt, tantum etiam ab ipsius facultate. Vocantur autem proprie sensum nervi, qui instrumentis immittuntur sensum, mollioribus aliis, qui particulas movent idque merito. Sensus quippe non sit, absque hoc quod quo modo afficiantur nervi: motus autem, in agendo solus actionem obtinet: ac proinde non ab resensum mollior, durior autem motorius nervus est factus. At motorius omnes, sunt sensus tactus partitibus, quoniam lumen sensibile crassius est partitibus. Porro visorius nervus, omnium nervorum maximus, inter cerebrum & oculum totus medius constituit: interiore quidem sui parte, molliorē habens, externam vero duriorē, ut & facile per ipsum multa ex cerebro spiritualis substantia in oculi regionem perveniat, & etiam vtriusque afficiatur. Quantum autem oculi primū sensibile exatius est, & tenuius, quod nervi visorius aliorum, tantum etiam oculus magis quam illa, cerebri nature est participes. Quare cum sub tunicis oculorum duo continentur humores orbiculares, unus qui vitreum, alter qui refert crystallum, ubi primū visificus nervus exterior oculi tunicam permeat, spiritus quidem per eius porum illos, humoribus illis miscetur, ut substantia eorum fiat tota sensibilis: ipsius autem nervi substantia soluta, dilatatur, amplectitur vitreum humorem, in maximum crystallinoides circulum desinens. At plexus quod efficiunt fibres ipsius nervi optici dilatati, vocantur tunica amphiblastroides, ac si dicas reticularis: quam si velis rursus in unum coagere, coacturam ego, cerebrum tibi esse apparebit. Ac merito si hanc si constructus is nervus fuit, instrumento visus aëre circumfluente. Tale autem instrumentum nervo sit aër, ad propriam sensibilibus explorationem, quale existit ipsi cerebro nervus. Proinde quæ cerebrum rationem habet ad nervum, talem habet ad aërem oculum. At propriū visus sensibile, quod primum antea appellavi colorum est genus. Illud siquidem primum, & per se, & solus inter alios sentit, quædam modum gustus & sapores: quantum & coloratum corpus simul cum eo cognoscit, perinde ut gustus & id quod sapores edit. Ceterum ut gustus atque alij sensus fiant, opus est ut ad animantis corpus ipsum perveniat sensibile. Visus autem per medium aërem ad coloratum extenditur, unde ipse solus vna cum colore illius quod videtur, cognoscit

Nervus quando reddatur insensibilis.

Arteria quando non pulsant.

Arteria quando non pulsant.

Nervi sensum sunt molliores, qui in oculis partitibus.

Nervi visorius omnes sensu sunt facti.

Optici nervi sunt facti.

Optici nervi sunt facti.

Optici nervi sunt facti.

Optici nervi sunt facti.

Optici nervi sunt facti.

Optici nervi sunt facti.

Optici nervi sunt facti.

Optici nervi sunt facti.

Optici nervi sunt facti.

Optici nervi sunt facti.

Optici nervi sunt facti.

Optici nervi sunt facti.

Optici nervi sunt facti.

Optici nervi sunt facti.

Optici nervi sunt facti.

Optici nervi sunt facti.

Optici nervi sunt facti.

Optici nervi sunt facti.

Optici nervi sunt facti.

Optici nervi sunt facti.

Optici nervi sunt facti.

Optici nervi sunt facti.

Optici nervi sunt facti.

Optici nervi sunt facti.

Optici nervi sunt facti.

Optici nervi sunt facti.

Optici nervi sunt facti.

& magnitudinem, & figuram, & situm, & intervallum, id quod sensibus aliis non licet, nisi per accidens nūquam taceat. Si igitur visus solus percipit scire quod ipsum movet per medium aërem, nō ceu per baculum quendam, sed particulam cōsimilem ipse, & cognati ipsi, nec soli hoc illi exumum est darum, simul quod per reflexum videt, mentio opus habuit spiritum desuper insubite pellucido, qui umbrae aëri incidens (qualis est Platonis, Empedoclique sententia) & veluti converbentis ipsum, sibi illum assimilaret. Visus agitur necessarius ducatur esse instrumentū pellucidū, splendensque: auditus, aërem: olfactus, vaporolum: gustus, liquidum: tactus denique terræcum. Neque enim aliter consistere possent, ut qui ex similibus alteratione requirant. Sed enim instrumentū olfactus, minime in nariū meatibus, sed in extremitatibus anteriorū cerebri ventriculorum constituit: in quas vici nariū meatus perveniunt. Ceterā cōmunis quædam facultas (de qua etiā differunt Plato) ex cerebro per nervos in singula sensoria perveniens, alterationes quæ in ipsius sunt, percipit. Porro quædammodum tactus (scilicet instrumenta per retinuum, sic gustus tori per humiditatem & succos in sensus cognitionem perveniunt. Vnde si inzefacta vehementer sit lingua, corrumpitur ipsa saporis dignatio. At obstructus narium meatus, odorū sensus la befactatur, non fecus quam auditoris, si aures obstructæ fuerint. Eiusmodi obstructionibus respondet oculorū fursusio, in qua sic obstruitur solis luminis meatus, qui in tunica rubea go de habetur, ut propriū visus instrumentum non amplius cum aëre, qui totum extrinsecus oculū ambit, iungatur. Attensus ipse nequam est alteratio, sed alterationis digno. Quare dispositio in qua corpora excedentia naturæ modum cōsistunt, & sensus ipsius, invicem differunt. Quippe id genus dispositiones labores vocant Hippocrates, ait: Qui laborantes aliqua parte corporis, plerumque laborē non sentiunt, in eis enim ægrotat. Patiuntur porro singula exiguas mutationes ex finitimo genere. Ideo visus instrumentū, quoniam coloribus discernendis idoneū ipsam esse expedit, splendidum creatū est; quod sola huiusmodi corpora a coloribus alterari soleat: quem admodū iudicat etiam aer ambiens, qui cum maxime purus est, tunc a coloribus alteratur. Ut enim a Solis splendore solum contrahit aer, totus et cōsertum assimilatur, sic protinus a colore mutatur. Nervus itaque, cerebri pars existit, veluti germē arboris. Pars aut in quam inferunt, virtutem ipsius totū in sese excipiens, omnino reddidit habitus, ut discernat ea quæ seipsam cōiungunt. Perfimile quid etiam in aëre nobis circumfluo accidit. Nam illuminatus a sole, tale iam est nobis visus instrumentū, quale ex cerebro proficiens spiritus. At si de anime substantia aliquid pronuntiare oportet, altervtrū necessarium dicemus: aut hanc esse veluti lucidū ætheremque corpus: aut prorsus in corporeum substantiā, cuius primū veliculum hoc ipsum corpus lucidum sit, per totū cerebrū meatus, & continuatæ quadam spirā visumque, etiam splendendum reddens: inter cū cuius, cum reliquis corporibus commu-

nionem ipsa anima habet. Alteratur itaque sensus instrumentum, digno autem ipsius alterationis, sit ex vna facultate omnibus sensoris cōmunis, quæ a principio insit. Ceterum insitū ipsorum, siue cōmunem sensum, siue princeps sensorium nuncupare volēs, nihil in terere. Atque hoc prior disputatio indicat esse cerebrum, a quo omnes particulæ sensum & motū obtinent; descendentes autem nervi in sensum instrumentū, ut sensibilia dignoscantur: alii in motibus ea quæ moveri desiderant. Et enim a cerebro exitur & ipsa spinalis medulla, a qua nervi dux agnoscuntur procedit. Quæ sanè ut cerebrum, fax etiam foritur membrana: quæ si quando iuxta singulos nervos adnectis, nulla pars offenditur, in qua nervus demissus fuerit; eam videlicet membranam ipsæ tegmina cantum sunt & cerebri & spinalis medullæ sensus autem & motus vis, in medulla, quam comprehendunt, existit. Quod si nervi partem medullarem secueris, statim membrum in quod nervum deferrebatur, sensus motusque omnino expers reddetur. Quod autem spinalis medullæ cerebro suspensæ facultatem originē habet, et perpendere, quod secta ipsa quæcumque in parte, quæ regio supra sectionem habetur, cōsistit in incolumitate quæ infra eam sunt, desinitur mota simul & sensu.

ETAT.

## GALENI PERGAMENI de Hippocrati & Platoni placuit, lib. VIII.

DEXTERUS igitur animæ principatum id esse, quod sentiat & voluntario præ est motui. Voluntario enim dico, nam cordis & arteriarum motus, non pro arbitrio nostro perficitur: sicut nec tertium motus genus, quod circa alimentum dispensationem veritatur. Iam verò, ubi principium nervorum est, ibi animæ principatus existit. Atque principium nervorum in cerebro est: illic igitur animæ principatus est nobis statuendus. Omnes porro animantium particulæ, nervorum impotes sunt: hæc manifestè ex cerebro descendenti in ipsas, illæ per mediam spinæ medullam. At lectur virtutis vegetatricis, quædammodum & venarum, origo existit: nec reperitur alia in animante particula, cui omnes venæ connatæ sunt. Si enim vena cauta oriretur ex dextro cordis ventriculo, quod nonnulli existimant, omnino hæc, ut arteria, bifariam scissa, altera parte sui ad iugulum, altera ad iecur ferretur. Quod quum non appareat, clarum est, nec ex corde ipsam originem ducere. Quod autem cor tum arteriarum, tum irascibilis animæ principium existat, abundè a nobis est demonstratum. Deinceps verò de naturalibus elementis, secundum Hippocratis & Platonis doctrinā, similiter differamus. Elementum est minima illius quod constituit portio. Quare ex his quæ ad aliqd sunt, vox hæc elementum dicitur: quem admodum etiam pars. Ut igitur sermonis nostri quatuor & viginti sunt elementa, eodem modo omnium generabilium & corruptibilium corporum, terra, ær, aqua, & ignis, minimæ particule existunt. At minimum dicitur, quod nequam sectionem

Sensus autem  
motus a natura  
est sensuum.  
Sensibilis autem  
esse animæ  
esse sensum.  
Cerebrum est  
principium  
sensuum.

Membrum  
quædam  
esse a  
spinali  
medulla.

Spinalis  
medulla  
in membrana

Spinalis  
medulla  
la scissa, quæ  
accidit.

Animæ  
principatus  
quod  
Cordis &  
arteriarum  
motus, non  
pro arbitrio  
nostro  
perficitur.

Animæ  
principatus  
in cerebro.

Partes  
omnes  
corporum  
impotes  
nervorum  
sunt.

Iecur  
esse  
virtutis  
vegetatricis  
originem.

Cor  
esse  
animæ  
principium,  
atque  
irascibilis  
animæ  
facultas  
est.

Elementum  
est  
minima  
illius  
quod  
constituit  
portio.

Elementa  
omnium  
generabilium  
& corruptibilium  
quæ  
minimæ  
quædam  
sunt.

Platonis de  
visus  
sententia,  
instrumentum  
pellucidum  
esse dicitur.

Olfactus  
instrumentum  
pellucidum  
esse dicitur.

Tactus  
instrumentum  
pellucidum  
esse dicitur.

Sensus  
instrumentum  
pellucidum  
esse dicitur.

Sensus  
instrumentum  
pellucidum  
esse dicitur.

Hippocrates  
ait: Qui  
laborantes  
aliqua  
parte  
corporis,

Patiuntur  
singula  
exiguas  
mutationes  
ex  
finitimo  
genere.

Visus  
instrumentum  
pellucidum  
esse dicitur.

Aer  
partem  
a  
colore  
mutatur.

Air  
quæ  
visus  
instrumentum  
pellucidum  
esse dicitur.



& flamma omnes instantur: & post hanc deinceps. Quæ quâ respirat extrinsecus, omnigenas tuberculosâ species feruens emittit: intrus autem colubata, igneos, plurimosq; morbos procreat. Verum dum Hippocrates tradit, semper iustum calidum, omnium naturâ operum esse quammaximè causam, Plato non calidum dicit, sed ignem: quoniam tamen si ab igne ciborum cœco scilicet fieret, necnon distribuendo, sanguificando, & nutritio, melius vix in acutè febrientibus hæc periculi viderentur. At intrusus calor temperatus existens, substantia quidem in sanguine & plura constituitur: qualitate autem, mixtus est temperatè, ex caliditate atq; frigida. Tutius igitur dixit Hippocrates, qui crescent, plurimum habent calidi innati, atq; illud: Verè hyeme & verè natura calidissimi sunt: & licet etiâ calore infuso intelligens. Falsus eniam est Plato, dum attractionem pulmonis inter respirandum mediò tollit, inspirationemq; ipsam successione ad mediò vacuatur, nempe succedente vno spiritu atq; subingrediente per cutis poros, in locum alterius, qui expulsiis est, necessarij fieri contendit. Quippe nervi ab spinali medulla orti, arbitrarium motum musculis thoracis largiuntur: à quibus eleuatus quidem, exterius aërem per fauces & asperam arteriam, in pulmonè attrahit: cœratus autem, per eadè expellit. Pulsus autem à corde & arteriis fit: atq; in eleuatione quidem, per arteriarum ora in cutem pennemina, exterius aëre intra corpus attrahitur, triplicis vijs gratia: refrigeratq; exardianones, & spiritus animalis generatio: nis: in contractione verò, arteriæ explodunt quicquid fuliginis sibi sumosumve in ipsis procreatum est. Sermo itaque Platonis coarguitur: primò quidem, quòd inspirationem affectum su peruenientem, non à actione voluntariam constituit: cum tamen in nostro situm sit arbitraria, citius, tardius, minus, magis, & frequenter inspirare, quemadmodum expirare. Secundò autem, qui à post arteriarum contractionem, oportet statim inspirationem fieri: si veri & post expirationem, protinus arteriarum eleuationem. Exterum licet nobis longiori tempore respiratio nem colubet, nec ob id tamen desinunt moueri arteriæ cum corde. Quin etiam eleuantur nonnunquam hæc inspiratione nobis: si vni & ex pirantibus contrahuntur: & in vnius respiratio nis tempore, sepnes, aut octies, cor cum arteriis amollitur, deprimiturque. At qui Platonem credunt fuisse adeò imperitum & rudem, ut cùm dixerit, spiritum potiusq; pulmones ipsos excipere, existimari potum omnem in pulmones deferri, si sanè manifestè falluntur: quandoquidem non fuit talis eius vltè sententia, sed noonul ex ipsa porione, per fauces, & perque asperam arteriam in subdium pulmonem desuere, non per mediâ instrumenti laxitatem delatum, sed circa tunicam, eui lenimentū quoddam, aëris modo descendens: id quod venisissimum est, atque rationi cōsonum. Quòd si aliquis accepta, dum fiat, copiosa aqua intra os, dein supinus decumbat, eiusmodi percipiet deluxū, si aperuerit modicè gutturis orificium. Verum cumulara potio et copiosa, tantūq; ut spiritus vias intercipiat, aut

mal ad rufum irritat: modica autè, nec comino sensum sui, cūm per arteriam delabitur, exhibet. Ad hæc, si fundendo animalis coloratam aquam propines, ac dein statim ingulatus id discesces, pulmonem etius similiter coloratū invenies. Liques itaq; manserit, aliquid ex potu & ipsis pulmones allabit.

## GALENI PERGAMENTI

de placitu Hippocratis & Platonis, lib. IX.

Cum autem facultatem discernendi rerum similitudines plura fecerunt tum Hippocrates, tum etiam Plato, atq; ad discretionem huiusmodi necessaria sit veritate cognitio, equidem veritatem eorum quæ inquiri mventurum te affirmo, si primum iotium vix quæ ad ea ducit, cognoueris: à qua aberrans, in pernigam verborum capnionem, erroris que decideris. Est autem principium, dimidiū, & (vt Plato ait) totius operis maxima. Si prout oculum nobis inest naturale iudicij instrumentum, necq; artificiosum, nihil poterimus in venire. At cūm naturalia & cōmunia omnes habeamus, invenimus etiam aliquod artificiosum. Quæ autem sunt illa naturalia iudicij instrumenta, quæ nobis cōmunia ad sunt? Oculi secundum naturam habentes, qui visibilia conspiciunt: aures naturaliter modo dispositæ, quæ audibilia percipiunt: lingua saporum diiudicatrix: nares odorum: & tota cūm tactum. Ad hæc intellectus, vel notio, vel mens, vel ratio, quæ consequentiam repugnantiūq; intermoscos: atque alia præterea quæ his incident, in quibus est diuisio, & compositio, similitudo, & dissimilitudo. Vt enim sensibilibus iudex est sensus, ita & intelligibilibus alia quædam facultas, quam vt quique appellare voluerit, illi permittimus. Rectè itaq; dixit Hippocrates, rerum naturam inveniri, si à maximis quidem visu, facillimis autem cognita, inceperimus. Et enim natura ambo nobis hæc dedit, & ipsa iudicij instrumenta, & quòd ipsis à nullo docti præceptore credamus. Ea igitur quibus iudicamus, & instrumenta sensuum sunt, & facultates instrumentis videntes. At fides ipsorum, citra disciplinam, & naturam, non hominibus tantum, sed aliis etiam animantibus inest. Quum igitur appareant artium opera vitæ hominum conducibilia, vñque naturalibus iudicij fidem accommodantes homines, de ipsis iudicium fecerunt: ac nos illis eò feliciores sumus, quòd quæ illi longo tempore, laborèq; improbo adinvenere vñq; ipsi breui condiscimus tempore, futuri etiam præstantiores prioribus, si pari ac illi studio, similitum dissimilitudines: diagnosis in defensione insistant, idly semper auspiciantes à facillimis cognitis. Enimvero Plato, cū prius nos in ciuitate exerceuisset, iudicassetq; alijs populi partem domitari, aliam propugnare, terriam aliam opificem esse in ea: idly semper auspiciantes à facillimis cognitis. Enimvero Plato, cū prius nos in ciuitate exerceuisset, iudicassetq; alijs populi partem domitari, aliam propugnare, terriam aliam opificem esse in ea: idly semper auspiciantes à facillimis cognitis.

Facultates di  
crandi reru  
similitudines  
plura fecerunt  
Hippocrates  
veritas inue  
niente motu  
dos.

Principium di  
midium opus  
maxima.

Iudicij natu  
ralia instrum  
ta, quæ cōmunia  
ad sunt.

Sensibilibus la  
dex est sensus  
intelligibilibus  
aliqua quædam  
facultas, quam  
vt quique  
appellare voluerit,  
illi permittimus.

Iudicia fieri per  
instrumenta sen  
suum, & facult  
ates instrument  
is videntes.

Petiores quo  
ratione facit  
virescentes.

Platonem tri  
anma facul  
tates, & triū  
republica par  
tem compo  
nasse.

tertiam,

et si dixerit  
etiam in  
habitu

Calorem insu  
bitur in po  
tuit & in fa  
guis, nolum  
que, temperat  
est, modicula  
tate in frigida  
tate.

Respiratio  
quomodo fit.

Pulsus fieri à  
corde & arte  
ris.

Dilatationem  
arteriarum in  
plex vñq;

Platonis opinio  
de inspiratione  
& respiratio  
con uolunt  
inspirationem  
esse voluntari  
a actionem.

Potius partē  
aliquid in pul  
monem semper  
desuere, per i  
psam arteriam  
aspiram.

In fine vnde in  
uenerit, sicut.

tertia, quam alendi corporis gratia opifices nostri apposuerunt: est discernendi similitudines imperiti, vnam esse omnes sentiant, non tres commemoratas particulas. Similiter etiam Plato in Phaedro nos docet, ne vnam quidem in se dubitanonem habere, quæ naturalibus iudicii instrumentis manifestè subdantur: in cæteris verò ambiguitatem fieri. Laborandum autem est in vnaquaque artis exercitatione circa materias, quarum actiones, vitæ vitales, expetimus. Atqui vno mulierum proposito exemplo in quinto de Republica lib. nos Plato exercuit, quo modo invenire differenciam possumus, in quo similia natura, & in quo dissimilia, quæ conferuntur, existant. Aut enim illæ, mulieres in omnium studiorum natura compositionem esse: ac proinde non esse præter naturam, si uxores custodiam musicen, gymnasticam exercant: in omnibus tamen feminis viro imbecilliorē existeret. Mulieres porro viris similes sunt, quatenus hæ rationalia animalia existunt, hoc est, scientiæ capacia. Quatenus autem virorum genus est fortius, & ad omne opus & disciplinam præstantius, mulieres autem imbecilliores, deteriorisq; dissimiles in hoc fuerint. Differunt præterea à nobis mulieres, quatenus hæ quidem sunt femininæ, eorum ad concipiendum idoneæ. Mulieribus siquidem certe quedam corporis particule insunt, quibus masculi carēt. Quare verè aliquis dixerit, in aliquo mulieres viris respondere structura simili, in aliquo ab illis differre. Hippocrates autem faciem ægri nos inspicere iubet, virum similis sit, an dissimilis sanis: præsertim an ipse sibi respondeat. Est quidam elapsum articuli sano Hippoc. cōparat, collatione in ipso affectu homine facta: nam deceptio plerumq; accidit, si alienis articulis ipsum conseras. Consequeruntur autem Græci similia nonnunquam vocare quæ idem aliquid obtinent. Ad hæc, exempla secundum idem, in his quæ conferuntur, Plato nos ducit iussit: qui quidem in Phædro & Phædro, dissimilium compositionem speculationemque maximè necessariam esse ad artem constitutionem ostendit: in qua sanè duplici modo exerceri nos voluit, si primo quidem & generalissimo descendentes, ad ea quæ non amplius diuidi queant, per differentias in medio consistentes: quibus & distinctiones specierum constitui, in Sophista & Politico monstrat. Contrā verò, à specialissimis, quæ multa sunt, ad primum genus, per compositionem ascendentes. Viam namq; esse vtriusq; vnam, sed iter duplex, ab altero primorum, ad alterum vicissim euntem. Nequit autem rationalis artis constructio fieri, nisi in diuisione & compositione exercitatio accedat. Porro speculationem circa medicorum dissidia, magnam vim obtrine, non ægrum tantū ad sanariem recuperandam, sed valentibus etiam, ad videntiam eandem, auctor est nobis Hippocrates. Mirari autē licet, cur artem medici pertractantes, in qua ea quæ offeruntur remedia, vñ possunt dundicare, virū profint, an noceant, maximè cōtrariū de iis quæ profint aut nocent, intrepide pronunciarint. Siquidē in philosophia non sedatas esse plurimas dissensiones, nihil miri est, cum res experientia iudicari perinde nequeat, ut ea de quibus medici digladiantur.

Cæterū hinc nascitur hæc cōtroversia, quod medicis quidem illis quæ experientia sola artem constituerit, illud solum visum est vitale, quod fortunata ipsis frequenter profuisse apparuit: neque enim ad contrariā victus rationē transire audent, ut illam quoque experiantur, nimirū veritū successum improspici. Solus autē qui naturā ægrotantis nouit, & morbi dispositionē, et vim auxilij quod adhibebitur, præterea tempus quo vtendū ipso est, audere possit, vñ auxilium iam ratione explorato, spem confirmare experientia. Quare hic solus inuenit dissidij causam, et distinctiones, quibus animū adhibens, ad id quod ægrotanti cōducit, perveniet. Aliorū verò nullus hoc ipsum cognoscet. Nam qui cognitis per experientiam adiret, immoriturūq; illa sola asumunt, causantes naturam, aut artem, aut eiusmodi aliquid causam ostensit extitisse id quoque etiam in opere de fractura ostendit luculenter Hippocrates, qui de vino, melle, aqua, ozymiute, prisa, & balneis, distinctiones conscripsit, accusans eos, qui in omnibus laborantibus grauitur, vel iubent, vel prohibent, singulas cōmemoratis vt. Nam interrogant an vinū febrenti sit exhibendum, respondere debet, quod huic aliquid dandum est. Idem verò hoc de voluptate Plato facit, videtur quædam ipsarum, nempe ab honestis rebus protectas, appetere nos præcipiens: quidā verò fugere, quales sunt quæ ad ventrē spectant: quæ autem nihil ab his secretum obtinent, illas neq; fugere, neq; persequi. Invenitur porro generis voluptatum differentia ex methodo diuisionis: quare quæ huius in inveniuntur, affinitia & communia sunt iis, quæ ex similitudine cognatione intelligi solent. At voluptates habent similitudinem quidem inter se in vicem: communitatē autem secundum genus. Elegantissimæ itaque omnium Hippocrates atq; Plato tractarūt eam duas speculationes, dico illam quæ discretione similitudinis & dissimilitudinis constat, et eam quæ via iuxta diuisionem generum vsq; ad indiuidua tendit, ac rursus à particularibus ad primum genus per differentias intercedentes reditum reciprocum facit. In vniuersum autem, rei de qua disputatur in primis oportet habere substantiam cogniti. Nam qui nouit, non simplicem vnam animæ in nobis speciem esse, sicuti in stirpibus appetitoriam, in diis rationalem, sed in homine ambas cōsistere, & tertiam præterea frascibilem, nouit cum hoc etiam virtutum numerū, vim, & possessionem: quemadmodum qui naturalem corporis nostri structuram habet perfectam, atque in similibus quidem, secundum elementorū commodationem: in instrumentis autem, ex similitudinem quantitate & qualitate, item vniuscuiusque conformatione & situ, discerit naturalem habitum effici, is morborū curationis cuique conuenientis, & præseruationis copiam habebit. Merito igitur nonnulli exactā similitudinis & dissimilitudinis cognationē sufficere ad methodicā cuiuslibet artis constitutionē existimant. Siquidē etiam ad iudicandum de iis quæ in ambiguo sunt, dux hæc est ab vnde faciēs. Speculari porro, num hic mūdus generatus sit, an ingentis scivri etiam, an geniti ipsius deus aliq; opifex fuerit: an deus nullus

Experiri eundem qui posuit medicum.

Hippocrates

Voluptates autem nobis singulas ait Plato, quæ ab honestis rebus perfectas aut corruptas aut vitales aut vitales.

Voluptates habent similitudinem quidem inter se in vicem, communitatē autem secundum genus.

Rei de qua disputatur in primis oportet habere substantiam cognitam.

Animum nostrum esse triplicem.

Bonus habitus similitudinem & dissimilitudinem particularium, in quo consistit.

Cognitionis similitudinem & dissimilitudinem sufficere ad methodicam constitutionem artis cuiuslibet rationem.

Quæstiones in vniuersum humanæ ætatis, quæstiones in

Dei enim omnia studiorum natura compositionem esse.

Formas viris imbecilliores existere.

Formas viris ligi deteriores existere.

Mulieribus similitudinem, dissimilitudinem, autem ad virum.

Formas ægri inspicere iubet.

Plato. De iis, qui conferuntur, quoque posuerunt, quoque speculacionem, maxime necessariam esse ad artem constitutionem.

Speculacionem circa medicorum dissidia, quod profint.



quidem, sed causa quædam irrationalia & inartificialia, fortuito ipsum adeo pulchrum effecerit: an etiâ Deus præsit mundi structura, sapientissimus simul & potentissimus: huiusmodi in quæstiones nihil conferunt ad honestè rem familiarem administrandâ, aut civitatis negotiosè cōmodè consulendam, aut deniq; ad morales virtutes ac civiles adipsendâs. Cæterum nō sicuti mundus genituine an non genitus sit, querere inutile est, ita etiâ de providentiâ & de dñs. Nam quod sit aliquid hominè præstantius, virtute & sapientiâ in mundo, omnibus nobis investigare præstat: nō tamen quales dñi sint substantia, utrū in corporei omnino, an corporei existit, necessarium est cōsiderare. Sunt autē multa falsa, quam-simillima veris: imō etiâ ipsa sophismata, ex similitudine quam cum veris sermonibus habēt, cōstituuntur. Sed internoscere ea, & invicem discernere possunt, in illa materia, circa quam ars versatur, exercitati, & prædicti naturali industria: quam oportebat possimū in puerili ætate, à cuiusq; civitatis senioribus prudētissimâ iudicari, ac dein vnuquemq; artem sui naturæ congruam doceri: quandoquidem permulto a videmus hodie artes rationales exercentes, qui ne easanē quæ ipsi dicūt, assequuntur. Cū igitur quod in omnibus rectè sit, omnes ad artem referant: quod autem in vno aut de obua, non ad artem, sed ad fortunam: meritò ex nostri structura corporis, licet admirari summam artem, equitatem, & vim naturæ, quæ nos cōstruxit. Cōstat siquidem corpus nostrum ex ossibus pluribus q̄ ducentis. Ad singula verò ossa pervenit nutriti vena, sicuti ad mīsculos: cum hac, enā arteria, & nervi: pariūq; ad amūsim sunt & omnino similia in dextra animantis parte sita, his quæ in altera sunt, os ossi, mīsculus musculo, vena venæ, arteria arteriæ, ac nervus nervo: idq; exceptis viscēribus, atq; nōnullis particulis, quæ habere propriam descriptionē videntur. Duplices itaq; nō sōlū corporis partes, omnino inter se sunt similes, & magnitudine, & conformatione, sicuti & consistētia, quam voco iuxta molliem duritiemq; differentiam. Quæmadmodum igitur de humana affectibus iudicium facimus, ex navisumma arte cōstructa cognoscentes peritiam ar-

nificia, ita etiâ de diuinis facere convenit, corporisq; nostri opificem admirari, quicumq; tandem is deorum exiit, etiâ si eum non videamus. Vocat autē ipsum naturam cōmuni nomine Hippocrates, cuius ministrū medicū esse ait. Plato etiâ, Deum causam quæ nos cōstruxit, mundi opificem pronunciat, qui suis filios iusserit humanum genus compingere, à se quidem accepta substantia immortalia animæ: in ea autē apposito eo quod generatur. Cæterū quæ de animi substantia & de dñs à diuinissimo Platone traduntur, probabilia tantū & verisimilia cū sint, quomodo possum de ipsis audacter pronunciare, non video. Contrā autem, quod plures animæ sint species, quodq; sede triplici collocatæ: & quod diuina ex ipsis sit, qua rationamur: reliquæ autē duæ affectibus obnoxie: hæc qua irascimur, illa qua corporis voluprates experimur: quæ illa quod alia in cerebro, alia in corde, alia in iecore delibet, me scientificas habere demonstrationes affirmo. Iustum tamen est admirari Platonem, qui nō solum methodo cōpēdiosè exposuerit, sed enā nos exercere in singulis. Sunt enim tria capita. Primum, quod diuisione & compositione cōstat: secundum, quod sequentium, & pugnantium cognitione: tertium deniq; rerū inter se mutatione, in maioris & minoris, equalia & similia ratione. Itaq; scopi secundum quos singula rectè aliqui aggrediatur, omnino pauci sunt: secundum autem ipsos exercitatio, non parum temporis postulat: id quod Plato quarto de Repub. ostendit, ubi conatur animam nostram nō simplicem, neq; vniformem substantia, sed ex tribus partibus cōpositam demonstrare, quæ singulæ propriam habent speciem, non vnā autem viam, sed plures. Vnum enim appellat, quodcūq; subiectum cū sit, pēculiare obinet substantiam, aut accidens. Porro substantia dicitur, quæ nō potest contraria circa eam idem eodem tempore pariter facere ac pati. At verò hæc vox diuisio dicitur propriè, cū totum aliquid cōtinuum, in particulas scinditur. Sed metaphorice dicitur, cū in differentias, aut species diuiditur: vt tertio modo, cū vox diuiditur in significata.

Deus vero naturam Hippocrates: dicit autem mentalis, mundum, Platoni spiritus de Deo.

Animæ species, sedes, & delibet, res, etc.

Sapiens, fortis, qui singula rectè quæ aguntur.

Vnam quid.

Substantia quid, diuisio quid.

# EPITOMES GALENI OPERVM

## sectionis prime, finis.



# EPITOMES OMNIUM GALENI OPERVM SECTIO SECVNDA.

SANCTISSIMO D. N. P. IUL. P. M. ANDREAS  
LACVNA SECوبيENSIS. MILES

S. PETRI, S. P. D.



**V**I Ut Medicam artem exterminent, eamq, non esse ex usu mortalibus persuadeant, summum diem ita hominibus esse à Deo praefinitum contendunt, ut non modo non produci, sed ne quidem ante illam metam ullo pacto vita intercipi queat, ij, Beatiss. Pater, praeterquam quod falsa & inania loquuntur, omnem fere humanam providentiam è medio tollunt. Quocirca tamen si sycophantae id genus, infestissimi sint Medicina ipsius hostes, eamq, assiduus sancient vulneribus, eius tamen sunt ope & praesidio curandi, cum gravissimo laborent animi morbo, correptique phrenitide, aut alia quavis animi alienatione, talia insanire cogantur. Infixit autem hanc opinionem complurium mentibus, quod legitur apud prophetam Iob, Deum constituisse terminos homini, qui praeteriri non possent: id quod sane est verissimum. Deus quippe & natura non hominibus tantum, sed etiam animalibus universis (sub quibus comprehendit serpentes) constituerunt cen quendam suae durationis atque periodi apicem, ad quem singula pervenire possent, si omnes occasiones effugerent, quae interitum praecoce acceperunt. Cum autem hoc vita cursus in singulis animalibus, ab insito vitali humore proficiscatur, portionem cuius in prima generatione non omnia fuerunt parem sortita, merito, mea quidem sententia, illa durabiliora erunt, quibus eius copia largior obtigerit: vita vero brevior, quibus humoris insit parciore. Quemadmodum igitur si conferuimus oleum purissimum, semper illi inardebit flammula, quandiu oleum ipsum duraverit: extinguetur autem, ipso oleo absumpto: pari etiam ratione, si humorem nativi caloris fomitem, immutem ab omni corruptela tucamar, non defungetur vita, donec ipse prorsus nos deserat: quod ubi acciderit, produci amplius dies nostri non possunt: ac proinde uerè ultimam vitam terminus, quem nimirum transgredi nulla homo industria, aut ratione potest. Quod si quispiam Dei donum ac beneficium contemnit, aut vitam exosam habens, prius quam ad finem sibi designatum adveniat, det se ipsum praecipitem, disrumpitque crapula & vino: prauidet quidem huic talem Deus exitum, non praefinit autem, cum ipsum suum in consilio atque imperio voluntatem reliquerit. Est itaq, singulus iam sua extrema dies, ad quam viq, pervenire, si optima inelus ratione possint, à Partu ipsi praefixa: quae quidem ut praeterire nemini ab illis est datum, sic etiam ut eam consequantur, solus contempsit illis, qui praecceptis Mediceorum audientes, & temperantissimè viuunt, & fouere rapidum illum humorem, vitam autorem, omnibus modis conantur: ad quam rem plurimum confert cum exquisitissimo inelus, exercitiisque modici, etiam regio vel admodum temperata, vel ad frigus magis quam ad calorem declinans. Pro variis siquidem ipsius caeli constitutionibus, constat hominum temperamenta, adeoque etates ipsas variari. Aethiopes quippe (id quod tradit ex Asclepiade Galenus libro de philosophica historia) circa tricesimum annum senescunt, quod sub ardentissimo sole, eorum calor geminus quam celsissime una cum subiecto humore euascescat. Angli verò Danique, ob contrariam causam, ad vicesimum supra centesimum annum, nisi propria pereant intemperantia, solent vitam ipsam protrahere. At Hispani, ut sita sunt medij inter hos, sic vitam illis quidem longiorem, his autem longè breviorē sortiuntur. Inter omnes porro temperies atque constitutiones ambulentis, quas mihi experiri contigit, nullam haecenus adeo propitiam reperi tum hominibus, tum fructibus universis, atq, est haec quae perfruuntur Veneti: apud quos, fructus quidem ipsi quomodovisimè incorrupti & succulentij servantur: homines autem, veteti, floridique, raro nisi extremo senio absumuntur. Id quod sane est in causa, ut Veneti passim tot senes, tamq, reuerendi, cernantur. Roma vero contrà, per paucos inveniuntur veri atque genuini cives sexagenarii. Quid si qui exteri illuc etate ingraue scientes confluat, intercipiuntur brevi: quod certe argumentum officacissimè est, se, Beatissime Pater, singulari modestia & temperantia tua, prouicisse malignitatē sideris: quippe qui sensibus universis integris, absolutissimisq, tam venerandam canitiem indeptus atq, affectus fueris: ad quam quidem nobis feliciter cōseruandam, producelimq, in multa annorum curricula, quacumq, de tuenda valetudine Galenus Pergonenus conscripsit, ea omnia nuper instigatione Excellentissimi viri Ioan. Aquileij, tui medicij longè vigilantissimi, à me et castigata, et in enchiridio coacta, dicare tua Beatitudini statim.

Hoc erga T. S. officij meū pium omnib. quā praefatissimū esset, ac praecipue illustris, et reuerendiss. Bonadilla et Mendo xza, Cardinali Cauriensi, Patronoq, meo singulari: qui

# GALENI

PERGAMENI AD THRASY-  
bulum, Num ratio tuende sanitatis, ad medi-  
cinales artes, an ad exercitatoriam

spectet, liber vñus.

**I**N omni cōtemplatione optimū invennonis initium est, prius ex-  
actē cognoscere quidnam sit id  
de quo disputetur. Qui autem ra-  
tionalem cōtemplationem satis  
diligenter tractant, in quodlibet  
sanē quæsitum æquē discutare poterit: sine qua  
quidem commentarios evolueret, nihil aliud est,  
quā olēū & operam ludere. Cū igitur in con-  
troversiam vertatur, num ars sanitatis tuendæ  
ad medicinales artes spectet, an ad exercitatori-  
am: qui medicinā esse curatricem ægrorum, & san-  
orum conservatricem, definiunt, hī certē medi-  
cinæ partem, salubrem esse confirmant. Qui verō  
medicinam laborantiū tantūm curam habere  
aiunt, ab ea sanitatis conservatricem abstrahūt.

Ita & exercitatoriam si quispiam sanitatis ser-  
vatricem statuat, quæsitum pro comperto habue-  
rit: quemadmodum & qui solum boni habitus  
eam opificem tradat, diverso modo & ille ambi-  
guum pro certo assumet. Nunquid igitur sic me-  
dicinam definire præstiterit, eam esse cuius finis  
est sanitas? Gymnasticam verō, cuius finis est bo-  
nus habitus? At sic etiam gymnasticæ salubrem,  
tanquam nihil sit dubium, detrahemus: medic-  
inæ autem adhuc obf. urū attribuemus, quæcum-  
que enim dīfinitiones constituantur a fine, non  
exiguas ambiguitates pariunt. At qui salubrium  
sciēntiam medicinam esse affirmaverit, is etiam  
nimis audacter salubre, tanquā medicinæ partē,  
accepisse videbitur. Non deerunt siquidem con-  
trariæ factiōnis nōnulli, qui egrotabiliū tan-  
tūm sciēntiam esse medicinā contendunt: hi ta-  
men primū ignorant, contrariorū omnīū vnam  
esse scientiā: & quicunq; egrotabilia norit, hunc  
& salubria non latere necesse esse. Dein verō ne-  
sciunt, quōd & salubre dicimus signum, quōd æ-  
groto adveniētia, futuram sanitatem portendat:  
nec non causam salubrem, quæ sanitatis est pro-  
creatricis: sicut & salubre corpus, quod est sanita-  
te præditum, quorum omnīū medicus sciēntiam  
habet. Periculum autem fuit, ne si vnam trans-  
eamus, septem circa humanū corpus artes con-  
stituamus: primam & manifestissimā, & penē so-  
lam contrōversia carentem, eam scilicet quæ ex-  
pellit morbos: duas alias, vnam a sanitate secun-  
dum affectionē, & lubricā, ad eam quæ est in ha-  
bitu, ducentem: alteram, in ea conservantē: duas  
item alias circa bonum simpliciter habitum, esse  
etericem vnam, alteram quæ cōservat: præter has  
etiam duas alias, circa bonum habitum Athleta-  
rum versantes, qui non simpliciter bonus est, sed  
cum adfectione, atq; periculofus. Ab his autē se-  
ptem, alias possemus etiam numerare artes, cu-  
iusmodi est & compitiua, quæ corpori pulchritu-  
dinem quandam adulterinā conciliat, vitiōsa &  
adulatrix existens. Huic etenim est cōtraria, quæ

circa legimā, verāq; pulchritudinē (quæ in ve-  
geto colore, carnis moderata copia, membro-  
rumq; congrua coagmentatione consistit) versa-  
tur. Porro sanitas & bonus habitus nō idem no-  
bis significat: cū sanitas quidem, salubre quan-  
dam affectionē: bonus autem habitus, non affec-  
tionem simpliciter, sed fixam & permanentem  
significet, quam nimirum omnes desideramus.

Cū autem omnes actiue artes proponant sibi  
quod in materia circa quam versantur, est valde  
optimū, ac maximē duraturum: earūq; finis sit  
vñus, nempe ipsius propofini consecutio: utique  
manifestum evadit, artis circa corpus nostrum  
versantis, finem etiam vñum, ut propofitū vñū,  
existere, sine id quispiam integritatem, siue bonū  
habitum, siue sanitatem, siue naturalem corpo-  
ris structuram, siue naturalem actionē, ad affec-  
tionem nominare volerit. Vt enim corpus hu-  
manū vna res est, sic busus quoq; vna perfectio  
habetur, quam & præsentem custodire, & abien-  
tem revocare, alicuius artis officium est. Quare  
nec multa corporis bona ponenda sunt, neque  
ipsius boni, quod est, aliam opificem, aliam con-  
servatricem artē statuere oportet. Ita verō cū  
vñum sit corporis bonū primariē ac propriē di-  
ctum, vtpote sanitas, ad quod cetera referuntur,  
ut actio integra, pulchritudōq; certē nō per alia  
exquisitē sanificet corpus, per alia robustum atq;  
pulchrum evadet: vnde vna circa corpus esse ars  
concluditur.

Quemadmodum igitur animi, sic  
etiam corporis bona multipliciter dici solent:  
vñū quidem ratione primariū, ut sanitas: aliud,  
tanquā fructus illius, ut actio: tertium denique  
necessariū consequens, ut videlicet pulchritudo:  
nec licet alicui horum prodesse, aut obesse, quin  
omnibus tribus aut prohis, aut nocēas. Quia itaq;  
in primis efficere sanitatē videtur, quam necesse  
est actio naturalis pulchritudinēq; sequatur. Quā  
enim primū artifex cū fecerit, acquiescit, id e-  
ius planē finis existit: at naturalis affectione per  
quam agimus (hoc est, sanitatē) restituta, cōque-  
scit: finis igitur medicinæ sanitas est, quam cū  
induxit, nihil circa actionem pulchritudinēque  
laborat, ut quæ vel innito artifice sanitatē sequa-  
tur. Sed neque in vili materia ars vna finis ef-  
fectio, altera conservatrix habetur. Qui autem  
sanitatem propria ratio ne tueretur, circa illa, iudicio  
meo, versatur, quibus, velimus nolimus, corpus  
nostrū vitatur: qualia sunt, ipse nos ambiens ær,  
somnia, vigilia, quies, motus, ac deniq; cibis &  
potus. Hæc siquidem quæ per se laedendi iuvandiq;  
potestatem habent, sanitatis cultos specula-  
tur, id semper ante oculos habens, ut in corpore  
exactē sano, validōq; nihil novare audeat: cū  
vero aliquantulum moderatōnē transierit, con-  
tinuō quod deficit, priusquā lanus id malum ser-  
pat, reficiat. Siue enim plenitudine, siue inani-  
tione laboret corpus, utrūq; vitium ars vna vno  
modo emendat, quod deficit nimis instaurans.

Ceterū in quanto, nō in quali, correctiōnis di-  
fferentia versatur. Atqui secūdum quantū in his  
quæ sunt differentia, ad vnam artem pertinet:  
quōd si alienus artis esse debeat, oportet prorsus  
qualitate etiam differat. Porro cū mulx æ  
varie sint medendi rationes, quarum alix ferro,

Pulchritudo ve-  
ra eo quibus co-  
sistat.

Sanitas quid.  
bonus habitus  
quid.

Artium omnū  
scopus.  
Artes cuiusq; fi-  
nis est cōsequen-  
tia scopus.

Artis medica  
san.

Perfectio huma-  
ni corporis. vo-  
na tantum est  
finis.

Vñum esse ar-  
tem, quæ circa  
humanum cor-  
pus versatur.  
hæc animi &  
corporis multi-  
plex est finis.

Sanitatē actio  
naturalis, pul-  
chritudoq; con-  
sequitur.

Finis artis  
quod sit.  
Medicina finis  
est sanitas.

Res expenden-  
da & medica.

Novandum ni-  
hil in sanis cor-  
poribus.

Medendi ratio-  
nes varæ.

Artes dictin-  
guenda sunt  
se, per actiones  
singulas.

Scopus communis  
medicinarum  
omnium, est sa-  
nitas.

Artes omnes in  
subiecta substa-  
tia bono versa-  
ri.

Medicina vni-  
ca, sua spec-  
ies, fuit parces  
fieri, omnes ad  
sanitatem ten-  
dentes.  
Artes esse dictin-  
guenda supra.

Medicinam ar-  
tis laceras vellem  
seruare, esse si-  
miles.  
Fines artis quid  
sit.  
Artes effectivae  
ab actione, quo  
differrant.

Sanitas est me-  
dicinae finis.  
Artes ut effecti-  
uae materiam dandi  
cendant.

Medicina in-  
finitas materiam  
subiicit.

Artes indicandi  
non sunt effecti-  
uae.

Artes omnes, et  
finitas, a fine  
sunt iunctae.

alix igni, alix medicamentis, alix victus ratione  
curantur, hallucinantur sane qui per singulas ac-  
tiones, artes esse distinguendas putant. Nam  
quis adeo fatuus atque stupidus est, ut a medicina  
modo propositas actiones deducat, atque aliam  
quamprimum arte pro vnaquaque ipsarum statuatur? Etenim  
ob commune propositum, quae sanitas est, om-  
nes qui quocumque modo medentur, medici vocati  
sunt: sed propter actiones, aut materiae, aut mem-  
bri diversitatem, hic manualis, ille medicamen-  
tarius, alter oculus, & c. & dicitur: manualis  
ab actione, medicamentarius a materia, sicut o-  
culus a membro: & cum omnes sanitatis gra-  
tia operentur (artes enim omnes in subiecta sub-  
stantia bono versantur, atque illi operam navant)  
sequitur operationis modos diversos. Erit itaque  
medicina unica, sed ipsius variae species ac par-  
tes, omnes ad eundem scopum tendentes, ad sani-  
tatem videlicet. Ac proinde non multitudine agen-  
tium, sed propositis exploratis, artes sunt distin-  
guendae. Si quidem singularia innumera sunt, sed  
generale quoddam opus omnibus est commune.  
Nam & corpori aliquid ut supervacuum detra-  
hens, aut aliquid quod deficit adiciens, vnum  
vtriusque opus praestat, corpori naturalem modum,  
hoc est, sanitatem coparans: proinde verum & cale-  
faciens, & refrigerans, sicut & madefaciens & sic-  
cans. Non est autem vnius artis, opus facere: alie-  
rius, variatim corrigere: eisdem. Quod si non  
eiusdem, at certe medicina nihil quod prius non esset,  
procrearet, sed arti laceras ac tritas vestes sarcienti  
oppido quae similis est: sanitatisque conservatio, parum  
labefacta corrigi, minimè existeret diversum ge-  
nus à curativo. Est porro id artis finis, quod quies-  
cente artifice, demonstrare valeamus, ut sanitas: qua  
ratione effectus artes ab actibus, quoniam finis ipsa  
actio est, tantum differant. Nam quamprimum actus  
ab agendo desinunt, finis quoque vna desit.  
Nihil siquidem in saltatoria praeter ipsam actionem  
ostendere possumus, ut in fabrilis grabatum, in  
indicatoria domum, sanitatem in medicina. Quare  
nec sanitatem custodire, aut viciatam emenda-  
re, aut prorsus amissam recuperare, finis est: sed  
omnia haec actiones sunt, finis autem est sanitas.  
Sed neque ex materiis ipsis artes diuidendae sunt:  
quandoquidem materiam vnam consistit pluribus  
artibus subici (ut lignum, exempli gratia, navium  
artifici, carpentarii, machinarumque structori) si-  
cuti & vnam eandemque artem, permixta ut ma-  
teriam. Quippe medicæ arti, vna cum sit, infinitae  
materiae subiunguntur: corpus nempe sanitatem susci-  
piens, cibi, ac potus, & medicamenta omnia, si-  
cuti & vocata diætemata. Haec igitur materiae  
sunt causarum vim obtinentes: corpus autem, tan-  
quam id ex quo finis, aut in quo. Itaque ad finem  
propterea omni ex parte, ab eorum arte iudicare,  
praecipit ratio. Propter hunc enim & communibus  
actionibus, & propriis praecipit atque principis  
differunt: nam haec & secundum artium fines eva-  
riant: & cuiusque artis constitutio à fine (quae re-  
gula omnium artis preceptorum existit) sumit  
initium. Igitur vnum tantum cum sit humani cor-  
poris bonum, sicuti & aliarum omnium substan-  
tiarum, atque vna similiter ars, quae circa illud  
versatur, huius artis iam omnes particulas spe-

culamur: cuius quidem finis cum non in sola con-  
templatione sit situs, sicuti Aristoteles, Astrono-  
mix, ac Physice: nec simul cum actione ipsa desi-  
nat, quod coniigit in saltatoria: manifestum vni-  
us est, neque inter activas, neque contemplativas, sed in-  
ter effectivas aut acquiescentes, quales sunt quae  
ex parte vniatum corrigunt, eam esse consumme-  
randam: sic ut natura quidem & corpus fabricetur,  
& ipsum imbecillum confirmetur: eius autem mi-  
nistria sit ars, quae in praesentiarum investigatur. Ap-  
pellatur igitur correctiva: quae quidem aut mul-  
tum subito corrigit, aut paulillum. Etenim quae  
ipsius pars multum semel corrigit, eam medicati-  
vum aut curativum dicamus: cuius sane, quem-  
admodum quantitatis, differentia permagna exis-  
tit: quae vero paulillum, conservativa. Atque  
haec quidem insignibus differentiis tripartito di-  
stingi videtur. Aut enim exactè valentem acci-  
piens, in hoc ipsum gradu conservat, diciturque  
euectice, hoc est, boni habitus conservatrix: aut  
eos qui iam evaserunt morbum, ac secundum habi-  
tudinem sani existunt, reficit, appellatur analep-  
tica, hoc est, instauratrix: nam quae inter vtriusque  
pars collocatur, versaturque circa corpora in habi-  
tu, non in bono habitu, sana, ac conservativa si-  
milis & salubris nuncupatur. Tres igitur haec par-  
tes conservativae, analepticae, salubris, & euectice,  
sunt quidem omnes sub ea medicinae parte, quae  
exigua tollit vitia: inter se autem ratione maio-  
ris minorisque differunt. Minora enim castigat  
euectice: paulò his maiora salubris: adhuc ma-  
iora analeptice. Quidam verò & quartam his par-  
ticulam prophylacticae, hoc est, praeservatricem  
addunt, laculatræque, habentem oppositam, quae  
à morbo reficit liberatorem. Curativa igitur, ma-  
gna vitia: euectice autem atque salubris, parva tol-  
lit: in medio verò latius interitio analepticae &  
prophylacticae posita sunt, si ad salubrem atque  
euecticam comparantur, haud exigua vitia emen-  
dantes: si ad curativam, non magna. Quocirca  
non immodè neutrum appellari possumus. Ergo v-  
totum sermonem repetam, circa corpus huma-  
num vnam quandam artem constituo, eiusque duas  
has esse partes, efficientem vnam, corrigentem al-  
teram: ambabusque prius natura inesse, sed ip-  
sorum alteri, emendatrici scilicet, humanam artem  
operi telari. quae & ipsa bipartito diuiditur, in  
curativam partem, seu medicatricem, atque in al-  
teram conservatricem, quae & salubris vocatur.  
Huius rursus tres partes sunt, analeptice, euectice,  
ac toti generi cognominis, salubris. Cum au-  
tem omnis questio sub definitionem cadat, sane è  
si quid tum medicina, tum gymnastica sit, dixe-  
rimus, nec amplius difficile fuerit invenire ad v-  
tram ipsarum salubris referatur. Cum ergo vna  
tantum ars circa corpus versetur, poterit qui vo-  
let, medicinam artem appellare: si in hoc non placet,  
exercitatoriam. Sim id ex quo displicet, totam ar-  
tem nomine carere dicens, vnam eius partem,  
medicinam, alteram exercitatoriam appellare. Si  
neque id probas, salubrem quandam artem curati-  
væ ex diversis distinctam, eiusque partes diæteri-  
cen, gymnasticæque dicito. Singula enim nomi-  
na si interpretaberis, iura vniuersum quod quere-  
bas indeprus fueris. Quod autem ut arte corpora

Medicinam esse  
inter salubrem  
artem omnium  
rationem.

Medicinam esse  
monstram na-  
turæ.

Medicatrix ne  
dona pars.

Confirmatrix  
medicinae pars,  
triplex.  
Euectice.

Analeptica.

Salubris.

Prophylactica.

Correctiva ar-  
tis pars, huma-  
nam artem spe-  
ctans.

Quæstiones o-  
mnium sub  
definitionem cadunt.

Latices.

malè affecta curantem, latices, hoc est, medicinam, sic artemque etiam ipsam, Medicum appellat Homerus, perinde atque alij Græci, verba illius indicant vbi ait:

*Vir medicus multis alibi tibi dignus esto,  
Dura uenenis trabes, et pharmaca multa fundens,  
Multa salubria misces, et letalia mela:  
et Vincta explebis, nisi latices omnia collens.*

Precipuas porro medicinx partes esse pharmaceuticam, chirurgicam, & dacteticam, nemo ferè in ficiatur. At gymnasticæ artis nomen, Homeri seculo uòdum tepertum erat. Nam paulò ante Platoni tempore gymnasiarum ars exorta est: quo etiam tempore Athletarum exercitatio emer-  
sit: quorù quidem bonus habitus vt vituperandus est, sic etiam ipsos instruens gymnastica, cò-  
tumelia nò caret. Eum autem habitù bonum lau-  
damus, qui & iustissimus est, & ad obeundas na-  
turales actiones maximè idoneus: cuius materiæ effectusque similes & conseruantur, dux sunt, & salu-  
bitur vocata victus ratio, & exercitatio. Nā cōm  
quatuor sint genere omnes materiæ, à quib. no-  
trum alteratur corpus, manuaria functio, medi-  
catio, exercitium, ac victus ratio: vna quidem est  
agroris in uulnibus, dux vero secundum naturam se  
habentibus. Aeger quippe in multis medicami-  
na, manuum operaria, victusque rationem postu-  
lans, nulla ex parte exercitatione eget: exquirere  
autè sanus, corpus exerceat, & certa quadam vic-  
tus ratione utatur necesse est, sed medicamen-  
ta, aut manus ministerium, nò postulat. Salubris  
igitur artis cōstat partem quandam esse gymnasti-  
cam. Siquidem etiam Plato in Gorgia, aliam  
gymnasticam esse ait, vt ipsius corpus regentis par-  
tem: atque aliam qua viuuntur Athletæ: quam  
nimium ceu omnium flagitio fisisimam crimina-  
tur plurimus modus: huius quidem finem, viriū  
esse incrementum, quo ad variosq; profertant:  
illius autem, vsum ad naturales actiones, confir-  
mans. Cū igitur in quadam moderatione sani-  
tas sita sit, Athletarum autem gymnastica intem-  
periem excessumq; molitur, multā ac solidam  
carnem procreas, sanguinisq; copiam quanten-  
nascitū ad augens: haud difficile in ventu fue-  
rit, artem hanc omnibus naturalibus animalib;  
busq; actionibus prorsus inuilem esse (crassius  
enim venter subleuem mentem nò parit) atq; ob-  
noxiam periculum. Quare Athletarū nonnulla te-  
pente obmutuerunt: alij sensum motumq; ami-  
serunt, ac penitus attoniti facti sunt, mole illa  
præter naturā, ac multitudine, insitum extingue-  
re calorem, liberumq; spiritui transitū interclu-  
de. Quicunque autem ex ipsis minora mala pa-  
tiuntur, rupto valè sanguinem vomunt, aut ex-  
spuunt. Ceterum legitime gymnasticæ auctores  
sunt, Hippocrates, Diocles, Praxagoras, Philori-  
mus, Erasistratus, atq; Herophilus, & quicunq;  
alij totam artem ad corpus pertinentem optimè  
didicerunt: quorū sanè dogmata congruit illud  
Platonis: Vna cū sit corporis curatio, duas e-  
ius partes appello, vnam gymnasticam, alterā cu-  
ratricem. Lucebit etiam in ipsa arte corporis præ-  
dicte, si quis iuvenire partes eius desiderat, agros  
curantē, medicariū: sanis cōsulentem, salubrem  
appellare. Vel melius sic vt diximus antea: Ars

corporis curam habens emēdatrix cū sit, quā  
parte magna vitia corrigit, medicatrix dicitur:  
quā verò exiguas noxas tollit, vocabitur conser-  
uatrix. Quin etiam apud illos materiæ has partes,  
morbida vna, salubrem alteram appellamus:  
quæ vt antè illos nobis est dictum, in effectrice,  
salubrem secundam habitum, & euecticem, siue  
boni habitus effectricem, diducitur. Nam dicta-  
rum partū singulis propria materia subicitur:  
primæ quidem, secundum habitudinē siue affec-  
tionem valens corpus, secundæ, secundum ha-  
bitum tertie deniq; bono habitu præditū. Ete-  
nim corpus secundum affectionē sanum appel-  
lo, quod iam extra morbum cū sit, leui tamen  
noxa pulsatum, facile in morbum relabitur: im-  
becillum etiam ad actiones existens. Secundum  
habitum autem, quod iam periculis obnoxium  
non est, absolutū tamen aestimū robur nondum  
est cōsecutum. At bono habitu præditum, quod  
extra omne versatur periculū, ac prę se fert etiam  
insigne quoddam omnium actionum robur. De  
sanitate etiam similiter iudicandū. Sanitas nan-  
que secundum habitum, inter sanitatem secun-  
dum affectionem & bonum habitū, actionibus  
media est. Nam sanitas in affectione, debiles a-  
ctiones producit: bonus habitus firmiores. Sa-  
nitas autem in habitu, nondum quidem firmas,  
non amplius tamen debiles. Quod si secundum  
auxiliorū materiæ artem hanc salutarē, conser-  
uatricemq; distribuas, in quatuor partes scabi-  
tur. Vna siquidem in assumptis, altera in his  
quæ sunt, tertia in his quæ evacuantur, quarta in fo-  
rinssecus occurrentibus, prorsus versari videbitur:  
per hæc enim sanitas custoditur. Pars igitur  
quæ in his quæ assumuntur versatur, ciborum po-  
tionumq; ad sanitatis custodiam pertinentiū est  
scientia. Quæ verò in his quæ evacuantur, excre-  
mentorū omnium est exploratrix. Quæ exterius  
incidentiū est, aeris, aquæ, olei, & cetera id ge-  
nus speculari. At quarta pars artis quæ super-  
est, in his quæ aguntur posita, studij exercitatio-  
nib;  
cōtinetur. In omnibus namque, vigilia,  
somnus, Venus, ira, laetatio, ex hoc genere sunt.  
Ceterū singulorū enumeratō salubriū quæ-  
ritas, qualitas, & occasio, dignoscenda est. Mini-  
ma igitur salubris artis pars est de exercitatio-  
nis scientia: rectius enim puto gymnastica ars  
appellabitur, quæ omnium exercitorū facultas  
cognitio est. Nam quæ ad palæstram solū per-  
tinet, cognoscere, per quæ exiguum est, om-  
nib;  
mortalibus minimè vñle. Vnde tibi iam  
intueri licet, non modò salubris artis quota sit  
portio gymnastica, sed etiam gymnasticæ mini-  
mam esse particulam lucidā studiū, & huic co-  
gnatam Athletarum exercitium, affectionis cu-  
uidam non naturalis effectiū. Idcirco eos malè  
sentire cōstat, qui in diuidenda tota arte, gym-  
nasticam medicatricem opponunt: illa namq; ma-  
teria, hæc à generali cōmuniq; actione appella-  
nonē habet. Similiter enī quævis p diuisione,  
medicatio conseruantium opponit, cognatorū  
oppositioem facit. Porro cum vniuersæ artes  
mechanicæ mutua op indigeant, perfectiorib;  
q; materiis ex quibus finē suum consequan-  
tur, suppedient: instrumentisq; optima, per quæ

Correptio in  
Medicina,  
Conseruatrice.

Corpus secun-  
dum affectionē  
sanum, quoddā  
esse dicitur.

Corpus sanum  
secundum ha-  
bitum.

Corpus bono  
habitu prædi-  
tum.

Sanitatem reli-  
quias dicit.

Conseruatricem  
artem, seu quā  
auxiliorū ma-  
teriæ esse quod-  
dā dicitur.

Exercitatio  
esse vnam an-  
tis salubris  
partem.

Artes omnes  
mechanicæ,  
mutua op  
indigent.

illas adornet, conficiantur eis omnibus, seu quædam architectonica, ars corporis curantia, quæ una est, prædictæ. Si quidem edificatorum, ut tales quasdam artes extruat, præcipui calceant, ut calceant: panemque, ut panem: calceantque, ut obionis: aluique iungulis, ut quæque apta est, imperat. Sed huiusce artis corpus nostrum curantibus, salubris appellata pars est, cuius quadrupartus diuisa, partibus vniuersis gymnastica particula existit. Cuius dum tamē est ne prædioribus, aut palæstræ præfectū, cum gymnastæ confundamus. Nam qui luctas omnes & frictiōis sigillatim omnes aduocet, nō itē obire valet, ille paucissimè et coquo proportionē respondet, facere quidem panem & oblonia scientibus, minimè tamen quid in ipsis optimum sit, quid nō optimū, intelligentibus: quam ut facultatē ipsorum vnumquodque ad sanitatē la-beat, nō dignoscētibz. Vigigitur miles artis im-

peratoris, sic prædioribus gymnastisq; minister est. Vocatur tamen nō solum prædioribus eos qui ex-ercent athletas, sed etiam gymnastas. Quare gym-nastica duabus artibus maximè separatis inier-uit: quemadmodū culanaria, quæ salutare obso-nium medico salubrig; continet: gustus verō in-cundum, ac voluptuosum, nō amplius id arti cui-piam, sed adulationi potius cuiusdam, sine sibi nō sanitate, sed voluptatē cōstruunt. Similiter & luctatoria, id quod ad sanitatem bonū est, salubribz & gymnasticis dicitur cōciliari. Quod au-tem ad affectionem athleticam pertinet, illi vicio-sæ parti comparat, quæ se gymnasticam vocat, cum tamen prostratorum potius, aut cabalice appellari mereatur. Verū omnis bene instituta res publica hoc genus artis odit ac detestatur, ut quæ omne vitæ robur prosteruat, laud in bonā affectionem traducens corpora. Iam verō cum prima totius artis pars curantia, quod sic expedi-rit maximè, constituta sit: deinde per multū oculi cōseruantia salubrig; vocata, et adiecta fuerit: totam artem à præcipua magis parte medicinam denominati cōngit, sicut & medicū illius pro-fessorē. Idcirco nō ab re nunc quispiam inter rogatur, cuiusnam artis pars sit illa facultas, quæ ruendæ sanitatis noticiam tradit, medicinæ re-spondere poterit, latius fuso & amplificato voca-bulo, neq; adliuc partem, sed integram humani corporis artem significante. Cuius sanē duas ma-ximas partes esse curantem & salubrem, sicuti & huius salubris, gymnasticam membrum ex-istere cōstat.

**Laſtatoria.**  
**Cabalice.**  
**Laſtatoriam** artem nota re-luc proſtetur.  
**Curantem** ar-tis partē primā omnium fuſſe inſtitutam.  
**Medicinā.**

**Medicina præcipue partes.**

## GAL. PERG. AD THRASYEVLVM LIB.

de exercitatione parua sphaera libellus.

Ltæ militi sanē videntur vtilissimæ omnium exercitationum, quæ non corpus solum exercere, verumetiam animus oblectare possunt. Vnde & sapientes, & naturæ humanæ illos probè fuisse penitus iudico, quicūq; venationes, & alias animalium capturas, primi omnium ad-inuenerunt, laborē qui in illis est, voluptatē, ob-lectationē, laudisq; cupiditatē lenientes & tem-perantes. Adde enim potentes sunt, quæ in id ge-nus exercitiis contingunt motiones animi, ut

multis morbis sepe liberati ex delectatione fue-rint: multi rursum ex nimia cōturbatione, in mor-bos incidunt. Nullus est autem corporis affec-tus tantus, ut veliementer animæ affectio-nibus esse possit. Quamobrem diligentior itari, quam corporis palationē habenda ratio est, tum aliis de causis, tum quia corpore longè præstan-tior est anima. Ceterum aliis omnibus parum sphaeræ exercitium nullus nominibus antecellit. Primo si quidem cum ceteræ exercitationes ma-ximum apparatus, hominēq; otioso admo-dum vitæ requirant, huc certè vna tantum pila, equè percuſa est opus, quam vel paupertum quique comparare sibi facillè poterit neq; in quæ ea se exercet, cogitur reliqua negotiorum relin-quere. Quod igitur eo esse possit commodum, id omni fortunæ, omni item negotio cōuenit: iam verò quæ ex æquo exercere partes corporis val-ueris, scilicet nunc in summam vehementiam in-tendere, nunc in summam facilitatem remittere possit, aliarum, præter hanc parum pilæ, nullam quidem exercitationem inuenies, quæ modō ce-lerissima, modō tardissima, iam vehementissima, rursumq; leuissima, ut quæ sanè volueris, cor-pusq; toleret, siet affollet: hæc enim membra si-mul omnia, si commodum tibi videatur, aut alia præ aliis, si id magis placeat, studiose exercere poteris. Vbi enim inuicem sibi oppositis, aliter aliter pilā ipsam præcipiunt, in ea certè cōcertatione

caput quidē ceruicēq; colla per motionibus ex-ercturadtera autem, pectus, & venter, facies suble-uationibus, depreſionibus, obnubibus, ceterisq; id genus preſensionibus, vehementer la-borant: validiōq; rum lumbi tenduntur, tum enī crura firmantur. Hæc itaq; vna exercitatio om-nes corporis partes quamlibet delissimè exercet. Si-quidem progrediētibz, aliis nerui musculiq; a-lij item subleuantur, plus agitantur: quemadmo-dum enā alij illis qui in obliquū se transferūt, & quotquot vno modo crura ipsi commouent, Quinetiam eorum membra qui transferūt feruntur, mouentur planè inæqualiter, sicuti & illorū qui impariter cūruunt. Sed quemadmodum cru-ribz, ita & brachijs exercitatio hæc, cuius æquū portionem largitur: quandoquidem pilam exci-pere in omni figura suadet. Accidit autē, ut dum necesse habent varis subinde modis se transmo-vere, aliis musculus alij fortius tendantur: hiq; in vices omnes laborent, æqualiter quietē pariter, aliis requiescentibus dum fatigantur reliqui: scilicet vicium et laborem cuncti, et requiescat, nec sint otiosi omnes, nec laborent omnes. Quod porro etiā visum exerceat, patebit, si reputemus quā diligenter pila sit oculis obseruanda, ut statim quodlibet pila sit, præſentiat, ne in illius apprehensione aberrare necesse sit. Vnde enī animus intentus atq; sollicitus redditur. Et licet sola soli-tudo macerare nos extenuarēq; soleat, exercita-tio non tamē & gloriæ cupiditatē cōiuncta, in vo-luptatem abit, plurimumq; ad corporis sanita-tem, & ad animi prudentiam confert. Quod au-tem & ad res maximas, adeoq; eas, quas subie-præſtare imperatores, vrbū regine leges præ-cipiunt, animus & corpus exerceat, demon-stratū nō est difficile. Quandoquidem & aggre-

di in

Animi affectus  
quoniam corpus  
curantem  
habenda ratio  
Pars a sphaera  
exercitium aliis  
lenit antecellit  
re.

Pars a sphaera  
exercitium aliis  
lenit antecellit  
re.

Pars a sphaera  
exercitium aliis  
lenit antecellit  
re.

Sollicitudinem  
exercitium aliis  
lenit antecellit  
re.

di in tempore, & insidiando latere, & occasionem præbitam momento arripere, & aut vi, aut improvviso assu, quæ hostium sunt occupare, occupatæque tuæ, bonorum imperatorum sunt opera. Etenim egregie eorum, subdoliūque esse ducem oportet. Et quotquot in palæstris dimicant, corporis obsecratur, potius quam virtutis exercitationem, consequuntur. Vnde multi ad tantam pervenire crastinitatem, ut vix etiam respirare possint. Et sane genus hoc hominū vel ad bella gerenda, vel ad regia vel civilia obeunda munera, minimè valent: ac subus propemodū potius, quàm luis, rem quampiam quis possit committere. Sed cursum fortasse, & cetera exercitia, quæcumque gracile reddunt corpus, laudatū me suspicaberis. At hoc rō ita se habet. Nimum enim quod est, repeliendo semper omnemque quæ exerceat velimus artem, esse moderatā volo: quæ sit modum excedat, iam bona esse definit. Quæ ratione ipse neque cursum cōmendo, ut qui nimum ad extenuent corporis labitur, ac ne tantillum virilis habeant exercitationis. Non enim celeriter fugiendo, sed fortiter stando, pugnandūque paratur victoria, iam si ad sanitatem respicias, quatenus per cursum iniquitatem exercetur membra, eatenus valetudo laeditur. Necessariū namq̃ sit, ut alia defatigetur, alia autē sint omnino otiosa. Horum verō neutrum bonum, sed vitruūque & morborū seminariū est, & vires in primis debilitat. Quapropter eam potissimum exercitationē probō, quæ & corpus conservare validum, & membra retinere integra, compositaq̃, & animū præterea vegetum, alacremq̃ reddere est positus. Quæ quidem facultas, in ea quæ parva pila sit exercitatione, reperitur. Quod autem placidissima sit, hunc discas licet, quod pueris, senibus, atque à morbo cōvalecentibus, hoc etiā nomine, aliis omnibus exercitatio lūx esse præstantior videatur. Quippe facilis nulla est exercitio, si præmissa molli ex oleo unctio, eo leniter, adeoque moderate vitaretur, ut ipsius qualitas minimè à quantitate obscuretur. Illud liquidum omnium lenissimū est, qd laxatis requeiturisq̃ vile in primis, potentissimūq̃ ad debilitatas vires revocandas exsistit, iunioribus iuxta senioribusq̃ cōducens maxime. Inter alia eius quæ recentius cōmoda, neque hoc esse prætermittendū videtur, quod maximi omnium extra pericula sit, quæ frequenter adeo in reliquis cadunt exercitationes. Celeres enim cursus, iam multos rupto vase præcipuo perdidit. Quemadmodū & voces magnæ, vehementesq̃ & confertim emissæ, maximorū nō paucis malorū causa extiterit. Sic equitationes etiam concitate, sæpe renes rupeunt, & pectus frequenter nocuerit: poris quoque nōnnullisq̃ spermaticis: ut ea interit præterea incōmoda, quæ ab ipsis equis existere solent, ita ut multi equites felis excusū subitō sint exanimati. Similes in saltus, discus, & quæcumq̃ nimis inflectunt corpus exercitia sunt. Nam de illis qui ad palæstram proficiscitur, quid arinet dicere, cum eos videas aut claudos, aut distortos, aut fractos, aut aliqua omnino parte mutilatos redire. Quamobrem cum præter reliqua cōmoda, parva illius pilæ exercitio addit etiam securitas,

nimirum aliarum omnium utilissima hæc exercitatio merito censenda est.

# GALENI PERGAMENI de alimentorum facultatibus, liber primus.



Aculeata alimentorū meritiō præstantissimorū medicorū plurimi diligenter pervestigant, quod aliis quidē præfūdus minimè omni tempore vitamur, sine alimento autem, ne vivere quidem, nec secunda nec ad verā valetudine liceat. Porro cum demonstrationum duogeneris sint principia (aut enim à sensū, aut à notionē evidenti, demonstratio omnis ac fides proficitur) nos de iisdem facultatibus conscripturi, sanus esse duximus ab experientia auspicari, eoque maxime, quod bona pars medicorū, hæc sola vires alimentorum esse pronunciant iuventas: inter quos præcipue Diodes, experientia sola, facultates alimentorum nobis notas esse arbitrat, non ex indicationibus, quæ tum à temperamento, tum à sapioribus desumuntur. Quod verò experientia, ut aliā plerique, ita & qui obī facile concoquantur, aut secus, quæq̃ stomachicū iuvant, aut offendunt, alūmq̃ laxant, aut fistunt, nos doceat, nemo sanæ mentis ignorat. Ceterū in his ipsis pleriq̃ falluntur, qui citra limitationē faciunt de rebus periculum. Etenim quibus statim bilis copia in ventriculo, vel ob pravam quampiam temperiem, vel ob peculiarem constructiōnem colligitur, hī cibos corruptos difficiles, melius quàm faciles, concoquunt: quando quæ facile concoquuntur, facili item alterantur, & corrumpuntur: contra quæ concoctū sunt difficilia, nō facile quoque tum alterantur, tum corrumpuntur. Hæc itaq̃ si in multum calorem inciderint, concoquantur magis, quàm si moderato occurrerint. Atq̃ hæc profecto ratione accidit, ut nōnulli bubulam facilius quàm saxatiles pisces cōficiant. Lens autē quibuidam alium movet magis quàm inhibeat, alūmq̃ item alterantur, & corrumpuntur: contra quæ concoctū sunt difficilia, nō facile quoque tum alterantur, tum corrumpuntur. Nam solidum cuiusq̃ corpus tardè permeat, alūmq̃ sistit: humor verò, ad excrescenciā stimulat. Quare lentis aut brasice decoctū, alū subditur: ipsi verò corpora, inliibet. Si quidem brasica bis cōcta, sunt qui ad ventris exhibitiōem vitantur. Omnibus enim quæ in humore coquantur viū venit, ut quidam ab eius facilitate in se detruent, ac de sua vicissim portione aliquam ipsi impartiantur. Quare si aut lentem, aut brasicam, aut aliquem marinorum piscium, quibus testa pro cute est, decoxeris, ac postea decoctum ipsum oleo, garo, pipereq̃ conditum, propinquaveris capiam, videbis plantæ portione quidem alium dilui, eū autē solidi corporis cōstipari: sicuti & tormina & inflationes oriri, si vnā cum ipsorū iure, solidū etiā corpus sumatur. Sic namq̃ pugna quædam inter vtrūq̃ sit, cum solidum quidem corpus hæret subinde, succus autem ad excrescenciā properet. At cum nōnullas quidem ventris ad egerendum fit natura propensius, aliis autem difficilis, vtrūq̃ pro sua natura symptomatis quæ ab huiusmodi cibis sunt,

Vivere absque alimento non licet.

Demonstratio omnis aut à sensu proficitur, aut ab evidenti notione.

Diodes.

Experientia quæ conueniant.

Alūmq̃m fieri, ut ventriculo, cibis corruptis difficilis, quàm facilis, multo morbo cōcogatur.

Robur, quā laxatiles pisces, cor nōnulli si multis facilius concoquantur.

Lenis et brasica dicitur, alium subinde, ipsi autem humores, si forte.

Etenim omnia de portione in aqua nonnulli propria substantia, et vicijs suis aliquid ab illa accipiunt.

Termina fieri, cōstipantur con trario facultate cibis inter se pugnantibus.



afficiuntur, quum venter alius succi, alius solidi corporis facultati optulerit. Interdum etiam pituitosum in ventre luemorem, interdum biliosum acervari contingit. Arque ipsius pituitosi, alius quidem est acidus, alius salsus, alius dulcis, alius denique sensibilibus qualitatibus expers. Rursus alius est liquidus, alius crassus, alius viscidus, alius dissipatus, alius densus. Humoris etiam biliosi, alius est flavus, alius pallidus: in quorum utroque maximum est, pro maioris minorisque ratione, discernere. Singulis igitur memoratis humoribus, cum aut ad alii excretionem, aut eiusdem cohibitionem plurimum habeant momentum, postquam in tegra ciborum memoratorum corpora cum suis succis in ventrem pervenerint, usque dum qui ex-

intemperantie contraria, in eodem gradu adhiberi. Quare ad præsentem speculationem summe necessarium esse videtur, hominum pater et ciborum temperamenta considerare, ut cognoscamus quænam quibus sint adhibenda. Etenim mel, verbi gratia, calidus & siccus naturæ est aduersissimus: frigidus verò et humidissimusque, cum ea temperies sit eissimalis, huc accesserit propter iracundiam, sine propter regionem, aut anni tempestatem, aut vires con-

Temperamentis  
humidum et co-  
herum esse con-  
sideranda.  
Nal calidus &  
siccus natura of-  
fe aduersifi-  
cans, humidus  
autem & frigi-  
dus, marasmus ex-  
cit.

Alimentorum  
fuerunt quali-  
tates etiam  
explorandas.  
Laporem con-  
stituunt quod  
inducit.

Cydoniū mālū  
cum filamento  
per operatū, ad  
solvendū alia.

*Asplenium*  
quadratum spe-  
cie.

Edulium foliat  
de alio, quomodo  
de re bus. C  
lente pariter.

Affectus augmē-  
tus expletur  
dum materiam  
libera est

Artifices nemini  
ex libris et vagis  
Doctores illi  
qui optima, qua-  
rentia vocantur

1. *Indica diffusa*  
 2. *Indica diffusa*  
 3. *Indica diffusa*

Estimasti hunc  
in quadruplex  
diversitate.

*Balsamitum*  
*delicatum*

Alimentorum et  
de Cardialg. de-  
fectus, à quib.  
prospicua occa-  
sionibus posuit.

Olera que ob  
ducunt de: au-  
dunt facile.

*Frustra subdu-*  
*enda alia etc*

Exposition, me-  
l'opinion d'un  
v. m. m. d. d. d. d.

Mellioratum  
quando ex-  
tremum erit.

Alimenta me-  
dicamentosa.

Admiration has-

Tempestas res  
para, libenter  
alumnus firmus  
de esse.

Intemperata  
corpora, red-  
cenda ad me-  
diocritatem  
per alimenta  
que contraria  
sunt intemperie  
fortificantur.

0

To



*Furfuracei panes parum quidem alunt, ventrem vero multum excrementis implent, ob eamque causam facile etiam defendunt. Ad hæc, quod fursus nonnulli facultatem deteriores fortituri, meritis intestinis exasperant, celeris eorum sit detestatio. his autem cōtrarij sunt panes purissimi, plurimum ponderis exigua mole habentes: qui omnium tardissime deticiuntur: quare copiosiori fermento egent quàm fursuracei, subactioneque longiori nec statim post ipsam assam possunt. Idem assanoneum duntaxat, quàm fursuracei, requirunt. Est autem & alia panum species inter hos planè media, quos *mixtosque & purissimos*, hoc est, miscellaneos ex farina & fursure, appellant. At verò purissimus panis apud Romanos, siliginæus dicitur: quemadmodum qui huic est proximus, sililaceus. Inter panes igitur siliginæus plurimum alimentum præstat: post ipsum sililaceus: tertio loco medius, qui & miscellaneus dicitur: post hunc, sordidorum est quartum genus: in quibus fursuraceus postremus est, minimūque omnium nutrit, sed omnium maxime per alium a descendit. Cōcoctum autem sunt inter panes facillimi, qui plurimum sunt fermentati, probeque subacti, qui in cibano igne moderato fuerint assati. Iam ex panibus in athletæ quidem est commodus, qui neque est bellissimè assatus, neque multum fermenti recepit: prius autem & lenis, qui in cibano probe coctus cum sit, habet etiam fermentum. At qui omnino carer fermento, prorsus nemini est cōmodus. Quod si casci enā aliquid illi addatur (sic enim rustici apud nos festis diebus panes quos vocant azymos conficere solent) eius viū promptè omnes læduntur, etiam si fortissimo sint corporis habitu: cuiusmodi sunt metiorum ac fossorum robustissimi, qui in Alexandria, asinina & camelina vescuntur carne, ob id gravius cruditas morbis tentantur, atque ante senectutem intereunt. Quod autem eorum plerique, qui se confecerunt laboribus, minime a pravis cibis læduntur, in causa est, quod his somni sunt profundiores: quæ res ad coctiones multum ipsis adfert momenti. Athletæ verò alimentis vniuntur etasii & viscidi succi, & quæ per exercitum improba, non facile aut computrescunt, aut in vapores solvantur. Quibus cibis si prius autem aliquis, aut ab exercitiis alienus vn voluerit, celerrime in plenitudinis morbum incidet, copiam crudi & crassi succi coaceruant: qualis est ille humor qui in urinis sublidet, puri quandoque assimilis: nisi quod pus & graueolens est, & lentum, crudus verò succus non item. Inter panes rursus, optimi sunt cibariæ: his proximi, qui assantur in furno minori. At qui super craticulam, & aut cineres calidos, aut soci paumentū, seu in cibano, assantur, pravi omnes sunt, ut qui se inæqualiter habent. Omnium autem pessimi sunt, quæritum ad modum assandi pertinet, quos eo subcinerosos nuncupant, quod cineribus re-  
ferti assantur.*

*Furfuracei panes parum quidem alunt, ventrem vero multum excrementis implent, ob eamque causam facile etiam defendunt. Ad hæc, quod fursus nonnulli facultatem deteriores fortituri, meritis intestinis exasperant, celeris eorum sit detestatio. his autem cōtrarij sunt panes purissimi, plurimum ponderis exigua mole habentes: qui omnium tardissime deticiuntur: quare copiosiori fermento egent quàm fursuracei, subactioneque longiori nec statim post ipsam assam possunt. Idem assanoneum duntaxat, quàm fursuracei, requirunt. Est autem & alia panum species inter hos planè media, quos *mixtosque & purissimos*, hoc est, miscellaneos ex farina & fursure, appellant. At verò purissimus panis apud Romanos, siliginæus dicitur: quemadmodum qui huic est proximus, sililaceus. Inter panes igitur siliginæus plurimum alimentum præstat: post ipsum sililaceus: tertio loco medius, qui & miscellaneus dicitur: post hunc, sordidorum est quartum genus: in quibus fursuraceus postremus est, minimūque omnium nutrit, sed omnium maxime per alium a descendit. Cōcoctum autem sunt inter panes facillimi, qui plurimum sunt fermentati, probeque subacti, qui in cibano igne moderato fuerint assati. Iam ex panibus in athletæ quidem est commodus, qui neque est bellissimè assatus, neque multum fermenti recepit: prius autem & lenis, qui in cibano probe coctus cum sit, habet etiam fermentum. At qui omnino carer fermento, prorsus nemini est cōmodus. Quod si casci enā aliquid illi addatur (sic enim rustici apud nos festis diebus panes quos vocant azymos conficere solent) eius viū promptè omnes læduntur, etiam si fortissimo sint corporis habitu: cuiusmodi sunt metiorum ac fossorum robustissimi, qui in Alexandria, asinina & camelina vescuntur carne, ob id gravius cruditas morbis tentantur, atque ante senectutem intereunt. Quod autem eorum plerique, qui se confecerunt laboribus, minime a pravis cibis læduntur, in causa est, quod his somni sunt profundiores: quæ res ad coctiones multum ipsis adfert momenti. Athletæ verò alimentis vniuntur etasii & viscidi succi, & quæ per exercitum improba, non facile aut computrescunt, aut in vapores solvantur. Quibus cibis si prius autem aliquis, aut ab exercitiis alienus vn voluerit, celerrime in plenitudinis morbum incidet, copiam crudi & crassi succi coaceruant: qualis est ille humor qui in urinis sublidet, puri quandoque assimilis: nisi quod pus & graueolens est, & lentum, crudus verò succus non item. Inter panes rursus, optimi sunt cibariæ: his proximi, qui assantur in furno minori. At qui super craticulam, & aut cineres calidos, aut soci paumentū, seu in cibano, assantur, pravi omnes sunt, ut qui se inæqualiter habent. Omnium autem pessimi sunt, quæritum ad modum assandi pertinet, quos eo subcinerosos nuncupant, quod cineribus re-*

*Miscellaneos panes.*

*Siliginæus panis plurimum alimentum præstat.*

*Sililaceus panis tertio loco medius, qui & miscellaneus dicitur: post hunc, sordidorum est quartum genus: in quibus fursuraceus postremus est, minimūque omnium nutrit, sed omnium maxime per alium a descendit. Cōcoctum autem sunt inter panes facillimi, qui plurimum sunt fermentati, probeque subacti, qui in cibano igne moderato fuerint assati. Iam ex panibus in athletæ quidem est commodus, qui neque est bellissimè assatus, neque multum fermenti recepit: prius autem & lenis, qui in cibano probe coctus cum sit, habet etiam fermentum. At qui omnino carer fermento, prorsus nemini est cōmodus. Quod si casci enā aliquid illi addatur (sic enim rustici apud nos festis diebus panes quos vocant azymos conficere solent) eius viū promptè omnes læduntur, etiam si fortissimo sint corporis habitu: cuiusmodi sunt metiorum ac fossorum robustissimi, qui in Alexandria, asinina & camelina vescuntur carne, ob id gravius cruditas morbis tentantur, atque ante senectutem intereunt. Quod autem eorum plerique, qui se confecerunt laboribus, minime a pravis cibis læduntur, in causa est, quod his somni sunt profundiores: quæ res ad coctiones multum ipsis adfert momenti. Athletæ verò alimentis vniuntur etasii & viscidi succi, & quæ per exercitum improba, non facile aut computrescunt, aut in vapores solvantur. Quibus cibis si prius autem aliquis, aut ab exercitiis alienus vn voluerit, celerrime in plenitudinis morbum incidet, copiam crudi & crassi succi coaceruant: qualis est ille humor qui in urinis sublidet, puri quandoque assimilis: nisi quod pus & graueolens est, & lentum, crudus verò succus non item. Inter panes rursus, optimi sunt cibariæ: his proximi, qui assantur in furno minori. At qui super craticulam, & aut cineres calidos, aut soci paumentū, seu in cibano, assantur, pravi omnes sunt, ut qui se inæqualiter habent. Omnium autem pessimi sunt, quæritum ad modum assandi pertinet, quos eo subcinerosos nuncupant, quod cineribus re-*

*Panis azymos esse, nemini est cōmodus.*

*Azymos panis, qui non promptè omnes læduntur, etiam si fortissimo sint corporis habitu: cuiusmodi sunt metiorum ac fossorum robustissimi, qui in Alexandria, asinina & camelina vescuntur carne, ob id gravius cruditas morbis tentantur, atque ante senectutem intereunt. Quod autem eorum plerique, qui se confecerunt laboribus, minime a pravis cibis læduntur, in causa est, quod his somni sunt profundiores: quæ res ad coctiones multum ipsis adfert momenti. Athletæ verò alimentis vniuntur etasii & viscidi succi, & quæ per exercitum improba, non facile aut computrescunt, aut in vapores solvantur. Quibus cibis si prius autem aliquis, aut ab exercitiis alienus vn voluerit, celerrime in plenitudinis morbum incidet, copiam crudi & crassi succi coaceruant: qualis est ille humor qui in urinis sublidet, puri quandoque assimilis: nisi quod pus & graueolens est, & lentum, crudus verò succus non item. Inter panes rursus, optimi sunt cibariæ: his proximi, qui assantur in furno minori. At qui super craticulam, & aut cineres calidos, aut soci paumentū, seu in cibano, assantur, pravi omnes sunt, ut qui se inæqualiter habent. Omnium autem pessimi sunt, quæritum ad modum assandi pertinet, quos eo subcinerosos nuncupant, quod cineribus re-*

*Alexandrinis asinina, camelina vescuntur carne, ob id gravius cruditas morbis tentantur, atque ante senectutem intereunt. Quod autem eorum plerique, qui se confecerunt laboribus, minime a pravis cibis læduntur, in causa est, quod his somni sunt profundiores: quæ res ad coctiones multum ipsis adfert momenti. Athletæ verò alimentis vniuntur etasii & viscidi succi, & quæ per exercitum improba, non facile aut computrescunt, aut in vapores solvantur. Quibus cibis si prius autem aliquis, aut ab exercitiis alienus vn voluerit, celerrime in plenitudinis morbum incidet, copiam crudi & crassi succi coaceruant: qualis est ille humor qui in urinis sublidet, puri quandoque assimilis: nisi quod pus & graueolens est, & lentum, crudus verò succus non item. Inter panes rursus, optimi sunt cibariæ: his proximi, qui assantur in furno minori. At qui super craticulam, & aut cineres calidos, aut soci paumentū, seu in cibano, assantur, pravi omnes sunt, ut qui se inæqualiter habent. Omnium autem pessimi sunt, quæritum ad modum assandi pertinet, quos eo subcinerosos nuncupant, quod cineribus re-*

*Somni sunt profundiores: quæ res ad coctiones multum ipsis adfert momenti. Athletæ verò alimentis vniuntur etasii & viscidi succi, & quæ per exercitum improba, non facile aut computrescunt, aut in vapores solvantur. Quibus cibis si prius autem aliquis, aut ab exercitiis alienus vn voluerit, celerrime in plenitudinis morbum incidet, copiam crudi & crassi succi coaceruant: qualis est ille humor qui in urinis sublidet, puri quandoque assimilis: nisi quod pus & graueolens est, & lentum, crudus verò succus non item. Inter panes rursus, optimi sunt cibariæ: his proximi, qui assantur in furno minori. At qui super craticulam, & aut cineres calidos, aut soci paumentū, seu in cibano, assantur, pravi omnes sunt, ut qui se inæqualiter habent. Omnium autem pessimi sunt, quæritum ad modum assandi pertinet, quos eo subcinerosos nuncupant, quod cineribus re-*

*Athletæ verò alimentis vniuntur etasii & viscidi succi, & quæ per exercitum improba, non facile aut computrescunt, aut in vapores solvantur. Quibus cibis si prius autem aliquis, aut ab exercitiis alienus vn voluerit, celerrime in plenitudinis morbum incidet, copiam crudi & crassi succi coaceruant: qualis est ille humor qui in urinis sublidet, puri quandoque assimilis: nisi quod pus & graueolens est, & lentum, crudus verò succus non item. Inter panes rursus, optimi sunt cibariæ: his proximi, qui assantur in furno minori. At qui super craticulam, & aut cineres calidos, aut soci paumentū, seu in cibano, assantur, pravi omnes sunt, ut qui se inæqualiter habent. Omnium autem pessimi sunt, quæritum ad modum assandi pertinet, quos eo subcinerosos nuncupant, quod cineribus re-*

*Quibus cibis si prius autem aliquis, aut ab exercitiis alienus vn voluerit, celerrime in plenitudinis morbum incidet, copiam crudi & crassi succi coaceruant: qualis est ille humor qui in urinis sublidet, puri quandoque assimilis: nisi quod pus & graueolens est, & lentum, crudus verò succus non item. Inter panes rursus, optimi sunt cibariæ: his proximi, qui assantur in furno minori. At qui super craticulam, & aut cineres calidos, aut soci paumentū, seu in cibano, assantur, pravi omnes sunt, ut qui se inæqualiter habent. Omnium autem pessimi sunt, quæritum ad modum assandi pertinet, quos eo subcinerosos nuncupant, quod cineribus re-*

*Omnium autem pessimi sunt, quæritum ad modum assandi pertinet, quos eo subcinerosos nuncupant, quod cineribus re-*

*Inter panes rursus, optimi sunt cibariæ: his proximi, qui assantur in furno minori. At qui super craticulam, & aut cineres calidos, aut soci paumentū, seu in cibano, assantur, pravi omnes sunt, ut qui se inæqualiter habent. Omnium autem pessimi sunt, quæritum ad modum assandi pertinet, quos eo subcinerosos nuncupant, quod cineribus re-*

*Quæritum ad modum assandi pertinet, quos eo subcinerosos nuncupant, quod cineribus re-*

*Inter panes rursus, optimi sunt cibariæ: his proximi, qui assantur in furno minori. At qui super craticulam, & aut cineres calidos, aut soci paumentū, seu in cibano, assantur, pravi omnes sunt, ut qui se inæqualiter habent. Omnium autem pessimi sunt, quæritum ad modum assandi pertinet, quos eo subcinerosos nuncupant, quod cineribus re-*

De Placenta, quam *trivertis* appellant.

Quæ placenta ex farina triticea læuigata sufficiuntur aquæ portione, atque oleo intra fartaginem fricta, conficitur, appellaturque *trivertis* ab

Articis, ea quidem cohibet ventrem, & crudorū succorum est generatrix. Quapropter & quibusdam mellis quippiam ei admiscetur. Sunt qui & sale marinum miscant.

De Itriorum compositione.

Duplex autem est Itriorum species: præstantior quidem, quam rhyemata: deterior, quæ lachiana appellant. Quæ sanè ex his ac similibus componuntur, et asii sunt succi, & tardè subdident, itcorisq; obstruant meatus: ad hæc lienis imbecillitatem augent, calculosq; in renibus gignant. Quod si cocta bellè fuerint, atque murata in sanguinem, admodum nutriunt. Quæ verò cum melle parantur, miliam possident facultatem. Quamquam in his qui obstructionis principium habent, aut inflammatione, aut scirrilo sunt aliquo obfessi, nihil minus quàm illa nocet: nonnisi quæ etiam grauius. Vt autem de pane sermonem repetam, is saluberrimus est homini neq; iuueni, nec exercitibus deditio, qui tū salis, tum fermenti habet plurimum, maximeq; fuerit, antequam assatur, subactus. Modus autè fermenti & salis sit, is, qui gustus sensum tristem non inferat.

De Paneloro.

Qui panis abluendi rationem excogitatur, minoris sanè alimentum cibum, sed qui ab obstructionis noxa absit, quoad licet, longissime, inveniunt. Siquidem panis lici, succum crassum, & lèrum habet minimum, ut qui ex terrestris æreus sit factus. Ceterum illi edulium quod ex multa triticea farina lacti permixta constat, tamen boni succi & multum alimentum sit, ex his tamen est, quæ ob assiduam vsum, hepatis obstructions, & calculos renum procreant: ad hoc etiam conferente renum temperamento acri simul & igneo.

De Alicia, siue Chondro.

Alicia ex genere est tritici, & valenter nutrit, succumq; lentū habet. Proinde huius vsum multum vitare convenit, idip potissimum quibus iecur facile obstruitur, aut renes calculis gignendis sunt prompti. Quod autem ad forbinones alicæ pertinet, oportet succum eius (qui sanè magnam concoctionem desiderat) tum malis aquæ admixtum super excoctis coquere, plurimum mendo, quoad exactè percoctus fuerit: tum verò salis quippiam etiam inacere, oleūque in principio, si placeat. Quod si quando sani ob vesicentem ventris mordacitatem, aut biliosis humoris & multi transitum, sorbitione eguerint, his alicam plurimum coctā donec extabuerit, ac dein colatam propina.

De Tritico tixio.

ELIXVM triticum ventrem, seu pondus maximum, premit, auleam ciborum inducit, flatus generat, dolorem capitis, caliginem oculorum conciliat, a dentis immodice silit alium: cuius facilitas, vnicum in cruditate est remedium. Nutrit tamen valde corpus & robur insignis, is, 60 qui ipso vñ fuerint, comparat.

De Amylo, hoc est, farina citra molam ex tritico facta.

AMYLVM ex tritico fit, partes exasperatas Amyli facili-  
læuigandi vim obinens dotisque panibus simili-  
lem facultatem sortitus. Nam vtili, minus  
Q. iij

*trivertis  
alium lici, &  
cruderum hu-  
morum est gene-  
ratrix,  
liverum, com-  
positum, &  
noxa.*

*Panis saluberrimus homini  
neq; iuueni, nec  
exercitibus deditio,  
qualis nam  
esse debet.*

*Panis lici nutrit  
minimè, non  
nisi quæ etiam  
gravius.  
Panis lici sub-  
stancia.  
Poli ex lacte  
& farina, he-  
patis obstruc-  
tiones, & cal-  
culos renum  
gignit.*

*Alicæ  
Chondro vñ  
quibus debet  
esse iussu.*

*Alicæ forbinis  
quibus sit pro-  
pinanda.*

*Tritici elici  
incommoda.  
Alii facilitas  
in cruditate,  
vnicum est re-  
medium.*

quim panes non loſi, corpori alimentũ præbet  
& non calefacit, cum exteri panes calefaciant.

#### De Hordeo.

*Panes taſſi-  
era.*  
*Hordeum reſi-  
erat.*  
*Hordeum quo-  
modo à tritico  
diſſeruat.*

**HORDEVM**, quo quomodo ipſo vitari, vim  
quandam habere refrigerandi cernitur: qua qui-  
dem ratione à tritico diſſert, necnon quod triti-  
cum fanè craſſum & lentum humorem gignat,  
hordeum autem, & tenuem, & deterſorium nõ-  
nihil. Cæterũ polenta quæ ex frixo hordeo con-  
ſicitur, ſiccare conſpicuè cernitur: quum tamen  
ipſa priſana humectet, vbi plurimum intumue-  
rit coctione longa, tandemq; in chylum degene-  
rauerit. Acerum autem tunc ei admifcitur, cum  
planè intumuerit: cum vero cocta fuerit exactè,  
ſub edendi tempus ſalem tenuem iniicere oportet.  
Oleum etiam, ſi in principio ſtatim inieceris,  
coctioni nihil nocuus. Porro hordeum ex quo  
conſicienda eſt priſana, aliquandiu in aqua præ-  
macerandum eſt, poſtea verò in mortarium con-  
iectum, vſque eo terendum eſt re aliqua aſpera,  
dum ſi qui in ſuperficie eſt cortex, abiectus ſit.

*Priſana confe-  
cunde ratio.*

*Priſanam deter-  
gere magis, vbi  
ex hordeo non  
pleniſſe deſerua-  
ta eſt. aſſicta ſua-  
re.*

*Priſana magis  
ſua communis  
datur.*

Quod ſi non quicquid eſt paleaceum deciderit,  
elixa priſana magis quidem deterget, nulla au-  
tem aliam noxam accipiet. Sic præparatæ ipſius  
priſanæ lentor, læuis, continuus, blandus, lubri-  
cus, & moderatè humidus eſt: ſummiq; arcer, ad  
abluendũq; idoneus, nec aſtinctionem habet,  
nec tormina gignit, nec deniq; in ventre extur-  
geſcit, cum intumuerit inter coquendum, quan-  
tum intumefcere poterat.

#### De panibus hordeaceis.

*Hordeacei pa-  
nes nocuunt  
multo minus  
triticeis, ma-  
gisq; ſubdolan-  
tur per alimen-  
tum. Hordeum læ-  
dentiſſimum  
quale.*

*Rugofa ſemi-  
na, deterua-  
riſſe.*  
*Semina, quæ  
de vitodum,*

**HORDEACEI** panes (quorum ſimiles ſunt  
diſſertè illiſ quas de triticeis tradidimus) mul-  
tò minus triticeis alunt, magiſq; ſubducuntur  
per alium, & poſitiſimum ſi facti ex peiori horde-  
o fuerint. Laudariſſimum autem eſt hordeum  
quod candidum, vbi pinſitum eſt, apparet, non-  
nihilq; liabet denſitatem & ponderis. Porro quod  
totum plenum eſt, & circumscriptionem exter-  
nam habet tenſam, melius eo eſt, quod gracile  
eſt & rugoſum: id quod ſeminum omnium tibi  
ſit indicium commune. Cætenim non debes vi  
ſeminibus ſtatim poſt collectionem, ſed vbi ea  
in locis repoſueris, diu ab eis abſtinere, quò in-  
terea pars quidem humoris ſuperflui exhalet,  
pars autem etiam coquatur. Deſuit enim à plan-  
tis, fructibus, & ſeminibus, poſtquam collecta et  
repoſita fuerint, primum quidem quicquid in ip-  
ſis aquoſum eſt, ac tenue: poſt autem, & nonni-  
hil humidum naturalis. Quare quæ diuſiſſimè fue-  
runt repoſita, vires habent imbecilliores. Verũ  
huius terminus ſit, cum ab ipſis diuiſis puluis  
quidam tenuis excidat.

#### De Polenta.

*Polenta epota  
cum vino aſ-  
ſero, ventrem  
ſiccatur.*  
*Polenta quib;  
plurimiſq; aliis  
in largiatur.*

Ex recenti hordeo mediocriter frixo lauda-  
tiſſima ſit polenta. Quum autem polenta omnis  
quæ rectè eſt facta, boni ſit odoris, ea eſt ſua ue-  
lentiffima, quæ ex optimo ac recenti hordeo, &  
quod ariſtam non admodum habeat ſiccam, cõ-  
ſecta eſt. Quæ quidem ſi cum vino aſtero fue-  
rit epota, ventrem deficiat. In vniuerſum autem,  
priuans quidem & in ocio degens, pluri-  
mum alimentum largitur: viſ quoque quomodo  
exercentur, minus  
quàm quod ſit ſatis.

#### De Maza.

At maza (quæ ex polenta frixa conſicitur)  
tantum in alendo corpore, à panibus hordeaceis,  
quantum hi à triticeis, relinquuntur. Quippe  
cum hordeum inuſo ſuaſpæ natura furfurẽ  
liaberet nõ paucum, vel ex ſe ad concoctionem  
ineptum, frixum iam, eum ipſum habebit tum  
ſicciorẽ, tum fraſtũ & communius diſſicilio-  
rem: ſicvĩt & cremorem illum ex quo corpus ali-  
mentũ ſumebat, ſimiliter aridiorẽ. Quo ſit vt  
maza panibus hordeaceis, ægrius coquatur, ma-  
giſq; ventriculum ſtatu impleat: in quo etiam ſi  
diutius manſerit turbationem excitat. Citius au-  
tem ſubducitur, ſi cõmiſta diutius, atque ſubacta  
fuerit. Quod ſi mel quoq; addatur, citius etiam  
ob id ventrem excitabit ad excretionem. Porro  
priſana deterſoria & inchoſia eſt: qd in cute no-  
ſtra indicat, ipſius ſordes eluens. Iſ ſi paulò poſt,  
quim ipſam cuſpiam ſarbandam edideris: vomere  
ipſum compulſus, pituitam quæ in ventricu-  
lo continēbatur, deterget, & omnia vomitu ſa-  
mul cum ea eiciet.

*Maza ægrius  
coquatur pa-  
nibus horde-  
um, ſtatim ma-  
za ventriculum  
implet.*

*Priſana ſa-  
culina.*

#### De Zea, Typha, & Olyra.

**ZEÄ** (quam vulgò ſpeltã vocant) nutrit qui-  
dem hordeo valentius, at im potentius tritico: ac  
proinde mediã inter triticum & hordeum na-  
turam poſidet. Olyra euſdem cum Zea eſt ge-  
neris. Quæ quidem ſi bona ſit, panes ex ea con-  
ſecti, poſt triticeos ſaltem ſunt præſtantiſſimi. Se-  
cundũ ab his ſunt quæ ex typha parantur. Ex ſo-  
biliſſima autem olyra, vt decet, excoſcata, ſunt  
quæ nominatũ tragus conſiciunt: quo pleriq;  
vniuerſi, primum in aqua coquentes, deinde ea ef-  
fuſa infundentes ſapam, aut vini dulce, aut mul-  
ſum, quibus poſtea ſuperiniunt & pineas nu-  
ces aqua præmaceratas, donec plurimũ intue-  
runt. Quod verò ad colorem natũ pertinet, in  
hordeo quidem & olyra eſt albus, in tritico &  
zea ſubſutus. At typha ſlauior tritico exiit. In  
vniuerſum autẽ, quæ ſemina parua mole multa  
reddunt ſubſtantiã, magis craſſam & viciſſimã  
optimi ſucci ſunt, ac multũ alimentũ: nõ tamen fa-  
cilè per alium ſecedunt. Quæ verò hiſ ſunt con-  
traria, mollem quidem ac laxam liabent ſubſtan-  
tiam: partes autem ipſorum furfurẽ, citius qui-  
dem ſubducuntur, ſed alunt minus. In iſ ipſis,  
quæ graueolenta ſunt, & giſtum quicquid ha-  
bent iſtiſcundum, perſpicuum eſt quod omnia  
& prauũ ſunt ſucci, & diſſicilia concoctũ.

*Speltã.*

*Zea mediã  
inter hordeum &  
triticeum.*  
*Olyra.*

*Typha.*  
*Tragus quomodo  
præparatur.*

*Semina optimi  
ſucci & multa  
alimenti ſunt,  
quæ parua mole  
multam red-  
dunt ſubſtan-  
tiam.*

*Semina parua  
ſucci quæ.*

#### De Avena, quæ Bromus dicitur.

**AVENA**, iumentorũ, non hominum, eſt alimen-  
tum, niſi eos extrema fames illi nutrirĩ com-  
pel-  
lar. Eſt autem admodum calida, minimũq; nutrit  
quàm typha: & paus inde conſectũ, inſuauis  
exiit, non tamen alium aut ſiſtit, aut prorit, ſed  
quod ad id ſaltem pertinet, medium locum  
obinet.

*Bromus.*

*Avena eſt ad-  
modum calida.*

#### De Miſto & Panico.

**PANIS** qui ex miſto ſit & panico, exigui eſt a-  
liimenti, & frigidus: ac præter id, tum præaridus,  
tam friabilis, cui nihil in ſeſe liabear nec leno-  
ris, nec pinguiudinis. Quare alium iumentum  
deficiat. Porro milium ad omnia eſt panico præ-  
ſtantiũ, ſuauiſſiq; editur: ad læc cõcoquitur fa-  
cilè, ventrem minus ſiſtit, ac magis nutrit.

*Panicum.*

*Milium ad om-  
nia eſt panico  
præſtantiũ.*

## DE LEGUMINIBVS, HOC EST,

LEGUMINIBVS, CEREALIBVS, &  
quibus panis non fit: ac primum  
de Oryza.

**O**RYZA omnes ad sustentandam aliam vtuntur quod semen diffusilius quam alia concoquitur, ac minus alit, illa infusior existens.

## De Lentinibus.

**S**UBSTANTIA lenis crassa, terrea, austera & astringens exsistit. Succus autem qualitate astringenti contrariam possidet. Quare decoctū ipsarum sale, garo, aut oleo etiam conditum, alium delectat. Ceterū lenis his cocta supprimit alui profusio: si stomachum, intestina, & totum denique ventrē corroborat. Lens porro decorticata magna nutrit quāquam cortex spoliatus nō est: focum tamen crassum & prauum gignit, nec sic alui profusio desiccat. Iure igitur qui largius hoc edulio vtuntur, elephantiasim & caneros incurunt: usque tantum qui laborant cachexia, vt iter talis cibis præbetur. Qui quidem integrū & inculparū viliū libet, ipsum immoderate excoctum: ei vero qui contrario modo se habet, confert: retinetque multetia profusio. Cū autem prestans, in eo saltem, contrariū ipsi facultatem possidet, ex amborum mitione perstansissimū edulium constituit, idē minus ri portione ipsius ptisanæ misceta, necnō iatureia, aut pulegio addito. In iūmna verō, lēis aduersatur us, qui crasso melancholicoque iucco redundat. Ceterū in ipsa victus ratione, temporum ratio est habenda, sicut & regionum, & anni temporū. Etenim autumnū melancholicis ac ficcantibus cibis abstinere, hyeme autem vti oportet: quemadmodum citare humectantibus simul & refrigerantibus. At vere, quod mediū temperamentū sit, me dix facultatis cibi sum dandi.

## De Fabis.

**C**IBVS qui ex fabis conficitur statulentus est, etiā si coquantur diuissimē: id quod senescentes nonnulli, cepas ipsis adiciunt: cū quicquid statulentum cibarius esset, corrigatur per calefactionem & tenuantia. Habent autem fabæ subtilitatem non densam nec grauem, sed fungosam ac leuē, quæ vim quandam detergendi possidet. Quare fabacea farina mulieres faciem deingūnt: tollit enim leutes quæ in facie apparet: ob quam sunt facultatem, ventrem non cunctanter fabæ ipsis permeant. Porro si fixæ fuerint, sicut & legumina omnia, statim quidem depouunt, sed concoctū sunt diffusilius, tardēque prætereunt, & crassi sunt alimentū exulcent. Quæ fabæ si videres quidem collectæ sunt, postea verō asiccant, vt minus nutriūt, sic deniciuntur promptus.

## De Faba Aegyptia.

**F**ABA Aegyptia vt magnitudine, sic insita humiditate, quā nonnisi, est idēque superius, magnāque etiam excrementitia.

## De Pisib.

**P**ISA tota substantia cum fabis sunt confimilia, eodemque modo sumuntur: non sunt tamen statulenta vique adeo, nec fortuitur vim detergendi, idēque magis in alio morantur.

## De Cictribus.

**C**ICER edulium est non minus statulentum quā faba: sed valentia nutrit illa. Ad venerem autem incitat, crediturque etiam est semen gignerē. Abstergit præterea cicera magis quā faba: sic vt nigra & exigua cicera manifeste calculos renū, vel herentes, cōmūant. Sarius tamen est succum ipsorum in aqua coctum ebibere.

## De Lupinis.

**L**UPINVS lupinus, ac deinde maceratus in aqua dulci donec omnē infusauitatem exuerit, sic demum manditur cum garo & oxygano, vel solum cum sale mediocri conditus. Lupini porro substantia, dura & terrestris existit: quocirca lapie concoctū diffusiliū sit, succumque crassum gignat, est necessarium. Ex quo nō probe in venis confectis, crudus propriè appellatur succus colligitur. Quare lupinus ipse tardē ac difficulter descendit. In vniuersū autem, vt ea quæ humidiora sunt consistunt, exiguū corpori dant alimentum, & quod celeriter in halitū digerantur, sic dura & terrestris (se quorum numero lupini existit) perdurabile, copiosum, & quod argere absumatur, largiuntur.

## De Fano greco, quod sturd dicitur.

**F**ANVS manifestē calefaciens alioque semen ceteris, eundemque hominibus in cibo vtiem præstat, quem lupini. Præsumitur autem ipsum curi garo, alui subducentia grana. Caput, si sumatur copiosius, ferit. Succus elixi fœnigræci sumptus ex melle, ad omnes prauos humores, qui in intestinis habentur, subducentia est cōmmodus: suo quidem lentore, leniens: calore autem, dolore minigans. Quod autem abstergerit qualitate quoque sit particeps, intestina in amandū excrenōne instigat. Sed parcius mel ei est miscendum, ne mordacitas ipsa exuperet. In diuturnis verō thoracis citra febrem affectibus, pingues cum eo quidem palmas elixare oportet: vbi autē succum ipsum expressum copioso melle miscuere, ac rursus super carbones ad medicorem crassiem coxeris, tum demum longē ante cibum eo vti præstat.

## De Phaselis &amp; Eruias.

**H**ÆC quoque semina homines, quo modo & fœnugræci, prius in aqua, quoad radicem prodixerint, macerantes, ventris subducentia gratia mandunt ante alios cibos, garo intingentes. Succum autem, cū coctus est, atque in corpus distributus, habent copiosioris alimentū, quā fœnugræcum. Intet ea tamen quæ succum bonum ac prauum generant, inter concoctū facilia & diffusilia, tardē & celeriter transiuntia, statulenta & status expertia, multum ac parum nutritia, medium sibi vendicant locum.

## De Cicerula.

**S**UCCVM habet phaselis & eruias facultate quodammodo similem, sed consistentia crassior: ob eamque ipsam causam, plura aliquantulo, quā illa, nutrit.

## De Aracis.

**S**EMEN hoc & vīu & facultate semini cicerulæ est simile, nisi quod durius est, ægriusque elixatur, ac proinde in ventre diffusiliū concoquitur.

Cicer prouocat, venter.  
Cicera nigra, calculos renū frangunt.

Lupinus dicitur, coctus diffusilis, crassus, iurem prædoci.

Lupinus albus, non copiosus, perdurabilis, largior.

Fœnugræci sumptus ex melle, ad omnes prauos humores, qui in intestinis habentur, subducentia est cōmmodus: suo quidem lentore, leniens: calore autem, dolore minigans.

Phasilem & eruias facilius.

Cicerula vī.

Aracum facilius.

Oryza omnes ad sustentandam aliam vtuntur.

Lentis subtilitatem. Lentis faciem.

Lentis his colla venterem flammam suppressit, corroborat.

Lentis, si quis ea largius vtatur, elephantiæ sim & caneros inducit. Lentis vīu in corporis leuitat.

Lentis passana mellea, apertum excoctum modis.

Lentis aduersatur us, qui crasso melancholicoque iucco redundat. Lentis, si quis ea largius vtatur, elephantiæ sim & caneros inducit.

Lentis, si quis ea largius vtatur, elephantiæ sim & caneros inducit.

Lentis, si quis ea largius vtatur, elephantiæ sim & caneros inducit.

Lentis, si quis ea largius vtatur, elephantiæ sim & caneros inducit.

Lentis, si quis ea largius vtatur, elephantiæ sim & caneros inducit.

Lentis, si quis ea largius vtatur, elephantiæ sim & caneros inducit.

Lentis, si quis ea largius vtatur, elephantiæ sim & caneros inducit.

Lentis, si quis ea largius vtatur, elephantiæ sim & caneros inducit.

Lentis, si quis ea largius vtatur, elephantiæ sim & caneros inducit.

Lentis, si quis ea largius vtatur, elephantiæ sim & caneros inducit.

Lentis, si quis ea largius vtatur, elephantiæ sim & caneros inducit.

De Dolichis, siue Smilace hortensiu.

QUIMADMODVM frumētacea semina spicis, ita memorata legumina siliquis continentur, similiterq̃ ipsos dolichos silique continent: qui quidem minus sunt statulenti quā pis, necnō asiluentius nutriunt, ac celerius etiam descendunt. Ceterū integros ipsos atq̃ etiamum virides vni cū suis siliquis, ex oleo & garo, vt plurimum homines mandunt. Nonnulli etiam vinum adiungunt. Sed eos, nisi prius reficentur, nō reponunt, propter copiosiore humiditatem, cuius occasione solent corrumpi. In summa verō, dolichus videtur species esse illius plātæ, quā hodie phascolum appellant.

De Orobo siue Eruo.

ER. VVM insuauissimū est, & prauī succi: quare homines ab eo, nisi in summa fame, abstinēt. Vitum autem orobus ipse cum melle, seu medicamentis hamores crassos thoracis pulmonisq̃ expurgantibus. Porro inter orobos, albi minus sunt medicamentosi, qui ad statuitem, aut pallorem recedunt. Bis cocti, insuauitatem, ac simul detergendū incidendūq̃ vim amittunt, ac sic citra insignem amarorem desiccandi vim possident.

De Sesamo & Erysmo.

SESAMI semen pingue est, ideōq̃ repositum, celeritē sit oleosum. Quamobrem eos qui ipso vescuntur, celeriter implet, stomachūq̃ subvertit, vt pinguis omnia, ac tardē concoquitur, pingueq̃ corpori alimentum præbet. Est autem 30 crassī succi: ideōq̃ non proprē pervadit. Ceterum ipso solo nō vique adeo vescuntur, sed cum melle coacti in placentulas. Panibus etiam inspergitur. Erysmum sesamo quodammodo esse aliū videtur, sed eo omnino deterius. Vtrumque tamē temperie est calidum, quamobrem sitim excitant.

De Papaueris semine.

SATIVI papaueris semen, panibus vitiler seu condimentum inspergitur: est tamen album nigro præstantius. Reingerandi autem possidet facultatem, ideōq̃ somniferum est. Quōd si sumptum liberalius fuerit, soporem etiam inducit, atq̃ coquitur egre. Inhibet præterea quæ ex pulmone ac thorace tussis expuuntur. Confert verō iis qui catarrhus fluxu tenui ac capite desluentibus instantur: corpori autem multum commorabile alimentum præstat.

De Lini semine, quod Linospermon vocant.

STOMACHO noxiū est, & coctū difficile, exiguum alimentum corpori exhibet: modicam tamen mouendæ vrinæ possidet facultatē: quæ magis apparet, cum fruxum sumitur. Tunc autē magis quoq̃ silium siliit.

De Ormino, vulgō Gallitricho appellato.

PARVM in seipso habet alimētū, vt quod mediet inter erysmum & cuminum nature exstat.

De Cannabis semine.

Hoc semen concoctū est difficile, stomachoq̃ & capiti nocet, ac breuiter prauum succum producit. Multum autem calefacit, ideōq̃ sumptum paulo largius, caput ferit, vaporem suū ad ipsum mittens, calidum simul & medicamentosum.

De Vitici, siue Agni casti semine.

Id semen etiam per se fruxum mandatur, crediturq̃ appetitus inlubere venereos. Alimētum autem corpori præbet exiguum, idē siccans refrigeransq̃. Flatus autem valde dissipat: quorum omnium occasione, usq̃ ad venere paros se letare conantur, est accommodum.

De Aphace & Vicia.

Hæc legumina non insuauia modō, sed concoctū etiā sunt difficilia, alidūq̃ inhihent: quare siliuentum haud boni succi, sed crassum, atq̃ ad humorem melancholicum gignendum, idoneum exhibent.

De seminibus alienigenis, quæ in quoq̃ genere permixta reperiuntur.

Ita tritico quidem frequens lolium reperitur in hordeis etiam, sed paucum. Quam autem argilopem vocant, ea in hordeis frequens inuenitur: sicut in lente aracam, & securinum, & planta illa, quam sparinem dicunt, quæ ipsam lentē strigulat. Melampyrum autem nuncupatur ex tritici quoq̃ mutatione gignitur, sed prauitate quā plurimum a lolio relinquitur. Non igitur oportet nos in purgandis feminibus, quæ ad eūm cōparantur, esse negligentes: periculosū, etiam si nūxam quæ quondā sit, ob exiguitatem sensu non percipimus, quod tamen longo tempore ex ipsa acerustur, tandem erupturum.

## GALENI PERGAMENI de alimentorum facultate, liber secundus.

OMNIA ædulia, quæ primo libro fuerunt commemorata, plantarum et si semina, exiguum quiddam a fructibus discrepant: nunc verō de fructibus agere instituo, in quorum visceribus reperiuntur & alia semina, quæ ab ipsis fructibus maxime discedunt: cuiusmodi sunt quæ in ficibus, vuarum acinis, piris, ac denique aliis plantarum fructibus, vt cucurbitis, peponibus & melopeponibus, licet cernere semina. Ceterū in fabis, lupinis, dolichis, lentis, & aliis id genus feminibus, quæ siliquis obvolvuntur, quod quidem ex siliqua feminēq̃ est cōpositum, ipse fructus exstitit. Plurima tamen substantiæ pars in feminibus inest. Porro siliorum propemodum omnium, quæ primo memorauimus libro, semen duntaxat manditur: solius autem dolichi, dum adhuc viret, fructus ingeritur edur. Vnde veterum nonnullis arbitror sub phascolorum nomine dolichos comprehendisse.

De fructibus fugacibus, quos Græci ἀγλας nuncupant.

HORUM anni, Græci id tempus appellant, in cuius medio canalicum exoriri coningit. Tempus autem id dierum est quod triginta: quo tempore omnes horarū (quos vocant) fructus, consistunt, vt cucurbitæ, mora, pepones, melopepones, persica, & consimilia. Vocant autem ipsos horarios, quod eos ibi iis qui ad reponendū idonei sunt, distinguant. Corrumpuntur siquidē facile, nec probē asservari queūt, quemadmodum cerealia

Dolichus siue  
similax hortensius.

Dolichus videtur  
esse species  
phascoli.  
Eruum.

Orobos prauus  
est succo.  
Orobos expurgans  
potius.  
Orobos dupli-  
cis.

Sesamum sub-  
uicet floues-  
cium.

Sesamum cras-  
si est succi.

Sesamum cum  
molle in placu-  
tulis coquitur.

Erysmum.

Sesamum cal-  
idum.

Papaueris siue  
alimodi perni-  
tiosus panis.  
Papaueris fa-  
cultatis insig-  
nosus.

Linospermon.  
Lini semen mo-  
di vniū ma-  
net.

Orminum.  
Gallitrichum.

Cannabis si-  
men calidum est,  
aspisq̃ ferit.

Vicia.

Agni casti siue  
flatus dissipans,  
quæ nomen ar-  
cit venereum.  
Aphace.  
Vicia.

Lolium.  
Argilopa.

Aracam.  
Securinum.  
Aparinem.  
Melampyrum.

Semina quibus  
refugantur, esse  
diligenter pur-  
ganda.

Fructuum  
semina.

Dolichus ad si-  
mul cū siliqua.

Horæ quod si-  
pau anni ducit-  
tur.

Horarios fru-  
ctus corrupti fa-  
cile, ægre as-  
servari possunt.

*Cucurbita quo  
modo reponatur  
in hyeme.*

cerealia omnia. Nonnulli tamen ē cucurbitis semen vacuantes, dein earum velut carnē siccantes, in hyemem reponunt. Porro quæ corpus habent cōpactam, ea vī permanentem, sic solidam, terream, multig nutritiui substantiam possident. Quæ verō cōsistentia sunt humida, corrum puntur, exiguūq; habent alimentū, & quod ex cernatur facili, potissimum cūm nitrosum quipiam ipsis inest, ac detergendi facultas. Tabia sane ē deterioris succi esse perhibemus istis, quæ nullam saporis qualitatem habent sensibilem, quomodo aqua optima nullam habet. Hæc igitur omnia, & us multo magis quæ ante exactam maturitatem manducant, stulticia quidem sunt, verum subducuntur celerius: quemadmodū etiam quæ succum habent tenuem, citius distribuitur. Sunt autem omnia hæc pravi succi, solidiq; vī lter ipsis vīetur, qui æstu vehemētiore, & longiore itinere sese cōfecerit: tunc enim iuvant, corporis squalorem humectantia: & si frigida sumuntur, moderatē refrigerantia. Etenim humectandi quidem semper habent facultatem: refrigerandi verō nequaquam, si calida, sic vt dixi affectus, fuerint comesta.

#### De Cucurbita.

CRUDA quidem insuavis est, concoctūq; difficillima: hominū ledit, nisi vomitione reddatur. Hanc igitur & alia fugacis plerag, aut post elixa fuerint, aut statim certē, aut in farragine friza, aut assa, omnes homines esse consueverunt. Sequēdum cucurbita elixa, prorsus insipida est: quocirca multos apperandi modos admittit, vt quæ in medio omnis excessus consistat, ob idq; ad quemvis excessum ex quo ducl queat: ac proinde illis quibus multa fuerit, assimilatur. Hæ verō cucurbita, quantum in se est, humidum frigidūq; & ob id exiguum corpori alimentum præbet: facili tamen descendit. Sed neq; coquitur ægrē, si modō prius corrupta non fuerit: id quod interdum ei, vt aliis omnibus humidis, simulac fugacibus accidit, si diutius in ventriculo hæreat. Assa autem vel friza in farragine, plurimum quidem de propria humiditate depōnit. Cæterum obqueam sibi qualitatem iuuantem, mento gaudet origano.

#### De Pepomibus.

UNIVERSA Peponum natura frigidior est, cum humiditate copiosa. Habent aut vīm quādam abstergerdi, cuius beneficio vīnam cūent, & deorsum expeditus quādam cucurbita, melopeponēsq; permeant. Semen autē potentius quā ipsum veluti caro, deterget: adeo vt adversus renes calculo infestatos conveniat. Succum tamen in corpore gignit vinoosum, idq; potissimū, cūm concoctum probē nō fuerit: quo casu cholera morbo obnoxios consuevit efficiere. Quinetiam priusquam corruptum fuerit, ad vomitum quoq; est idoneum, præcipue si largius sumat.

#### De Melopeponibus.

MELOPEPONES minus quā pepones sunt humidi, nec adeo pravi sunt succi. Minus item vīnam mouent, traditūq; deorsum descendunt. Ad vomitum præterea excitandum, non tantum, quantum pepones, habent momenti, nec adeo celeriter in ventriculo corrumpuntur, est

in iuuādo eo, autumnalibus fructibus longē sint inferiores.

#### De Cucumeribus.

VRINAM quidem & ipsi, quomodo pepones, cient, minus tamen quā illi, quia ipsorum substantia minus humida est, idcōq; non facili, vt illi in ventriculo corrumpuntur. Invenias autem qui ipsos concoquant, ob naturam cum eis familiaritatem. Siquidem a tonis substantiæ proprietate, suus cuiq; animantium generi cibus est familiaris: vt cornubicibus quidem elleborus, sturnis autem cicura. Cæterum quibus biliosus humor, aut omnino prauum excrementū quodvis, in ventriculo sæpe congeritur, in iis quæ natura concoctū facilia sunt, celeriter corrumpuntur. Quod si quispiam eorum aliquid, quæ cæteris concoctū sunt difficilia, concoxerit, succus tamen qui ex eo in corpus distribuitur, eandem semper retinebit naturam. Quare omnibus pravi succi edulius censeo abstineudum, enam si ea quibuscūq; esse concoctū facilia videantur.

De fructibus qui ab arboribus colliguntur.

EX fructibus quibus vescuntur homines, humidi quidem, tenue humidūq; corpori alimentum præbent: quod ob id per corpus celeriter permeat, excernitūq; tum per cūm, tum per vīnam. Consistentia autem solidi, vt alimentum copiosius exhibent, sic etiam ad permeandum tardius.

#### De Ficibus.

FIGVS tanquam prauitatem non potuerunt omnino effugere, facili tamen totum corpus pervadunt. Nam & abstergerdi quoque insignem obtrinent facultatem: quo fit, vt post ipsarum esum, nephroci arenulas multas excernant. Nutriunt præterea vberius cæteris autumnalibus fructibus: sanbus tamen hæc quoque implent. At quæ ficus prorsus iam maturuerit, propemodum nihil omnino lardunt, quomodo nec carix, quæ multiplicem quidem præstet vīlatem: si quis tamen largius eas esiauerit, offēderetur ab ipsis, quandoquidem sanguis non admodum probum gignunt. Quo fit vt ex ipsarum esu pediculorum multitudo proveniat. Hæbent etiam tenuandi facultatem, & incidendi, quæ ventrem quoq; ad excretionem irritant, renēsq; expurgant. Cæterum lecori, liensiq; inflammatione obfests sunt noxi: quemadmodum & ficus, cōmuni omnium dulcium ciborum ac potum ratione. Abstrusus tamen illis, ut scirrius ascedis, ipsi ex sese nihil cōmodant, nec officiūt: sed medicamentis incidendibus, extenuantibus, & abstergentibus mistæ, non medio critere iuvāt, tum canca tum ficus.

#### De Vitis.

FIGVS & vīa quemadmodum inter autumnales fructus principatum obtrinent, ita fugacibus omnibus magis nutriunt, minimūq; pravi succi habent: laxam tamen carnē ac praximūdam gignunt, ob idq; celeriter staccēcent. Verum vīa minus alunt quā ficus, maximsiq; id ipsis inest cōmodum, quod descendat velociter. Quocirca si quēdo hæserint, grauit lardūt, quum id minimē maturis ficibus in sit. Etenim

*Cucumeris insuavis vīnam,*

*Cucurbitis vacuatur eliborosis.*

*Sturni aluntur cicura. Sole reducenda est ventriculi, corrumpere cibis comesta facilia.*

*Ficus præstare nulas sanitatis exergendi, prædita, fructibus tamen non plent.*

*Caricæ vberius sumptas, pediculorum multitudinem figere. Caricæ fuscæ, quæ ad versari inflammata vīntibus cum minus emolliant dulcium ratione.*

*Vīa minus alunt quā ficus, quod descendit quæ velociter.*

*Aqua optima nullam habet gustus palatatem blandie.*

*Cucurbita quo si aspidia, multo apparatū dūm q; a d. macta, cōducunturq; vīam quā in cila sunt, assimilatur. humidis tant frigiditq; diuturnum lardit, vt quæ in ventriculo hæreat.*

*Pepomum facultas. Vīnam cient.*

*Pepomum semē mouentur calidum reuocant.*

*Vomitum præbet.*

*Melopeponum facultas.*

*Acinorum substantia ex quibus conficitur.*  
*Acinorum semina astringere, ubique misceri in corpore.*

*Mustum non nisi ventri fiat, ut pertranseat velociter, ut pertranseat velociter.*

*Vua quae nutriendae magis, et quae ducenda sunt promissa.*  
*Vua generosa quae sunt.*  
*Vua affluens, ubi induritia durescit.*  
*Vuarum affectionum differentia.*

*Vua dolens quam vini possideant.*  
*Vua austerior.*  
*Arida.*  
*Acriora.*  
*Vinosa.*

*Mustum dulcis, si sumum, solidum, et alium maiorem.*  
*Lena et opifera.*

*Lena quae ratione non possit reddatur.*

*Vuarum passiva et differentia et facultas.*

*Passivum quae praesentia habent.*

acinorum substantia, composita est ex carne, humore, seminibus, atque ambiente pellicula. Ceterum substantia semina sicca est, & quodammodo astringens, omniaque intestina pervadit, nihil, quod sensu queat apprehendi, & si mutata: non secus ac in fibribus *myopidibus*. Exiguam etiam tegumentum acini recipit in ventriculo mutationem. Quare si sola acinorum caro cum succo sit transglutita, magis alvum laxabitur. I. axatur autem impenitus, cum solus ipse succus expressus (vulgo mustum appellant) fuerit epotus: qui ventrem, ni pertranseat velociter, non nihil flatibus implet. Ex hoc sane alimentum non nihil corpori accedit: copiosius tamen ex carne substantia. Ergo quibus visus exigua est succus, ex magis nutritum. Quibus vero vberior, minus quidem nutriendum, sed promptius deiciuntur. Vocant autem vuarum huiusmodi generosas, quae humidam quidem substantiam habent exiguam, solidiorē autem non paucam. Quaa quidem reponente, eas in mustum concitiunt, aut impletas eis novae olas, sic in vinacis, hoc est, in vuarum reliquiis, recondunt, ut ne minimam quidem habeant respirationem. Atque huiusmodi sane vuarum, ventriculum dissolutum corroborantes, hominibus appetentiam restituunt, non tamen per alvum descendunt. Quod si sumitur largius, serunt caput: minus tamen quam quae in musto conduntur. At pensilis, nihil prorsus caput laedit: ventri autem nec sistit, nec ad deiectionem irritat. Porro vuarum in musto, aut in ollia reconditae, aliarum omnium facillime concoquuntur. Cum autem non sit parva differentia inter vuarum, quae sane dulces existunt, calidiorē possident succū, ob idque siticulosi sunt, atque alvum subducunt: austeriores vero, acidae, acerbiores, frigidiore: ac proinde non excretioni modo, sed coctioni, distributioni, & nutritioni sunt noxae. At qualitates expertes, quas vinosae appellant, locum inter calidum & ingidum, medium obtinent. Maxime autem subdunt alvum, ipsam multum dulcissimam. Quod vero ab visus austerior aut acidis est expressum, ad omnia pessimum est. Solent praeterea coniecta in parva dolia vinacis, tantū aquae superaffundere, quoad omnia permadeant. Quod ubi satis factum videretur, in dolij fundo foramen aperiant, ut dilurum (quam nos appellamus loram) effluat: id quod postea pro vino bibant. Capitia tamen dolorem afferunt, nisi quia dilutiorē loram ipsam ebibant: quamvis ocyus per vrinam excernitur. Ceterum dilutū id multo vinosius efficitur, si vinaceus ad verum aut aetatem, repositus fuerit.

#### De Vuis passivis.

VUA passiva cum aliis visis eandem habent rationem, quam carice cum fibribus. Ceterum ut dulces temperamento sunt calidiores, ita austeriores frigidiore: quae quidem stomachum roborat, & ventrem conficiunt, & his multo magis, acerbior: inter quae medium quodammodo constitutionem dulces obtinent. His enim ut vis quaedam semper inest contemperandi, ita & medicioriter detergendi: unde exigua mordaciorum, quae ventriculi infestant, obtundunt. Inter passivas autem praedantiores sunt, quae tum pingues sunt, tum cuticulam habent tenuem. Quae quidem si

inveteratae sint, aqua praeacerata, purgataque a seminibus, multo praedantiores redduntur. In Cliticia tamen crebunt nonnullae solidae, minus laxae, nullum semen prorsus habentes. Porro in regionibus frigidis, ne vix quidem ipse exquirere maturari queunt, nedum passivas quae iam: ob idque resinam visis immittunt, ne acescant celeriter. Alimenti ex passis tale qualitate in corpore distribuetur, qualis ipsarum naturae fuerit: quatenus verò, copiosius ex pinguib. dulcibusque: parcius ex austeris & macris. Quod si pinguiū dulciumque repurgarū parem molem cum pari vuarum mole contuleris, passas valentius nutrire deprehendes.

De Sycaminis, quae & mora appellantur.

MORA (quorum succum recipit medicamentum duorum, ori gratum) celerissime pertranseunt, cibis aliis praecunt, si in ventriculum purū incidunt, & sumpta in primis epulis fuerint. Quod si post alios cibos sumitur, aut praeuam succum in ventriculo offenderint, celerissime computrescunt cum aliis cibis, ut in cucurbitis accidit. Quare postiores si cibi sumendi sunt, qui tarde permeant: sic omnium primi, qui celeriter quidem permeant: corrumpuntur tamen, si in ventriculo commorentur diutius. Tempus verò utendi ut peponibus, ita & moris est, cum corpus ventriculi iqualore aestuat: quo tempore necesse quodammodo est hepatis quoque idem accidere. Porro mora, cum non admodum maturerint, qualitates quaedam astringens inest, sicuti & immaturioribus acidis: unde nonnulli iis ressecant, ad diuturnam alvi profluviū vtrunt. Matura autē si corrupta non fuerint, omnino quaedam humectat: non tamen omnino refrigerant, nisi sumpta frigida fuerint. Alimenti verò corpori praebent minimum, quomodo pepones: non tamē ut si vomitum exoriant, neque stomachum laedunt.

#### De Cerasiis.

EX CERASIIS quaedam sunt moris similia, cuiusmodi sunt quae nullam habent astringentiam: alia ruborum fructui, quae evidentius astringunt. Quaedam autem sunt quae vel valentius astringunt. Proinde memoratae cuiusque speciei facultatem, ex iis quae de moris & rubi fructibus dicimus, potes colligere.

De Rubi fructibus quos *Astron* vocant.

MAGIS astringunt quam mora: quod si quia largius ipsis vescatur, capitis dolore leniet. Alii stomacho anguntur. Proinde ut mora, sic fructū hunc, prorsus non edatur, maxime abluere oportet. Cohibet autem ventrem: atque medicamenta omnia quae ex mororum succo parantur, si ex hoc rubi fructu fiat, facultate habebunt efficaciorē.

De fructibus Canarubum, quos *Hydrus* appellant.

MULTO magis quam rubori fructus astringunt, ac venter cohabet: parūque alimeni suggerunt. De luniperi fructibus.

FRUCTUS iuniperi, acris admodum est, cum exigua dulcedine, & minori praeterea astringentia. Habet autē & aromaticū quiddam: unde constat, quod calefacit. Omne enim aroma calidū. Hepar autem & renes purgat: succo crassos & lentos tenuat: unde medicamentis salubribus admiscetur. Ceterum alimentū praebet exiguum.

At

*Passivas magis in semina et in Cliticia crebunt.*  
*Vua non maturent nisi in regionibus frigidis.*  
*Passivum quae sunt corpori ali mentum largiuntur.*

*Passa valentius nutriendae quae vae.*

*Diamorosa ori gratum.*

*Mora debere alvi cibis praecedere.*

*Cibi qui tarde quidem permeant, postiores sumendi sunt: qui celeriter autem permeant, primi.*

*Mora venter ressecant, dum immaturioribus acidis: unde nonnulli iis ressecant, ad diuturnam alvi profluviū vtrunt.*

*Cerasorum facies et facultas.*

*Rubina.*

*Rubi fructus venter et facultas.*

*Cynobates. Canarubum fructus facies.*

*Iuniperi fructus facies.*

*Aroma omnia calidum.*







*Palma Aegyptia.*

gentesq; ut Aegyptiæ: alia molles, humidæ, & dulces, ut quæ *Aegyptiæ* appellantur. Reliquæ omnes palme inter hæc duo genera videntur medæ. Omnes autē difficiles concoctū sunt, capitig dolorē conciliant, si largus sumatur. Porro succus quæ ab ipsis in corpus digeritur, crassus omnino est: habet etiam & lentoris quippe, cum palma ipsa pinguis fuerit. Cōm autē dulcedo tali succo permixta sit, celeratim quidē lepar ab ipsa obstruitur. Lædatur autem vel maximē à palmularū esu, \* vel inflammatū, vel scirrho affectum. Post lepar enim lien & obstruitur, & læditur. Quod autem dulces palme succum calidiorē possideant, sicuti & astringentem, magis frigidum: quodq; virides, status gignant, nec in regionibus non admodum calidis possint maturare exacte, perspicuum est.

#### De Oliis.

*Palmas non macerantur nisi in regionibus admodum calidis.*

EXIGUUM quidem & ipse corpori alimentum præbent, potissimumq; caducæ. Edunt autem homines has quidem cum pane, maiori ex parte: sine illo verò, quas halmasdas & colymbas vocant, idq; garo perfusas, & ante alios cibos, ventris subducendi gratia. Porro quemadmodum caducæ, pinguitudinis habent plurimū, ita hæ succum astringentem: proinde stomachū roborant, & appetentiam excitant. In vniuersum autem, quod suauius est, facilius iis quæ ex æquo sunt salubria, concoquuntur.

#### De Nucibus.

*Salubriorem cibum, ut quæ ex aqua sunt factæ, facilius non aq;.*

NVCAS corpori alimentū præbent exiguum: copiosius tamen Ponticæ nuncupant, quas auelanas appellant, quod substantia ipsarum coarctior sit, minūsq; oleosa quā regiarū, hoc est, cōmuniū. Habet tamen & asstringentis facultatis exiguū ipsa nux regia, quæ procedente mæcæsi tempore, tota ipsis substantia, in cibum pinguem transmutata. Coquunt autē hæc nux facilius, quā Ponticæ, stomachoq; est gratior, & multo magis quando manditur cum caricis. Hominē à pharmacis letalibus nihil magnopere lesūm iri, si vitæq; hæc ante alios cibos cū rursū sumperis, proditū est. Liquer præterea, quod humida quidem apta ad dēfectionem est, sicca verò minus. Plerique autem ventris subducendi gratia, cum garo etiā ipsam præsumunt, in quem vsum viridis est accommodator, vtpote minus asstringens. Quin & siccarū quoq; si in aqua fuerint præmacerate, facultas, viridibus est assimilis.

#### De Amygdalis.

*Nucem regiam, si cum carica et rursū sumatur, fieri alexipharmacum.*

SOLEA in amygdalis tenuandi facultas ac detergens præpollit, qua tum viscera purgant, tum humores & pulmonibus ac thorace, spūis expectorant: sed potentius quæ amara sunt. Sunt autem omnes oleosæ & pinguis qualitatē participant, minus tamen quam nuxes: quare tardius illis oleosæ fieri cernuntur. Cæterum nec ventris subducendo conferunt, nec corpus multum nutriendum.

#### De Pistaciis, vulgò fisticis appellatis.

*Amygdalis non multum nutriunt.*

QUALITATEM obtinent aromaticam, subamaram, & subasstringentem. Quare parum quidem nutriunt, verum ad hepar roborandum, & succo in ipsis vis infarctis purgandos, conducunt.

*Pistacia.*

#### De Prunis.

HIC fructus minimū quidem nutrit, sed ventrem mediocriter humectat, atque refrigerat, ipsumq; tum humiditate sua, tum lentore, subducit. Siccatior porro esse cū potest, vt ficus. Damascena pruna perhibetur præstantissima omnium. Scidæ tribuitur partes iis quæ in Hispania perveniunt. Maximē illa omniū probatur, quæ cum mediocri asstruione, magna simul sunt, & laxa. Cocta in melicratō, in quo pluculū sit mellis, ad modū albi delectat, etiā si quis sola ipsa sumperit, & multo magis, si postea melicratum biberit. Confecti etiā ad iudicandum albi, post sumpta ipsa, vinū dulce exhibere, temporisq; aliquid interponere, non autē statim potū prandere: quod in omnibus solentis sit præceptum commune.

#### De fructu quem Seneca appellant.

EXIGUUM quidem est alimentū, & cōcoctū difficilis, nec rursū quicquam stomachum.

#### De Ceratis, hoc est, siliquis Algatobas.

Hispani vocant.

EDULUM lignosum est, ob idq; prani succi, & concoctū difficile existens, nō dēcurrit facili.

#### De Cappare.

TENUUM quidem est partiū, ac proinde minimū alimentū exhibet. Vniuersa autē fructū luvius plantæ magis vt medicamentum, quā vtilimento. Sale enim cōspersus ad nos importatur, propterea quod putrescit, si reponatur solus. Vbi igitur salinaginem deposuerit elota, collapsam appetendi vim excitat, puritatem ventris detergit, atq; subducit, purgatq; tum lenis, tum lepatas obstruções. Vti autem ad eas res oportet ante alios omnes cibos ex oxymelite, vel oxelao. Huius etiam plantæ, virides ac teneros succulos, nō aliter quām tercolinthi, mandunt, in aceto simul & muiia, aut solo aceto condientes.

#### De Sycomoris.

PLANTA est parva ficū alba: perissimilī: cuius fructus exigui est dulcedinis participes, in mororum atq; ficuum medio consistentes, unde nomen contraxit.

#### De Persæ planta, quæ à Persicā diversā existit.

HVVS arboris fructū apud Persas adeo esse noxiū fertur, vt pernam: esculentum autē evadere, in Aegyptum translatur.

#### De Citrio, quod etiam malum Medicum vocant.

TERTIUS fructus partes existit: acida, quæ in medio ipsius sira est: præterea quæ velvū fructus est caro: & tertiā, quæ vt tegumentum extrinsecus circumdatur, sua olei & aromatica existens. Atq; hæc sanē concoctū difficilis est, vtpote dura & callosa: quanquā vt medicamentū exhibita, cōcoctione auxiliatur. Partē autē ipsius mali acidam, in aceto imbecillum coniciunt, quod ipsum longē acius redant. Ceterum pars inter dictas media, quæ neque aridam neq; acrem qualitatem forsitur, propter duritiem etiā concoctū est difficilis: quare ipsam omnes cum garo & aceto edunt.

#### De fructibus plantarum agrestium, inter quos sunt quercuum glandæ.

PLANTAS illæ vocantur agrestes, quæ citra mægoni

*Prunorum virent. Damascena pruna. Pruna Hispanica.*

*Pruna colla in melicratō, albi subducere.*

*Solanū quod vbi aliquis sumperit, non statim illi prandendum esse Seneca.*

*Ceratis, Soligæ.*

*Cappero facit catinacum.*

*Cappero rursū dem in pruna spolia esse, idq; ex oxymelite, vel oxelao.*

*Sycomora.*

*Persæ fructus.*

*Malum Medicum.*

*Citrium ex quo bus coquitur paritibus. Citry contra concoctus non auxiliatur. Acetum imbecillum cū citry aceto si acetum.*

*Planta agrestes, quæ sunt. Glandæ quercuum.*

gonij industriam proveniunt, ut fagus, quercus, ilex, cornus, comarus, rubus, canis rubus, adierus, pirus, atque agricoecymelus; cuius fructus appellatur in Italia vnedo, stomacho que nocet, & capitis dolorem concusat: effig acerbus cum exigua quadam dulcedine. Porro glandes æque triunt, ac frumentaceorum eduliorum pleraque. Alimentum autem quod ex eis sumitur, tardi est transitus, & crassi succi: ob idque sunt concoctio difficilis. Cæterum Gomari fructus: *papaveris* 10 appellatus, glande quædam ad omnia est detrior: quemadmodum hæc glande, quam vocant castaneam.

De alimento quod à plantis ipsis agrestibus sumitur.

Non modò plantarum semina & fructus, sed etiam integras ipsas sæpenumero mandamus: idque ut virgente necessitate, aut etiam suavitatis gratia. Siquidem palmæ verticem edimus, nec non tenellas spinas, aut elixas, aut crudas, vel si ad id genus adaçti non simus. Cæterum omnia id seminis & parvisimè nutriunt, & pravi succi sunt productiva. Quædam etiam ex ipsis, noxam ventriculo adferunt, præter spinas, quæ nunc primum à terra emerunt.

De Lactuca.

Hoc olus succi est, quam alia omnia, laudabilioris. Nam quum reliqua omnia sanguinem gignant paucissimum, ac pravi succi, lactuca nò multum quidem generat: tamen nec mali succi est, neque omnino laudabilis. Porro dum essem iuuenis, ventriculusque mihi infestaretur bili, lactuca, quò ipsum refrigerarem, vtebar: quum verò ad ætatem declinarent perveni, hoc ipsum olus fuit mihi contra vigilas auxilio, quæ senibus esse annæque videtur. Habet itaque lactuca succum quidem frigidum atque humidum, minimè tamen pravam. Quare nec concoctioni resistit, nec perinde ut reliqua olera, ventrem cohibet: si vñ neque etiam prorat.

De Sen, siue Intybo.

INTYBI facultatem habent lactucis similem: suavitatem tamen & cæteris quæ lactucis insunt, ab eis relinquantur.

De Malua.

DISSIDENT agrestis malua & fatiua, quòd hæc quidem humiditate, illa siccitate exuperet. Vtraque autem calorem habet moderatum & tepidum, facilèq; subducitur, non modò propter humiditatem, verum etiam propter lentorem, præsertim si cum oleo & garo, copiosa ipsa ingeratur. Nutrit tamen mediocriter.

De Beta.

SYCCVS betæ abstergendi vim adeò manifestam sortitur, ut ventrem ad excernendum excitet, atque stomachum mordicat, præsertim quibus sensu exactiori est præditus. Ob idque edulum id est stomacho noxium, si largius sumatur. Corpori autem ab ipsa, ut ab aliis oleribus, paucum alimentum accedit. Verum obitu scilicet hepatis magis quam malua aperit, præcipue si cum sinapi, aut saltem cum aceto mandatur. Lienosis item eodè modo sumpta, vitæ medicamentum exiit.

De Brassica.

BRASSICAS quidem succus purgatioe pos-

siderat facultatem, effig non probus, ut lactuca, sed pravius graueolensque: at corpus, còmunis siccantium ratione, magis sinit quàm laxat. Quare dum humentem alium reficicare est consilium, brassica ipsa discocta in secunda aqua donec extrahescat, vitur. Quippe nihil quod accuratè coquatur, proprii succum feruare omnino potest: sed necesse quidem est ut totù abiciatur, si coctum diutius fuerit. Quim & lenticulæ diximus eodem quo brassicam inodo, oportere parari, ut quæ vtriusque possit efficere, ventris subductione scilicet, & cohibitionem. Cæterum nihil ex iis quæ bis coquuntur, ætrem frigidum, aut frigidam aquam attingat, alioquin non extrahescet: sed oportet calidam in promptu habere, ut cum ex priori extraxeris, protinus in illam concias. Lens itaque & brassica, æquali inter se mensura siccant, ob idque visum hebetant. At lens quidem, non exiguum corpori alimentum præstat, idque crassum, & melancholicum: brassica verò paucum habet alimentum, verum quàm lens humidius.

De Atropice & Biro.

HÆC sunt alius oleribus aquosiora, necnon qualitatis expertia magis quam eucurbita, aut saltem non minus, cum cocta videlicet fuerint. Quo fit, ut non ex solo oleo & garo ipsa mandant, sed acetum etiam iniiciant: alioquin sunt stomacho noxia. Corpori porro alimentum præstant exiguum, nonnullisq; ad detractionem inclinant.

De Portulaca.

NUTRIMENTUM exiguum exhibet, idque humidum, frigidum, atque lentum. Quo sanè lentore suo mordicationis experte, stuporem dentium perferant.

De Laphatho, quod licet appellare beatam agrestem.

NON gustu modò, sed viribus etiam beatæ hor tensi est persimile. Quia tamen beta laphatho est suauior, idcirco nemo est, qui ipsa non libentius 40 vescatur.

De Oxylaphatho, siue Rumice, siue Laphatho acido.

MULTI RES rustice laborantes pica, necnon pueri quidem gulosi, oxylaphathum crudum interdum mandunt: quod quidem olus non nutrit multò magis quàm laphathum.

De Solano, siue Solario, siue Morella.

RARO ipso vitur ut alimento: ut medicamento autem, a siccis. Efficax enim est in iis, in quibus strictioris refrigerantis visus incidit. Men- 50 tum autem est nutrimentum.

De plantis spinosis.

PLERUMQUE rusticorū plantis huiusmodi è terra super emeritis, prorsus quàm ipsarū folia desinant in spinas, vescuntur, non crudis modò, sed in aqua etiam elixis: crudas quidem aceto & garo innungentes, coctis verò præter hæc assondentes oleum. Mediocriter enim iuuant ventriculū.

De Cinnara, quam Romani Caccopham,

Galli Arachao vocant.

PRÆVI succi est edulum, maximè cum plusculum obduerit. Tunc si quidem ex ea succus melancholicus: ex ipsius autem succo, tenuis ac baliosissimus gignitur. Quare longè satius fuerit ipsam elixam, aut frixam mandare.

R 2

Vandemum cum  
olere dolorem  
capitis.

Gomari fru-  
ctus.

Castanea.

Palmæ vertice  
et visum.

Spina recentior.

Olera amara  
gignunt paucis-  
simum sangui-  
nem, præcipue  
succo, excepta  
lactuca.  
Lactucam re-  
frigerant, & se-  
ni manifestam esse  
veritas esse co-  
gnita sunt.

Senn.  
Intybum.

Malua veriusq;  
faciliat.

Beta succi in-  
ferum extergit  
siccitate esse  
præditum.

Brassica succum  
quidè purgat,  
corpus autem  
necque soluit,  
quàm laxat.

Brassica desola-  
ta.

Lenticulam al-  
tem subducit  
siccitate.

Lens brassica-  
que vtrum be-  
bent.

Atropice.  
Biro.

Portulacum sa-  
nore superem  
dentium.

Laphathum.

Oxylaphath.  
Rumice.  
Laphathum  
acidum.

Solanum.  
Morella.  
Morella astrig-  
ua, refrigeran-  
sque.

Plantæ spin-  
osa.

Cinnaram  
prævi esse succi.

Apium,  
Pterisfolium.  
Sio.  
Smyrnaum.

Smyrni habet  
in magna pre-  
parata heme.

Hippocistum.

Cibi infusa-  
ta magna ex  
parte in causa  
est, qui min-  
us in causa  
conferunt.  
Candida co-  
quuntur plus  
interdum ob-  
scure proficiunt.

Erucis foliis  
erucis spec-  
matum.

Acelyphe.

Vitica alium  
denotat.

Gingidium.  
Scandix.

Ocymum.  
Aspidium.

Feniculi olim  
etiam in tota  
annum repon-  
batur.

Asparagum com-  
munis dicitur  
tenuis  
caulis, quo tem-  
pere ad semina  
produci solet.

Asparagi dicitur  
suum sicutum.

De Apio, Hippocistino, Sio, & Smyrno.

Ita c omnia vrinis cient: inter quæ apium est  
vtriusque, & iuuat, atque stomacho gratum. Pe-  
troselinum autem, & Sion, iuuatiora. Smyrni  
verò non est iuuatiorum. Si quidem Romæ maxi-  
ma copia manditur, acrisque multo est quam a-  
pium, necnò calidius: præterea aromaticum etiam  
nōnnulli possident. Prouide vrinis valentius pro-  
uocat quam apium, quæ Hippocistum &  
Sion, mensis mulieribus mouet. Ceterū Hip-  
pocistum ipsum & Sion, cocta mandunt, cum  
vtriusque ipsorum crudum sit infusae. Nam tam-  
en nos vilitatem quæ ex cibis provenit spec-  
temus, non voluptatem, quia tamen cibi infusa-  
ta magna ex parte causa est, qui minus ipsum  
nonnulli conficiunt, ob id iuuatiorum satius fuerit  
ibos condire interdum modico: non vti co-  
qui faciunt, cōdimenta quorum plus interdum  
concoctioni obfunt, quam profint.

De Eruca.

Hoc olus manifestissimè calfacit, semineque gi-  
gnere creditur, & coctum excitare appetitum.  
Capiti enim dolore insert, præsertim si quis  
ipso solo vescatur.

De Acelyphe, siue Venica.

TENVIVM est vinum & partium: vnde ne-  
mo ipsa vt alimētum vntur, nisi fame extrema pre-  
matur. Vtilis autem est, vt obsonium, ac medica-  
mentum quod alium deicit.

De Scandice, Gungido, quod Cha-  
resolium vocant.

GINGIDIVM non aliter q̃ candix manditur  
apud nos, stomachumq̃ admodum iuuat, colla-  
psimq̃ alius appetitum, si cum aceto sumatur,  
excitat, siue elisum siue crudum mandere velis.  
Elixanonē tamen diuturniorem nō tolerat. Est  
porro uon tam alimētum, quam medicamentum,  
attributionē & amarorē nō mediocrem sortitur.

De Ocymo, quod vulgo Balsicon vocant.

Hoc olus ventriculo exulit noxum, præuius  
succo, & concoctio difficile.

De Feniculo.

ASSIDVA vtuntur anetho quidem in condi-  
mentis, feniculo autem etiam in obsoniis. Nam  
apud nos sanè reponunt ipsum, eodem modo  
quo pyrethrum & terebinthum, adeo vt in to-  
tum annum sit vtile.

De Asparagi.

OMNES propemodum Græci, teneros cau-  
les, quo tempore ad fructus acfeminis produ-  
ctionē augescunt, asparagos cōmuniter vocant.  
Brasice igitur germen, minus q̃ brasica ipsa sic  
cat: tamen illi olus oleum calidius temperatura sit  
vtriusque q̃ folia sicciore: vt ampeliscus, lactu-  
ex, bitor, betas, malicq̃. At radicle asparagus, si-  
cuti & rapæ, sinapi, cardami, pyrethri, & omniū  
propemodum acris & calidioris, humidior ex-  
istit. Bulbus autem, apium, sion, eruca, ocymum,  
oxylapathum, lapathum, & omnes oleracei ge-  
neris herbf, antequam semen effundant, eiusmo-  
di caulem quendam producant, qui post semen  
effusum siccatur, sitq̃ ad cibum hominibus vti-  
lis. Hæc autē omnia aqua incocta mandunt cum  
oleo & garo, paucis aceto adiecto. Alimētum ta-  
men paucum dant corpori, neq̃ id boni succi.

De alio genere asparagorum.

Quæ asparagi in oxymyrtine, chamædaphne,  
oxyacantha, & bryonia proveniunt, actum is qui  
regius, tum qui latus vocatur, omnes inquam in  
stomachū iuuat, vtriusque cient, ac parū nutriūt.

De germinibus.

ARBORVM ac truncum germina, olerum a-  
sparagos proportionē respondent. Quæ quidem  
omnia aqua incocta manduntur, præter infusa-  
ta quædam ac medicamentosa. Quibus etiam  
urgente fame, homines vesci coguntur. Omnium  
tamen præstantissima sunt, terebinthi, viticis, vi-  
tis, iunci, rubi, & caurubi germina.

De discernimine quod paribus plantarum  
esculentarum inest.

NON est autem Mnestheus audiendus, vbi ait,  
radices omnes concoctū difficiles esse, longeq̃  
ipsis foliis crudiores. Radicula siquidem, radice-  
m habent caule ipso, ac foliis acriorem: simili-  
ter cepa, ampelopraium, porri, & allium. Quod  
si betæ quoque, & malux, & rapæ radice cōparare  
ad iolia volueris, plus vinū in ea deprehendens  
quæmadmodū & in altitæ, quæ agrestis quædā  
esse malus videtur. Nā radix ipsius, vt & betæ, cū  
tumores multos pituitosos discit (ad quod fo-  
lia prætare nequeunt) plane facultatē suam indi-  
cat. Etenim quod in radicibus ad genus probe cōse-  
ditū non fuerit, in iolia & caule ipsa natura ex-  
cernit: vt facere videtur etiam in ceruis, totius sub-  
stantiæ extremis, ad gignenda cornua, minime  
necessaria transmittens. Tenuis itaq̃ est, gustatū  
prius atq̃ olfacientem, singulas plantarū partes  
ipsas per se explorare: post autem experiri manden-  
tem: quandoquidem olfactus & gustus, om-  
ne ipsius plantæ temperamentum ostendunt.

De Rapa iue Bumade.

DURA quidem est, minimèq̃ esculenta, nisi co-  
quatur. In aqua autē cocta non nutrit minus cō-  
generibus salus. Succū autē in corpus distribuit,  
mediocri crassiorē, coctionemq̃ diuturniorē de-  
siderat: atq̃ illa vnicè cōmēdatur, quæ bis cocta  
fuerit. Quod si crudior sumatur, cōcoctū diffici-  
lior, & flatulenta redditur, stomachoq̃ noua.

De Aro.

MANDITVA & huius plantæ radix eodē mo-  
do quo rapæ. Ceterū quæ ipsam coquis, priore  
aqua effusa, in aliam calidam, eam cōdicere con-  
uenit. Quæ autē acrior & medicamentosior ex-  
istit (quæ alis in nōnullis regionib. crescit) ad eliciē-  
dos rufi crassos pulmonis succos est præferēda.

De Dracontio.

HVIUS quoque radicē bis tēre elixātes, quo-  
ad medicamentum omne posuerit, nōnunquā  
exhibebimus mandendam: quæmadmodū & Ari,  
quædam humores crassi & leni, qui in thorace  
ac pulmonibus habentur, vi maiori indigent. In  
vniuersum autē, acra quidē et amara si edantur,  
corpus parciū nutritum: nīspida autē, & ita ad-  
huc magis dulcisa, multib: & multo magis, si com-  
pactam adhuc habeant substantiam.

De Asphodelo.

RADIX asphodeli & magnitudine, & figura,  
& amarore, scilicet radici quodāmodo est similes:  
facultatēq̃ habet tenuandi, atq̃ aperiti. Si ra-  
men, vt lupini, pareretur, maximam sui amaroris  
partem

Asparagi mul-  
ta ventriculo,  
quoniam sunt.

Arborū & fru-  
tū germina.

Radices caule  
& foliis acro-  
ri & pingui-  
or, quæ sunt.

Radices ali-  
tiores, & bre-  
uiores, potius  
humores,  
quod non dat-  
ur folio car-  
nem.

Cornus totius  
substantiæ re-  
cremā a ad gi-  
gnenda cornua  
transmittit.  
Plantarū im-  
peritiam  
efficit ab effu-  
sa & gulla,  
rapæ.  
bananæ.

Aro.

Dracontij  
viti.

Nature corpus  
qua parciū, et  
qua vbius  
posuit.

Asphodeli radi-  
cis viti.

partem deponit: scilicet autem qualitas difficilissime eluitur.

### De Bulbis.

**BULBUS** quoque eiusdem cum prædictis est generis: mandatur enim ipsius radix sine foliis: vere autem, interdum & asparagus. Facultatem habet in se amarā & austeram, eamque insignem: unde etiam stomachum exoluit, ad appetentiam quodammodo excitat. Ceterū si bulbi elixi fuerint, magis quidem nutrent: verum cum amarorem omnem iam deposuerint, aduersabuntur illis, quæ sponte sunt elicienda. Quidam ex ipsorum esu liberaliore, semen sibi inuictum, sed ad venerem alacriores manifeste senserunt. Alimentum porro dant mali succi, nisi probe coqueatur.

### De Pastinaca, Daucō, & Carō.

**HORVM** quoque radices mandantur: minus tamen quam rapæ & arum Cyrenaicū nutriunt. Calescunt autē insigniter, aromaticūq; nonnihil ostentant: conficiendi tamen difficultas illis inest. Vnam porro ciet: & si quis eis copiosius vratur, mediocriter vinorum succum producit. Ceterum radix melioris est succi, quam pastinacæ. Sunt qui pastinacam agrestem appellent daucum: qui vrinam quidem mouet potentius; sed medicamentoſior existit.

### De Tuberibus.

**HÆC** quoque radicibus aut bulbis annomanda sunt, vt quæ nullam qualitatem habent insignem: crassum autem alimentum largiuntur.

### De Fungis.

**EX** fungis quidem bolus, si beile in aqua fuerint elixi, propè accedunt ad insipidos cibos. Alium autem ex ipsis est pituitosum, frigidum, prauis succi. Omnium tamen illi minimum noxi existunt. Secundi autem post hoc, sunt amara. Reliquos verd omnes tutius est ne attingere quidem: muli enim ex ipsis esu interierunt. Ceterum oxymeli per se, & cum hyssopo & origano, quibus nitri spuma fuerit inperſa, si propinetur, auxiliatur illis qui ex fungorum esu habent perisimē.

### De Radicula.

**RADIX** eius ex illis quibus assidue vescimur: estq; obſonium magis quàm alimentum: mirum quæ & ipsa cum manifesta calcificatione attenuandi facultatem sortitur, nam qualitas acris in ipsa superat. Sed caulis eius elixus magis nutrit quàm cruda radícula: paucissimum tamē & ipse alimentum præstat. Mirari autem subire eos medicos & idiotas, qui non sine multorum incommodo, post cœnam crudas eas elendas tradunt.

### De Cepis, Alliis, Porris, & Ampeloprasis.

**CORPVS** calcificant, & qui in ipso sunt humores crassos attenuant, lentosq; incidunt. Si cocta autem bis tervè fuerint, acrimoniam quidem deponunt, teneant tamen adhuc, & alimentum corpori dant paucissimum: quod certe primum elixa essent, omnino non dabant. Ceterum allium quidem mandū nou vt obſonium, sed vt salubre medicamentum, quod digerendi, & obſtructionis aperienti habet facultatem: quod si elixum parum fuerit, vires quidem imbecilliores, succi autem prauitatem nō amplius retinet:

quemadmodum nec porra, nec cepæ, quum elixa bis fuerint. Ampeloprasa verò tantum à porris diſcedit, quantum in aliis omnibus cognerebus agreſſia à domestica. Abſtinendum autem ab assidue vſu omnium scruum est, præcipue na rura bilioſis. Solis enim qui vel succum pituitosum, vel crudum & crassum acientū aceruarint, eiusmodi cibi expediunt.

## GALENI PERGAMENTI de alimentis, lib. III.

### De alimento quod à gressibus animalibus sumitur.



**AN** quis animalium omnes non eadem facultate sunt præditæ: sed carnes quidem, cum probe elixæ fuerint, optimum gignunt sanguinem, & potissimum, si ex animalium boni succi fuerint, cuiusmodi est suum suū genas: nā partes neruosa, iusto sunt pituitosiores. Omnium itaq; ciborum, suū caro potentissimè nutrit. At bubula, alimentū quidē & ipsa corpori suggerit non mediocre, nec disparu facili sanguinem tamē gignit, quā conueniat, crassiorē. Quid si quis naturalis temperamento melancholicus magis fuerit, affectu aliquo melancholico prehendatur, si largius ea vescatur. Affectus melancholici sunt, cancer, elephas, scabies, lepra, febriſ quartana, & quæ peculiari nomine melancholia nominatur. Lien autem quibuscūq; à tali succo intumuit: quam rem cachexia & hydropses sunt consecuti. Ceterum quantū carnes bubulæ totius sunt substantiæ crassius suillū superant, tantū suillæ bubulæ lentore antecedit.

Vt autem illi iuuenibus qui bono sunt corporis habitu, sues ætate florescentes magis quàm porcelli congruant, sic viruli perfectus bobus, luxuriosius capris, sunt præferenda, vt pote quorū carnes multo facilius atq; præstantius coquantur. Porro capra temperamento minus quàm bovis est sicca: si tamen sui & hominis comparetur, multū superat. Suillæ autē carnis similitudinē cum humana ex eo potens intelligere, quod nonnulli carnes humanas pro suillis exhibitis ab his spiritibus improbis, sine vlla in gustu vel olfactu suspitione comederint. Merito igitur porcelli alimentū nobis præbent tantū magnis subus excremento suis, quantū ipsis sunt humidiores: ac merito etiā minus nutrant. Nam alimentum humidius vt distribuitur, ita etiā diſcuntur longè celerius. At agni carnem habent humidissimā, pituitoſissimā: verò excrementoſior est, ac deterioris succi. Caprarum quoq; caro, præter succū vinofum, acrimoniam etiā fortitur. Hircorum autē, tum ad coquendum, tum ad succum bonum gignendum, est deteriora. Hanc sequitur arietum, post taurorum. Porci in is omnibus carnes castrorum sunt præstantiores: quemadmodū senilū peliſimæ. Ad hanc caro leporum, sanguinè quidem gigni crassiorē, sed melioris succi, quàm bubula ouillæ. Ceruina autem nō minus iis succum vinofum generat, & concoctū difficilem. His agreſſium aſinorum bene habitorum, ac iuuenū caro est propinqua. Sunt tamen qui aſinorum,

*Porra.  
Capra.  
Ampeloprasa.*

*Acres cibi quibus tantum est uniant.*

*Carni elixæ optimum gignit sanguinem.*

*Nervosa partes, iusta pituitosiores.*

*Suilla caro non minus potens gigni nutrit.  
Bubulæ præstantius melancholicum sanguinem.  
Melancholicus affectus quo fit.*

*Humanis ætate florescentibus, suillis, virulis, magis carnes congruunt.*

*Capra temperamento minus quàm bovis est sicca.*

*Porcelli quale alimentum habent.*

*Alimentum longè celerius diſcuntur.*

*Agrius carnes.  
Ouille.  
Capra.  
Hircus.  
Arius.  
Taurus.  
Castroren carnes sunt præstantiores, vti suū pſima.  
Lepus.  
Ceruus.  
Asinus.*

domesticorum, ubi senuerint, carnes mandunt, quæ pelam succi sunt, concoctiæq; difficillimæ, atq; siomadiu lædunt, etiã insuaves inter edendū quemadmodū equorū & camelorū carnes, quibus & ipsi homines animo & corpore alimini cameliniq; vescuntur. Sicut qui & vris, & us ad huc deterioribus, leonibus ac pardis vescitur, se meli aut his exantat. Vulpū aut carnis autum apud nos venatores vescitur: tunc quidem vuarū vīū piuguescunt. Porro animalia omnia quibus alimenta propria asiatim suppetunt, longe scilicet in cibo præstantiora evadunt: quæ admodum deteriora sunt, quibus ea minus adfuor. Cæterum quæ affantes homines mandunt, aut in sarragroe ingentes, ea corpori siccius dant alimentum: quæ verò in aqua præcoquunt, humidius: quæ in panis cōdiuntur, inter hæc media sunt: quanquam & illa ipsa pro modo conduntur: inter se multū discrepant. Siquidem quæ vitum aut garum habet copiosum, ea sunt aliis quæ ipsa non habent, sicciora. Rursus quæ exugam quidem illorū portionem, aut sapi etiam ampliorem habent, aut io simplici & plebeio, alibiq; appellato iure elixa sunt, ea prædictis longè sunt humidiora. Quæ autē in sola aqua coquuntur, us quoq; ad huc humidiora existit. Maximū præterea in præparatione discrimen accidit, pro eorum quæ miscuntur potentia: vt cū omnia ficiant quidem, sed alia magis, alia minus. Suor porro hæc ex seminibus quidem, anethū, apium, 30 carum, libyiticum, cumini: ex plantis, porrū, cepa, anethum, saturea, thymum, pulegium, mentha odorata, origanū, & alia id genus pertinentia ad oblationem committantur.

## De limacibus.

**LIMACES** Græci omnes quotidie mandunt, carnem quidem duram habentes, eorū cōcoctū difficilem, sed quæ confecta potentissimè nutrit. Succus autem ipsis inest qui ventrem subducit: quemadmodum & in quibus testa pro cute est. Quapropter quidam oleo, garo, vinōq; ipsos condentes, eo iuculo ad alium decidendū vtuntur. Huius porro animalis caro bis teriq; elixa, conditūq; alium sistit, alimentumq; dat corpori minimè contemendū.

## De animalium pedestrium partibus excarnibus.

**EXTREMÆ** corporis partes, vt pinguedinis ita substantiæ carnosæ habent minū. Nervosa enim, hoc est, ligamētofa, & mucosa natura in ipsis præpollent: noo tamen tales hu nervi, cū sine sunt, quales in reliquo corpore: nam in excarnibus magis exercitata sunt, eorū magis lenta. Quare mento quicquid corpus minus alunt: ob leuitatē tamen facilius desciuntur per alū. Meliores autē sunt pedes suum quod rostrū: quemadmodum pedes aulis est præstantior. Porcellorum pedes prorsus elix inieci, illam meliorem efficiunt, ipsi etiam meliores redditi: quare sic in ore & ventriculo melius elaborantur. Quāto autē aliorum animalium carnes alimēti bonitate suilla sunt inferiores, tantō aliorum partes excarnes partibus suis excarnibus sunt deteriores.

## De animalium pedestrium lingua.

**PSYLLARTE** quædam licet parte substantia

inest: carnem enim habet fungosiorē, ac sanguineam magis: eam tamen haudquaquam solam, sed cum musculis, glādis, venis, arteriis, & neruis (quæ illi communia sunt) exemptam, solent coquere & mandere.

## De Glandulis.

**QUANTVM** lingua à carnis substantia, tantum glandulæ à lingue substantia recesserunt. Porro glandulas quæ iuxta hanc hanc constitunt, ad saluam generandam comparauit natura: ad conficiendum autem lac, mamillares: ob adeo post factum cōceptum laxescunt, atque lacte repleantur. Omnibus autem glandulis aliud cōmunē inest, vt suauis ex cibo, hialicūq; appareant. Cæterum mamillares, cū imbuit sunt lacte, de ipsius etiam dulcedine aliquid præseferunt. Alimentum autem quod ex eis probè quidem in vtriculo concoctis prouenit, propè sanè ad carniū alimentum accedit. Quod si minus quā par est sint confectæ, succum crudum aut pirmitosum generant: humidiores quidem puriusum, dāniores verò crudum.

## De testibus.

**TESTES** autem, cum ex genere sint glandularum, non perinde tamen sunt laudabiles fucci vt mamillares: sed habent virosū quiddam, seminis, quod in se generant, ostantur referēs, ceu renes vrinæ. Animalium grætilium testes, cōcocti sunt longè difficiliores. Nam testes gallinæ acorū altitudo & foauissima sunt, & laudabile corpori alimentū præbent. Renes admodū prauisunt fucci, & cōcocti difficles, vt aduliorū animalium testes. Iuniorū quippe sunt præstantiores. Porro taurorū, hircorū & æretum, insuaves sunt & mali fucci, cōcoctūq; difficles. Sines quidem apud nos exant, quod videlicet castratorum caro suauior sit, & alimentū plenioris, cōcoctūq; facilius: bones autem, vt multo melius eis ad agricultram vtantur, cū non facile tauri domentur. Capræ autem & ones, propter virūq; vīū castrantur. Cæterum omnes memoratorum animalium testes, cōcocti resistunt, ac mali sunt fucci: nutrant tamen, si belle conficiantur. Quāto autem suum caro aulis præstantior est, tantō horum quoque testes, aliorum animantium testibus sunt meliores. So li autem gallorum gallinæcorum vndequeque sunt præstantissimi, & pensissimum eorum qui sanguinati fuerint.

## De Cerebro.

**CEREBRVM** omne cibū est pituitosior, crassiq; succa, & tardè permeans, atq; ad cōtionem difficles. nec minimū ipd vtriculū. Excitat præterea nausæ, omninoq; vomitioni est accommodatior, si cōnotatū cū incedibus & calefactionibus fuerit. Si ramen rectè cōcoqui possit, alimentum corpori præstabit nō contemendū.

## De osium medulla.

**HÆC** cerebro est dulcior, incundior & pinguior, nausæq; prouocat, si liberalius sumatur: onit tamen & ipsa, si conficiatur probè.

## De spinali medulla.

**SPINALIS** medulla (quæ perperam medulla appellatur) cerebro cōtinua, eiusdemq; cū eo nature existit: nisi quod ipso multo est durior, potissimum

Glandularum lingua, & marmarum vīn.

Glandulas omnes esse in eis inueniri.

Testes esse in p. uere glandularum.

Testes gallinæcorū præstare alimentū alibi, hanc præstare fucci.

Testes æretorum mali esse fucci. Castratorum carnes suauiores, & facilius exant.

Suilla caro esse ceteris præstantior. Gallinæ testes.

Cerebrum non sicut existat. Cerebrum quoque laudatissimum præstare medulla quæ.

Spinalis medulla.

Equina carnis.  
Camelina.  
Vulpina.  
Leonina.  
Pardorum.  
Vulpina.

Assuetudine  
ficcum quā  
eluxant a  
alimentum cor  
pori.

Garum.

Album iur.

Edimentorū  
genera varia.

Limaci.

Limacum fac  
cus subducit  
alium.

Limacis testis  
buculla, alio  
sistit.

Extrema mem  
bra minus al  
la, sed danti  
or promptior.  
Porcellorū pes  
des carnis in  
piscinam, me  
liorē reddunt.

Lingua carnis.

tissimū in infernis spinæ finibus. Quamvis enim a cerebro abscedit, tantum magis durescit. Pinguitudinis præterea habet minimum, quo fit, ut nansam non provocet: ac si probè conficiatur, non exiguum corpori alimentum suggerit.

De pinguedine & adipe.

PINGUIDO, humida quæpiæ res est, oleo laeta veritate ineratissimè alissimè: adipe verò pinguitudine multo est siccor, ideòq; fuit concrescit facili. Pauci utraq; est nutrimentum, potiusq; carnis minus alimentum sunt cõdimenta, q̃ alimentu.

De pedestrium animalium secur crassi est succi, ac ad coquendū difficile, tardèq; permeat. Omniū autè est præstantissimū, nõ modò ad voluntatem, sed ad alia omnia, quod ex caricari esu optimè preparatū fuerit. At lien gustu est usinissimus: in eo tamè reperitur peripicia quædā acerbitas. Mentò etiā pravi succi esse creditur, ut qui sanguinè melandriolici gignat. Vtq; verò tanq̃ pulmo facilius coquitur, quãtò est rarior. Multo tamen quod ad nutrendum attinet, est hepatis inferior. Pyrenosius autem est alimentū quod exhibet. Cor substantia quidem caro est fibrosa ac dura, ideòq; concoctū difficile: & tardè permeat. Si tamen probè conficiatur, alimentū corpori dat ut non paucum, ita nec mali succi.

De quadrupedum animalium ventriculo, utro, & intestinis.

DVRLTORAS carnis sunt bæ paces: ob id, etiam si ritè conficiatur, succum tamen gignit non planè sanguineum, sed frigidiorem, atq; crudiorem. Proinde multum temporis postulat, priusquam sans confici queant.

De agrestium ac domesticorum animalium differentia.

DOMESTICA animalia, temperie humidiora sunt q̃ agrestia, tum ob aëris in quo degant, humiditatem, tum ob vitæ ignaviam. Caro eorū quæ in montibus degit, ob cõtrarias causas est durior, nulliusq; propterea pinguedinis, aut paucissimæ particeps. Ob idq; pluribus diebus q̃ domesticorum, imputris feruatur: alimentum q̃ exhibet minus excrementum, eo q̃d à domesticis sumitur: ac proinde & nutrit valentius, & succum gignit meliorem.

De lacte.

LACTEUM crassissimū ac pinguisissimū est: liquidissimū ac minimè pingue, camelorum: mox equarum: deinde asinarū: mediæ autem consistentiæ est caprarū: hoc crassius, o vorum. Secundum autem anni tempora, lactis partu est liquidissimum. Temporibus verò progressu, magis semper ac magis crassescit. At mediæ ætate, ipsum etiam in suæ nature medio consistit. Post id autè tempus, sensim iam crassescit, quoad penitus deficiat. Vt, ut liquidissimum, ita copiosissimū est. Porro liquidissimum lac, ferum: crassissimū, caseum habet plurimum. Mentò igitur liquidius quidem lac, magis: crassius autem, minus alium subdit. Nunquam lac quod ignitos lapillos, aut orbiculos ferreos extulerit, & ventrem sistit, & his auxiliatur, quibus venter acrum excrementorū mori infestatur. Facile tamen sic paratum lac in ventriculo coquitur: ob idq; mel illi, & sale, adiciamus: sicq; & aquam etiam, quæ seri

acrimoniam corrigit. Constat siquidem lac omnino ex cõtrariis substantiis, sero scilicet, caseo, & pinguitudine, ex qua butyrum conficitur: quo in frigidis pleriq; regionibus, pro oleo vitatur. Cuius pinguis succi asinitivitas habet minimum. Quocirca raro alicui in ventriculo coquitur, si ita non vitæ maxime excidit, calidum fuerit epotum. Quod si sal & mel adiciantur, fieri nõ potest, ut ipsum in ventriculo coaguletur. Eandem ob causam magis per alium deicitur, ut quod ferū multum habet, à quo lac omne facultatè accipit deiciendi, ut in caseosa substantia stendit. Quare plurimo sero ad deiciendam alium vsi sunt veteres. Cui quidem tantum mellis optimi & salis est adiciendū, quantum suæ citra stomachi eversionem sentitur. Porro inter omnia quæ mandimus, lac optimū, optimi succi est. Nam quod vitosum exuit, pravo succo ventium corpora replet. Quod si capre, aut alterius animalis, sciamonitū nethymaliūve depasti, lac cibi loco quis sumpsit, omnino alium est fuerit. Lac igitur q̃d feri habet plurimū, etiam si semper eo vitare, nihil penitus periculi adfert. Quod verò huiusmodi humiditatè habet exiguam, caseosam autè crasiam emulsam, eos quidem offendit, qui calculus generandi sunt prompti: necdū obstruit, qui huiusmodi facili prehendendi possunt. Thoracis autè ac pulmonis partibus lac omne est: ut leucapiti verò, nisi quis ipsum habeat admodum firmum, non est accommodum: ut neq; hypochondriaci, quæ leui de causa inflantur: plurimis siquidem in ventriculo in stant vertitur. Si verò cum aliquo eorum cibariis, quæ crassi succi sunt, diutius elixum fuerit, statimque quidem naturam deponit, sed iecur magis obstruit, & promptius calculos in renibus gignit. Illud igitur lac boni succi & multo alimentum exiit, quod ex cõtrariis substantiis & facultatibus constat, subdicens scilicet, ac stendit, obstruendi ac tenandis.

Nocet autem ipsius visus assiduus tum dentibus, tum gingivis: has quippe humiditas, dentra putrefactioni reddit obnoxios. Cæterum occurrere huic malo, si aut diluto, aut teraco vino, cui nonnihil mellis permixti sit, aut primò quidem melicraro, dein verò astringente vino, sumpto lacte, os ipsum tolleris.

De oxygalacte, hoc est, acido lacte.

DENTAS qui secundum naturam habent, nihil offendit: eos autè lædit, qui iustro frigidiore existit. Iam verò ventriculus quavis de causa frigidior, oxygala non belle cõcoquit: temperatius verò, quamvis ingre, conficit tamen id aliquando. Contri, ventriculi calidiores, præter q̃ quod nihil ab humecemodi edulibus leduntur, aliquo etiam fruantur cõmodo. Pro diuerfa autem ventriculorum natura accidit, ut lac ipsum interdum acefcet. Si quidem caloris inopia, in accore eisdem excessu, in nidorem & fumum vertit. Porro oxygala est in ventriculo non coquatur, nunquam tamen in nidorem convertitur, potissimum si in feruentissimum ac biliosissimum ventriculo incadat. Est autè natura tum frigidior, tum crassi succi: quare nõ facile à modice acriore corpore cõco, ratione suspexit. Quinetiā cõferantem est quidā succi à cibis huiusmodi gigni.

R. uq

Lactis quibus substantiis conficitur.

Lactis asinitivitas habet minimum.

Lactis asinitivitas habet minimum.

Lactis asinitivitas habet minimum.

Lactis asinitivitas habet minimum.

Lactis asinitivitas habet minimum.

Lactis asinitivitas habet minimum.

Lactis asinitivitas habet minimum.

Lactis asinitivitas habet minimum.

Lactis asinitivitas habet minimum.

Lactis asinitivitas habet minimum.

Lactis asinitivitas habet minimum.

Lactis asinitivitas habet minimum.

Lactis asinitivitas habet minimum.

Lactis asinitivitas habet minimum.

Lactis asinitivitas habet minimum.

Lactis asinitivitas habet minimum.

Lactis asinitivitas habet minimum.

Lactis asinitivitas habet minimum.

Lactis asinitivitas habet minimum.

Lactis asinitivitas habet minimum.

Lactis asinitivitas habet minimum.

Lactis asinitivitas habet minimum.

Lactis asinitivitas habet minimum.

Lactis asinitivitas habet minimum.

Lactis asinitivitas habet minimum.

Lactis asinitivitas habet minimum.

Pinguedine adipe.

Lactis quibus substantiis conficitur.

Lactis asinitivitas habet minimum.

Lactis asinitivitas habet minimum.

Lactis asinitivitas habet minimum.

Lactis asinitivitas habet minimum.

Lactis asinitivitas habet minimum.

Lactis asinitivitas habet minimum.

Lactis asinitivitas habet minimum.

Lactis asinitivitas habet minimum.

Lactis asinitivitas habet minimum.

Lactis asinitivitas habet minimum.

Lactis asinitivitas habet minimum.

Lactis asinitivitas habet minimum.

Lactis asinitivitas habet minimum.

Lactis asinitivitas habet minimum.

Lactis asinitivitas habet minimum.

Lactis asinitivitas habet minimum.

Lactis asinitivitas habet minimum.

Lactis asinitivitas habet minimum.

Lactis asinitivitas habet minimum.

Lactis asinitivitas habet minimum.

Lactis asinitivitas habet minimum.

Lactis asinitivitas habet minimum.



Non ab re autem edulū hoc calidissimū est ven-  
triculis vtile: quemadmodum frigidioribus ad-  
versissimū. At partes ipsius lactis, citra coagulū,  
etiam scissio, quam vocant, discernit, cūm lactū  
abundē calido oxymeli frigidū instillamus. Idem  
etiam multo efficacius. Interdum citra villam li-  
quoris instillationem, vase frigidissimā aquā ha-  
bente, in lac demisso, ipsum scindimus. Præterea  
sine coagulū id lac, quod post edendum fortū emul-  
sum fuerit, cōcrevit pronus, si super cineres ca-  
lidda pariter calefiat. Nutrit autē vberius ex la-  
cte id quod concretū est: parcius verō, quod se-  
rosum existit. Ceterum quod lac à partu concre-  
scens, nihil recipit mellis, concoctū quidē est dif-  
ficilius, atq; succi crassioris: præterea per alium  
tardius secedit, corpus tamen abundē nutrit.

## De Caseo.

De vi casei cōficitur, assumit ab insecto coa-  
gulo acrimoniā quandā, humiditatēq; om-  
nem deponit, & possimū si inveteraverit: tunc  
enim quā prius, longē acrior evadit, ac manife-  
stē calidior, atque ardentior redditur: ob idq; ip-  
sum, si nictolior, & difficilior concoctū, & peio-  
ris succi efficiunt: ac proinde calculus est generan-  
dis. Vbi enim succorū crassities cum ardenti ca-  
lore iungitur, illic calculi generantur. Itaq; caseus  
id genus, omnium ad omnia est pessimus. Deinceps  
autem malus quidem, sed prædicto minus  
putandus est, qui neq; est vetus, neq; acris. Om-  
nium autem caseorum recentium, præstantissimū  
is habetur, quē à nostris in colas oxygalatū  
nūq; dicitur, suavisimū quidem in cibo, stomā-  
cho autē minimē noxius, aliisq; omnibus caseis  
cōcoctū transiūq; faciliōr: succum habens nō vi-  
tuosum, neq; visque adeo crassum. Præstantissimus  
eniam est is, quē Romani *caseus* appellant. In vi-  
uerum autē, mollior caseus duriorq; est præstan-  
tior: rarus verō ac laxus, densio admodum, & cō-  
pactio. Iam verō cūm plurimosus valde, & is qui  
ad asperitatē vsq; est friabilis, sine vinoli, præstan-  
tior est qui iuter hos duos est medius. Quod au-  
tem ad gustū pertinet, is omnīs est præstantissi-  
mus, qui nullā vehementē obinet qualitatē, sed  
dulcem habet supra alias parum eminentē. Ru-  
ctū enī, cuius qualitas paulatim marcescit, præ-  
stantior: cuius contrā perdurat, non bonus.

## De pedestrum animalium sanguine.

SANGVIS omnīs concoctū est difficilis, præci-  
pue crassus & melan cholicus, qualis bobus &  
apris inest. Leporinis autem, caprinisq; vi sua-  
visimi celebrantur.

De alimento quod à volucribus ani-  
malibus sumitur.

AVIUM omnīs volatiliū genus paucissi-  
mum præstat alimentū, si ad genus grasilū con-  
feratur: possimū si ad fullam, qua nō aliud in-  
ventas, quod copiosior sit nutriti. Volu-  
crum tamen caro concoctū faciliōr est, præci-  
pue perdacis, attagenis, columbe, galli gallinacei  
& gallinæ. Turdorum verō & merularū, minus  
torumq; passerulorū caro, quā prædictorum,  
est durior. His autē ipsis, narturis, palumbi, anat-  
isq; caro enām durior existit. At phasianorum  
caro, quod ad cōcoctionem & nutrimentū atti-  
net, carni gallinarū est similis: voluptate tamen

in edendo eam superat. His durior est pavonum  
caro, & fibrōsior, & difficilior concoctū. In vi-  
uerum autem, auget centum caro multo est præ-  
stantior, quā in cūctis annis etate: meda verō  
est inter vtrāq; florentum. Præva autem admo-  
dum est novellior, sed diversā ratione ac sentī.  
Siquidem horum caro, dura est & sicca, ac nervo-  
sa, ideoq; concoctū difficilis, & nutrimentū exte-  
rior: contra animalium superimē auctoriorū cor-  
pora, mucosa sunt ac humida, ideoq; excrementa  
plena: facilius tamē per alium descendunt. Se-  
cundum enām præparationis modos, & locos  
in quibus ipsa animalia vivunt, non mediocri-  
s eorum est differentia.

## De anseribus &amp; struthocamelis.

CARO horum excrementa existit, multoq;  
difficilior concoctū, quā prædictorum volu-  
crum. Ipsorum tamen alæ, non sunt ceterorum  
alis deteriores: quādoquidem in multis, alarū  
substantia fibrōsa est & dura. Quārandam au-  
tē caro, tota est eiusmodi: cuiusmodi gruum: quas  
tamen & ipsas manduit, plerumq; ante dibus  
macerantes & mortificantes. Inter grues & anse-  
res, caro tardior est media.

De differentia quæ est in partibus anima-  
lium volucrium.

NON manduntur inethina volucrium: ventri-  
culi autem & vici sunt, & nutriti. Quidam au-  
tem ipsorum valde enām furru candi, cū anse-  
rum: secundum quos, sunt alium gallinarum.  
Ad hæc anserum quibus lac in alimēnis miscer-  
tur, iecur est succandissimū, atq; potenter nutrit:  
& cūm fit optimi succi, deusatur facili, probeque  
in ventre cōcoquitur. Ad hæc alæ anserum, & us  
ad huc magis gallinarum, minimo negotio co-  
quuntur. Pedes autem paulo minus omniū, ci-  
bo sunt inepti. Ceterdū iuniorum & probē hu-  
torum caro, graciliū carni atq; annoformior  
præstat. Gallorum testes, præcipue alium, præ-  
stantissimi sunt, & multo magis, si cibis ipsorū,  
quo sunt nutriti, seroso lacte fuerint imbuiti. Por-  
ro volucria, exiguum quidem habent cerebrū:  
ipsum tamen tantō pedestrum: cerebro præstan-  
tius est, quanto dunnus. Ac montana sane, quā  
palustris, cerebrum habent præstantius.

## De Ovis.

GALLINARUM & phasianorum ova, omni-  
bus sunt præstantiora: deteriora autem anserum  
& struthocamelorum. Porro quæ ova dicuntur  
tremula, ad nutriendum omniū sunt præstan-  
tissima: Sorbilia autem, minus quidem nutriti,  
sed subducuntur facilius, & pharyngis asperi-  
tates lævigant. Cocta verō, et ad coquendum sunt  
difficilia, & tardi transiū, corporiq; crassius al-  
imentum largiuntur. His autē tardius permeant,  
& crassioris sunt succi, qui in calidis assunt ci-  
neribus. Quæ verō in sartagine sunt inspissata,  
pessimū habent modis omnibus alimentum.  
Porro quæ suffocata appellant, sunt elixis atque  
assitis meliora: parantur autem ad hunc modum:  
Vbi enim ipsa oleo & garo, & pauco vini cōspersa  
fuerint, vas quo cōmmentur, cacabo aquam ca-  
lidam habenti indunt. Deinde vbi ipsum totum  
superne obturant, ignem substruunt, quoad o-  
ua mediocrem consistentiam forsiantur.

De

Lat quibus me-  
di fructatur.

Lactis peritis  
qua videtur, et  
qua minus a-  
lant.

Calculus vero  
ratus calculi  
apertus.  
Calculus à quo-  
bus à casu ge-  
neratur.

Oxygalatū  
caseum: is est  
nūq; cōcoctum  
apertum.

Caseus casus.  
Caseorum qui  
præstant.

Sanguis omnīs  
est concoctus dif-  
ficilis.

Smilla carni ni-  
hil nutriti co-  
posius.  
Volucrium car-  
nes quæ facili-  
tate, & quæ de-  
gent cognos-  
centur.  
Phasianorum  
caro.

Pavonum ca-  
ro.  
Carnis diffi-  
cilio secundū a-  
tatem.

Anserum caro.

Struthocame-  
lorum caro.

Gruium caro.

Tardior caro.

Anserum ve-  
triculus: is est  
suavisissimus.  
Anserum be-  
per ipsi com-  
mentatur.  
Alæ anserum,  
gallinaceæ.

Testes gallorū.

Cerebrū aviū.

Omnis dif-  
ferentia.  
Ova tremula.

Ova sorbilia.

Ova cocta.

Ova assa in cr-  
neribus.

Ova fixa.

Ova suffocata  
parata modis.



De volucrum animalium sanguine.

GALLINARVM & columbarū sanguine nō nulli vescantur, maximē altitū: qui suum sanguine haud quāvis inferior est, neq; suauitate, neq; concoctionis facilitate. Plurimū tamen à leporeno relinquitur. Ceterū sanguis omnis concoctus est difficilis & excrementosus.

De nutrimento quod ab aqualibus animalibus sumitur: & primum de Mugile.

MYTILUS ex squamatorum piscium sunt genere. Verū eorū caro, qui in aquis limosis, sordidis & stagnantibus degunt, excrementis admodum atq; mucosa exsistit. Optima autē eorum est, qui in puro mari viuunt, præcipuē cū ventorum procellis ipsum mare agitur, atque ad Boream spectat. Nam in quero, nullisq; agitato fluctibus, tantō piscium caro deterior fit, quanto minus exercitatur. Eorum autem qui in fluctibus gignuntur, præstantiores sunt, qui in stagnantibus, in quibus ea quæ rapidè fluit, & copiosa. Qui verō in stagnantibus, nō laudabiles. Præterea penes alimenta ipsa pisces meliores præterire evadunt. Etenim qui in fluminibus urbem magnam præterfluuntibus, hominum stercorebus, & prauis id genus cæcis victitant, omnium deteriores sunt. Porro qui mugil in mari gignitur, is à mari longissime abscedens, aduerso lumine natat, numerosissiq; ac paruas spinas non habet.

Qui verō à fluitis insignisq; mæditur mare, huiusmodi spinarū est plenus. Nam omnium ferè piscium caro, qui in stagnis aut fluminibus crescit, tenuibus spinis plena inuenitur, quas nullus marinarū habet. Pauci autem fluminali mare ingrediuntur: at marini omnes, fluitus gaudent. Multis præstantioris caro est incandior & acrior, necnon experti pinguedinis. Nam pingues, & solum saponis, & vitiosi sunt succi. Quapropter eam cum organo preparant. Hic piscis vnus eorum est, qui conditi sale afferantur.

De Lupo seu Laureæ.

HYNC piscem natum in aquis dulcibus non vidimus, sed à mari in flumina aut stagna, ipsum ascendisse cōspeximus: idēq; paruus caro, quæ admodum mugil sepe, in viciatur. Alimenta sanè quod iam ex hoc, tum ex aliis piscibus provenit, sanguinem gignit cōsistentia tenuiorem, quam quod ex pedicibus animalibus sumitur: adeo ut nō assuenter nutriat, & discutiatur celerius.

De Mullo seu Trigla.

Hic quoq; pelagicus piscibus annumeratur. habetq; aliorum ferè omnium carnem durissimā, & valde friabilem. Ac nutrit sanè cūm probè confectus fuerit, copiosius omnibus aliis piscibus, quod durior & crassiorum partium exsistat, habetq; substantiam alendo corpori accommodatam. Quare mullo caro iucunda est: quæ quidem licet aliorum carne sit durior, mandi tamen quod non potest, propterea quod friabilis est, & pinguedinis experte, cū quādam acrimonia. Nam pinguis & lenta cibaria sanis, ut siuapta fuerint, celeriter implet, & appetentia evertit. Multi etiā leper propter volupstatē à gulosi summo pereperunt. Openni autem muli sunt, ut aliq; etiā omnes pisces, cūm propter mare purum, tum vel

maximè propter alimenta.

De piscibus saxatilibus.

SCARVM, merulam, turdum, iuliam, fucam, percam, à petrosis promontoriis maris, in quibus compenditur versari, saxatiles appellantur. Inter eos autē scarus excellere suauitate creditur. Secundum hunc, merula, ac turdi. Tercio loco iulie, fucæ, & perca. Porro alimentū quod ex eis sumitur, nō modò concoctū est facile, sed hominum etiā corporibus saluberrimū, ut quod sanguinem medium consistentiā generet.

De Gobione.

Gobio littoralis est piscis, ex numero etiā eorum, qui parui perpetuo manent. Præstantissimus autē omnium ad volupstatē, coctionē, distributionem, ac deniq; succi bonitatem is est, qui in arenosis littoribus, aut saxosis promontoriis degit. Ceterū gobiorum caro, ut carne saxatiliū est durior, ita mollior quā nullior. Ipsa igitur pro portione, vescentium corpus nutrit.

De piscibus molli carne præditis.

SCARVS itaque primas inter pisces saxatiles obtinet quibus omnibus caro inest quā alii piscibus mollior & friabilior. Sūt q; carnis tantum duritie à saxatilibus discedit, cuiusmodi sunt pelagici propemodū omnes: nisi si ipsorū prauo alimento propriā carne corumpantur, ut mulli, q; cancellos, animalia itaq; colore, minimis ceteris similia, mandit. Porro saxatiles pisces, nec loca,

nec alimenta mutant, nec dulcibus aquis viuunt. Ob eāq; causam omnes perpetuo sunt in ulpatione. At sceli dicit, si probò alimento vtiatur, & mātū puro, carnis bonitate contendit cum saxatilibus. Qui verō prauo alimento vtiatur, aut in aquis mistis, aut vinosis versantur, carnis quidē non abiicit molliem, sed pinguitudinem atq; lentore contrahunt. Quare neq; suaves persiliūt, sed alimentū excrementū reddunt. In vltimum autem, pessimi pisces gignuntur in eorū fluitioribus, quæ purgamenta cuiuspiam ciuitatis magnæ recipiūt. Idcirco in eiusmodi fluitioribus oñs (qualis est Romæ præterfluens Tyberis) murena pessima piscitur: eōq; in ea vrbe omnium ferè maxiorū piscium ea minimo venditur, cūm tamē meliores sint eius fluminis pisces, priusquā is ad urbem perueniat. Quin & alius etiam est flumini, necētis & quinquaginta stadiis ab vrbe in Tyberim profluens, Nar appellatus, qui pisces habet longè Tyberinis meliores. Similes autem quodammodo inter se sunt, passer & solea: non tamen omnino eiusdem sunt speciei.

Solea namq; mollior est, & cibo suauior, atque in totum præstantior quā passer. Quin & lacernæ mediū quodāmodo sunt inter pisces carnis mollior & dura. Nullus tamen memoratorū piscium, aceto, aut sinapi, aut organo indiget: vel ut pingues, lentī, atq; duri. Quidam etiā fritis iis in sartagine aluntur: alij assant, aut in panis conduunt, ut rhombos, & catharos. Optimè autē omnium condimentum ex alio iare concoquitur, quod in hunc modū paratur. Copiosam aquam primum infundit: dein olei quod satis sit affundit, cum pauco anethi, & porri. Vbi verō pisces semicocci fuerint, salis tantum aspergit, quoad totum ius salum nōdum appareat. Hæc

Saxatiles pisces vocat dicimus.

Saxatiles pisces præbere alimentum saluberrimum corpori.

Gobiorum caro.

Scarus.

Mulli.

Cancelli.

Mulli.

Cancelli.

Pisces quoniam non loca gignuntur.

Tyberis.

Murenam Romæ vtiuntur ferè maxiorū piscium maximo vtiuntur.

Nar flumini prædicere piscis longè Tyberini melioris.

Passer.

Solea.

Lacerta.

Nar flumini prædicere piscis longè Tyberini melioris.

Passer.

Solea.

Lacerta.

Alia, vtiuntur enim dicimus.

Languis gallinæ, Columbianus.

Leporeno.

Languis omnis incandescens.

Mugilæ caro.

Piscium carnis differentia, pro diversitate loci in quibus degunt, et alimentis quibus utuntur.

Piscis qui in mari, in stagnis, in fluminibus, in aquis vivit, et quæ sunt.

Marini pisces minus gaudent saporibus.

Mugil conditus sale afferatur.

Lepus, Laureæ.

Trigla, Mullo caro.

Trigla, Mullo caro.

siquidem præparatio vel ægrotis ipsis est cōmōda. Quibus autem inculpatā sanitas est, his piscium in sartagine fruxorum, secundo loco super crānicula assiorum, præparatio est convēiens. Hæc tamē, oleum garāmg cum paucō vino expolcit. At frixis, plus vini, garig addere expedit, minimē verō olei. Quōd si cui id subvertat stomachum, paratū habeat ætēum, modicum in se garī, piperisq cōtinens. Omnium autem memoratorum piscium alimentum, hominibus oī  
10

De piscibus dure carnis.

*Pisces duracar  
qui quānt.* DRACONES quidem, libellæ, cuculi, scorpius, trachurus, mulus, cernua, glaucus, conger, pagger, hamya, & aquila, inter duræ carnis pisces an numerantur: nonnullarūq multellorū species. Nam celebrē ille qui apud Romanos galexia dicitur, in eorum numero, qui dura carne cōstant, 20

*Galēnia.* *Canis piscis.* habetur. At canis ad cetaceorum genus refertur, vt qui carnem duram habeat, atq̃ excrementum. Quapropter ipso in partes secto & salito, vescuntur vulgares homines. Ingran enim saporis est, ac mucosus, ideōq̃ cum sinapi & oxaleo, atq̃ id genus acribus condimentis eum mandunt. Ex hoc item genere sunt balenæ, delphini, & phocæ: ad quos proximē magni thunni accedunt: quanquam non æquæ sunt vt prædicti, iucundi. Insuaves enim sunt hi, præsertim recentes: nam salsi evadūt meliores. Thunorū autē et  
30

*Asinus, Delphinus, Phoca.* *Thunni salsi evadūt meliores recentiores.* ro, qui & ætate & corporis molē sunt minores, nō perinde durā est, ideōq̃ hi facilius etiā coquuntur: & is adhuc magnis pelamides, quæ sale cōditæ, laudatissimis salamentis nō cedunt. Post sardas autē & pelamides, myli qui ex Pontō aserūtur, præcipue cōmendantur. Post ipsos sunt graculi. Porro duræ carnis pisces, ægrus quim mollior cōcoquantur. Siquidem quæ molliora sunt, facilius alterantur, quōd facilius panātur. Durior  
40

*Sarda. Myli. Pelamides. Graculi. Molliora facilius alterantur.* etiā cibis crassiorē habet substantiā, vt mollior tenuiorē: ac proinde ille succo crassiorē gignit.

An dura omnia per decoctionem salios succos gignant, vt Praxagoras & Philonimus existimantur:

*Decoctum omnium, quando equum, semper salisum erit dū.* EQVIVM omnū decoctū, quandiu coquitur, saliosū semper evadere, post autem, amarum, deprehendo. Nam corpus ipsum solidum quod in aqua eluxatur, qualitates quæ intus sibi inest, in ea deponit, sic vt qualitatē expers evadat. Clarius autem huius rei veritatem intelliges, si quando quod elixas, in aliam aquā transfulus, secūdo & tertio recoquas. Invenies quippe id quod decoquitur, propriā amisisse qualitatem, siue saliam, siue acrem, siue etiam acerbam: aquam autem, eam in se recepisse. Si verō succos ipsos solos concoxeris, primū quidem saliosos, postea autē amari etiam sient: Siquidem vel ipsa aqua optima diutius cocta, saliam qualitātē tantū assumit. Quamobrem, quod ad succos attinet, Praxagoram ac Philonimū rectē sensisse, nobis est concedendum: quod verō ad solida corpora pertinere, non item.

De animalibus quibus testa pro cute est.

OMNIBVS id genus piscibus cōmune est, vt

salium in carne succum contineant, qui alium subducit: quod seorsum cuiq̃ magis minūve in est, pro qualitatē & quantitatis ratione. Siquidem ostrea, inter alia testacea, carnē habent molliissimā: parvæ autem liatulæ, vertebræ, vngues, purpura, buccinæ, omnīq̃ eiusmodi, duram. Non ab re igitur ostrea quidem, alium valentius subducunt, corpus autem imbecillius alunt. Duriora verō, difficilior quidem coquuntur, sed firmioris sunt nutrimentū. Verū hæc quidē omnia elixantur. Ostrea verō etiā citra elixationē mā  
50

duntur. Sunt qui ea in sartagite frigrant. Quemadmodum autē ex ipsis testaceis, quæ dura sunt, carnem habent concoctū difficiliorē, sic etiam quæ corruptantur ægrē. Quare ipsi bis terve cocta, eis exhibemus, quibus op prauos succos cibis in ventriculo corruptum pur: gignitur tamen ex ipsis succus crudus plurimus, vt ex iis quæ molli sunt carne, puritū.

De Crustatis.

ASTACTI, paguri, canci, locustæ, carides, gamari, atq̃e id genus alia, tenui testa concluduntur, durinēq̃ sunt testaceis similia: sed salii humoris minus quam illa continent, quanquam eum habent satis multum. Dura in totum carne constant: ideōq̃ & concoctū sunt difficilia, & firmi alimentum, quum scilicet in aqua pouleuta percocta fuerint. Horum quoq̃ caro, vt ostreorum, vbi percocta, vt dictum est, in aqua succum salisum reliquent, alium sibi: ægrē etiam corruptum pur, non secus ac testacea, quæ duram carnem possident.

De mollibus.

MOLLIA vocantur, quæ negi squamas, negi asperā cutem, aut testaceam habent, sed mollem: vt polypi, sepiæ, loliginēs, & his consimilia: quæ omnia mollia tangenti apparent, duræ tamen sunt carnis, & difficilia cōcoctu, exiguiq̃ in se succum salium continent. Cæterū si concoquantur, alimentum exhibebunt non paucum corpori: succi tamen crudi plurimum gignent.

De Cartilagineis.

HORM animalium cuius est aspera, acnōtū splendens. Inter ea autem torpēdo & pastinaca carnem habent mollem argi iucundam, eum mediocriter per ventrem subeunt, nec concoctū difficilem. Nutriunt item mediocriter. Rara autem, leuitatā, squatina, omniāq̃e huiusmodi, duriora sunt, & concoctū difficiliora, alimentūq̃ copiosius, quā torpēdo & pastinaca.

De Cetaceis animalibus.

OMNIA eiusmodi duram & pravi succi, excrementūq̃ habent carnem.

De Echinis marinis.

EX mulso eduntur hi & garo, alui subducendæ granæ: paratūq̃ in panis, ovis, pipere, melleq̃ insectis. Imbecillus sunt alimentū, ac mediū inter ea quæ humores excrementū & densant.

De Melle.

MEL oritur in foliis plantarum, eiusdem cum riorē generis. Porro in monte Libano quotannis per sepe coria super terram extendūt, ac deinde arbores excurrentes, quōd ab eis destitit, excipiunt, & ollas ac fīstula melle implent: vocantq̃ id mel rosicidum, & æreum. Proinde consistat materiam

*Testaceis iucundum alium subducere.*  
*Ostrea.*

*Ostrea ob id est cruda.*

*Testacea dura carnis, quibus conferant.*

*Crustata.*

*Mollis cutis imola.*

*Cartilaginea.*  
*Torpēdo.*  
*Pastinaca.*

*Rara.*

*Cetacea.*

*Echini marini.*

*Mel.*  
*Manna vulgē appellata oritur.*  
*Mel rosicidum.*  
*Mel æreum.*

*Praxagoras.*  
*Philonimus.*

materiam ex qua mel gignitur, rori esse congene rem. Videtur autem & ex plantis, in quarum foliis colligitur, boni malive quidpiam ipsi accede re. Ideoq; laudatissimū in locis mel gignitur, in quibus thymus, & alix quædam herbæ & frutices temperamento calido & sicco, affanem prove niunt. Tenuiorum enim est partium id mel: ideoy in calidis corporibus promptē in bilem conver titur. Frigidis verō est accōmodatissimum. Cūm autem tenuium sit partium, acrimoniæ quiddam habere etiam uiceffe est, quæ alium ad excretio nem proreitet. Quam quidem adimentes per inie ctionem aque, atque coctionem, ipsum redde mus ad distributionem atq; concoctionem accōmodatius. At melicratum quod paulisper aut nihil omnino concoctum fuerit, prius dicitur, quā concoctū, & in corpus distribui, & nutri re possit. Præterea mel nō planē coctum, in ven triculo & intestinis flatu quodā gignit: con trā quod in decoctione spumam omnem abiecit, flatu est expertus, & vrinam mouet. Quod si quis citra aque admitionē mel solum delugat, nutrit quidem infirmus, sed alius p̄ptius de nocet. Largius verō sumptū, ventrē superiorē cō dātare ad vomitū solet. Coctum autē sine aqua, neq; vomitū similiter mouet, neq; aliū subdori: verū distribuitur & nutrit magis: vniū autē mi nus eo quod cum aqua coctum est, mouet. Seni bus itaq; mel cōmodissimū est: ætate autem flo rentibus & calidis, in bilem vertitur.

## De Vino.

SI MODO quicquid alit, cibis est, vinū etiam in genere ciborum est collocandum. Ceterū vi norum omnium, rubra simul & crassa, sanguini generando sunt accōmodatissima, ceu quæ mi nima mutatione indigeant vt fiant sanguis. Post ipsa sunt nigra, crassaq; & dulcia: tum quæ colo re quidem rubra sunt & nigra, cōsistentia autem crassa, vni cum qualitate astringente. His autem minus sua natura alunt, quæ alba sunt, simul & 40 crassa, & acerbā. Omnium autem minimum nutriunt, quæ colore quidem sunt alba, consistentia autem tenuia, & aquis hydromelin faciendo apposita, similia quodāmodo. Dulcia verō con ficiuntur in ventriculo, & distribuuntur facibus, quā austerā, vt quæ facultate sunt calidiora. Quia autem sunt admodum crassa, tardius quidem perficiuntur, atq; distribuuntur. Si rames in ventriculum adeo robustum incidant, vt confici rectē ab eo possint, alimentum copiosius corpo ri dabunt. Constat præterea, quod quæmadmo dum hæc corpori alendi tenuioribus sunt præ stantiora, ita ad vrinam ciendam sunt deteriora.

## De cibis sale conditis.

ANIMALIVM corpora, quorū carnes simul duræ sunt & excrementitix, sunt ad salendum accōmoda. Quæ verō aut admodū mollem, aut valde siccam, & minimē excrementosam habent corpora habitum, sunt ad salendum inepta. Sa lis namq; facultas, humores superfluos tenuat, & digerit, corporaq; cogit atq; condensare: cum ni tri spuma, & laxum aplorionitri, tenere quidem & dūcutere possint, cogere verō & condensare non possunt. Sinitur igitur obeforum & ætate flo rentium carnes, ad salendum sunt cōgruentissi

mx, vt quæ ab utroq; extremo absint. Quæmad modum enim corpora sicca salata, corus evadūt similia: sic cōtrā, quæ immodica humiditate dis siliunt, salis commercio tabescunt. Ob eam cau sam neque pisces molles carnis, & excrementis vacui, vt faxatiles & aselli, ad salendum sunt ap p. Graculi verō, pelamides, myla, sardæ, & sar denæ, quæq; asellus vocant, & salamenta, ad sa liendum appositū sunt. Nulli verō, quod dura eorum sit caro, & ab excrementis pura, non sunt ad salendum accommodi. Ex his autem perspi cūm est, ea esse concoctū admodum difficilia, quæ sale condita, dura & nervosa evadunt, ac veluti coriacea. Quæ verō contrā habent, te nua quidem ipsa redduntur, mansa autem hu mores crassos & giuniosos attenuant. At præ stantissima omnium quæ mihi licuit experientia cognoscere, sunt quæ a veteribus mædici Sardica salamenta appellantur.

## De mediis edulibus.

IN singulis differentis, quas alimentis inesse diximus, quædam sunt media. Animalibus au tem naturalem temperiem atque inculpatam ser uantibus, similia suis naturis cibaria conveni unt: verō quæ pravam temperiem, aut ab in no sunt sortita, aut post acquisierunt, non simi lia sibiipsis eūs, sed contrariorum est vtilis. Et quæ singule nature suum proprium medium habebunt, idq; secundum ætatem, vitæ cōditio nem, in ætatem, & regionem, in quibus tan diu habitant, differentias.

GALENI PERGAMENI  
de euchyria & cacochymia, li  
ber unus.

Nonne caritas asidua, quæ nō pau co abhinc annos multas nationes Romano imperio subditas afflixit, coegit vici alimentis pessimi in strumētis, ac proinde variis, & ma ximē perniciosos morbos induxit, planē signifi cauit, quam vitiosi succi ad gignendos mor bos vim habeant. Etenim ab his alimur, quæ na turæ nostræ sunt familiaria: quæ verō illi adver santur, nos in perniciem deducunt. Ceterum qui huiusmodi letalium venenorum percunt, facile fecer ni ab iis possunt, qui ab aliqua corporis affe ctione extinguuntur. Neq; etiam quicquam infir mitas ibit, ob humorem quem venenata anima tia in istam particulam insiliunt, vel illam cele riter vita priuari, vel in putredinem labi, vel do loribus vehementissimis, aut phlegmone vrgere: necnon corporum ieiunio hominis spūto bis tēve aspersum, protinus interire. Nam licet vi nature quedam cum aliis quorū naturis conveni unt, sic altera quoque adversatur alteri, cūque corrumpit. Porro quandiu ipse patris consilium sequitur, ab usu immodico fructuum, quos horarios vocant, abstini, observauitq; ab illo traditam optamā vitæ rationem, tandiu im munitis ab omni interperie perstet. Quoties au tem eius præcepta negligēs, vni cum cortaneis meis vitra modū fructibus illis me impleui, sem pter in morbos incidi, qui sanguinis misionem

Nonne apud ad salendum.

Sardica salamenta.

Animalibus ut prius naturalis temperiem, similia naturis cibaria conveniunt: verō quæ pravam temperiem, aut ab inno sunt sortita, aut post acquisierunt, non similia sibiipsis eūs, sed contrariorum est vtilis. Et quæ singule nature suum proprium medium habebunt, idq; secundum ætatem, vitæ cōditionem, in ætatem, & regionem, in quibus tan diu habitant, differentias.

Sacris vitiis ad gignendos morbos maxime vim habere. Naturæ nos ab illis quæ naturæ nostræ sunt familiaria.

Scorpionem hu minis inani suum corpus.

Galeni quædā ab omni temperie cauere.

Mel laudatissimum in locis gignitur.

Mel quibus facit in bile vertitur, & quibus in maxime ex vno.

Mel acrimonia quomodo vertitur, Melicratum.

Mel crudum.

Mel coctum, vrinam mouet.

Mel largius sumptum, vomitum provocat.

Mel similes cōmodatissimum, ætate florentibus & calidis, in bilem vertitur.

Vinorum differentia. Vina rubra simul & crassa, sanguini generando sunt accōmodatissima.

Vina alba & crassa, minimum nutriunt.

Vina dulcissima.

Cibaria quæ animalibus sunt apta, et quæ in ista.

Humores superfluos digerit, corporaq; cogit atq; condensare.

In carnis.

*Galenus pater  
in omni dis-  
tinctione  
et fuit reser-  
vatus.*

*Cibi admodum  
exquisiti non  
oportet quod pos-  
sint exerceri  
ante cibum.*

*Panis optimus  
quis sit.*

*Alica.  
Sicca caro.*

*Crudo humo-  
ri necessario  
debent aut con-  
coqui, aut con-  
pascere.*

*Calculorum ge-  
neratio.*

*Exercitii ante  
cibum medicre.  
Tragus.*

*Cibi confectio-  
nes in medicre-  
tate, omni cu-  
m datus sunt  
fuit.*

desiderarent. Erat enim pater meus geometrix, architectura, astronomia, arithmetica, logistica, studiiis excellens, maximèq; omnibus quibus erat notus, ob ipsius iustitiam, modestiam, bonitatemq; ut quivis ex philosophis aliis, admirationi. Ceteri quoque potest exerceri ante cibum, is haud sanè admodum exquisitos cibos desiderat: cui verò negotia & occupationes impedimèro sunt, non modò huic probato innoxioq; victu, sed salubribus quoq; medicamentis est opus. In primis igitur his qui quiete ac pro animi sententia vitam traducunt, cum victus ratione describam, ex qua gigni sanguis optimus possit. Deinde emittendi est, ut quardam huius etiam præcepta tradantur, qui turbulentè vitam, atq; negotiis deditam agunt. Cibi itaq; cibi probati sunt, ex frumentaceo genere panes purissimi probèq; confecti, adhibita prius maceratione atque fermentatione, sibi, necnon sale iniecto. At cocti in cubano præstant: post quos furmacei secundo debentur partes. Alica verò, sive nigræ, sive illa caro, si exactè in ventriculo concoquantur, in sanguinemq; a leciore convertitur, probatissimos gignunt humores: aliquid tamen glutinosi in se habent, ob idq; in eis iecur obstruit, & renes, quibus hæc à natura affectus meatas fortitèr, ac proinde distributione impeditur. Horu quoque visus vberior, in supradictis particulis vel gravitate, vel dolore nonnihil facit. Quineti in venis que per caua iecoris, aut per mesenteron feruntur, redundans humor periculè adfert, ne vel putredinè contrahat, vel ex ipse particula in quibus cogitur, afficiantur phlegmone. Quippe necesse est crudos crassosq; humores, vel concoqui, vertiq; in sanguinem, vel cum putrescere: non secus ac quæ calidis in locis diutius manent. Quamobrem inventa medicamentis salubria sunt, que tenuandi vim possident, que obstruccionibus liberant. Quandoq; horum frequenter visus, vel ferofum, vel biliosum, vel melancholicum procedente tempore sanguine reddit. Quandoquidem id genus medicamenta, non solum incidunt & tenuant, sed etiam immodicè calefaciunt: ob idq; & solida membra excitant, & crassum humorem reddunt, quo in renibus asfo, gignuntur calculi. Optima itaq; corporis constitutio, quæ temperantissima est, meatas, per quos humor fertur, patentiore habet: quam quidem talem conferuat ante cibos exercitii medicre. Tragus ex frumentacei generis alimentis, eiusdem cum alica nature est: ægrius tamen concoquitur. Propè enim natura ovoru atq; vires accedunt. Iam verò quæ glutinosos crassosq; humores gignunt, sibi in hepate convertantur in sanguinem probum, potentissimè nutriunt. Ceterum qui cibi in omni excessu medicocritate consistunt, q; omniù commendatissimi sunt. Eius generis panes optimi habentur: præterea gallinarum gallinaceorumq; carnes, necnon phasianorum, perdicum, aragraru, columbaru, mularum, rardorum, nurrurimq; & omniù passeruloru. Pisces item saxatiles, pelagici, littorales, gobi, murenæ, buglosi, aselli, & simpliciter pisces omnes, qui neq; insuave, neq; mali odoris, neq; glutinosi quicq; gustu repræsentant. Verum ad fa-

niratem tuendam, si ante cibum corpora moderatè exercerantur, mirum in modum prodest: at contra, quæ & oculum diuturni, in maximo no cumento est. Qualiscunq; autem post cibum motus, alimentu ex ventre trahunt in diuersas corporis partes distribuit. Porro panis qui nec fermenti, nec falsis quod sit est conner, neq; probè maceratus nec coctus est, in glutinosum succum producit. Caseus omnis, crassus: vetus, mali succi est: recens verò, succi prauitate caret: qui quidem ex melle sumptus, alium subducit. Lac autè cdm ex triplici, dissimiliq; substantia consistet, nempe serosa, crassa, & pingui: camelinu, asinmūq; lac, serosi humoris plus habet: plus crassi & caseosi, ouillum: plus pinguidinis bubulum. At lac caprillū, inter cetera lactis genera moderatè se habet, ob idq; in corporibus nostris mediū etiam præstat effectum. Etenim lac quod ferofum & tenue est, minus nutrit, sed alui magis deicit: contra crassius, minus alium subducit, ceterū magis nutrit. At lac caprillum, sine melle sumptis, periculosum existit, quod nimirum in ventriculo concretescit strangulat: quemadmodum vbi san- 30 gnis in grumos edcretus, aut in vulnus aliquod, aut in ventrem, aut in aliquod intestinorū defluxerit, grauissima symptomata inducit. Lac itaq; statim vbi est emulsum, hauriatur. Cui quidem ne in ventre concreseat, mellis, aquæ, & salis aliqui solent nonnihil miscere. At quod ex lacte coctione destitit serum, alium egregie mouet. Quæ ex lacte & caseo placenta consistit, itraq; etiam, quæ ex lacte & similagine consistit, crassi succi alimonia præstant. Cochleæ crassi succi censentur: itremq; oua, quæ vel elixa, vel rosta, pe- 40 nitius sint densata. Fritia verò, mali succi, mollosi: in ventriculo coctura existunt, secum etiam corruptentes adustus cibos. Mediocriter verò cocta, quæ ideo appellatur tremula, ad coctionem, digestionem, nutritionem, boniq; succi generationem, sive nigræ & quæ sorbilia dicuntur, ad le- 50 nitas gutturis asperitates, idonea sunt. In aqua nigris verò, quæ mollia dicuntur, videlicet lolligues, sepiæ, polypi, aliq; id genus, crasso & tenaci sunt succo: necnon ex piscibus, quæ cetacei generis habentur: cuiusmodi sunt thynni. Sed pelamides ex his magis ad medicocritatē tendunt. Obree item, buccinæ, purpure, crassi admodū succi sunt: ac omnia breuiter, quæ dura testa inte- 60 guntur, necnon chamæ, patellæ, pectines, pin- næ, & alia id genus. Quorum omniū succum scri- bere debet, non secus ac serum lactis, alium deice- re: at solidiores ipsarum partes, serius ob crassum coctui, crudumq; & crassum, & frigidum humorem gigneret: quales vires in brassica & len- te etiam videt licet. Quorum ita men succus, non glutinosus, sed nitrosus, & deiciendo alio effica- 70 est: sive dracunculi acerrimus, & amarissimus. Vtrūq; etiam aron præstat, sed minus effica- ce. Bulbi austeri amaroq; sunt succo: ex qui- bus lotis coctiq; sepias, quicq; supet, crassi succi habetur. Sed fangi inter huius generis ci- 80 bos, frigidissimo, tenacissimo, & crasso succo re- dundant: à bolis tantum neminè interisse me- moriz proditum est. Sed hi vbi concoqui nequi uerunt, in nonnullis cholera excitantur. Alij

*Exercitii ante  
prandium me-  
dicre, confis-  
ad sanationem  
tandem,  
Mortuus post  
cibum trahenda.  
Tenuis visus.  
Caseorum dis-  
tinctio.*

*Lactis substantia  
triplex.  
Lactis diffin-  
itio.  
Lac caprillum.*

*Lac ferofum.*

*Lac crassius.  
Lac caprillum  
aliquo melle  
sumptum: quod  
concretescit.*

*Sanguis in pro-  
mo cauitas  
grauissima sym-  
ptomata inducit.*

*Lac statim vbi  
est emulsum,  
hauriatur.  
Serum lactis al-  
ium subducit.*

*Placenta ouis  
tata.  
Cochleæ.  
Oua.*

*Oua tremula.*

*Oua sorbilia.*

*Pisces molles.*

*Cetacei piscis.*

*Tegula.*

*Dracunculus.*

*Aron.*

*Bulbi.*

*Fangi.*

*Noti.*

omnes

**Tuber.** omnes fungi periculosissimi sunt. Tuber, leniter crassi, non mali succi est: cuius generis amyli habetur. Item nux pinea se habet. In his quoque crassus succi censetur, iecur, renes, & testes annomendandi sunt. Verum recur mali succi non est: renes testesque non boni, testesque gallinaceorum exceptis. Lien ex ceteris animalibus, satis vitiosus est succi, melancholicusque minus vero nocivus. Cor dis substantia durior ac magis fibrosa est, quam quae in alijs habetur visceribus: quare ipsum non nulli inter masculos collocant. Sed musculorum verorum capra, nervosiora quoque modo cetera carne sunt, in eisque ob visibus ligamenta oritur dissimulantur. In fine autem musculi tendones oriuntur: ceterum ob causam extremam vitium musculorum partes nervosiores: sicut & medullae carnosae sunt, & verissime nutritae. Porro totus musculus propriis quibusdam lincamentis circumscriptus, iunctusque ab alijs partibus cernitur, ob idque functione vnam, quae est ex motibus voluntariis. Extremae animalium partes, ligamentose existunt, corporis alimentum lentum & glutinosum praebent. Partes etiam quae penes labia pedestrium sunt, lentae, sed non crassum humorem gignunt, coquanturque comode: itaque & volatilium atque communi quodam corporibus se excercens ratione. Nam hec omnia extremities carere: quae vero in otio degunt, excrementosa sunt. Nulla curis praeparantur, ubi probe fuerit elixa, glutinosum, sed non satis quidem crassum succum praestat: nec veluti extremas partes, concoctione admittit: nec non succum, sed excrementotiores producit. Cerebrum quoque pars crassus succi est, & quae durior medulla excipitur. Sunt glandulae eiusdem naturae, sed mediocriter: nec non iuvenum & iuvenum testes. In universum autem partes seniorum, dures, siccae, & edoctae difficiles sunt: sicut & iuniorum, humidae, mollesque atque, idcirco faciliores concoctae: his tamen exceptis, quae ubi in lucem exite sunt, protinus in cibo sumuntur. Sunt enim id genus omnes istae coxae. Quae in mammae glandulae habentur, si lae in sese continent, crassus succi edulitas. Quod si animal ex quo sumitur, bone habitus fuerit, abunde nutritum, & bonum succum efficiunt. Etenim lae probantissimi succi habetur. Quare nonnulli pulmonis vitio affectos, potionem tantum lactis curari putant, antea scilicet quam id ipsum vitiosus vastus atque callosus fiat. Sed praeter istam lac muhbre, tanquam naturae elusum, non itaque familiarissimum, commendamus cum ab his medicis, tum vel maxime ab Herodoto & Euriphone, quod quidem vbera ab ista affectu fugenda esse pronuntiant. Lac siquidem, simulque est emulsum, non nihil naturae bonitatis amittit. Sicut autem oportet, lac ex iis animalibus quidem, quae boni habitus fuerint, homini esse succi: ex iis autem quod prauo, non secus ac sanguis qui in illis habetur, cacochymum existere. Inter crassos succi edulitas animalium vtrique balauri species, quoniam videtur, ac fructus etiam palmarum. Ex his autem quae quercus ferunt, gratum sunt castaneae & issaues: quae quidem & edocuantur comodus, & potissimi succum non gignunt: ex enim abse vel elixis mandantur. At quae figura oblonga sunt, & similes

palmulis, subis sunt certe nutritiis, haud item hominibus congruae. Ilignae vero glandes durae sunt & acerbae, atque concoctione admittunt, atque crassum succum largiuntur: ac proinde vitandae sunt. Est autem in austeris quidem remissa, astringendi qualitas, in acerbis autem intensa. Sed quanto ilignae glandes valentiores astringendi potestate ceteras superant, tanto hac in re ab ipsis glandibus superantur castaneae: quarum tamen visum videri cavendum, quod & crassi sint succi, atque coquantur, ac tum alium astringere, tum excitare inflationes possint. Porro palmarum fructus dulcis sunt succi, crassique, & astringentem facultatem habent: quare facile iecur obstruit. Siquidem dulces cibi, crassique succi, iecoris ac lenis obstructions faciunt: inchoatremque in visceribus phlegmonem augent: necnon inflationes, scirrhus vna, adeoque ab seculi generationes procreant. Nostris autem corporibus alimentum secundum modum est, quod ex istis rebus constituitur, quae nec crassi, nec tenacissimi succi: haec siquidem moderate consistentiae sanguinem gignunt. Quod vero tenue admodum est, parum nutrit. In his quoque vitium est cibi, qui omnino friabiles sunt, ut qui paucissimum in se habent lentorem. Panis quippe ex panico, miliove confectus, dum est, aridum quiddam, vel quasi cinerem sapit: nisi et aliquid indiderit pinguitudinis. Quare ad bonam valetudinem si cibi commodissimi sunt, qui mediam quandam naturam inter ea quae diximus obtinent. Ceterum quae ex tenuibus, aut omnino ex fructibus intumescent, vteremque protinus siccitate atque duritie depaunant, mollioraque & humidiora redduntur, praetantiora existunt: deteriora vero, quae praestant duritiam retinent, atque etiam minime tumescunt. Quod vero ad pistanam pertinet, quae celeriter quodam turgit, probantissima est: quae autem post multum temporis intumuit parum, vitiosa. Porro quod praetantius est turgit, plus quidem: quod deterius, minus farinae reddit. Illi autem fructus comode, iudicio meo, afferantur, qui proliquis marcescant, siccantur. Nonnulli cucurbitas in tenuis ossas dissectas, arefcere sinunt. At huiusmodi siccat neque canis, vitium in se habere maximum indicant. Paucissimos tamen fructus reperias, qui siccati non possint, praeter pepones, melopepones, Armeniacas, Persicas, & quae a Romanis praecoxia appellantur. Ficus etiam siccate durat, & cucumeres ut cucurbitas similiter reponuntur. Qui cibi illi in tumorem crescant, interit dum in aqua coquantur, si & edocuantur aptius, & ad bonos humores gignendos sunt praetantiores. Nulli autem in cibariis omnibus ad boni succi generationem tam pertinet, quam si probe in ventriculo edocuantur. haec siquidem & secundum, quae in iecore & venis sit, & tertia, quae in particulis quae nutrantur, perficitur, facibus concoctionem admittunt. Est enim nutritum, alimento secundum qualemque nutritum, & parantur quae nutriturum assemilato. Ceterum praeparata praecoxia, comodus transmutantur, & emissa, cum ad invicem edociones succedant. Chnides igitur corporis partibus iecur alimentum praeparat, illi ventriculus, huius, uti ars

Nux pinea.

Castanea.

Phenice facile iecur obstruit. Dulcis cibi, quo a male inducant.

Friabiles cibi. Panicum, Milium.

Seneca praestantiora quae sunt.

Pistana quae praestantior.

Tritum, fructus ad oporandum aptius, Cucurbita, Ficus.

Praestantior qui siccantur post sunt.

Ficus, Cucurbita.

Cucurbita tri-

pina.

Nutritum quomodo fit.

Praestantior nutritum in quibus condit.

Cucurbita nutritum.

*Interitica aus  
malum.*

*Cauda.*

*Colla vituloru.*

*Ventriculi gal-  
linacei anseri-  
nis.  
Anserina car-  
nei.  
Struthio camel-  
orum partes.  
Anseri.  
Ovis.*

*Son.  
Peronii.  
Squilla caro.  
Helena.  
Vitulina.  
Aggina.*

*Pyrena.*

*Berytaceum.*

*Faba infestio-  
nis pyrenae.  
Pyd.*

*Lentis.*

*Oculus Dolebi.  
Cicerula.  
Olyra.  
Typh.  
Panicum.  
Miliolum.  
Cicer.*

*Lupinus.*

*Castanea.*

*Horii fructus  
si corruptus in  
ventre sunt  
in letalibus vo-  
catis redduntur.  
Ficus. Vux.  
Carica quo-  
do pediculi ge-  
nerat.*

oblongatrix, quæ variis modis concinnat cibos quibus denique omnibus gubernatrix natura fructiferas plantas disponit. At ventriculi, vulvæ, intestinorum animalium, quod durior substantia quæ caro consistit, etiam concoctum difficultiora, nec adeo boni succi sunt, nec tam apta ad nutriendum. Sed cauda sunt his quoque duriores: reliqua verò in ipsis, quæ ad concoctionem & nutritionem spectant, duritiei proportionem respondent: hoc tamen excepto, quod minoris causa minime excrementis redvndant. Cum his volatilium nutritia, similitudinem quandam habent. Ventriculi pedestrii & volatili, maxime inter se differunt. Namque ex volatilibus crassius duriorque est, & concoctum diffusius: at si coquantur, vberime nutrit. Gallinæ & anseris præstantissimus est. Ceteræ verò anserinæ partes, alis exceptis, sunt duræ, & excrementosæ, nec facile concoctionem admittunt. Struthio camelorum membra omnia, duræ, excrementina, & concoctum sunt difficilia. Aurii cartilago & siccata est, & minime nutrit: earum cutis exterior tenuis aridior, ægrè item concoquitur, & paucissime nutrit. Oculi a paucis eduntur: consistit enim ex substantia dissimili. Ceterum eorum musculi tantum facillime concoquantur. Ex animalibus quorum natura est ad gignendos bonos humores aptissima, suæ medicis iam ætatis habentur. Caro ex porcellis parvulis, excrementis scatet. Itaque ex pedestribus animalibus suilla caro cibis probatissimus est: deinde hœdina, mox vitulina. Agnina verò, humida, tum lentorem, mucoremque in se habere censetur. A ceteris pedestribus generis, meo iudicio, abstineas, quibus boni succi generationi animi curamque inrendit. Pti fana probe ex optimis hordeo confecta, inter cibaria omnia prorsus omni noxa caret: nutrit iam, men quàm panis minus. Fœnogrecum nō boni succi est, si quis eo liberalius utatur. Pti fana verò, est quod inde ad fatietatem sumptis, nō idoneo boni succi generationem impediens. Idē quoque de fabis dicere, cum nec mali sunt succi, nec ob vim illam detergendi, quam habent, obstructions faciant, nisi iustanones parerēt. At pisum extergendi quidē vim nō requirit, ac faba: sed iustanone caret. Lentescit & vitiosi succi, & melancholici sunt. Odori præterea & dolichis his quæ diximus deteriores, & cicerculis meliores habentur. Post hordeum olyra annumeranda est: post hæc typhæ. A panico prorsus abstineas. Huic miliolum consimilis est generis, sed minus malū. Cicer egregie nutrit, sed nec boni succi est, & inflat nō minus quæ faba, semēque auget, ac venenis desiderium. Lupinus nō mali, sed crassi succi est, propter caliditatem egregie. Fructus quos arbores ferunt, omnes ferè mali sunt succi, castaneas tamē exceptis, quæ si in ventriculo concoquantur, efficaçiter nutriūt: atque ex crassi quidem, nunquā autem sunt mali succi. Ceterum qui fructus horæ appellantur, humorem vitiosum gignant: quod si forte in ventriculo corruptantur, similes letalibus venenis redduntur. At ficus & vux ceteris autumnalibus fructibus sunt præstantiores. Quippe maturæ ficus ferè innoxie sunt: vux deinde, & ex quidem appende. Verum carica, si diutius immoretur in corpore, mali sunt suc-

ci, & pedicularum copiam produciunt. Cum nubicibus autem sumptæ, cibi præstantissimi sunt, cum amygdalis similiter: sed cum his obstructions aperiunt, non tamen ita bonum succum præstant, nutriuntque, ut cum miscentur cum nubicibus. Sunt qui caricas cum ruta nubicibus præsumptas, venenis vniuersis adversari fassantur. Reliqui arborum fructus mali succi sunt, nig potissimum, quos sylvestres plantæ & fructus tenent. Sed malis, pitis, puticiis, et mēspilis, non alimētorū, sed medicamētorū loco vituntur, ad ventriculi firmitudinem. Inter fructus quoque, cucumeres, pepones, melopepones cōnumerantur: quorum nullus boni succi est. Quod si elegerit perfici, digerit nō possint, in succum ferè letalibus venenis similem convertuntur. Cucubita duntaxat ex huiusmodi fructibus damanda nō est. Si tamen in ventriculo corruptantur, ipsa etiam malum succum produciunt. Mora idem, si perficiantur citò, & pnisque corruptantur transierunt, innoxia sunt: nisi uis quāpiam liberalis vitantur. Ex olereacis nihil est quod bonū succum præstet. Lactuca tamen in his quæ boni malique succi sunt, medietatem in se habet. Post illam malua habetur. Post hæc portulaca, amplex, blattia, rumex. Sed lactuca agreis, chondrilla, candix, gingidium, feris, cichorium, aliisque ex olereacis agreisibus omnia, succum vino sissimū gignant. Radices oleum in se acrimoniam habentium, ut allium, cepæ, porri, raphani, & pastinacæ sylvestris, malum succū produciunt. Sed asari, carig radix, & rapum, in his quæ boni prauis succi sunt, mediabatur. Quæ piscesque ferè omnes, boni succi censentur, exceptis lacutribus, palustribus, et qui in imundis fluminibus atque turbidis degunt. Minus enim hæc rationibus seque exercet, vitiosioris aëre, & prauo victus genere vniuntur. Quæ verò in meliores aquas se transferunt, adhuc animalia ea iis deteriores sunt, quæ puro ex mari viciant. Omnia siquidem propemodū animina, quæ in ea maris parte versantur, quæ dulci aque se non immiscet, innoxia sunt: ut pelagica, & saxatilis, quæ tum ad bonos humores gignendos, tum ad gustus ipsius voluptatis, ceteris multo sunt præstantiora. Horū itaque fructus viles, tantissimus est. Nonnulla præter ea sunt quæ duplici ex humore viuunt, tum marino, tum dulci: ut lupi, capientes, canes, gobii, murenæ, anguillæ. Sed quæ puro ex mari victū perit, ea & boni odoris sunt, & gustus suavia: pinguedinis autē aut nihil omnino, vel paucissimū in se continent: diutiusque putredine illa durant (quibus signis discernuntur ab aliis) præsertim si nunc obducantur. Ad hunc enim modum quæ durior sunt carne, præstantiores evadunt. Murenæ igitur æque impuræ, pefissimæ. Anguillæ nunquā boni sunt succi, vel si in puro humore versentur, nedū in eo qui purgamenta vrbium recipit. Secundū quoque locorum pasturas, pisces & meliores & deteriores fiūt: ad quod odore & gustu explorabis facili. Ceterum neque auxiliorū, neque exactam salubritatem ciborū noticiam cōsequetur is, qui illorū vires accuratissime norit, nisi corpora quoque atque particularū naturas, quorū causa cibi appetitur, agnoscat. Ex his enim nonnulla sunt densa, & quæ spargere non possunt:

*Carica cum ruta  
nubicibus  
præsumpta,  
adversari venenis.  
Ficus quibus  
ut medicamentis  
in vitium.  
Cucumeres.  
Pepones.  
Melopepones.*

*Cucubita.*

*Mora.*

*Oleracea omnia  
dumtaxat  
ma.  
Oleracea variis  
speciebus.*

*Radices oleum  
acrimoniam habentium.*

*Asari, Pisi.*

*Pelagica pisces.  
Saxatilis.*

*Pisces duplici  
ex aqua viuunt.*

*Pisces puro ex  
maris viciantur.*

*Murenæ.  
Anguilla unquam  
boni sunt  
succus.*

*Corporum densitas  
feruina.*



Naturae diuer-  
fas, diuersa effe  
alendae velle  
ratione.

Ariditas in  
quibus adhi-  
citur. Frigiditas in  
quibus. Vina alba et  
tenuia moue-  
re vitiis. Vinorum differe-  
rentia.

Vinum omne  
crassum et dul-  
ce, esse acrius.

Vinum dulce  
quibus sit pro-  
prium.

Vinum odoratu-  
m caput tenet.  
Vinum trane  
mouet vitiis.

Modesta esse  
differenda esse  
similibus, immo-  
derata contrariis.

Nonnumquam  
et aliam.

possunt laxa nonnulla, & quae insaniuntur facile  
eandem ob causam humidior illa alimēto egent,  
hac sicciore. Alia item glutinosius, alia tenacius,  
alia parcius, alia vberius alimentū desiderant. Si-  
militer, quibus sanguis est admodum melanco-  
licus, humidi calidique cibi sunt dandi: quibus ve-  
ro biliosior, frigidus & humidus. Verū ubi pitui-  
tosus exiit, cibis tunc opus est qui calefaciendi  
siccandi vires obtineant. Qui probō sanguine  
abundant, alendi sunt parcius us cibis, qui natu-  
ram mediam sortiantur, sic ut neque aliqua prima-  
rum qualitatum excellant, nec crassius aut tenuius,  
nec lentius aut aridius, aut denique friabiles sint. Por-  
ro ariditas, in duris valdeque siccis rebus: friabili-  
tas autem, in mollioribus, mediisque inter humida  
& sicca invenitur. Commune tamen vtriq; est, ut  
tenacius lentore careat omnino. Ex vinis quae a-  
qua tenuiūque sunt, vitiis mouent, & paucissi-  
mi sunt nutrimenti: crassa verō, ut Theriacum &  
Scybelites, quae absolute dulcedinis sunt, non le-  
uiter quidem nutriunt. Cilicium vinum, austerū  
simul & dulce exiit. Quae Aegidis & Perperinae  
proveniunt, medium inter dulcem & exquirere  
astringentem qualiteram, sporem reddunt: nigra-  
que haec omnia sunt. Nulla enim vina inuenies  
crassa pariter & dulcia, quae nigra non sint. Alba  
vina haudquaquid dulcia sunt, sed alia austeriora  
& crassa, alia aquosa & tenuia. Ex illius autem, ru-  
tilisq;, nonnulli medio ceteris dulcia sunt, sicut  
Hippodamantiū, Faustinum, Falernum: nonnul-  
la omnino dulcedine carent. Sunt autem his ru-  
bra crassiora, & ex rubris, quae proxima colore  
ipso nigris sunt. Nutriunt autē haec omnia cras-  
situdinis proportionē eandem ob causam, qui in-  
dignae refectione, ut dulce viniū poterit, suaden-  
di sunt: ac tunc prae ceteris, hoc horum secur, lien,  
& renes, vino penitus carent. Verū cui crassius  
succus per venas redvndat, tenuis substantiae vi-  
num: cui frigidus, acre & vetustum: cui non frigi-  
dus, quod neque acre neque vetustum sit, accom-  
modatum est. Ad bonos autē humores gignen-  
dos, odoratū praestantius: sed tamen caput tenet.  
Tenuis, ceteris vinis magis idoneum, capi-  
ti nullam infert noxam. Vitanda quae crassa si-  
mul, malique odoris, gustuique ingrata & austeriora  
sunt. Ex vinis praesentissimi succi Falernū habetur,  
potissimumque id quod dulcissimum. Ad alui fluxiones si-  
stendas, austeriora vitmur vinis: quae ad nullos al-  
ios usus accommodare solemus. Ceterū in ipso-  
rum vinorum habitatione, non minus regionum,  
temporū, exercitiorumque, quam affectuū, & tem-  
peraturarū hominū, ratio est habenda, sic ut mo-  
derata conferuamus similibus, immoderata cor-  
rigamus contrariis. Temperantius igitur frigi-  
dioribus, runilium dulcēque viniū, vitore calidum,  
accommodatū est. Contrariū verō, temperamen-  
tis atque dispositionibus calidis: quod illud calefa-  
ciat impense, capitiueque dolores, & febres facie-  
re infert, nervosque nonnunquam laedit. Quod autē  
crassa vina dulciūque deiciant aluum, nemini ob-  
scurum est. Mustum etenim, licet coquantur acre,  
crassumque succum & infestationes gignat, aluum  
tamen subducit: id quod si interdum efficere ne-  
queat, mirum in modum nocet. Viranda ergo  
quae nimis vetusta sunt, nimisve recentia. Namque

illa praeter modum, haec nullatenus, quandoque re-  
centia fuerint, calciantur: quae tantum abest ut  
aliquem usum cibis concoquendis asserant, ut  
etiam ipsimet conficiantur aegerimē. Praeterea  
nec cōmodo per aluum transeunt, nec digeruntur,  
nec vitiis mouent, nec sanguinis coactio-  
ni nutritioque idonea sunt. Saepē etiam, ut aqua,  
in ventre suspensa remanēt: ut si paulū amplius  
ex his hauserim, facillimē coaccrescant. Sed ex recen-  
tibus vinis genus illud duntaxat rursū bibitur,  
quod tenuis substantiae est: sicut ex Italiciis, Cau-  
chanum, Albanum, & ex Sabmis Thusiisq; non-  
nulla. Aminaeū quoque quod in eo colle nascitur  
qui Neapoli imminet, citō ut bibatur idoneum  
redditur: quale apud nos in Asia est Tibinū, Af-  
sinium, & Tiraasenum. Quae sanē tenuia, candi-  
da, & aquosa existunt, idēque oligophora vocan-  
tur. Et quemadmodū rutila vina, cum calida po-  
tēstas sint, replent protinus caput, sic illa, nempe  
tenuia, & aquosa, leniterq; astringentia, non  
modō capiti innoxia sunt, sed etiam leues eos ca-  
pitū dolores nonnunquam tollunt, qui ab hu-  
moribus in ventriculo collectis proficiuntur.  
Quin & saepe potio, vitium praecipue in he-  
bentis, nonnullis capitis dolores infert: nam &  
ipsa corrumpitur, & naturale robur exoluit. Quo  
fit, ut vbi ventriculum invalidum reddidit, in ca-  
uss eius partes ex reliquo corpore fomes qua-  
dam biliosis defluere consueuerit, more eorum  
quos premit inedia. Quibus sanē offensis, no-  
xiosisq; ductum viniū, si temperatius ratione, ho-  
minem aetatum liberat: pauloque post, vbi firma-  
rit ventriculū, quae illi noxia sunt, ad partes in-  
fernas deferit. His ergo qui calido admodū tem-  
peramento sunt, aquae potio longē accommoda-  
tior est vino: quod vniū si interdū propinare ex-  
pediat, sit quidem tenue, leniterq; austerū. Ex vi-  
nis itaque quod vetustissimū est, adeo ab albo  
& austero, necnō recente & crasso distinguitur, ut  
illud quidem efficacissimē calefaciat, lenibilem  
hoc refrigerandi facultatem obtineat. Dulcissi-  
mum autē acerrimūque mel, eximie estimatio-  
nis est. Verū cuiuslibet generis mel calefaciendi  
vires sortitur, sumptūque a calidis corporibus  
facile in bilem vertitur. Idcirco pituitosis admo-  
dum naturis, etateque & senio confectis, vitlitter  
datur: frigidis quoque morbis accommodatissimū  
est. Acerū mustum, hoc est, oxymel, sanitatis ruen-  
dae gratis aetibus naturisq; omnibus vtilissi-  
mum est: siquidē obstructions omnes discutit,  
astriētisque meatus ita aperit, ut nulla in parte  
crassi glutinosi succi adhærescant. Quare me-  
dicamenta salubria, tenuandi omnis in se pote-  
statem habet, tūtorisq; ad valendūque tuendam  
cēserunt, quāquam quae crassiores humores gignūt:  
sed bonā habitudinē, robūque efficere nequeūt.  
Viranda autē penitus quae vitiosi sunt succi, pre-  
terquam aetate, cum languentium corporū sic-  
citate & calori occurrendum est. His enim hoc  
ipso tempore, mella, pruna, cetera, morisq; ido-  
nea sunt: item cucumeres, pepones, melopepo-  
nēs: sed parcius his vti cōuenit. Dantur quoque  
praecoxia, persica, & quae a Romanis milce dicitur,  
refrigerata tamen: necnon spuma lactis, sty-  
gii cibaria ex lacte confecta. Ficus item frigida,

Vine venosa  
callescere im-  
peditur, necesse est  
laxare.  
Vinorum recen-  
tiora acria.

Aminaeum vi-  
num.

Aqua potio  
quae malo  
infert.

Aqua potio  
quibus con-  
ueniat.

Nel omne cal-  
ce, atq; in cor-  
poribus calidis  
bilem gignit.  
Mel quibus con-  
ueniat.  
Oxymel ana-  
lysis & natura  
et vtilitas.

Cibi aetate  
admodum.



Affluetibus vi-  
sibus ratio con-  
ueniens.

& cucurbita, ita affectus accommodat sunt. Prae-  
dens tamen vir, ad refrigerandos affectus ex bal-  
neis rediens, epota prius aqua, mox vino medio-  
criter aquoso, iisq; per vomitum redditis, lactu-  
cam edat, quæ inn oxia est, simulq; vires habet re-  
frigerandi. Sumat postea sullos pedes bene deco-  
ctos, ex aceto & garo: itemq; alas gallinæ vel  
anseris, & risuldem etiam ventriculum, necnon  
piscis nonnullos frisos, ex us qui molli sunt car-  
ne. Danda item ex oleisbus quæ mali succi non  
sunt, sicuti malua cucurbitaque. Vinum postea,  
vbi frigida aqua dilutum sit, poter. Mihi sa-  
pius similes affectus & calores perperso, prorsus  
cremor bene refrigeratus fuit satis. Sunt qui ni-  
ue refrigerantur. Sed hæc illis præcepta tradun-  
tur, qui assidue occupationibus impediuntur  
qui verò huiusmodi sunt soluti negotiis, si exer-  
citantone vis solent, quamtransiame frigido po-  
tius indigent. Qui minime exercitantur, summa  
xatæ cum viciamenti calore vrgentur, aquam  
fontinam bibant, ab visig nuiis abstineant. Hæc  
siquidem, quamvis protinus nullam corporis  
suaueium lesionem sensibilem inferat, sen-  
sim tamen, occulteq; crescente vitio, cum iam ve-  
tas progressu temporis inclinatur, articulos, vi-  
scera, neruôsque morbis veat, qui vel difficul-  
ter admodum, vel omnino tolli nō possunt: ni-  
mirum semper imbecilliori particula, facile quan-  
cumq; excipiente lesionem. Quid autem vitio-  
si humores morbos gignant, cruditas assidua

Exercitatio  
quæmersitanti  
Frigida potio ex-  
te.  
Nian viam effe-  
pernalolum.

Cruditat quæ  
fit alim deter-  
rior.  
Affluet a te-  
nuisflantur et  
ta.

Affluet a te-  
nuisflantur et  
ta.

### GALeni PERGAMENI de attenuante victus ratione li- ber vnus.



Vm victus ratio attenuans pleisq; so-  
diuturnis morbis, vt arthritidis, dys-  
pnoæ, tumoribus lienis & hepatis,  
necnon morbo comitiali inci-  
pienti, adeo conferat, vt sola ea, si-  
ne vilo alio medicamento, sublatis sepe n̄ fuerint,  
operæprecium videtur aliquid & de ipsa prescri-  
bere. Vocant autem eam attenuantem, quemad-  
modum incrassantem, quæ illi contraria existit  
pro eo humore scilicet, quem vtrique in nostris  
corporibus gignit. Etenim olfactus & gustus,  
mentem nostram ad omnes eiusmodi cibos dis-  
cernendos, satis abvndè instruant. Quippe quæ  
sensūs nostros pungunt & mordicant, ea omnia  
constat esse acra, & quæ succos crassos tenuare  
queat. Quæ etiā, si largius æquo sumpta fuerint,

ventriculū mordicant, ciborumq; nauseam ma-  
gnam inducunt, & halitus acres emittit. Pluri-  
ma autem eorū vitia & indoles grauolentes  
& acres promouent: alia autem diuellunt, ero-  
dunt atq; pertundunt. Ceterū corpora in qui-  
bus humores frigidi, crassi & leni redvndant,  
huiusmodi cibos vlti maiori ex parte iouantur.  
Nemo igitur est qui alium, cepam, nasturtium,  
porrum, & sinapi, in genere ignoret esse tenuan-  
tium: post illa autem, finyruū, pyrethrum, origa-  
num, calamithen, silymbrium, pulegium, sara-  
rriam, thymū: quæ omnia vitia quidem mao-  
dantur: excicata verò, iam non amplius sunt ci-  
bi, sed medicamenta. In summa, omne quod sic-  
cum est, vandi valentius existit. Eorū verò quæ  
sicca non sunt, maturiora minus maturis: & quæ  
in montibus & locis siccis proveniunt, us quæ  
in campestribus, planis, hortis, & paludibus cre-  
scent, sunt fortiora. Prædictis autem ordine pro-  
xima est capparis, & terebinthi fructus: his au-  
tem truca, huen, apium, petroselinum, orminū,  
raphanis, brisica, & beta. Malua verò & bitru,  
& atriplex, tametsi us specie sunt proxima, facul-  
tandus tamen disident: a quæ enim sunt, minis  
māq; acris facultatis formitū: quomodo cucur-  
bitæ, citrulli, melones, melopepones, & prunæ  
humida siquid sunt hæc omnia, necnō frigida,  
& pinurola, potissimū si cruda & non elixa man-  
dantur. Omnia igitur tenera & incrementis, fa-  
cultatis moderata existunt. Quo fit vt plera-  
que medicamenta, dum oriuntur, & adolefcunt,  
non secus ac cibi mandantur: vt silphij, sinapis,  
pyrethri, & iringi foliones, quæ omnia vbi com-  
maturauerunt, magnam habent vim incidendi.  
Tennant verò admodum, dum oriuntur, atque  
a dolescent. Pari modo & vtrica, priusquam ex-  
citetur est esculenta: præterea feniculum, ruta,  
coriandrum, anethum, eiusdem cum illis sunt  
species, evidentiq; etiam calfacientia. At verò a-  
grestia olera, inter ea quæ diuina, naturam me-  
diam fortuntur. Si quid igitur olfactui, aut gu-  
stui, aut vtriq; simul, acre, mordicans & calidum  
apparebit, scito facultatem id habere tennandi,  
atq; incidendi. Ad hæc, si quid olfactui bonū o-  
dorem insensens, aromatis speciem repræsentet,  
id quoq; viribus calidum esse oportet: sed non  
æquæ ac mordicantia & rodentia, & insigniter  
calfacientia. Incidunt præterea & quæ sapore  
habent nitrosum, aut salinum: quoniam plura etiam

alium deiciunt, nec minus us amara, facultate  
tenuanda sunt prædura. Incidendi autē in illis fa-  
cultas, aceto & melle interdinat, oleo verò minui-  
tur. Mixacanthus porrò, medix quodammodo  
est facultatis: ab eo autem elq; & chamædaphne  
vtrinq; nō multum differunt. Stomacho autem  
minus prædictis com odant vitis alba, & viticæ,  
& spinæ asparagi: omnium autem maximè auste-  
ri atq; astringentes, quales sunt vitis ac rubi. Spi-  
ne verò asparagi alium deiecit, lunat etiā ven-  
triculū, facultatūq; est medicocis, & palmæ ger-  
men. Qui asparagi amaroris quippis præferunt,  
quāto amatores, tantō sunt sicciores, & inci-  
dentes magis. Semina sunt facultate suæ plantæ  
similia: nūquid illis prorsus ficiora sunt, ma-  
gisq; ad calorem propensā, eorū magis tenuantur.

Non

Aria largum  
sumpta, quæ  
mala infirmit.

Aria gustum  
vitia.

Tennandi ut  
dicamini.

Sicca effe-  
natura vari-  
bus.

Mitana effe-  
lentiora cam-  
pistrum.

Aria habere  
facultatem com-  
munda.

Tennandi fa-  
cultatem acco-  
modando atq;  
melle, remitti  
autem sicut.

Palmæ germin.

Brutia effe-  
natura sua pib-  
ta similia.

Tenuis vi-  
sibus ratio qui-  
bus affluetibus  
causatur.

Olfactus.  
Gustus.

Aria quæ di-  
cuntur.

Nou omnia tamen sunt vesca, vt nec herbe ipse. Est itaq; papauer semen herba ipsa praestituta, adeo vt tanq; inuocati panibus ipsum & placenta permisceant. Refrigerare tamen & spium gas-  
 lam ex hoc intelligis, quod caput grauat, & so-  
 porentur est, sed non perinde ac succus ipsius. / So-  
 porentur est & laetitia semen: quandoquidem &  
 olus ipsum frigidu est & humidu. Ab his itaq;  
 frigidis humidisq; a feminibus est effluendum;  
 qui remanent victus ratione vii volent. Sefami se-  
 men, succum crassum ac lentum in corpore gi-  
 gnat; nam vero, petroselinu, cumini, carui, parisi, li-  
 bydici, sinapi, ameo, dani, sciscle, & omnia  
 deniq; odoratoru & acru, eidenterq; a laetitia  
 tum semen, tenuitate dura vt in bua congruit.

Ceteru rura semet neminem duntaxat tenuit  
 vim possidet, nam modo & lenit & canna sem-  
 inaque ena & caput remane. Quibus tunc pra-  
 cipue vtendu est, dum sanguine per vias pur-  
 gare volumus. Cerealia omnia generaliter ap-  
 pellatur legumina. Quae vt manu leguntur,  
 speciatim dicuntur: ched opus: sicca & frumentu  
 quae falciputatur. Triticu agitur firmisimum, est  
 alimentu: sicculu qui praestitit admodum gignit ad  
 lentu. Quare illo simpliciter alioq; non est vefum  
 dum: nam colloctio non remittit, et crassum succo  
 producit. Sola itaq; a preparatio est probanda,  
 quae fermento constat, tale & cibano. Paulo de-  
 terior quae minori feruore: Trincum quod graue  
 est & densum, ac in profundo stium, copiosius  
 mi alimentu est, crassiusq; succu ac lentu. Contra  
 quod leue est, & rarum, & album, minus nutrit;  
 succoq; gignit crassum minus, ac lentu. Simila  
 go aut & alica, multa plant, crassiusq; succu  
 ac lentu. Veru similitudinem quidem ad conueni-  
 entia amittit, qui extenuant victu vtuntur. Ali-  
 qua vero possunt vesca moderare, tum sola quae  
 incocta, tum vero cuot melle, aut vino dulci, ita  
 usq; ac tenui, quodq; viribus. Faleno fir proxi-  
 mum. Licet etia miscere tum betas tritis, tum  
 anetu nonnullu, vel poru, vel pulegiu, vel calamit-  
 ribus, vel hyssopu, vel piperis. Prisana autem ipse  
 per se nonnullu absterget, vt hyssopo non magno  
 pere cgeat. Mel prisana immiscere opus nou est,  
 nisi quis ea quae in thorace ac pulmonibus con-  
 tinentur, studeat expectorare. In hepate vero ac  
 lienis affectibus ipsum admiscere non conuenit;  
 si hordeacei panes, quouis illo modo parentur,  
 exiguu alimentu sunt, succumq; crassum, ac stur-  
 mitum generant. Potentia vero, similitur ac pa-  
 nes, nutrit: nisi quod disticat magis, propter ea  
 quod fixa exsistit. At farina est vtriusq; humidior;  
 excrementosisq; magna ac stultitia, & possimili-  
 si cum lacte coquantur. Ex typha porro & amentu;  
 panes similiter cōficiuntur, qui & argre coquan-  
 tur, & succum reddunt non probum, in senex &  
 ruitum, olyza medium lo com foratur: nimiru  
 tantu detetur tritico, quantum in a medio existit.

Quod vero ad senem pertinet, non arbitror esse  
 aliud framentu genus, ab olyza & typha: duntaxat  
 sum: fed ex utroq; ad quod non appellamus ty-  
 pham, sed venter duntaxat appellatur. Quod frum-  
 vbi a cordice spoliatum fuerit tritico: hordeo, &  
 olyza, longe tenuius atq; exilius existit. Flauru  
 preterea est, vt iustitiam duntaxat albu, vt hordeu

Fabae minus quidem quam hordeu tergeri: verum  
 sunt concocto diffusi, atq; admodum stultitia.  
 Fabis pusa ad omnia sunt praestantiora. Eruli-  
 lae vero; & dolichi, & phaseola, multo fabis sunt  
 deteriores. Lentis aut tamen succum crassum  
 gignunt, mon omnino tamen sunt aspernandae:  
 Lupini similes sunt lentibus, nisi huiusmodi melle  
 fiant. Oleo ab utroq; statim lenis, & concocto  
 diffusis, magis excrementis, admodum tamen  
 men viciu eodemodi. Eruli videri magis, & ho-  
 minum est alimentu: in ciliisq; tamen facultate  
 insignitur. Vnde et ex eo medicamentu paratur,  
 quod in iis quae in thorace haerent expectoran-  
 dia, nullu est secundu. Fortioraq; huiusmodi  
 alui detrahenda praestit, ante alioq; cibos sumitur:  
 Cum melle quoque eius succu exhibet, vt qui cal-  
 facientia & detergendu vim habeat. Quod tamen  
 caput tenet, viciu eius multu excedens est. Pri-  
 na Damascena hydromelle incocta, praestanti-  
 duru, quibus extenuante victu ratione est vt-  
 tendum. Veru his magis alui distillant, quae ex-  
 libet exportitur. Venter pueru subducat echin-  
 u marini, & concharu ostia atq; inuolunt gal-  
 linaceoru iuseula. Pance & melle prout fuit suc-  
 cu, stultitia, & diffusio: & oleo: Nam alui fluo-  
 rem impedit facit. Horreus lobis cibo ad  
 praetium crassu tantu, prout ostia sunt succu. Ex tra-  
 mentaceis cibis sola hordeu, tenuitanti victu est  
 immodu. Secundu hoc sunt panes clibanici, qui  
 extrinsecus sunt. A viliq; in viliu duntaxat censeo.  
 Ex picebus faxanlibus, montanisq; auculis, multu  
 copiosiusq; potes alime uti ad remanent victu  
 accommodare. Animalia liquidum quae in fragis  
 ac locis aquosis & campetribus degunt, humi-  
 diora sunt, atq; excrementisq; vero in monti-  
 bus viciu, omnia sunt tam fictiora, tum calidiora  
 ra tepere: eorlq; caro minimu pituitosa ac vici-  
 da exstet. Quare animalia omnia in montib; ad  
 viciu calidiora, multo lae quae in locis viciu plantis, sunt pra-  
 stantiora. Manduca etia sunt alicui ex, quae in tue-  
 ribus viciu agitur vici. Quare columba turri-  
 colae domesticis sunt meliores: tum etia pari mo-  
 do & apri, subus domesticis: atq; viciu summa di-  
 cam, omnia quae exerceant, iis quae viciu a cloaca  
 quae viciu siccioribus, iis quae humidioribus, viciu  
 & quae parat ac tenui acriu inspirat, iis quae co-  
 trarium, ad tenui viciu sunt praestanda. Etenim  
 suu domesticu: caro omnino aliorum ciboru fir-  
 missime nutrit: plurimum tamen habet lentioris.  
 Quod si le qui rale viciu requirit, sese multu ex-  
 ceat, licet et a auribus, & rostris, & pedibus  
 suillis viciu venter priore, & melle, si modo  
 ea elixa belle fuerint. Qui aut viciu in maiori  
 ocio degunt, ab viciu in furiu moderatis quibus  
 viciu, & picebus faxanlibus, ac breuius omnib;  
 quae carni habent simul mollem atq; friabilem.  
 Nam ab iis quae auribus habent, aur lentu, omni  
 no abstinendu est, nisi aliorum pementa nos  
 quidam rale esse copelat. Poteris melle, & melle  
 hum plicu pars maxima, tamen carni mollem  
 sortiantur, quod tamen fisco leno ac piceu  
 reddunt, quod viciu tenui vt voluit, plu-  
 rimu non est. Hirci aut & boves, carni quide  
 habebant friabilem, moderat tamen propter du-  
 ritiam; & in aliorum diffultat, ut sola car-



Vinea odorata  
sapor tentans,

Vinea affusa  
humiditate dulcis,  
aut profusa  
in thorace.

Vinea pancia.

lidiore, meritis caput tentant: quo circa virgunda  
sunt, qui cephalica, aut hemerantia, aut cepha  
lalgia, aut morbo comitiali, aut denique mania la  
borat. Affectus vero omnes thoracis ac pulmo  
nis, qui diuturni sunt, & sine febre infestant, à vi  
na huiusmodi luanantur mirè in modum, & pon  
tissimi qui humoris per spura expectoratione pur  
gantur. Si quidem quae vina sunt crassa & dulcia,  
propterea quod humiditatem possident crassam,  
& ob id perdurant, in thoracis ac pulmonis af  
fectibus, si cum tenuantibus medicamentis sum  
mantur, multum adferunt comodi. Verum nec acer  
biam, nec austeram, nec omnino alstringentem vim  
esse iussit oportet sed ad mellisam magis, odore  
guisui, & facultate, spectare ipsa expedit: ac tale  
sanè est quod Timolides dicitur. Porro vina Pon  
tica multum implent, ac tardè permittit, ambrosy  
excretionis morantur: tum eam quae sit per se  
dem, tum etiam quae per vesicam: harenam in hy  
pochondriis diutius inest & facile accendunt, nam  
seam provocant. Soli autem ventri fluenti con  
ferunt, idem si moderatè sumantur.

## GAL. DE PERGAMENI

de cognoscendis curandisq. animi affe

ctibus, liber unus.



Eccata quidem hominès à salu op  
nitione profecti sunt: affectus aut, si  
ue perturbations, à vi quadam ra  
tionis experte, quae minime rationi  
obtemperat. Etenim cernimus eun  
ctos homines existimare seipsos aut esse omni  
no sine peccato, aut paucis exiguisq. rebus recta  
ratione offendere: cum ab aliis forte omnium ha  
giniotissimis habeatur. Quicunq. igitur aliis per  
miserunt, ut de seipsis ferrent sententiam, ac iudica  
rent quales nam essent, eos in paucissimis aber  
rare solitos animaduerti. At qui cum seipsos opti  
mos existimarint, nec alius in dicitur sumptu facere  
permiserunt, hoc contra, & in maximis rebus,  
& in plurimis offendentes cõspexi. Quam obrem  
merito commendatur illud præceptum Pythii, quo  
subicit unusquisq. seipsum cognoscere. In tamè  
solus qui sapientissimus est, perfectè seipsum co  
gnoscere poterit reliquorum autè omnium, perfectè  
quidem nullus, alius autem alio, & magis & mi  
nus. Quod enim in vita vniuersa & in artibus  
omnibus cernimus, ut magnas quidem atq. infi  
gnes rerum eminetias dicentibusq. unusquisq.  
facile possit discernere: exiguas autè ac tenues,  
dumtaxat qui & prudentes sunt, & ipsarum ar  
tium: idem quidem in peccatis affectibusq. soler visu  
venire. Si quidem perturbationes maximas vni  
uersi facile deprehendunt: mediocres autè & leues  
& quae etià correctione desiderant (tamen si eas  
vitare propterea quod parue existunt, magis sit  
arduum) non item omnes agnoscunt. Quis igitur  
velut honestas atq. probas evadere, in cogita  
bit necesse esse, ut plurima à se peccata sua igno  
ratur. Nam cum duplicem anticum (ut ille Aescu  
paeus ait) collo suspensam geramus, vni qu  
idem ante pedes alienorum, alteram vero à tergo,  
nostrum criminum pleni: aliena sanè spectamus  
semper, propria autem cernere nunq. possumus.

Etenim quicquid amat, ut inquit Plato, rectè est  
erga eam rem, quam amat. Ac proinde si nobis  
quis seipsum omnium maxime diligit, unus  
quisq. nostrum erga seipsum maxime curat  
est necessarium. Quomodo igitur propria mala  
inspiciat, aut se peccantem intelligat? Si ante om  
nia se ab affectibus liberarit: quòd quidem pos  
est ab his non detento, semper falsa opinari. Sane  
autem animi affectus, quae omnia novimus, vel  
candescencia, ira, noster, avarus, invidia, vehementi  
cupiditas, ac deniq. alicuius rei excellentis amor,  
aut odium: Quare probe dictum est illud, men  
suram esse optimam: tanq. nil rectè fieri possit sine  
illa. Quomodo igitur quis istavniq. eiciat, nisi  
si prius ea se habere cognoverit? At vero ut quis co  
gnoscat, fieri non potest ob philosophiam. Si igitur  
ratio ubi haec non permittit, ut de seipsis iudicet  
se saluè verè alio, què neq. unum huius odium, ius  
dicium ferat, ubi non admittit potestatem. Cuius  
ergo audiam in urbe quempiam à multis laudari,  
quod nullis hominibus adolent: tunc ipse, ubi  
ad illam proprius accesserit, num sit talis, qualis  
vitiis perhibetur, huiusmodi periculù facit. Pri  
mò, si videas ab eo frequentari sedes magnatum,  
ac principum, non existimes illum fore verè rectum.  
Obsequia quippe istiusmodi, mendacium sequi  
cõsuevit. Deinde, si id genus hominès salutaris  
sem, sit illis seipsum comitem exhibentem, con  
tuitis illorum ac oculis ingerentè conspicias,  
non solè nò vtracumq. sed omnia etiam acqui  
tiae alumnus illum talem esse ne dubites: quip  
pe qui non pecuniarum, aut principum, aut glo  
riae, aut honoris cupiditate trahatur. Qui ven  
rò nec salutare, nec comitari id genus hominès,  
nec cum valde potentibus cõtinare, sed frugi ac  
temperato victu vii solitum indies magisq. cõni  
peretis, speraveris tibi vera dicturum, cõtare  
hunc quocq. profundius altiusq. cognoscere, ut  
feras cuiusmodi tandem sit vita: què cognovè  
es longiori cum eo cõsiderandine comparabile.  
Quòd si talem offenderis, quales ipsam fore spe  
fasti, seorsus aliquando hominè, rogàq. ut si què  
tibi ex illis animi affectibus turbulentiis sollicita  
te notaverit, continuò admoneat, iteq. illi maxi  
mam habitarè gratiam, existimaturumq. te ali  
ipso magis ferènti, quàm si corpore aggrorato  
sanasset. Quòd si ille recipiat se facturum, cum pri  
mum aliquo tali viro te laborantè inspexerit, ad  
deinde longo temporis intervallo interiecto, nò  
dixit, & oculis hominè, rogàq. iterum aliquan  
tò blandius q. prius, ut quicquid talium pertur  
bationum in te residere animaduertit, illico tibi  
significet. Qui si tibi responderit, propterea se ni  
hil tibi dixisse, quòd tali tempore nihil in te residi  
modi deprehenderit, ne ob id quidem continuò  
illi fidem adhibeas: neve existimes te repente o  
mnino evasisse inculpabilem, sed duorū alteri  
in causis esse, aut neglegentiorè amicum fuisse, aut  
illud redarguendi verè undia impedire, tacuisse,  
aut etiam non velle tibi in odium venire: eam bria  
ignarus sit omnibus (q. ut ita dicam) hominibus  
huc morè esse, ut eos odierint, qui vera loquuntur.  
Aut si nihil horū est, scito hominè propterea ta  
cere, quòd nolit tibi prodesse: aut ob aliud quip  
piam, nempe q. nò tibi obesse dèbita verè, què

Amant enim  
officiis, etiam  
comitem, quoniam  
amici  
Quos si quis  
amant, non  
indiget.

Affectus animi  
qua.

Philosophia.

Philosophia.

Philosophia.

Philosophia.

Philosophia.

Philosophia.

Philosophia.

Philosophia.

Philosophia.

Philosophia.

Philosophia.

Philosophia.

Philosophia.

Philosophia.

à te perpetuam agitentur id quod certe non prob-  
bo. Est autē sapiēs domino à peccato immūnis  
ac proinde philosophi, non hominē, sed Deo si-  
miliū sapiētē esse dixerunt. At tu repente Deo  
similis nunquam effici poteris. Ceterum si ei qui  
te reprehendit gratias egeris, post autē diligen-  
ter tecū expendas, verēne te ille, an falsō incre-  
pauerit, ex ea te sententia te magnē percipere vni-  
tatem. Si verō idem assidue egeris, tibi in omni-  
bus sit ad meliorem frugem te moris q̄ tuos compo-  
nere, faciliē absolutus et valens. Ceterū hac sit tibi  
exercitatio precipua, vt cumulatās & contum-  
elias ex quo animo ferās: quod vbi feceris, atq̄  
sedatus fueris, habuerisq̄ tuas perturbationes  
perfectas, tum aggreditor respondere calumnia  
toribus: quorū audis rationib⁹, quammiti-  
mē cum ea lites tuas cōponas: atq̄ ut rem omne  
agas, ac si pedagogus mox finē reddatur: ratio-  
nem. Porro si quis sit vel assequi potens, vel op-  
ulentus, qui velit ut vniū egregiū evadere, habe-  
re q̄ ad monitoris liberos, necesse est illi maiore  
statē relinquit his præsertim temporibus, ut qui  
bus nullus adest Diogenes, qui vel opulentis-  
simo Principi, vel alicui Monarchæ sit ipsam veri-  
tatē dicturus. Iam autē monitoribus duntaxat cre-  
dendum est, qui & inculpat sumē vixerint, & æ-  
tate provecti sunt. Cum autē nullus sine peccatis,  
aut sine affectu vivat, vel si optima quis natura  
sit præditus, sed necesse sit vniūq̄q̄ labi & er-  
rare in aliquibus, eodē etiam magis, quo iunior  
quispiā fuerit, laudabile quicq̄ nostrū exercita-  
tione per totā indiget vitā, vt vitæ perfectus red-  
datur. Nec tamen detereri quēpiam oportet,  
quo minus seipsum conetur meliōrē facere, etiā  
si iam factus scægenarius, sentiat sibi animū vi-  
tio immedicabili deformari. Nā tamen si nobis  
cōpertsū sit, animū nos nō posse sapiētē conse-  
qui (id quod fortē licet et si, si tēneris illū ex-  
coleremus) an salū ne totū illū omnino deforma-  
geramus, vt Tristes corpus, sedulō nobis cu-  
randum est. Etenim si supremā quispiā animi ex-  
cellentiā assequi haudquaquā posuit, ac certē  
post supremos illos sapiētes, in secundis, aut ter-  
tiis, aut quartis vt collocetur, id facere lōgiori tē-  
pore atq̄ assidua exercitacione poterit. Primo in-  
gitur sius erit, si neq̄ in deos male dicta iactabis,  
neq̄ calcibus feries, aut deūbus aggredieris la-  
pides, neq̄ cōterato vultu iutueberis, sed intra te  
ipsum cōtinebis, atq̄ occultabis iracundiā. Nam  
ab ira prius liberari simulac quis velit, nō cōti-  
nuo quis potest: cōprimere autē illius perturbat-  
ionis int̄perantiā, atq̄ insolentiā potest. Quod  
remediū si sepius quia vsurpaueris, agnoscat ill-  
dem adeo seipsum prius quā ante propellit  
ad irā, vt ne ob magnas quidē causas irasci pos-  
sit. Porro seruū ā me vniūq̄q̄ mea manu verbe-  
rātū fuisse, nō memini: id quod etiā pater meus  
perpetuo cauit, qui complures amicos increpare  
solitus erat, q̄ ferociter furebant in famulos. Id  
igitur quod in nobis est iracundiæ ac furoris, ratio-  
ne coercere atq̄ erudire oportet: erudire autē  
te exercitacione improba. Turpe enim est quēpi-  
am multos annos cōtinentē laborare, sterce-  
re, vt vel medicus, vel grāmatus fiat: vt autē  
in virū bonū evadat, in tanto curiculo rēporis

nunquam sibi quicquid laboris assumere. Ergo  
nec tuis ipsius manibus seipsum cedas, nec quan-  
diu iratus fueris, alij vt ad facias impēres, sed in  
postem differas. Postquam enim furor refrig-  
ratus fuerit, prudens, temperantijq̄ dispiciet,  
quorū vterib⁹, famulus plectendus sit dignus:  
nisi fortē melius esse videatur, immo statim con-  
cessa venia, negotiū ipsum transigere, & vbi lo-  
rum assertu iussus, tum verbis duntaxat corri-  
gere, militariq̄, te non amplius cōdonaturum,  
si rursus ille idem scelus portarit. Præter itaq̄  
te facere omnia que facis, vbi impetus ille ani-  
mi deserbuerit, quo tempore iam ratione optima-  
lante, punitionis modum sis innerturus: cum ni-  
mirum impetus irascentis nihil ab infania, vel d-  
furorē differat. Quamobrem si venterbus haud  
immiteris animi affectus hæc quinq̄ appellas  
fuerint timorē videlicet, ira, excandescētia, cu-  
piditas, merēsque. Singulis itaq̄ diebus acquie-  
re habere tunc in promptu opinionem oportet,  
quid præterit quidem vniūq̄q̄ se ex-  
hibere dignum, qui egregius ac frugi ab omni-  
bus appelletur: hoc autem fieri nō posse vt con-  
trigat nobis, nisi eum, qui singula præterit id-  
cet, ceterorū admonitorē inq̄ habuerimus: quem  
sanē ipsum nostrorū peccatorum iudicem, & ser-  
uatorem nostrum, & amicum nequimū existima-  
re convenit. Qui quidem & si tibi viliū fuerit il-  
liquidō falsis crimina obicere, ne ob id quod  
irasci oportet: & quod multo melius quā tu,  
ille singula peccata tua perspicere possit: & quod  
licet falsum quandoq̄ obicem in obicit, in eo  
tamen tibi sit viliū: quod te ad eorum que agis  
diligentiorē obseruationem excitet. Curabis  
autē temperatū, vt quā dignus sis, quā nily fa-  
ciendus, si te ipso, non ab alio, accipias habēsq̄  
in memoria semper, quantē sit eorum qui irasci-  
tur, deformitas animi, quā nily rursus vniūq̄  
eorum qui sine ira viuunt. Omnibus accendit  
tripsum potestatem facit, gratiāq̄ haberi nō  
adularibus, sed obisurgantibus potius. Præter  
autē semper domi cilij tui fores, vt liceat notis  
ac familiaribus omni tempore ingredi: cum sic  
affecto, atq̄ omnia int̄ facienti, verendum tibi  
non sit, ne ab ingreditibus aliquo magno scelerē  
implicatus deprehendaris. Volo itaq̄ vt non  
modo alios omnes, sed teipsum in primis etiam  
vetaris, illity auscultes qui dixit: Omnia autē  
maximē tui ipsius te pudent. Quod sanē si fecer-  
is, potes quandoque experiri illam rationis  
vim, qua excandescimus, quasi feram quādam  
reprimere, mansuifacereq̄. Vt autē longe turpi-  
simū est, hominem iracundiā percipitum in  
temperanter, aliquid agere, sic etiam ob amo-  
rem, vinū & crapulæ cupiditatem: que omnia  
facilitatim appetitorie sunt affectus & opē, ob  
que homo non iam equo vel canē, disciplinæ ca-  
pacibus, evadit similis, veluti ob illa prius, sed  
vel perulanti apro, vel lupo: vel cuiuspiā agre-  
ssu bellus, que mansuifecti non possit. Quocir-  
ca libidō hæc perducta ad obedientiam non po-  
test, quæ admodum illa poterit: castigari autē  
quodammodo potest, si rebus potiri ac frui præ-  
habetur, quarum appetens est. Nam si potiturus  
erit, mansuetus ac vellemior fit. Si castigetur,  
tenuis

Sapiens est om-  
nino à peccato  
immūnis.  
Sapiens Deo si-  
milis.

Contumelias  
est, quo ferus  
est animus.

Temporibus  
suis deplorat  
infelicitatem  
Galienus.

Exercitatio  
per totam vitā  
regneret, ut quā  
vitæ perfectus  
reddatur.

Iracundiā si  
non vincit, ac  
certi possit  
prius a nobis.

Galienus in ser-  
monibus  
suis.

ita vbi  
ita vbi

Favere refo-  
rmas pro-  
cedens  
dilecti ser-

Irasci in  
pauca noli  
ab infania  
differre.

Affectus animi  
quinq̄.

Irasci deorum  
deformis ac  
omnis.

Quisq̄ non a-  
liis malis sed  
seipsum etiam  
debet vitare.

Appetitorie fa-  
cilitate affe-  
ctus ac opē.

Libidō non red-  
dit similis be-  
lly aggressibus.  
Libidō qua na-  
tura castigari  
potest.

tenus atq; imbecilla redditur, ac sic imbecillitate coacta, nō vltro, ipsam rationē sequitur, vel vti quoddam mancipiū. Duplex itaq; in nobis est animi vis experta rationis: vna, cuius & citō ex-  
candescere & irasci est officium: altera, quæ ad id quod ipsi iucundum, suauēq; vñum sit, præcep-  
terat, antequam vñle ne sit atq; honestū, sū no-  
xum & turpe, cognoscit. Hinc igitur, quæ vehē-  
tissimā est, colubere actum oportet, priusq; ubi incrementū accepit, viribus inuictis iux-  
pugnabilēq; se exhibeat: tunc enim vel si vo-  
lueris, non poteris illam cōpescere, sed dices (qđ  
audiui olim quendam amantē) velle te quidē  
desuere, at nō posse. Quippe vt nōnulla corpo-  
ra vna propter magnitudinē insanabilis sunt:  
sic vis illa, cuius est temere cōcupiscere, plerūq;  
amore accenditur insanabilis, nō corporum mo-  
do quæ sunt formosæ, aut rerū quæ pertinet ad  
venetē, sed etiā crapulæ & vinolentiæ, itēq; ob-  
secratiōis quæ præter naturam potatur. Quæ  
ignitur de ira & exandescens vincenda dixi, e-  
adem puta de aliis affectibus me dixisse. Quæ o-  
mnia tibi sæpius reuocanda in memoriā sunt, qđ  
si nō posui tam crebrō, at salūtē maritimiū lora,  
semper anteq; aliquid eorū quæ acturus es aggre-  
deris, & vesperinis anteq; cubitū eas. Ego hui-  
dem cōsueui admonitiones has, prius quidem  
his legere singulis diebus, post verō etiam ore e-  
nunciare. Neg; autē si esse potius ab ira vna, dū  
taxat liberū te cōseruare, nisi etiā ab omni eda-  
citare, violentia, nequicia, ciuilitate, & inui-  
dia, te purū integriusq; cōserues. Nam nec pro-  
pter finem decet, forsuentū inuit, totum calicem  
exhaustū: nec propter famem in cōspēctū, om-  
niū, nō famabiliū ipsū ventrē explere, sed dan-  
da opera est, vt omnibus vbi cōcubitus, minus  
obsonij assuamur, & si cibis gulam nimis irri-  
tantibus abstinamus: moderate interim velle-  
tes vis, quæ salubris habetur. Progreſſu verō te  
ponis, ne respicere quidem te ad conuīantes ve-  
lim: (magnū quippe nō fuerit, si in cibo & po-  
tu illis cōninentior esse videris) verūm, si hoc  
honore te afficere decreuisti, cura sedulo, vt con-  
tinentius viuas hodie qđ ieri. Quod si feceris, sen-  
tentes haud dubie te indies ab us, quæ dixi, multo  
minori negotio abstinere: maximāq; perfundē-  
ris laetitia, si quando verus modestus, temperan-  
tixq; amator existeris. Sic enim gaudet, quicūq;  
in ea te promouetur, cuius amore fit grāt. Hic e-  
nim si ingrediamus viā, nō sams esse putabimur, si  
si pliusquam dissoluti homines consecuti simus  
modestæ, probatæ, & continentis: sed prius  
quidem eos qui hūc student virtutibus, superā-  
re conabimur. (est enim hæc concertatio atq; ex-  
amulatio pulcherrima) post verō, etiam si nō ipsas:  
idē memores semper pulcherrimorū dictōrū,  
quorū vel hoc in printis est vnum: Delige opti-  
mū virū genus, quod reddet cōsuetudo iucun-  
dum. Quemadmodum igitur cum te ad ver-  
sus iracundiæ exercere iubebam, rum argumen-  
to vti poteris, te aliquid proficisse, quod nō am-  
plius te excandescere temeres: ita in his quæ  
ad modestiam perueniunt, hoc indicio intelliges  
quantū profeceris, quod nō cupiderat quidem  
suauissimā rerum tangere. Ceterū ad mo-

destiam vna est via per cōtinentiam. Hoc siquidē  
idem modestus superat continentē, quod ille ne-  
cupit quidē amplius nullantes palari cibos. La-  
boriosa tamē ab imino via hæc est & aspera, quæ  
ad modū ceteræ omnes honestorū studiōrū ex-  
ercitationes. Verūm si pro malina cupis habere  
virtutē, ac pro voluptatibus corporis, tranquil-  
litate animi: per continentiam, ratione ne duc, ad  
modestiam cōtendas oportet. At verō & cōtē-  
ntia, & gloriæ, & principatus appenno, animi  
plane est affectus, licet illas iam dictus minor. De  
invidia autē quid ardeat dicere, cum omnī vbi  
vñorum ferdissimū? Est enim invidia, doloe ex  
alienis bonis conceptus. Sic itaq; id genus affec-  
tus omnes sunt dispungendi, vt ne radicē quē-  
dem eorū vllam in nostris animis relinquamus.  
Nam ex us quæ se relinquuntur, solet rursus alia  
quid pullulare, dum id ipsam in nequitia & prau-  
ritate irritatur. Porro d natura in pueri ætate ad  
vitam perficiendam, in cunctis plurimū potest:  
secundo autē loco, studij, exercitatioisq; disci-  
plinarū. Ceterū ipsa puerorū ingens plurimū  
inter se differunt, cum alia magis, alia minus vir-  
tutes ipsas scēlentur: omnia tamen sunt vel maxi-  
mē ad affectus propenā. Verūm educatio pue-  
rorum, similis quodammodo est sedulitati, qua in  
plannis alendi vñtur. Si quidem, vel si optimas  
se plantarū fator & cultor, nunquam tamē effi-  
cies, vt rubus vñs prodicat, quod natura illius  
talem a principio perfectiōnem capere nequeat.  
Rursus vites, quæ, quod ad ipsas primas, fructū  
ferre paratæ sunt, si negligenter, reliquerisq; soli  
naturæ curandas, aut multo deteriorē, aut plane  
nullum edere fructum animas dvertes. Mili autē  
ingenti quodam felicitate contingit, vt patrem ab  
omni iracundia alienum, iustissimū, frugalissimū,  
humanissimūq; haberem: at matre vñq;  
adeo iracundā, vt interdū etiam morderet ancil-  
las, sempitēq; & vociferaretur, & cum patre con-  
tenderet, idē longē quidē odiosius, quā Xan-  
tippe illa cum Socrate. Inter omnia porro admo-  
nebat me pater, vt si nulla scēta cognomen sume-  
rem: sed illas perpetuō artes ediscerem, per quas  
iustitiam, modestiam, animi magnitudinem, atq;  
prudentiam consequer. Laudati autem dice-  
bat mihi virtutes has cūctis, tametsi sibi ipsis sine  
cōsensu, nullam se harū habere: dñatq; opes pro  
virilū, vt aliis appereant fortes, modesti, iusti, &  
prudentes. Vt verō autē memoriis sinat atq; tristi-  
tie expertes, vel si minimē tales esse videatur, id  
magno studio continent. Quare etiā huic d me  
rei ut primis studendum esse, cui omnes mor-  
tales student, prius omnibus aliis virtutibus, vñ  
hoc querendum sinadebat. Quæ documenta pa-  
terna in hanc vñq; diem reuocans, nec vñus scēty  
nomenclaturæ me additi, neq; ob vñam fortu-  
næ vicissitudinē sui perturbatus animo. Quip-  
pe affuecit me pater gloriā & honorem cōtē-  
mentis, atque vñam tantum, eamq; vñam ve-  
ritatem suspicere. Quædebat etiā, ne ob vñam  
pecunie iacturā marore afficeret, quandiu quæ  
reliqua essent, ad curandum corpus sufficiere. Hunc  
enim prius finem illis quæ possiderentur,  
statuebat, non edurire, non algere, nō sitim pati:  
quod si cui plura suppetere, quā hominem vñus  
quis.

Animi vis ex-  
pertis rationis  
qđ duplex.

Cōcupiscibilis  
facilius in  
immoderatio.

Modestiam esse  
liberū & salu-  
tariū.

Conuentionem  
vñam esse  
habet quam  
habet.

Conuentionem  
vñam esse  
habet quam  
habet.

Conuentionem  
vñam esse  
habet quam  
habet.

Conuentionem  
vñam esse  
habet quam  
habet.

Viam ad mode-  
stiam esse vñam,  
per continentiam.  
Modestiam quā-  
dam rationem  
conuentionem  
supponit.  
Viam quā ad vit-  
tutem ducit  
est laboriosa.

Natura in pue-  
ri ætate quā-  
dam rationem  
conuentionem  
supponit.

Pater dicitur  
vñam esse  
habet quam  
habet.

Conuentionem  
vñam esse  
habet quam  
habet.

Conuentionem  
vñam esse  
habet quam  
habet.

Conuentionem  
vñam esse  
habet quam  
habet.

Conuentionem  
vñam esse  
habet quam  
habet.

Conuentionem  
vñam esse  
habet quam  
habet.

Conuentionem  
vñam esse  
habet quam  
habet.



populariis sanè ad eas res agendas, quæ honeste essent, esse vitandis censebat. Nec melatè (alebat ille) re fortunari plus duplo quàm ipse habeam, possiderè, in nostrisq; hac ciuitate nò mediocri honore esse prædicti: vique adeo vt quænam maioris tibi causa futura sit, nulli videt, præter inexplebilis ac summæ quandam cupiditatem. Comparabat autem insanabilem illam habendi libidinē, vocatam venericuli, quæ plus quam satis fit, ciborum ingeritur. Etenim cibo, vt dicebat, nulla alia causa egemus, nisi vt alamus corpus. Nutrit verò corpus, si bene concoctus fuerit: bene autem coquetur, si modicus. Nam si immodicus fuerit, concoctionē nò expectetur, sed vñs ipsius corruptetur. Siquidem aut deiectus per inferiora, profusione alui excitabitur: aut distributus per vniuersum corporis habitum, malum intra venas humorē gignet. Quæ igitur in corpore didici, ad animi licet transferas: cuius inexhausta cupiditas, plura perpetuò expetit, q̃ ipse vñs possidet, vnicuiq; omnis maioris atq; tristitiae est causa. Ea namq; accensio nònulla, qui præsentium rerum inexplebiles sunt, nunq̃ concupiscere desinūt, sed si duplum quippiam habeant, triplū illic student acquirere. Triplū nacti, quadruplum appetere incipiūt. Qui quidem nunq̃ sibi proponunt eos, qui pauciores possident: sed illos tantum, qui plura: quos enīl superare consuevit. Quamq; certè multo satius est ciuem in eo ceteris antecellere, quòd his quæ nunc habear, vt omnino còtentus: id quod certè (dicebat pater) in tua manu est. Contrā, diuitiis præstare, nò virtutis, sed fortune munus existit, quæ plerumq; seruos atq; liberos facit longe diuiores nobis, qui & generosi, & nobiles appellamur. Quòd si tu quoq; in nostra repub. reperiūt pauci diuiores) quantū opus aliquando assequaris, hoc est, vt plus vniuersis possideas ciuib; ne sic quidē satis sis habiturus: sed illic circumspectis, num quis in alia ciuitate sit diuior: quem quidem si superaueris, tibi obsecundante fortuna, ad alias progredieris nationes, & his q̃ apud illas opulentos offenderis, fieri opulētiore còtendes. Quare nunq̃ tu sanè omnibus diuior, sed propter immentas cupiditates, semper futurus es pauper. Quòd si ipso vñs rerū metieris id quod modulo tuo respondeat, iam te ipsum vñs ex diuinibus numeraueris: aut salte ex eis, qui eo quod opus est abvndent: etisq; quatenus ad rationē pecuniarū spectat, beatus, cum earū causā minimè futurus sis tristis. Si verò etiā illa, quæ ad honores appetendos pertinet, insanabilitatē exploseris, hac quoq; parte iucundè ac sine molestia vitam ipsam traduces. Sin autem nbi non fatis fuerit honorari ab iis, qui tua consuetudine vtantur, sed velis ab omnibus omnino qui sunt in ciuitate laudari, etiam ab illis scilicet à quibus ignorans prorsus: fortasse primū quidem ab iis ipsis cognosci voles: tum autē, vbi cognitus fueris, suspici. At illud quidem, velle cognosci ab omnibus, ab immensa quadam proficietur gloriæ cupiditate: hoc autē quod est, velle honorari & suspici, ab inani planè & stulta ambitione. Quocirca nbi necesse erit, vt nec pecuniis querendis invigilanti, sic tunc ad gloriæ honorisq; studiū

cupidinē intēdenti, ob illos qui cū plures sint te neq; cognoscunt, neq; honorabunt, maiori q̃ nonne tristitia & dolore affici. Si igitur in his semper nos exercuerimus, iam exploratū habentes, insanabilitatem vitium esse animi pessimū, fundamentūq; omnī cupiditatum, pecuniæ, gloriæ, honorum, principatus, & còtentionis, haud dubiè citra omnem molestiam viuemus. Qui enim sua sorte contentus fuerit, is omni merore ac tristitia carebit. Quis autem nolit omnē iratam citra merorem transigere? aut quis nò hoc omnibus præposuerit? mobilibus, imò verò sceleratis diuinis? Ille igitur hæc & alia multa mihi & aliis quam verissimè pronuntiabat. Turpe siquidem est libertatem eam, quæ humanis legibus accepta reperitur, maximi facere: eam autem quæ & verè, & natura ipsa est libertas, non omni studio venari, sed in honestis, impuris, atq; tyrannicis dominis inferuire, lucris videlicet, minutissimisq; quibusq; pecuniariis rationibus, ac principatus, gloriæ, honorisq; ambiosis cupiditatibus. Quorū sanè omnī matrē ego haud dubitauerim dicere, inexplebilē habendi libidinē. Quis igitur talem in animo pectem habēs, possit vnquā aut honestus, aut probus evadere? aut cur nò mille firmitatibus dignus, qui nò toto animo talem turpitudinē oderit? Porro autē hanc ipsam multo magis & odisse & fugere debent adolescentes, quæ saluos esse velint. Nam si fortè intro assueuerunt pecuniā insanabiliter cupere, fieri iam certè non poterit, vt cū ad annum pervenerint quadragesimū, seipsos reciperent. Ceterū tamen difficile atq; arduum videatur, adolēcentes ipsos in principio sese liberare ab affectibus, progressu tamen temptationis omnia faciliora redderent. Quò enim maius rationalis nostri animi pars in huiuscemodi exercitationibus ac studiis incrementū acciperit, eò perfectiorem obediētis labebit. Nam cū ea quæ maxima sunt, ratio nondum exercitata pervicerit, minimè dubium est, quin vbi duplicem excellentiam indecepto spacio temporis fuerit, sit multo facilius superatura: quippe ex eo quòd iam sese exercuerit, evasent multo generosior quàm antea: proindeq; sic abvnde sufficere exterminandis affectibus, iam enī iam imbecillitatis redditus.

### GALENI PERGAMENI de consuetudine, liber vñs.



Vod consuetudinis ratio ad inventionem eorum quæ sanitati conducunt, magnam sibi viderant facultatem, non modò Hippocrates, sed Erasistratus enī professus est: quill quidem negligentes medici, interdum egros q̃ miserimè iugularunt: vt in Ario Peripatenco factitatum fuisse videtur, qui cū gracilis natura esset, & os ventriculi frigidissimum fortiretur, ita vt vel ex leuissima refrigeratione singultu statim competeret, ob idq; nunquā fuisse aut sus aquam gustare, tandē febri occupatus, à medicisq; præter consuetudinem eorumq; potu rigide: vñ, subito fuit quidem exanimatus. Aliis vero

Insanabilis est fundementum cupiditatum. Cautius fac forte qui fuerit, qui fuerit tristitia.

Adolēcentes & fortiusque assueuerunt pecuniā insanabiliter cupere, fieri iam possit, vt cū ad annum pervenerint quadragesimū, seipsos recipiant.

Rationem per experientiam iudici reddere non possumus.

Arim Peripateticum fuit infirma moderata extioflow.

Galeni opuscula.

Inexplebilis habendi libidinis cupiditatis insanabilis venericuli.

Cupiditatem est vitium in animo mori, atq; tristitia causam.

Diuitis profectio, nò virtutis, sed fortune munus existit.

Galeni opuscula.

Velle cognosci ab omnibus, velle profectio est. Velle honorari ab omnibus, velle ambitione.



verò contrà, nisi auctacter potius is propinetur, periculum sane est, ne excidantur celeritè. Sôc enim quibuscûq; aliquis peculiariter ex propria natura, aliudq; alimentum alij corpori accommodatur. Ob idiq; animalia ipsa absque vlla disciplina, sed tracta à natura, ad ea pabula accedunt, quæ sibi magis sunt familiaria: sumpta nimis ad iherbas, forum, paleas, & hordeum: ad carnes verò, tum leones, tum lupi. Vt autem nò parus in animalibus iuxta varia genera propriorū alimentorum reperitur differentia, sic in eodem etiam genere multa inter sunt atq; magna discrimina. Nam multa sunt quæ vinum (exempli gratia) ne gustare quidem possunt, quod tamē ab alijs plurimum sine vlla modestia bibitur: ac de cæteris quidem pari iudicio. Soli quippe homines alia alijs audis mandere, pro sua nature ratione, quodd videlicet alia ipsi faciliora concoctū videantur: contrà verò quæ gustū sunt ingrata, ta gere & fastidire, tanq̃ ea quæ ab ipsis concoqui nequeant. Et igitur hic consuetudo ipsa signum naturalis cuiusdā proprietatis. Sed quodd ea innum quā sit etiā illius causa, hinc liquidd constat, quodd aliquib; verū quardā vīus inter initia ingratus & noxiu cdm sit, vbi paulatim assueverint, iam ea illis neq; amplius ingratu, neq; noxia redduntur. Nam vt vnu quidd corū quæ vel comeduntur, vel bibuntur, alteratur secundū qualitatē: ita & ipsum quoq; id à quo alteratur, quoquomodo afficitur. Quodd autem simulind quodd sit inter ea quæ alunt, & illa quæ aluntur, tum semina, tum plantæ, eisdem argumentō esse possunt, quæ ita sepiusmē alterantur & transmutantur, vt quæ in vno loco solet esse exilis, ad aliu transiit, maxime cōseruetia reddantur. Iam verò vt corpus cibo & potu immutatur, sic etiā quæ extrinsecus occurrunt nobis, quæq; nō minus cōsuetudini inserviant. Primi igitur refrigerantibus rebus cutis ipsa colligitur: dein cæteri partee quæ illi proxime sunt, donec ad profundiores alteratio ipsa perveniat: Idq; primò & perfè. Nam per accidens, calor in collectus corpore, cutē densat præ frigore, increscit. At ve rō sicvt causa refrigerans chimo di alterationes invehit, sic calefaciens, istis contrarias. Cæterum ab vna & eadem causa sepe contraria fiunt. Soli quidd inter initia, dum nos calefacit, fundit humores, cutem lenit, carnemq; reddit molliorem. Si quis tamen æstivo tempore plunbus diebus nudus sub eo sit diuersatius, illi tum cutis, tum caro, dura aridaq; reddetur: id quodd nō est calor solius, sed siccitati etiam illi annexæ opes. Porro balnea dulciori aquarum calefacient nos & humectant, quodd calori habent humorem cōiunctum. Quare necessum est nos nonnisi, aliam quiddem esse rationē caloris humidū, aliam verò siccū. Cæteri corpus rariū & molle facile ab extrinsecis iniurijs afficitur: durum autē multo facilius eas tolerat, ægermendq; ab illis labefactur, ad quæ etiam patienti faciliatē & dyspanti, consuetudo nō exiguam vim obtnet. Quodd verò ad exercitia pertinet, exercitæ particule fortiores pariter & solidiores redduntur, ac proinde motiones suas obire ac ferre, q̃ ceteris, longe facilius possunt: quæ, quodd exercicio caruunt, mol-

les atq; languide existunt. Eodem etiā animi exercitationes spectant, quibus exerceri solemus: primū quidem grāmaticis rudimentis, dum sumus pueri: mox rhetorici, geometrici, arithmetici, logicisq; theorematibus. Cum enim facultates illæ, quæ ad animi principem vim spectat, ad omnes vires pernecessariæ sint, quard altera quiddem cognoscimus quidd consequens, quidd verè repugnans ei, altera verò memores sumus: à primā sentē id habemus, vt sapientiores simus: à secundā autē, vt magis memores. Eam tamen naturam hæ facultates habent, vt exercitatione vires indispensantur & crescant: octo atq; linguae, ac minuat: id quodd discretissimè explicuit Plato in Timæo, secutus Hippocratem, qui vīum robur addere, ocium verò dissolvere pronūciat. Verūm ipsi exercitationibus, sicuti & cibo, & potui, vigilantijs & veneri, mensura congrua adhibenda est, quæ rem ipsam neq; vitā quālibet sit, prostrahat, neq; etiam de illa adimit. Quia ex cæcis dissoluitur vires: defectus verò tantum de vilitate detrahunt, quantum ipsi & restā mentis, va deficiūt. Facultates itaq; nostræ robur sibi comparant, si moderatīs congruentib; exercitijs fouentur. Atq; hæ quiddem sunt consuetudinū differentie, quæ materiem in quib; illæ consistunt, & quib; fiunt, desumpræ. At vacuatio nes non dēcentur corporibus ob cōsuetudinē aliquam, quemadmodum Erasistratus existimauit: sed ob causam quæ illas possulat. Sunt quiddem qui ex malo victu, sunt qui ex praua corporis affectione sanguine plurimū, aut viscosos humores aggregant: quos plurimum luare solet, tūm aut à natura, aut à medico, quodd reddendū, antequam in morbum labantur, detrahatur: quodd remedio toties vniatur, quōtūcūq; aut morbum præsentem vident, aut cum advenire præsentunt: adeo vt talis mēdendi ratio sit consuetudinem illis esse versā videtur.

## GAL. PERG. DE CONSVETVDINE LIB.

de tuenda sanitate liber.

primus.



Vm vna sit ars, quæ etiam humanū corpus versari, eius primæ ac maximæ partes sunt duæ: quæ sunt altera sanitatis tuendæ, altera morbi profigandi facultas est. Ac sunt qui

dem officia eorū contraria: illi quippe tuenti huic immutare statum corporis, est propositum. Quoniam autē & dignitate & tempore sanitas tuendū præcedit, vtiq; & nos: quiddem modo hæ seruanda sit, prius tractare conuenit: post hæc, quo pacto commodissimè sit abigendus morbus. Vtuisq; facultatis in veniendā cōmūis ratio est, vt quiddam ex corporis affectib; sit, quæ huius dicitur, huiusq; cōstet: quando quiddem nō præsentē seruare, nec amissam restituere, si cum peccatis ignoscis, sicut. At similariū partū sanitas, valdi, singuli, humidi, & siccū pyrametia est. Instrumentalis verò, ex similitudine ipsarū compositione, numero, magnitudine, & figura cōstat. Quare quicquid hæc cōmōde tueri possit, & optimus sanitatis cultor fuerit. Tuebitur hæc, qui modon

Animalia naturaliter ad ea pabula accedere, quæ illis magis sunt familiaria.

Consuetudo est feruor natura in cuiusdā proprietate, atq; animi interio causa.

Medicamentum vt alteratur, sic etiam quicquid alteratur id quodd non trahit. Similiter licet esse inter ea quæ alunt, & illa quæ aluntur.

Calor internus ex accidentibus inficit, cutē refrigerat. Contraria sepe vni ab vna eademq; causa.

Balnea dulcia calefacient nos & humectant.

Corpus rariū. Corpus durū. Consuetudo ad dissipandum humorem vni obstat.

Exercitia partium robore fortiora & solidiora.

Exercitia in animi liberalibus studiis.

Intellectus, Memoria.

Humiditas facilius excutitur: siccitas vitiis dissipatur. Ceterum vni longior sunt, vt morbum huiusmodi te esse medica.

Excessus dissolutio, nimis.

Excessus, nimis. Excessus, nimis. Excessus, nimis.

Excessus, nimis. Excessus, nimis. Excessus, nimis.

Excessus, nimis. Excessus, nimis. Excessus, nimis.

Excessus, nimis. Excessus, nimis. Excessus, nimis.

Excessus, nimis. Excessus, nimis. Excessus, nimis.

Excessus, nimis. Excessus, nimis. Excessus, nimis.

Excessus, nimis. Excessus, nimis. Excessus, nimis.

Excessus, nimis. Excessus, nimis. Excessus, nimis.

Excessus, nimis. Excessus, nimis. Excessus, nimis.

Excessus, nimis. Excessus, nimis. Excessus, nimis.

*Lactis corruptio: corpus, generis duplicis esse videtur.*

*Primordia nostra generatio: non esse sanguinem, & genitalis semen: illa sanguinem materiam, hoc spiritum rationis obtinent.*

*Semen esse ipsi sanguine fieri.*

*Sentientia illa mensura sunt in qua & terra, & aqua materiam suam capiunt: si ad vitium, nostra generatio: ista principium.*

*Semini corruptio deorsum.*

*Corruptio in terram: duplicis esse videtur: non enim necessarium.*

*Animalis vita: per se perpetua fore videtur.*

*Animantium rationis esse indicium: quia illi vires, desideria ac desideria apparent.*

omnes quibus videntur, cōpertos prius habuerit. Sanē quæ corpus nostrū ledūt cōiunguntq; ea sunt genere duplicia: altera nobiscū congenita, & quæ evitari nequeat, quæq; ex ipsa generationis principis oriuntur: altera, quæ & deducere possis, & orta à nobis nō sunt, sed aliunde perveniunt: quæ tamen nō minus q̃ illa corpus nostrū cōficiūt. Et primum sanguis, semēq; generale, generationis nostre primordia sunt: illa, cū materies quædam apta hoc opus rationē obtinent. Constat horū vitiumq; ex iisdem genere elementis, nempe calido, frigido, humido, & sicco. Ceterū in semine plus est ignis subtilitatis, & ære: in sanguine aquei, terre: quāq; præ pollet in hoc quoq; calidum frigido, & humidū sicco. Semen itaq; in sanguine fictus est, et si ipsum quoq; humidum atq; fluxile. Quare in obis vitiumq; ex humida subtilitate generis origo proficitur. Hanc autē siccat oportuit ad generationem ficcatū particulāri, elemento nempe facultate siccatū præditi cōfluente illuc liberius. Siccat autē cum ignis, cum terra. Ex illo tamen ad vitiumq; principii maior cōfluxus copia, ut scilicet cum siccatē abunde, cum calore suo ad motiones agilitatem præstaret. Ab hoc quidē primum cogitur atq; cōcretat fetus. Mox siccor redditur, veluti lineamenta quædam cuiusq; membri oblinei. Vitiū verō succicent, exactam vniuersūq; speciem ostendit: tandem in lucem editus, magnitudine augetur, succiorq; & valentior vitq; ad summum incrementū efficitur. Quo tempore vniuersa membra, non solum robusta & integra sunt, sed vires suas etiam summas fortissimè. In eo verō quod sequitur tempore, omnibus iam partibus supra iustum succicentibus, nō solum cuiusq; officii munus probe administratur, sed etiam corpus ipsum macilentius, gracilius, atq; rugosius redditur, artūsq; omnes invalidi, atq; ad moros suos pigrī & incontinentes cernitur. Quæ affectio appellatur senilis, ipsi marcori plantarū, proveniunt ob siccatē excessum, quædam proportionē respondentē. Vna igitur hæc est omni-generi corpori corruptela, intensiq; connata necessitas. Altera autē, quæ præcipuè in ipsa animalibus cernitur, totius substatne fluxor, quæ insensu calor excitat. Hæc itaq; in cōmodā, nullura quod generi sit corpus effugere potest. Reliqua quæ hæc sequuntur, & quæ ad victus rationē pertinent, providētia cōsilioq; certè potest. Neq; enim his aliunde origo est, q̃ ipsi iam ductis in cōmodis corrigendis atq; faciendis. Nam cū tota moles animalium in perpetuo fluxore sit, in similibus altera subtilitā pro ea quæ defluxit, restituta fuerit, evaporabitur certè, dissipabiturq; vniuersa. Idcirco natura non modo animalibus, sed stirpibus etiam, insensis quædam vires, deficientes ac desideratæ semper apparet, ita ut ab initio induit. Cibo igitur, qui quid siccorū subtilitā efficit, restituiturque portione, quicquid humidioris. Ita verō & ære igneque substantiæ modum, respiratio, ætherumque pulsus tucmur. Necessè autē est, ex his omnibus colligi excrementorū proveniā, cū nimirū his quæ effluxerunt, prorsus similia non sint, sed varias mutationes alterantēq; paul-

quis aseruitentur, possulent. Cū igitur effluibereq; necessaria animalibus sint, has autem res generatio excrementorum sequatur, natura non solum eis excrementa insinuat organa, verumetiam organa ipsa facultates insinuat, quibus in cistis, quædam ad se trahunt, quædam alius transmittunt, quædam omnino expellunt ipsa excrementa. Porro hæc, quod semper ruindum corpus ipsum seruetur, nec obstrui aliquatenus, nec ad proprias functiones imbecilla esse oportet. Atq; ita geminū iam scopi salubris viciū sermo nostro exposuit: alterū eius quod exhaustum est reficiendū, alterū excrementa expellendū. Nam ternis, quæ huc spectant, ne animal præpropere senescat, duos iam ductos necessariō comitatur. Ex se itaq; duplici ratione cōsumitur corpus: & quod vel gratis cursu, vel assiduō suo re ad interitum tendat: & quod etiam excrementorum copia obstruat. Eorum verō quæ extrinsecus incidunt, vnum certè est, quod ab eo separari nō potest, sed perpetuō illi veluti cognatum adhæret, & ipse ambiens. Alia nec necessariō, & in certis temporibus nobis accedunt. Aer igitur circumfusor nō lædit, calidos immodicè, vel frigidos, vel humidos, vel siccos efficiens. Hæc, quod cōtundant, divellant, vulnere, articuloq; aliquem sua sede dimoveant. Est autem sanitas, haud quidem absolutè ipsorū elementorum, sed duntaxat partū similitudinē temperamenti cōmoderatum. Quemadmodū & instrumentū talis sanitas, in figura, numero, magnitudine, & compositione & similitudine consistit. Porro habiti sanitatis discernimus, ex functionibus secundum naturam obitā in ipsaq; latitudinem sanitatis, sanitas quædā optima, cōsummatariq; existit: quædam veluti recedens ab hac, nec ita planè absoluta, quæ & ipsa suam etiam nec parvam latitudinem habet. Nam cum sanitas symmetria quædam existat, symmetria autem omnis duplici ratione dicitur: aut enim veluti summa & perfectā, aut tanquā à perfectione hac deficiens paululum: vitq; & sanitatis symmetria similiter duplex est, hæc quædā absoluta & optima, illa paulo recedens ab hac, nō tamen cæteus, ut animal sit gravis. Quemadmodū igitur corpus aliud magis, aliud minus album cernitur: ita quod sanum dicimus, magis minusq; tale esse mihi videtur quod ex mutatione terrarum atq; actionū diversitate licet planè colligere. Siquidem cū ipsæ actiones quæ debite respondent temperaturæ, corporisq; constitutioni (quæ sanitas est) sint vni nec cessariū profecto est, ut temperaturæ atq; constitutiones hominū, sit sanitates etiā varias & diversas existere, secundū maiora minorūq; rationē. Non itaq; absoluta illa raritas, quæ insectis est, simul est & dicitur sanitas, sed etiā quæ ab hac deficit, & in qua nec doloribus cruciamur, nec vires actionibus impediuntur. Sed nec functionū imbecillitas, morbi statim est notā, nisi adiciat, quæ præter naturam cuiusq; sit. Nam vit sanitas est naturalis affectio actionem perficiens, & in morbus affectio præter naturam, impediens actionem. Quare nō omnis affectus secundum naturam, cōtra nō etiā sanitas erit. Siquidem Aegyptiorum nigritas, licet naturalis affectus

*Excrementa per unum viciū in quibus duces facultates insinuat: utque naturæ.*

*Salubris viciū geminū sit.*

*Corpus re si duplicis ratione cōsumitur. Aerem ambire non esse viciū ingratū corpori.*

*Sanitas similitudo corporis quædam. Sanitas instrumenti in quo bene constituit. Compositione habiti sanitate discernimus, ex functionibus secundum naturam obitā in ipsaq; latitudinem sanitatis, sanitas quædā optima, cōsummatariq; existit. Sanitatis veluti recedens ab hac, nec ita planè absoluta, quæ & ipsa suam etiam nec parvam latitudinem habet. Nam cum sanitas symmetria quædam existat, symmetria autem omnis duplici ratione dicitur: aut enim veluti summa & perfectā, aut tanquā à perfectione hac deficiens paululum: vitq; & sanitatis symmetria similiter duplex est, hæc quædā absoluta & optima, illa paulo recedens ab hac, nō tamen cæteus, ut animal sit gravis. Quemadmodū igitur corpus aliud magis, aliud minus album cernitur: ita quod sanum dicimus, magis minusq; tale esse mihi videtur quod ex mutatione terrarum atq; actionū diversitate licet planè colligere. Siquidem cū ipsæ actiones quæ debite respondent temperaturæ, corporisq; constitutioni (quæ sanitas est) sint vni nec cessariū profecto est, ut temperaturæ atq; constitutiones hominū, sit sanitates etiā varias & diversas existere, secundū maiora minorūq; rationē. Non itaq; absoluta illa raritas, quæ insectis est, simul est & dicitur sanitas, sed etiā quæ ab hac deficit, & in qua nec doloribus cruciamur, nec vires actionibus impediuntur. Sed nec functionū imbecillitas, morbi statim est notā, nisi adiciat, quæ præter naturam cuiusq; sit. Nam vit sanitas est naturalis affectio actionem perficiens, & in morbus affectio præter naturam, impediens actionem. Quare nō omnis affectus secundum naturam, cōtra nō etiā sanitas erit. Siquidem Aegyptiorum nigritas, licet naturalis affectus*

*Imbecillitas functionis, non præter naturam sit non est indicium morbi.*

*Sanitas hominum esse diversā.*

affectus sit, nō tamen dicitur sanitas, cūm ea minime in colore consistat. Neq; si præter naturam aliquis affectus se habeat, propterea morbus est: alioquin morbus esset nigredo ex insolatu contracta. Permagis autem itaq; haberi sanitas latitudinem consistat, nec eam in nobis omnibus æqualiter profus inesse. Iudicabimus autē ipsam eurasiam & dyscrasiam, in quibus sanitas & morbus consistunt, vnius sensus opera: is siquidem ad omnia vitæ munia vbiq; nobis est iudex. Quare actionis vitium, non antè pronuntiabimus morbum, quā ad sensibilem pervenerit magnitudinem. Porro actiones ipse, constitutiones corporis necessario sequuntur, eam quæ proba est, inculpatæ probæq;: quæ contrā est, culpabiles ac vitiosæ. Ac proinde nihil refert insensentiarū, si quis in genere functionū, aut constitutionū, sanitatē & morbū collocet: modō intelligat, in naturali constitutione corporis illa maxime seruanda esse, quorū beneficio obtineant functiones: & quod similitū quidem partū eurasiam, instrumentū autē forma, positura, numerus, & magnitudo, causæ existunt functionum: quodq; hæc omnia spectentur in latitudine quadam. At verō diuersitatem eurasie in corporibus sanis, ex extraneis ad amissum cognoscens, cūm nimirū ad omnes volitantes actiones adulescenti ætas q̄ aptissima sit, inceptor autē infans & senum, propterea quod humor in illis, in his siccitas frigidiore nimis abvndet. Quāq; certē in functionibus, naturalibus, in sanisq; ætas cæteris omnibus antecellit. Neq; tamē eo secius omnib; per omnes ætates licet esse sanis. Et quæ admodū in ætatibus sese habet, ita etiā in naturis eorū immensam esse differentia temperamentorum invenies. Quibuscunq; igitur corporibus multo supra iustū caliditas, frigiditas, humiditas, aut siccitas esse cōgigit, is planē optima temperies nō est. In quibus autem ab eo quod absolutissimē temperatū est, diuersitas quædam intelligitur, minor tamen q̄ quæ sensu discerni possit, hæc certē, p̄ absolutissimas accipimus: ita vt sanitas, quā in latitudine contemplamur, hæc quidem mediū temperamenti sit, nec vlli vitio obnoxia, quod saltem sensu percipiamur: hæc cū intertemperata, vitiōq; exposita. Quocirca illi quī inculpatū diximus, exactā absolutūq; debetur custodia: alteri quæ vitio nō caret, haud ita exactā. Quippe in temperies quæ intra sanitatis consistunt terminos, ita corrigere oportet, vt per contraria reducatur ad moderatū temperamentū. Scv̄ti igitur nec nimis gracile corpus probamus, nec qd valde est obesum: ita nec temperamentū eorū, à quibus videlicet habitudines id genus oriuntur, planē laudabimus, tamētī vt vniq; maximē sanū esse cōspiciamus. Sed quæ in medio lorū habitudinis sunt, & quæp̄ Græci dicunt, scv̄ti ipse debiram partium convenientiam, speciemq; inculpatam habent: ita id totū cōuenientiū laudabilisq; temperamenti beneficio acceptū ferunt. Ceterū ne tales quidem corporū habitus absoluta exactiq; temperie duxerit temperatos: quod omnquam eodem in statu permaneat: licet secundū sensum, & quatenus ad vsum sit satis, nō inculpatibiles modō, sed etiā optimos eos esse censueris.

Est autem optima corporis constitutio, si substantiam eius spectes, & quæ optimo temperamento sit, & quæ figuram partium, omnemq; tum numerum, tum magnitudinē, tum omnium earū, inter se contexturam, ad functiones egregie comparatam habet. Si verō indicia notariq; respicias, cuius corpus carnis mediocritatem præfert, atq; secundum singulas partes, in medio excessuum omnium libenter, pulcherrimū simul & cōmoderatū existens. Huius ergo sortis homo, si statim vbi edatus est in lucē, arti sanitatis ruendæ educandus tradatur, erit vniq; fortunatissimus. Sic namq; ad animi quōq; affectus nonnulli lucrificet, ipsa nimirū recta victus ratio mores quoque probos reddente. Ergo recens is natus infansulus, cuius corporis constitutio omni nota vacat, primum quidem fasciis deligetur, sed corpori prius non sale modicē insperio, quō cutis eius densior solidiorq; sit quæ intus sunt partibus reddatur, vt resiliat faciliē muiari extrinsecus. Vbi verō involutus iam fuerit, lacte pro alimentō vtatur, & balneis salubrib; aquarū. Vniuersam namq; victus rationē, humidū sibi adhiberi postulat, vt quī cæteris extraneis temperamento sit humidior. Id quod senēs Hippocrates, aut, humidam omnē victus rationē feberricantibus esse vtilē, præcipiē verū puellis, & is qui tali refici vult sunt assueti: vbi à morbo quidem contrariū adhibendi indicatiō accipit: ab ætate & consuetudine similitū. Quæ enim corpora secundum naturā se habent, us custodiū suum habitū deest: quæ aliquo morbo premuntur, his contrā, alterant & ad contrarium trahi habitū expedit. Ac seruatur quidem similitudo vnumquodq; alteratur contrariis. Si itaq; nulla præter naturam humiditas subit, pro naturæ ratione alendi, ac dulciū aquarum balneis humectandi sunt puelli. Nam sulphureæ, bituminosæ, aluminosæq; aquæ, planē omnes siccant. Cū igitur sanguine in vtero alii nos coolect, ex sanguine autem exiguum in mamillis mutatiōne perpeffo gignatur lac, erit vniq; lac maternū non modō alimentum consuetū, sed etiam maximē propriū cunctis infansibus, ac præcipuē optimē temperato: quippe cuius maternū non corpus modō totum, sed etiam lac, à vitio esse alienū non sit ab simile. Tribus autē remediis nutrices ipso vsu edoēt mulcere solent infantes, dū aut offendunt, aut plorant: nempe ipsa papilla ori induta, motu medicari, necnon vocis modulatione. Quibus non solum eos mitigant, sed etiam somnum conciliat: vel hoc ipso resistente natura, ad miscent eos & exercitia suapte esse ingenio propensos. Aded quicquid his artibus probe vt sciet, is corpus & animam optimē instruet. Nutricibus porro triplex infansibus excoGITATA dimotio est: in cunis, in pendensibus lectulis, in suis ipsarum vlnis: totidemq; in vniuersum notantur etiā prima exercitatio nam genera. Quippe aut à nobis ipsa mouemur, aut ab aliis, aut medicamento. Horum tamen tria species, ad sanos nequaq; pertinet. Sed qui ab altero præstat moris, nauigando, equitando, vehendo, atq; in cunis, lectulis, & vlnis obitur. Recens tamē nō ti puellā, tam valentē motū, quā et quī vehiculis, nauigis equiue

Sanis videretur  
non esse curam  
sed & dyscrasiam.

Adhuc si quis  
non insensentiarū  
non curam.

Insensentiarū  
causa quæ nascitur.

Adulescenti  
si quædamque  
non ad omnes  
volitantes actiones  
aptissima.

Insensentiarū  
autē habitus  
naturalis  
in functionibus  
naturalibus  
maxime, quoniam  
multoque altior.

Sanitas est  
duplex: una  
temperamentum,  
altera vel vitio  
expulsa.

Sanitas vniuersa  
pauca conformata  
est: quæ  
non caret  
reducta de  
contraria est  
ad moderatū  
temperamentū.

Enferari.

Optima corporis  
constitutio,  
quæ dicitur,

Mores reddi  
probus à recta  
victus ratione.

Insensentiarū  
edammodo ratio.

Insensentiarū,  
primū quidem  
involuitur, lacte  
esse insensentiarū.

Lac.

Balneis.

Humida  
victus ratio  
quæ  
conuenit.

Corpora  
secundum  
naturā se  
habentia  
seruanda  
esse  
aliquo  
morbo  
premutur.

Similitudo  
sanitatis  
quæ  
aliteratur  
per  
contraria.

Quæ  
sanguine  
in  
vtero  
alitur.

Lac  
fecit  
esse  
sanum.

Lac  
familiare  
alimentum  
infansibus.

Infantes  
multū  
de  
radio  
trahunt.

Insensentiarū  
naturā  
propensā  
esse  
ad  
miseriam  
atq; contrariā.

Insensentiarū  
motū  
excoGITATUM  
dimotio.

ExcoGITATUM  
dimotio  
trahitur  
a  
radio.

præstatur, adhuc non desiderant. At qui iam tertium aut quartum annū agunt, in vehiculo, nauigiorū modicè agitari licet. Septennēs verò, iam equare assuecunt. Ac per se tum primū pueris moueri licet, cum iam repere ceperunt, magisq; etiā cū ingredi. Immaturè autem cogendi omnino nō sunt, ne pondere crura eorum vitentur. Sanè vel hac re facile declaratur, quanta sit nature nostræ cum exercitiis societas: cū pueros, nec si cōduseris loco aliquo, prohibeas quo minus discurrant, ac pīllorum vitulorumq; modo lasciuant. Quippe sua cuiq; animam naturæ satis est ad proprias convenientiq; excitandas appetitiones, quibus sanitatem tueatur.

*Puelli curare sint immaturi cogendi ad mortem. Natura nostra cum exercitiis habetur magna necessitudo.*

*Puelli optimo præditi temperis habitum, animi quoq; moris acutissimi sunt.*

*Seruari quid sit idem generis ac quib. et præcipitur. Mori animi quo corruptio te soleant.*

*Caloris naturalis infusum de nata.*

*Dietæ ratione ter quorū malorum existant causa.*

*Morbi admodum languidi quoque efficiant.*

*Infantes non edunt in vitiis mentis animi motum, carere dunt.*

*Infantes quibus de causis plerumq; immundo animal delectatur. Mediū semper expectant, in relatione ad aliud.*

per est numero, quæ in collatione ad aliud spectantur. Eum igitur qui curam infantie educandi suscipiet, ac rem mediocritatis, convenientiq; consuetorem esse oportet. Hæc autem omnia, vix in tertium à natali annum, circa puerū peragenda censio: in primis de nutrice ipsa nō minimam habendam esse curam, quid edat, quid bibat, quo pacto in somno, venere, & exercitatione se habeat, vt videlicet lac eius egregiè sit temperatū, quale certè erit, si sanguis eius quam optimus sit. Sanguis porro sit optimus, si modica exercitatione, & cibis tum boni succi, tum iusto tempore modicè assumptis: præterea potione temperatā, modicèq; assumpta. A venere omnino abstinendam esse, quæcumq; lac prebebit, moneo. Nam & menses sui consuetudine prouocantur, & lac odoris grauiam in deterius mutat. Quinetiam aliquæ concipiunt in vtero, quo alienas à puello adhuc lactente nihil est: cum quicquid sanguinis optimum est, absumatur in fœtū. Quare vbi mater concepit, vel aliquo morbo est affecta, alia nutrix est inuenienda: cuius lac gustu, odoratu, visuq; explorandum est diligenter. Siquidem quod optimum est, id gustatū, olfactūq; planè suauē, inuenti candidum, & quæle, ac medium liquidi crassiq; apparebit. Quod vitiōsum est, è diuerso tum crassum & caesiosum, aut liquidum & ferosum ac lauidū, tum consistentiā ipsā, colorq; iniquabile nobis videbitur. Idem gustantibus amarorem, aut salcedinem, aut qualiteratē quampiam extraneam exhibebit. Nute vero nec olfactū suauē erit. Atq; lactis probi improbitū linee sunt indicia. Puellum autem ipsūm primò quidem solo lacte nutrire: at vbi primores dentes emiserit, tum si hodiō quodammodo iam cibū assuefacere conuenit. Corpus autem infantis conficere oportet oleo dulci, idq; posteaquā vniuersum lac accuratè concoctū fuerit: alioqui alimentō crudō vniuersū corpus replebitur. Quare post longissimum somnū fricandi occasio captanda est. Maiorum tamen puerorum, qui parere plagis & minus norūt, iis duplex tum fricandi, tum lauandi temporis occasio est. Prior ac cōmodior, cum à materno somno surrexerint, deinde luserint, ac iam cibum petant. Quod si quā occupatione, qui puellum alit, auocet, modico panis præbitō, ludere permittat quantum velit. Dein cum rursus cibum petierit, tum fricat, lanctq;. Muni-

*Nutrix vitiata ratione quodlibet infans non fovendam esse.*

*Sanguis optimus à quibus duntaxat. Veneris inter ceteros naturæ, quod ab ea ceteris ad procreandum grauiam.*

*Nutricem grandem esse in utero, quod in lacte infans.*

*Lactis optimi nota.*

*Lactis vitiōsi nota.*

*Infans primò quidem solo lacte nutrire. Postea vbi dentes emiserit, tum si hodiō quodammodo iam cibū assuefacere conuenit.*

*Corpus autem infantis conficere oportet oleo dulci, idq; posteaquā vniuersum lac accuratè concoctū fuerit.*

*Infans post longissimum somnū fricandi occasio captanda est.*

*Maiorum tamen puerorum, qui parere plagis & minus norūt, iis duplex tum fricandi, tum lauandi temporis occasio est.*

*Prior ac cōmodior, cum à materno somno surrexerint, deinde luserint, ac iam cibum petant.*

*Quod si quā occupatione, qui puellum alit, auocet, modico panis præbitō, ludere permittat quantum velit.*

*Dein cum rursus cibum petierit, tum fricat, lanctq;.*

*Muni-*

*tem tamen bibere ei permittendum post cibum est, quem balneum excipit: quando ita præcipitator eorum quæ ventriculus cōtinet, distributio in corpus fiet, id quod in corporibus profusis sanis canendum est. Præterit autē semper, vt in nobis proposito puello, balneum cibū sequatur. Nam quibus vitulis est ante balneum cibum dedisse, horū planè improbande habitudines sunt. Ceterū nec Germanis, nec hominib; duntaxat aliis agrestibus, licet dōcūmēta prodimus, nō magis q̃ apriis & vrsis, sed Græcis, & iis qui eorum emulsiū studia. Nam quibus obsecro nō rūtulerit, modō edūt in lucem infansulum, atq; ab vtero calentem, ad flumen deferri, ibiq; (sicut fieri apud Germanos aient) cru candens ferrum, in frigidum humore submergi, vt & roboretur corpus,*

Causa quatuor  
autem sunt de  
dentibus.

Pueri iam ha-  
biti ad latus  
reddunt, quia  
peragunt.  
Pueri optimi  
temperata cur  
in uterodentem  
sic vena.  
Venaque cur na  
adultis quide  
nisi modici pro  
ponendum sit.  
Venaque ad  
quod velle.

Pueri potius fri-  
gida et cibo ut  
commoda.  
Aqua optima,  
omnis qualita-  
te ut expet.  
Aquaque dif-  
ferentia.

Aere differen-  
tia.

Aere qualita-  
tem tempera-  
tis quidem na-  
tura tempera-  
tam aut con-  
stantem requirit.  
Pueri secundum  
spem naturam in  
vitiis tempera-  
mentum.

Educatio opti-  
ma pueri con-  
sistit in duobus.  
Primum est  
plena paratio.  
Pueri marci per  
facilem esse ter-  
tium spem.  
Vultus dicitur  
saluberrime de-  
bitus esse ad ne-  
que commu-  
nitate sed ad  
gros corporales.

corpus, & periculū de vigore illius sumatur. Pre-  
stat itaque nec adeo denicare cutem, vt corporis  
transpiratū prohibeat: nec rasefacere ita, vt facie  
le à qualibet extrinsecus incidenti occasione lae-  
datur. Corpus autē propolū nobis puelli, me-  
dium excessus omnis existit: Aut vero cūm mēti-  
iam is in ludum est habilis, non necesse est ali-  
quid praeterca balneis vri, sed interim cūm lucta-  
ri conducit, medio critet iustib; ante cibum exerce-  
ri sat erit, ac balneo plerumq; abstinere. Vinū fa-  
ne quādiūnissimū quē ea natura puer est, ne gu-  
stare quidem suaserim, quod humectet nimis &  
calcificat corpus, caputq; halitu repleat. Quare  
nec iam adultis vinū, nisi modicum sumptū, est vi-  
le: quod videlicet ad iram & libidinem praecipue  
facit, & partem animae rationalem, liebetem  
atq; turbidam reddit. quāq; his ipsis ad bilis ex-  
crementa vel mingenda vel expellenda, est sanē  
nō inuitū: non minimē verō ad eam siccitatem,  
quae in solidis partibus aut ex immodicis labori-  
bus, aut ex proprio temperamento provenit.  
Iam puellis pono frigidū, ac praecipue à cibo &  
per calores, non incommoda est. Aqua tamen son-  
tana & recens alius est preferenda. Quae autē o-  
mnium optima est, ea penitus nō gustui modū,  
verumetiam olfactui, omnis qualitatē expers  
videbitur: eritq; iucunda gustui, & celeriter per-  
transibit praecordia. Porro quae aqua ex petra cō-  
tra septentrionē fluit, solēmq; avertim habet, x-  
grē quidem concoquitur, ac tardi trāitus est, tar-  
dēq; incalcescit, atq; refrigeratur, Cuius ad orien-  
tem solem erumpit fontis, quaeq; per terram pa-  
ram colatur, eadem calēsca refrigeratur ocysui  
mē, omniq; atq; vtilissima est. Idem de aere etis  
est iudicandum: quem optimum, hoc est, pun-  
tissimū, in pulmones trahere, omnibus iuxta sa-  
lubre est. Nam impurus aer, omni atq; aduersa-  
tur. At verō quae ex calore, frigore, siccitate, lu-  
miditateq; diuersitas aēnis coningit, nō perin-  
de se ad omnes homines habet: sed corporibus  
quae optimo temperamento sunt, etiam optimē  
temperatus aer est saluberrimus. In quibus verō  
aliqua exuperans qualitas dominatur, iis vtilis-  
simus aer est, qui ei qualitati pari gradu aduersa-  
tur. Porro vbi puer iam est secundū septennii in-  
gressus, calidum est, eodem gradu quo prius, illi  
temperamentū: humidū verō nō eodem, quan-  
doquidem omne animans ab ipso statim ortu,  
siccus indies efficitur. Cui igitur optimi status  
corpus coningit, is ad quārtumdecimū vsq; an-  
num iam traditum viciū rationē obferuet, mo-  
do semper exercitiū seruato. Lauetur autē calida  
potius q̄ gelida, vt qui nondū hanc: citra noxam  
perterunt: adhibeantq; illi educatio optima, q̄  
probris consuetudinibus, & grauib; disciplinis  
paratur. A secundo autem septennio vsq; ad ex-  
pletum tertium, liebet ibi ad robustissimū cor-  
poris habitum provehere hominē, aut instrue-  
re iis animi dotibus quae ad sciētiā, sapientiāq;  
pertinent. Non est tamen eadem vrobisq; victus  
rano. Atq; hac maxime etate perfici abfoluūq; cō-  
uenit, quae spectant ad mores. Vt aliquis autē in  
longissimū prolata vita, etiam bona valetudine  
perpetuū vtatur, is liber oportet sit ab omni ne-  
gocio publico, nimirū sibi viuens duntaxat, so-

lūp indulgens corpufculo. Etenim immortale  
fieri quod geturum est, plantē non potest: vt verō  
in longum perduret tempus, id maxime fieri po-  
test. Nam qui optimū sortitus est corporis habi-  
tum, si ab omnibus quae ad publicum in vita spe-  
ctant, secedat, sibiq; tantū vacet, nec morbo vi-  
lo quoad fieri poterit inquam tentabitur, neq; an-  
te longissimū vitae tempus morte occupabitur.  
Cāterū cūm huic tali edendum, bibendumq;  
sit, ad reparanda quae ex corpore effluunt, necesse  
vitiū est, excernendorum liabeat rationē. In pri-  
mis igitur excrementum à sincero separatur, &  
paulatim impellitur per omnia intestina, vsque  
ad rectum vocatū: ad culus exitum musculi quā-  
dam inserti sunt, qui ipsum, ne immaturē effluat,  
coarctent. Postea verō quā plurimū congestum  
iam graue animalis fuerit, tum foras agi sūit, ad  
celeritatem emissiois etiam abdominis muscu-  
lis vni cum transverso septo adiuvantibus. Ieci-  
nonis excrementorū aliud est, quale quod florē  
in vino appellant: aliud, quale quod fixū dicitur.  
Attrahitur alterum à vesicula quae iecinori sub-  
ditur, alterū à lēse. In his collecta excernuntur;  
alterum in pnoem intestini tenuioris partem,  
alterum in ventriculū, ab hisq; per omnia in-  
testina permeant. Quod autē in venis & arteriis  
excrementū accretur, eiusmodi planē est, quale  
in lacte concreto serum. Hoc renes à sanguine  
secerant, ad vesicam transmittunt. Cuius col-  
lo transuersus etiam musculus inest: quo arcta-  
to supprimitur, laxato emittitur loniū, ad id con-  
ferentibus etiam abdominis musculis. Reliquū  
excrementū genus in singulis animalis nasci-  
tur partibus, ex ipso vnde aluntur succo. Huic ex-  
cremento nullus certus à natura praescriptus me-  
tus est: expellitur tamen partim per ipsa molliora  
corpora, ac partim per sudorē, partim per la-  
tentem trāspiratū discuntur. Sed in hoc peristū  
insensibili, etis crassioris excrementi nōnullū ex-  
cernitur, à quo tum pili, tum ipsius cutis sordes  
gignuntur. Cūm igitur etis omnia excrementa  
haec oportet, expedit arbitror primum nouisse,  
quibus maxime causis remouentur: dein ratio-  
nem hui, qua nec in ipsis incidatur: ac si quan-  
do inciditur, q̄primū error corrigatur. Atque  
ne incidatur quidem, hunc licet assequamur, vti-  
que si excreta ab vnde sint, nec ne, compertū ha-  
buerimus. Porro iis quae in ventre continentur  
excrementis mora cōtingit, aut ipsius cibi potio-  
nisue culpa, aut ipsius ventriculi vni cum inte-  
stinis. Et cibi quidem potionisq; vitio, aut pro-  
pter qualitatem eorum, aut quantitatem, aut pro-  
pter ordinē, vtrendū modum. Et propter quali-  
tatem quidem, si acerba, austera, aut sicet naturae  
fuerint: propter quantitatem, si iusto plura aut  
pauciora sint assumpta. Ordinis culpa, si quae sic-  
ca, astringentia sunt, primo: quae humida, pin-  
guia & dulcia, secundo exlibentur loco. Modi  
viciū ratione, si cūm bis fuerit edendum, totum se-  
mel sumptum. Quae ventris aut intestinorū vi-  
tium sequitur excrementorū mora, vel ob natu-  
ralē eorū affectum accidit, vel certē acquiriturū.  
Ac quae quidem naturae eorū vitiū causa pro-  
ueniunt, ex prauis corporis habitibus aliquid sunt.  
Recentiū autē ventris affectionū acquiriturū,

Excrementū à  
sincero separatur,  
si ferreus, quo  
modo fiat.  
Masculi cupu-  
litas excernunt  
totū sūuū.

Bili flena in  
excreta intesti-  
nā excernuntur.  
Atra bila à bo-  
ne in ventrem  
lum mictur,  
Venaque secer-  
ni à sanguine,  
perentes, in  
vesicā demittit.  
Culo viciū  
mouetur.

Excrementū  
qua in singulis  
excrementis par-  
tibus, etis ad  
da non ferre  
aliquem certū  
metum à na-  
tura praescri-  
ptum.  
Pili tum graui-  
tate.

Excrementa ad  
no supprimi  
quibus de cau-  
si possunt.

Affectiones v-  
tri atque  
varum, differe-  
ntia ossis.

Interpret ven-  
tri a quibus  
signantur.

Flava bilis ven-  
tri a quibus  
causis posuit.

Anghia vasi-  
rum vnde cau-  
sa posuit.

Affectiones sic-  
carum vnde cau-  
sa posuit.

Interpret vasi-  
culum partem  
angustiam a quibus  
supponit posuit.

Meatus lene-  
tes quibus par-  
tibus sunt tribu-  
ta, ad excremen-  
ta excreta. Cerebrum autem  
domicilium plurimum cau-  
alibus expurga-  
tur.

Oculi quod par-  
te expurgantur.

Interpret vasi-  
culum excre-  
mentorum cau-  
sa, citius a-  
lia sunt adhi-  
benda.

Exercitia quod  
probit cibum  
& medicamen-  
ta tenuioribus.

Ossis sunt differentie: quarum nemp simpliciter,  
intemperantes, tondemq coposita: a quibus ma-  
ximè in ualecentibus, in ualida potest reddi ex-  
pulsit facultas cum ventris, tum omnium intes-  
tinorum. Creatur porro eiusmodi intemperies,  
aut a cibo & potione, quibus vis infirmicoma-  
lis: aut a vino aëris ambientis, aut a lauacro, aut  
ab vitione, aut deniq ab aliare, quæ extrinse-  
cus ventri adlitterens, cum alterandi vim pos-  
sident. His igitur de causis excrementum ventris  
suppeditur. At si illic bilis excrementum mora-  
tur, aut propter attrahentis expellennive facul-  
tatis infirmitatem, aut propter valorum quibus  
deducitur atq excremitur angustiam. Porro in-  
firmitas tum vesiculæ torius quæ subiciitur he-  
pati, tum eorū meatū qui ab ea in iecur subeū,  
tum eorum quibus in intestinum evomitur bilis,  
ex recenti provenire potest intemperantia. An-  
gustia verò vasorum, aut phlegmonia vitiō fit, aut  
propter curthos, aut obstructionē, aut circum-  
sacientū partū innixū, aut oscillorū cōnientū.  
Iam ipsa proximarū partium cōpressio, aut pro-  
pter immodicam copiam eorum quæ in se conti-  
nent, aut propter phlegmonē aut scirrhū acci-  
dit. Acque & oscillorum cōnientie, aut pro-  
pter horum quicq, aut siccitate. Siccitatē con-  
ciliant & quæ valenter asfringunt, & quæ partim  
calfaciunt & siccant. Ad eundem modū atræ bilis  
excrementū aliqūdo sūstetur, si lien quidem  
propornone respōdeat bilem excipienti vesicæ: 10  
venā verò quæ a porta iecoris in ipsum infertur,  
vasū illis quæ excrementū biliosum attrahunt:  
atq ea deniq vena quæ ex liene in ventriculū fer-  
tur, proportionē etiā respōdeat meatui illi qui  
excremit bilem. At excrementū quod per singu-  
las cōgeritur animalis particulæ, & copia sua, &  
crassitudine, & prætereā lentore remoratur. Ad-  
hæc, ob imbecillitatem caloris, transitūq angus-  
tiam. Sunt tamē partes quæ præter latētes me-  
atus, alios quōdam patentes atq conspicuos ob-  
tinent, vt cerebrū, & oculus idip aut ob principa-  
tum particulæ, aut propter actiōnē exquisitius  
eundam, aut propter continentū corporum  
spissitudinē. Est namq cerebrū rationalis animæ  
ceū domicilū: quod cum offe solido vudiq se-  
ptum sit, plurimū maximisq canalibus expurga-  
tur: primum per nares & palatum, secundū per  
vitrang aurem, tertio per calur cōmisuras. Nec  
ab simile est etiā aliqūd ab eo cōbuerē ad oculo-  
s. Oculi verò ipse per evidētes meatus eūcit 50  
quicquid in eo excrementū gignitur, idip iuxta na-  
res & genas. Illud autem cōmune omnū excre-  
mentorū sit documentum, vt retentionis causæ,  
contrariā semper causam admo ueas. Vt, exem-  
pligratia, si ex comestorum paucitate & siccitate  
restricta alius sit, plura & humidiora exlubebis:  
ac sic de cæteris. Obstruēta quippe sunt apertēda:  
intemperata reducenda per cōtraria ad natu-  
ralē temperiē: sicuti & quæ crassa & viscidā sunt,  
inci deūda, tenuatoria viciū ratione, ac præci- 60  
puē exercitiis, quæ tam cibis q̃ medicamentis  
renuantibus ranē præstant, quantū sanus est nullo  
corporis nostri labitus in cōmodo exigi quæ  
redvndat, q̃ pariter & carne liquida, & solidis ex-  
teuandis. In his autē tribus primis generib, cō-

sistit sanitatis tuende studiū, atque ac mēdendi  
methodus: nemp corporibus, causis, & signis.  
Corporib. quidē, si quæ & sanū iam sunt, & eo  
statu seruari debēt. Signis verò, corporū acciden-  
tibus, ex quibus ipsa corpora dignoscūtur. Causis  
sunt, ex quib. custodia sanitatis perficitur. Harū  
materiā quatuor generib. iuniorū, pbatisimū  
sunt cōplex: admo uendus, educendus, facendus,  
extrinsecus incidentib. Sanius tamē fortasse fue-  
rit admo uendus, educēdis, facendus, & incidenti-  
bus, alterari immutariq corpus dicere. Mura-  
tionē verò aut in qualitate fieri, aut in quantita-  
te. In qualitate, dum aut malecūct, aut refrigera-  
tur, aut siccificat, aut humectū redditur. In quan-  
tate, dum altius aut numitur. Iam inanitionem  
ipsam duplicē quocq esse, alteram excremento-  
rum, alterā naturalis substantiæ nostri, assidue  
deductā, quæ nutritiois ex aduerso opponitur.  
Porro alimentū est secundum Hippocratē, tri-  
plex. Aliud enim est nutritius, aliud veluti na-  
trientiū, aliud quod nutriturū est. Quarū dis-  
tinctionem primū, ipsius substantiæ fluorem opo-  
nas rectē. Secundæ autem, tum hemorrhagi-  
am, tum omnem faugūis inanitionem. Terti-  
æ deniq lientemā & vomitum. Iamq m hoc  
loco primum commentariū claudamus.

## GALENI PERGAMENI de sanitatis tuenda, lib. II.

Proponatur nobis in hoc cōmentario salu-  
bertimæ naturæ puer, qui iam tertii ætatis  
sux septennū ingreditur: cuius corpus es-  
singeret quoad fieri potest q̃ optime, propōsum  
sit. Cum autem vt corpus ipsorum plurimum numero-  
sa diuersitas est, ita vitæ ratioium quibus viuamus,  
sunt specēs diuersæ: fieri nequit sanē, vt  
qualibet propōsita vita absolutē optimam corpo-  
ris nostri curam exhibeas, sed eam tantūm  
quæ cuiq optima sit. Quare omnibus iis qui aut  
seruitute, aut enā impediti negotiis, corpori cu-  
rando vacare nequeunt, opūmā prorsus corpo-  
ris curam facipisse, supervacanea fuerit. Is  
autem qui omni modo liberam vitam degunt,  
præcipiē fas est, quemadmodum victū sint  
solicitq & diuersimē. Porro quod simplex in-  
culpatūq in omni genere est, id cæteris omni-  
bus cū regula quædā præponi postulat. Ac si-  
plex inculpatūq in corporib, quidem est quod  
optimo est labitur: in vitæ generibus, quod om-  
nino liberū est. Primū igitur hoc libro duo hæc  
coniuncta tractemus. Itaq in optimæ notæ pue-  
ro, qui tertii septennū ingressus est, ac vni corpo-  
ris curæ vacat, labor cibum præcedat, sicuti  
mediocria omnia, labor scilicet, cibus, potio, som-  
nus, & venus, quemadmodum rectē monuit  
Hippocratē. Quāq̃ certē venus, quæ somnum  
debet excipere, tantū florenti est, vniq quæ tem-  
pore etiā eius est vita. Quæ autē hanc vel præ-  
cedunt, vel sequuntur ætates, aut pluriē semen-  
non effundunt, aut certē infundunt, aut malē  
fecundunt. Porro labores ipsa appellatio, idem  
muli significare videtur, cū cōmuni exercitatio-  
nis appellatione. At nō quisvis motus exercita-  
tio videtur, sed tantū qui vehemētior est. Quoniam  
autem

Sanitas tuenda  
de studiū, ac  
methodū, nemp  
corporibus, causis,  
signis. Corporib.  
quidē, si quæ &  
sanū iam sunt, &  
eo statu seruari  
debēt. Signis verò,  
corporū acciden-  
tibus, ex quibus  
ipsa corpora dig-  
noscūtur. Causis  
sunt, ex quib.  
custodia sanitatis  
perficitur. Harū  
materiā quatuor  
generib. iuniorū,  
pbatisimū sunt  
cōplex: admo uen-  
dus, educendus,  
facendus, extrinse-  
cus incidentib.  
Sanius tamē for-  
tasse fuerit admo  
uendus, educēdis,  
facendus, & in-  
cidentibus, alterari  
immutariq corpus  
dicere. Mutationē  
verò aut in quali-  
tate fieri, aut in  
quantitate. In  
qualitate, dum  
aut malecūct, aut  
refrigeratur, aut  
siccificatur, aut  
humectū redditur.  
In quantitate,  
dum altius aut  
numitur. Iam  
inanitionem ipsam  
duplicē quocq  
esse, alteram ex-  
crementorum,  
alterā naturalis  
substantiæ nostri,  
assidue deductā,  
quæ nutritiois ex  
aduerso opponitur.

Alimentum tri-  
plex, secundum  
Hippocratē.

Inculpatūm  
quod in omni  
genere est, præ  
poni cæteris cū  
regula debet.

Labor cibum  
præcedat.  
Mediocria debe-  
re esse omnia.  
Venus, quæ so-  
mum debet ex-  
cipere, tantū  
florenti est  
exercitatio.

Motus veluti  
exercitatio, de-  
bet exercitatio-  
nis appellatione.



autem eorum quæ ad aliquid dicuntur, est quod vehementius, dicitur, fieri potest, ut idem motus alteri sit exercitio, alteri non sit. Tenuius igitur vehementer est alteratio respirationis: quando in quibus nulla sit respirationis mutatio, hos nondum exercitationis vocamus. Sunt autem exercitationis duplicia commoda: hæc quidem ad excrementorum inaniitionem, illa ad solidarum partium bonam habitudinem conferentia. Nam quoniam vehementior motus exercitatio est, infirmamentorum duritiem, genuina caloris augmentum, & spiritus valentiores motum necessitudo inducit. At ex infirmamentorum duritia sequitur ad labores robur & remittentia: ex calore, distributio validior, immutatio expeditior, nutritio absolutior, omniūque corporū fusio, ob quam solida mollescent, humida tenuantur, exigui meatu laxiores fiunt. Sed ex valentiori spiritus impetu, & purgari hos omnes meatus necesse est, & excrementa expelli. Quoniam autem exercitatio digestiōem in corpus adiuvat, non debet, cum administrabitur, quæ cruditas, aut multitudo faccorum, vel in ventre, vel in vasis consistere. Quoniam verò & exiguo meatu expurgat, & excrementa expellit, viduus est ante cibum eam administrare. Siquidem quæ impura corpora sunt, atque ab excrementis parum purgata, hæc quod magis nutrit, magis lædes. Quare tunc ad exercitationem commodissimum tempus est, cum hæsternus cibis duplici concoctione iam prorsus consumectus fuerit, & ea quæ in ventriculo, & ea quæ in vasis sanguinis agitur, ac iam denuo cibandi tempus inflet. Quod si prius aut posterius exercitatione utare, aut crudis humoribus hominem impleueris, aut pallidæ bilis proventum auxeris. Atque huiusce temporis nota, color est vrinæ. Quæ enim aquæ speciem præfert, crudum adhuc in venis esse indicat succū qui à ventre submittitur. Quæ verò rufa, bilisq; est, iam dudum concoctum esse huiusmodi succum. Quæ modice pallet, peractæ modò secundæ concoctionis est signum. Cum namq; bili infecta vrina nondū est, aquæ speciem alborēque præfert: cum verò plus iusto eiua bilis acceperit, rufa cernitur. Ergo cum mediocriter est rufa, mediocriterve pallens, tum est exercitatio adeunda: sed expulsi prius excrementis, quæ vel in vesica, vel in inferioribus intestinis continentur, ac paribus solidis molli frictione sensim concassatis, crassiusq; tenuatis humoribus, necnon reclusis per exigui meatus, ne vel excrementis repleta vriniuersus corporis habitus, vel rumpatur aliqua pars ex solidis, vel prædicti obturētur meatus. Oportet itaque, ubi lincollo suauiter perfunditur sic calceare rostri corpus, vt floridus quidam rubor per totam eius cutem fundatur, oleo tandem ipsum subligere: id quod nunquam tentandum est, priusquam incalcescat cutis, & laxentur eius meatus. Venitio autem ipsa fieri nudis manibus debet, ac mediū, inter mollem & durum, modum servatibus: infricandūque primum a contrectatione & blanda, inde & sensim paulo fortius, donec caro manifeste circa conuulsionem prematur, adeoque vniuersum corpus legitime compactum esse videatur. Haudquaquam tamen tam valida frictione

diu vtendum, sed semel aut bis in quaq; parte, ne eius pueri corpus dureret, exicetariue, quod feruare in medio temperamēto est animus. At procedente tempore, ubi iam adolefcit, tum dolore frictione vitetur, ac præterea frigida ab exercitando laetatione. In preparatoria verò illa autē exercitium frictione, quæ huic spectat, vt corpus molliat, molliis duritq; mediū qualitatem dominari oportet, ac pro eiusdem qualitatē ratione, compleri singula. Vix autem quāmaximè ex manuum iniectione circumactūq; frictiones esse debebunt, quō vniuerse musculorum fibrae, omni ex parte sintentur, nec superne modò decorsum, aut inferne sursum adhiberi, sed etiam tum in subrectum, tum in obliquum, tum in transuersum, tum in subtransuersum. Quas quidem differentias frictionum, dicere ex hac figura licebit



Dura porro frictione ligari corpus, molli solui, multa extenuari, mediocri crassescere, autor est nobis Hippocrates. Quæ differentia quatuor ex quaduplici omnis frictionis tum virtute, tum viū oriuntur. Quod si medias quoque harū annuere, sex in vniuersum differentia existunt. Iam verò mollem frictionem necessario consequitur vt corpora emolliat: sicut duram, vt impingat indurētq; illa. Si igitur dura ligandi, molliis soluendi vim habet: quæ supra modum soluta corpora sunt, ea duntaxat planè fricanda sunt: contrarij quæ cōstricta sunt, molliet. Quæ modice se habent, manifestus est ea nec molliet nec duriet, sed mediocriter esse fricanda. Sicut verò in iis differentia quæ in qualitate spēctantur, non solum dura molliisq; consistunt, sed etiam media, ita & in iis quæ ex quantitate ducuntur non solum multa, & pauca, sed etiam media internotescunt. Cur autem in iis differentia quæ ex qualitate trahuntur, omiserit mediā Hippocrates: in iis verò quæ ex quantitate, exiguum, iam dicam. Cum enim ex contrarietibus, aliquid quidem in frictionum genere (vt dura & molliis, multa & pauca) alix in affectum qui ab iis proventum, necessarii consistant, vt colligatio & solutio, grauitas & crassitudo: ac prior quidem affectum contrarietas, ex priori frictionis contrarietate nascitur: secunda autem non item (evenit enim in hac, vt grauitas proveniat ex multa, carnis incrementū ex mediocri frictione: quando quidem pauca augenda carni non sufficit, sed exci-

T lii

Exercitationis terminus sit ad totius respirationem.

Exercitationis duplicia commoda.

Caloris opera.

Exercitari, si alij crediderint, aut humorem plantarum, carbo non debet. Exercitatio curatur cibum ad ministranda. Impura corpora quoque magis nutrit, et magis lædes. Exercitationis commodissimum tempus.

Vrina inter ista per cunctas aperit indicat. Vrina alba indicat cruditatem. Vrina rufa quod indicat, Vrina modice pallida quod indicat.

Exercitium esse aduicandum prius alio ex vicia soluit, necnon solida partibus, modo frictione concassata.

Olus post frictionem manibus, paulatim aff.

Vasica.

Postea quædam non esse debet.

Frictionum varietas.

Frictionum differentiarum ratio.

Frictionum differentia.

Contrarietas alia in frictionum genere, alia in affectu qui ab iis proventum consistunt.



Frictiones vi-  
les differentes  
cor differentes  
Hippocrates  
cibus affectu  
cibus adhibet.

tando calori modico, id quod aliis commune est omnibus) ob id nimium secundum affectuum contrarietates, seu longe viliores ut, quæ in frictionibus spectantur, ipsarum frictionum distinctiviles differentias Hippocrates. Meminit itaque duræ, mollis, multæ, & mediocri frictionis; subterea ceteras, quod ab his corpus in contrarias affectiones ducatur: quodq; vna cum ipsis pronus se promittit, tum media eorum opera, tum ea quæ per coniugationem faciunt, Meda, cum neq; ligare corpus, nec solvere, nec citius augere, nec minuire studemus. Quæ per coniugationem, cum, verbi gratia, pariter colligare, & carnem addere. Quis enim nō videat, cum duram carnem adicere corpori volumus, frictionem duram vna cum medio modo petendam esse: velv cum mollem addere studemus, frictionem mollem & quantitate mediocrem adhibendam: & per alias coniugationes ad portionem? Particulares porro frictioni coniugationes, sunt non in universum. Quippe si tres quæ à qualitate frictionum funtuntur differentie, tribus quæ à quantitate ducuntur iunxeris, novem coniugationes effeceris, vt per subiectam formulam constat.

Qualitas.	Quantitas.
Dura.	{ Pauca.
	{ Multa.
	{ Mediocri.
Mollis.	{ Pauca.
	{ Multa.
	{ Mediocri.
Mediocri.	{ Pauca.
	{ Multa.
	{ Mediocri.

Frictiones gener  
ta sunt duri  
repleto colla  
tionem.  
Pauca habenda  
quali frictio  
conueniat.

Meminisse autem oportet, hinc omnia frictionum genera respectu collatio neq; dici: quandoque huic dura esse, alteri mollis fuerit ac sic in relinquendum de ceteris. Ignoti optimæ humiditatis nobis propositum puerum, cuius volumus primam mediocritatem seruari, neq; duriter, neq; mollior, neq; multis frictionibus, neq; quantitate medicis, sed paucis, & qualitate mediocribus, in fricabimus: nihil vltra moliri, q; vt ad exercitandum corpus ipsius præparemus: ac rursus, cum iam satis exercitatum sit, apothecia curemus. In tractatione autem harum differentiarum, Hippocrates vix est doctrina quæ per res elementa instituitur, seu aliis omnibus vñtori: quippe quæ & sub cõpendium rem omnē cogit, & memorie affigit, & reminiscencie facile suggerit, ac omnium quæ singularium agentur, rectum vñm promptè suppeditat, seu ad pauca & certa elementa referens. Quis enim non facili membra- tim frictionum differentias, vñm, ac vires inue-  
nuat, si intelligat illam sensu sententiã, quæ docet, contringere quidem frictionem duram, solvere mollem, minuire multam, augere mediocrem posse? Ex horum namq; notitia ac memoria, primum sanè quæ omnis in verborum cõtextu sunt, differentias inuenias: mox omnibus inter se cõplicans, nouem illas cõiugationes efficias, quas paulo supra descripsimus. Sed iam de affectuum

Dolores qua  
per res ele-  
ta sustinetur,  
q; aliis omni-  
bus vñm.

Frictiones duri  
adhibere  
si frictio mol-  
lis, mouere  
doctrinæ aug-  
re posse.

nomnibus nōnihil dicendi est. Ac duri quidem & mollis vocabulã, quidã significet, planè con- stat: rari aut & densi, nō vñquendo. Sicut em pñs priè rarũ, qd meatus magnos per totũ obtinet: sicuti è diverso densum, qd eisdẽ paruos. Tamen per metaphorã, de laxo coactiq; hęc ipsa vo- cabula dici audias. Quia ratione & ætem & igne aliquid raro dictum, æq; & terræ dẽss, quæ tamen & vñta sunt, ex similibus natura par- tibus constant, nec vñlos eiusmodi meatus obte- nēt. Oportet aut nō nomnũ inspicere numerũ, sed affectu si genera duplicia in totũ existimare, alterũ quod in similibus, obferuatur, de quo mol- le dũmve dictum alterũ qd in infirmioribus, meatu ratione, consistit, qd densum, vel rariũ vocatur. Ili nq; corporũ ipsorũ propriũ affectũ exi- stunt. Ceterũ ad institũm reduendo, frictio ipsa interdũ per se corporibus nostris cõmodũ aliquid affert: interdũ illis quæ cõmodum esse- runt, subuenit. Efficit aut frictio, rariũ den- sando, & molliũ durando atq; hæc quidẽ omni- nio dura esse postulat: præterea dura molliendo, & densũ laxando: quæ contrã sit mollis oportet. Pari modo & quæ carnis ægẽdã minuen- tẽ ve- causa suscepta est, vñq; per se vñle aliqd cor- pori præstat. Quæ tamen ad exercendũ corpus præparat, et quæ post exercitacionẽ adhibet, hęc exercitacionibus subter nũ: illa molliẽ casu- clẽdũ tenens meatus tẽdũ, & simul extremi- tas carnis fluxiles reddens, & solidas emolliens par- ticulas: altera, quam apothecia emolliens, hoc est, securariẽ appellat, cum pluculo oleo admini- strata, simul in a pinguedine humectat, & soli- das emolliat particulas, & quæ in corporis meat- bus cõbentur, discunt. Sed preparatoria illa fric- tio in optimi status naturam caliditudo corporis causa suscepta, siat mollis primũ: mox verò exer- citacionem aggressio, dura. Quod si quid erro- ris cõtingat, id potius durum atq; densum debeat, qd laxum & molle. Nam transpiran- di defectũ, exercitio facere licet: alterius verò infirmitatis vitium, quod est ad externas iniurias opportunas, neq; aliis corrigi facili potest, facitq; vñd excrementũ modũ, verumtamen cor- poris nutrimentũ evaporetur. In his aut frictio- nibus quæ à quantitate ducuntur, in proposita natu- ra & ætate, si qd delinquitur, versus id qd minus est id eũ, cõm augendi cõfinio corpus, haud- quãq; siccandi, nobis studium sit. At verò ipsa fric- tio nũ mensura, secundũ temperaturũ æris qui corpus fricandum ambiat, secundũq; anni aut diei tempus, arque adeo constitucionẽ regionis; debet variari. Ceterũ duo propositi hominẽ eo corporis statu de quo queri non possit, obiter etiam regionẽ ipsius potestatem nimirum definitũ: cum nec optimo temperamento, nec in apprehen- sibili omnino membrorũ modulo, corpus vñũ in his regionibus quæ à temperamenti modo re- cessant, pñgi possit. Quippe siccũ, gracile, & velv torrefactũ, in ætuous tractibus homines fiunt. Rursus frigidioris plage incolæ, in æquali temperamento vñuntur, vt in quibus externa frigidat, interiora impensẽ caleant. Itaque apud Gallos, Scythas, Aegyptios, Arabas, ne per som- nium quidem vñq; est vidisse id corpus, quod velv

Kerni quid.  
Dignum quid.

Elonitã can-  
re profus me-  
tatem.  
Afflictũ dupli-  
cia genera.

Frictio dura.  
Frictio molli.

Frictiones exer-  
citacionis sub  
feruam.

Apollon apoth-  
ecia frictio quid  
vñm præstat.

Frictio præpa-  
ratoria qualiter  
admodum de-  
bit.

Frictiones mox  
faciuntur qua  
sua varianda.

Corpus optimũ  
constitutum in  
regionibus in-  
temperatis si-  
quid non possit.  
Regionis in-  
temperata quales  
producant er-  
rores.

veluti Polydetti regula exiit. Cui in nostro sexu, non pauca similia videas. Siquidem nostræ regionis, quæ in latitudine non parum extenditur, id quod in medio habetur, optime sanæ temperatum est, cuiusmodi patria est Hippocratis. Enimodum igitur locum cum corpori proposito dederis, anni quoque tempus, vena mediū ipsum dabis. ex die autem, mendum. Eadem exigui ratio, vt ne domus quidem in qua exercendus est, ipso præsertim die calidior frigidiorve sit, quàm publicis totius vrbis ætqui liyeme quidem calidior, ætate autem frigidior, vel arte parandus est, quod exacta temperie corpora, frictiois temperate fruatur. Sunt autem rubor & tumor in æria temperie & corpora statu temperato, mediæ frictiois notæ. Veluti enim si calidam infundas, primū quidem corpora intumescit: si laqueus infundas, decumbit ita frictio quoque attollit quæ dem primū, postea contrahit, ac molem depouit. His ergo qui carnia augenda causa fricantur, mæ plane finiendi frictio est, cum corpus & intumuit, & ad lummū ferē tumorem peruenit. Qui autem ad exercitandum iam præparantur, his minime id tempus expectandū, sed longeprius desistendum à frictione est, postquam cum optimi temperamenti sunt, & ætate adhuc pueri. Præparatio vero frictiois est finis, vt solidæ partes molliantur, lumbi de soluantur, corporis exigui metus laxentur. Porro expedire nōquid paulo animosiores esse, qui exercitantur, vt lassus ram viribus eū exerceri aueat, quod contingit iis qui sunt calidiori temperamento: neque item ignauū, qui integritate adhuc viribus, labore tamen detrectet, quod soletur qui aut laborant plerūq; hora, vel frigidum temperamentum fortiorum. Porro natura optima, quæ hic est nobis propofita, frictiois, exercitatio nisque, ac tum cibi, tum somni mensuras aperte indicat. Hæc tunc primū quodlibet horum respuit, cum eius vitæ non eget. Quare ipsius quidem nature ad singula quæ agi debent promptitudo & alacritas, est quæ tali præficietur corpori, fuerit inde mensura. Quippe sanū corpus ipsum, si ipsi omnia inuenit proprio nature suæ impetu directum: maxime si in iis quæ ad animum pertinent, ecclē se educat. Nam multo in malis moribus à pueris educati cum sint, in desidēque & intemperantiā viuunt, bonitate nature corruptuntur. Sic uti

frictiois modus indicat sibi robur et tumor.

frictiois modus indicat sibi robur et tumor.

frictiois modus indicat sibi robur et tumor.

Natura optima modus indicat sibi robur et tumor.

Sanum corpus ipsum sibi solum natura optima modus indicat sibi robur et tumor.

Natura optima modus indicat sibi robur et tumor.

Exercitatio triplex est.

Exercitatio triplex est.

oportet, tum vocatam apothetapiam. Quod si etiam idonea frictioe vias, ad ea quæ accedat, iam omnes exercitatiois numeros impleuerit. Ac genera quidē exercitatiois sunt ea quæ diximus: qualitas verō seu differentia, velocitas, tarditasque mouendi sunt: præterea quod aliud robustum, aliud imbecillum est: ad hæc, velocitatem & lenitatem. Vnde de vobis rationes sunt humilimodæ. Nam aut perpetuus motus est, aut interciui: & si perpetuus, æquabilis, aut inæquabilis. Sin interciui, aut certo ordine, aut citra ordinē. Hæc igitur vtendi rationes ab ipso negotio capiuntur. Quæ verō ab illa quæ extrinsecus sunt posita ducuntur, eiusmodi sunt, quod aut sub diu exercitia non sit, aut sub tecto, aut in mixta vmbra, aut calens loco, aut frigido, aut tepetate, aut siccio, aut humido, aut mediocriter cū puluere exiguo multo, aut cū exiguo aut exuberant oleo, aut etiam sine vtroque. Omnium autē exercitatiois commune est illud, quod earū auxilio, animalibus ex ipso corpore, in istis caloris augmentū excitatur. Is tamen proprius exercitatiois effectus nō est, si modo & iras, & perturbatio, & pudore afflicta naturalis etiam calor augetur. Quamquā ira, nō augmenti, sed veluti feruor est caloris in corde. Iam verō ex exercitia ipsis, aliam partem aliud alio magis fingat: quædam lente motus sunt, quædam de se ipsas agitant, quædam robore & nexa adhibuit, quædam sine lino: ad hæc, quædam cum robore pariter & celeritate, quædam ligide. Fodere ergo, robusta exercitatio est. Similiter, quæ quatuor simul equa habentes coercere, impensè robusta exercitatio est, nō tamen celeris. Ad hæc sublatio maximi oneris, imbulatio quoque acclius, huius quoque generis sunt. Præterea si quis per sinem manibus apprehensum scan dat, aut ex eo arrepto sublimis pcedat, ac diu ipsum teneat, robustū is, validumque labor exercet, citra tamē celeritatem. Ita verō & si qua manibus in pugni ductus, isidē prolatis, vel in alio sublati, diuisim in habitu eodem consistat. Quod si adhibuit quempiam deducere sibi maius iubet, nec tamē ipse remittat, vel impendens luctum multum omnes, tum neruos ad robur cōparat, vt quorum maxime propria sunt omnia id genus exercitia. Iam si cuiuspiam iussu te te violenter detrahar, in se trahit, dam toto erectus ex corpore, nō leuem ad membrorum robur exercitatioem obicit. Robur aut partium & exercet & firmat, qui aut quæ completitur mediū, absoluit se inibat, aut ipse se à cōplectente soluat. Ita etiam & si quis antegoniam suam à latere aggr essus, alibi apprehensum, seu aliquod onus sublati, vicium proferat, reducatque. Acque verō qui perioribus ex adverso innixus, magno se conatu remouent rinvicē. Et si quis à cerni ab una pendente deorsum trahatur, ad robur præparat. Cæteri talia omnia exercen citra palestrā aut copiosum puluerem queunt, quocumque cōspicuo loco, etiam atque stansbus. Quæque videntes inter se moluntur, cum robore augdō itudent, licet aut puluerem altum, aut palestram desiderant. Sunt infimæ alie in palestra exercitatioes id genus robustæ, quæ omniā penitū vniūq; prædignibā caliet, si ciple à gymnasiis duentis, vt à medico

Exercitatiois qualitas.

Exercitatiois ratio.

Exercitatiois effectus.

Exercitatiois effectus.

Exercitatiois effectus.

Exercitatiois effectus.

Exercitatiois effectus.

Exercitatiois effectus.

Exercitatiois effectus.

Exercitatiois effectus.

Exercitatiois effectus.

Exercitia qua  
adstante ab his  
robore peragun-  
tur.

Leuississimae  
peraguntur.

Exercitatio ve-  
hementior ex re-  
busta celerisq;  
composita est.

Exercitia an-  
nimae.  
Manuum.  
Lumborum.

Exercitationes  
abstrusae sunt  
respirationis et  
motus.  
Voluntaria a  
sensu, quare  
parum sunt  
propria.

Motuum natu-  
ralium species di-  
uersae.

Facultatibus  
naturalibus  
quatuor gover-  
nari censet per-  
ici.

Motus cordis  
arteriarumq;  
intermittitur  
naquam.

Pulsus a quib;  
causis mouetur.

Veniens opus a  
quib; causis va-  
riari possit.

Motuum qui a  
sensu non sunt,  
differtentia tri-  
plex.

Equitatio et  
motus iuxta.

coquas. Peraguntur autem celeritate, citra robur  
& violentiam, cursum, vmbrae armorum con-  
sentio, necnon quae summis manibus sit concen-  
tratio, tum quae per corycum & pilam exercitatio  
a diuitibus & currenibus administratur. Huius  
generis est & quod *leuissimae* Graeci dicunt, &  
quod *uualissae*, necnon celeris volucrio & cir-  
cunio in palæstra. Potest & solis cruribus, mani-  
buse, idq; erectus, ac vno loco consistens, cele-  
riter exerceri. Porro exercitatio vehemens, ex ro-  
busta celerisq; composita est. Non in postrema ve-  
ro vehementes hae sunt, fodere, discum mittere, sal-  
tare, idq; sine intermissione: similiter, graue qd  
vis relin iaculatur, cōtinuatis sibi q̄maximē lac-  
tibus: aut graui armatura testā, celeriter agitari.  
Sed qui aliquo talis exercetur, intermittere pau-  
lulum solent. Quae verō remissiores exercitatio-  
nes sunt, ex sine interposita quiete magis sunt.  
Ceterū incessus, cursusq;, curū exercitationes  
sunt: acrobaticis & scamaclis, brachiisq; a  
manuū propriis. Lumborū autē, assidue se in om-  
nes partes torquere inclinat, idq; aut pondus  
aliquid et terra tollente, aut assidue in manibus  
sustinentē. Thoracis verō & pulmonis, maximae  
respirationes, propriae exercitationes sunt. Maxi-  
ma autē vox praeferat in dicta, vocis quoq; insti-  
tuta omnia permouet. Porro volūtariae actio-  
nes, musculorū, neruorū, atq; tendonū sunt om-  
nes proprię cum ipsis tamē vna mouetur ex ac-  
tione & ceterae animalis partes, si motus ipse ce-  
leris & vehementius edatur. Reliquorū autem  
motuum qui vel naturales sunt, vel pro animi  
eduntur affectibus, alij cordis & arteriarum, alij  
venarum & iecinoris actiones sunt: atq; horum  
quidem primū & maximē secūdo loco, reliqua  
omnium partū: quandoquidē quatuor naturali-  
bus facultatibus omnes gubernantur. Ad arterias  
quidē cordisq; motus nūq; sanē omnino inter-  
mittitur. Ceterū magnitudine, paruitate, veloci-  
tate, tarditate, & vehementia, variē intēditur atq;  
remittitur. Vna igitur mutū pulsus causa est, na-  
turalis calorū auctio, diminutioq; atq; haec qui-  
dem pro anni tempore, nutrimento, potione, bal-  
neo, frictione, somno, vigilia, itēq; animi affec-  
tibus, & volūtariis actionib; incōdit. Altera cau-  
sa est, secundū quāritatē animalis spiritus alte-  
ratio, quae pro motus voluntarij differentia va-  
riatur. Tertia, quae ex firmitate, infirmitateq; na-  
turalis virtutis accipitur, pro substantia ipsius cor-  
dis & arteriarū bono contrariōve temperamen-  
to accidens. Quarta deniq; est, quae ex instrumen-  
ti ipsius malo affectu estimatur. Ad venarum o-  
pus, vna cū aliis instrumentis, quaeq; natura ad  
alimentū dispensationē ex cogitat, pro cibo po-  
tioneq;, tum verō pro distributionis in corpus,  
& eductionis, & nutritionis ratione varia-  
tur. Huius verō mutationis, arteriae quoq; par-  
ticipes sunt. Qui verō motus actiones nō sunt, ho-  
rū triplex intelligitur differentia. Alij nāq; animan-  
tibus se ipsis insunt, vt q̄ ante cōmemorau-  
imus. Alij extrinsecus adueniunt, vt nauticatio.  
Alios medicata prouocant. Nonnulli t̄m motus  
planē sunt mixti, vt equitatio: quae quidē qui ex-  
ercetur, simul & agit & agitur. Conceditur autē  
p̄cipue secundū viscera. Quae quidē vbi quif-

plam fricare voluerit, stantur in qui fricat, atq;  
tergo, ac modō in dextrā, modō in sinistrā, maius  
inuiciat. Sanē cōiunxit nōnūdū ea quae sub sepeo  
viscera sunt, & maximae tum respirationes, tum  
vires, paritq; modo citatus. Iam ipsa spiritus co-  
hibito, exercitatio quaedam musculorum est, nō  
minus certē eorū qui in abdomine, q̄ qui in tho-  
racis insunt. In summa verō, valdi & cōsistens  
motus, gracile, musculosum, durū, compactum,  
atq; vegetū corpus efficiunt. At remissi, tardi, &  
languidi, diuersam omnino affectionē inducūt.  
Pedotriba igitur, quicquid in palæstra motuum  
geritur, accuratē pernouit: quid q̄q; motus effi-  
cere queat, ignorat: cū hoc ipsum ad gymnā-  
sticam solum spectet, cum p̄dōtriba misuiter est,  
indicant nimirū illi omne actionū exercitatio-  
rum materiā. Ergo gymnastes propositū nobis adole-  
scens, omnū quidē in exercitatio-  
nis vires cū  
suar, deligit illi ex omni genere quod moderatū  
mediūq; inter vtrūq; excessum est: quod nō  
alterat, sed plane seruare opmū corporis statū  
conuenit. Ac prouide ex omni genere medio cre-  
tas adhibenda est, frictio, exercitatio, bal-  
neo, cibo, somno, ita vt neq; durior illi, densior-  
ve, nec mollior aut rarior corporis habetudo  
reddatur: hęc quippe ab extrinsecus imminēti-  
bus facile offenditur: si corporis inhibet au-  
ctum. Exuat autē se puer ipse propositus, vbi in  
sonio iam pfecta cōcoctio cernitur. Mox frictio-  
nis ratio huc spectet, vt membra molliantur. Post  
haec exercitatio, dum & corpus intumescit, & co-  
lor illi floridus appareat, & motus p̄p̄re, & ego-  
bilitat, & concine edit. Inter haec verō sudorem  
cum calido vapore mixtū cernes. Inhibenda verō  
exercitatio tum primū est, cū aliquod horū  
fuerit mutū. Nec tamē protinus lauandū eius  
est corpus, sed vbi summus exercitatio-  
nis vigor remissus atq; sedatus fuerit. Quod si alia vel  
cohibito anhelu implere, perfundi oleo, atq; apo-  
therapia vti deinceps debet: de qua in sequenti  
libro dicemus. Lauandū autē ipsum omnino me-  
dio temperamento eligendū est, ad propositū zeta-  
tem atq; naturū. Cui ne puluere quidē est opus,  
si domus in qua exercitabitur, optime constituta  
sit. Quae si fuerit calidior, tum puluere vtendum.  
At eo si vretur, omnino erit lauandū. Sin nō vretur,  
licet & illotū dimittere, praesertim hyeme.

## GAL. DE SANITATE TVENDA LIB. III.

de sanitate tuenda, lib. III.

St autem apothierapia duplex. Vna quidē  
cei exercitatio-  
nis species: altera verō ce-  
par, de qua imprefertur agendi est. Om-  
nis igitur exercitatio-  
nis probē peractae postre-  
ma partē, apothierapia dicitur: quae duplici cōsilio  
suscipitur, & vt extremēta expurget, & vt corpus  
a lasitudine tutum reddat. Propriam tamē apo-  
therapiam scopus est, vt lasitudinē quae succede-  
re immo-  
dicō exercitio solet, submoueat, atque  
prohibeat. Ceterū optime constituto, a nobisq;  
proposito puero, cum eodē alio, q̄ tuenda: ta-  
tam bonae valetudinis gratia exercetur, etiā ra-  
rō lasitudo succedat, quem admodum superue-  
nire solet athletis, ceterisq; illi qui corpus ope-  
re ex necessitate fangant: eis tamen apothierapia  
est ex

Viscera fican-  
di ratio,  
viscera quae di-  
cuntur,  
viscera colli-  
tis, q̄ in viscera  
liberati ab  
demonisq; ex-  
citatio,  
motus diuer-  
sum efficiū  
dunt.

Pedotribam q;  
visuaria gym-  
nastica.

Medicritatio  
in omnibus cū  
suar, ad cū  
formandū in  
primū corpus  
re habetur.

Puer qui vixit  
exercitatio debet

Exercitatio  
quando inhibe-  
nda sit,  
Exercitatio cor-  
pus quando la-  
uandum sit.

Lauandū quae  
esse debet  
conueniunt.

Apothierapia  
duplex.

Apothierapia  
quid.

Apothierapia  
duplex vbi.  
Apothierapia  
propria scopus.

est ex vfu, si nō lafitudinis nomine (i qua etiam nos fecurimus redder) at certē excrementa purgandi grana. Qualis autē apothērapia sit adhibenda, ipsa finis, ad quos tendimus, demonstrabit natura. Cūm igitur & excrementa digerit, & quæ tenfa ex exercitatione sunt, mollior expedit, duræ certæ frictiones fugiendæ sunt, nec his minus à lentis cauendū arbitror. Nam postq̃ i se corpus non amplius dimouetur, periculū est ne frigeſcat ac denefcat, dū nulla opus exerna cal-

Exercitatio corporis qualem ab apothērapia frictuone expedit. Color communis da.

Frictio media necesse multum ad dūcā adhibenda. Spiritus colubis, qui quid confitetur.

Musculi ab hominibus vniuersis sunt transuersi, ut inter se quid accedat.

Spiritus colubis, qui non probat.

Effluat quomodo de sunt.

Spiritus colubis, qui quomodo sunt.

Pharyngem esse causam tum effluat, tum colubis spiritus, ac quidam ipsum reseruat.

attollit ea quæ ad ventrē spectāt, idq̃ tenſis thoracis musculis, & remissis qui sunt in ſpecto & abdomine: ita namq̃ deorsum excrementa ſerēt. Secundo autem loco habenda est, quæ mediocriter eos qui in abdomine sunt musculos tendit, quō videbit ea quæ ſub ſpecto sunt viſcera, apothērapia fructū ſentiant. Atq̃ his ipsis de cauſis ſciāciarum circumactūs ſiāt, quas trācantes ipsi dum à tergo ſcācandorū cōſiſtunt, circa torū ventrē adhibent. Alias verō cū à frōre ſe collocarint, ceruicibus circa dorſum circūvolūones efficiunt, duabus manibus circūducentes. Alias præterea coſtis, ſpinæ, & pectori accōmodant, idq̃ cōverſo pariter cum his quodammodo eo qui fricatur. Circa lumbos verō ſimilis ſciāciarum circumectio fiet, tendente ſe ad ſingulas eo qui fricatur, nō tamē cum omnibus pariter ſe reuertente: cū ne quæ cōtinuos motus, nec vellemus ei cōtingere ex apothērapia, ſicvñ ex præparatio, conueniat: ſed certē aliquos, & quibus ex intervallo frictiones ſint interpoſitæ. Hac enim vel maxime ratione, & calore qui exercitando eſt adactus ſeruaent, & ſimul excrementa proprii ſpiritus tum tenſionibus, tum motibus eiecent. Ad quod ſanē opus colubitus ſpiritus cōducere non parum mihi videtur. Quippe exilia inſtrumento rum foramina, vellementoſi ſpiritus inſtillatū videas etiam expurgiles opifices: extruduntur ſiquidem quæ antē occurrūt: attrahuntur quæ ad-

20

30

40

50

60

Spiritus colubis, qui ad apothērapia est vtilis, quæ sit modo.

ſciāciarum circumactūs quæ sunt, ex quodamplacuerunt.

Spiritus colubis, qui est opus de fructu.

Materia impetu, citra rationem edere effluat poſſe.

Spiritus colubis, qui non probat, interpoſitū eſſe ex quo videtur.

Aquam dulcem caſſiācam, præ cauſa de re, miſſione calorem quomodo ſuſcipit, variis facultatibus ſeruat.

Aqua medicata caſſiāca, per ſe humectans ſunt, per ſe caſſiācam, nec ex acritudine ſe vires aliam ſeruat.

latus ſunt poſita, impetu ipſius ſpiritus vtraque acta. Cū autē vehemens ſiſtis materię impetus, diuerſis rēporibus ac rationibus, contrarios edere effectūs poſſint: obſtruere quidem, cū craſſum & multū fuerit, quod confirmat ac præcepit agitur: purgare verō, cū exigū tenuēq̃ eſt, nec præproperē, nec violentē cogitur ſimul vniuerſum expelli: rectē ita quidem ſententiā illi ſciant gymnaſtæ, qui inter ipſam vehementem exercitacionē interpoſunt colubitionē ſpiritus, necnon frictiōne quæ apothērapia debetur, ſimul hominē recreantes, paulatimq̃ ipſius cutis expurgantes meatus. Nobis autem propoſito iuueni, cū mediocri exercicio atque enām viciū ratione vtatur, non eſt opus interpoſitione id genus, quam ob contrarias cauſas athletæ poſtulant. Ac de apothērapia quidem abvnde vobis eſt dictū. Nunc de balneis agere tempeſtuum videtur, ac primū quidem de aquis dulcibus caſſiācis. Earum igitur, ſi media temperie ſint, vis calida & humida eſt: ſin tepidiores, humida & frigida. Quōd nō iuſto calidiores reddantur, calida quidē, ſed non perinde humida. Quippe horreæ corpora, contrahitq̃ exiles eorū meatus cogunt, ita vt neq̃ madoſe ab extrinſecis accedente humore poſſint, nec excrementū quod intus laret, quicquidnam emetere. Cæterū ab us incipendum, quæ medium temperamenti obſtinent, quæ per ſe ſemper caſſiācant & humectant, licet interuallū ex accedenti aut per habitum digerant humores, aut ſupervacua fluxione corporis particulatim impleant, aut molliant, aut conſequantur, aut vires firmant, aut ſoluant: hæc ſiquidem quantitas quoq̃ earum non minimū conſert. Hæc autē balnei iuueni à nobis de ſcripto perſequutus eſt vſus, vt qui omniumq̃ ex

mediocri exercitationione, & dicta apothierapia fit consequens. Nihil scius tamen si probe balneo adhibeas, ipsum quoque apothierapie pars aliqua sit. Siquidem duras tensisq; partes emolliat: excrementū, liquamentūq; si quid intus ad cutem hæret, evocat. Verū neutrius horū eget talis adoleſcentulus: quare elui fit in balneo sudorem & puluerē, si quādo hoc vniuerſum, magis postulat, q̄ caleſcitur. Ergo transire tantū ad solū vīq; nō in balneo morari debet. Sed nec immorari huic

Balnei modera  
te caliditate vsus

Frigida lauandum nō est opti  
mū corpus, quō  
dū augetur.  
Frigida lauatio  
nem vsus.  
Frigida lauatio  
nem tempore, et  
gymnasticum  
aptem.

Frigida lauatio  
nem vsus, et  
mediū quartū  
in septem an  
negat.

Aqua glacialis  
ferre infusus  
atq; impensū re  
frigerat.

Frigida lauatio  
nem cōmoda.

Menstruū mē  
struū in frigi  
da balneo, ex  
māto que in co  
te vsuatur su  
mi.

Lafitudinis  
differentia in  
vniuerſis sunt  
olē.

si se, vel vlcis, vel phlegmonis sensus oboritur, affectiones nō sunt, sed symptomata. Simpliciter igitur lasitudinis differentiarū, prima est vlcis: quæ oritur ab excrementorū copia tenuiū simul & acriū, adeo pungentū ac veluti vulnerantiū tum cutem, tum carnē inter exercitandum, vt enī horror ac ceu cūctus vniuerſi corporis interim oboritur. Secūda est lasitudo tensa, citra vllum vlcis sensum. Accidit namq; in vehemēti tensione, omnes musculorū fibras tendi, eas tamen in primis lassari, quæ per longitudinem tensionis porrigitur: quippe vbi tensæ fuerunt immoderatas, tendi adhuc videtur, etiam si nulla iam tensione vergeat. Tertia differentia dicitur concussoria, quā nimis ceu confusus aut phlegmone obfusus partes sentimus: eāq; tum solet maxime incidere, cum musculi nimis exaltati attraxerūt quippiā ex circumsusis sibi excrementis. Quod si etiā tum tendonibus, tum nervis idem affectus incidat, vt in vlcis, quasi ossū laborem, ob penitiori sensum, tum vocant. At differentia quarta, quæ impropre dicitur lasitudo, tum incidit, cum musculi supra iustum sicantur, sic vt squales contractūq; corpus videatur, atq; ad motū quodammodo pigrū, citra tamen vllum nūc deſcriptorū symptomatū. Harum autē quatuor differentiarū singulas, sua remedia sunt. Ceterū lasitudo vlcis, maxime in ea incidit corpora, quæ & mali succi sunt, & excrementis abvndant. Succedit verō recentibus eruditib; cum aut exercitatur immo deratur, aut in sole sunt morati. Nihil tamen obstat, quō minus in corpore boni succi & citra cruditatem proveniat, vtiq; ob exercitationis excessum. Remedium aut huius est redvndantis evaporationis, quæ fiet frictione tum multa, tum mollī, cum oleo adhibita, à quo omnis astrigendi vis abſit: quod genus maxime Sabinū est. Adversissimum verō huic affectioni est, idq; aduſu ex Hispania & Iberia portatur: quodq; enī sit circa Aulonē.

Lafitudo vlcis  
reſa vnde prop  
oficitur.

Lafitudo tensa  
na quando ci  
odet.

Lafitudo concussoria quā  
et quando p  
tatur.

Articuli.

Lafitudo squa  
lida.

Lafitudo vlcis  
reſa que part  
fimum corpus  
infusit.

Lafitudinis vlcis  
reſa remedia.

Oleū Sabinū.

Lafitudinis vlcis  
reſa quæ morat  
et frictuibus  
sunt tractanda.

Lafitudinis in  
fine curatur.





& viribus antecellit. Ac dignitate quidem & viribus maior laetitudo est, quae phlegmones fecit sum praefert, quam excrementosa. Est affectus iam dictus proximus, & ipsa meatuum cutis angustia, quae obstructus illis aut densitas cōtingit. Ac obstructio quidem ex lentis crassius excrementis oritur: densitas, tum ab his quae astrin-

partim molli frictione ex multo oleo, partim tep-  
perato balneo sanantur: partim tarda & mod-  
ica agiratione, quæq; subinde interponat quietē.  
Is verò apotherapeutici exercitij erat modus.  
Ad eundem modum ex quæ ab ira, vel potiori

GALENI PERGAMENI  
de sanitate tuenda, lib. IIII.

**N**Vnc autem primò de morboris sympto-  
matis differre est animus, provt citra ex-  
citacionem incidunt. Secundo loco de  
illis quæ similitudinem quandam cum his ha-  
bent. Acque immo diacis quidem excitacione  
insinuando excipit, sanòrū symptomata est: quæ  
verò sine his cõstitit, morbum itaq; ab Hip-  
pocrate cõmo dissimè dictum esse videtur, lasi-  
tudinis spontè naras nunciare morbos. Atq; vi-  
cerosus quidè sensus symptoma lasitudinis est.  
Causa verò unde ex nascitur, affectus lasitudi-

Veritatem a vi-  
gilia & animi  
afflictione, ut  
quomodo cum  
eunda.

Flammidactylus  
varians des-  
sa. ferns de va-  
riationes au-  
sorum.

Cat's daisy  
quivered his  
kanda.

*Laurus nobilis*  
spice laurel /  
*munda.*

Prædixi reser-  
vare a quibus re-  
solvam.

de offe deket me  
Bren.

Lesiurdine  
pōie mata me  
bei premanai



*Cerebrum  
vnde vnde  
menda fiat.*

*Humores  
cras-  
siores  
per labores  
qui  
sunt  
sunt  
autem  
in  
sunt  
qui  
sunt  
sunt*

*Sudorem  
effe  
necesse  
fieri  
qui  
in  
vniuerso  
corpore  
abundat.  
Vrina  
indicat  
tanti  
quod  
conuenit  
in  
vniuerso  
corpore  
abundat.*

*Turbiditas  
vrinae  
quod  
indicat.*

*Vrina  
per  
turbiditatem  
speciat  
varia.*

*Sudor  
quid  
indicat.*

*Calor  
a  
fuerit  
profundus  
necesse  
fieri  
sunt  
sunt  
sunt  
sunt  
sunt*

fit etiam cōmoda. Hinc autē mali succi note sunt. Qui in ocio degunt, hi pituitosum succum solent accumulare. Quos multus labor exerceat, hi biliosum, vel melancholicū, illum vitæ, hunc autumnū gignunt. Quantō autē diuturniores labores fuerint, tantō sunt ad aram generandam bilem magis proclives. Præterea qui cum multo sudore obeuntur, in crassius incrementū faciunt: qui sine sudore peragunt, magis tenuē: veluti qui hyeme, & frigido ære ita colliguntur. Ad hæc etiam, nō solum vrinae multitudine & qualitas, sed ipsius etiam sudoris consideranda est. Cuius in eo qualitatis dignonō nō modō ex gustu & olfactu, sed ex colore etiam facili est. Pallidus quippe cernitur sudor, pro eiusmodi bilis ratione. Super tamē poit validissimos labores & vehemētē vitæ, planē sanus conspicitur: aliquando medius, atque ex ambobus mixtus. Ad eundē modū & ipse bilis humor se habet. Quālisvis verō is in corpore habetur, tale necesse est eius apparere serum. Ac sudor quidem succorū qui in vniuerso corpore abundat, nota est: vrina eorū tantū qui vasis continentur. Itaque tum consistentiam, tum colorem vrinae, nec non quæ in ea pendunt, aut sident, pendere oportet, vt quæ offendant qualisnam sanguis sit qui in vasis habetur. Quando si is biliosus sit, serum quoque eius biliosum esse necesse est. Simili modo pituitosum, si pituitosus. At vbi crudus planē is est, vrinae tenuis aquosæ vrina cernitur, nihil nec quod ficiat, nec quod pendat in se habens. Vbi autem condicatur, hæc vrina apparet, de superius tenuis quædam nubecula. Quid si turbida sit, qualis veterinorum visitur, crudis succis repleta venas in dicat, non tamen cessare naturæ, sed eos valenter conquire. Si verō celens separatio crassius si liquido in ea cernitur, sitque quod subsidet album, læue, & æquale, iamvis superatur ipsos omnes succos naturæ indicat. Sin cū emingitur, pura sit, protinus verō turbetur, iam crudi succi concoctio nē aggredi naturæ doceat. At si interposito tempore turbetur, nō protinus, sed poit aggressuram insinuat. Similiter si protinus separatio fiat, & id quod subsidet, sit album, læue, & æquale, superiorem longē naturæ succis quos concoquit, indicat. Sin bonum sit quod subsidet, sed longiori tempore colligatur, etiam naturam temporis spacio superatur succos declarat. Si verō vel omnino nulla separatio, vel id quod subsidet malum sit, imbecillitas naturæ significatur, egeat ope aliqua ad succos percoquendos. Si vni verō vrina succorū qui in vasis sunt constitutionē prodierit sudor, & alia quæ per vniuersum animalis habitū conspicuntur, eorum qui illis sunt effectus demonstrant. Quippe superantibus in eo calidis succis, insolitus calor sensus percipitur: frigoris verō, cūm frigidi dominantur. Tam aliores, pituita dominante: pallidiores, bili abundante, cernuntur. Si quidem calor a succo provenit, nō a solidis animalis partibus, vrina cūm se succi in alium non receperit. Accidit verō id illis propter frigora, rigores, vel animi effectus: veluti timorē, vel ingentem tristitiam, vel incipientē verecundiam: quorum si addit nullum, nunquam se in alium recipiunt succi. Aequē neque in eam violentius irruentes, hanc adrent vnquam, nisi animus aliquo modo affectus sit, aut æstus immodico animal extrinsecus obiectum. Ergo si neque ambiens violentia, neque vllus animi affectus subsit, certissima succi animalis cognitio ex colore datur. Quare si ad rubicidius quod pro natura mutatu sit corpus, sanguinis abundantia fuisse significat: si ad nigrum, nigram superesse bilem ostendit. Porro color plumbeus, qui mixtus ex albo & livido est, crudos & pituitosos dominari succos indicat, minus tamē humidus quod sit pituita cōmuniter dicta: cui si addit lentor, vitreus succus dicitur il Praxegora. Generaliter igitur eiusmodi succi omnes albi crudus sunt: nomenclaturæ verō alius aliam fortitur. Ipsorū autē & biliosorū sanguis in medio est: hi siquidem ex eo supra iunctū percocto sunt: illi autem, ex nondum perfectio. Ac singulorū quidem vrinae sunt differentie. Cæterum in corpore laetitudine affecto, vbi paululum vel extra sanguinem relictum, vel vitri processum est succi, audacter mittendus est sanguis: vbi plus, considerandus agendum: vbi plurimū, in hoc nullus omnino mittendus. Inspicere verō & quantitatem conuenit: vt, verbi gratia, si borius sanguis exiguus sit, reliquus verō succus plurimus, vrina in his abstinendū à detractione sanguinis est. Sin in quidem exiguus, sanguis vero copiosus, audacter incidenda vena est. Dein deiciere alium oportet, ratione habita de abundantia succi copia & specie. Quod si quid detrahi sibi sanguinem nolit, huic deicienda largius est alius: aut si id quod suspensū habeat, alia ratione educendum est superuacuus. Iam verō, si in venoso vasorū genere copia semicrudorum humorū subsit, in reliquo autem corpore multitudine horū mordacis, cūm dum hi nobis scopi sint, nempe semicrudorū percoctio, atque crudi & mordacium ductio, abstinere eos cōuenit ab omni valido motu, quos laetudo secuta fuerit. Blandē tamen vinctos atque oleo perfusos, perquam suauiter lauare balneo expedit: inde in ocio abstinendū habere, atque etiam somno, si id fieri possit: Nihil enim equē concoquit, aut malos succos ducit, vt somnus a balneo. Conducit autem ad somnum non in postremis etiam & balneum ipsum. Quid si secunda die & tertia, similiter grauius sentimus hominem, iterum atque iterum vtetur eadem medendi ratione. Sitque ubi somnus & causa & signum sperare vitantes percoctum: si vni ē diuerso, non posse il balneo dormire, nec causa, nec signū est cōmodum. Sed ex fomno vigiliis plerumque redundans succi indicia sumuntur. Frigidi namque succi, \* soporem & longiores somnos inducunt: calidi & mordaces, vigiliis. Si vti autem in primo, ira in secundo die, ex simpliciter cremore pisanæ, aut ex alica, cum pauxillum aceti ad incidendum permittunt sit, si cruditas suspicio subsit, sorbitionem minimam eis exhibebimus. Quippe vt largior nutritio noceat, sic abstinentia omnimoda, nauseæ inducit, ventriculum ledit, resoluit vires, ac prauum succum accumulatur. At boni quidem succi est alia. Cæterum si lentior ipsius corrigatur, adiectus aceti & porri modico, non solum obiteret, sed

*Color corporis  
quando sit  
quæstio nota  
est: quæ sit  
sunt, hinc.*

*Color plumbeus  
quid indicat.*

*Vitreus succus.*

*Sanguis vitreus  
quid quando in  
laetudine sit.*

*Albus effe  
longe recedat  
in qui per laetudinem  
repleta detrahi  
sibi sanguinem  
noluit.*

*Somnus a balneo  
necesse, quod  
si malis succis  
deficiat.  
Balneum cū  
est ad somnum.*

*Frigidi quid  
sunt, soporem  
calidi autem, vigiliis  
grauiores.  
Cruditas quæ  
sorbitionem conuenit.*

*Abstinentia omnimoda  
reducit ad nauseam,  
et prauum succum  
accumulat.*

*Alia tenet  
corrigendum aceti  
& porri.*

sed

sed etiam nutriet plenus, & propositis sit ex vfu. Hac itaq; ex causa pitang cremor in hoc casu nufior est, vt qui tum modice nutriat, tum facile per angusta permeet, dissecitq; & dissoluat quicquid in crudis habetur fucci. Horii ipsoru gratia & multa his idonea est, & oxymeli, & apomeli, & piper, & zingiber, atq; omnia breuiter, que citra vitiu generationem fucci, humorem crassum dissecant, soluantq;. Frugum itaq; maxime apta est pitana: olerum, sola lactuca: piscium, qui di-  
 10 cuntur fixatiles: panis, qui in cibano coctus, & fermentatus, & modice purus est: aues montico-  
 le: porco, oxymeli, multa, vinum tenue, & alibi. Quæ verò vrinam cient, hoc casu non probor: maxime quæ preualentia ex his sunt, & sanguinem calefaciunt, & liquant. Quippe quod concoquendum probe est, huic tanta vexatio non conuenit. Hac itaq; omnia secundo die ita facienda sunt, atq; etiam tertio, quartorq;. Quod si tum laesuridinis sensus leuetur, tum cetera pro natu-  
 20 re ordine appareant, fricare quidem liberalius, exercere verò parce hominem audebis. His ita peractis, si nullus laesuridinis sensus præterea fa-  
 perit, ad confectas statim exercitationes reducet ipsum. Sin quicquam appareat priorum aut symptomatum, aut notatum, rursus tu quoque in id intentus, mutare tentabis ea que particu-  
 30 latim non recte habent. At si in eodem lassato corpore, reliqua eadem habeantur, sanguis autem bonus exiguus sit, crudig humores pluri-  
 mi, huic nec sanguis mittendus, nec alui deie-  
 ctio, aut exercitatio, aut omnino motus, aut bal-  
 neum adhibendum: sed seruandus in omni quie-  
 te is est, dandisq; ipsi cibis, poenio, medicamen-  
 taque sunt singula eius generis, que attenuant,  
 40 dissecant, & coëctant succorum crassitudinem, idq; citra manifestum calorem. Ergo nutres hos maxime oxymelite, aliquando etiam pitane & multo exiguo quopiam. Sustinent enim hi victu,  
 si modò alij vili, tennem, ipsa nimium crudo-  
 50 rum humorum copia, quos paulatim conco-  
 quant, ad corporis alimentum abventes. Quo-  
 uiam autem precordia istiusmodi o di omnibus tur-  
 gida inflantq; sunt, & facile quicquid assumpse-  
 rint, in statum vertitur, non inutile fuerit & lon-  
 gi piperis, aut albi, aut nigri aliquod cum cibo  
 dare. Sed album quidem supra reliqua duo ge-  
 nera alium roborat. Nigrum id eligendum est,  
 quod præcellit pondere. Vilius tamē sit & Dio-  
 60 spolitico medicamento vti, cuius duplex est cō-  
 positio. Nam aliis ex partibus o mribus; cumi-  
 no, pipere, ruta, nitroq; id cōficitur: ac potest sic  
 magis ventrem soluere: aliis cum reliquorū pa-  
 ri pondere miscetur nitri dimidiū. Præhiterit aut  
 cumini esse quod Arthiopicū vocant, piper vero  
 vel longum vel album. Macerabitur cumini  
 in aceto maxime acro: dein cōtinuò id tunditur,  
 aut etiam prius modico frigoris in vase fictili, qd  
 coctum in camino ioptimē sit. Sunt verò & ru-  
 te folia modice excucata. Sumitur & per se medi-  
 65 camentum hoc, & cum pitane cremore, & ante  
 & post cibum. Porro ad cum vsum maxime cō-  
 mendatur, quod mel optimum, opnmēq; desu-  
 peratum admixtum habet. Appositum sanē reme-  
 dium sic afficitur est, & quod ex tribus piperibus

constat, vtiq; cum non admodum medicamen-  
 tosum sit, atq; ex variis confectum, quale est il-  
 ludas quo vniq; in iis fluxionibus quæ à capite  
 descendunt ad pectus. Expedit autem prepara-  
 rum habere vtrinq; ad manū. Simplex igitur il-  
 lud, quo ad cruditatē quæ in primis est venis vti-  
 mur, huiusmodi est: Ad cuiusq; trium piperū dra-  
 chmas quin quaginta, ab vnde adduntur anisi, &  
 10 rhyini, & zingiberis, singulorū drachmæ octo.  
 Hoc magis simplex est, id quo detractū sit zingib-  
 er. Alterū verò est, quod ex iisdem conficitur:  
 verū ad cuiusq; triū piperū drachmas quinquaginta,  
 reliquorū cuiusq; sexdecim drachmarū in-  
 icitur pondus. Debet autē, si haberi potest, anisum  
 Cretense esse. Thymum aut Anicum, aut ex  
 edis locis & fectis: cuius quicquid, ignosam est  
 circūcisio, coma ipsa vna cum floribus inuicietur.  
 Eto verò & piper, quod longū quidem est, inere-  
 gram, minimēq; foratū: æque verò & zingiber.  
 Quod autē piperis qualitatē retinet, ac nec ma-  
 ceratum resoluitur, nec etiam pertusum est, pi-  
 20 per id longum vt maxime idoneum est, sic mi-  
 nimē fuerit adniterinū. Nigrum verò nec exille,  
 nec rugosum, nec crassi corticis esto, sed maxi-  
 mum plenissimūq; quæ duæ notæ album enī  
 piper cōmendant. Deinde omnibus simul tufis,  
 & per tenue crūrū transmissis, mel optimū,  
 30 curioſeq; desuperatū miscetur: id quod debet esse  
 odoratū, flauum, acerrimū, dulcissimūq; atq;  
 crassitudine quadam mediocri, & quæ suam cō-  
 tinuatē teneat. Hoc igitur medicamen & ante  
 cibum, & post, & rursus cubitum rectē da-  
 tur, coctilearū pleni mensura: atq; chois quide-  
 m, vt paruis parui, & maximis maximi, ita me-  
 dia ad portionē præterea etiam zingiber, quod  
 ex barbaris affertur, aceto maceratum. Est id vi-  
 rentis herbe radix, à collectū statim in aceti in-  
 40 iecta. Extingitur enim eiusmodi medicamen-  
 torum calor circa ipsas primas venas: neq; in ru-  
 tam perfertur corpus, veluti aliorū quorūdam,  
 cuiusmodi est quod diacalaminthen appellat.  
 Idcirco etiam oxymeli his vtilissimum est, cuius  
 talis est cōpositio. Cum meli optimo super  
 carbonēs spumam abstuleris, cōlōies in ipsum ac-  
 50 tūritum, vnde gustatis nec acidum nimis, nec  
 dulce videbitur, ac deniq; super prunas coques,  
 quoad planē vixit amborum qualitates sint.  
 Hunc ab igni depones, cūq; vti voles, aquam  
 ei micesis, ita nimirū temperans vt vinū. Quō  
 autem pluribus id cōueniat, vni aceti parti, mel-  
 lis à quo detracta spuma sit, duplum est mices-  
 dum. Pro vniuscuiusque tum gustu aut vntura,  
 plus aut aceti, aut melis nos addicere conuenit,  
 id esse sumentis naturæ conuenientissimū oxy-  
 meli ratos, quod illi vtiq; in cūdisimū est. Cum  
 aqua verò ita facies oxymeli. Quadruplū opti-  
 60 mæ aquæ micesis mella: dein coques modico  
 igni, donec spumare desinat. Ac melli quidē mel  
 multū egerit spumē: quō etiam diutius cōcoqui  
 debet. Optimum verò vt breuissimū coquitur  
 tempore, ita minimū spumæ evomit. Post verò  
 dimidio aceti adiecto, rursus coquendū, donec  
 qualitatem omnino sit vntura, nec acrum cru-  
 dum sentiat. Conficitur sanē oxymeli, etiam  
 tribus statim à principio mixtis, ad hunc modū.

Pitana cremor  
 crudus atq; ubi  
 modicissime.

Cruditatibus  
 que ab ipso  
 quæstionant.

Dumtaxat pro-  
 valentia, non  
 esse cruditati  
 melia.

Lassato corpo-  
 re, cui sanguis  
 quidem humores  
 multos sit, et  
 de his humores  
 plures, qui  
 mendo ratio  
 adhibenda.

Crudo succo  
 refecti cur te  
 uisum vili-  
 bus rationem  
 perferant.

Piper cum cibo  
 adhibendum per  
 rationem esse.

Diospilico  
 medicamento  
 vti, cuius duplex  
 est compositio.

Diatrum piperi  
 simplex, et  
 datibus esse  
 medicamen ap-  
 positissimum.

Diatrum piperi  
 reon simplex  
 compositum.

Quod si  
 vti sit.

Quod si  
 vti sit.

Piper longum  
 quale sit elegen-  
 dum.

Piperis nigri,  
 albiq; ducta.

Mella optima  
 nota.

Diatrum piperi  
 reon quod effi-  
 ciat modum.

Zingiber quid.

Piperatū cal-  
 lorum circa pri-  
 mas venas ex-  
 tangat.  
 Oxymeli cō-  
 positio.

Oxymeli a-  
 quæ faciendi  
 modus.

Mel vntissimū  
 multum spumæ  
 egerit: optimū  
 vntissimū, et  
 quæ sit optima.

Apomeli refri-  
gat.

Mullum ex plu-  
via aqua con-  
fuit.

Vinum aqua  
non probat Ga-  
lenus.

Apomeli co-  
pofitum.

Vinum quod  
fecit lentius, q-  
si crudus ab his  
commoda.

Capparis res-  
taurina res-  
taurina admodum.

Viperam gene-  
ra vicia.

Vina crudiora  
aliter, autia.

Vomita cur nō  
trahit per co-  
dices liffima-  
dum copulatur.

Humores res-  
taurina ab alto.

Humores intro  
pelluntur.

Vomita quod  
trahunt.

Vomita praeter  
se finit, crudif-  
que humores ab  
alto in cer-  
tera habitum  
distribuit, qua-

Aceti vni parti, additur mellis duplum, & aquae quadrupli: atq; haec ad tertiam vel etiam quarte-  
tam partem coquantur, spuma interim detenta.  
Quod si valen nunc id facere studeas, tantundem in-  
uicies aceti, quantū mellis. Apomeli optimum  
aqua conficitur, bibulinq; totaestate refrigeran-  
tis vice. Potest verō cui id libet, & ad quam pro-  
positum affectuonem eo comode vii, potissi-  
mum vbi docuit: id quod sepe contingit ei, a-  
liis magis, alia minus, vt pote ex aqua con-  
fecto non pluuiā, sicut multa, sed qualibet. Quan-  
quam potest qui vult, & ex aqua pluuiā id con-  
ficere, ipse q; pluuiam aquā probarem, id sua-  
derem: verum neq; ipsam probō, & nihil est de-  
terius si acecit, potissimū ad ea quae nunc sunt  
proposita. Quinimō medicorū etiam acit, qd  
non omnino iucunose est confectum. Sane cu-  
ra conficiendi in eo est, vt nec sauis admodum  
sit vinosus, coquanturque bene in fontana aqua,  
quae & pura sit, & dulcis. Oportet enim expres-  
so it sauis melle, eatenus in aqua coquere, quo-  
ad nulla iude spuma existat. Ergo tum hac vten-  
dam potione est, tum verō ē vinis ita quae leuiter  
acecant. Nutriendū medicorū etiam acit, qui citra  
calorem extenuent, cuiusmodi capparis est, si ex  
oscyमितe vel oleo fumat. Quod si crudus id  
soccus satis attenuatus speras, vinū dabis quod  
& substantia sit tunc, & colore fuluū albuūve:  
hoc enim ad succi bonitatem, & concoctionem  
facit: illud vinū mouet. Sunt verō in Italia, prioris  
generis Falernum, & Surrentinum: posterio-  
ris, Sabinum & Albanum, & Adrianum. In Asia  
verō, prioris generis Lesbium, & Arrium. Sec-  
undi Titaezenum, & Arrium. At crassa & nigra  
vina sunt reicienda. Quod si his adhibitis  
melius habere se sentiat, etiam lauare tum homi-  
nem debebis, vtgerog, ac molliter fricare. Vt ve-  
rō primū in vina hypostasis cernitur, nō frictio-  
nem augere, tum ad coctas exercitationes pau-  
latim reducere. Hoc tēpore vnguentis ita quoq;  
vten-  
dum, quae per halitū eueant. Vomitus autē  
minimē in affectibus id genus vtiar, ne succi re-  
uellantur intri mordaces, quos videlicet carni in-  
higret. Quemadmodum autem exercitatio, frictio,  
balneū, fomenta calida, vnctio calefaciētia,  
iracundiāq; humores ab alto reuocant, ita quae  
refrigerant astringunt; cum, ad haec tristitia,  
horrorē, & quacūq; causa calida frigida ve proce-  
dens, nec non omnia quae introsum impetū fa-  
ciunt, ea in quā a cute ipsa motū humorū ad in-  
terna eicitans. Haec itaq; omnia de vitanda rum  
sunt, cum idem homo pariter & lassitudinē sen-  
tit, & venas habet crudis succis repletas. Nam  
oec qui extri sunt, rectē intro reuocantur: nec qui  
intus, foras. Imō qui foris sunt, leuiter educendi  
per halitū sunt. Ego quibus intus crudi succi co-  
pia est, & foris lassitudinis sensus, ita hyssopum  
in mulso coquens, nō statim nec primo die, sed  
in frequentibus dabis: vomitū verō abstinēbis,  
nisi vbi crudus citra lassitudinē succos euacua-  
re contendis. At verō si vni cum sensu vlceroso,  
enā crudorū copia aut calore, aut ab immodi-  
co motu in corporis habitu sit transmissa, quae  
quidē ita non in venis, sed in solidis animalis par-  
tibus haeat, tūc sanē ea excludenda sunt, quae vel

ad cutem vsq; suum calore transfundant frican-  
dius largiter oleo quod relaxat vim habear,  
ac potissimū manē, cum surgant a somno. Nam  
ea frictio concoquit crudum succū, similis cor-  
porum molem animāq; nutrit. Quiescendū ve-  
rō duo post haec est. Cedit autē negotiū felicius,  
si homo exigui cibū pridie sumptum, & ex aliud  
a cena biberit, quam tēne vini, suluūq;. Post  
ipsam autem quiescent duritiam, modicē inam-  
bulandum citac dem tum deus multa frictio-  
ne, tum balneo modicē calido, & alimentis quae  
boni sunt succi, vten-  
dū. Quin etiam medicamen-  
tis diacalaminthen audacter dabis: cuius talis  
est compositio: Accipe calaminthen, pulegionem,  
petroselinū, lefeleū, curugū vicia it, seminis apii,  
cacum nūm thymi, singulorum vnc. iij. Liby-  
ti, vnc. xvi. piperis vnc. xlvij. Hec omnia vbi e-  
lectissimum fuerint, simul tritanda cribrandiq;  
sunt tenet cribro. Tēnia quippe medicamenta  
in totum corporis habitu maximē digeruntur  
vel in diuerso, & crassiora in ventre haerent. Ita  
cisco Diapospiticon medicamen crassius facere  
soles, quoq; ē denique alium per id frado. Ma-  
scendum his ita preparatis mel optimū est, cu-  
nōse depuratum. Porro viciū eius erit post ma-  
tutinam frictioem, ante exercitationem & bal-  
neum: potest itaq; etiam cum aliquo cibo mixtum  
assumi. Post cibum autem nunquam nec hoc me-  
dicamen, nec aliud vllum quod ad distributio-  
nem vehementiorem facit, sumendum est. Licet  
& sine admixto melleficum medicamentū re-  
ponere, eodē salū vice vti. Ad ipsorū autem con-  
coctionem ciborū, praestat sanē aut medicamen-  
tationem pepercon simplex, aut ipsū piper po-  
tionis imperium, aut etiā quod ex succo mūli cy-  
donis ebitat medicamentum porrigere. Verū  
ad ea quae nunc agimus, optimum omnium est,  
quod constat ex calaminthe. Nam crassa lentius  
attenuat, & per halitū educit, & vinas mouet,  
& muliebria provocat, etiq; iucundissimum gas-  
tri. Vbi igitur acciter duos vel tres primos dies  
ira praeparatus homo est, exercitatio nonibus ebit  
sine tradatur, animaduertis prius vniuersa quae  
iam diximus notis. Nam si omnia comode se ha-  
bere videntur, plenē exercitandus est. Sin mi-  
nus, etiam ante medicocritatem desistet, prius di-  
cta victus & medendi ratione tractandus, do-  
nec postmodū circa exercitio omnibus ex senten-  
tia se habentibus, ad consuetum victum reuoca-  
ri iam possit. Quia verō & acopo qd ex abie-  
te sit, vt expeditur qui in carne & tota corpo-  
ris mole succos congesterunt, qui aut concoqui  
desiderent, aut per halitū digerī, apponamus  
eius compositionem. Ignat abitis pulcherri-  
mum semē, quale circa Septembrem colligitur,  
conuicere oportet in oleum, quolibet anni tem-  
pore, vbi prius contusum fuerit. Postea verō q;  
spacium dierū ad minimū quadraginta in ipso  
oleo relaxante (quale Sabinum videntur esse) ma-  
ducat, ipse liquor est percolandus. Conuicetur  
autē in quing & viginti olii heminas, eius seminis  
modis Italici. Excolato oleo, quatuor ce-  
ras libras adiungito: reficue verō abierit tētia  
viciū librae parte: inuicies etiam & pice reficue  
tantundem. Quod si harū copia nō sit, earū loco

vten-  
dum si ra-  
tione mōdē.

Diacalamin-  
then confectum.

Tēnia facit  
diger.

Crassiora in  
ventre haerent.

Purgantia me-  
dicamenta de-  
bent crassiora  
relaxari.

Diffinitudine  
confusio medi-  
camentorum  
facit a cibo  
distingui.

Concoctum ci-  
borum quae con-  
ferant.

Diacalamin-  
then medicamen-  
tum viciū.

Acopi ex abie-  
te compofitū con-  
tra omnem col-  
luctationem rati-  
onem.

terebinthina vtendum. Coques autē cōmodius hęc in vase duplici, aut certē igni lento. Medicamentum enim hoc spississimū ad omniē lasitudinē em est. Vtile etiam est & quod ex populi floribus fit. Est autē tale: Ex illis enim adhuc cōnūctibus medicocitricis contritis, modus Italicus in quindecim aut vīginti libras Sabini olei aut alterius similis, immittitur, quondāq; sub sole feruado simul torū id dimouebitur, si id fieri liceat. Itaq; post binos aut ternos menses potes slore expresso habere oleū, quod sine vlla mordicatione, nihil minus quā abietinā, per halitum digerat. Cui tantundē cerę & resinę licebit addere, quantum illi esse adiciendum diximus. Si quī verō humidū id quod exprimitur, crassius videbitur, sat fuerit vel quintam partem cerę adici. Sunt qui in duplici vase elegantē id medicamentū conficiant. Qui verō celerius id preparare cogitur, hunc necesse est aq; vinīve quartam aut quintā partem, nec torreatur, iniicere. Atq; ad ea quidē de quibus nunc agitur, vtilior aqua est: vinum verō ad articulares affectus. Ergo & hęc

medicamenta succos quicuq; nō crassi nec leni in carne cutēq; residēt, evaporant: necnō qd ex chamæmelo fit oleum, tum ipsum solum, tum cerę quartā, resinę duodecimā parte immixta. Potest etiam & anethum oleum, aut per se, aut cum cerā & resinā, similiter discutere in lalutem. Preparatur autem in duplici vase, siatq; ex anetho viridi, maturōq; iam samphylichium oleum, liyente, & regione frigida, ac tempestate simili, idoneum medicamentum est. Simili ratione rosæ maris herba, aut betę albę radix, aut agrestis cucumeris, aut althęe, aut vitis albę, efficaciter etiam discutit, vbi suas vires in oleo similis facultatis quæque ipsarum dimiserit. Quōd si eorum singulas, vel ceram solum, vel cum ea resinam iniiceras, non solum pulcherrimū, sed etiam quod in loco bene hæreat vnguentum facies. Abvndē autē omnino erit, si cerę quartam partē, resinę duodecimā addas. Si verō abietinam simul & pineam resinam iniicias, aut cum his etiā terebinthinam, aut si hęc desint, humidā pini resinā, aut resinam quæ in sicilibus est, aut etiam quam sirixam appellant, sic quoque medicamentum feceris, quod evaporandā vim habet. Porro vbi præter vicerofum sensum, etiam copia humorū crudorum in toto corpore abvndat, concoquenda quidem ipsa cruditas primarum venarum est, concoquendāq; simul & discutienda quæ extremas obfudet corporis partes: semper ipsius curationis studio in id propensio, quod assilgere magis videtur. Nam si pari doxa ipsi insistent affectus, respectu æquali curandī sunt: sed ita tamen, vt inter inieta potiores medendi partes ei præstentur, qui in primis venis consistit: in fine verō, ei qui in carne. Medio inter hæc tempore, am bæ rationes quælibet miscbuntur. At lasissimod

ben sua, cum citra excruciationem incidat, abvndantiā indicat, quæ solidas animalis partes distendit. Vbi igitur sanguis redvndantiā grauat, optimū est vel venam tundere, vel scarificare malleolum. Ex us autem quæ in vicerofa affectu retulimus, vbi vinoso succo miscetur, licet ratiocinari & de alio quouis, cum solus conti-

terit. Iam verō lasissimod quæ phlegmones sensum inferit, si quidem sponte oriatur, subitō accendat vehementissimam febrem, nisi misione sanguinis malo prius fit occurrit. Itaq; nec cūctat, nec parū detrabere conuenit, sed (nisi quid obstat) ad animi vires deficiunt. Optimum verō fuerit, bis eodem die, si fieri possit, detrabere: ac primū quidem ita mittere expedit, vt animi defectum homo non adeat: secundo verō, ne defectus quidem ipse est formidandus. Quippe, qui priore detractiōne resolutus est, secundam sustinere haud poterit: in hac verō si quid tale homini incidat, facile reuocabitur. Qui verō sic affectū sanguinem non miserit, huius evaserint, vtiq; fortunæ beneficio id acceptum fuerit. Aestimare autem diligenter oportet, qui sanguinem sunt missuri, in thoracē, dorso, & lumbis tensio, pulsantisq; dolor figatur: an in capite potius & collo. His namq; affectis, humeralem venam divides, maxime si repletum caput & calidum sentiant: illis verō internam. Si verō omnino æqualiter lasitudinē occupat corpus, ambarum mediam. Ac si ab ista quidem vena febrile corporet, alterius etiā artus, nempe curatū, illis prospiciat. Sin autē tum non febricitent, primo die post incisam venam, aut prius cremorem, aut sorbitionē ex alica solum dabis. Secundo verō etiā lauare licet cum copioso oleo, nutrire autē moderatissimē, lactuce, vel cucurbitæ, vel pitræe aliquid offerens. Eā & alica nō inuiliis. Si cucurbitæ copia nō sit, malua, betāq; & lapathio, & aplice vtendum. Quōd si carni quog; gustare velit, saxatiles pisces, vel onicos in albo iure (quod anetho, sale, oleo, & porri exiguo in aqua coniectis conficitur) bene elixos dabis. Vno autē vniter etiam aquo secundo die parcat. Tercio verō, si quidem aq; potione facile toleret, tunc quoq; vino abtinebit: si non ferat, posissimum quidem apomeli dabis. Hoc si non sit, album & tenue vinum offeret, aliquid pro ratione exhibebis, quæ vt boni sint succi, ita minimē calfaciant. Cauendum tamen vel maxime est, ne propter & multū, sed sensum, & paulatim renutrias. Alioq; minime ipse ventriculus poterit tantam ciborū colluuiem pro dignitate concoquere, ac proinde plurimū crudi succi rapietur in vniuersum corporis habitum. Venter quippe suā ipsius causā nutrimentū suscipit, vt eo nimis fruatur. Vbi autem expletus fuerit, quod reliquū ciborū, ex prurit, pessimum cenonus alienum deicit, videlicet ad ipsā intestina. Abhis verō rursus ad venas suggerit, si quibus tandem in vniuersis animalis partes determinatur: vbi alimentam ipsum nactum iam concoctionem ternam, alendo corpori assimilatur. Vnde multi exanimio corporis habitū, nisi reficiantur lentē, plurimum excrementorum in toto eo congerunt, atq; ex illis nō leuiter agrotant. Quoniam autem per lasitudinē quæ phlegmonem representat, vis calida sanguinis congesta in corporis mole est, venæ autem sectio succos & vasis emittit, vtile est post priorem detractiōnem tantisper intermittere, dum aliquid eorum qui in corpore sunt humores, remigrare possit ad venas, Quod tamen quoniam cōmiserandum.

Medicamini  
quod ex populi  
floribus fit  
pissio.

Incisum latus  
utq; hancet, a-  
vapora. Chamæ-  
melo, Anethum  
oleum.

Samphylichium  
oleum.

Discutiensia qd  
facit quæ.

Refinarum sive  
ut dicitur.

Vicerofa sensus  
si sit commota  
cruditas, id est  
primæ venæ,  
quod in vicerofa  
corpus habet,  
quod agendum.

Lasitudinis et  
sine sita manij  
natura.

Lasitudinis  
quæ phlegmonem  
sensum inferit, creata per  
sanguinem mis-  
sionem vsq; ad  
animi defici-  
um, admi-  
stratur.

Sanguis missio  
quando fit nulli  
die repetenda.

Humeralis ve-  
na quid sit, fi-  
da, Interna vena  
in quibus in-  
drada, Medus quando  
aperta vena,  
Lasitudinis  
phlegmonis  
visum ratio  
conueniens.

Albi iuris con-  
pissio.

Ventriculus  
sua ipsam causā  
nutrimentum  
suscipit.

Nutritiōnis me-  
das.

Sanguis de-  
tractiōnis pri-  
mæ & secunda  
cum interpono  
dum fit signu.



*Sanguis de-  
trahitur ut  
sananda sit.*

non est vt in ius maneat, vtpote ex dimidio cor-  
ruptum, idcirco detractionem sanguinis etiam  
secundo die iteramus: aliquando verò & in ter-  
no, vbi videlicet & reuelleret, & ex aliis in alia  
transfere visum est conducere.

## GALENI PERGAMENI de sanitate tuenda, lib. V.

*Humor natu-  
ra durior.*

*Art. sanitatis  
tuenda quod p<sup>ri</sup>-  
mum.*

*Galeni vixit  
sanctissimus.*

*Corpus optimè  
constitutum, ad  
custodiam sui de-  
ficienti animi  
excessus medi-  
corum.*

*Affectus conuul-  
sus quod conuul-  
sus quod conuul-  
sus quod conuul-  
sus quod conuul-*

*Humor durior  
afflictus multo  
durior.*

*Sic ut immo-  
di-  
cū affectus quod  
in dicit.*

**C**um hominū natura sit numerosa, diuer-  
sam vītū & exercitū rationē postulant,  
quæ æ arte quæ valitudine tueretur peten-  
da est. Huius enim beneficium cōtingit, vt qui ab  
ipso ortu imbecillum corpus nō fuit fortis, sen-  
tibus illis, ab omni prius morbo & dolo-  
re alieni, ad summam senectutem perveniunt.  
Ego verò, tametsi nec salubrem corporis statū  
ab ortu ipso sim nactus, nec vitam planē liberā  
egerim, hac tamen ipsa arte vītū, post octauum  
& vicefimū annum tē minime quidem labora-  
vi morbo, nisi fortē diaria febris, ob lassitudinē  
aliquādo contractā cum alioqui liceat nō mo-  
do hanc, sed bubonē etiam effugere, si quis libe-  
ram vitam sit nactus, vacetq; ab vtroq; genere  
excrementorū, & eo quod in quantitate, & eo qd  
in qualitate cōsistat. Ergo corpus optimè con-  
stitutū, ad sui custodiam, tam in exercitationibus,  
tum in potensibus & esculentis, necnon in som-  
no, vigiliis, balneis, atq; vniuersis animi actioni-  
bus, medium vītūq; excessus, idq; in qualitate,  
quantitate, & facultate, postulat. Quod si in al-  
quo sit erratū, corrigendus error est, per contra-  
riū excessus vīspationē. Vt autem corrigēdo nō  
ceres, primū corporis affectus ad vīguem scire  
oportet. Deinde omniū eorū quæ priore die facta  
videri, meminisse. Nam affectus quidē, qd  
delictū sit, docebit: recordatio eorū quæ pri-  
die sunt acta, quantū tibi id cōsuetis sit receden-  
dum, insinuat. Imò verò id quod peccatū est, me-  
morā factorū ostendit: & prout corrigetur, ex  
præsentium collatione docebit. Vt, exempli gra-  
tia, si nollis quā prius possidide corpus vi-  
deatur, primū quidem frictiōnū memnissē con-  
ueniet, an molles, & cū pinguitudine & balneis  
leniter tepidis sint adhibita. Ab his revocari ad  
memoriā debet, an exercitationes tardæ & exi-  
gæ præcesserint. Dein, an potio vberior fuerit.  
Mox, an cibos plures, aut natura humidiores ac-  
ceperit. Postremū, an multum dormierit. Proxi-  
mus mollis corporis affectus, est humidus: hoc  
differt, qd mollis ipsorum corporum propria  
qualitas est: humidus, qui in eo continetur, hu-  
morum. Discernitur in tactu: nam humidus af-  
fectus cū madore cutis est: mollis sine hoc: quan-  
q; est profectū & molle corpus humidum suis i-  
pſius partibus: non tamen cum molitie neces-  
sariō cōiunctus est humidus affectus. Potest namq;  
durata caro esse, & tamen maior sudorē v corpore  
emitti. Accicus quidē immodicē affectus,  
habitu statim durum efficit: indicat autē, aut ci-  
bi potioniſve penuriam, aut vigilas, aut vitæ  
solitudinem, aut multam frictiōnem, aut deniq;  
exertationem immo dicam. Hæc itaq; conside-  
rans, corrigere quotidiē errorem poteris, prout  
quā is in auctu, curatu difficilior evadat. Sem-

per autem memineris, excessum omnem contra-  
rio excessu emendandum esse. Cui præcepto si  
corporū dignoscendorū peritiam adieceris, &  
singulorū remediū facultates adiunxeris, vni-  
versæ iam artis quæ corpori hominis tuendo di-  
cata est, peritis fueris: cuius ope licet præsentem  
sanitatē tuam, & amissam recuperare. Atq; opti-  
mum quidem corpus cuiusmodi sit, dictum iam  
est. Quod ab huius perfectione deficit, scire li-  
cet tribus id de causis defecisse: aut quod statim  
in vtero, vniūso statū fuit: aut quod qualibet de  
causa in non naturalem affectum pōt conſeſcit:  
aut ætatis ratione. Omnia verò corrigenda per  
contrarium excessum sunt. Nam senium, frigi-  
dum & siccum cum sit, per ea quæ caleſcunt &  
humectant, corrigitur. Talia sunt balneum dul-  
cis & calidæ aquæ, vini potio: præterea ex cibis  
quicūq; humectare caleſcereq; sunt nati. Quod  
pernitet ad exercitacionem, frictiōnem, atq; om-  
nem motum (qui cibum debet præcedere) scire  
licet potam ex parte verum dissilire.

*Vi lina, sumptus cibum, det membra sopori.*

*Nam, hanc lina sibi.*

**P**ostulat autem senium, non secus quā iuuentū,  
corpus, dimperat aliquando. Imò corpora quæ  
in florenti ætate sunt, nō desunt quæ quietem re-  
quirant. Senium verò nemo quietem ex toto po-  
tulat: sed neq; exercitiū vehemens. Cui enim ven-  
tulo quodam excitari, accendit calor eorū defi-  
derat: vehementior autē motu deicitur. Cū  
igitur senium omne corpus sit frigidum, nec po-  
tens alimentū ad sese trahere, atq; id probe con-  
ficere, ex eodē nutrire, plurimū frictiōne pingui  
adhibita post somnū matutinu īuatur: quippe  
quæ vitale robur excitet, ac modicē caleſcat,  
efficacitq; vt sit distributio nutrimenti faciliōr, atq;  
nutritio promptior. Quare multos etiam labo-  
rantes atrophæ, cū nimidā frictiōne adhibita, fa-  
cile paucis diebus carne impleuntur. Frictio itaq;  
quæ ex oleo administrata manē, veluti caritati-  
tio quardā sit sensibus. Post hanc inambulatio, ge-  
statioq;, ex lenis vīribus cōſeſcit. Etenim exerci-  
tatio acuta corpus tenuat: cōtrariā crassius red-  
dit: multa corpus siccitatē mediocri obestum præ-  
stat. Verū exercitacionis formæ quæ senibus vil-  
les alienę ve sint, tum ex corporis totius affectu,  
cōſuetudinēq;, tum vitiis ipſius quæ insistant, in-  
telliguntur. Ex totius corporis affectu: nam opti-  
mi status corpus, sicuti in iuuentute ad vehemen-  
tissimos quoſq; labores maximē idoneū est, ita  
in senectā se habet ad omnes mediciores. Quod  
verò i mediocritate recedit corpus, ad pleraſq;  
id exercitacionis ineptū est. Quippe vitiōſæ fig-  
uræ thorax, in ſis quæ per vocem administratur of-  
fenditur. Per ambulatiōnē gracilia crura lædan-  
tur: de ceterisq; pari iudicio censendum. Quic-  
quid autem ex his parum ritē ab initio cōditum  
est, id exercitacione imbecillū redditur. Senibus  
verò quæ præcipua ad sanitatem exercitiū sunt,  
hæc per valēiores corporis partes sunt obeun-  
da. Sed habenda conſiderandis in primis est ratio.  
Nam quæ conferta sunt, vt minime lassantia  
quos exercent, etiā deſeſcit: sicuti ē diuerso, quæ  
insueta sunt, tum displicent, tum verò lassant.  
Porrò quibus operibus arte opus est, ea ne arri-

*Excessus am-  
plius contrariū  
corrigendum ex-  
cessu.*

*Medicina vīta.*

*Defectus ab æ-  
prima confusa  
sensu, tribus de  
causis cōſeſcit.*

*Senium siccum  
& frigidū, hu-  
mectantibus si-  
milis & caleſ-  
centibus com-  
pendium est.*

*Senium omne  
quodammodo  
postulat: sed  
neq; exercitiū  
vehemens.*

*Senium corpore  
plurimum som-  
ni post fricti-  
ōnem, post so-  
mnum matutinu  
nam adhibita  
frictiōne matu-  
tina post som-  
num a distributa  
vitalitate.*

*Senibus quæ  
est debet exerci-  
tatio.*

*Exercitacionis  
forma, quæ  
senibus, vitiis  
sunt, vnde sint  
conſideranda.*

*Membra infir-  
miora ab iuue-  
nitate, sicuti  
excessus de im-  
becillia.*

*Conſuetudine  
exercitacionis  
quæ si habenda  
rationem.*

*Sensu confectis laboribus sunt exorandi.*

gere quidem senes debebunt. Senes igitur confectis laboribus exercendi sunt, sed tamen vellemus eorum remissa. Tertio quo dicitur qui exercitacionis formis præcibit, ab affectione sumitur. Nam quos comitiales morbi, vertigines, grauis ophthalmia, vel aurium dolores ex leuoculatione male habent, his in clauo capite, dodoque aut humi volutatis, exercitacioni non expedit: sed rum ambulatione spepe, rum cursu mediocri, rum gesticatione in vehiculis circa sangatione vi. Simili modo quibus aut in fauces, aut in partes eas quæ circa collum aut tori caput consistunt, fluxiones procumbunt, minime quæ caput impleat exercitacione sustinent: sed sunt his omnibus quæ per crura geruntur vilia: sicut et diuersi, qui imbecillis sunt cruribus, his superioribus paribus exercitaci et fatius. At quorum medicum cruribus brachiorumque partes opportune offensionibus sunt: his quodvis exercitacionis genus idoneum fuerit, modo ne reliquarum considerationum vilia prohibeat. Quæ tamen circa thoracem partes sunt, magis inferiorum exercitacione inuadunt: quæ circa venter et renes, superiorum. Lien, ventriculus, iecur, & intestina, vt in medio superiorum & inferiorum sunt, ita se ad exercitaciones habent. Frictiones tamen paribus infirmis, quo tempore laborant, ad mouere non conuenit. Vbi tamen sunt, conuenit vel magis quam aliis, & potissimum siccas. Quiniam qui certa periodo redeunt quibusdam partibus dolores, hinc hant, non exigua ex eiusmodi frictione cautio est, præcipue si duas vel tres horas ante accessiones adhibita sit: firmantur enim ex partes, & obiectas fluxiones minus admittunt. Atq; hæc quidem omnibus ætatis communia existunt. Non exercitaci vero imbecillis partibus, solis sensibus suadeo: ex cæteris, quanto quisque remonior & senio fuerit: tanto illi magis exercitaci pars debet. Cæterum si crura gracilia fortiantur, ea sanè picari, modicè fricari, & cursu vi potius quam alio exercicio conducit. Si igitur neclatitudo, nec calor præter modum seniat, augeri ambulationem & cursum oportet, nec non alternis diebus picari. Sin aliquid eorum cernitur, crura sursum habita in lecto collocare cõuenit, & consummatione exercitacionis minui, atque inferne diffusum vi frictione. Vbi verò, his obrita, confectura fuerint naturalem habitum crura, ad eum quem capisti remediis vsum redibus: adhibitis & rotundis frictionibus, quæ durarum ac mollium sunt medijs. Aliquando etiam & pingui puluere prius inspersis cruribus, oleum insundes, & innox fricabis, si cui verò crassiora quidem crura sunt, brachia verò cubitis gracilia, huic omnia quæ per manus sunt exercitaci, sunt petenda: fugienda verò quæ cruribus obreunt. Frictiones tamen & picationes simili modo fiant. Porro qui imbecilliores sunt, his gesticatione potius quam inambulatione dimouebis: validiores vtroque genere exercitabis, ægeles ad secundam frictionem vtrosque, sed semper imbecilliores citius. Nam ubi imbecilliores sunt vires, crebra exiguaque frictione vtendum: ubi valida, rara multaque. Sic autem licet, senilis statum corporis, quoniam ex leui mento in morbum incidit, simili ratione ut qui

*Infirma partes dum laborant, non sunt fricandæ. Vt illis prædicta laboria per unctam viam acci, si duas vel tres horas ante accessiones adhibita sit.*

*Crura gracilia picanda est, et cursu exercenda.*

*Brachia gracilia & cubitis, & omni modo conueniunt. Gesticatione in quibus vt debet.*

*Imbecilliores autem vires, crebra exiguaque frictione vtendum: ubi valida, rara multaque. Sic autem licet, senilis statum corporis, quoniam ex leui mento in morbum incidit, simili ratione ut qui*

ex morbo conualecent, in victu esse curandum. Tunc ergo est imbecillo feni exiguum dare, tunc, sicuti Ammochus medicus solius est se cibare, qui circa tertiam vel ad summum quartam horam, panem cum attico melle sumebat. Post festum autem, iam exercitatus & iotes, prædebat mediocriter, primum iis sumptis quæ alium decit: post hæc maxime piscibus, vel quos fixatiles vocant, vel qui in alto mari degunt. Rursus in cœna a piscium vsu abstinent: sumptis autem aut farum multo, aut auenæ ex iure simplicis: quæ quidem victus ratione sensibus & membris omnibus integris ad extremum durant. Sciendum autem est, vt puerum vinum est aduersissimum, ita æque quamaphisimū senibus. Esto autem id ex his quæ calidioris nature existunt, qualia sunt in Græcia quidem Ariusum, & Lesbium, & Myrsin: ex Italiciis verò Falernum & Surrentinū. Proxima his sunt in Italia quæ Tiburnum & Signinū, ambo vetera: quando nouella diu fluitant in vetre. Secundo ab his loco sunt Adrianum & Sabinum, & Albanum, & Gabrianum, & Triphiliū: præterea omnia Aminga quæ in Italia nascitur, & circa Neapolim & in Tuscia. Ergo de his modice antiquitatis bibendum sensibus est, vtique quibus valentius caput non est. Quibus autem est, his & Falernum, & Surrentinū, & Ariusum, & Lesbium, & Myrsin, & Tmolites, idonea sunt. Huc autem dirigi omne consilium debet, vt vinum ipsum sit substantia tenuissimū, atq; fusilo colore: quanq̃ pallidum cõmodum etiam existit. Calidissimū autem vinum, si colore speciosus, est ssaum: minime vero calidum, album. Quæ tertia inter hæc sunt, prout altervtri magis accedunt, ita vim eius exhibent. Vnde igitur illud maximū sensibus cõmodum ex vino accedit, quod omnia eorum membra calefacit: alterum, quod per vias serum sanguinis expurgat. Quæ omnia præstat tenue simul & ssaum vinum. Quæ verò ex pallidis aut ssauiis vinis substantia pinguis sunt, hæc & sanguini augent, & corpus nutrit: quo fit vt ea vilia sensibus interdum sint, vtique quo tempore nec serosam humiditatem in venis habent, & ab liberalis desiderant. Cæterum quæ diu in ventre morantur, vt crassa simul & alpingenna vilia, eorum sanè nullum aptum est feni. Si quis ergo senum dulci vino vi a balneo Velit, vbi manè comederit, huic optimum Fastanum Falernum fuerit, aut aliquod illi simile. Possunt etiam vinis iis vi fenes, quæ melle conduntur: maxime ubi suspicio est prociendi calculi in renibus, aut podagre, articulare morbi impetus futuri. Verum quia obstructio a cibus crassius atq; tenuius succum glegenibus, difficilior curata est ea quæ a vinis procedit, ideo cauendum sensibus est a multo alic, aut casei, aut ouorum, aut cochlearum, aut bulborum, aut lentis, aut fuisse carnis est: multo magis ne angustarum, aut ostreorum, aut cartilaginorum, aut thynorum, aut certarum visum frequentent. Sed neq; ex carnis crumina, caprinæ, aut bubula est vilia, nō modo sensibus, sed neq; vili ætate. Quilla verò iuuenibus quidem nō malus est cibus. Sensibus tamē, nec ea est cõmoda: atq; hæc etiam multo minus agnina. Hædina verò seni nō

*Drum crebra & parum obediens est. Antichus quæ vsu vilius ratione, sensibus & membris omnibus integris ad extremum durant.*

*Vinum vt pueri est aduersissimū. Simi, ita quæ apertissimū senibus.*

*Strumina quælibet vili sunt cõmoda.*

*Vinum ssaum calidissimū, effusum, vt non minus calidum. Vinum quæ est modica præstat sensibus.*

*Vina iuuenibus da sensibus.*

*Seni a quibus cibi cauta debent. Carnes omnes ætate non vili, sunt crumina, caprina, & bubula.*

*Semibus salubri  
esse meliora re-  
centibus.*

*Senes quib. vel  
debent profici-  
diu ne ob-  
structiones in-  
cidant.  
Panis qualis ex  
hibendus senibus.*

*Bellaria esse  
abigenda a senibus.  
Melle corrigi  
præcavet pla-  
centularum.  
Panis quo par-  
rior fuerit, eo  
magis senes ad-  
versari.*

*Lactis effi ad-  
versari quidam  
dicunt.  
Lactis commo-  
dissima.  
Rafina enim  
bis obferre pla-  
centiam ad he-  
betatem lactis  
medicatur.*

*Alimentum lac-  
tile.  
Capritu lac-  
tile.*

*Lactis officinam  
minime in ven-  
tre cogitur.  
Lactis quibus sit  
exhibendum.  
Vina senibus  
que conducit.  
Senilis corpus,  
partibus quilibet  
solida esse sic-  
cum et frigida,  
colligere tamen  
ea si pinguiss-  
e et ferre reco-  
mita, que sunt  
pergenda.*

incommoda est: præterea aures et quæ extra pal-  
des ac humina, stagnatque degunt. Salubra autem o-  
minia meliora recentibus sunt. Ergo assidue om-  
nia cavendum ab obstruentibus est. Quod si res  
cogar aliquando copiosius iis viti, pronius su-  
mendum medicamen Diacalamintiles est, aut e-  
tiam diatrion pepercon: aut piper album & red-  
actum in pollinem, cum ipsi cibis ac potione  
est miscendum. Sed & cepas escitare tunc expedit  
aliumque, si huic assueverint. Quod si post  
obstruentes cibos, ea quæ obstructiones aperit  
dederit, atque ab iis ipsis soluta alius sit, vitulif-  
me posttridie theriacem propinaveris, si civi &  
Ambrosiam, & Achanasiam. Iam illud patere arbi-  
tror, panem quoque his exhibendum, qui nec salem,  
nec fermentum, nec subsactionem, nec iustam coctio-  
nem desideret: non autem aut simlaginem, aut que  
ex ea sunt bellaria, cum nimirum viscera obstruit.  
Quippe nisi placitis que ex butyro & simlagi-  
ne sunt, mei assatam admixtum esset, nullus cibis  
omnibus hominibus, nedum senibus, magis ad  
versus esset. Panis itaque quod purior fuerit, eo ma-  
gis seni adversatur. Si quidem nisi multum iermen-  
ti & isalis receperit, diglignissimæque sit coctus,  
obstructiones in iccinore, licne, & renibus facit:  
maxime quibus in his visceribus valoris extrus  
angustiores natura sunt: pro quorū sanè diversis  
late contingit etiam, vt alii citra noxam diu lac-  
te nutriantur, alij gravitate in præcordiis ac ma-  
ximū pondus, dum vixit illo, persentiant. Noui  
autem quendam, qui ex lactis viti dentes om-  
nes perierunt, id quod ex de causa conngit mul-  
tis aliis. Porro lactis comoda sunt, ventris mo-  
derata desictio, succi bonitatis & nutritio: paucis  
ipsis quoque animalium, quorum lacte sumus vi-  
ritudinem parum ad hanc conferentibus. Nam si scam-  
monia, aut rishmalorum quopiam vescantur, cō-  
stat in lacte etiam laxandis vires inesse. Quare a-  
animalium quorū veluti optimi succi lacte sit viti-  
rus, neque acris, neque acuta, neque admodum auster-  
ra nutrimenta esse debent. Animal autem ipsum  
sit ætate florens oportet, habitusque inculpato cor-  
poris. Satisque fuerit alterum capram, alterū a-  
sinam esse, earūque lacte vicibus viti. Quippe asinæ  
lac tenue ferissimumque est: capre, mediocri substan-  
tia existit. Itaque hoc nutrit magis, illud omnino  
tutius est. Nam & si quando solum cum pane su-  
mitur, tum cinis subducitur, tum minime est sta-  
tulentū: sed neque in ventre cogitur, potissimum si  
prius salis aliquid & mellis immiseris. Lac tamē  
non omnibus exhibendum est, sed iis solis, qui id  
probe concoquant, nec vllam ex eo symptomā  
in dextra præcordiorū parte sentiant. Vina autē  
que calidiora sunt, & que ipsas vinas mouent,  
ea magis conducunt senibus. Cum autem senile  
corpus, quantum ad ipsas partes artinet, frigi-  
dum siccissimumque sit, facile autem serosus & pingui-  
ssis excrementis, ob vixit infirmitatem, implea-  
tur, hæc quidem purganda sunt, solidæ autē par-  
tes calefaciendæ simul & humectandæ. Iam quod  
moderato motu & somno senes indigent, satis  
magna documenta sunt, quod victus eorum con-  
silium dirigi debeat. Quare si quando propter  
putitatem ab obstruentibus cogitur aliquid ex  
iis que incidunt ac disscentur petere, reuertendū

sine mora ad humectantem victum est: atque alica  
ex melle, cui aceti aliquid mistum sit, aut ex mul-  
so, vino ve Falerno exhibenda: aut lacte vtendū,  
aut prisana bene cocta, quæ piperis pollinem ac-  
cepert. Ita verō & marum hici, præ ceteris auto-  
malibus fructibus eligendi sunt, si cū hyeme  
cærigæ. Panis autē præparatus sic viti dicitur ex  
hibeatur. Sed vinas quomodo moueri cōuenit,  
nō per pharmaca, sed apio, et melle, vinisq ad id  
facientibus: ne enim alium solvere, potissimum  
oleo ante cibum absorpto, atque oleibus ex oleo  
garoq ante cibum assumptis. Quin & sicus, prun-  
is, aliisq id genus que ætate autūnōq vigent,  
soluntur nonnullis aliis. Hyeme verō tū caricis,  
tum Damascenis prunis, aut elixis, aut in mullis,  
cui plusculum insit Attici mellis, maceratis. Lon-  
ge autem ad desiccandū alium Damascenis Hi-  
spana præstant. Oliuas etiam ex muria præsume-  
re aliquando licet. Alio viti verō (quod multos se-  
num, quibus sicus viter est, facere video) haud  
quaquam sumi fuisse, nisi maior aliqua ne-  
cessitas urgeat. Quod si biduo astrictus venter  
tertio die nō soluitur, sit eo tempore fuerit mer-  
curialis herbam, & mannā brasicam, & cui-  
cum in prisana, dedisse. Similiter & terebinthæ re-  
finam, nucis ponticæ magnitudine: aliquando  
duarum triumve. Quippe non modō alium solu-  
ere citra noxam potest, sed etia viscera omnia,  
iecur, lienem, renes, pulmonēq abstergere. Vi-  
tatiū autem prædicta exhibere oportet, tum vti  
tō id medicamentū quod ex caricarum enicis,  
& pelliculis exutorum torurum, pari mensura  
constat. Sumere verō cōuenit duarum triumve  
caricarum magnitudinis modum. Cæterum nul-  
lum eorum, que dicta sunt exhiberi admodum  
copiose debet. Si quidem nonnulli in præsentia  
gaudent, si copiosius desiderant. Verum quan-  
tū magis sunt vacuati, tantū his venter sequen-  
tibus debet magis astringitur. Quo fit vt ipse,  
si qui sunt quibus in diuturnis morbis venter si-  
statur (contingit enim id post longum morbum  
in conualescentia) iis alium ducam non acris  
bus per inferna insulsi, sed tantū oleo: id quod  
sanis similiter viti est. Omnis porro affectionis  
corporalis pro videntia, in duobus consistit, nem-  
pe propria eius internoscenda essentia, & mate-  
rie prædictiorum viribus. Vt itaque in propo-  
sito nunc senio, qui scilicet peruenit senectutem  
esse siccum & frigidum corporis temperamen-  
tum, annorum multitudinis ratione proveniens,  
si quidem que humectant pariter & calfaciant  
prædictiorum materias norit, si idoneus senium  
medicus fuerit. Quadruplex verō materię ge-  
nus cum sit, que iuuuatur, que geruntur, que  
educuntur, que foris admoventur: vniq ex singu-  
lis eligere oportet, que calefacere humectareque  
possint. Quod autē ad exercitia pertinet, vt iuue-  
nibus ea murtare que nocent, tentandum est, etiā  
si à quæris hīs maxime insueverint: siq vilius est  
senibus consueto opere exercitari, vel si modice  
proxium sit. Sicut verō senium ipsorum inter se  
non parua differentia est, ita & eorum qui na-  
tura sicciore frigidiorēque sunt, si ad medicorem  
statum cōparet, non parum intemperie di-  
crimen inuenias. Atque humectare quidem hos  
cale-

*Semibus viti  
humectantibus  
esset.*

*Piperis materis  
congruere senibus.*

*Senibus viti  
& alium quib.  
medicamentis  
atque cibis ad-  
versanda.*

*Damascena  
pruna.*

*Oleum  
aliis viti in  
probat Galen-  
um in senibus.*

*Venter solutus  
iis.*

*Terebinthina  
soluit alium  
abstrigereque  
viscera.*

*Quædam  
medicamenta  
caricis et eni-  
cis, alio soluta  
de comedum.*

*Venter tamē  
magis astrigere  
sequenti tempo-  
re, quā magis  
fuerit vacua-  
tus.*

*Chylus ex solo  
oleo ad desicc-  
andū alium com-  
modissimus  
esset.*

*Afflictum cor-  
poris prædicta  
tū, in propria  
eius tempera-  
da essentia, et  
vitiis prædic-  
torum consistit.  
Senium quid.*

*Materie reuer-  
sionis quadruplex  
genus.*

*Senibus dis-  
crepanda que hu-  
mectant et cal-  
faciunt.*

*Senes exerci-  
dia conueto ope-  
re, vel si modo  
ei doctrina sit.*

calefacere, non venientia dicitur tamen eos, qui per atatem maiori exercitio ferendo sunt. Conducit utem ad certiorē affectū uxoriam, cum etiam consuetudinis, tum causarum quas procaraticas vocant, confiderantur. Qui vero affectum exatē norit, facile aduenient remedia, cum contraria contrariis auxilio sint. Male itaq; affecto corpori, semper contraria: optimi se habent, viribus salubria exhibebantur. Quinetiam temperies ipsa, quæcungq; salubri in sanitate fines subsistunt, si corrigere studebis, contraria quodammodo victus ratione curabis: quod tamen per multum sit ocium. Nam si in negotio sine, similibus vitiis, potissimum cum ira fuerint corpora afflicta. Atque hæc tenus male affecto corpori contraria exhibebimus, quoad primum statum sit consecutum. Ceterum ea vitiis ratio quæ temperies corrigit, longius plerumq; procedit, propterea quod similibus maioribus ex parte morbis tentatur. Facilius itaq; quicquid imperatū est, ad propriam naturā redit, quam ad optimū temperamentiū accedat. Quippe id cum in medio omnis Intemperantia sit, quicquid conueniente naturæ flux morbo laborat, ab eo longius abest: qui dissimili, minus. Ergo nec ad iustitiam ipsæ, tamen parus sint, dissimilitudinis adhuc cibi corporibus, sunt mutandæ. Cum autem contrarij inter se maioris hominum corporis status sint, certè mirandum non est, nonnullos vilitatem ex contrariis percipere.

At proinde si fieri non potest, ut vnum calopodium ad omnes homines sutor accomodat, ita nec medicus vnam omnibus vitiis speciem quæ conducit, potest accommodare. Nonnullos inquit nomi, qui si triduo se ab exercitatione abstinuerint, protinus egrotabant: alios in perpetua quæste degentes, tamen secundam tuen valitudinem: atq; horum ipsorum alios minime lazare: alios nisi laissent, alio feberrare: si veni. Prementem Myrsinam, cui omnium ob excrementa fumida sub cute collecta cohibitaq; febris excitabatur. Quare naturis cuiusmodi balneum est vtilissimū, id modō quod humidum est, et tunc etiam quod humectet, idipsum dulci humore. Facillimè igitur id quæritur, ratione iuvenit: fidem verò eius experientia cōprobat. Porro ubi Hippocrates ait, labores debere ipsos cibos precedere: illic agit de ordine exercitiorum & ciborum, nequaquam illud asserens, quod omnibus hominibus hæc ambo cōducant, sed quod us quibus exercitatio expedit, præcedere exercitatio ipsos cibos debeat: cum nimirum in lib. De morbum vulgo grauioribus, calidis naturis quæcūq; dum esse suadeat, hoc est, a vehementi motione cauendum: quando quidem ex ipsa in totū desidia, nemō inquit aditus est. Quibus itaq; mordax calor à natura est, adeo ut fumida gignat excrementa: us balneum salubre est, tum moros qui exigunt & lentus sit: multus autem & celer, aduersus est. Quare si bas non semel modō, verum etiam bis lauen die cōducit, potissimum estare. Esse quoq; boni fucci nutrimentū, in quo nihil sit acre. In sole aut veran, & iraci, & multi corpirum, he inimici sunt. Qui diu esse ab his naturis sunt: aut aut sunt frigidi & humido tempera-

mento) valentiores morus desideret, ac viciū in quo suppet quod tenuem succū faciat. Hi vero, nec si in sole exercites, laudemur nec enim si bat neq; abstinent. Porro senescit celeriter, quæ corpora frigida & sicca sunt. At humidum & calidū temperamentiū est statio nō vitis obnoxia. Iam verò omnes intemperatas naturas corrigere quidem contrariis oportet, dum plane in ocio sunt: lenare autē in libris, dum per negotia vacare libris nō possunt. Ceterū plus laborandi est propter humiditatem corporis: præceteri mori non vitandum, propter calorem. Ad hæc, cum ex signis re vitæ ratione ad exercitationes & balnea transferet, alio fluxionū tentantur morbis, nisi prius sine vacans, quim exercitationes ad eam quare antevitetur per veris vitiis sanguinis detractione oportet, aut per incisionem venarum, aut scarificationem melleolarum. Quod si ita maduit recuente, purgandi medicamentis sunt, non simplicia facultatis, sed quod trahere statum bilem, & putidam, & serosa excrementa possit. Viam autem frigida & sicca naturis vtilissimū esse prius dictum est: circumcendū verò in eis, qui omnimodū calidi propter intemperiam existunt. Nam qui media temperie sunt, vix plurimum in se sunt naturalis calor: ac tali quidem naturæ medicorū dandum est vitium, si viti ipsa quoq; medicorū est. Sed cum triplex genere sit calidi temperamenti differentia: vna, in qua reliqua cōtrarietas (temperie que in homido & sicco cōsistit) mediam temperiem lenat: altera, in qua sicca subfalsat: & tertia, in qua vni cum calido est redunda humiditas: at quidem quem primo loco diximus, tantum albi, tenuis, atque diluti vini offeremus, quoniam ipsa à summa intemperie recedit. Reliquæ autē differentia nō curat, cum summe caliditates existant. At quod calidissimum vinum est, id frigidissimis Intemperantissimis est vnde: reliquis autem quod d porione respondet. Hæc velut dictis muli de his sunt, qui mediam senectutis ætatem agunt.

## GALENI PERGAMENTI de sanitate tuenda, lib. VI.

Cum autē anterioribus quinque libris, quod pacto quis cum qui optimo corporis sit statum, ab omniq; cuiuslibet negotio immunem, propriæ tantū valetudinis indulget, d primā inuente ætate ad vltimam vixq; senectutem in sanitate custodias, tam abvnde docuerimus: nunc si ad ad eos venimus, quibus per negotia esse, bibere, atque exerceri debet tempore haud licet; præterea ad eos, qui statim ab ortu sunt vixq; durat morum corporis statum sortiti. Vitiōsi autem corporum statum, genere duplices sunt. Alij siquidem vniuersas similes partes similes habent intemperatas: alij vero dissimiliter, inæqualiter. Quinetiam in istis: nec aliū partium compositione, quædam æqualiter, quædam in æqualiter condæ sunt. At primū quidem dicam hæc quoq; qui statum corporum sint maxime valetudinarij: si vni, qui maxime sanus esset, ostendi. Vtrum is vnus erat. Et enim si omnium rerum genere, quod optimum est, id vnum est.

Naturā frigida ac humida, quæ cōuenit, senectutis colerit corpora quæ, Intemperata nature dam sunt: ac, cor rigenda circumspecta, si frigidissima sunt, dem sibi vacare nō possunt.

Intemperata nature dam sunt: ac, cor rigenda circumspecta, si frigidissima sunt, dem sibi vacare nō possunt.

Calidi temperamenti differentia triplicis.

Calidi temperamenti differentia triplicis.

Calidi temperamenti differentia triplicis.

Calidi temperamenti differentia triplicis.

Calidi temperamenti differentia triplicis.

Vnum vixq; esse, quod optimum est.

Affectu cogniti, facile in vitiis remedia.

Contraria conuenientia auxiliis esse. Sane esse conuenientia similibus.

Intemperies quæ uariis sunt: ita fieri similibus per vitiis quidem uariis: per laboribus autem similibus. Intemperies maior ex parte, uariis laboribus.

Intemperies quæ uariis sunt: ita fieri similibus per vitiis quidem uariis: per laboribus autem similibus.

Affectu cogniti, facile in vitiis remedia.

Intemperies quæ uariis sunt: ita fieri similibus per vitiis quidem uariis: per laboribus autem similibus.

Naturæ quibus se vtilissimū.

Naturæ quibus se vtilissimū.

Labore in quibus, debet cibos precedere.

Calidis naturis quæcūq; dum esse suadeat, hoc est, a vehementi motione cauendum: quando quidem ex ipsa in totū desidia, nemō inquit aditus est. Quibus itaq; mordax calor à natura est, adeo ut fumida gignat excrementa: us balneum salubre est, tum moros qui exigunt & lentus sit: multus autem & celer, aduersus est. Quare si bas non semel modō, verum etiam bis lauen die cōducit, potissimum estare.

Calore morbo o præterea quæ obnoxia.

*Vitiosa esse plurima.*

Vitiosa verò plurima sunt. Eorum autē quæ per omnes partes familiæ habent intemperantiam, maxime improbanda sunt, quæ validā habent ipsas intemperantias, ac potissimum frigidas simul & siccas. At eorū quibus inæqualiter se habent corporis partes, illa quidem maxime morbi patent, quorū principes maxime partes contrariis temperantibus affectæ sunt. Minus obnoxie valuerunt sunt, quibus ignobiliores partes ita se habent. Afficiuntur autem interdum partes per consensum aliarum, atque consorti lege. Primum ergo de his verba facit, qui æquali sunt intemperie id est ab iis qui præcalidi sunt, auspiciatus. Dictū autē alibi à nobis est, nō posse diu intemperiem vni solam per se durare: quidō ipsa sibi ipsā alteram ex necessitate afficit. Sciendum etiam est, temperiem optimā corpori in adolescentia accedere: reliquis autē ætates, hæc deteriores eunt: necnō corporales quidem actiones, præcipuas adesse pueris: animales autem, et ætati, quæ à pueritia ad remissionē vsq̃ succedit. Nec tamen est hæc ætates annorū numero circūscribere: nisi forte in latitudine quadam. Pubescente quippe incipiunt aliqui, vbi expleverunt quatuordecim annū. Quidam vno post anno, aut etiam amplius. Inimū præterea remissionis nōnulli habent statim à trigésimo anno: nonnulli post quinquagésimū. Ac robur quidem omnibus minuitur, post ipsam summū vigoris ætatem: nō tamen hi sanitatem amittunt, tamen minus hanc quādam sentia laudabilem habent. Nam cum latiusdō sanitatis sit amplia, nō solum vsque ad initium senectutis, verum etiam in ipsa senectute tota (quæ quibusdā naturalis esse morbus videtur) sani dicuntur homines, sanitate senectutis congruente: quæ tamen, sanitas absolute nō est, cum actiones in senibus nō sint perinde validæ & firmæ, vt in iis qui ætate florescunt. Quare horum sanitas, propter ipsam actionum virtutem in tegra est, & de qua queri non possit: senum sanitas, querimonibus non vacat. Quamvis in im omnes actiones habet, nullam tamē validam possidet. Porro corpora quæ à prima statim genitura pronū ad morbos ita turn sortita sunt, ea sanē ad senectutē nunquam perveniunt: aut si quando pervenerint, vno saltem diutino morbo penitus laborant. Qui autem salubrem viuendi rationem ignorant, credibile etiam est, hos citius quā pro naturæ ratione interire. Sed iam ad illos cōvertamur sermōnem, qui æqualiter per omnes partes, calidius sunt sortiti temperamētū: ceterum in humiditate & ficitate se habēt modicē. Ac talis quidem corporis natura, ab initio statim magis apparet sana, quā quæ in vtriusq̃ oppositione est vitiosa. Citius quippe edet dentes, & citius articulatam vocem, ingredieturq̃ citius, & singulis annis ad portionem increcet. Postea verō q̃ adolescentia annos compleverit, exinde ad remissionem vsq̃ manifestē apparebit calidior, ita vt tum morbis, tum symptomata quæ à calore oriuntur, facili sit obnoxia. Multus hanc calor dum humorem absumit, ficitus reddit temperamētum. At cum florescit iam ætas item calida sit, nimirum composita eorum temperies, calida si-

mul & sicca erit. In talibus autem temperamētis, bilis abundare tum pallida, tum flava solet. Sunt verō, qui hæc natura sunt, ad ætatem vsque adolescentie, similes educandi iis, qui optimæ sunt nature. Si igitur bilis ipsa ventrem superiorem petat, per vomitum expellenda est, post excoitationes aqua tepida propinata: nam vino tunc vti nō est, nisi difficulter, vomant ex aqua. Quingē custodiō quidam naturæ sunt, quibus vsq̃ vinum dulce, vbi equam præbuerint, est concedendū. Præterea etiam magis, vbi temperamētum eorum ab initio calidius ficitiusq̃ fuit, vomitū petenda est: Quin & exercitari his vtilis est, non acutis exercitationibus & præugetis, sed potius tardis, & mollibus. Sunt enim omnes qui hoc statu sunt, graciliores. Acutæ autem exercitationes extenuant: lenæ implent corpus. Sunt verō ex iis qui impense calido temperamento sunt, & qui exercitii prorsus nō debeant: sed abundē his satisfaciendū bulatio, balneū, & mollis ex oleo frictio. Quos etiam iubar à cibis balneum, nisi in dextra præcordiorū parte dolorem, tensionē vbi aut gravitatem sentiant. Erenim quidam eorum incredibile est, quā etiam obesi sint redditi ex tali vitæ ratione. Antiquū autem vinum iuueniū iis est: album verō & tenue, idoneum. At si quando eorum quæ dixi aliquid circa dextra præcordia sentiant, illic dandū aliquid est eorū quæ ietur obstructū liberent, abstinentiū ab iis cibis, qui crassum efficiunt succum: id est donec affligus seles remiserit. Vile sanē fuerit & liquore in quo macerata sit abstinētia coma, offerre præterea, tum ex ea, tum ex aniso & amaris amygdalis cōficatur: quod etiam bibere est oxymeliter præstat in eo tempore, quod inter surgendum à somno, lanondūq̃ intervenit. Non iuuile est & medicamentum diacalaminthes, ex oxymeliter: cuius tamē asiduum vinum cauere oportet in biliosis temperamētis. Porro alimēti species, si quis hoc temperamētū vertere in melius studet, & traxia esse intemperantia debet. Ceterū qui vteratur in febribus ciuilibus, & multis negociis distringitur, huic tutius est, vt nec teneri suum temperamētum mutare, sed similia sibi nutrimenta assumat. Nutritio siquidem fit, cum is qui nutritibus corpori quod alit, assimilatur. Citius autem assimilantur sicca siccis, & humida humidis. Quibus verō æquale temperamētū est, quāto iucundius fuerit quod edunt, tantō vigili magis nutriens. At qui inæquale temperiem sortiti sunt, iis diuersum est, quod assumptum iucundum est, ab eo quod cuius est particulæ idoneum. Duplex autē est, id ipsum quod cuius cōueniens dicitur. Aliud quippe fecitū simplices quæ litates, aliud secūdo totam substantiā esse cōueniens dicitur. Atq̃ illo quidem vitmur, dum aut murat intemperiem per oīci volumus, aut seruare, propter negocia. Hoc autē quod tota substantia maxime idoneū est, sola experientia discitur, habetq̃ vim non vulgarem, ad mutationē alimentorum in substantiā animalis nutriendi, potius substantiæ conuenientia. Funt autem & qualitatibus cōuenientia, vsq̃ si seruare temperamētum studeat: humidis naturis humectante cibo

*Bilem abundare in calido & sicco temperamento. Bile purgat quomodo sit melianda.*

*Calido & sicco temperamento præditi, carum molliūq̃ exercitii sunt conueniēda.*

*Mollitudo quæ in vtriusq̃ temperamento præuenit.*

*Obstructioni obferre oportet leni abstinētia, aniso, amaris, aut amygdalis. Lenē medicamentum diacalaminthes.*

*Occupati viri, non debent temperamētū mutare. Nutritio fit, cū nutritus ab eo alendo corpori assimilatur.*

*Clarioris cuiusque dupliciter dicitur, aut secundum qualitatem, aut secundum totā substantiam.*

*Temperamenta esse seruanda si molliūq̃ vbi alio modo claretur.*

*Intemperiem vni per se diu durare non posse.*

*Temperiem optimam soli ad adolescentiam accedere.*

*Animæ corporis esse præcipuas partes, ut animales, præuoluntatis vsq̃ ad dedicationem.*

*Articuli citius sibi annos annorum non posse.*

*Robur inueniuntur totiusque vigorem accipere.*

*Sanitas latiusdō est amplior.*

*Sanitas senum non est sanitas adulescentium.*

*Corpora ab initio possumus constituta, nō pervenire ad senectutem: aut citius quæ semper morbo tenentur.*

*Calidiori ab eo quæ recte hoc medicatur aut ficitatis temperamētum quæ alius.*

*Calidus, frigidus, temperatus, et per contraria saluberrimus.*

cibo maximè quadrante: sicis verò eo qui ficit: sin alterare placet, contrariis. In eo verò qui est in calido frigidove ad intemperatiam lapsus: contraria dare imper expedit: cum efficaciores quàm quæ ex ficitate & humiditate consistunt, eiusmodi intemperies sint, facilièq; similibus nutrimentis in morbosam intemperantiam abeant. At si sicus quodvis membrum efficiat, nihil manifestè lædes. Pari modo nec si humidiori suam ferues humiditate. Evidenti verò argumento tibi ætates sint. Quæ enim à prima consuetudine, ad lescientiam vix habentur, humidissima ius caro est. At senili ætati, tum caro, tum ceteræ partes admodum sicce sunt, licet mediæ capacitates su perflua humiditate impleantur. Corpus itaque iuile calidius, si quidem in prima constitutione medium ficitatis humiditatisq; habitum obtinuerit, omnino id in incrementi statu siccius efficitur: idq; tum magis, tum celerius, si etiam natura erar ficitis. Sed & senectutis idem citius, quando vix ad summum incrementum pervenit citius. Hi ergo in præcipui vigoris ætate potissimum humidum victus rationem postulant: quæ humiditatis cibis & balneis, tum exercitio nam, quæ prevaleat & mulex sint, abstinenda, perficitur. Prodest his & frigide potio. At Venus sicce temperantis inimicissima est. Vitandæ quæ maximè hæ sunt exsiccationes, & lassitudines, & solitudines, & vigiliæ, & motus omnis celer. Iracundia verò, cum biliosas naturas maxi-

*Vitæ dicitur.*

*Calidiores, frigidiores, temperatius, et per contraria saluberrimus.*

accendat, acutas febres parit: Eatenus autem intendere, remittere speciem victus oportet, quatenus supra naturalem habitum aucta dimittatur sunt temperamenti elementa. Accuratur quidem temperamenti contraria victus ratione: custoditur simili. Sanæ calidioris humidiorisq; nature in puerili ætate, fluxionum, putredinis, & redundantiæ morbis tentantur maxime. Quo magis & pluribus exercitationibus, & exacta ventris concocione indigent. Itaque & ante cibum bis terq; hi si lauent, & calidis sponte ortus vntant, maximum inde cōmodum sentient. Quippe hac dirigitur in hæ consilium, ut ipsas animalis particulas servemus humidæ. Quæ res omnis temperamenti cōmunis est; si modò contraria ratio omnium animantium corpora citius ad senescitum perducit, ipsaq; est, cuius calidus omne genitū corpus mortale sit. Nam cum non liceat corpori effugere progressum ad ficitatem, idcirco fescere nobis, corrumpiq; est necesse. Enitanti enim maxime diuturnum, quicquid erit minimè licetum: Ac proinde qui maxime humidi sunt, & maxime sunt longævi, & saniores, ubi corpus ad robur pervenit, plus ceteris fruuntur: & reliquis qui parem ætatem agunt, valentiores ad extremum usque senium perferunt. Nam tamen si humidū temperamentum in principio decessus sit, tempore tamen reliquis præstantius evadit. Quo magis qui tendit huius corporis sanitati præstatur, excretio: omnium recreamentorum oportet maximum operam navet, tum balneis ante cibū plurimis, tum exercitio, tum apoplegmatis & purgationibus: sed ante omnia cibis boni succi, necnon vini potione, quod vitæ promouet,

*Corruptum, et per contraria saluberrimus.*

*Laetitia, et per contraria saluberrimus.*

At frigidior temperamenti tres summæ differentie existunt. Nam aut modice se habent in altera opposita: aut altera qualitas in hæ exuperat, vique vel ficitas, vel humiditas. Pessimam tamen merito sicca temperatura est: quippe quod temporis spacio senescentibus accidit, id ius statim à principio contingit. Ergo istos humectare calefacereq; oportet: quod fiet exercitatio modica, & nutrimento humectante, & calido. præterea calidi vini potione, & somno liberaliore: illud interim providentibus nobis, ut quotiens excrementa omnia expellantur. Venient autem adversissimam esse temperantiam siccam, iam diximus. Quare adversari eam ius qui præter ficitatem sunt quoq; frigidi, etiam verum simile est. Nam innoxia venus ius tantum est, qui calidi sunt & humidi, tum verò qui genitura naturaliter abundat. Malum verò & illud frigidum temperamentum est, quod cum humiditate coniungitur: maximèq; est id fluxionū morbis obiectum. Succurrat huic & balnei abstinencia, & exercitio, & tenuiori victus, & vniū omnibus quæ modice calefaciant. At qui frigidi natura sunt, ceterum in sicca humidisq; temperatura se modice habent, minus q; vel ad sanitatem, vel ad corporis robur sunt inepti, quàm qui sunt in illis intemperatis. Horum igitur excitare, firmareque calorem expedit: in humiditatis verò ficitatisq; specie, tota victus ratio fit media. Nunc autem de his dicamus, quibus corporis status est inculpatus, vivunt tamen vitam servilem, aut ne gocius implicatam: sed ita, ut ad extremum dies liberè possint sibi vacare. Salubris & inculpatus corporis status, in latitudine intelligi debet, sicut & ipsa sanitas. Cum autem ad extremum dies dico, distinguendum est: circæ solstitium æstivum, hybernūq;ve, an circæ æquinoctia, dies ipsa sit æstivitas. Roma: liquet maxime dici ac noctes paulo maiores quādecim æquinoctialibus horis sunt: cetera minimi, paulo intra novem. In magna verò Alexandria, maximus dies quatuordecim horarū est, minimus decem. Ergo qui in brevissimis diebus & longissimis noctibus à ministerio sole occidente redit, huic fricari per oculum, & lavari, & modice dormire licet. Nemo autem tam infelici est corpore, qui in maximis, & etiam in minimis diebus, non possit aliquid medicorum agere. Ceterū qui exercitationi nō assueverint, sed circa fricitione protinus perfuncti oleo cōsueverint lavari, satis per se transpirabiles, ita ut bene assidue, nec longo tempore ægrorent, in ad alia consuetudine transferendi non sunt: sicuti nec vili alii, nisi qui iam longo tempore ægrotauerint. Aegrotare autem solent, aut redundantiæ, aut succi vitio. At si quid redundantiæ vitis ægrotaent, succi ad cōvenientem modum sunt revocandi. Sin succorum vitio, ad meliorem frugē reducantur oportet. Vbi igitur quod exhalat à corpore, minus est ius quæ accepit, redundantiæ oriri morbi solent. Quare prospiciendū est, ut eorum quæ eduntur & bibuntur, respectu eorū quæ expelluntur, servetur conveniens medicocritas. Scrubatur sanè ius modus, si ponderetur à nobis in vtriusq; quantitas. Detrahimus porrò de nutrimenti vel quantitate, vel qualitate, vel etiam

*Frigidum, et per contraria saluberrimus.*

*Sicca, et per contraria saluberrimus.*

*Humidum, et per contraria saluberrimus.*

*Salubris, et per contraria saluberrimus.*

*Dies maximus, et minimus, et per contraria saluberrimus.*

*Redundantia, et per contraria saluberrimus.*



vtrag. Ac quemadmodū de quāsitatē dematur, norum est. De qualitate denitur, cū vnus maxime altenus cibi loco, alius exigit utrumq; apponitur. Qui igitur celeriter norabilem abvdatant acruent, iis de vtrag; qui nō celeriter, aut nō norabilem, iis de altera demptum esse fat fuerit, vera videlicet homo ipse potius voluerit. Qui verō vinoſos congerit fucos, nō ten pende vt qui redundantiam cogit, vñ tantum

hatur, aliâque quæ ex cnico vel epithymo cōficiuntur. Porro si quisque sunt affectus, etiam vomitus ante cibum ex vini dulcis potione conducit: nec non alui subductio, ex conveniunt intervallo, medicamine dialofo (quod amarum vocant) exhibito. Nam si lōgo tempore vinofum succum augeri finas, gravis quispiam ipsis incidit morbus. Confluendum verò his est, ne quod fumidum, aut male olens, aut facile corruptibile nutrimentum accipiant, sed qui boni succi sunt potius eligant. Ars quippe quæ sanitatē tuetur, et qui libi paruerint, finissimam sanitatem promittit: qui verò aut voluptate, aut ambitione victi, parere recusant, si perinde est, ac si omnino nō esset. Iam verò, qui nimis graciles fuerint, foret enim accidere nonnulli gracilitas ob frigiditatem et siccam intemperantiam, nonnullus propter digerentis in corpus, vel nutritiæ, vel ambaram facultatū naturalem imbecillitatē illius ex pice cōducit maximē. Dein vnguētū illud quod dicitur par dicitur. Prodest tamē si ante balneum manu medioctriter molli corpus perfricas, quod rubore contrahat: deinde dura frictio ne, nou multa, curem cogens, densam eam duritiæ efficias. Ab his, si medioctre exercitatio ne visum, ac lorum, citra longam tamen in folio moram, hominē astringas, moxq; vngas oleo exiguo, & cibum offeras. Quippe studium in his est, vbi bonum sanguinē in corpore molem attraxerit, vbi tum nutriticem vim firmes, tum ne et quod attractū est exhalat, proficiat. Ac firmatur quidem nutritiæ vis excitatio in carnis calore. Non exalabit qui in has sanguis attractus est, si oleo vnxeris. Vpote quod emplastici medicamētū vim habet. Quod si atas non reclamet, etiam si frigida lautione vna cum predictis vtatur, magno fruetur cōmodo. Contrā verò in iis qui immoedici sunt obeli, minuenda digestio est, augenda verò corporis exhalatio. Minuetur potest digestio, assiduā ventris desectio. Corporis autem exhalatio inaugebitur celerī exercitatione: cuius generis curfus est: præterea vnguētis in quæ evaporandi vim habent, fricando ipsulimus. Frictio tamen ipsa esse mollis debet, ac quæ laxum corpus efficiat. Quæ rari one præpinq̃ue quedam paruo tempore ad medioctrem carnis reduci. Sed & alias quæ totum occupant corpus intemperantias, simili methodo corrigere conuenit: primum, coram quæ agi expedit, invento scopo: mox materiæ quæ ipsa præstare queant. At iam ad inæquales corporis status accingor. Sanē inæquales status trifariam sunt, prout compositio corporis nostri est triplex. Vna ex primis elementis, ex quibus constant similes partícula. Secunda ex iis ipsis similibus, ex quibus infirum mentalium compositio consistit. Tertia ab his, compositio tonas corporis ex ipsis instrumentalibus. Ac facillima quidem, tum ad discernendum, tum ad curandum, tertia est: difficilior secunda: maxime lubrica est prima. Cōmodius ergo à tertia incipitur. Quare exordiarum dispositionem à capite, quod intemperatæ naturæ sit, ad pedē multa excrementa gignat, vnde laxa sublesta membra cōtingat, in quodcūq; excrementa decubuerint. Ac promptissime quidem in os

Venerunt autem  
ceteros quibus  
censuerat.

Dietary

APTI fante  
 munda, in qu  
 fide, parum  
 forma sumam  
 famit atē pr  
 munitatē.  
 Circū illos  
 in de

Graciliter  
moder.

Naturale va-  
re et ratione  
firmatur.  
Omnis erroris  
prohibet ex-  
latamente per-  
cipitur.

Obiter efficitur  
differentiam in  
nocentiam, augmen-  
tam autem in  
halationem,  
Exhalationem  
moderantem.

in aqua salis  
trifurcata  
fieri.

Complexive  
corporate as-  
pect.

quida murem  
de quavis  
aut murem  
quavis, aut  
vitræ, facit  
dum sit.

Alui dicitur  
quibus sit an-  
nua et cetera.

Nacrimita vř-  
trum fideiſia,  
quibus ante a:  
liis cubes ſunt  
ingerenda,

Aphorismus  
vñ in eo qui  
est ventriculi  
imbrellis pos-  
sitens ad aliu  
dicitur eadem  
conducit.  
Apothepia  
vñ quibus et  
venit.

Exercitia post  
crapulam, quæ  
male solent  
producere.  
CAPITULUM

Obſtinationis  
remedia etiam  
ad curacionem  
facere.  
Oryzeli,  
Diatriam pepe-  
rem,  
Demerit aliū  
leniter Diſſo-  
lutum medi-  
camentum, & qua  
ex ſicu, & can-  
da, & epithy-  
mo conſtant.

Caput excrementum in quas partes solat de eadem.  
Larynx instrumentum est vocis, quo fit vocis fluxio, sicut et alia pars a dextra.

Tales vnde gignatur.

Calida in ventriculo fluxio quod dicitur, frigida in ventriculo fluxio quod dicitur.

Cista.

Caput proprium est, quo fit fluxio, sicut et alia pars a dextra.

Caput laboris, quo fit fluxio, sicut et alia pars a dextra.

Caput voluntatis, quo fit fluxio, sicut et alia pars a dextra.

Arteria quod dicitur, sicut et alia pars a dextra.

Idem cum quo fit fluxio, sicut et alia pars a dextra.

& nates excrementa impetū faciūt. Decidunt verō & in oculos: nullas etiam in aures. Sed excrementi in os decursum, tum gula excipit, tum aspera arteria, cuius summā pars ori coniuncta, quæ larynx dicitur, instrumentū est vocis. Ergo in larynx ab his quæ capite decidunt madefactus, principio quidem rauca vocem facit: procedente verò tempore parauit. Si verò longius etiam procedit malum, rotam admittit: quippe cum larynge, arteria quoque ipsa vnā humectat. Quod si acris fluxio sit, nō solum ad vocem ineptæ prædictæ partes fiunt, sed etiam grauissima eis erosio accedit, quæ & pulmo simul exulceratur, qui morbus tabes dicitur. At si in gulam & ventrem feratur fluxio, quæ quidem frigida est, in frigida intemperem corpora mutat: quæ calida, in calidam. Hæc verò etiam spacio exulcerat. Verū inter ista appetitū & concoctionē spernit. At frigida quidem fluxio tarditate concoctionis & cruditate, & acidus ructus creat. Quod si etiam corrupta sit, alimentū quoque vertit in corruptelam. Si verò inferius se noxa recipiat, & ieiunum, & colon intestinum affligit, tangitque vasa quæ in mesenterio sunt, per quæ sit in secur cibi digestio. Ac nōnullos quidem fatidium ciborum excipit: alios appetitū canina, aut etiam vinoſi cibi cupiditas, qualis est circa affectus in grauidis. Nec latet vnam quoque, & paritūmia, & parulides, & antiades, & erosiones dentium, & viceræ, & in ore putredines, hanc sanem quæ a capite in ipsa decidit, consequi. Sanius autem iō his omnibus est, ipsum mali ceu fontem prius tollere, caput firmādo, quā ad eorū curatione oīs conuertamus. Aut si id præ magnitudine naturæ intemperantia nō licet, saltem illi prospicere, ab ipsa scilicet vitæ specie, providentia indicatione semper accepta. Quibus igitur ex calida in temperie caput malè habet, hos frequēt balneo dulcis a quæ fouere expedit. Calidarum autem quæ sponte nascuntur, noxius his vīs est. Si quidem quæ ex iis sulfureæ bituminosæque sunt, ex propterea quod calefaciunt, inimicissimæ calido naturaliter capiti sunt: aluminosæ verò, quoniam angustos meatus claudūt. Solus autem iis sponte natus quæ dulces sunt (si tamen ipsis vtendum sit) vti citra noxam poterunt. Nam quod vtile etiā aliquid ipse præstare possint, hoc dicere nō perinde tūti est: quādo nec calidæ fortasse forent, si omnis calefacientis medicamentosæ virtutis essent expertes. Quibus verò caput vellemus calidum sitūduſque est, iis præstas æstatis tempore rosacæo perungi, quod ex rosæ in olei omphacini salis experti insectis, cōponitur. Sūt capita quæ propter arteriarū temperamentū in vertiginēs & capitis dolores incidunt in quibus etiam incidere arterias solemus. Sed hoc genus propolisæ artis limites egreditur. Quæ autē ex nimis acuto neruorū sensu (qui a capite ori, inter alia omnia ventriculi tequuntur) frequenter dolent, his sanè mederi, propolisæ artis officium est. Ponus tamē consiliū est id agere, quod minus huius modo incidant, curando ne aut biliosus huius mori in ventrem prorsus confluat, aut æceterissime inde expellatur. Atque ne prorsus quidē confluat cōsulueris, si citius cibum exlubas. Vbi

enim totius corporis biliosus temperamentum est, necnon imbecillus venter, nisi iis corroboretur cibo, defluunt in tum quas corpus accumulatur superflue sanies: ex quarū vapore dolores capitis, suffusiones, atque morbi comiales gignuntur. Horum itaque omnium vniuersa victus ratio ad frigidus potus, humidiusque mista est. Quod autem in ventrē cōstitit, id vomitione ac ventris solutione expellendū. Stomachus verò cibis quidem quoti die priusquam bilem cōtrahat firmatus. Purgetur etiā medicamentis ex maiori intervallo, absinthij coma, & compositione ex aloë, quæ picram nominant: quippe hæc quod altius in tunicas biliosæ ventris se recipit, expurgat: absinthio parum id præstare valente, vt cui vis infirmitatis detergendi astringendique, ac talis, quæ fordes tunicarū ventris detergeat: nō si quid altius in eo imbutū est, foras extrahat expellatque, sicut aloë. Quæ verò post hanc ventri extrinsecus admoventur vñctiones, ex modicè astringētes sunt: toci melinū, mastichinū, & nardinū. Ac æstare quidē potius melinū, hyeme nardinū, vere mastichinū sumendū. Est autē opulentiſſe mulierib. & quod præstantius nardino vnguentū sit, nempe soliatū: præterea quæ spicata vocantur, quæ ventrem & roborare possunt, & calefacere. Si verò nō modo caput calidam sanè transmittit ventri, sed etiam venter ipse calidam intemperie habeat, vñque refrigerantem tum ponione, tum cibo, semper vti cōueniet: atque eam qualiterem in his pro temporū anniratione intendere variè, ac remittere: nūquā tamen ad contrariū pervenire. Ad eundē modū si vtraque pars sit frigida intemperie affecta, illis calefacientibus et vtendū: variè tamē ea pro ratione temporū intendenda remittendaque sunt. Porro difficilis cōnexio est, quoniam vel in calidum ventrē frigida & pituitosa sanies defluit, vel iō frigidū calida. Atque huiusmodi altera semper expertus sum magis ad curandū rebellem: nempe in qua frigidus pituitosusque succi in calidū decidunt ventrē. Pessimus verò iō istatus est, si præter id, homo etiam ea natura sit, vt neque aloum facile solubilem habeat, nec vomere ex facili possit. Si verò pituitosus succus a capite iō frigidum naturā ventrem decurrat, facile his succurrat, si manē aliquod medicamentis diatriō peperon sumpseris. Sed & piper solum, præcipue quod album est, cōminutū, atque aquæ immixtum, bibere iis licet. At potio absinthij his aduersissima est, vt quæ pituitosum succū ipsorum ventri affigat. Sed neque aloë valde iis conducit, cum et biliosū trahendi humoris facultas sit: eoque excogitata salubriter et cōpositio quam picram dicunt, quæ acrimonia caloreque eorum quæ in se habet, crassos & lentos succos defleat, ac deterget. Verūm assidue vñ hoc medicamentum nō licet, sicut diatriō peperon, aut dia calamintēs. In totū ergo ad aloë drachmas centū, reliquorum cuiusque coniungitur sex drachmæ, quæ ipsa quoque sex sunt. Atque hæc est picra quæ Romæ omnes præparat. Ego verò etiā alias duas cōpono: atque in altera, eorū quæ calefaciūt, plus in altera, minus cōducio. Vtrūque autē fieri, si aloë solius potēri nunc præscripto, aut addamus, aut detraximus viginē drachmas. Cæterū si cinnamomi co

Ventriculi imbecillitas, nisi corroboretur cibo, expiuntur totius corporis.

Picram ex aloë expurgat humores alios imbutos in capite ventriculi.

Absinthij vis.

Vñctiones roborant ventriculū.

Solata vñctio.

Spicata vñctio.

Frigida intemperie capitis quæ vñctione expellenda.

Status ventriculi pessimus.

Diatriō peperon, piper, aqua succurrunt ventriculo frigido in quod picra deflenda a capite ab intestino autē est aduersissima: vñque aloum valde vis.

Picra vñctio, atque cōpositio.

piā nō sit, ponendū pro eo est optimā calidū du-  
plum. At in quibus quidem venter aut frigidus  
est, aut etiā temperatus, ad frigus tamen propen-  
sior, ut apud dispositiōis est: quod dupliciter cō-  
fici assuevit: nēpe qui alio sunt astricta, ni-  
tro, quod Berenicarū vocat, cum cumino, ruta,  
& pipere, pari pōdere admixto: iis verō qui sunt  
soluta, dimidio. Grauis autē nec facile tractabi-  
lis cōplexio est ventris, qui intemperanter calidus  
sit, cum frigido capite: quippe os ventris ab  
his quæ calorē accendit, offēditur. Ergo in iis  
qui sic sunt affecti, id agēdum, vt putatū disseces,  
detergeasq; iis quæ minimē calēfaciūt, quod ge-  
nus oxymeli esse nouimus. Iam lubrica atq; ad  
curam oō difficiilia connexio est, vbi tales partiu  
affectus coherēt, in quibus os ventris imbecillū  
ac nauseosum est, sistitur autem venter. Iis igitur  
cōuenit primo loco olera cū oleo & garo, aliisq;  
quæ ventrē mollire solent, fumere. Post istū au-  
tem cibi modum, aliquid eorū quæ stomachum  
roborēt, accipere. Ea sunt mala, & pira, & puni-  
ca. Ipse autē qui affligitur, omniū seiorum visu  
explorāt, quod minimum ē noxiū, incundis-  
simūq; inuenerit, eo in quantitate medioeri vta-  
tur. Atq; in totum magis qui ita sunt affecti dei-  
ciunt, si quid astringens post cibū sumperint, q̄  
si eo caruerint. Si quidem eorū visu roboratus vē-  
tricular, nāstēs succos pellit ad intestina, quos  
ea etiā cōtinuata expulsiōne propellunt. Quē-  
admodū ē conuersio, vbi humor aliquis mordax,  
ad expulsiōnē sui circa sedem nō imitat, quæ ta-  
men cohibere propter ciuiliā negōciā coactū, ne  
que ab his expedit eum expellimus, signum est  
illū ipsum humorē, conuersione factū, ad inte-  
stinū pulsū esse vēsus supēria, vnde supēri-  
mero capitis dolore tentamur. At vbi renēs cal-  
culos aut phoos gignūt, rotus verō habitus gra-  
cilis est: quæ iniquis cōdoxio ceteris maligni-  
tate nō cedit: hi medicamenta & victū quæ ex-  
nuare possint, requirūt: ea tamen gracili corpori  
inimicissima sunt. Carterū cūm intergaret me-  
quispiam, qui ob tales renū affectus, sicciōsimi  
victus ratione vult, in maximā siccitatem inci-  
derat, quo vniq; victus, citra renū noxam, me-  
den quis possit siccitā illi suæ, pristinæ cremo-  
rem excogitare, & pisces nū laxantes, tum qui  
in alto mari degunt. Simili ratione & ex volatili-  
bus quæcūq; similem carnē habent, Porro mul-  
tæ ex mōrānis volucribus tali tempore amen-  
to. Quas nanq; in vrbibus cōclusas humido nu-  
trimento impingunt capones, aduersissimæ  
his sunt. Optima verō sic affectus caro est, vt ex  
auius, perdicū: proxima atraginarum, & stur-  
norum, & merularū, & turdorum. Quod si mon-  
tanarū auium copia nō est, de iis quæ in agro vi-  
ctitāt, & gregalibus columbis, passeribq;, qui  
in turribus nidificant, sumere licebit. Sunt o  
autem in editis locis huiuscemodi turres. Ita nanq;  
& gallinæ, & gallinæ acris qui io corte aluntur, vti  
licet. Ex lactibus autem, solum asininū est conce-  
dendū, propterea quod ceteris omniū est tem-  
peratiss. Ac breuior, media inter extenuantem im-  
pinguantēq; sit eorū victus ratio. At si obesus  
sit quæ calculus infestat, audaet hunc tenuē vi-  
ctū in iungit. Eadem & iis qui articularum vi-

tiū laborant, conuenire præcepta censebis. Scire  
tamen licet, podagrica annidota multū distare a  
nephritici, nō tantū quod crassos glorioōsūq;  
succos attenuent, sed quod etā calēfaciūt & sicc-  
cent. Nam calculo sis, quæ valde calēfaciūt, dare  
nullo modo cōuenit. Iam verō partes quæ læsæ  
sunt ob defluxiōnē in capite, nō omnes corro-  
borandæ veniūt, sed ex tantū, quarum perma-  
gnus est vīus: vt oculus, atq; auris. Idcirco deci-  
dentibus in has partes excrementis a capite, de-  
ruiāno per vicinas partes molienda est, ac ad na-  
sum ponseimū trahēda, quæ in illa decumbūt,  
idig per ea quæ sternutamenta mouent, atq; eius  
obstructiones aperiunt. Si ad nasum nō sequon-  
tur, in os ipsū apophlegmatissimis sunt dedu-  
cenda. Oculis verō ipsi robur adiciēs, si sicco  
collyrio, quod ex Phrygio lagide consistat, vtare:  
ac sic palpebris speculo inducas, ne oculi membrā-  
nam intus cōtingas. Ita nanq; mulieres quotidie  
faciunt, cūm sibi oculis granam cōciliant. Ad  
aurium verō robur adhibēs vel glaucium solū  
super eorū tritum cum aceto, ac mox tepidū: aut  
collyrium quod diaphanum vō carat, aut dia-  
rhydōn, aut crocodēs, aut nardinum, aut quod  
aliis dicitur, aut deniq; foliatā & spicata vnguē-  
ta. Carterū vbi iis firmatæ sunt, ita vt nihil tam  
in has confluat, assidue aliquid instillandum est  
optimi vnguēti nardini. Porro aurū vici, An-  
dronis medicamentum, similibsq; medebēria. In-  
terim tamen auertere niatiam ad osium & os  
oportet. Vt autem ex iis quæ a capite dedūnt,  
læduntur nōnulla eorū quæ illi subiecta sunt, sic  
ex iecinore & renibus, & liene, in aiaas partes  
quæ ipsi sunt imbecilliores, morbi incidunt: ni-  
mirum semper ipso excremento a fortiori ad im-  
becilliorē partē demisso, donec ad imbecilli-  
mam omnī deuenit sit. Atq; ad hunc modum,  
quorū nulla sui cura est, aliis alia parte assidue  
vexatur. Qui verō nihil colligit supēri vacui, nec  
qualitate, nec quantitate, huiusmodi imbecilli-  
tates semper in tuto. Iam quod redundat, aut  
per totum colligitur corpus diciturque affectus  
plethora: aut in parte aliqua peīnclēsed quæ a-  
liquo in natura sui imbecillior. Ante omnia tamen  
est definiendū, propriā affectū laboret mem-  
brum: an propter aliud, quod prius ipso sit affe-  
ctum. Sed extrinsecus etiā imbecillæ partī noxa  
potest accidere: plurimū tamen ex viciōsa victus  
ratione. At redē itaq; magnitudinē naturalis in-  
firmitatis membri conuenit, ac tenuiorē quidē  
victum quā antea, exhibere homini: tum  
id oīem exercitatioē in iungere, cauendo ne  
quid ab externis causis noxæ incidat. Postea si ab  
his neq; ipse gracilis sit, neq; imbecilla eius par-  
te affligatur, instillandum videm victus rationi est:  
Sin autē aut omnibus membris fiat gracilis, aut  
male afficiatur quod viciōso est habere, mutare  
talem victus rationem de debiliusq; si affligitur,  
aut victum hominis in tenuiorē mutabīs, aut  
certo anni tempore purgationē vtrius. Ac aliis  
quidem vna quotannis purgatio vere incipere  
satis faciat: aliis altera quoq; post hanc, aurūno est  
opus. At si sanguinis quidem a bonā dāniā corpus  
accumulauit, mirandum ē id. Sin viciōso  
suctū, vacillidus proprio ad id medicamēto fue-  
rit. Quod

Dispositiōis  
pulsus duplex.

Ventriū in-  
temperie calid-  
a cūm cum  
capitis frigida,  
quid agendum.

Oxy-meli.

Ore ventriculi  
nauseabundo  
emphreia, cum  
astrictione al-  
ia, quid agē-  
dum.

Renēs si gignūt  
calculos, totam  
autē corpus sit  
gracile, quæ vi-  
ctus ratione  
ratiōne.

Les affligitur  
solum esse vici-  
tatem calculi  
sit, cum totum  
corpus fuerit  
la.

Podagrica m-  
medica d'forn  
a nephritica.

Calculi d'forn-  
li modo d'forn  
valde calēfaci-  
centis.

Derruatio per  
vicinas partes  
molenda q.

Collyrium fir-  
cum ex phry-  
gia lapide con-  
sistat, vtare  
ac sic palpebris  
speculo inducas.  
An d'forn vici  
auris ratiōne.

Excrementa  
semper a fortiori  
ad imbecilliores  
partes deducenda  
sunt.

Pleuris quid.

*Picatio quod  
de videretur.*

rit. Quod si ex tenui victus pars afflata leuatur, sed corpus emaciatur, picatione vtendū. Porro status corporis eorū etiā est pessimus, qui genitalē semen copiosum calidūq; gignunt, quod eoa ad expulsioē sui prouocat: post quā & vētra illa resoluatur, & ipsi toto corpore nō solum relaxantur, imbecillius fiunt, sed etiam sicci, graciles, pallidi, cauique ocula cōspiciuntur. Quod si propterea quodd ex cōcubitu sic vexatur, ab hoc se retrahant, nō modō capitis molestiam, sed sto machi ostensionē, fastidiūq; sentiunt, nec ex continētia magnopere iuuantur. Accidunt enim ipsa per nocturnas imagines nō minora in composita iis, quē cōcubitu senserunt. Sumere igitur ij debent non cibos modō, verum etiam medicamenta quę semen extinguant: tum verō exercitationibus vti, quę superius tantum partes exercent: ac deniq; ad balneo lumbos totoque vniuersū aliquē refrigerante, qualis ex omphacino oleo, & rosaceo, & melino conficitur. Lubi autem oleis, ne deluant, ceram adducere poterit. Vbi verō ceram illi in mortario subegerit, cum eo succum aliquem refrigerantem miscetibus accuratissimē: videlicet temperuini, aut solani, aut vmbulci Veneris, aut psylli, aut polygoni, aut tribuli, aut portulacę, aut lactuicę. Portulaca tamen succi suum non remittit, nisi dum in mortario tunditur, affusum sit humoris quippi tenuis aquosius substantiam, qualis vix immaturę est, & rosarum. Quinetiam lini semen si in aqua coquas, refrigerantem cremorē efficit. Ego verō cum ē plebe cūdam consulerem, vt plumbi laminam renibus superponeret, quod nocturnis careret Veneris imaginibus, tali præsidio ad tuius postea mihi egit gratia. Alter autem qui plumbi duritiā non tulit, ex dictarum herbarum, cum eisq; mollium amertis & rursū foliorum appositione, necnon ex assiduo esu seminis ipsius amertis, singulare præsidium sensit. At quicūq; ex papauerē mandragoręve vñctiois nec sunt, omnino fugiende sunt. Sed neque vt prædictis, ita lila quocq; substantia vtendum est, cum in vigore cōsistant. Quin rosas experiri cui dam suasit, sensitiq; ex illa substantia leuamen circa viliam renū noxam. Alios autē, qui vbi tibus boni succi modicę se impleuerunt in cerna, postea concubere dormientes, postero die cum sana dormierint, ac surrexerint, iubeo linteo fricari, quoad rubor per cutem appareat: mox aliqua ex oleo frictione modicę vti: tum exiguo interposito tempore panis aliquid fermentat & in elibano cocti, & pari ex vino mixto, illis gustandū porrigo: atq; ita ad cōsuetam opus dimittito, magnam hinc vilitatem expertos. Non disimilem roborandū per cibum stomachi rationē, & grammatico cuidam, quod assidue morbus commināla vrgebat, suauitē misicē contulit. Maxime verō in iudiciā veni hominū iuandū, vbi didici tum spasmus incidere, cū diutius a cibo abstinuisset, magisq; si dolor interrim, irāre interuenisset. Quinetiam habiū eiua intuebar gracilem: sciscitanti mihi de hac ipsa re, stomachum assidue bili vrgeri est fastus. Nōnulli tūq; immodicę vneria vñ leuatur. Alij citra noxā vñ eius ad senū vñq; fusi cū. Verū hac ambo genera

ra. Totum verō quod in medio est, id cum in aioria minorisq; discrimine, ad magnū hominū numerum se extendit. Ac de his hæc tenus. Huic autem cōmentario iam colophonē imponam, vbi medicamen illud descripiro, quod ex malorum succo conficitur, tum ad apperendi vim excitandam, tum ad iuuandam faculterē coctricem, robūq; conciliandū ventriculo, maxime confertur. Accipies igitur succi malorū cotoneorum, quę dulciora maiorāq; sint, sextarios Romanos duos, quibus mellis optimi tantūdem misceris, aceti sextariū vnum & semissem. Hęc cū super prunas modicę coxeris, & spumā detraixeris, immitte zingiberia vncias tres, pipera albi vñc. Dein rursus in simili igitur recoques, donec mellis crassitudo consistat. Qua vñq; crassitudine, stomachica medicamēta parari solent. Hoc porro pharmacā, etiam iis quibus invalidum iecur est, salutare in primis existit. Illud verō latere nō debet, ieiunio id maxime dandum esse, medio cris cochlearia modo. Quāquā nec si a cibo sit sumptum, quicquam leuē. Cōmodē quoq; dabitur, etiam si prius pransua quispīam, ante cōnam id sumperit. Maxime tamen tempestiue id duabus horis aut tribus ante cibum obuleris. Quod si id astringere magis volest, ex succo acetorum cotoneorū confices ipsum. Licebit autē pipera zingiberisq; portioni addere, scitv etiā detrahēre, atque omnino nihil illorum miscere. Propterea qui tali est medicamine vsurus, aut calidum biliosūq; ventrem sortitur: aut contrari, frigidum atq; refertum pituita: aut deniq; in medio constitutum temperamento.

*Medicamini  
ex cotoneorum  
succo & vñq;  
& semissem.*

### GALENI PERGAMENI de vñ respirationis, lib. vñus.



Inimē sanē vulgare esse respiratio nia vñum, hinc liquet, quod ē apriuari, ne momentum quidem possimus viuere. Ex quo manifestū est, respiratiōē ipsam, ad nullam particularem actiōē, sed ad solam vitam conferre. Cū igitur actio animę, vita sit, quę plurimū d respiratiōe iuuatur: tandū certē vñlritas modum nōa ignorare oportet, quādiu animę sub stantiam (quę nobis incognita est) ignorauerimus. Coarguitur autē facili Erasistrati opinio, dicentia, impossibile esse vt cor ex pulmone aē rem transiūat, circa respiratiōis cōhibitionem. Nam si milles quę inspiratiōem faciat, plurimūq; vñdique premat thoracem, & nihil rursus expiret, apparebit certē nihilominus in ipso cor pulsans, hoc est, tum atrahens, tum expellens: suffocatur tamen interim homo idēq; magis & citius, quod plus inspirauerit: quod nimirum tunc non substantia, sed qualitate spiritus, cor opus habet. Quare huius suffocatiōis mēdela, vñica expiratio existit: quę quidem si confertur & cum magno strepitu fiat, valide compresso thorace, & reserato alperā arteriæ orificio, efflans appellatur. Si igitur ipsum corpus substantia tantūm egeret spiritus (quod nimirum Erasistratus existimabat) magis vñique penuria ipsius, quā ex abundantia oboriretur.

*Respiratio  
primarię, ne  
momentum quidem  
possimus viuere.*

*Vita est alio  
anima.*

*Anima substantia  
ita est nobis  
incognita.*

*Suffocatio  
mēdela, expiratio.*

*Respiratio quid.*

laetities, id quod minimè apparet, cum tunc præcipue affligatur, dum maximè illius copia redundat. Similiter confutatur illorum etiam opinio, qui solius nutritionis ipsius animalis spiritus gratia, nos respirare contendunt, cum suffocatio, respiratio colubura, non propter inopiam nutrimenti animalis spiritus accidit. Adest liqui-  
dem largus tempus in pulmone spiritus: longiusque requiritur tempus ad hoc, vt animal propter inopiam nutrimenti spiritus pereat. Etenim substantia anima, etiam si non vna sit, per omnem tamè vitam, ad multum tempus durat. Ergo si non ob substantiam, relinquatur quod ob qualitatē penuriam, animalia in respiracionis colubitione extinguantur. Quæ igitur ista qualitas sit, inquirendum venit. Porro quandoquidem vbi amplior quàm secundum naturam caliditas in locus circa cor & thoracem fuerit collecta, statim, & amplius solito, respirare appetimus: videri vtiq; potest refrigerationis gratia, respiratio fieri. Rur-  
sus, si perfrigeratis eisdem organis (quemadmodum in magna fame, & vbi quis in magno frigore sit versatus, contingit) non solum non refrigerare eam, quæ in nobis est, caliditatem oportet, sed etiam calfacere, refrigerationis gratia respiratio minimè fieri apparet. Nonnulla tamen huic obiectioni occurrentes, insitum calorem semper egere refrigeratione contendunt: verum cum auctus sit, ad aliorum pauciorum verò, cum imbecillior est redditus. Hanc autem controver-  
siam diluimus, flammæ exemplo proposito: quæ quidem (vt animalia) ære priuata extinguntur: quemadmodum indicant cucurbitæ medicinales, vndique circumpositæ. Nec verò tantum si quis cauum quid circumponat flammis, sed in balneis etiam, & solis ardoribus, & frigoribus excellentibus, & vehementer ventilatæ, & materiam multitudine obrute, si vti & inopia alimentis, similiter extingui videntur. Augentur autem ac roborantur à moderato frigore, & si moderate ventiles, & cōmodato alimento nutritæ. Omnes autē flammæ duplici moueri motu videntur: altero à materia ex qua accenduntur, per quem maximè sursum feruntur, & vndeque disperguntur: altero huic contrario, ad sui ipsarum principium, ac vbi radices vergente, per quem confluunt & contrahuntur. Etenim si facis quæmaximè supernam exuritatem accendens, confestim ad infernam perueniet ignis. Si quidem cum omnis flamma celerissimè corrumpatur, ob id necessarium est, velocissimam eius esse generationē. Atqui generatio vniuersusque flammæ, est ex subiecta materia accēdi. Corrupti igitur omnem flammam est necessariū, si aut materia, aut altero motu priuetur. Qui ppe ex contrariis motibus, quorum alter alterum mutuo excipit & consequitur, alterum sine altero conservari impossibile est. Ob id igitur, moderatè frigido ambiente ære omnis flamma opus habet. Qui enim excellenter calidus est, motum alterum ipsius immodicè extrā extendendo, frigidum verò alterum immoderatè intrā protrudendo, extinguit. Vterq; autem à modicè ventilatus, flammam materię applicat, vt frigidus ær temperatè: supra modum verò moueri, flammā di-

spergit veluti etiam calidus vehemētè ambiens. At verò moderato, omnium cōseruatrix flammærum existit. Eodemigitur modo caliditas animæ mantibus insita, materiam vnde accenditur, sanguinem habet: necnon à natura insitum principium motus in vtriusq; partem, ita vt altero priuata, etiam reliquo ex necessitate destituatur: & ob id ipsum, siue à respiracione prohibeas, siue à sanguine, statim corrumpitur: nam & lucernæ flammā tolles suffocando, aut omnino oleo priuando. Simile itaque pōtito cor funiculo, oleo sanguinē alicui organo cano pulmōnem: nam circūstus est cordi forinsecus, ad cucurbitæ similitudinem. Verum quo tempore expirat animal, à similitudinis potius ipsum cucurbitæ foratæ: vbi verò respiratio colubetur, imperforatæ & vndiq; occlusæ. Quemadmodū itaq; cucurbita perforata intra se non potest flammam extinguere, respirantem per ipsum foramen: quæ verò è ventis est conclusa, eam per suffocationem extinguit: ad eundem modum pulmo artus & densus, qualis est in respiracione colubura, extinguit: perforatus autem & rarus (talis enim existit circa respiracionem) insitum caliditatem cōseruat, iam expiratio ipsa, ad euacuandū id quod veluti fuligo sanguinis est, mirè conducit. Fauilla quippe, & fumus, & fuligo, & omnis quæmodū vitæ materię superfluitas, non secus quàm aqua, conuehit ignem extinguere. Ex omnibus itaq; sunt recipiendū, qui dicunt, insiti caloris gratia respirare animalia. Nam & moderatè illum tum ventilari, tum refrigerari expedit: motumq; aliquem præficio fuliginoso excremento, quod nascitur ex vitæ sanguinis, explodendo. Itaque ex ventilatione principij caloris insiti, & ex moderata refrigeracione, & ex eius quod in ipso veluti fumosum est, defluxione, vnum coaceruatur caput & summa, confusum videlicet naturalis caloris. Quare in balneis diuini versantes exoluntur, accenduntur monitum. idq; non ob euacuatum ex toto corpore spiritum, sed quod perspiratio tam quæ per vniuersum corpus, quàm quæ per os fit, ostendatur, calidum spiritū attrahens. Nam cum respēdit talis vis insit, vt vel per insitum ipsi tridentem pīcatorem maximè stupefaciat: certè sursum esse non debet, si ær etiam ambiens, situm nobis, qualiscunq; illa sit, qualitatem cōmunicet. Porro per vehementes exercitationes, perip ardentissimas febres, amplius & frequentius respirare solemus: minus autem & rarius, vbi loci circa cor & pulmōnem refrigerati sunt. Valde nanque & crebro ventilare paruum caliditatem non conuenit. Si quidem maior flamma. ampliori ære, minor pauciori habet opus: omnis tamen flamma eo indiget, ac proinde & calor omnino aliquam ventilationem desiderat. Iam verò pueri, q̄ pberes, plus & crebrius respirant, ob id forte quod plurimū habēt calidi innati (necessario enim sequitur ad magnitudinem caliditatis, magnitudinē & frequentia respiracionis) aut quod eorum spiritus, si quidem à respiracione nutritur, ampliore ærem desideret: quem dum confluunt, plurimū fuliginis procreant. Vbi enim amplius alimētū elaboratur, ibi amplior superfluitas gignitur. At senibus, cum

*Anima subtilis  
nam ad multū  
tempus durare.*

*Suffocari ani-  
malia ob quali-  
tatem priuata,  
dum respiratio  
colubetur.*

*Flamma quæ  
modis extingui  
potest.*

*Flamma à qua  
bus augetur.  
Flammæ motus  
duplex.*

*Mutui spiritus  
cum cōsequen-  
tium, alteri si-  
ne alteri seruari  
non est pos-  
sibile.*

*Flammæ om-  
nem opore moderatè frigido  
ærē.*

*Caliditas a  
ueritatem ma-  
teriam, est ser-  
uata.*

*Pulmōnem effi-  
medica cōser-  
uanda simul.*

*Expiratio  
confert ad san-  
guinem repul-  
sam flammam.*

*Respiracionem  
fieri tamē cal-  
orem insiti gra-  
tiam.*

*Balnea diuini  
non curant mor-  
bum, mori-  
tatem.*

*Trepēdit vi-  
um.*

*Respiratio ma-  
iora & parua  
quædam acci-  
dat.*

*Calor omnis e-  
st varius.*

*Pueri quoniam  
dum, cor plus  
& crebrius re-  
spirant.*

Smadon reffer  
ratio est per  
pud qd ratio.

Aspiratio par  
ua frequen-  
ter, quod, dispo-  
sitione, adfit.

*Spiritu anima  
li esse aut sub-  
stantiam ani-  
ma, aut prout  
ipsius instru-  
mentum.*

*Spiritus ani-*  
*mali vade qu-*  
*trahere.*

*Spiritus animalis præcipuus  
nascitur ex in-  
fusione quæ  
fit per mater.*

Calendat atom  
moder apē v. m.  
-ense corpus of  
se maxime mē-  
saturam.

*Caliditas ob-*  
*que reparatio-*  
*ne salua esse no-*  
*potest.*  
*Refertur hanc*  
*etiam.*

Delirium in alcoholics  
usually subsides  
in 48 hours

*Affirmare in re-  
bus promissis  
est à calumnia  
modico ludo.<sup>11</sup>  
Constitutio in  
re in qua pro-  
fitetur.*

cum pueris adolescentibusque frigidiore existat, respiratio adest minor, & rara. In calida præterea regionibus & natura, semper estur respiratio maior, & densior. frigidis verò, minor, et rarior. Parum etiam & frequenter respirant, qui cibum acceperunt & potum, ob septi tranfueri cor aretationem: sic & prægnantes. In aqua etiam inter cutem, & in hepatis, ventriculi & splenis inflammationibus, similiter respirant eadē de causa. Jam verò quandoquidem vbi ventriculi animalis spiritus iuxta cerebrum vulnereantur, ita tunc immobilis ac fœtus expertus non reddunt: oportet utique omnino hunc ipsum spiritum, aut substantiam animæ existere, aut primum ipsius instrumentum. Qui sane spiritus cum necessarii nutriti debeat, certe rationi cō consoni, partim ab aëre per inspirationem attracto, partim à sanguinis evaporatione, illi nutritionē accedere. Nam si arteriæ caronē de circa collum vinctulis confringantur, nihil offenditur animal, quod pertinet ad respiracionem, nec non ad motum & sensum. Vnde liquet cerebrum spiritu per eas à corde allato, non valde liabere opus. Reliquum itaque est, aut evaporationem ex sanguine ipsi sufficientem existere, aut per nares inspirationem. Atqui nec evaporationem largam contingere verisimile est, si arteriæ laqueos excipiantur: quare necessum est ex inspiratione per nares possumus alimentam partem animali spiritui accedere: id quod sensit Hippocrates dicena: Principium alimenti spiritus, os, nares, guttur, pulmo, & cætera respiratio. Ex omnibus enim his nutritur nullatenus impeditur. At si quod ex his impediatur, per reliqua tamen ei alimentum suggeritur. Est itaque maximè & vtilis & necessaria animalibus moderata caliditas, præsertim animali spiritui, & principis ipsiusque organia, imò verò etiam vniuerso corpori. Turbigitur principium naturalis caliditatis, ipsum videlicet cor, respiracione in tantum egens habemus, quantum etiam ipsi moderata caliditate indigemus. Siquidem citrà respiracionem impossibile est saluam esse caliditatem: proinde totum corpus est transpirabile. Cæterum respirano moderata omnibus aliis membris per arterias contingit. Cerebro verò & cordi duo præcipua adiacent respiracionis organa: illi nares, huic pulmo. Verum vt moueatur pulmo, thorace opus habuit. Quòd si etiam sanguinis evaporatione ad nutritionem animalia spiritus indiget, id quod credibile est, maximum liabuerint sanè animalia & hoc à moderata caliditate cōmodum. • Etenim vbi sanguis melicholicus aut etiam biliosus est, in viscosos vapores soluitur: atque alter ad atram bilem, alter ad animi alienacionem perducit: proptereaque in æstusibus febribus ægri ipsi delirant. Confert moderata caliditas ad vniuersi cuiusque membri conservandam propriam constitutionem, actionemque similiter: quæ à nulla re promptius hederit, quàm à calore immodico: quemadmodum & cōstruio ipsa, quæ in debita temperatura quatuor qualitatrum consistit. Atque in aliis quidem organis actio non offensa parui momenti est. In his vero quæ ad vitam pertinent, magni refert. Postremo in

hita quæ non solum ad vitam conducunt, sed ad alia enamorationem principij habent, maximè. Talia autem sunt cor & cerebrum: quorū constitutio læsio vitæ damnum infert. Nequit autem constitutio ipsorum alteri breui offendi, quia per caliditatem immoderatam. Nec ob aliā causam in spiritalia prohibitionibus defungimur vita, quia ob immoderatam caliditatem. Prima itaque respiratio vitalis, per inspirationem & expirationem completur: alteram nimirū refrigerantem & venientem, alteram expellentem fuliginosā. Secunda verò, quæ est nutritio animalis spiritus, per inspirationem duntaxat accidit. Quod verò cum cor à pulmone aërem partim quidem ad se attrahat, partim vicinis arteriis transmittat, ipse aër qui expirat nihil perior appareat, eo quia per inspirationē attractus est, in causa esse videtur, quod vapor quidam omnino expirat, pars copiosa portio spiritus in cor & arterias transiit.

GALENI PERGAMENI  
de causis respirationis lib. unus.



Vi respirationis causam efficientem deprehenderit, id demum solum rationis differentiam, tum curandi modum cognosceret. Cæterum cum res sint in genere respiratio-  
nalia voluntaria, instrumenta volentia, & ad hæc virilitas ipsa, ob quibus causis opus habemus: vitalitas inter respiratio-  
nalia causis locum habet, quæ inanimati caloris commodatetur, & animalis spiritus substat. Voluntas verò disponit, & velut ad coaptat respiratorias actiones. Venerunt species multitudine & multis. Quædam enim ad venturam spirata sunt, quædam ærem susceperunt, quæ moventur movent. Principium est, qui per os & nares attrahitur, magna virilitas respiciendi, bifariam præ altera quidem & maior pars, ad cerebrum fugiuntur, altera vero maior, arteriam ad pulmones illabitur. At ipse organum vocis, via est etiam respiratio autem, velut profundas ventilationes spiritui est: cuius dilatationem thorax gubernat, qui movetur, & osibus inarticulatur: prætertransierunt, respiratio-  
nalia similiter circulare enim id est, in centro quodam circum circa vero carnosum. & sic etiam bifariam regionibus duo & viginti mutantur, & præter duos alios primarium & secundum extremum. Ultra hos, collo vtriusque provenientes: deinde unam porrecti, & cum ipsis, qui curren-  
tes constitunt, octo. Ac tot sane sunt æreantes respiratio-  
nalia. Actiones autem, eorum quidem qui in septo trans-  
vires respiratio-  
nalia involentam operen-  
terò qui iuxta collas consistunt, vtriusque dilatant, & contrahunt. Qui cum du-

Respiration  
per second

*Blaffertianus*  
*secunda* Volker, n. sp.

Expiratus aër  
est par vo-  
luntate.

Respirationis  
causae esse in  
genere tria,  
Viz. hanc res-  
pirationem, tan-  
to causae illius  
obtinere prae-  
cipuum locum.  
Valentur

lastrum etiam  
affertur et  
specie multi-  
plici.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

Aërie pertinet  
viam ad cer-  
brum, aliâ ad  
pulmones rila-  
bi.

*Amoria aspera* v. var.  
*Palmetto* v. var.  
*Theraps* v. var.  
*Sepalum trans.*

Interfasciales  
majusculi duo  
reperiuntur.  
Minusculi abdo-  
minis alio.  
Majusculi in-  
feriores non re-  
servantur, re-  
numerantur.  
Minusculi ibi-  
dem alio.  
particulari.  
Majusculi in-  
terfasciales dupli-  
ces.



plices sint, externi expirationem, interni inspira-  
tionem perficiunt. Et primorū quidem duorum  
actio est, ut superum tantum thoracis partē di-  
latent: inferorū verō, ut infernam eius partem  
constringant. Qui ex collo descendunt, retrahūt  
simul & dilatant sublimis thoracis partes. Ex re-  
ctis etiam \* iuxta ipsum collum musculis, hi qui  
ad claviculas extenduntur, fines cartilaginum  
que illie sunt, contrahunt: quemadmodū etiam  
n, qui ad costarū in spina radices pertinent. Mus-  
culi demum \* abdominis, firmitudo existens  
sepi transversū, thoracis contractionem adiu-  
uant. Cum itaq; duo genera respiracionum sint,  
nempe facilis & violenta, habetq; utraq; ipsarū  
inspiracionem & expirationē, sit ut in totū qua-  
tuor sint respiracionis partes. Ceterū singulis  
his quatuor partibus, propria quedam instru-  
mentorū natura inest. Quippe facili inspiracioni  
sepi transversū subseruit: violentæ \* rum si-  
ma scapularum pars, tum interni musculi inter-  
costales. At facili expirationi \* musculi famulan-  
tur abdominis: violentæ autem, \* externi muscu-  
li intercostales. Atq; hoc quidem modo res mus-  
culorū se habet. Porro nervi duo qui ad septum  
pertingunt, ex cōnexionē inter quartum & quin-  
tum colli vertibulū procedentes, in ipsam septi  
nerviosam partem se inserunt. Qui verō à spina  
disperguntur in musculis intercostales, transier-  
sim progrediuntur ad pectus. At qui in alios mu-  
sculos respiracionis opifices feruntur nervi, ferē  
omnes ex spinali medulla oriuntur. Volūtas igitur  
similis equi existit, qui habentur moru e-  
quos ipse impellit. Habemus autem sunt verū  
similes, quemadmodum equi musculi. Sic verō  
& vitulus extremū est respiracionis vortum, per-  
inde ac victoria artis aurigandi.

## GALENI PERGAMENI

de difficultate respiracionis, li-  
ber primus.



Vod respirandi difficultas respira-  
tionis quedam sit latio, nomen ap-  
ertē indicat. Cum igitur id quod  
secundum naturam habet, vnum  
atq; idem sibi semper simile exis-  
tat, veluti regula quedam: vanum autem atque  
disimile multiplici errore involutum, ac pro-  
inde & infinitum numero, & arte incomprehen-  
sibile, quod præter naturā, & impossibile certē est,  
huius immensitatē certis terminis comprehen-  
dere, citra cognitionem eius quod habet secun-  
dum naturam. Cum itaq; vnum sit hoc, & ani-  
mali cōmodum, palam est etiam id moderatum  
existere. Quare immoderatum fuerit, quod præ-  
ter naturam habet. Cum igitur immoderatum  
omne duplex sit genere (aut enim deest quid ab  
eo quod secundum naturam habet, aut excedit)  
tot sane in seipso particulares differentias  
fortiter, quod possibile est rem ipsam fuscipere,  
circa moderatū excessus defectusq;. Suscipit au-  
tem simplex duplex: compositum verō ex plu-  
ribus, duplicatas, iuxta numerum eorum ex qui-  
bus constat. At verō, cum duæ quidem sint  
primæ & principalissimæ rotius respiracionis

partes, inspiratio videlicet, & expiratio: duæ ve-  
rō alie per accidens, nimirum quæ interveniant  
cessaciones: in quatuor sane his vniuersa con-  
sideratio de respirandi difficultate cōstitit. Qua-  
re oportebit omnino vnam ex prædictis, aut  
plures, aut simul omnes vitari, aut corrumpi,  
ut respirandi difficultas sit locus. Fieri autem  
optimum, simplicem appellare respirandi diffi-  
cultatem, quæ vnam tantum respiracionis par-  
tem occupat: compositam verō, quæ plures læ-  
duntur. At cum postea sit semper composi-  
tum simplicibus, à simplicibus auspicabimur re-  
spirandi difficultatibus. Quandoquidem igitur  
ex his quæ diximus partibus, duo motus sunt,  
inspiratio videlicet, expiratioque: duæ verō hinc  
cessaciones distinguuntur ac generacione quidem mo-  
ribus composita est, cessacionibus verō sim-  
plex: manifestum utique fuerit, immoderatio-  
nes illorum, plures: cessacionum verō, binas  
tantum produci. Hæ namq; simplices existentes,  
iuxta temporis quantitatem solim differentias  
fortiuntur: motus verō nō solum iuxta hæc, sed  
iuxta quantitatem etiam spaciū localis, per quod  
instrumenta respiracionis mouentur. Itaq; dupli-  
ces erunt immoderaciones ipsorū, quemadmo-  
dum & cessacionum, utq; iuxta temporis quan-  
titem distincte, secundum quas aut veloces aut  
\* tardi motus dicuntur: duæ verō adhuc alie, iux-  
ta quantitatem distensionis instrumentorū di-  
stincte, quarum nimirū ratio, aut \* magni, aut  
parui appellantur. Sequidem inseparabilia sunt  
ab omni circa locum motione, tum tempus, tum  
spacium, per quod id quod agitur moru,  
mouetur. Quemadmodum autem motus propria  
sunt velocitas atq; tarditas: ita & quantitati ces-  
sacionū, rantes & densitas. Præterea cum & ipsa  
respiratio ex contrariis motibus per cessaciones  
distinctis cōposita sit, densam ipsam reddet bre-  
uitas cessacionū, ratam verō longitudo. Atq; hæ  
sane vniuersæ sunt simplices respirandi diffi-  
cultates. Cum itaq; respiratio ex duobus contrariis  
motibus consistit, inspiratione videlicet, & expi-  
ratione: necnon ex cessacionibus binis: offensio-  
nes utiq; circa motus cōtingent, in velocitatem  
& tarditatem, magnitudinemq; & paruitatem: cir-  
ca cessaciones verō, in raritatem & densitatem:  
nec præter hæc, simplicem aliam difficultatis re-  
spirandi differentiam reperias. Porro cum vni-  
quodq; ab isdem peius aut melius reddatur, per  
quæ omnino produci solet: certē si scierimus à  
quibus causis respiratio produciatur, sciemus etiam  
de respirandi difficultatis causas. Igitur ani-  
malis facultas thoracem mouet, cum quo simul  
pulmo mouetur: ad distentionem cuius sequitur  
inspiratio, siue ad contractionem ipsa expira-  
tio. Etenim principalissima respiracionis vitia-  
tas, nec conservatio caloris inest, animalisq; spi-  
ritus nutritio. Si ergo & facultas, & vīus, & v-  
numquodq; organorū opprimē habuerint, iuxta  
naturæ legem animal respirabit: sin verō ex eis  
fuerit quicq; vitiatū, iuxta illud etiam respiratio-  
nem impediri est necesse. Inquirendū igitur iam,  
quemam causæ esse possint respiracionis celeris.  
Enim verō si illud est verum, eandem vitiatorem  
à respiracione quidem, et qui circa cor est calori:  
à pulsi-

*Drissina sim-  
plex quæ sit  
cetera, & quæ  
præterea capi-  
tula.*

*Inseparabilia  
ab omni latro-  
ne esse, tempus  
et spacium, per  
quod mouetur  
corpus mouetur.  
Motus propria.  
Cessacionum  
quantitati pro-  
pria.*

*Respiratio con-  
stat ex contrariis  
motibus in  
transfusione de-  
fectu.*

*Respiracionis  
vitiosæ princi-  
palissima est  
distensio cal-  
oris caloris, aut  
malitiae quæ  
naturæ contraria.*

*Vitium omni-  
se respiracionis  
est posuit.*

*Musculi abdo-  
minis.*

*Respiracionis  
partes quæ  
sunt.  
Respiracionis  
facili  
quæ organa in-  
feruntur.*

*Septi transuer-  
si sunt.*

*Musculorū in-  
spiracionis in-  
feruntur  
motus.  
Voluntas est  
quæ similes.  
Nervus habens  
sunt similes.*

*Drissina est re-  
spiracionis la-  
tio.*

*Vitium esse quod  
secundum natu-  
ram est.  
Vitium esse  
quod præter  
naturam vitia-  
tis.  
Immoderatum  
omne esse du-  
plex.*

*Respiracionis  
partes præ-  
ter naturam.*

ad pulsibus verò, ei qui per totū animal est dispersus, contingere: ac velox quidem pulsus, sicut & omnis motus, ab vilitate vrgente, facultate integra, & promptis organis perficiatur (quæ quidē a nobis alibi sunt demonstrata) eadem certe esse possint causæ velocis respirationis. Possibile tamen est vilitate sufficienter vrgente, etiam si facultas moderatē debiliior sit, quandoq; motum fieri velocem. Si verò magis debilitetur, nō amplius possibile est velocem actionē fieri, sed pro veloci densam. Omnis autem densitas actionū vna causa assignatur, prioris videlicet actionis defectus: siquidem illa vrgente, conagitur festinare expeditus. \* Porro sermo a nobis habitus in cōmentariis de pulsibus, respirationis videtur fuisse cōmunis. Primū quidem, nam de omni motu illud differuntius in vniuersum. Deinde, quia parum abest, quin omnis respiratio pulsui proportionē respondeat. Quippe similiter ut ille, est composita ex contrariis motibus per cessationes distinctis: atque eiusdem vilitatis gratia contingit. Præterea ex partibus eius, inspiratio quidem consimilis existens pulsus dilatationi, insitum caliditatem refrigerat: expiratio verò, veluti contractio pulsuum, fumum sanguinis excrementū excernit. Quin & ad nutritionē animæ his spiritus ambas actiones conferre: & ex cessationibus, eam quidem quæ post dilatationē fit, breuiorem esse: quæ verò contractionē sequitur, longiorē ambobus cōmunia existunt. Eundem autem causarū concursum magnitudinē respirationis, quæ velocitas, postulat: nempe vilitatem vrgentem, facultatis robur, & promptitudinem organorū. At tarditas paruitasq;, nōa omnino opus habent cōtrariis omnibus simul, sed vnum ex ipsiis prius adesse oportet: plura non est necesse. Quemadmodū igitur si parum sit aucta caliditas, perspicue maior, nō tamen velocior: sin autem plurimum, & maxima & velox & densa inspiratio redditur: eodem modo vbi caliditas secundum naturam imminuta fuerit, aliis causis immotis manentibus, necesse est parum, tardam, & raram inspirationē fieri: sed paulo tamen quā secundum naturam minorem, multo verò tardiorē, plurimū autem rariorē. Robusta enim existens facultas, non est possibile multo minorē fieri dilatationem. Sed si quæ ad vilitatem pertinent, admodum exoluantur, plurimam cessationē fieri verisimile est: non tamen propterea omnino tardē moueri, modō facultas robusta sit. Porro quæ in aucto calore, eodem & in animalis spiritu ad nutritionem vrgente, species erant respirationis difficultatis, eum videlicet quæ circa \* inspirationes consistit. \* Quemadmodū enim immoderatio fuliginis eadem respirandi difficultates circa expirationē efficit, quæ circa respirationē relate sunt. Veloces quippe erūt, & magnæ & dēxæ, vbi multa eiusmodi superfluitas collecta fuerit: tardæ autē & paruæ & ræ, circa affectiones cōtrarias. \* An igitur sic ratio possit, relucetur autē aliquid eorū quæ evidētē apparere. Ego sane omnia hæc circa artus, regiones, vniuersas constitutiones aëris ambiente, exercitia deniq; & morbos, maxime cōsentientia reperiō. Vbi. n. abundat caliditas, ve-

loce, magna, & densa videre est inspirationes fieri: vbi rursus frigiditas, contrarias, nempe tardas, paruas, & raras: At verò quibus animalis spiritus evacuat, & ob id cita renutritio & habent opus, hi nō solum valde, sed & citè & densè inspirant: quibus nihil vacatur, hi contrariā illis habent inspirationis speciem. Si verò ambo concurrant, & caloris augmentū, & spiritus cōsumptio, hi omniū maximam, & velocissimam, & densissimam inspirationē formantur: & maxime si ambo fuerint aucta vehementer: quemadmodum vbi ambo fuerint admodum imminuita, minime, tardissimæ, & rarissimæ sunt inspirationes. Ipsa sunt enim expirationis species, si quidem multe fumose superfluitates collectæ sint, maxima, velocissima, & densissima erit. Si verò paucissime penitus fuerint superfluitates, minima, tardissima, rarissimaq;. Et tamen ex variis omnes quæ in augmento sunt, magnam, velocem, & densam facere inspirationem cernimus: quæ verò decrescunt, raram, parvam, & tardam, propterea quod illis caliditas amplior, his longè minor existit: & illis quidem animalis spiritus substantiam cum corpore coangere est necesse, his verò cōtabelcere. Iam verò cum in artibus quidem erectis, ob insiti caloris robur, arque adeo ob ipsum augmentū, maxima humorū copia absorbatur: in decrecentibus autē, quantum necesse est ad ipsam vitam duntaxat, vix ite quæ neq; augeant amplius, & iam sunt perfrigerata: mento sanè illa velox, magna & densa: his vice versa, per omnia cōtraria cultus expiratio. Quemadmodū verò secundum ætates, ita & iuxta tempora, & regiones, & omnes ambiente constitutiones, tum pulsus cum respirationibus, tum respirationes cum pulsibus proportionem habent: in calidis quidem ad magnitudinē, velocitatē, & densitatem, mutare in frigidis verò, cōtrario modo. Quinetiā in exercitiis improbis (quod in eis augeatur quidem caliditas, absumatur autē animalis spiritus) valde, vel citè, & dense respirare solentur: quiescentes verò, parū, tardè, rarèq;: quando quidem sic marcescit caliditas, spiritus autē neq; in totū, aut omnino modicè absumitur. Ex balneis erūt, calida quidem, velocem, magnā, & densam faciūt respirationē: frigida verò, contrariā. Porro in somnis, magnitudine & velocitate motus, expiratio inspirationē excellit: quando ciborū cōsumptiones & cōcoctiones maxime tum persolvuntur. Unde verisimile est, coaceruari in illis plurimū fuliginosi excrementa. At per affectus febiles, maxime vbi circa aliquod respiratiōnis organū, aut circa cor, maxima caloris copia est collecta, omnis respiratio magna, velox, & densa redditur. In quib. verò perfrigerantur est calor, cōtraria prioris. Atq; late etiam, ut in aliis omnibus, pulsus & respiratio proportionē habere videtur. Neutrū namq; ipsorū in totū perire est possibile, quādiū vixerit animal: erit interdū ob paruitatē nōnullis perire putetur. Hoc autē discrimen est inter respirationē & pulsuum: quod illa quidē, cum sit animalis opus, volūtas possit coercere, ac prouide in varias species mutare, vel si vilitas bona sit, & facultas integra, & organa respirandi ad operandū prœp-

Difficultates  
ob calorem cres-  
sum, quales.  
Inspirationes  
ob immodicam  
fuliginem, quales.  
Inspirationes  
ob abundantiam  
spirituum.

Expirationis  
species pro can-  
sari differentiis  
variantur.

Augmentū ex  
decrementum  
inspirationum.

Extrictū imo  
peritū augeo  
quoniam calidi-  
tatem. Quicquid  
autem anima-  
lis absorbui.

Balnea quæ  
reddunt respi-  
rationem.

Expirationis in  
dormientibus  
magnitudine  
per velocitatem  
inspirationis  
excedit. Con-  
coctiones res-  
piratio quales.  
Perfrigeratio  
pulsum.

Vita manente,  
neq; pulsus, neq;  
respiratio perire  
possunt. Quicquid  
est animalis opus  
potest coerceri.

*Pulsus est natu-  
ræ alio.*

*Respiratio in-  
flammati tho-  
racis.*

*Difficultas ob so-  
lum ardorem  
prodella, qua-  
lis.*

*Spiritus in-  
qualitas, qua-  
rent affectibus  
fit notæ.*

*Tumore præter  
naturam coar-  
ctantem septum  
transversum,  
paruum, velo-  
cem, & densum  
facient spiritum.*

simas pulsus autē, utpote existēs opus vitale, nec  
supprimi, nec variari possit, quandiu tres illi can-  
se inculpabiles conspirant in vnum. Ob idque  
circa inflammatas partes dolor vehemens ob ar-  
teriarum motū oritur, quod in nostra manu nō  
sit motum facere magnitudine minorē, aut velo-  
citate tardiorē. Thorax itaq; vnum ex respira-  
tionis organis, quādoquidem respiratio motus  
voluntarius existit, ad similitudinem crurum mo-  
uebitur. Quamobrem si sit inflāmus, & ad mo-  
rum cogatur, tardius multo q̄ oportebit, dilata-  
bitur, ac proinde cum respiracione difficilis, ani-  
mal in discrimen suffocationis perducet. Ceterū  
ne suffocetur, dēfiores actiones edit, nō amplius  
tantum cessans, quantum solebat cū secundum  
naturam haberet. Quamobrem tunc est necesse  
totam respiracionē fieri paruum, tardam, & den-  
sam, multoq; sanē minorē, q̄ par est, nō autem  
ita multo tardiorē. Dolor quippe nō adeo gra-  
uiter vexat thoracem, ob motus velocitatem, si-  
cuti ob magnitudinem dilatationis. Quod si so-  
lus dolor thoracis particulas affligat, manente  
calore cordis intra naturæ terminos, tunc motus  
thoracis manifestē tardior reddetur. Si verō  
ardor quidam in ipso corde oboritur, veloci-  
tas quidem minime exoluitur, aufertur autē hic  
etiam multū de magnitudine, pro qua densitas  
generatur, ob vrgentē vilitatē. At quæ ob solū  
ardorem coniungit dyspnœa, ea magnū & velo-  
cem & densum spiritum efficit. Ob idq; magni-  
tudine tantum & velocitate, ab ea quæ propter  
dolorem solum orta est, distinguitur. Quæ verō  
ex ambabus causis confusum generatur, ab ea  
quidem quæ ob ardorem fit, sola paritate dif-  
fert: ab ea autem quæ propter dolorem, sola velo-  
citate. Ceterum difficultas respirandi ob perfrige-  
rationem naturalis caloris, paruum, tardum,  
& rarum spiritū reddit: cum aliarum nulli simul  
tarditas & raritas accodat. At quantum in defecti-  
bus & excessibus caliditatis, ipsa respiracionis  
species à rhythmo naturæ excedit, tantum etiam  
cum pulsibus cōmunitet & eodem modo libet.  
Differt autem ab illis, in eis quæ ob dolorificos  
organorū affectus accidunt. Nam reliquæ affec-  
tiones instrumentorū, quæ citra dolorem per  
obturationes, aut durities, aut compressiones,  
aut omnino coarctationes quasdam fiunt, consi-  
miles variationes in vtriusq; actionibus, anima-  
libus & vitalibus faciūt. Quippe in id genus affe-  
ctibus, paruum & velox, & densus spiritus redditur  
circa pulsus & respiraciones, necnon in aqua-  
lis, quæ vel præcipua earum affectiōis est nota.  
At paruum quidem tunc spiritus agitur, propterea  
quod ob angustiam susceptoriorū instrumentorū  
paucior q̄ oportet attrahitur: densus autem,  
quia nō expletur votū vilitatis: atq; ob ean-  
dem causam densus. Vt autem quæ respiratoris  
instrumentis nisi propria cōmemorem, tumore  
et præter naturam, qui circa ventrē, hepatis, splen-  
tis, colon, hisq; coniunctas partes consistunt,  
ob septi transversī coarctationem, paruum & ve-  
locem & densum faciūt spiritum. Iuxta eundem  
modum & aqua inter cutem laborantibus, & ge-  
rentibus vterum, & iis qui se supra modum ca-  
bo expleverunt, & qui prominētē ventrem ha-

bent, huiusmodi sit respiracionis species. In or-  
thopnœa etiam (quæ erecta ceruice spiratio est,  
sive collectis viscidis & crassis humoribus circa  
asperas pulmonis arterias) & similiter vbi circa  
pulmonē aliquod induratur, aut tuberculū gigni-  
tur prement atq; coarctans ipsam arteriam, alpe-  
ram, paruum, densum, veloxq; spiritus redditur.  
Ad eundem modū si in thorace tuberculū tale cōsti-  
terit, paruum & densus & velox spiritus generabi-  
tur: occupante nimirū tumore præter naturam,  
pulmonis regionē, in quā dilatatus extendeba-  
tur. \*Perinde autē est, ad hoc vt compressus pul-  
mo nō possit sufficientē aērē atrahere, siue tho-  
rax totus angustus reddatur in affectu quovis, si  
væ media regio occupetur à quibuscūq; præter na-  
turā corpuliculis, siue ipse etiā pulmo in daretur,  
aut obteueretur, aut intrinsecus, velvbi in peripneu-  
monicis vitis cōtingit. Vna enim in iis omnibus  
cōiuncta est causa, ob quā parua inspiratio red-  
ditur, coarctatio videlicet asperæ arteriæ. Ceterū  
paruitatem inspirationis densitas & veloci-  
tas sequitur, si facultas robusta fuerit. At cū iux-  
ta pulmonē affectus ipse consistit, q̄vis thorax  
dilatandi plurimū possit, parū tamen inspirat: ita  
etiam vbi intermedii ipsorū organorū regiones  
fuerint occupatæ. Vbi verō totus thorax aut fen-  
dus, aut aliter paruum & angustus redditur, tūc  
distentionē parium efficiens, pulmonis causa est  
velocis inspirationis: quemadmodū & septum  
transversum, quidō ab aliqua mole iuxta infer-  
nam regionē opprimatur. Porro suppuratorum  
affectio, q̄vis sæpe ex pleuritide oriatur, his pro-  
ximè relatis annumerabitur, quæ videlicet iuxta  
pulmonē coarctationē citra dolorem faciendo,  
parū reddunt inspirationē. A quo modo igitur  
hæc respiracionorū organorū vitia citra dolorem  
consistunt, ab iis quæ cum dolore fiunt distin-  
guentur, si & paruum & densus vtriusque similiter  
spiritus redditur. Motus velocitate. In affectibus  
siquidē dolorificis modicē respirant & densē, nō  
tamen velociter, nisi forte etiā febris addit. Quæ  
præsentē, licet iuxta paruitatē & velocitatē ipsam, sed  
ob actionis facultatē, quæ animalis existit, spiritus  
paruum & densus redditur. At species difficul-  
tatis respirandi, quæ ad coarctationē pulmonis  
cōsequitur, nihil opus habet facultate ad sui ge-  
nerationem. Periculum igitur est, q̄ amplius in  
magnis thoracis moribus dolere vexantur partes  
que in vêtre consistūt, minus verō in paruis:  
& ob id paruum & densus erit spiritus, nō solum in  
pleuritide, sed & quibus stomachum, aut ventrem,  
aut hepar, aut splenem, aut peritonæā, aut  
intestina, aut præcordiorū musculos, dolorifica  
affectio infestat: cū nimirum eis omnia partim  
appensa sint, partim agnata respiratoris organa,  
atq; ad eorum motū moueantur, ac proinde  
offendantur in respiracionibus. Quare illis etiā  
non

*Orthopnœa  
quid sit, & vnde  
de generatur.*

*Inspiratio  
paruitatē  
densitas & veloci-  
tas sequitur, si  
facultas robusta  
fuerit.*

*Empyema red-  
dit paruum in-  
spirationem.*

*Motus veloci-  
tas distinet  
affectiones de  
vtriusque organi  
respiracionis,  
ab iis quæ circa  
dolorem in-  
stant.*

*Respiratio fe-  
brientibus qua-  
lis.*

*Spiritus paruum  
& densus,  
quodam superius  
atque affligitur.*



respiratio habebit, præter pulsum rationē: dum videlicet partim quidem à sola proficietur facultate animali, partim verò à complexu ipsius cum doloribus. Porro in delirius superat quidē raritas & magnitudo: apparet autē quædam inæqualitas, & ordinis perturbatio, tum iuxta plures respirationes, tum iuxta vnam solum: quod nimirū \* spectra & phantasmata aliquando plus, aliquando minus, rationem à naturalibus operibus reuocent. In doloribus etiam instrumentorū cōtingit totam respirationē inæqualem & inordinatā reddi, cum neq; in illis etiam expleatur vitlitas iuxta actiones singulas: quippe nec velociter, nec densē, nec amplius thoracē distendere possunt. Omnia enim luc ipsis molesta sunt, & præsertim magnitudo: deinde velocitas: postremò autē densitas. Dolentibus namq; minus molestum est per longius tempus, nūq; breuius moueri. Cæterū dum ob ipsorū motū immutationes, partū abest quin animal suffocetur, voluntas tunc cogitur ad aliquod tempus maiorē facere respirationem, & multo velociorē, & priore densiorē. At cum in eiusmodi actionibus vitlitas quidē expleatur, animal verò affligatur doloribus (omnia siquidem quæ vitlitate explent, exacerbant dolores) voluntas rursus à magnitudine & velocitate & densitate detrahit aliquando plus, aliquando minus: vt pote quæ cōsiliū inops, nec siltire actionē possit, ob insufflationis periculū, nec reperire aliquam doloris medellā: quare modò ad hoc, modò ad illud transit. Vnde tum inæqualitas circa singulas & omnes deinceps respirationes, tum multiformis illa ordinis perturbatio oritur. Siquidē ex corruptione parilitatis, inæqualitatis omnē, itēq; ordinis perturbationū generatio cōstat. Parilitas quippe cōtinua, æqualitas est: parilitas verò iuxta circuitus, est ordo. Ob idq; vbi paritas cōtinua corrūpitur, gignitur inæqualitas: vbi verò iuxta circuitus reuertens, ordinis perturbatio introducit. Cæterū quæ multa inæqualitas & ordinis perturbatio in eiusmodi affectionibus incidat, superat tamen id genus respirandi difficultatis, qd iuxta paruitatē & densitatē cōsistit. Quare rectē videtur dictū, quod ad omnia dolore afflicta organa, quæ cōmouentur circa respirationes, paruus & densus spiritus consequatur: & iuxta eandē rationē in delirius magnū fieri & rarum spiritū, idq; inæqualiter: nunq; autē parū & densum. Igitur inspiratio magna simul & velox, ob vitlitatē vrgentem, prompta organa, & integram, aut certē parū remissam, gignit facultatē. Ad magna simul & tarda, solis mente motis cōtingit, atq; laia non semper. Cōspiciat autē etiam hic est ex prædictis, causæ cōsideratio: quemadmodū etiā, cum parū habet inspirationem & tardam iñ, quibus calor insitus est nimis perfrigeratus. Quæ restat adhuc cōiugatio quarta, paruitas erat cum velocitate: sitq; penitus in nulla affectione simplici, quemadmodū nec magna simul & tarda, quam aliquando alienam mente accidere diximus: sequitur tamen vt plurimū, vbi simul dolor & vitlitaris incrementū concurrūt. Ad eundē cum prædictis modū etiam in cōiugationibus circa expirationem perfrutari ipsas affectiones oportet,

Nam & in his, aut facultatem, aut aliquod organum læsum, aut caloris modum alteratū deprehendimus. Si igitur quis fumosa caliditate in corporibus red vidente, expirationem magnam simulq; velocem fieri dicat, nō vtiq; errant. Manifestum est autē quod & facultatē integram tunc esse oportet, & ex organis nullum vinarū. Similiter autē magnū simul & tardam in quibudam delirantibus fieri, eodē modo quo inspirationē, contigit. Sic parū simul & tardam fieri illis, quibus nullum fumosum recrementū fuerit collectum. Sic vt tum paruum, tum velocem illis, qui cum recrementū fuliginosum collegerint, dolēt etiam aliqua parte earum quæ circa respirationem mouētur. Ad dissonantias autē deveniendū motū respirationis, si tardior quidem & minor quæ secundū naturā sit inspiratio, exspiratio autem & velocior & maior, dicemus sanē imminutum esse calorem secundū naturā, aut tūm verò excrementū fumosum. Si cōtrā, inspiratio quidem sit magis & velox, exspiratio autē parua simul & tarda, aut tūm naturalem calorem dicemus, nullūq; inesse recrementū fumosum. Porro simplices respirandi difficultates, plurium affectionū cōmunes existunt: ob idq; nō certi indicant. Coniugate autem alias, ad iudicium minimē fallax perdunt. Magnitudo siquidem \* inspirationis, ipsa per se respirandi quædam difficultas est simplex, verū nullūq; certæ cognitionis est signū. Nam & vrgente vitlitate, & læsa fieri mente affollet. At si cum densitate consistat, vitlitate vrgentem: si verò cum raritate, delirū indicat. Similiter & cum per seipsam paruitas nō certi fir, aut dolere afflicta partem aliquā, aut exsolutam vitlitate ostendit: ad densitatem iuncta, dolorem: si vbi raritati, vitlitaris exsolutionem portendit. Per se etiam nec rara quidem, nec densa firmi quicquam ostendunt. Ad densā simul & magna, vitlitaris augmentum indicat: densa verò simul & parua, organi alicuius quod inter respirandum mouetur, dolorem. Rara similiter, si cum magnitudine quidem cōtat, delirū: si verò cum paruitate, perfrigerationes ostendit. Atq; ob id sanē omnium compositarū respirandi difficultatum hæc quatuor vltimæ coniugationes sunt vtilissimæ. Sunt autē, differentis actionū iuxta magnitudinem & paruitatē, ad cessationū differentias permixtis. Cæterū ex cessationū oppositione (quæ vnica tantum est penes raritatem & densitatem) aliis differentis permixta, quatuor etiam oriuntur coniugationes. Prima quidem est densa & velox: secunda, densa simul & tarda: tertia, rara & velox: quarta deniq; rara simul & tarda. Nullam tamen certæ cognitionis signum simpliciter & necessario exhibent, quemadmodū priores quatuor: quare his ad prænotiones nequē indigemus, cum nimis si qd significet, id iam distinctū per priores illas habebamus. Porro si quæ negotantur facultatis respiratoriz, omnissq; facultatis animalis, præcipue refrigerare, propria signa cupit habere, is alarū nasi morū habebit, & omnium musculorū, q; circa faculas sunt, actionē, & cōstentiam factū cōcidendū thoracis. Quādo, n. hic debilius q; expedit mouetur, circa respirationes qdē, spiritus ductū nasi alie aduancat: circa expirationes autem

Delirium respiratio qualis.

Dolent organorum respiratio, reddunt afflicti ipsam inæqualem inordinatamq;.

Vitlitaris plenitudo exacerbat dolorem.

Parilitas corruptio, cum sit causa. Aequalitas quid. Ordo quid.

Respirationis dolentia organa, qualis consequatur spiritus.

Dolentibus spiritus magnus simul et rarus. Inspirationis magna et velocitas causa.

Diffusio parua simul et velocis.

Respiratio magna et velocis causa.

Respiratio magna simul et tarda in delirantibus. Exspiratio parua simul et tarda, quibus. Exspiratio parua simul et velocis, quibus. Diffusio motuum respiratorum causa.

Respirandi simplices quid difficultates, nō certi indicant: coniugate autem, ad iudicium minimē fallax perdunt.

Respirandi difficultates quatuor vltimæ coniugationes sunt vtilissimæ, quæ vnica tantum est penes raritatem & densitatem. Cessationis contra oppositio vnica penes raritatem & densitatem.

Respiratio animalis, facultas refrigerare, propria signa cupit habere, is alarū nasi morū habebit, & omnium musculorū, q; circa faculas sunt, actionē, & cōstentiam factū cōcidendū thoracis. Quādo, n. hic debilius q; expedit mouetur, circa respirationes qdē, spiritus ductū nasi alie aduancat: circa expirationes autem

*Cicidantia tho-  
racis & anfractu  
lunatum de-  
finitum.  
Ipsam trans-  
finitum.*

*Ipsam fieri  
de intercala-  
tionem musculi.  
Respirationem  
ipsam cessantem.*

*Respirationem  
mutuam efficien-  
tem duplex.*

*Cessationem in-  
ter respirationem  
breui & longi-  
am, à quibus  
ipsam profici-  
unt.*

*Respirationem  
mutuam efficien-  
tem duplex.*

*Respirationem  
mutuam efficien-  
tem duplex.*

*Respirationem  
mutuam efficien-  
tem duplex.*

*Respirationem  
mutuam efficien-  
tem duplex.*

autē, thorax confertim delabitur, nō autem pau-  
latim demittitur. Etenim cōcidentia differt à de-  
mitione: quōd illa quidem, facultate agrotan-  
te fiat: hæc autem, integra & valente eadem. Ete-  
nim septum transversum thoracis tensione ad-  
iuuat, solūque illam per expirationem resolu-  
it, nōnihil etiam opitulantibus intercostalibus mu-  
sculis, per quorum actiones ipsi sunt efflati. Cum  
autē duplex existeret cessatio in respirationi-  
bus, vna ante inspirationē, altera ante expiratio-  
nem: vter sanē morus offendatur, cessationē præ-  
cedentem, ab eo quod secundum naturam habet,  
immutat. Duplex igitur existente in mori-  
bus offensione, & duplici itrem in cessationibus:  
vtilitatis quidē defectus, diurni temporis sem-  
per cessationes efficiunt: red vñ dantur verō, bre-  
uiora. Itaq; ab vñdanna calorū secundum natu-  
ram, reddens inspiratio nē magnā, statim etiam  
præcedentē ipsam cessationem, brevis temporis  
efficit. Ab vñdantia verō caloris præter naturā,  
fuliginis oblit, ut expirationem magnam, sic etiam  
cessationem præcedentē reddit breuiorē. Qua-  
re magnus & densus penitus fit spiritus, vbi ca-  
liditatis genus redvndat. Sic etiam si sublara vti-  
litas sit, ob caloris videlicet immixtionem, vbi  
quidem naturalis calor imminutus paratam red-  
dit inspirationem, etiam longa cessatio præce-  
dit. Vbi verō calor præter naturam deperditus  
fuerit, parva quidem expiratio, longa verō ante  
ipsam cessatio accidit. Sapenūm verō calor se-  
cundum naturam est auctus, imminuto calore se-  
cundum naturam. Atq; ita cessatio ante expira-  
tionem brevis temporis redditur: altera verō  
ante inspirationem longioris. Vtrum enim ex  
motibus ipsa urgebit vtilitas, si præcedentē ces-  
sationem cunctatū non permittit.

## GALENI PERGAMENI de difficultate respirationis, liber secundus.

Proprium itaq; desipientiæ symptomā est,  
magnam & raram, hoc est, per longū tem-  
pus, respirationē facere: videlicet ambic-  
hæ, vel vbi obliuiose actionis affectus esse. Nam  
immoderatam facere spiritus attractionem, rursus-  
q; immodicū quietem, eius est, qui nec quā-  
do desinere ab actione oporteat, nouit, nec  
quando rursus incipere: sed in vtriusque mensu-  
ram egreditur, ob convenientis ignoracionem.  
Cum igitur respiratio animale opus sit, desipien-  
tes autem habeant obliuionem rationem, obliuio-  
siores tum circa actionē, tum circa ipsarum in-  
teritū sunt. Quamobrem & actiones & quie-  
tes in multo facientes tempore, hoc modo ma-  
gnitudinem & vtilitatem circa totam respiratio-  
nem efficiunt: id quod Hippocrates cum in vñ  
locis, tum etiam in prenotacionibus, sensisse vide-  
ret, vbi ait: Spiritus magnus & per multum tem-  
pus, desipientium significat. Quo sanē oraculo,  
magnum & rarum spiritum desipientiæ signum  
esse contendit: non tamen necessarium esse, ut  
qui desit, magnū simul & rarum faciat inspi-  
rationem. Nec enim inseparabile magnum &  
rarum spiritū, sed proprium esse delirij obliuio-

Quicquid autem proprium existeret, haud conti-  
nuū est etiam inseparabile. Esse quippe geome-  
tram, propriū hominis est, nō autem inseparabi-  
le, quemadmodum rationale, existit. Licet itaq;  
desicere ex doctrina Hippocratis, omnibus quide-  
m deliris magnū & rarum spiritū luxta pro-  
prium ipsorum rationē comitem esse: nō autem  
deliris omnibus, sed illis tantū, qui nō per aliam  
quamdam affectionē delirio maiorē, habent re-  
spirationem aliter alteratam. Hippocrates siqui-  
dem aliquando magnū & rarum spiritū fieri de-  
liris nouit, aliquando verō ipsius cōtrarium: in-  
terdum in eo dem homine vtrūque vicissim inci-  
dere. Potrō qui in calore & lactu suspirant, du-  
plici de causa post longum tempus inspiratione-  
m magnā efficiunt: tum quod circa curam, ob  
quam trāstant, conversi, per multas ex ordine  
actiones respirant minus & rarius, ob idip tan-  
dem cognātū vno actu totam semel explere atq;  
reparare iactant: tum amplius etiā, propterea q;  
per motores, & spiritus & calor intus mouea-  
tur, q; quidē homini faciens negotiū, cum ad  
maiorē expirationē compellit. At in affectioni-  
bus delirantū, necessitas quidem magnæ respi-  
rationis à prima quidem causa, est persimilis: à  
secunda verō nō item, cum nō intro magis q; ex-  
tri his calor moueat, nisi alia potentia quāda ac-  
cessio fiat. Differunt autem & febdis ratione de-  
liri ab illis, qui aliā aliquo calore cruciantur.

Igitur reuocatis in memoriā quæ in primo li-  
bro sunt tradita, si à solo delirio pervertatur re-  
spirationis cōcinnitas, omnino erit spiritus ma-  
gnus simul & rarus. Si verō à solo dolore, pa-  
rus & densus. At si conspiciantur ambo, & dolor  
præcellenter vehemēter, obseura omnino altera-  
tio ex delirio erit. Sin autē modera nō fuerit do-  
lor, aut plus quidem à dolore, minus verō à deli-  
rio respirationē alterari cōtinget, aut vice versa,  
aut æqualiter luxta vtrūque. Sic etiam si cum alia  
quāpiam affectione delirij complexū sit, respi-  
rationis speciem inter dū aliam efficiet, pot vñ su-  
perat, aut superatur, aut æqua potentia est prædi-  
tum: aut nunc quidem (si ita contingat) superat,  
rursus alio morbi tempore superabitur. At verō  
in priapneumonici, pleuritis, & in angina, ac  
breuiter in omnibus quibus aliquid circa thora-  
cem aut pulmōnem, aut etiam in ventre infla-  
tur sit phlegmone (hoc est, tumore dolente, duro  
& calido) oblesum, parus omnino & densus  
spiritus sequitur: qualis etiā hydrogicus, & eos  
qui se aut post aut obis expleuerūt intemperati-  
tus, necnō prægnantes, ventre promiuiū prædi-  
tōr, anhelosos, purulentos, atque eos denique  
quibus dorsi spina conuorta est, comitantur. Ve-  
rū Hippocrates de his quidem respirandi diffi-  
cultatibus, quæ sunt vel idiotis nōquisiunt, nihil  
memorie prædidit. Potrō in pleuridē quatuor  
mala semper se ostendūt symptomata: videlicet  
febris ardens, asiduus dolor, tussis, ac difficilis  
respiratio, parua simul & densa existeret. Dolor  
appe, non secus quā in perfrigeratio, parua solet  
esse respirationē: verū dolor quidē, cum den-  
sitate perfrigeratio autē, cum raritate. Cum au-  
tem ipsa sit vltus minimē obnoxii dolori, nec  
septim tridū etiam, primū & principissimum

*Proprium ven-  
te non ita  
est etiam in  
parabiles.*

*Suspirantes re-  
lucti, cur post  
longum tempus  
respirationem  
magnam effi-  
ciant.*

*Respiratio de-  
lirantū simul  
& delentium  
qualis.*

*Phlegmone  
quid.  
Spiritus par-  
us & densus  
quæ conuortit  
desipientes.  
Pleuritis sim-  
ptomata sunt.  
Febris ardens,  
asiduus dolor,  
tussis, ac diffi-  
cilis respi-  
ratio.  
Parua acpe  
simul & densa.  
Spiritus rarus  
magnus etiam  
vultus trans-  
versum est pri-  
us etiam in  
desipientibus.*



respirationis organum, ipsius tumor cōprimat, nisi maximus sit, & caput illius occupet, haud quidem sufficiens est vt respirandi difficultatem ex delirio inductam superet, spiritū paruum & densum reddens. Quandoquidem opus est dolore ipsū consistere circa aliquam partē, quæ iuxta respirationem mouetur: aut aliquod ex organis respiratoris coarctari, vt paruum & densus spiritus fiat.

**GALENI PERGAMENI**  
de difficultate respirationis liber  
tertius.

Respirationis  
difficultas qua-  
tuor causis  
habetur.

Methodi dicit  
fieri qua sunt  
consideranda.

**R**ECTE autem Hippocrates rationaliq; diuisione vsus, sexto populariū morborum libro duas opposiōnes difficultis respirationis inter se complicans, eam scilicet quæ secundum magnitudinē & paruitatē est, illi quæ secundum raritatem & densitatē, quatuor in vniuersum fecit cōiugationes: vnam videlicet, magnā & raram: secundam, paruum & raram: tertiam, magnā simul & densam: quartā, paruum & densam. Quibus etiam adiecit ibidem, & reliquas duas cōiugationes, quæ ex collatione inspirationis cum expiratione oriuntur: vtputa magnam inspirationē & expirationē paruum. Inspirationem exiguam, & magnā expirationē. Dux siquidem opposiōnes inter se complicate, quatuor coniugationes efficiūt. Porro qui methodicē velit diuidere, in primis expendat oportet, qualis natura existat, quod diuidendū venit. Quod si simplex esse videatur, quæ iuxta substantiæ ipsius rationē sunt, quot sint, & quæ, ac qualia, considere randum. Si verò compositū, vtang, aut singulas eius partes diuidere expedit: totum autē, ex modo compositionis. Igitur dictio Hippocratis ita habet: Spiritus parui densi, magni rari, parui rari, magni densi, extra magnus intra paruum, intra parvus extra paruum, alius extendens, alius vrgens, dupla intra reuocatio veluti super inspirantibus, calidus, frigidus. Quod itaq; ex spiritus intra & extra matu, totius respirationis actio composita sit, quodq; altera eius pars inspiratio, altera expiratio appelletur, ignorat nemo. Quod verò nullius alterius rei, q̃ morus, propria sint velocitas atq; tarditas, iam est a nobis expositū. Ceterū magnitudo & paruitas, vt motui propria sunt, sic omnino inseparabilia existunt ab eo, quod per localem distantiam fertur: ob idq; iuxta vtriusq; respirationis partem dux differentes opposiōnes erunt: altera iuxta velocitatem ac tarditatē, altera iuxta magnitudinē & paruitatem. Est autem & alia oppositio iuxta densitatem & raritatem consistentes: quæ quidem nō tanq̃ motui, sed tanq̃ alicui rei ex ipsis distantis consistere, in est respirationi. Quare in his tribus opposiōnū generibus omnes respirationis differentias esse necesse est. In velocitate quidem & tarditate, propterea quod hæc propria, & ab omni motu inseparabilia sint. In magnitudine & paruitate, quod per distantiam \* organa respirationis moueantur. Densitas autem & raritas (quæ tertia oppositio est) neutrius propriarum ac primarū respirationis partū proprium

Respirationis  
differentias om-  
nes in tribus op-  
positiōnū, esse  
prebendū.

aut inseparabile existit, verū totius respirationis pars sit per accidens: quod quidem ex duobus cōtrariis motibus quietē distinctū constat. Hæc itaq; sunt primæ differentie totius respirationis. Ceterū cum respirationi res sit, quæ & facere aliquid, & pati possit, aliud vtrius fuerit differentiarum genus in ipsa, vtrius videlicet parte æqualiter inæqualiterve perfectā: aliudq; rursus ipsius totius vt compositæ, partibus inter se mutuo collatis. Hæc cum ita habeant, sciendum primas quatuor differentias difficultis respirationis, in proposita Hippocratis dictione assignatas, totius respirationis esse, cum ad neutrum eius partem raritas densitas ve pertineat. Similiter etiam sequentes duas: nam & in his dux totius respirationis partes mutuo inter se conferuntur. Quæ verò deinceps aliz dux sequuntur, vbi ait: Alius extendens, alius vrgens (quibus tardus & velox pulsus significatur) eas sine alienis ipsius respirationis partis propriis, maximeq; substantiales, putandū est. Tarditas namq; velocitas ab omni motu inseparabilia sunt. Quod postea deinceps habetur, Dupla intro reuocatio, veluti super inspirantibus, inæqualem inspirationē ostendit. Inquirenda est autē eadem oppositio & in expiratione, quam ego omissem puto a transcribentibus, potius quam ab ipso Hippocrate. Addidit præterea & optimē differentis prædictas, calidum frigidumq; spiritū. Quamq; certē in Prætionum libro, horum trium, densi, & magni, & frigidi tantum spiritus meminit, tali dictione vtens: Spiritus densus existens, dolorē, aut caloris effluenscentiā in locis supra septum transversum significat. Magnus autē & per multum tempus, desipientiam ostendit. Frigidus verò ex naribus & ore prodens, valde iam perniciosus est. Reliquas autem differentias subnecit, tum propter breuitatē veteribus familiarissimā, tum propter altitudinē animi, quæ ipsimet erat genuina Hippocrati. Demōstratū enim a nobis est, q̃ prauis sit semper hæc vir, vt qui ea quæ aliis medicis nota sunt, præterea, veluti quæ a nemine eorū qui artē ingenue exerceant, ignorari queant: quæ verò talibus sunt ignota, omnia diligenter, simulq; perspicue exponat. Merito itaq; differentias densitatis, vt quæ medicis, tali ignote non possunt, vna summa comprehensas exposui, dicens: Spiritus densus, dolorem, aut maximū incendium significat, in locis supra septum transversum: tanq̃ sanē possumus nos intelligere, quæ cum paruitate quidem, dolorem significet: cum magnitudine verò, incendium inexpugnabile partium supra diaphragma, quod immodice caliditates partū quæ intra id sunt, respirationē in magnitudine & densitate augere nō possint. In pleuritide itaq; & peripneumonia, anginiq; & orthopneia, densus sit ac paruus spiritus. \* Imo verò etiam si pleuritis nō adsit, solus autem dolor costas infleat, spiritus densus & paruus redditur. In vniuersum autē, siue tumor quis sit premeas coarctansq; quodcumq; respiratorii organum, siue dolor circa quæcumq; partem, sic ac propinquante respiratorii organo, vt ipsi motus simul moueatur, densus ac paruus ipse spiritus erit. At calore maximo in respiratorii organo co-

Respiratio  
totius quatuor  
fuit differentia.

Spiritus frigidus, ore & naribus prodens, admodum paruum visus est. Inuicemq; fuisse vtriusq; familiarissimū, Hippocrati grauitas.

Spiritus densus, quod significat.

Spiritus paruum & densum in quibus afflicti sunt accedat.

*spiritus densus  
fuit & ma-  
gnus quando  
inducitur.*

nis coaceruato, spiritus densus simul & magnus  
agitur: id quod indices in omnibus exventibus  
febrisbus est conspicui. Quare ignorandum non  
est Hippocratem, densum quidem & paruum, do-  
lori: spiritui autem densum & magnu, incendio  
calidians inuisse. Quemadmodum enim dolenti-  
bus cruribus, progredi multu non possumus,  
eodem modo ubi aliquid organu ex eis quæ in-  
ter respirandum mouentur, doluerit, parum re-  
spirare cogimur, & citius desistere cupimus: quæ  
citius à dolore immunes reddamur. Ceteru  
quanto citius quam oportuit, motus respira-  
tionis cohibetur, tantu ipsum animal defectuo-  
sius est inspiratione recreatu. Quemadmodum  
igitur si quis pauciores cibos, quam sit ex usu,  
accipiat, hic statim alioru ciboru opus habebit;  
sic si quis minus quam expediens sit, inspiran-  
tia citius inspiratione indageat: qua ex occa-  
sione spiritui densari cõtingit: id quod etiam sen-  
tiens Hippocrates in libro de Victus ratione in  
acutis morbis, ait: Spiritu intra retentum, proli-  
bet quidem spiritui intro ferri, cogitque cum citò  
expirari. Porro iuxta copiam eius quæ inspira-  
tur, substat, oportet magnitudinu ipsius re-  
spirationis metiri. Reliquit autem Hippocrates  
exemplum difficultatis respirationis ortæ à dolore,  
quod multis locis iam ipse dixerit, actiones or-  
ganoru à dolore impediri, quodque illius cog-  
nitio oppido quæ facilis sit. Nec verò tantu à dolore  
& retento spiritui, oriri debitas respirationis po-  
test, sed vel maxime etià ab incendio febris cali-  
daris: cuius quidem est multu densumque spiritum  
reddere. Magnus spiritus, quantitate circa  
singulas indicatur respirationes: multum verò,  
possibile est aliquando ex multis paruis coacer-  
uari: vt videre est in pleurincis, qui cum magnu  
quidem spiritui semel ducere ob dolore nò pos-  
sunt, quamvis ætè largiori ob febrim opus ha-  
beant, continuate tamen actionis, equalè mul-  
titudinem spiritus magnis respirationibus colligunt.  
Quod cum paucæ magnæ, hoc multæ par-  
uæ præstant. Similiter in peripneumonici loco-  
tum est opus spiritui, verum ob coarctatione mo-  
torum parum inspiratur: quare densitas iacturam  
paruæ inspirationis restituit. Quod autem in or-  
thopneumici paruis & densis ob coarctationem  
fiat spiritus, haud scio an quisquam ignoret. Ceterum  
omnes qui ob talem coarctationem suffi-  
cienter inspirare nò possunt, stertorosam faciunt  
respirationem, & in suffocationis diuturnam ve-  
niunt, si decumbant: ob id tum totum thoracem,  
tum collum, & os rectu habere oportet, cum non  
paruum auxilium ipsi ex humilidum figura accedat.  
Quippe ampliora similique longiora sic sunt  
omnia respirationis organa, partim quidem per  
rectam figuram in directam extenta, partim verò  
minus in sese cõdere prohibita. Iam verò re-  
licta etiam parua simul & rara respiratione, Hip-  
pocrates frigida meminit, quod timidi nò alia  
sit parua simul & rara, alia verò frigida. Nam  
cum magna & densa ex immoderato calore col-  
lectio in organa respiratoris gignatur, necessa-  
riò certè parua & rara (quæ illius contraria ex-  
istit) his ipsi organis perfrigeratis oriatur. Si qui-  
dem calida respiratio, cuius similiter meminit,

eadem est cum densa & magna, sub qua videli-  
cet cõprehenditur. Etenim spiritus frigidus, om-  
nino paruis & raris est: densum autem & magnu  
indicare incendiis organoru respirationis, mi-  
nime sanè quis dixerit, nisi & ipse etiam efflatur  
calidus. Solam verò frigidam expiratione dixit  
esse perniciosa Hippocrates, mortisque nunciu,  
quod perfrigerari respiratoris organis plane sit  
perniciosum, cum nimis inter ea sit cor situm,  
insit caloris fons & principiu. At vehemens il-  
lorum caliditas, aut dolor, aut desipientia, nò o-  
mnino sunt perniciosa, licet nò sint extra pericu-  
lum. Nam si facilis respiratio valde magnâ vim  
ad salutem habere putanda est, in omnibus ac-  
tus morbis, qui cum febribus sunt, & intra qua-  
draginta dies iudicantur (quale documentu nò  
his reliquit Hippocrates) vti respirationes diffi-  
ciles minime vacabant periculo. Verum quæ  
iam morientibus accidunt, vt videlicet ipsa expi-  
ratio frigida, ea nullu magnu momentu in præ-  
notionibus habent. Est enim honoru medicoru  
opus, non in quæ iam idoneis apparent, præfigere,  
sed quæ & ipsos latent, & cum nihil mali reget ha-  
bere putetur, cernuntur. At frigida respirationis  
Hippocrates meminit, vt omnes respirandi diffi-  
cultates complecteretur, & quod etiam magnæ  
simul & dense ipsa opposita existeret. Porro in  
Prænotionu libro nihil de maxime respiratio-  
nis difficultate scripsit nobis Hippocrates, quam  
doquidem propositu illi erat in prænotionibus  
solum ea quæ verè acutorum morboru propria  
sunt, recensere: quæ verò diuturnis propria es-  
sent relinquere. Quare rationaliter etiam illic  
inæqualem respirationis difficultatem, ex alio  
morboru genere, consualione videlicet, proce-  
dentem, omisit. Acuti autem sunt morbi, qui om-  
nino cum febribus cõninentibus sunt: vt pleuri-  
tis, peripneumonia, pleritis, ac febres ætinas.  
Nec meminit in prænotionibus de his respiran-  
di difficultatibus, in quibus aut sola inspiratio,  
aut sola expiratio est magna: siue nec veloci-  
nec tardæ respirationis: quod ad quinq; iam di-  
ctas difficultas respirationis differetias hæc omnes  
reduci possunt. Iam verò expiratio rara simul &  
magna (id quod etiam docuit Hippocrates) con-  
tinuorum oscitationu & signum & causa medi-  
cationis existit. Nam cum oscitatio continua fiat  
ob vaporosum quandam crassumque spiritui in ge-  
nere musculoru contentum, certè expiratio quæ  
rara est & magna, erit quidè signu, vt affectus  
in contrarium mutatur: causa verò medicato-  
ria, quod contrariis sint cõteraria remedia. Ete-  
nim per talem expiratione spiritus diutius colli-  
bitus, quæ ratione singulus sanatur, videlicet alicui  
evacuando, eadem etiam mederi oscitationibus  
poterit. Quemadmodum autem ipsa detentio  
spiritus superflui excernere potest, sic respiratio  
continua, ventulare simul potest & exallescere  
perfrigerata: existens eorum & signu, & causa fa-  
lubris. Iuxta hanc igitur ratione etiam in secundo  
Morboru populariu consulu Hippocrates, vt  
is qui perfrigerari essent, exandecentiam in  
duceremus, & revocandi calor, et sanguinis in  
vafa subter cunculum colligendi gratia: tanquæ  
sanè innatu calida excitare queat exandecentia.

*Expiratio frigi-  
da quæ morti  
nunciatur.*

*Carissus in ca-  
lida fuit &  
principium.*

*Spiratio faci-  
lis, ad salutem  
magnam vim  
obtinuit.*

*Medici optimi  
innou quod  
sit.*

*Acuti morbi  
sunt, qui cum  
febribus  
cõninentibus  
sunt.*

*Expiratio rara  
simul & ma-  
gnæ continua-  
tionis oscitati-  
onis signu at-  
que causa existit.  
Oscitatio est  
tota causa.  
Contrariis  
sunt contraria  
remedia.*

*Spiritus diu co-  
hibitus, sanatur  
singulis.  
Respiratio con-  
tinua ventula-  
re simul potest  
& exallescere  
perfrigerata.  
Respiratio con-  
tinua ventula-  
re simul potest  
& exallescere  
perfrigerata.*

*Revocandis  
calorem colli-  
gere, vt  
distingueret  
respirationem.*

*Opus est respi-  
rationi dolenti  
digni, cur par-  
um est creditu  
quæ spiritus.*

*Spiritus calidi-  
us in medio de-  
fuit spiritus  
calidi.*

*Respiratio  
parua & ma-  
gnæ continua-  
tionis oscitati-  
onis signu at-  
que causa existit.*

*Respiratio la-  
borantem curat  
ut spiratio re-  
la.*

*Respiratio  
parua & ma-  
gnæ continua-  
tionis oscitati-  
onis signu at-  
que causa existit.*

quæ quidem quod densior etiam omnino reddat respirationem, nemo ignorat. Vtremur itaque ipsam refrigerant, decoloratis, gracilibusque, nū tamē perpetuū, sed ex intervallo, & opportunis temporibus, ne videlicet facultatē valde lædamus. Verumē immo quod Hippocrates ait, spiritū frigidum ex naribus & ore prodeuntem, valde perniciosum existere, id in morbis acutis intelligendum est. In aliis autem morbis, qui citra febrem consunt, sæpe frigiditas totum animi malis haberi apprehendit: & accidit quidem neque his extrā periculum, nō tamen penitus pernicioſa. Ex his enim est stragulario vteri, omnique spiritus interceptione, quæ mulieribus quidem assidue, viduis præsertim, accidit: raro autē aliquando & viris. In huiusmodi enim omnibus affectionibus, præ multitudine materiæ frigida, imatus calor opprimitur, ad similitudinem illam, quæ suffocatur multis humidis ignis obruta. Quare etiam accendere quandoque possibile est hanc, ubi materiam exsuperaverit. Aliquando tamen consumpsit materia, necessarii etiam ipsa extinguitur: quare in his qui per acutos morbos sic expiunt, nulla spes salutis relinquitur.

Quod autē in spiritus interceptionibus nō omnino respiratio perit, licet minimus rarisimisque spiritus per illas trahatur, hinc cognoscitur manifestissime, quod si aut plūs, aut tenuissimū hanc, ægri præcendunt naribus, illam moereri percipies. Atque in affectibus sane id genus omnibus spiritus densus, causa simulque signū salubre existit: quemadmodum conuulsarū ostentationē, exploratio tara simul & magna. At verō anhelosa respiratio, quæ & densum spiritum facit, & thoracem nimis distendit, oritur aliquando quidem in affectibus multa inspiratione indigentibus. Fit tamen interdū a cursu, aut ab alio quo vis exercitio improbo. Eiusmodi etiam spiritus accidit in omnibus ardentibus febribus: & quando obtutatio, aut com pressio, aut coarctatio, instrumenta respirationis infestat. In vniuersum autē, quod aut tumor, aut dolor quispiā, in partibus iuxta illa constiterit, paruus & densus necessarii spiritus ducitur. Porro spiritū impetū densatū, anhelationē cōsuevit vocare Hippocrates: quē admodū & sublimem eum, qui paruus simul & densus fuerit, qualis in anginis percipitur. At obsecrum spiritū aërē esse rescentibus malū, sic uti & non parientibus. Etenim nō parietes mulieres (sunt autē hic omnino quæ nō probē purgantur) maximē a spiritus interceptione, apprehenduntur: perinde vtilis, quæ diu sunt orbatæ suis viris. Quare spiritus qui conspicit & insignes non sunt, eos obsecrum nominat. At sermo de respiratione difficilis suum iam hic finem fortissime.

## GAL. DE PVLIVVM VSV LIB.

de pulsum vsu, lib. vnu.



On est eundem vsum pulsus & respirationis, cōtra quā medici existimant, certē rationibus huius quāvis cōtendere possit. Primū: nam respirationem si cui adimās, illud mortē afferes. At pulsu si complures particulas prius, nō magnopere lædes. Quippe si vel arterias quæ

per inguina descendūt ad crura, vel quæ per alas feruntur ad manus, laqueo cōplecti velis, vniuersas quidem, quæ in iis artubus sunt, arterias pulsu priuabis: nō tamē artubus ipsis aut mortū addices voluntariū, aut sensum. At si nervos funiculo religes, immotas prorsus, insensibilesque extemplo reddes particulas. Debebit igitur & arteriæ ubi similiter nervi essent affectæ, quod singulis membris antea cōtulissent vtilē, id ipsum protinus præstare desistere. Ad hæc si ipsas quæ in collo sunt arterias vinculo exceperis, nullā evidentem noxā animali attuleris: ramentis cor cum cerebro, principē scilicet instrumentū actionū vitalium, cum principe animalis, cōnectant. Si igitur cum lineæque arteriæ, nihil tamen officium, cōstat vtiq; & cum valentes sunt, nihil esse cōferre. \* At si obiiciamus illi qui arteriarum vsum sic negligit, nos maximē præfugire ex pulsus minimū quidem fieri ut ex causis id genus, quæ plurimū habet momentū, sed ut ex opportunis signis, responsum dabit: ut si quis mortē ex incuriis vnguibz nigricantibus cōlectet. Cor si quidem principē viscus existere, ex quo omnes arteriæ oriuntur: ac primum eas eundem cum illo mori seruire, offendit similiter, atque ita nō exigui rei indices esse posse. At maior medicorum atque philosophorū pars, inde eundem vtrinque mortis esse vsum existimant, quod vtrique similes iidem ex causis mutationes accipiat. Nam & qui exercitatur, & qui in balneo lauitur, & qui aliter quouis modo exaluitur, eorū nō modō respirationem celeriorē frequentiorēque ac maiorē cōtineri licet, sed pulsus etiam pari modo mutatur. Præterea qui algent, aliterve quolibet modo perfrigerati sunt, horum sicuti respiratione rarior, tardior, ac minor visitur, ita & pulsus. Similiter qui vrentibus prehensi sunt febribus, ut maximē in & celeritē densissimēque respirant, sic etiam maximē, densissimē, & velocissimē, iis pulsant arteriæ. Quod si ab immodica repletionē pulsus sensistis maiores, respirationes minores, ne id quidem sermone hunc reddat ambiguum. Quippe minorē tam respirat quā pulsum idcirco habent, quod angustius transverso eorum septo superstit locus. Ceterū quantō minor, tantō hunc & crebriorē habent: scilicet respirandi paruitatem, adiduitatis eius ope pensantes. Ideoq; tantūdem minor simul & frequentior respiratione potest, quantū maior simul atq; infrequentior. Dicimus autem hoc loco rariorē pulsū eum qui comestioni succedit, non vtiq; cum eo qui comestione præcedit comparantes (quippe quo est frequentior) sed ad respirationis speciem referentes. Igitur si respiratio pari cum pulsū modo, illud ex causis mutatur, non tamen parem noxam, cum perit, affert, licet vtiq; hinc etiam colligere opposita: nempe tum ambos morus a natura ciuilem vsum grati esse datos, tum non infusum: id quod est impossibile. Itaque nobis investigandum est, quā parte altera rationum claudicat, ipso respirationis vsum pro norma nobis propōitū. Qui quidem duplex existit: nempe alter qui maior est, insitū caloris custodia: alter qui minor, animalis spiritus nutritio: in quorum vtroque ex attracto per nares spiritum accedere

*Spiritus frigidus ore & naribus effluit, in acutis tantum morbis illi perniciosus admodum.*

*Respirationem non omnino perisse per interceptionem spiritus: nam quæ ratione cognoscitur posita.*

*Anhelosa respiratio vnde proficitur.*

*Spiritus parvus densior quam de decurrit. Anhelatio. Sublimis spiritus.*

*Spiritus obsecrum, quāvis sit malus. Spiritus interceptione fieri ac videri frequentissime erroris.*

*Pulsus ex respirationem non ita firmus vsum, quāvis insitū caloris custodia, alter animalis spiritus nutritio.*

*Nervus seu interceptio partis in quas prohibetur delatatio non finalis ex se.*

*Præfugium ex pulsus sum.*

*Cor esse attractum originem.*

*Pulsus ex respirationem vnde colliguntur esse vnum eundemque vsum.*

*Respiratio ex pulsus vti in causis mutatur, respirationes autem minores atque crebriores.*

*Respirationes in modis redditis pulsus quidem maiores, respirationes autem minores atque crebriores.*

*Respirationes vsum illi duplex: vnum insitū caloris custodia, alter animalis spiritus nutritio.*

*Cerebrum sui  
respiratione  
per vias.*

*Respiratio ple-  
ni fieri ad cere-  
brum ad ba-  
sin cerebri con-  
ducitur.*

*Arteriam an-  
imalem exha-  
ueri per vasa  
huiusmodi.*

*Corpus vinctum  
sui esse non  
transparabile  
et fluide.*

*Flamma ex-  
tinguitur sub co-  
mitione medi-  
cinali.*

*Respiratio flo-  
rida, cordis calo-  
rem mouet.  
Calorem cysti-  
ca reliqua  
post cor partem  
duplex.  
Calorem ad cor-  
de membrum o-  
rium demittit  
per venas.*

*Respiratio animi  
et pulfus est  
vni idem.  
Pulsus est do-  
mum calorem  
nudi graue.*

accedere cerebro vilitatem dicimus. Id quod vi-  
deri possit in causa, vt caronibus arteris (que  
sanguine calido & halituoso plenæ, cum perpen-  
dunt ad cerebrum, antequam duram eius mem-  
branam transierint, iuxta ipsius cerebri basim  
multis ac variis plexibus involutæ, admirandum  
quoddam recte conficiunt: vt quemadmodum  
in vaforum testium revolutionibus semen, atq;  
in voluminibus intestinorum chylos, ita in eo  
sanguis ille diutius hærens, perfectissimè elabo-  
retur, additq; simul animalis qui in cerebro est spi-  
ritui, alimentum copiosum) vinculo exceptis,  
per diem integrum animal sine noxa perducit.  
Quamquam certè si cogitar tale animal curre-  
re, diu quidem id facit potest, postea vero fati-  
scitur, atq; elanguescit: cum animus ille animalis  
spiritus, quo pleni sunt ventriculi cerebri, assiduè  
nutritu possit, absumaturq; per voluntarias,  
præcipuè violentas motiones. Cæterum si animal  
quiescat, quævis cōmercium cum cor-  
de sit interceptum cerebro, satisfactæ tamen ei  
diu tæxus ille reticularis potest, ex animalis spi-  
ritui in motum voluntarium minimè tum con-  
sumpto. Mirum autem esse non debet, si alicuius  
partis haud omnino percat caliditas, etiam si ar-  
teris illius vinculo constringantur. Nam cum to-  
tum corpus sit sibi conspirabile & fluxile, certè  
si non per arterias, at per alia, & præcipuè per  
venas, propter eum qui est de vna in alteram  
transitum, in omni particulam deferretur à cor-  
de calor aliquid. Nec vero simile est, aut in isti  
caloris principium pati, aut aliquod eorum quæ  
ab illo calore accipiunt. Id siquidem semper ter-  
uere est opus, vt quod tum cæteris pulsant vim  
præbet, tum ea calfaciat: his autem ad salutē est  
fatis, si nō omnino sint frigida. Nec mirari præ-  
terea debemus, si principium ipsum, vbi respiratio  
pernitiatur, plus quam cætera noxæ contrahit:  
quippe sub cucurbitulis medicinalibus flamma  
illico extinguitur. Iam verò si cor nudatū refrige-  
ret, ceterumque perit animal: si nō calidū seruet, pa-  
tur oculi. Quod si corde refrigerato, ac propere  
ad animal iam mortuum, in altervtrū ventriculo  
rum eius, & præcipuè in sinistram, inferas digi-  
tum, magnū inibi calorem deprehendes, longèq;  
maiores quàm in aliis sit partibus, dummodo  
pro naturæ modo se habeant. Siquidem vt par  
hæc caloris portio cordi est minimā, sic reliquis  
partibus omnino est magna. Proinde vbi quod  
pro naturæ modo est, non seruat, cordis quide-  
m calor, qui velvū flamma est, perit: reliquos  
calor longo tempore durat. Porro illi sola respi-  
ratio calorem tuetur. Aliis autem partibus du-  
plex eius custodia est: pulvis videlicet, qui velvū  
quædam est respiratio, & quod ex abundantiore  
naturæ gratia accedit, qd à corde confluat. Quod  
autē non solum per arterias, sed etiam per venas  
confluat à corde calor, hunc colligere licet, quod  
quibus ex vinculo est, exceptæ fuerint, ob vulnera,  
partes in quas secebrant, fuerint refrigeratæ.  
Cum igitur nihil iam aduersari videatur, quo mi-  
nus vnus respiratiois & pulsus vnus, sinifque  
sit, faciliè promptumq; collectu arbitror, caloris  
in qua q; parte custodiendi gratia pulsus condi-  
tum esse: atq; ita, quod ex respiratione vni præ-

statut cordi, id ex pulsu calori illi qui in toto est  
animali, accedere: cōmunem verò vtriusq; esse,  
& animalis spiritus nutritionem: magis tamen  
arteriarū propriam. Quoniam igitur in us que  
de respirationis vsu tradidimus, nobis monstra-  
tum est, nanquā calorē per inspirationē quidem  
refrigerari: per expirationē autem purgari, sumi  
do scilicet excrementū excofluere: ambas verō actio-  
nes ad eius custodiam conferre aliquid vñle: pa-  
ret arbitror, quod in pulsu etiam idem ducendū  
erit: nempe in diutole arteriæ, sublatū quā-  
piam attrahi: in systole, qd ex humorū devotiō-  
ne in toto animali contractum est, velvū sumi  
superfluitas, expelli. Verū quemadmodū &  
fauces, & pulmones, & vniuersum pectus, dum  
recipiuot spiritū dilantur: itidem arterias, quo  
trahunt tempore, dilatarī oportet, ne quo spi-  
ritum reddat, vt existimauit Archigenes. Cum  
& quies illa que arteriarū contractiōni succedit,  
cum multo maior sit ea que dilatationem sequi-  
tur, sicuti quæ inspirationem præcedit, & quæ  
peruenit illi: ostendit sane, etiam secundum hoc  
esse quandam similitudinem inter ipsam respi-  
rationem & pulsus. Cuiusmodi etiam instrumentis  
spiritus res inspiratio est, eiusmodi arteriæ di-  
latatio exiit. Et cuiusmodi est illis emissio spi-  
ritus, eiusmodi est arteriarū contractio. Cuius  
quidem duplicis & compositi arteriarum motus,  
quod nominamus pulsus, auctor & origo est cor.  
Cæterum cum vis illa, vnde cor contrahitur di-  
lataturq;, in omnes arterias per tunicas earū in-  
fluens, eas cogat aperiri, quemadmodū ipsum  
cor: vñq; sicut illud dum dilatur, ea que oscu-  
lus suis appropinquat, trahit: item contrahitur,  
expellit: sic & arteriæ, cum se aperiant, ad se ven-  
diq; trahunt, cum contrahuntur, in omnem par-  
tem expellunt, videlicet per vniuersos meatus,  
quibus in intestina, ventriculum, vniuersam cu-  
rim, atque adeo in venas se aperiuot. Quippe si a-  
nimali alicui, ex his quibus arteriæ sunt amplæ,  
magnas multasq; arterias quis vulneret, vniuer-  
sum per eas sanguinē euacuat. Sunt itaq; arte-  
riis & venis communia oscula, per que quidem,  
dum dilantur arteriæ, ex venis trahunt: in eas  
dum contrahuntur, reuertunt. Sicuti nimirū per ora  
quæ in cutem finiuntur, quicquid halituosum si-  
mudumve excrementū habet, excremūt: recipiūt  
autē ex aëre ambiente, nō exiguum in se portio-  
nem, per aliq; spiramenta similit. At à corde  
quidem accipiūt pulsus: reddūt autē ei minus, pro-  
pter membranas illas, quæ in earū superna na-  
scentur parte: quanq; certe aliquid impertiuntur.  
Iam verò cum sanguis in arteriis, enā recte se ha-  
bente animalis, cōtineatur: manifestū est nō ideo  
dilatarī arterias, quod spiritu profecto à corde  
impleatur: sed potius ob id impleri, quod dilate-  
tur. Quippe si essent sanguine vacuæ, si enī disten-  
se possent, vt exiguo tempore, quod à corde con-  
fluit, ad fines earū perveniret: sanguinē verò in  
se habentibus, si enī omnino nequit, vt motus ce-  
leritas cum ea dilatatione cōsentiant, quæ ex his  
a corde implendis proveniat. Arteriæ itaq; seipsas  
mouēt, vicissim se attollēt, sumum intētiq;: idq;  
eadē qua cor us: quā scilicet ab ipso corde orta,  
per tunicas earū transmittit ducimus. Est enim vi-

*Animalis spiritus  
nutritio  
est motus com-  
munis respi-  
rationis et pulsus.*

*Calorem in-  
animum respirari  
per inspirationē  
et purgari est  
per expirationē.*

*Difficile arte-  
riarum sublatū  
attrahi, spiritum  
attrahi, systole  
expelli, systole  
expelli, systole  
expelli.*

*Arteria dila-  
tatur de tra-  
henti spiritum.*

*Pulsus et respi-  
rationem simili-  
tudo.*

*Cor est prin-  
cipium compositi  
arteriarum mo-  
tus.*

*Pulsus facili-  
tate à corde in-  
fluere arterias,  
per aperturam  
interiorum sublatū  
est.*

*Arteria tra-  
henti, dum dila-  
tatur, expelli-  
turi cum con-  
trahuntur.*

*Arteriarum trahi-  
re à venis in  
illas potest per  
communem os-  
culum.*

*Arteriarum partem  
corde singere  
sanguinem non  
trahenti in arte-  
riis.*

*Arteria non  
quia impitior  
dilaturatur, sed  
quia dilatatione  
implatur.*

*Arteria seipsas  
mouet, gradum  
que est facili-  
tate.*

Respirationem  
esse apud ani-  
male potentia  
pulsum, rati-  
onem.

Diallolem esse  
etiam arteria-  
rum actionem.

Expiratio est  
actio remissi-  
va.

Systolem natu-  
ralem esse rela-  
tionem ad con-  
tractionem.

Systolem repe-  
ritur, quae efflu-  
ium propor-  
tionem responde-  
at.

Impugnatorem  
cibo diallolem  
systolem qualis.  
Calorem per se  
motum ad con-  
tractionem non vertit.

Pueri respira-  
tio et systole ex-  
cessiva.  
Sensum systole  
tardior.

Pulsus a quibus  
mutari possunt.

Mollis tunc  
quidam sine agi-  
tatione ad mori,  
et quando tar-  
diora dantur.

respirationis vis animalis, quae a cerebro profi-  
citur, sic pulsuum vitalis facultas, quae a corde  
emanat, effectrix. Porro vitæ, animalis vita iam  
functio, simulac vacuæ sunt sanguine, prorsus in  
seipsas si dunt, ita ut supra earum tunica pars, cõ  
mittatur cum inferiore: at arterie, paribus dial-  
lentibus nunquid uõ conspicuuntur: quod sanè pro-  
pter alteram earum tunicam, quæ dura est, evenit.  
Quod autè nõ modò systole, sed diallole sit en-  
actio arteriarum, contrà quò nulli arbitrantur, uõ  
admodum perspicuè videtur: cum nimirum ipsa  
diallole sub vinum robore magna fit: sicvñ è di-  
ueris parua, sub facultate imbecilla. Ad hæc, si  
quemadmodum expiratio, sic diallole actionis ef-  
fect remissio, utique nec intensio in ea, nec remissi-  
o, sicvñ nec in spiritus emissione, percipitur:  
nec omnino robur & vehemètia ictus, quæ per-  
cipiuntur. Diallole itaq; mihi ex genere actionis  
videtur. Deinceps considerandum, an sicuti ex-  
piratio remissio actionis thoracis est, ac tanquã  
cessatio quædam: effluio verò actio, atq; idcirco  
intensionem & remissionem admittens, quod ex-  
piratio non facit: sic systole in pulsibus relaxatio  
sit arteriarum operis, aliq; huic annexa invenia-  
tur, quæ effluio non respondeat, actio. Ac mihi id  
quoq; videtur esse verissimũ. Etenim rationabi-  
le est, ubi ex humorum devotione collectus fuligini-  
osus vapor plurimus fuerit, tum animal effluu-  
um appetere. Contrà cum vel ob succi temperiæ, vel  
caloris mediocritatē, nihil talis excrementi colligi-  
tur, tũ expiratione duntaxat. In arteriis quoq;, ubi  
tale excrementum redvndat, similè effluuio sys-  
tolem edo. Reliquas, cum id qd ex ipsis vacuatur,  
halitus q̃ fumo est similis. Quãobrem ite qui se  
ingurgitatũ cibo, per somnũ sit remissior: quid-  
em diallole, systole autè intensior: quippe tunc  
intro magis q̃ foras naturalis calore se cõferent:  
eõq; etiam circa viscera & ventrem, qui succos  
& cibos cõcoquit, iam plurimo collecto, neces-  
sarium est excrementũ, quoniã id quoq; copiosius  
gignitur, naturalè vacuatione desideret. Proinde  
expiratione quidè maior, & plerũq; cũ effluio-  
ne persicuitur: cõtrãctio autè arterie, illi propor-  
tione respõdens. Similiter ambæ & in pueris ex-  
cellunt, quod sit in eis velicemus propter incre-  
mentũ concoctio. Contrà senũ ætas tardiorè &  
minorè videtur habere systolem, vtpote minus  
necessariã, cum & imbecilliter cõcoquant, & mi-  
nimè succos cõficiant. Ad proportionè horũ o-  
mnium, tum anni tempus, tum regio, tum omnis  
vno verbo circumdantibus nos ætẽ ad frigus et ca-  
lorem mutato, pulsus alterare videtur. Pari mo-  
dò & animi affectus omnes, & vitæ fortes, & mor-  
bi, arteriarum motum innotuos extorsisse pro-  
mouent. Qui verò iniquit, arterie nõ agendo  
aliquid, celerius intensius descendere debet pro-  
pter tunicarũ molliem, ubi à diallole dimittun-  
tur, & vterius & celerius, q̃ duras, in seipsas reci-  
dere: faciliè redargui possunt. Quippe faciores  
ad motus erũt molles tunice, cum scilicet facul-  
tates ipis aliquid per eas molliatur, vtpote sic ma-  
gis eis obsequentes. Dum verò postq̃ ab eis sunt  
motæ, rursus permittuntur ad statũ propriũ re-  
dire, tum vniq; duræ, q̃ molles, ob impetũ, robur  
& firmitudinẽ suã cõstitutionis, revertuntur mul-

tò celerius: quemadmodũ grandiores arbores,  
quæ vt cum tenuis trahuntur, sic dimissæ, res-  
cenduntur celeritè. Diximus igitur, & quod pul-  
sus naturalis qui per totum corpus diffunditur,  
caloris grana si condisceat: & quod dilatare arte-  
ria, is calor refrigeretur, contracta rursus pargi-  
tur: & quod motus hi, spiritus moribus omnino  
sunt similes & q̃ animali spiritui cõducant: & q̃  
vna re tantũ, respiratio & pulsus discedant, neq;  
q̃ illa ab animali facultate, hæc à vitali onatur.

## GALENI PERGAMENI introducio in pulsus.



Numeris arterie pulsus habent nõ  
modò sibi inter se, verumetiam cordi  
ipsis persimilè, adeo vt ex vna ipsarũ  
posuiss de reliquis iudiciũ facere: nõ  
tamen motũ omnium æqualiter sen-  
tias, sed earũ quidem quæ partibus carnibus  
insunt, clarius: quæ verò in carnis, obscurius:  
quæ autè carne tantum integuntur, aut intra ossa  
sunt, aut aliis corporibus subiacet, earũ motum  
sensu haudquãq; deprehenderis, nisi fortè exta-  
buertis animal. Nam sic motus arterie quæ spine  
incumbit, tangentibus epigastriũ plerũq; depre-  
hendit solet. Porro quæ in temporibus sunt, tarsis  
pedis, & interna parte corporis, ræ perpetuo mo-  
tu sensibili prædictæ sunt. Verũ neq; expeditus,  
neq; honestus, nec si vsum species, maior com-  
modo aliam attingas, si eas que in carpis sunt  
præteriens, & quod maximè perspicue & expo-  
sitis sint, & secundum rectitudinem sitæ.

De quantitate dilatationis.  
Tibi autè tangenti, arteria sentietur in omni  
dimensione extendi. At dimensiones corporum  
omnium sunt tres: in longi scilicet, latum, & pro-  
fundum. Carterũ cum animal secundum naturã  
habet, cõperies arteriam modèratè à modò di-  
latari: cum autem contrà præter naturam habet,  
interdum secundum quãvis dimensionè partem  
minuitur, partim ex parte: quo casu memo-  
ria tenere oportet, cuiusmodi pulsus naturalis ex-  
titerat. Tum si is qui est præter naturam, auctus  
latitudine inveniatur, largi: si in longitudine, lon-  
gum: si profunditate, altum appellare. Ad por-  
tionem & his contrarios, qui videlicet naturales  
sunt minores, angustum, breuem, atq; humilem  
vocatibus. Pulsus verò secundum omnem dimen-  
sionem in statum præter naturæ traductorũ, qui  
vndiq; est diminutus, parvus: qui auctus vndiq;  
est, magnus nuncupatur. Atq; hæc pulsus sunt in  
dilatatione quantitate differentie.

De motus qualitate.  
Proprie motus differentie sunt, celeritas &  
tarditas: quarum illa quidem, motus quidam est  
concitatus, hæc autem exolutus: quas ita demũ  
diuidu cabimus, si eas ad motum naturalem com-  
parauerimus. In occursum porro qualitate, lan-  
guor ac vehementia consistunt. Carterũ durities  
atq; mollietas, tunc ipsius arterie sunt quali-  
tates: minime autem propriam pulsus differen-  
tiam constituunt, licet cum eo percipiuntur. Tres  
igitur hæc differentias pulsus, & præterea quar-  
tam illam quæ in magnitudine erat & paruitate,  
in percussione arterie reperies.

Pulsus vñ.

Respiratio  
est apud ani-  
male potentia  
pulsum, rati-  
onem.

Pulsus habet  
cor et omnes et  
terras similes.

Pulsus non e-  
qualiter prop-  
ter in arteria  
motibus.

Arteria sub  
ten pulsum e-  
dunt.

Corporum ar-  
terias est om-  
niū apertum,  
vt tanguntur.

Arteria in oc-  
cursum dimen-  
sionem extendit.  
Quantitas cor-  
porum est tri-

Pulsus, quæ a-  
tura modum ex-  
gressus sunt, di-  
gustandus va-  
tio.

Pulsus coloris  
quid,  
Tarditas,  
Languor pul-  
sus,  
Volumen.  
Pulsus durities  
atq; mollietas,  
ad tunc et ar-  
teriarum referri.

## De tempore quietis.

*Pulsus dici fr  
quenti, rarum,  
si moderatum,  
parvum quie  
tem interceden  
tem solum &  
debilem.*

Quintā autē aliam numerabis, quæ est in intermissione, quæ inter percussiones intercedit. Voco enim percussiones, cum arteria tactui nostro occurrat: intermissione autem, quietem quæ inter duas percussiones intercedit: secundum quam, frequens, rarus, atq; inter utrumq; medius pulsus iudicatur: quo in medio pulsus secundum naturam consistunt. Porro omnes ei temporis etiam quantitate diiudicatur. Nam frequens dicitur, cum quietis tempus brevis fuerit: rarus, cum diuturnum. Non fuerit autem alienum, si raroni bus contractio arteriæ ponatur esse insensibilis.

## De æqualitate atq; inæqualitate.

*Æqualitas pul  
sus quomodo in  
dicta veniat.*

Æqualitas autem & inæqualitas in dictis omnibus differentiis invenitur. Nam ubi in illis ordine se consequentibus est æqualitas ac similitudo, æqualitatem tunc vocitamus. Verbi gratia, si pulsuum ordine subsequenteum magnitudo fuerit æqualis, ibi tum pulsuum in magnitudine æqualem dicere possumus: sin in celeritate, celeritate æqualem. Ad eundem etiam modum in vehementia, frequentia, & languore. In æqualitas porro, æqualitatis est labe, in quavis pulsuum differentia ipsa accidit.

## De pulsui ordinato inordinatog.

*Pulsus ordinat  
us, inordinat  
us, quomodo  
discriminandi.*

Nonnunq; autem & post certam quandā percussionū numero præfixitarum seriem, pulsibus æqualibus inæqualis vnus intercedit, idq; multis modis. Nam tres æquales, quartus inæqualis subsequitur, servaturq; id deinceps vno tenore: aut quatuor, quintus: pari modo & in omni alio numero. In quibus certe omnibus æqualitas nō servatur, ob eamq; causam pulsus fit inæqualis. Quia verò certa quedam series servatur, ob id or dinatus vocatur. Quæ certa periodos si minimè servaretur, pulsus is diceretur etiā inordinatus.

## De inæqualitate quæ in vno pulsu accidit.

*Inæqualitas in  
vno pulsu quomodo  
accidat.*

Accidit autē & in vno pulsu inæqualitas, tum partibus arteriæ situ & motu inter se dissidentibus, tum cuiusq; pulsus motu sibiipsum non consentiente. Inæqualitas igitur in partium situ accidit, cum arteria ipsa à propria sede traducitur. In motu autem, cum arteriæ velocius aut tardius, tempestivius aut serius, vehementius aut languidius, tempore diuturniore aut breviori, assidue aut penitus nihil, moventur. At in singulis pulsus partibus est inæqualitas, cum pulsus est interitus, repetitive. Præterea cum motu celeritate eandem, aut vehementiam, aut languorem, aut magnitudinem, aut parvitatem non servat. Sunt igitur hæ simplices inæqualitates.

## De pulsuum inæqualitate composita.

*Inæqualitates  
compositæ pul  
suum.*

Compositæ autē fuerint, quatenus licuerit al teram alteri, ac singulas singulis, aut vnam pluribus, aut plures pluribus copulari. Quarū nōnullæ quidem ad apte sunt propriam appellationē: quemadmodum pulsus vermicans, formicans, & hæcticus. Vermicans quidem, cum arteria velut reptantem vermem, atq; fluctus instat: subsistentē nobis repræsentat, nō autē tota ipsa vno tempore dilatarur. Ceterū si cum exigua dilatatione id accidat, vermicans: sin cū magna, fluctuosus sim pliciter appellatur. Perspicui autem est, q; vermi

cans pulsus, languidus est & frequens. Qui verò languidus summè fuerit, frequens ac parvus, is formicans cognominabitur: qui tamen celeritate præ se ferat, nō tamē est revera celer. Hæcticus verò, q; in modo febris, ita pulsus quoq; nuncupatur, quod nihil magnopere immutetur, sed perpetuo sui similis, colitur, ac nunq; solutus permaneat, vtpote toto corporis habitu in febribus eiusmodi ac pulsibus, in statū morbosum mutato. Vt igitur quæ sunt dicta, denuo in memoriā revocem:

*Formicans pul  
sus, qui dicitur  
tur.  
Formicans pul  
sus non est, ce  
ler.  
Hæcticus pul  
sus.*

Pulsus magnus est, qui fit cum arteria multū in longū, latū, & profundū deducitur. Lōgus, cum in longitudinē tantū. Latus, cum in latitudinē. Altus, cum in profunditē. Pulsus autē vehemens est, qui valide tactū percussit. Molli, in quo arteriæ tunica blanda est ac tenera. Celer, qui fit dum arteria exiguo tempore dilatatur. Frequēs, cum paruo interposito repetit. Acqualis, qui serie cōtinua sibi est æqualis. Ordinatus, qui singulis percussiois est æqualis. Qui verò in vna percussiois est inæqualis, in vna percussione dicitur inæqualis. Pulsus omnibus his cōtrarij, satis sunt perspicui. Liqueat præterea, quod aliorū contrariorū omnium vnus est medius: æqualis verò & inæqualis, nullus est medius: sicut nec ordinarij & inordinarij: quodq; illorū quidem omnium medijs ipsi sunt secundum naturam, in his verò solus æqualis & ordinatus.

*Pulsus ma  
gnus.  
Longus.  
Latus.  
Altus.  
Vehemens.  
Mollis.  
Celer.  
Frequens.  
Acqualis.  
Ordinatus.*

*Pulsus inter a  
qualis & in  
æqualis pul  
sus est medius  
sicut neq; in  
ter ordinatum  
& inordinatum.*

## De causis pulsuum.

Cū ab omni causa pulsus mutari soleant, triplicem & generalissimā mutationis ipsorū differentiam statuo. Ac prima quidem mutatio, naturalis existit: secunda nō naturalis, quæ nondum præter naturā: tertia deniq; præter naturā. Verū omnes hæ mutationes, differentias naturales sequuntur. Arteriæ quidem, aliq; aliter natura moventur. Proinde fiquis eas illi esse exploratas oportet, qui velit dignoscere, à qua causa, & quatenus pulsus ipsum mutari esse cōtingit. Proprium autē cuiusq; pulsuum experientia certū dicitur: ob idq; arteriā tangere sæpe cōvenit, potissimū quidē perfecte sanū, ac dum ab omni vehementi motu quiescit: post autē, & in ipsis affectibus. At cum fieri nequeat ut pulsus omnium experientia explorētur, certē artifex plurimū poterit, si eorum quæ multis passim similiter insunt, scientiam sibi cōparat. Nam cōmunio quæ datur viris inter se est, quemadmodū etiam mulieribus: quam qui probè calluerit, à recto aberrare non potest. Ac viri sanè in vniuersum mulieribus pulsus habent maiorem multo, vehementiorēq;: ceterum tardiorē paulo, ac longē rariorem. Qui natura sunt calidiores, ij quidem pulsus habent maiorem & celeriorē, ac longē frequentiorē, non multo tamen vehementiorē. Qui autē natura sunt graciliores, maiorem quidem, ac longē rariorem, verū non multo vehementiorē. Mutantur verò pulsus, & per ætates. Puero recens in lucem edito, pulsus frequentior est, sicuti seni rarior. Qui verò ætates sunt inter illos media, vsq; pulsus ad portione respondens, pro viris scilicet propius ad pueri aut senis ætate accesserint. Pari modo puero quidem celeritimus est, seni verò tardissimus: mediū interdix ætates fortissimè. Ceterum inter ætates,

*Pulsus mutationis differe  
ntia triplicis.*

*Pulsus cuiusq;  
propriam experi  
entia cognoscit.*

*Pulsus virorū.*

*Pulsus calidiorum.*

*Pulsus gracilio  
rum.*

*Pulsus infan  
tilis.*

*Pulsus senis.*



*Pulsus florens  
tunc.*

maximus florentiū est pulsus: minimus autē senium: medius inter ipsos puerorū, est paulō maior. Præterea florentium quidem vehementissimus, senum autem languidus, puerorum denique medius. Sed per anni tempora pulsus etiam mutatur.

*Pulsus differens  
secundum ætatem  
distinguitur.*

Siquidem vere medio, pulsus sunt maximus & vehementissimus, celeritate verō ac frequentia, moderat. Pariter etiā & autumnō medio se habent. At progrediente vere, magnitudo quidem ac vehementia ipsius minuitur: augetur autē celeritas & frequentia: ac tandem ubi æstas advenit, sūt languidus, parus, celeres, ac frequentes. Autūno verō progrediente, omnia minuitur, magnitudo, vehementia, celeritas, & frequentia: ut cum hyems accesserit, iam sint pulsus in paruitate, languorem, tarditatem, ac raritatem mutati. Porro ut veris initium, autumnū exitus, ita veris exitus, autumnū initio respondet. Tum quemadmodum æstatis initium, æstatis exitus sic hyemis initium, hyemis exitus respondet. Proinde quæ ab ætate media, hyemem media, in vtraque partem distant, idem æqualiter pulsū immutant. At æstas media, partim hyemi medix est similis, partim dissimilis. In vtraque enim pulsus sunt parus, ac languidus: æstas tamen sunt celeres, ac frequentes: hyeme verō tardi, ac parvi. Non tamen sunt parvi pariter hyeme atq; æstate, sed æstas minus nec pariter hyeme atq; æstate languent, sed minus hyeme. Mutatur & per regiones pulsus, pectus alias constitutiones æris ambiens. In calidis quippe, tales reddūt pulsus, quales citate media: in valde frigidis, quales hyeme media: in temperatis, quales vere medio: quæ verō inter has sunt medix, ad portionem se habent. Mulieribus vtero gerentibus, pulsus sunt maiores, frequentiores, ac celeriores: cetera verō modū suū naturalem retinent. Somnus etiā permittit pulsus. Nam principio quidem minorem ipsū, tardiorē, rariorem, & languidiorem efficit: progrediente verō tempore, tarditatem intendit, & raritatem, idque præcipue post cibum. Maior autem sit tunc & vehementior. Quod si diuturnior sit fuerit, rursū in languorem mutatur ac paruitatē: tarditatē autem & raritatem retinet. Qui si somno sunt exciti, protinus quidē us pulsus sunt magni, vehementes, celeres, frequentes, & turbati quodammodo: verū nō ita multo post, reuertuntur ad mediocritatē. Quod verō ad status corporis acquisitionē pertinet, non aliter h, q̄ naturales, pulsus immutant. Quandoquidem qui natura erat gracilis, factus postea quadratus (quæ Græci *diapētes* vocant) pulsū habet ei, qui talis natura est, similem de ceterisq; pari iudicio. Corporis quoq; temperamēta acquisitionē, laud secus q̄ naturalia, pulsus immutant. Inter causas autē non naturales, incipientes quidem exercitationes, quoq; ad mediocritatem pervenient, pulsus vehementiores efficiunt, magnos, celeres, ac frequentes. Si quis verō multū ac supra vires laboret, paruos, languidos, celeres, ac frequentissimos. Sin modū plurimum exerceat, adeo ut vires sint exolutæ: magno opere, paruos admodum, languidos, tardos, ac raros pulsus habebit. Quod si ad virum progrediat, dissolutionē, pulsus habebit viri

*Pulsus differens  
pro diversitate  
regionum.*

*Pulsus gerentis  
vires.*  
*Pulsus dormientis  
tunc.*

*Pulsus experientis  
ad somnum.*

*Pulsus mutari  
ab æquitate  
habituū &  
temperamētis,  
perinde ac a  
naturalibus.*  
*Pulsus differens  
pro ætate  
etiam distinguitur.*

dissolutarum proprios. Balnearū quæ moderatē calida sunt, magnos, celeres, frequentes ac vehementes: quæ verō immodicæ, paruos ac languidos, præterea celeres & frequentes pulsus efficiunt. Quod si sibi nō cessent, paruos & tardos, raros, & languidos. Quæ autē frigida sunt, repente quidem paruos ac tardos, raros & rariore pulsus reddunt: post autē aut stuporē, aut robur inducunt. Quod si refrigerant, stuporēq; inducunt, paruos ac languidos, tardos & raros: sin celerem conciliant, aut robur, magnos quidem ac vehementes, celeritate tamen ac frequentia moderatos efficiunt. Copiosior cibus, q̄ ut vinū possit, pulsus hinc quales iuxta & inordinatos efficit: moderatus autē, magnos, vehementes, celeres, atq; frequentes: parvior, q̄ sit ex vīu, minorem & breuiorē pulsus mutationē efficit. Vinū, cetera quidem, ciborū in ista, pulsus immutat: in eo tamen differet, quod repente immutat, quodq; mutatio quæ ab eo proficitur, citius definet, q̄ quæ a cibis provenit: ac deniq; quod celeritatē magis augeat & magnitudinē, q̄ vehementiam & frequentiam. Aqua omniū quæ sumitur, mutatio minimā efficit: mutat tamen & ipsa ad portionē ciborū. Reliqua verō omnia, quantum possunt aut alere, aut calfacere, aut refrigerare, tantū arteriarum motū immutant. At æris constitutiones, ac ciborū copia tanta, ut vires optimar: præterea exercitationes, balnea, & somni, ubi modū excedunt, omnia sunt præter naturā. Nam causæ quas naturales & non naturales diximus, quantitatia excessu cedunt in causas præter naturā. Causarū verō quæ nō quantitate modō, verum etiā genere sunt præter naturā, numerus est infinitus. Porro causarū omniū præter naturā, alix quidem vires vitales veluti solunt & dissipant: alix autē veluti premūt & grauāt. Ac soluit quidē, alimen

ti inopia, morborū malignitas, eorūq; aut diuturnitas, aut vehementia: præterea affectus animi immodici, necnō vacuationes immoderate. Opprimūt autē, tum ipsa materiæ copia, tum instrumentorū affectus: infestationes videlicet, scurrilitas, tumor, moles, abscessus, & corruptiones varix. Soluit itaq; vires, parui, languidū, ac valde frequentē pulsū efficiunt: pressæ verō, pulsus mutant, cum in reliquum omne inæqualitatem, & ordinis confusione, tum in eam quæ in vehementia ipse atq; magnitudinē: nam inæqualitates hæ, oppressurū vīu maxime propriè exiliunt. Quinetia in eisdem affectibus, motus quidam funditus pereūt, aut intercidunt. Ceterū qui intercidunt, minorē qui pereunt, maiorem læsionem indicat. Solutariū igitur ob alimentū inopiam vīu, pulsus revertuntur principio quidem, in languorem, paruitatē, celeritatem, ac frequentiam: ad medium autē, in languorem, paruitatē, tarditatē, & raritatem: postremo in paruitatem summā, languorem, frequentiam, & ementiam celeritatis imaginem: qui pulsus est, quem formicantē appellant. Vermiculi autem pulsus, sit quoq; & ipse viribus: iam dissolutus, sed aliquantū adhuc subsistentibus: in eoq; q̄ formicantē distepat, quod nō itidem in summā languorem ac paruitatē deductus sit, tum quod perspicuum habeat in vinctu inæqualitatem, quæ sit, dum partes mouentur

*Pulsus differens  
pro balnearum  
diversitate.*

*Pulsus differens  
pro modo  
cibi assumpti.*  
*Vinū quilibet  
pulsū immutat.*

*Aqua quomodolibet  
pulsū immutat.*

*Immodica omnia  
esse præter  
naturam.*

*Causarū præter  
naturarū infinitus  
numerus.*  
*Vires vitales  
veluti solunt  
et dissipant.*

*Vires vitales  
veluti premunt  
et grauāt.*  
*Pulsus facultati  
soluitur.*  
*Pulsus facultati  
appressus.*

*Pulsus facultati  
soluitur ob  
alimentū inopiam.*

*Formicantē  
pulsū.*  
*Vermiculi  
pulsus.*

tempe-

*Pulsus differenti-  
tia secundum di-  
versas synco-  
pas.*

bracchiderum  
palmar.  
Vulgaris quomodo  
palmar.  
Masturum pal  
mar.  
Masturum pal  
mar.

Polled differentia  
na pro vario-  
ni delictum.

*Tolypus inflatus*  
*inflatus* *inflatus*  
*inflatus* *inflatus*.

*Polypus diffusus*  
 Hæc pro exemplis  
 in classibus, et  
 partibus inflat  
 multitudine in  
 suis diversis.

rempeius aut ferius incipiat: unde tardus est minus & parvus. nonnunquam autem nihil penitus habet tarditatis, ob idque ipsum, minime malignus existit. At quæ à febris ex alicuius atque acutis oriuntur syncopæ, pulsus vermicantem non habent: qualis vitæ reliquæ virium solutiones ut plurimum comitantur, ac eas præcipue, quæ sine febris accidunt: aut certe cum exiguis admodum. Ob eam vitæ causam syncopas comitant cardiacas, formicantes: cholera verò morbos, ac fluxus ventris vehementes, hæmorrhagias, fluxus muliebres, & quæquæque affectus qui corpus inaniunt celeriter, ut plurimum vermicantes: cum autem extretum afficiant, formicantes sequuntur: iam vero ab ira pulsus fit altus, magnus, vehementer, celer ac frequens: A voluptate autem, magnus, ac rarus, non tamen vehementer diversus. A moestitia, parvus, tardus, languidus, atque rarus. A metu recentem quidem ac vehementem, celer, turbulentum, inordinatum, atque inæqualis: inveterato autem, pulsus a moestitia est similis. In omnibus porro his, si diu perferantur, ut vehementer admodum fuerint, tales pulsus sunt, quales consequuntur solutæ vires. Dolor autem qui pulsus immutat, aut quia vehementer, aut quia in partibus principalibus est, id facit: quemadmodum inflammationi. Cum igitur adhuc parvus est, atque in ipso ortu, maiorem, vehementiorem, celerem ac frequentem pulsus efficit: auctus autem, vehementer admodum factus, ut iam robori vitali noxam inferat, minorem, languidiorem, celerem ac frequentem. Qui vero vires iam dissolvit, pulsus mutatur in languorem, parvum, & falsum celeritatem imaginem, immensamque frequentiam inflammationum pulsus, communis quidem omnium, quasi serratus est: ut pars quidem arteriæ alia quidem dilatari videatur, alia autem minime, quæ videlicet durior sentitur. Habet autem pulsus hic & turbulentus nonnullus: præterea celer quidem est ac frequens, magnus verò non semper. Proprie cuiusque, incipientis quidem, maior est naturalis, vehementior, celerior, frequentiorque. At in ea quæ adhuc crescit, omnis hæc sunt auctora, pulsusque iam palam est durior & turbulentior. Cum vero ad vigorem pervenerit, vehementior quidem est, durior, ac turbulentior, sed minor quam antea: non tamen languidior, nisi morbus vires exuperarit, quo calidior frequentior & celer redditur. Quod si diu admodum perseveret, rursus scirrhorum durecat, pulsus tenuis ac durities predicta accedit. Hæc itaque illi phlegmoni accidit, quæ totius animalis pulsus immutat. Eius vero quæ animal totum non turbat pulsus, in parte saltem inflammatione accensâ, est custodiendi esse illum in toto corpore diximus: intendatur autem ac remittitur predictorum quodvis, aut pro inflammationis qualitate, aut pro ipsius infirmitatis phlegmonis obsequii natura. Nam quæ partes magis sunt nervosæ, ex duriores, serratilesque magis, ac minores pulsus efficiunt: quæ vero sunt venosæ magis atque arteriosæ, cōtrarios. Hæc autem ipsa maior est in partibus magis arteriosis, ibidemque facilius inæqualis & inordinatus efficitur. At præter ipsos pulsus differentiâ, quibus sepe transferuntur est inflammationum, celeriter hinc con-

luntur: infundatur aut quibus pulmones. Syncopeprehenditur, quibus os ventriculi. Atrophia laborat, quibus hepatis. Non cōcoquant, quibus ventriculus. Urinae supprimitur, quibus renes exaeperiuntur inflammationē. Ad hęc partes sensu exaltiori præditæ, pulsus, propter dolores, immutant: hebetiori autē, dumtaxat propter affectū. Itaque pulsus pleuritis cordis celer ac frequētiōr, non tamen magnus admodū. Est præterea nō languidus quidem, nō tamen, quod ad affectū spectat, vehemens. Porro quantitas frequētie in pubescente consuetū modū pleuritidis, cum pleuritidis ipsa in peripneumoniam transit, aut etiā minuitur syncope. Infra modū autē subsistit, cum in carā phoram; aut nervorū læsione desinit. Eodem modo & inæqualitas illa servatilis, quæ plenitudo maxime est propria, remittit quidem, si pleuritidis sit mollis; ac facile cōcoquantur: infunditur autem, si ea sit exitialis: indicat ipsam esse cōstitutā difficilē. Tales autē pleuritides, si simul adfuerint, becillitas viriū, pene illi præsens minuitur. Sin viri robur nō desit, signū est eas cum costis iam esse, aut in empyema transierat, aut in tabidum marcorem degenerasse. Cæterum si pleuritis coquantur, sensim deponit pulsus omnem mutatonem præter naturā. Cū vero transit in empyema, sunt pulsus empyematum proprii. Pari modo & marcoris proprii eis accidunt, qui talis marcoris sunt incursum. Talis autē est purulentorum neper ordietis pulsus, qualis viget in inflammatione: hæc siquidem ipsa est suppurationum principii. Nonnong autem est inæqualitas & inordinatus: omnibus tamen est hecticus. Cū vero iam pus incit, cæteri quidem est similis, nisi quod magis æquālis. Postquā autē est corruptum, languidior, lanior, tardior ac rarior. Marcescentium pulsus nō simpliciter, neq; secundum unā speciem, mutatur. Qui namq; unā cum phlegmone nō dum solus pulmonum emacuerit, pulsus habet languidos, celeriores, frequētes valde, atq; cum depressione in angulum redactor: quos vtiq; myuros vocant. Porro marcescentibus omnibus cōmunit est pulsus hecticus: dū autē in diabolos magnitudinem myurorum imitant inæqualitas: postquā vero ea quæ in frequētia consistit: quæ omnibus etiam perpetuo incit, quā in marasmodum incidunt propter inflammationes: ad quibus propter cardiacos affectus, vel syncoas stomachicas, periculi præsens lumen. quig; vino opotū periculi huius præcepere effugerit, nihilominus tamen tempore procedente macuerunt. Plurificorum pulsus, parvus, languidus, mollis & ceter est, hecticusq; medicorum. Peripneumonicorū, verō, magnus, asquāritulum fluctibus, languidus, mollis, non aliter quā lethargicorū: nisi quod inæqualitas superat, tum ea quæ in unā periculis consistit, tum ea quæ systematicam vocant. Ceteri autē peripneumonici omnes aut febri acta infestant, aut soporis graui nō nihil habet, vitiumq; prævalent in horū, secundū illud frequētiā quantitatis maxime deprehenditur. Nam si in peripneumonia sit inflammator febris, pulsus erit admodū frequēti: si sopor prius magis potest, infrequētiorem. I. charitator pulsus, est si in marasmodum

Septis transfer  
 su inflammatione.  
 quatuordecim  
 dies curatio  
 necesse est  
 fore ut nec  
 pulmonum  
 nec obsequio  
 Plurimum  
 potius.

Serravallo's *ins.*  
quadratus palpe-  
riferus.

*Pterostichus*  
*diffusus* n.

Paralendare m  
pallidum, est quod  
de vegetis in  
flammatiōe.

Marceline, 1901

১৯৩৩-৩৪ সালে  
 ১৯৩৪-৩৫ সালে  
 ১৯৩৫-৩৬ সালে

Рисинбасу  
ру/уу.  
Рисинбасу  
ру/уу.

**Periphrasis**  
in *quæ* *ad* *finem*.  
— *ad* *finem*, *ad* *finem*.  
— *ad* *finem*, *ad* *finem*.

Lethargic

linguore, & mollitie, peripneumoniarum pulsus  
 consimilis, eodem tamen est tardior, languidior,  
 minus inæqualis, magisq; deficiens, quam interci-  
 dens. Porro consilio ordinis utriusq; inæquali-  
 tates sequitur: nam inæqualis pulsus raro qui-  
 dem ordinatū reperias. Ceterū minores noxæ,  
 inæquales & ordinatæ: maiores verò, inæqua-  
 les & inordinatæ efficiunt. Phreniticorum pul-  
 sus est parvus: rarissimè autem magnus fuit vi-  
 sus, roburq; mediocre habere. Durus præterea  
 est, ac nervosus & frequens, & valde celer. Vi-  
 deas autem licet & speciem inæqualitatis in situ,  
 in eo nonnunq; vehementer accidere. Quin & ti-  
 bi sæpe videbitur tota arteria suo ipsius loco re-  
 lecto, sursum deorsumq; ferri turbulentissimè: cuius  
 magna frequentia eminentem minatur syn-  
 copen. Est & alius quidam nomine carens affe-  
 ctus, ex phrenitidis & lethargi generibus mi-  
 stus: quo detenti, bonam quidem temporis par-  
 tem oculos claudunt, suntq; somnolenti ac ster-  
 runt: post autem oculis incōnvenientibus atq; im-  
 motis intuentur diuissimè, nō aliter q̃ carochi-  
 tum si quis eos interroget, invitèsq; ac collo-  
 quium trahat, tardi erunt ad respondendū, diffi-  
 cilèq; plerumq; autē turbulenter effutiant, quic-  
 quid primū in buccam venerit. Atq; eius sanè af-  
 fectus pulsus fuit frequens & celer, quo mo-  
 do phreniticorum, sed minus. Pari modo & ro-  
 boris habent minus quam illi, verū lati sunt, atq;  
 parvi, nec dum extra mouetur, quicq; habet  
 cōsertim ac simul inter cūsum: sed alia ratione ve-  
 luti intrō properantes suffragis, systolem quidē  
 accelerantes, suffragantes autem diastolem. Non  
 tamen, ne in hac quidem sunt phrenitis simi-  
 les, cū non habeat, nescio quid inter cūsum. Cata-  
 tochion, hoc est, detentorum pulsus, ceterā qui-  
 dem similes sunt lethargicis, magnitudine, tardi-  
 rate, & raritate: quemadmodū & totus affectus  
 à lethargo specie nō multū distrepat. Catochion  
 ramens pulsus imbecilli non sunt, nec molles, sed  
 in his vel multūm dissident: quemadmodū cer-  
 te & quoddā lethargicus totus habitus sit solutus,  
 ac tumens, catochion verò contractus, coactūsq;  
 Præterea detentorū pulsus æqualis est: inæqua-  
 lis autem lethargicorū. In convulsis, ipsū qui-  
 dem corpus arteriæ coactū esse videtur, com-  
 pactūq; vndiq; nō tanquam à quoquam com-  
 pressū, aut arctatū: nec rigidi planè, vt in  
 febrilibus, & maxime in earum accessibus: nec  
 propter duritiem dilatarū difficile, quod tempo-  
 ris longinquitate accidere solet, præterit si vi-  
 tia quædam, aut vicerū affectus adfuerint: sed  
 nō aliter quā si corpus nervosū causū, vt inte-  
 stinum, ab utroq; sine fuerit extensum. Talis est  
 motus inæqualis arteriæ, quæ in star funis, sur-  
 sum & deorsum traducitur. Nec enim vllum est  
 diastoles aut systoles signum, sed confusio nō  
 potius simile quippè hic accidit. Apparet autē ve-  
 hemens esse ac magnus convulsorū pulsus: ac ve-  
 rō nec languidus est, nec parvus: nō tamen adeo  
 vehemens aut magnus vti videtur. Per causā e-  
 nim multis imponit, quæ propter tensionē qui-  
 dem, robusta: propterurbationē autem, exilire  
 apparet. Vnde aliis quidē altior, aliis quasi stre-  
 pitum quendā asperū ad tactum nostrū videtur

efficere. Quem pulsū, qui fuerit exercitatus, fa-  
 cile deprehenderet, cum nulli sit alteri similis. Para-  
 lyticos pulsus parvus est, languidusq; & tardus:  
 nonnulli tamē rarus: sicuti aliis frequens qui-  
 dem verū penè deficiens inordinatè. Epilepti-  
 corū autē & apoplecticorū pulsus, sunt similes:  
 quocirca quæ de epileptici memorabūtur, eadē  
 & de apoplectici distrahisse est putandum,  
 nisi quod omnia sunt in his intensiora. Porro  
 quandū mediocriter natura ipso affectu turbat-  
 ur, tantisper nullam mutationē in pulsū est repe-  
 rire cōmemorabilem: sed solū veluti tensa in  
 vtrans partē videtur arteria, quemadmodum in  
 convulsis. Vbi verò invaluerit affectus, ita vt op-  
 primat vires, inæqualitatem quandam ac tensionē  
 fortè adscit, longiorq; sit pulsus, languidior &  
 rarior. Quod si affectus ipsas vires decerit, pul-  
 sus efficit languidus, frequens ac celer. Angi-  
 na laborantium pulsus, tensionem quandam  
 habet convulsioni asimilem: magnus tamen est,  
 ac fluctuosus, quo modo peripneumoniarum.  
 Atq; utrumvis in eo prævaluerit insigniter, se-  
 candum illud est trāmutatio expectanda. Nam  
 si pulsus peripneumoniarum similis præpoller,  
 in peripneumonia: si convulsionis, in convul-  
 sione, angina terminabitur. Ceterū qui ex ip-  
 sis nimis anguntur, ipsi pulsus sit parvus & rarus:  
 ex pirantū autē, iam frequens & inæqualis. Ortho-  
 pnceæ acutè pulsus est inæqualis, inordinatus, &  
 penè deficiens, cum autem mediocriter est mali-  
 gna, frequens: cū ad extremū vrget, tardus ac  
 deficiens: cūm hominem iam è medio tollit, fre-  
 quens ac languidus. Suffocatio nō à maris or-  
 te pulsus, est convulsorū extensus, ac rarus: eius  
 autē quæ est extensus, frequens, languidus, inor-  
 dinatus, & penè deficiens. Os ventriculi af-  
 fectum, si quidem inficitur in inflammationē, est  
 mutationē diutaxat, cuiusmodi in inflammationē  
 corporis nervosi fieri iam diximus. At mor-  
 sus illius, vomitus, nausea, singulus, appetitus  
 priuano, atq; dissolutiones, præterq; quod pul-  
 sum parvū eliciūt & languidū, ipsum enī nimis  
 frequentè reddūt, & quibusdā moderate celerior.  
 Cōpressio autē sola, citra ea omnia, rarum,  
 tardū, parvū, obscurū. Præterea quibus fames est  
 magna, pulsus est erulmodi. Qui verò affectus  
 in frequentē ipsū pulsū permittit, si diutius  
 perseverant, aut vehementius afflixerint, ip-  
 sum vermicanit efficiūt. Qui in raritatem, præterq;  
 quoddā memoratis differentias intendunt, eadem  
 præterea quādā pulsus specie in ea inæqualitate,  
 quæ in vno pulsū accidit, efficiūt, vt corpus ar-  
 teriæ in multas partes cōmuniū esse videatur. Hy-  
 dropnum pulsus, ascite quidē, longus, frequens,  
 & subdurus cum quādā tensione est: tympaniti-  
 autē longior, nō imbecillus, celerior, frequens,  
 subdurus, cum quādā tensione. Eius verò qui in  
 toto nascitur corporis habitū (quæ Græci *anæd-  
 pna* nominant) fluctuosus, lanior, ac mollis. Ele-  
 phantiasis laborantium pulsus parvus, imbecillus  
 tardus, & frequens. Ictericorū pulsus sine febrī,  
 minor, frequentior, durior, non languidus, neq;  
 celer. Eorum qui sumperunt helieborsū, paulo  
 quidem anteq; vomant, latus rarus, languidior:  
 cū autem vomant ac divellunt rursus, inæqualis, &  
 inordinatus.

Inæqualis pul-  
 sus, quo ordinis  
 sui sit, reperit-  
 ur rari.  
 Phreniticorum  
 pulsus.

Catoplepticorū  
 signa: & pul-  
 sus.

Catochion, hoc  
 est, detentorū  
 pulsus.

Convulsorum  
 pulsus.

Orthopnceæ  
 pulsus.

Pericardii ar-  
 teriæ motus an  
 possit.

Paralyticorum  
 pulsus.

Epilepticorum  
 apoplecticorū  
 quæ pulsus, sunt  
 similes.

Epilepticorum  
 pulsus.

Angina laboran-  
 tium pul-  
 sus.

Orthopnceæ  
 pulsus.

Suffocatio  
 producta ab  
 vtero pulsus.

Pulsus diffi-  
 cultatis diastolæ,  
 pro naris et  
 ventriculi affe-  
 ctibus.

Hydropnum  
 pulsus.  
 Tympaniti  
 pulsus.

Elephantia-  
 sis pulsus.  
 Ictericorum  
 pulsus.  
 Pulsus nō qui  
 sumperunt hel-  
 eborem.

inordinatus: cūm meliusculē iam habent, ordinatus quidem, sed adhuc inequalis, minus tamē quā prius. Cūm autē sanēscit iam, & penē ad statū naturalem redierit, æqualis & maior ē antea, vehemēnōrque. Qui verō ex his syncope corripitur, convellitur, atque singultunt, his pulsus parvus & languidus, inordinatus, ceterior, atque admodū frequē. Qui ex eis suffocatur, parvus, languidus, inordinatus, inequalis, nō tamē frequē, neque celer, sed subardus magis. Pre se fert autē & fluctuosum quiddam & larum, & nōnunquam eugum quandam arteriæ tensionē,

## GALENI PERGAMENI

### de differentiis pulsuum, liber primus.

#### Prima genera pulsuum.



Arteria corporis quide.

Pulsus quid, Pulsus inquit qui ex gemina.

Humor elevatum non exoritur natura prius, quam peritiam fideat.

Arteria fortis, tres dimensiones, pariete ut reliqua corpora.

Quantitas dimensionis et contrahit.

Arteria contrahit, non inesse, Arteria contrahit, non inesse.

Respiratio vni, in motum pul, sui ad altera.

Differentia in vni, pulsuum incidenti, que sunt.

Pulsus differens, in circumscriptione, sunt pul.

Celer pul.

Tardus.

Modicus.

Differentia in pul, sunt in dist.

ione, frigidum, singulis dimen,

sionibus, sunt in propo,

ri sunt mod.

Vandoquidem arteriæ corpus est cauum, longū & circumductile, habetque perpetuū geminū motum ex contrariis constitutū partibus (aut enim in seipsam vndique cōsider, aut in omnē partē distēditur: qui duplex motus vocatur pulsus) in vitroque quies accidat necesse est: altera dī distentione, priusquā cōtrahatur altera dī contractione, priusquā distendatur. Quas quidem binas quietes experientiū tactus cognoscit, nec minus demonstrat ratio. Nam prius contrariū motum natura, si priore sedatione, nō exorditur. Atqui sedari, subsistere est, & in quiete esse. Sic motibus intercedit quies. Exprimunt ergo necessitas, quoddam esse tempus propriū vniuscuique motus: aliquod etiam intermissionium, & harum item vniuscuique proprium, tam quia tres arteriæ dimensiones, ut reliqua omnia corpora, obtinet, longitudinem, latitudinē, profunditatem: non potest in singulis dimensionibus nō fieri quantitas aliqua distentionis & contractionis. Præterea contentione quandam necessariū habet, ut aut agere, aut languere, aut propriē, valentēque operetur. Est etiam ipsa arteriæ tunica aut mollis aut dura: necnon intercapedo interna, aut vacua quodammodo, aut plena. Atque hæc omnia aliquando æqualia, aliquando inæqualia sunt. Temporis nem distentionis aliqua proportio est cum tempore contractionis. Aliū in vno pulsū differentiam: constitutas præter has nullas sed sunt omnes quæ in vnum pulsuum incidunt differentię generales, quas retulimus. Quibus due accedunt alię, quas collectivas appellamus. Ex his in pluriū pulsuum mutua contentione, æqualitatem & inæqualitatem, ordinē & cōs perturbationem restituiamus.

#### Differentię cuiusque generis pulsuum.

At motum ipsū pulsū, aut moderatū & naturalem esse, aut tardiores, aut celeriores, oportet: quæ tres pulsuum circa motū differentię existunt. Fit igitur pulsus celer, vbi modico tempore ipsa arteria mouetur: tardus, cū multo: moderatus, vbi mediocri. Differentię pulsū in distentionis quantitate, si quidem in singulis concipiuntur dimensionibus, nouem numero sunt, in vnaquaque trium dimensionū tres. In longitudine arteriæ, qui moderatus in ea est, & qui hunc

excellit, vel eo est inferior. Vocatur qui excellit, longus: qui inferior est, brevis. In latitudine, moderatus, & alij inmoderati duo: nempe latus, qui moderatum excellit: huius contrarius, angustus. Idem in dimensione profunditatis arteriæ, vnius moderatus est, alius altus, & alius humilis. Hæ pulsuum sunt in vna dimensione acceptorum differentię. At differentię pulsuum in trinis simul dimensionibus, sunt septem & viginti. Perspicies hæc manifestē in tabella. Vnus enim erit longus simul & latus, aliusque, qui omnibus præponatur: alius longus, latus, & profunditate moderata, scribarique secundus: alius longus, latus, humilis, qui sit ordine tertius: similique reliqui omnes cognoscantur via & ratione, ut duæ primæ dimensiones manent immotæ, triariam vltima variet, hoc pacto. Quartus longus, moderata latitudine, & altus. Quintus longus, moderata latitudine, similiter moderata profunditate. Sextus longus, latitudine moderata, humilis. Deinde alij tres, primā dimensionē longum seruantes, secunda angustum, tertia trifariam variant. In his nouem, vna dimensio perimant, longitudinis longæ: alie omnino cōmurentur. Mox alteri nouem, dimensionē longitudinis in mediocritate seruata, varian tribus reliquis. Ad hæc nouem alij, vbi longitudinis brevis dimensio sit, & alie immutentur.

#### TABELLA.

1	Longus	latus	altus	modicus
2	Longus	latus	moderatus	humilis
3	Longus	latus	humilis	modicus
4	Longus	moderatus	altus	modicus
5	Longus	moderatus	moderatus	gracilis
6	Longus	moderatus	humilis	gracilis
7	Longus	angustus	altus	modicus
8	Longus	angustus	moderatus	gracilis
9	Longus	angustus	humilis	gracilis
10	Moderatus	latus	altus	turgidus
11	Moderatus	latus	moderatus	turgidus
12	Moderatus	latus	humilis	turgidus
13	Moderatus	moderatus	altus	turgidus
14	Moderatus	moderatus	moderatus	medicus
15	Moderatus	moderatus	humilis	medicus
16	Moderatus	angustus	altus	turgidus
17	Moderatus	angustus	moderatus	turgidus
18	Moderatus	angustus	humilis	turgidus
19	Brevis	latus	altus	turgidus
20	Brevis	latus	moderatus	turgidus
21	Brevis	latus	humilis	turgidus
22	Brevis	moderatus	altus	turgidus
23	Brevis	moderatus	moderatus	turgidus
24	Brevis	moderatus	humilis	turgidus
25	Brevis	angustus	altus	turgidus
26	Brevis	angustus	moderatus	turgidus
27	Brevis	angustus	humilis	turgidus

Longus pul. brevis. Latus. Angustus. Altit. Humilis. Pulsus differentias trinis simul dimensionibus acceptorum, sunt septem & viginti.



deniq; ad quietem omnino recidunt, motusq; deficiunt, quos vocant deficientes *pulsus*. At qui deficiunt, duplici sunt differentia. Quidam enim in quâ primum paritate munui desisterunt, hæc constantissimè seruant. Alij autem rursus augentur, quos imminutos reciprocis vocant. Quorum quidem ipsorum nonnulli ad parem reuertuntur pristinae magnitudinē, alijs ad minorem: alijs isdem excessibus quibus fuerant prius imminuti, rursus augentur. Sunt qui minoribus accessio nibus, maioribus vrantur.

#### De inæqualium inæqualitatum differentiis.

Inæqualium inæqualitatum quidam nullam propriam æqualitatem retinent: aliquæ retinent ad tres vsq; vel quatuor, vel quinque pulsus, sed postea amittunt: in quorum inest vtriusq; vel ordo, vel perturbatio ordinis: ordo, si circuitus seruent aliquos pares: perturbatio ordinis, si & hos quosq; violent. Argi hi quidem ex ipsis & motibus deficientur, ut illi qui æqualiter agitur. Ceterum ut illos decurtatos deficientes, sic hos inæquales deficientes vocamus. Porro intercurrentes pulsus ex sola inæqualitate erebriarum nascitur: intermittentes verò, ex inæqualitate raritatis & paritatis, alio atq; alio vtrobiq; modo, consistat. In raritatis inæqualitate, quod quies sit pro ducta longis in æm paritate, quod minima fuerit duratio. Vel potius, ex pulsuum paritatibus deficientes consistant: intermittentes, ex raritatibus.

#### De inæqualitatis vnius pulsus differentia.

At inæqualitatis motus in vno pulsui, duæ pri mæ differentie constituendæ sunt. Quarum vna, in vna arterie parte gignitur: in pluribus altera. Earum autè vtræq; potest iterum in plures distri buti. Auspicabimur tamen ab ea, quæ circa vnam arterie partem versatur, licet distinctis temporibus: quod nimirum inæqualitas illa sæpe inueniatur in pulsibus, multaque denotare consueverit. Tres igitur illius sunt differentie primæ: cum videlicet quies interpellat motum particulæ: aut cum ille continuus appareat, non paris tamen velocitatis: aut cum interdum recurrit. In prima autem, ubi à quiete motus interpellatur, pulsuum no uem differentie inueniuntur.

#### Primæ differentie inæqualitatis motus, membra.

Sit prior motus celer: alter vterq; aut celer, aut tardus, aut moderatus: iam hinc tres differentie oriuntur. Rursus alteræ tres, ubi prior manet tar dus, & trifariam secundus variat. Aliæ item tres, si permaneat moderatus primus, varietur autè tribus secundus modis. At verò inter non inter mittentes distinctionem in æquales motu pulsus, quidam velociter motum exordientis, tarditate finiunt: alijs contrâ, tardi sunt initio, celerisque semper magis ac magis evadunt: idque horum vtriusq; habent aut æqualiter, aut inæqualiter. Il lorum ergo qui motum æqualiter minuunt, vel augent, quidam ab extrema tarditate ad moderatum motum perveniunt: quidam à modera to motu ad vnam tarditatem: alijs à prima ce leritate ad moderatum motum: sicuti & alijs ab hoc ad extremam celeritatē. Sunt præterea qui

vtriusq; à moderato motu paululum deficiunt, huius bifariam: modo enim celeriores, modo tar diores sunt, ut sex sint cunctæ eorum differen tiæ, tametsi plures excogitari possint. In solis au tem inæqualibus pulsibus qui inæqualiter vari ant, interdum (licet raro) accidit motus ex tar disimo velocissimus, sicuti & ex velocissimo tardissimus redditur.

#### Differentie pulsuum vni in parte inæqualiter inæqualium.

Eorum verò pulsuum qui inæquales cum sint, inæquali in mutatione versantur, interim duæ planè, interim tres motus differentie cernuntur. Nos quartum aliquando, sed obscure animaduer timus. Vbi igitur motus arterie duas sensibi les differentias efficit, sex erunt formæ concut sum: ubi autem tres, quatuor & vixini. Quod autem cum in vtriusq; disparium motuum insint tres pulsus, velox, tardus, & moderatus, ex concut sumis eorum non nouem dicamus, sed sex differ entias prodire, hæc ratione intelliges, si noris, quæ eundè bis deinceps pulsuum ponar nulla intercedente quiete fieri, vnum eum totum æqua lem pulsuum effecturum. Itaq; de nouem cõmis suris tres detrahuntur, in quibus non inæquali iam pulsus, sed æqualis redditur, vel celer, vel tar dus, vel moderatus: id quod ex tabella evadet apertum. Nam secundus in ea, & quartus, & nonus, sunt æquales: celer secundus, tardus quartus, nonus moderatus.

#### TABELLA.

1	Celer	tardus
2	Celer	celer
3	Celer	moderatus
4	Tardus	tardus
5	Tardus	celer
6	Tardus	moderatus
7	Moderatus	tardus
8	Moderatus	celer
9	Moderatus	moderatus.

Eadem ratione si tribus positis inter se dispa ribus motibus, in singulis us terminos pulsus com mutatos committas, viginti septem numero for mæ erunt. Ex quibus tres necesse est inæqualita tem recidant: estq; id eundè ipsum ex tabella planū.

#### TABELLA.

1	Celer	celer	tardus
2	Celer	celer	celer
3	Celer	celer	moderatus
4	Celer	tardus	tardus
5	Celer	tardus	celer
6	Celer	tardus	moderatus
7	Celer	moderatus	tardus
8	Celer	moderatus	celer
9	Celer	moderatus	moderatus.
10	Tardus	celer	tardus
11	Tardus	celer	celer
12	Tardus	celer	moderatus
13	Tardus	tardus	tardus
14	Tardus	tardus	celer
15	Tardus	tardus	moderatus
16	Tardus	moderatus	tardus
17	Tardus	moderatus	celer
18	Tardus	moderatus	moderatus

Deficientis motus pulsus, pariterum pulsus differentie, tripliciter, deinde imminutus amprovis.

Inæqualium in æqualitatem differentia.

Decurtati pulsus, inæquales differentie, intercurrentes pulsus, intermittentes pulsus.

Inæqualitatis motus in vno pulsui differentia.

Pulsus differentie, in vna in parte in æqualiter inæqualium.



19	Moderatus celer	tardus
20	Moderatus celer	celer
21	Moderatus celer	moderatus
22	Moderatus tardus	tardus
23	Moderatus tardus	celer
24	Moderatus tardus	moderatus
25	Moderatus moderatus	tardus
26	Moderatus moderatus	celer
27	Moderatus moderatus	moderatus.

Itaque tres in his sunt æquales, secundus in ra- 10  
bella, & tertiusdecimus, & vigesimusseptimus.  
Celer enim secundus est: tardus tertiusdecimus:  
medius vltimus. Et iam alij duodecim pulsus, in  
primam tabellam transeunt. Nam primo primæ  
tabellæ, duo sient similes, primus nempe & quar-  
tus secundæ tabellæ, hic tarditatis plus, ille cele-  
ritatis habet. Et tertio, tertius & nonus, ille plus  
obtinens celeritatis, hic mediocritatis. Quanto  
vnde decimus & quartusdecimus, ille maiori cele-  
ritate, hic tarditate præditus. Sexto decimusquin- 10  
tus, atque decimus octauus, hic plus habet medio-  
critatis, ille tarditatis. Septimo vigesimussecun-  
dus, & vigesimusquintus: hic mediocritate, ille  
tarditate excellens. Reliqui de secunda tabella  
duo, vigesimus, & vigesimussextus, octauo sunt  
primæ tabellæ similes, hic mediocritate præstiti,  
ille celeritate. At duodecim secundæ tabellæ re-  
liquos, qui prorsus sunt inæquales, nihil cū illis  
prioris tabellæ consentire, clarissimū est: in qui-  
bus sanè ipsa est ascripta inæqualitas, non quod  
alij illi duodecim qui conveniunt cum prima ra-  
bella inæquales nō sint, sed quod in terminis hi di-  
fferentia motuū aperta inæqualitate sunt prædi-  
ti, cū in binis differentiis eam habeant alij. Sunt  
autē, si ordine à primo numeres, quintus, sextus,  
septimus, octauus, decimus, duodecimus, deci-  
mussextus, decimusseptimus, decimusnonus, vi-  
gesimusprimus, vigesimustertius, vigesimus-  
quartus.

De tertia differentia pulsuum in vna  
parte inæqualium.

Qui repetentem pulsū, siue ferientem iterum  
(quem Archigenes dicrotum vocat) duos esse  
pulsus existimant, hallucinantur. Nam qui in v-  
na diffentione intermittit, quantū iterū feriant,  
non ob id tamen eos dixeris duos pulsus existe-  
re. Quemadmodum enim dum malleo ad incu-  
dem ex longo intervallo prior validēq; pulsus  
incutitur ictus, illi secundus minor accedit, vel v-  
ti resultantē haud ita multū ab incude malleo, 10  
recidentēq; in eam languidus & breviori inter-  
vallo, sic dicrote pulsatione in vna dilatatione  
inæquales oriuntur. Arteria siquidem in occur-  
su quasi repellitur, moxq; redit. Cuius delapsū  
a primæ diffentionis sine nulla dirimit manife-  
sta quies, qualis animadvertitur inter systolem  
& diastolem. Sed simulatq; attollit destitit, ipsa ar-  
teria recedit, atq; paulisper vibrata, mox occur-  
rit iterum: id quod etiam vi tractus ramis dein-  
deq; dimissis accedit. Atq; ubi eum vi maiori ta-  
les pulsus contingunt, ipsius arteriæ partes vno  
eodēq; tempore, hæc quidem attollit, decidere  
illę videntur. Sic itaq; cū gignitur dicrote, diffe-  
rentiæ eorū in illis omnib; quæ retulimus generi-  
bus erunt, plenitudinis, duritiei, magnitudinis,

vellemētis, celeritatis, & his contrariorum, tam  
in ipso primo motu, quā in reditu ab ipsorum  
discessu. Nā magnus potest esse & non magnus,  
sicuti & equalis & inæqualis: ac sic de ceteris dif-  
ferentiis, quarum sanè cōmparationes, multas spe-  
cies constituunt dicrotorum pulsuum. quoriū hę  
quidem in vna diffentione sunt differentes, in-  
æqualitate occupant vnam partem duntaxat.

De inæqualitate duarum partium  
in vna diffentione.

Inæqualitatis quæ secundum diversas sit par-  
tes, primæ differentie sunt duæ, iuxta quas aut  
continuus est motus, aut intercisus. Reliquæ ex  
harum divisione gignuntur. Nam cōtinuus, aut  
est equalis, aut inæqualis. Si equalis, aut remitte-  
tatur celeritas, aut incretatur à primo, sex modis,  
necesse est, ut paulo ante exposuimus. Inæqualis  
sunt differentie plures, pro pulsus magnitudine  
longa, vel breui, vel moderata. Nanque duobus  
digitis si motus occurrat, sex differentie existēt:  
si tribus, quatuor & viginti: si quatuor, septua-  
ginginta octo. Nam cū eorum quæ tres diferen-  
tias habent, coniugationes existant viginti septē,  
si quartū illis accedat, cui tres differentie in sint,  
vnam & octoginta numero esse ratio postulat.  
Quibus si tres quæ creant æquales pulsus, cri-  
ptas, reliqui quidem erunt septua-  
ginginta octo.

De differentie motus interrupti.

Interrupti motus primæ differentie sunt qua-  
tuor, quarum singularū complures. At quatuor  
in hunc modum. Aut primus & tertius digitus  
morum sentiunt, non secundus autē & quartus:  
aut primus & tertius & quartus, nō autē secun-  
dus: aut primus, secundus, & quartus, minimē ve-  
rō tertius: aut primus deniq; & quartus, secundus  
& tertius nequāq;. Vbi igitur primus & tertius  
duntaxat sentiunt, novem pulsuum in singulis  
generibus differentie sunt: vbi verō primus &  
tertius, & quartus, vigenæ septenæ. Totidē cū  
primus, secundus, & quartus: at cū primus &  
quartus, novenæ. Atq; hæc quidem est iam inæ-  
qualitatis divisio, quæ diversis in partibus sit.  
Cōmiscuntur porro variis modis ambæ inter se  
primæ differentie, ut non iam diversas tantum  
partes, verum etiam singulas teneat inæqualitas.

De inæqualitate quantitatē diffentionis  
in duarum arteriarum partibus.

At verō inæqualitas quantitatē diffentionis  
diversas quidem arteriæ partes occupans, cū  
animadvertitur crebrō, tum percipitur facillimē,  
& interrupta, & continua, æqualiter & inæquali-  
ter. In vna verō arteriæ parte nō recipit luvius  
generis inæqualitatem vnus pulsus, quod prius  
quā finem motus attingat, magnitudinē mini-  
mē deprehendi possit. Siquidem magnitudinis  
& paritatis differentiam, nisi iam moueri arteri-  
a destitit, ne quāquam cognoscere posuis.

Inæqualitatis vitalis contentione  
differentie.

Inæqualitas verō contentione vitalis, ean-  
dem distributionem ac inæqualitas motus ha-  
bet. Nam aut eandem partem, aut distinctas to-  
ner. Eandem tribus modis: aut interrupto mo-  
tu, aut perpetuo, aut dicrote. Distinctas bifariā,  
vel cōtinuo motu, vel intercisio. Singularū præ-  
terea

Dicrotum pul-  
sum siue ferien-  
tem iterum, nō  
duos, sed vnu  
talem pulsū  
constituit.

Dicrote pulsa-  
tione quomodo  
dicitur in vna  
dilatatione in-  
æquale.

Dicrotus dif-  
ferentia in qui  
bus consistant ge-  
neralia.

In æqualitate  
pulsus, quæ si-  
cutum dicitur  
sua arteria per  
tertia differre-  
ntia.

Interrupti mo-  
tus in pulso, ad  
ferentia qua-  
tuor.

In æqualitate  
quantitatē dif-  
fentionis dicre-  
tæ arteriæ par-  
tes occupant.

In æqualitate  
vitalis contentio-  
nis differentia.

terea horū generū totidem sunt singulares differentie, quorū motus. Quin & cōmiceri etiam potestas vna in parte inæqualitates necesse est, ut alias quæ in diuersis sunt.

De inæqualitate corporis arteriarum.

Sed inæqualitas corporis arteriarum, ex qua pulsus aut mollis aut durus redditur, in vna quiddē nō potest parte fieri: in diuersis fieri duobus modis videtur: non alter ab inæqualitate motus & contentionis vt aut continuus motus sit, aut interitus. Quo fit vt differentia huius generis sine eadem, atq; predictæ illorum. Verūm arterie pars vna non potest initio esse distentionis, mollis, dura in fine: aut contrā primō dura, in exitu mollis. Quare hæcenus quidē ab hoc pulsu genere duntaxat & mollitudinis, duo genera disti dent priora, motus & contentionis.

De inæqualitate ab infusa materia in cauitate arteriarum.

Pulsuum genus quod efficit infusa materia, in quo quidem pulsus plenus & vacuus est, eadem habet questiones ac superiores quod quantitate distentionis constabat. Videbitur namq; hic quoq; obtinere diuersas partes posse in vno pulsu inæqualitas: vnam autem eandem non posse. Porro quia euidentius in arteriæ sede febres calor qui sit, quā si aliam rāngas partem, cognoscitur, idco probatur quibusdam, inter alia hoc etiam genus pulsuum annumerari, quo caloris qualitatem pernoscescimus. Cuius quidem generis inæqualitas & inæqualitas in vna distentione versantur. Ac inæqualitatis etiā differentia, prima, tum quæ diuersas partes, tum quæ singulas tenet. Quas iterū si predictis rationibus seces, alteræ particulares plures nascuntur.

De inæqualitate à sede arteriarum.

Est & aliud genus diuersum inæqualitatis in vno pulsu, quod à sede arteriarum proficiscitur: vbi pars quiddē quæ dextrorsum, pars sinistrorsum, pars sursum, pars deorsum deflectitur: id quod accidit aut in duobus locis, aut pluribus.

De pulsu vndoso & vermiculante.

Aliud item inæqualitatis vnius pulsus genus est, quod vocatur vndosum. Ad cuius finē generationem minimē videtur arteria in ea inæqualitate simul diffendi vnuersā: sed primō prima eius pars, dein de secunda, mox tertia, & sic consequenter: idip̃ cum eleuatione quadam vndosa, altera vnda semper priorem excipiente. Prioris siquidem partis arteriæ dilatationem, secundæ cōsequitur, ut interueniat pars à motu libera nulla: verum propemodū quieti similis est finis vndarum. At non reperias tamen vllam partē prorsus quiescentē. A vermiculante porro hic pulsus magnitudine differt. Neque enim eos qualitas, sed quantitas separat. Vtriusq; tamen, omnibusq; eorum speciebus aliquid inest cōmune, siue & aliquid propriū cōmune, vnde nomen vterque inuenit, vndoso quidem, exurgere quasi vndas in arteria alteram ab altera: vermiculanti verō, esse vermis gressui cōsimilem. Differentia autem eorum hoc modo specian sunt. Quibusdam enim recta fertur vnda: quibusdam in obliquum deflectit. Quidam etiam breui longitudine, alii rudine insignem sortiuntur. Sunt con

tra, qui longiores altitudinem humilem: aliqui laui, nonnulli angusti, alij etiam pari celeritate præditi, alij secus. Et cōtentionis hæc etiam vnda plus, illa habet minus: interim simul est istarum differentiarum inæqualitas. Habent autem vtriusq; huius vndas, tum vermiculantes pulsus, vt tales sint, à sola distentionis inæqualitate ipsius quantitatis. Vna enim hæc inæqualitas, adiuncto sibi, vt partium motus alter anteverrat, alter cunctetur, huiusmodi pulsus gignit.

De pulsu formicante.

Iam verō vt vndoso pulsui succedit vermiculans imminuto ita formicans vermiculanti, vbi multis amissis motibus, in vnu eundemq; prorsus parui defluunt. Quare inæqualitas eius præ exiguitate nos fugit. Est porro hic pulsus parvus (quo nec alius est minor) languidissimū & creberrimū: non tamen (vt quibusdam visus est) celer.

De vibrato & convulso pulsu.

Superiunt autem vibrari & convulsi, qui hæcenus quidem sunt inter se similes, quod vnum locum arteria non teneat, sed sursum deorsumq; agitur, naturali sese deserta. Distant tamen vel hoc ipso, quod non ad id affectus in convulsi uos cadat: in vibratis magnopere, admodumque perspicue: ac præterea, quatenus ex terminis vtriusq; retrahi, contendit & convelli convulsi videntur. Vibrati omni iusto vacant. Ad hæc magna frequenter est dilatatio vibratis, ac convulsis parua. Et partes arteriarum quædam superiora petere, quædam demitti vno eodemq; tempore apertè in vibratis cernitur: convulsis verō id perpaucis & obscure accidit. Breuiter sentias vel vt fidem quandam intemam in convulso pulsu, quæ illi res cum nullo alio convenit. In vibratis nihil simile animaduertas. Maximè enim iaculis motum eorum, quæ magna vi emissā, celeriter impetu videntur, asimiles. Omnes autem hosce pulsus qui præter quinq; illa prima genera in vna distentione inæquales sunt, horū duorum accessu constituit, quæ sunt, genus inæqualitatis in arteriæ sede, & cum maturius aut serius morum partes aspiciantur.

De pulsu caprizante.

Pulsus etiam caprizans inter inæquales in vno pulsu refertur: estq; etiam compositus, expertus tamen inæqualitatis vtriusque, quæ primis quinque generibus adiuncta erat. Verūm vbi motum arteria interpellat quāpiam in parte, tum potissimum generatur, licet nō semper, sed vbi motus à quiete alter celerior primō & vehementior oritur.

De inæqualitate creberritatis, raritatis & rhythmi, in diuersis pulsibus: quæ collectiuam inæqualitatem appellant.

Vbi omnia ordine æqua ictum sunt intervalla per omnes pulsus, æqualem distantiā habent tunc pulsus esse: vbi verō partim maiora, partim minora, inæqualem in creberritate, raritate. Rhythmū iam etiam eodem modo ex proportionē temporis ictus ad intervalli tempus constantem, cum deinceps maneat eadem, æqualem cum esse aiunt: quemadmodū inæqualem, vbi talis proportio variatur.

Vndoso pulsus  
facit de vermis  
colens.  
Vermiculante  
pulsus succedit  
formicans.  
Formicans pul  
sus est omacum  
interitus, non  
men dī celer.

Creberris pul  
sus.

Vibratis pulsu.

Caprizans pul  
sus quando ge  
neratur.

Collectiva in  
æqualitas.

Inæqualitas in  
creberritate, rara  
tate, succedū  
diuersis pul  
sus.

Rhythmus quā  
do æqualis, &  
quādo inæqua  
lis dicitur.

De inaequalitate crebritatis, raritatis, rhythmis, in vno pulsu.

*Inaequalitas crebritatis, raritatis & rhythmis, eo vno pulsu contrahi potest.*

Partes arteriae aut omnes vna motum exordiantur, aut haec quidem maturius, illae autem tardius. Si igitur moveri omnes simul coeperint, postea autē motus, minus aequis temporibus dilatationem alteri aggregantur, duorum generum in vno pulsu inaequalitas erit: quod videlicet illa sit quidem cognita, ubi primū secunda distentio coepit, in secunda tamen ipsa minime continetur: sicut neque ipse rhythmus, nec genus crebritatis & raritatis, cum & haec ipsa fiant in vno pulsu, & quamvis ut cognoscantur, omnino secundum desiderant: quandoquidem antehuius initium, prioris neque finis cognosci: quo incognito, nec crebritatem, nec raritatem, nec rhythmum valeas cognoscere. At verō tempus parvis quae praeter ceteris prima motu deficiunt, minutum est: maximum eius quae vltima: proportionem autem media, in quantum aut a prima, aut a posterioribus abstant. Contrā ac tempora motus, quietum tempora, longiora sunt illis quae prima: a motu deficiunt: in illis quae postrema, breviora. Quare tempus motus quem habuit pars, quae prima moveri desit, minimum, cum maximo tempore quietis eiusdem comparatur. Et vltimū tempus, quod maximum erat omniū motuum temporū, ad minimum conferitur quietis eiusdem partis. Atque ita rhythmus in singulis commutatur, quatenus proportio temporis motus ad quietis tempus non eadem in omnibus manet. Si itaque dilatatio quidem prior, in omnibus simul partibus auspicietur motum, sed non pari in omnibus tempore: secunda autem deinde & ipsa motum incipiat, non tamen simul omnium partium, sed prius quidem eius quae prior quieverat, secundo autem illius quae secunda, atque ita deinceps: inaequalitas quidem ita rhythmus fiet, crebritatis & raritatis nō item. Nam quies cum in omnibus aequa sit, differentiam in crebritate & raritate efficit nullam: nō respondet tamen motus tempus, tēpori quietis. Si quidem motionis tempus nō erat omnibus par: quietis erat, ac proinde nō idem omnibus rhythmus erit. Quod si cum moveri arteriae simul omnes partes coeperint, nec priorem terminaverint simul, sed ne quies quidem in omnibus aequa sit, binas in eo necesse est differentias esse. Nam crebritatis & raritatis in alterutra differentia inaequalitas fit, at nō rhythmis tamē necessariō. Possunt quippe omnium partium tempore motus, quietum temporibus respondere. Et si hoc, erit quidem rhythmus aequalis. Sin autem eadem in omnibus partibus proportio non constet, simul perdetur rhythmus. Iam verō ubi vna omnes partes moveri coeperint, motū aequo sūt tempore, si secunda dilatationis nō idem omnes initium partes ordiantur, sed quaedam maturius, quaedam inceperint serius, non erit iam rhythmus aequalis, nec crebritatis raritatisque differentia. Hanc enim impares queres inaequalem efficiunt: rhythmum verō, proportionum commutatio. Ac tot sunt inaequalitates vtriusque vno in pulsu generis differens, cum omnes vnae partes arteriae disten-

di coeperint. At ubi haec primō, illa secundo distēdi coeperint, si omnes simul quieverint, ac deinde distentionem vna alteram auspiciatur fuit, necessariō inaequalitas in altero tantū genere fiet rhythmus. Quod si alteram distentionem arteria iuxta oria sit, ac priorem, ut in vtriusque distentione eadē pars prior altera pari intervallo incipiat, idem fit in omnibus partibus constans atque illa etiam simul priorem distentionem absoluerint, & necessariō vtriusque in vtroque genere inaequalitas erit. Nā omne tempus quod est ex motu & intervallo constitutum, omnibus est aequabile arteriae particulis. Sed motū proportionem, quod totum tempus in aequis partem non distribuitur, non respondet proportionibus quietum. Quare simul inaequalis rhythmus necessariō erit singularum partium: & quatenus tempora intermissionum differunt, etiam crebritatis raritatisque coniungi cum his inaequalitatem est necessarium. Si verō altera distēdi, perinde ac prior fecerat, initium motus partium sit oria, non sit autem prioris distentionis finis omnibus idem, quae differentie orientur. Potest enim & longē quidē quiescere prius, quae prius motum est auspiciata: potest etiam posterior. Si igitur rariō quieverit prius, quantum coepit, fiet ita aequalis in vtroque genere pulsus. Sin multo prius atque est auspiciata quieverit, duorum generum inaequalem pulsum eliciet. At si quae prior coepit deficiat posterior, duorū generū omnino inaequalitatem creabit: si videlicet aut multo tardius, aut paulo, quieverint. At verō si nec prioris distentionis initium ex omnibus simul partibus fiat, neque secunda, est cum rhythmus potest esse inaequalis, nec non crebritatis & raritatis genus. Verum si sic motū tempora temporibus quietum respondeant, rhythmus aequalis erit. Si verō tempora sola paria fuerint intermissionum, aequalitas erit in altero genere. Sed haec infrequētia sunt: inaequalitates verō permultae. Nam omnes possunt simul partes a motu cessare, & nō simul. Et cū nō cessant simul, haec prius, illae posteriores: iam enī vel longē prius, vel longē tardius.

## GALENI PERGAMENI

de differentiis pulsum, lib. II.

Non eundem usum hic liber pollicetur, ac primus: sed quam veritatem rationem habet, vel scilicet motum cum pane, & carnis, eandem quae nunc dicemus, cum superioribus habent. Nutrire enim mentes illa sanas, haec refecare pravae sententiae valent, ut morbos quodam. In primis autem mihi cum sophistis est bellum circa usurpanda nomina. Illi quippe ipsas res negligentes, barbaras quasdam voces, vndeque citra delectum contractas, Graecorum commiscunt nominibus: neque his sane integris, legitimis, sed corruptissimis: atque ita nobis aures obrundunt, qui perpetuo sumus solliciti, ut nominibus quā purissimum sensum interpretemur: ut clarissime quis mentem suam possit significare, ut sermone vii cum optimē, existimantes. Ad haec verō, illi praeuulgum homonymiam distinxerint, singula desinere conantur: vnde necessum est eos quam turpissime hallucinari. Neque enim nomina sunt, sed rerū definitiones. Proinde quando

*Rhythmum efficiunt inaequalitates proportionum commutatio.*

*Sophistae enim ipsas negligentes, de nominibus commiscunt.*

*Definitiones sunt rerum, ad nomina.*

Definitorem i-  
pſum ſec debere  
eſſe, quod res.

Chriſti de Bri-  
am compoſit ſub  
ſonant Gale-  
m.

Græci lingvæ  
vix communi  
ſunt Galen.

Ad aliquid, ef-  
ſe dicuntur me-  
diis generibus.

Pulſus maioris  
ſic, aſſertus  
quæq; aut ſeu  
diſſimilis.

Maximus pul-  
ſus.  
Maximus ſimpli-  
ter pulſus.

Pulſus magnus  
ſignificatur, ſub  
prædicamento  
Ad aliquid eſſe,  
& quantitas eſt  
ſignificatur.

Albus.  
Magnitudo  
nulla conſta-  
re poſſit abſq;  
diſtinctione ſub  
tribus.

Quantitatem  
vix extrinſe-  
cæ, nō eſſe ma-  
gnitudinem.

quando ab vno nomine res indicantur multe,  
tot definitiones, quot res, neceſſario deſideran-  
tur. Vbi verò vnus rei plura nomina habentur,  
vna tantum definitione eſt opus. Porro vbi Ar-  
chigenes etiam de octo qualitatibus pulſum re-  
merariam illam ſuam nobis ſcētiam protulit,  
debiſſet aliquam addere, ſi non firmam demō-  
ſtrationē, at certe rationem validam: vne quis  
in ioco ſtatim, velut in Moſis & Chriſti ſcholam  
impingens, leges audiret nulla ſtabilitas demō-  
ſtratione. Olim etenim homo duarum linguarū  
peritus, oſtendebatur digito, omnibūſque erat  
admiratōni. At ſophiſtæ hodie nos multas e-  
diſcere volunt, ceterum barbariſſimas, cum ta-  
men præſtaret ipſos doceri vnam græcam addo-  
ornatam & cultam, præterea communem omni-  
bus, ac plenam humanitatē. Quæ quidem ſi  
imbuitur fuerit, neutiquam vt illi fateberis, om-  
nia prima genera pulſum, qualitates exiſtere.  
Siquidem inter differentias ipſorum referri tum  
magnum, tum paruum, tum medium conſtat;  
nec non longum, breue, latum, anguſtum, atq;  
alios deniq; aliter nominatos: quorum quidem  
omnium vnus eſſe cōmune genus conſiſtens in  
qualitate, nemo ſane mentis fateretur. Quippe  
ipſius magni pulſi & parui, nō qualitatem, ſed  
aut quantitatem, aut ad aliquid, aut cōiunctam  
eum ad aliquid quantitatem eſſe genus, rationi  
conſentaneum videtur. Neq; enim ſanus neſcit,  
multis generibus eſſe cōmune Ad aliquid. Siqui-  
dem albus & nigrus ſunt in coloris genere. At-  
qui color qualitas eſt. Iam ſuperius & inferius e-  
tiam in genere Vbi: manuiſus item & tardus, in  
genere Quidō. In aliis etiam pluribus generali-  
bus prædicamentis, verſatur Ad aliquid. Proin-  
de mirum non eſt, ſi in prædicamento quantita-  
tis illi adſit etiam locus. Quare oporēt ſane va-  
leas moderatū pulſum, qui deſideratur, oſten-  
dere, ſi exquiritē moderatū cognorīs. Ceterū in  
maiori pulſu, qui videlicet moderatū excellit, ſat  
facit cōſtitute quinq; aut ſex differentias. Ete-  
nim illum qui omnes ſuperet, maximū appella-  
bimus. Qui medius eſt inter maximū & mediū,  
ſimpliciter magnum. Iam interponendi huic &  
illi vtrinq; bini alteri: vnus paulo maior modera-  
to, alter qui magno paulum cōcedit. Alius item  
qui magnum ſuperet: ſicv & alius qui ſit proxi-  
mus maximo. Dicimus itaq; maximum & par-  
uum pulſum, ſub prædicamento Ad aliquid eſſe,  
& quantitatem ſignificare: inſciēſq; vtrique ma-  
gnitudinem, vt magno magnam, ita paruo pu-  
ſillam. At longus dicitur, qui longitudine exce-  
dit medium: latus, qui latitudine; altus, qui pro-  
funditate: quorum intelligi quos nullus in tribus  
dimenſionibus arteriæ, citra quas nulla magni-  
tudo conſiſtiteret. Siquidem quantitas vnus & ex-  
tenuſionis, non magnitudo, ſed longitudo eſt: ex  
qua nōn illos longos & breues dicimus, nō ma-  
gnos vel paruos. Nec verò ita lineam vnū appel-  
lamus, ſed aut longam, aut breuem. Verū cor-  
pora quæ trinam dimenſionē ſortiantur, ea maga-  
60 & parua appellamus. Proinde pulſus qui ab  
vna dimenſione cognominantur, à magnitudi-  
nis quidem genere reuincuntur ſub eo autem qui  
ſecundum quantitatem eſt, continentur. Vbi igitur

à proportionē tres illæ dimenſiones diſcedunt,  
atq; aliqua vel aliquæ illarū impuñtur, vel ſupe-  
rant, quatuor & vixinti pulſum differentiaſ na-  
ſcantur: quas nos, quod viginofeptem eſſe obte-  
nentiōs tres dimenſiones pulſuū differentias oſ-  
tenderemus, cū prædictis tribus in tabella pro-  
poſuimus. Quibus omnibus vnū commune  
genus, quantitas ſcilicet diſtentionis arteriæ, in-  
venimus. Quod ſi licet etiā contra hōiōē rectū  
diſcernere, & in hac quoq; reperitur tot oē diſ-  
ferentia�. Enimvero qui nullū aiant longū ſe ſim-  
pliciter pulſum poſſe animo cōprehendere, cum  
omnino is aliqua ſit prædictis latitudine & pro-  
funditate, multo rudes primarū diſciplinarū vidē-  
tur: quādoquidem nec magni etiam ſe concipi-  
pere poſſent, quod videlicet ſi ſimplex non de-  
retur, niſi ſimul ceder vel tardus, vel vehemens, vel  
languidus, vel particeps ſit aliarū differentiarū.  
Etenim quæ ſine aliis eſſe nō poſſunt, nōne me-  
ra ſanctas eſt, ne cogitationi quidem repræſenta-  
ri circa illa poſſent: Porro ex vnica dimenſione  
pulſus, multa nos cognoscere poſſumus. Nā vt  
certū rem demōſtrare magnus pulſus poſſit, ita  
etiam altus ſolus, non ſimul cum ipſo conceptus  
aliis dimenſionibus animo. At verò pulſus bina-  
rum dimenſionum, nec ad viam & rationē quic-  
quam faciunt eorum: qui trinis ſimul dimenſio-  
nibus intelliguntur, & à diuidendi ſunt metho-  
do abducti. Porro vbi ex omniſus differentiaſ  
volumus intelligere compoſitū ipſum, tunc ara-  
iubet, vt propoſitæ rei totam perſpicimus natu-  
ram. Eam itaq; nos in ſimplices differentias re-  
ſoluimus, quod abſq; eo, compoſitum exactē in-  
telligi nequeat. Nūi verò totam rei naturam in  
vnum completi, neq; in vna differentia & ſim-  
plici conſiſtere valeas, nulla erit ars, nulla via vel  
ratio, nulla deniq; vtilitas. Quamobrem nos pri-  
mū pulſum vniuerſam naturam diduximus  
in differentias, quæ ipſam conſtituant: atq; hanc  
quantitatem diſtentionis vocamus, illam qua-  
litateſ, aliam qualitateſ tunc, aliaſq; ordi-  
ne commemoratas. Deinde in his ruriſus ſim-  
plices notiones inueſtigauimus: vt quam habet ea  
notionem differentia quantitateſ diſtentionis ad  
totam pulſum ex omnibus cōſtatam naturam,  
ita inueniatur aliud, ad hanc ipſam ſe ſimiliter  
habens. Sunt autem differentiaſ omnes vniuerſi-  
cuſq; dimenſionis, aliarum omnibus copulan-  
de: vt in vnaquaq; binarum dimenſionum co-  
pulatione exiſtant nouem differentiaſ, omnes vi-  
gintiſeptem. Adſcribam vnā, poſtea de reliquis  
etiā licebit diſcere.

Pulſum diffe-  
rentiaſ viginofe-  
ptem.

Ar. v. m. v. m. v. m.  
v. m. v. m. v. m.  
v. m. v. m. v. m.

Compoſitum  
non poſſe in ſim-  
plices abſq; ipſius  
reſolutione in  
ſimplices diffe-  
rentiaſ.

1	Longus	latus
2	Longus	moderatus
3	Longus	anguſtus
4	Latus	moderatus
5	Moderatus	moderatus
6	Anguſtus	moderatus
7	Breuis	latus
8	Breuis	moderatus
9	Breuis	anguſtus

In hac ergo tabella tres longitudinis differen-  
tiaſ cōſpicientes cum tribus latitudinis, nouē eſt.

ficimus differentias. Altera erit eodem modo tabella, cum tribus longitudinis differentis, coniunctas profunditatis tres habens. Tertia præterea, in qua profunditatis tribus, copulabuntur tres latitudines. Erunt itaque omnes differentie viginti septem, cum singulis tabellæ nouem contineant. Cæterum hos omnes pulsus, qui conueniuntur hinc, ob dictas causas omisit: tradidimus autem eos, qui singulis dimensionibus intelliguntur, numero nouem: atque eos qui trinus simul, quos in tabella descripsimus, viginti septem: quorum omnium fecimus commune genus quantitate differentionis. Porro excessus pulsuum atque defectus, qui vna dimensione intelliguntur, à principio diuidere potes: ut in magno nobis est demonstrari. Nam moderati soli singulis generibus indiuisibiles sunt: alij autem, plures diuisiones recipiunt, ac sua quidem natura infinitas. Quod enim genus maiore & minore excessum & defectum obtinet, infinitas potest esse differentiarum sortitur, non tamen secundum se ipsum. Ergo esse quoddam genus pulsum, qui in quantitate differentionis consistunt, satis ostensum est. Ar quandoquidē celer quidam est, & tardus, & moderatus, in arterie motu pulsus: atque horum commune genus qualitas est motus: nam ali quod in venire commune genus valeamus qualitas & quantitatis, nobis est attendenda. Quod si nequeamus, in primis referemus genera, tum quam firmitate differentionis, tum qualitate motus. Cum autē qualitas motus differat à qualitate corporis ipsius arterie, ceteræ qualitates prædicamentorum commune erit vniui generis: tamen genus haud item ambæ qualitates vilius commune obtinent. Nam per homonymiam vtrique affectio qualitas dicitur: Neque enim eadem est in ambabus qualitas, sicuti lualbo & nigro: atque frigido & calido. Genas aut tempus in quantitate differentionis: à genere motus, corporis arterie, plane distat: quantitas siquidem à qualitate diffidet: atque idcirco etiā à genere contentionis, necnon à rhythmo, & à genere ordinis & perturbationis illius, sicuti & à qualitate inaequalitatis. Quæ quidem prædicamēto Ad aliquid attribuitur omnia. Proinde superest, vtilius cōparemus cum genere crebritatis & raritatis: nam hoc constituit videri quantitas temporis quietis. Sed sub idem fieri sua prædicamentis reducentur: genus amborum tamen non erit idem. Nam genere toto quantitas dimensionis corporis, à quantitate abest temporis. Et nullum sane esse, apertū est, in pulsibus genus aliud, quantitatibus genere differentionis. Verum differentie ipsæ interdum quidem atque cōmuniter accipiuntur, tum pro generibus, tum pro speciebus: peculiariter autem pro illis quæ in diuisionibus reperiuntur, quæ nec species sunt, nec genera. Differentie tamen nomen potest omnibus assignari: qualitatibus, à quantitatibus, relationibus, & vno verbo, vniuersis. Nam ab eo quod differat vnum ab altero, nomen differentie factū est & conceptum. Differunt autē quædam ita in primis generibus prædicamentorum, ut homo, albus, biuibratilis, dextrū. Nam vnum illorum est substantia, alterum qualitas, aliud quantitas, aliud ad aliquid. Quædam subiectis

generibus sub his: ut albus & triangulare. Color enim, illius est genus: huius figura. Hæc sunt alio prædicamento subiecta sunt Qualitatis. Itaque albus primū prædicamentum cum triangulare conuenit: est enim vtriusque qualitas: ceterum generis sunt diuersi, hoc figurati, illud colorum. Alia iam specie differunt, cum non differant genere: ut albus & sanus. Similiter alia differunt numero: ut, grana exempli, albus ab hoc albo, peculiari quadam differentia disidet, sed eidem speciei subditum est, albo: præterea vtriusque idem genus est color, & commune prædicamentum Qualitas. Atque ita sanè quodlibet quod sit, alterum ab altero prius aliquatenus differet. Quando igitur differentia à differentio appellata est, & inventa: differre autem tum in diuisionibus, tum species, tum genera inueniuntur subiectis, & semel omnia quæ aliquo modo sunt differentia: rebus omnibus inest, nō autē qualitatibus: nisi vtrique Archigenes prima genera differentiarum pulsum, qualitates vocauit: nos autē recte, atque ordine, cum hæc, tum alia omnia, differentias. Quare etiam vniuersi operi titulus fecimus, De differentiis pulsum.

### GALENI PERGAMENI de differentiis pulsum, lib. III.

Sic amor sapientie atque honesti singulis luxu placet (ut ait tragicus) nulla foret mortali bus contento ambigua. Nunc quia non videtur omnibus idem hæc honorabile, nec sapiens esse, neque etiam verum, necessarium controversia nascitur. Cæterum qui in dubia opinione versatur, quod non affequeatur sciendam, & condonandum fuerit. Ar quæ de nominibus digladiantur, nec vllum hic faciliū finem aut modum, nisi me mēis vni ventis digui videntur. Nam rerū cum sit ea obscuritas, ut si vel in tripulum hæc vira nostra prorogaretur, non tum quidem exacte cognoscere omnia possemus (qua ratione adductus Hippocrates, vitam ait esse breuem, & ætatem longam) quo modo, qui in his quæ ab eis sunt tempus conterit, absurditatis impudenter notam abiciet? Etenim de nominibus laborare, est prorsus operam ludere: res autem ipsas expendere, artes locupletare. Perinde siquidem est si vocemus ipsum pulsum Diorem: dicamus autem illum dignosci exacte, si comprimamus artem, nec leuiter attingamus: necnon pulsum proficisci à robore facultatis vitalis, effectus signū salubre in morbis: & præterea quales indicationes solet promittere. Porro ipsius robur ictus, in tactus impulsu, repulsi, subuersio neque possunt esse, omnibus in professo est: at à qua causa sit, controuersum existit: vniūquisque iuxta quædam propriam opinionem tueretur. Citius autem Mosis affecta & Christi sua deserant dogmata, quam qui sectis addicti & consecrati sunt, tum medici, tum philosophi. Itaque inter pulsus est quidam, qui tactum ipsum habet vertit: id est, valde & cum remota quodam pulsus. Dignoscitur autem is, ubi plurimum insignis digitorum, non leuiter palparemus. Causæ eius existit, facultaria robur pulsus efficientis. Proinde si de medicis vocabulis primò omnis nostra potestas sit inueniendis,

Moderati pulsum soli singulis generibus indiuisibiles sunt: alij autem, plures diuisiones recipiunt, ac sua quidem natura infinitas.

Differentia non modo vnde facta dicitur.

Pulsus differentiarum genera prima, Archigenes proprias qualitates vocauit.

Controuersia nascitur.

Vita brevis. Aet longa.

Pulsus proficisci à robore facultatis vitalis, effectus signū salubre in morbis: & præterea quales indicationes solet promittere. Porro ipsius robur ictus, in tactus impulsu, repulsi, subuersio neque possunt esse, omnibus in professo est: at à qua causa sit, controuersum existit: vniūquisque iuxta quædam propriam opinionem tueretur. Citius autem Mosis affecta & Christi sua deserant dogmata, quam qui sectis addicti & consecrati sunt, tum medici, tum philosophi.

Differentias in terden accipi pro generibus & speciebus.

Differentia non nisi quod est posset accipi dicitur.

*Pulsus ventris-  
tus.*

*Vacuum nihil  
in orbe duri.  
Pulsus vacuum,  
quomodo nati-  
ligendus sit.*

*Primum aut va-  
cui vas prae-  
cipui duri infusa  
substantia va-  
cuium.  
Metaphorice ef-  
fe abrogandi  
ab artificiosa  
duri.  
Tandem cor-  
pus unum esse  
plenum aut va-  
cuium.  
Duri quod sit,  
Mollis quod.*

*Tactus est in-  
duri duri. mol-  
lis.  
Mollis esse quod  
induratur. Cuius-  
duri esse quod  
natura repel-  
lens cuncta.*

*Arduos pra-  
ferens Platonem.*

*Mollis quod  
in seipsum ces-  
dit non migrat  
alio.*

*Durissimus est  
qualitas in-  
solita.  
Qualitates ta-  
ciles quomodo  
sint.*

tuendis, contentum cum pulsum, non vehemen-  
tem vocemus. Nunc quia a pluribus iam im-  
dum vehemens est vocatur, nomen nunc mu-  
tamus: tamen non simas neque, vehementer no-  
men actioni semper tribui, contentum simulare  
citatur. Jam verò dum vacuum pulsum appel-  
lant, cum nihil omnino vacuum in orbe datur,  
bisam illam interpretamur. Nam aut arteri-  
am sic intelligimus vacuum, vt quae aërem tan-  
tum contineat: & quamquam sit plurimum in-  
flata & distenta, vacua tamen sit appellanda, vt  
inflatus calculus vacuum dicitur vino: aut ita illam  
vacua esse dicemus vt vires ipsos, quod aëre ex-  
pulso, eorum tunica confidunt. Ac prima sanè  
significatione erit pulsus talis, qualem Erasistratus  
natura cum semper sillerit esse: altera nihil a  
parvo differet. Itaque necessum videtur, vt aut par-  
uum pulsum, aut aëreum, vocemus vacuum:  
itemque contrarios us plenos, magnum scilicet,  
atque cum qui humidam speciem reierit. Praecipue  
tamen infuse substantiae ratione appellare lice-  
bit plenum aut vacuum vas: ratione autem tu-  
nicarum arteriae, aliter: quas rectius sanè duras  
& molles, non plenas vel vacuas appelles: cum  
similare corpus (nisi per metaphoram, quae a di-  
sciplina artificiosa ableganda est) quod vacuum  
vocetur vel plenum, sit nullum. Quis quidem  
autem omnia corpora, ex terra, aqua, igne, & aë-  
re constata sunt: in quibus exuperat quidem vel  
terrestris elementum, vel aquae a gelu concre-  
tum, non possunt ea non dura esse: in quibus ve-  
ro igneum, vel aëreum, vel humidum elementum  
excellit, non concretum, necessum est ea mollia  
existant. Praeterea si praedita foraminibus sint,  
vel meatibus, si superior ibi sit terrestris substan-  
tia, vel aquosa concreta, facit necessariò ad to-  
tus duritiam corporis: si subtilis vel humida,  
sed non concreta, ad molliorem. Est autem in no-  
bis tactus iudex corporis duri mollis. Quem  
quidem dum applicamus obiectione, quod offendi-  
mus illum admittere, & quasi subeundi cedere,  
mollia appellamus. Contra, quae vim afferunt  
cui nostrae, & profrudent, si huc cedens virgen-  
tia intrus excipit, dura illa vocamus. Ad si omni-  
no cedat & decidatur ab virgine, id quod concidi-  
bit, imbecillius omnes: quod denique, validius ap-  
pellant. Porro Aristoteles climas quàm Platonem  
non id quod cedit, appellat molle: sed ei addit,  
modò, quod in seipsum: modò, quod loco non  
dimouetur. Quod si simul vtrumque addamus, vt  
in secundo libro de Generatione & interitu Ari-  
stoteles fecit, ad molle dicimus esse, quod in se-  
ipsum cedit, nec migrat alio, adhuc definiemus  
apertius: vtrumque inquit id soli a cedit molli. Nam  
cedere quidem, commune symptoma est molli,  
& imbecilli: at in seipsum, solius est molli: vt nò  
in seipsum, imbecilli tantum. Praeterea, vt in vici-  
num locum migratio, proprium infirmi est: ita nò  
demigrare, vniuers molli. Jam verò, vt tangibile  
est corpus durum, si durities est qualitas tacti-  
lis. Si quidem qualitates tactiles sunt, calor, frig-  
us, humiditas, siccitas, grauitas, leuitas, durities,  
mollities, lentor, fragilitas, asperitas, liquor,  
crassities atque tenuitas. Quae omnes exprimi tan-  
gibiles qualitates possunt, & corpora non secus

us praedita. Quippe horum pariter septem sunt  
oppositae coniugationes, & nomina quatuor de-  
cim. Prima est oppositio calidi & frigidi. Secun-  
da, siccitatis & humiditatis. Tertia, grauis & leuis. Quarta  
duri & molli. Quinta, leni & frabili. Sexta, as-  
peri & leui. Septima, crassi atque tenuis. Durum  
igitur corpus, quod sic proprie & primarie ap-  
pellatur, renuitur, & nihil tangendi cedit. Quia ve-  
rò multa corpora durum accidunt, vnumquodque  
eorum metaphoras nobis suppeditat: inter quas  
sanè vt repudiamus obscuras & tectas, sic proba-  
mus illas, quae apertam illustrant similitudinem  
praefereunt. Vt, dum legem duram & indocilem  
dicunt, qui a venia danda sunt omnino alieni. Cor-  
pus itaque arteriae, vel durum, vel molle primò  
& praecipue est dicendum. Ad pulsus eius statim de-  
nuncians, non proprie, nec primò, sed per acci-  
dens venit durus aut mollis vocandus.

### GAL. DE DIFFERENTIIS PULSVVM LIB. III.

At verò, ubi etiam ante definitionem, ipse  
res notae existunt, nullus profectò est vltius  
definitionum: quem admodum in pulsus  
appellatione, quam intelligunt etiam omnes  
mortales, nedum medici. Proinde incusandi sunt,  
qui circa definitionem pulsuum inter se maxi-  
me digladiantur, alij aliud esse pulsuum cen-  
sentes. Sunt porro definitionum primae genera duo:  
alterum quod planè rei notionem explicat: alter-  
um, quod ipsam essentiam docet. Virtus est sua  
vtrique definitioni: illa quae notionem explicat,  
vt omnibus sit testata, qui eodem sermone vtun-  
tur, & ad rei essentiam ne aspiciat. Huic quae  
essentiam docet, vt rei quae non omnem subiecti  
consentiat, non sit tamen cum ea eadem. Ac prima  
quidem debet ex se ipsa fidem habere, res per-  
spicuas explicans, manifestas. Vnde Aristote-  
les eam definitionem nominis appellauit: sive  
alteram esse definitionem ait, quae quid sit, ex-  
planat. Etenim quibuscum in partibus cutis, nò  
modò tactus, sed etiam oculis, motum quendam  
percipimus. Qui quidem in iis qui rectè se ha-  
bent, in multis corporis partibus cernitur: de  
quibus est corpus manus. Pulsus siquidem illic  
deprehendimus aënis quendam atque descen-  
sum, praeter ea mediani interitusuonem. Quam  
sanè motionem omnes pulsum appellant. Hunc  
qui breuibus possit interpretari, optime defini-  
tionem ille notionis effecerit, si nec opus sit  
quicquam, nec superfluum aliquid addat. Vt si di-  
cat, cum talem motum, esse arteriarum pulsum.  
At si quoniam tunc arteriae explorant, facilius  
reperire quae arteriarum motionem excitat,  
ipsiusque motionis usum cognoscit, est certe vt prae-  
tergressus notionem est, sic valueram essentiam  
pulsuum generationis tenuerit. Veritatem ista  
quidem nequaquae definitione vniuersa comple-  
cti. Vnde sit, vt nulla pulsuum definitio proflua  
essentiam constiterit possit: aut certe perlonga  
erit. Sensibilis itaque ille arteriarum motus (quem  
quiete interpellari diximus) pulsus vocatur. Ni-  
hil autem apertius est, quàm motum ipsum in ad-  
rum latum & longum extendi, in gracilibus cor-  
porum, atque in maximis pulsibus. Ceterum

*Tactibus car-  
porum septem  
oppositum.*

*Durum corpus  
simpliciter.*

*Metaphora  
quae non sunt  
respondenda.*

*Pulsus duri du-  
rum aut molle  
ex accidenti.*

*Definitionum  
prima genera  
duo, nominale  
nominale, atque  
essentiale.*

*Definitio no-  
minale.  
Definitio quid  
sit explicans.*

*Arteriarum mo-  
tum in corpore  
esse vniuersa per-  
ceptibilem.*

*Qui non tunc  
arteriae explorant.*

*Qui non tunc  
arteriae explorant.*

*Qui non tunc  
arteriae explorant.*

*Pulsuum essen-  
tiam definitione  
quae breuiter sit,  
quae tunc sit,  
quae tunc sit.*





nō dignoscas: hunc tantum abesse vitio cognoscas premendo, ut semel etiam si ita facias, videatur immotus. In convulsivum autē pulsu, aut maxime sentiri distēctio, aut parum certe & obscure videtur: arteria nimirum ipsa in fide modum sursum deorsumque iactata. Similiter etiam sit & vibratus pulsus, ubi arteria propriam sedem deseruit. Si tamen animum intendamus, nō modō scilus (ut opinantur Empirici) sed distēctio etiam omnium pulsuum, ita ut ipso cognoscatur. Quod autem contractio etiam sentiri possit, his rationibus evadere perspicuum. Quādo quidem tangenti corpora partim leniter sese ac mutuo tangunt, palpitantia duntaxat: partim verō virgēt, impellunt, evētiuntque: atque ita quod fortius est & durus, veluti sulci imbecillius & mollis: alterum autē cedit, evētiuntque, ac veluti amplectitur id quod virgēt: sanē discessus eorum mutuos nō potest eodem modo effici: ceterum quae in superficie tangunt, discedunt subito. At quae cedente molliore, longius progressa, veluti intrat illud, nō revertunt itē subito. sed quando à primo occurru progressa penitus virgēt at, tantum illas discedentibus sensibile superest. Tempus namque intercedet inter primū impetum discedendi, & extremū finem, secundum quem non discedere amplius, sed subsistere iam dicuntur. Quo tempore toto, paulatim discedente altero, paulatim etiam alterius remissio pressu, ut nūq̃ sentitur motus. Iam si hoc accedat, ut quod ab imo monetur, feratur sursum: & quod tangit, superne incumbat: praeter hoc, quod pressus est qd incumbit, detrahetur, etiam accedet ei, ut veluti subsidat: quia quod prius exiciebat, & sursum impellebat, nunc desertur. Quorum sanē omnium in vasis ipsis & vitiis, posui periculum facere, cognoscere, sic se habere contactus corporum, atque recessus, ut diximus. Sentimus itaq̃ ab impressione vehementium pulsuum, cariem nostram, vni cum ambiente illam cutē, repelli: laus quēcumq̃ adiuncta mon & prementis cognatio. Quinetiam recedente arteria sentimus in ipsa corpore nostro motum. Siquidem inter compressa, siue ea cuius est, siue carnis pars, comitantur descendente arteriam, pristinam sedem, qua deiecta erat, occupant: simulque sit, ut in recessu cognitionem veniamus. Nam sentimus primos omnium, affectus nostrorum corporū: deinde, quae hos induxerunt foris obiecta. Vbi igitur à premendo recedit arteria, sola inaequalitas pressus, reditus & contractionē eius annunciat. Porro languidos pulsus, si qui leniter tangendos illos igitur, fortasse abolutum homini pulsū dicit: qui quidem mētiuntur inde, qd non rectē ipsos tangentes. Contrā planē vehementes, quo igitur deprehendatur robur, requirunt ut qui tangunt, digitos valde inigant. Repelli em hoc ubi magis videbuntur, quo eos virgeas magis. Unde etiam contractionem omnes vehementes pulsus habent sensibilem: languidos vero nullus. Ceterum qui maximus simul & vehementissimus durissiq̃ sit, quatenus coniungam magnitudine duos videri valeat: non autē vix, hic apertissimū habet contractionē. Omnes alia, quatenus plura vel minus de illorum aliquo ha-

beant adiunctum, eatenus percipiuntur aut facilius aut xgrius. At verō non vt maximos simul & vehementissimos, ita durissimos eodēque maximos vāquam pulsus reperias: ac ne duos pariter & maximos: sed qui inter durum & mollem mediū est pulsus, cum maximo connexus invenitur frequenter. Etiam durum simul ac vehementem non raro evēdit: ceteras: sicut & durum simul & vehementissimū. At vehementissimus & durissimus nunquam idem pulsus existit: nec maximus, vehementissimūq̃, atque idem tardissimū. Quippe maximi & vehementissimi maiori ex parte iunc celeres: si minus, at nō tardi. Vehementissimus ergo & maximus, qui nec mollis sit, nec vix, clarissimam contractionē adducet. Claram etiam vehementissimus certē, & magnus, & durus, & etiam vehementes simul & magni, & duri. Minus autem quā horum, sed evidens tamen contractio vehementis, magni, & mollis existit. Manifesta adhuc vehementis simul & moderati magnitudine atque duritia. Imō verō qui tribus differentis est moderatus, perspicuam adhuc contractionem sonatur. At non facile contractio vehementis & parvi, qui omnino etiam durus est, cognoscitur. At parvi, durique, sed contentione moderata, etiam obscurior est. Iam si parvus nec durus sit, & moderato robore, ut deprehendatur, sensum flagitat probe exercitatum. Languidus pulsus, neq̃ cum magno coniunctus, neq̃ cum parvo, apertam obinet contractionem. Is si cum duro iungatur, necessariū erit minimus. Itaque non cuiusvis pulsus potest contractio sentiri: nec quorū potest, perinde omnium est evidens. Ceterum vel vebemens, vel non languidus si pulsus sit, est necesse, qui sensibile tangētibz contractionem fuerit representaturus. Porro ex his, qui moderato sunt corpore, & temperata natura, in flore aetatis, maxime Vere inter anni tempora, regionēque incolunt temperatam, utque robusti sunt, & omni calore, metu, satietate, motuq̃ vacui, hi pulsū vehementem magnūq̃ omnes habent. Qui si se moderate exercuerint, fortis sunt modici balneis, vel vini non permultum hauserint, vel irati sint, vel aliquam operam strenuam navaverint, non magnos iam & vehementes tantum, sed quāmaximos, vehementissimosq̃ pulsus habebunt. Idem si laborent synocra tertiana, vel ardenti, miti, & simplici, vel qua alia magnopere elidita, & vel vi feruente febra: praeter ea diuturnam aliquā, quae exulsiōne prodiciuntur, & ex aduersionibus, modicisq̃ lassitudinibus, maximos etiā tum, & vehementissimos pulsus habebunt. Quorum quidem si arterias coniungas, clarissimē contractio nem perschies. Nam vt maximum recessus arteriae spatium & tempus in illis est: sic apertissima eius erit cognitio. Sed nōnihil etiā conducit durities, ad percipiendam systolem, quā ad vim scilicet magnopere conferat. Quōd igitur distēctio violentia semper respondeat contractioni sensus, hoc contractiones dignoscitur clarior, quo violentioris succederē diuturnioribus. Magnus est pulsus haud facile cū duro mīscetur: Ceterū quibz, valida vitalis facultas est, sed in victa

*Durissimus simul & maximus pulsus non reperitur vāquam.*  
*Pulsus inter se coeunt, et qui eorum non possunt.*

*Contractio arteriarum in quibus constituta sit possibilia, et in quibus non.*

*Contractio arteriarum in quibus constituta sit possibilia, et in quibus non.*

*Contractio arteriarum in quibus constituta sit possibilia, et in quibus non.*

*Contractio arteriarum in quibus constituta sit possibilia, et in quibus non.*

*Contractio arteriarum in quibus constituta sit possibilia, et in quibus non.*

*Contractio arteriarum in quibus constituta sit possibilia, et in quibus non.*

*Contractio arteriarum in quibus constituta sit possibilia, et in quibus non.*

*Contractio arteriarum in quibus constituta sit possibilia, et in quibus non.*

*Contractio arteriarum in quibus constituta sit possibilia, et in quibus non.*

*Contractio arteriarum in quibus constituta sit possibilia, et in quibus non.*

*Contractio arteriarum in quibus constituta sit possibilia, et in quibus non.*

delinquat, ac præcipue in vini intempestua potione, ut tales pulsus contingunt, conspicuaque est in eis ipsius arterie contractio. Iam tarditas, quantum auget recessus tempus, tanto manifestior motum offendit. Quod vero ad manus applica-  
*Applicatio ma-  
nus ad corpus  
quale molles-  
da sit.*

tionem pertinet, si comprimendo applicemus ta-  
*Contractio ar-  
terie qualiter  
differenda sit.*

ctum, nulla differentia sensibilis ex manus super  
*Manum tange-  
re apte qualis  
manasse debe-  
at.*

arteriæ, vel subter, applicatio inuenitur. Vel  
*Applicatio  
manus ad cor-  
poris tres diffe-  
rentias.*

si palpatum tantum, vel ut suspensæ digitis, ue-  
*Arterie dorsi-  
lo pulsus in ta-  
bula ad abdo-  
men difformis.*

rum quidem villam differentiam animaduertimus.  
*Crasus pulsus  
corporis est  
advis.*

At tertius applicandi modus, qui medius  
*Gracilis si-  
milis et validus  
pulsus est, o-  
mnium diffinien-  
tium confusio-  
natio. Dele-  
tationis arte-  
rie, et cetera-  
rum finem,  
est notitia seu  
sensu significat.*

est iure compressionem & palpatuonem leuem,  
*Gracilis si-  
milis et validus  
pulsus est, o-  
mnium diffinien-  
tium confusio-  
natio. Dele-  
tationis arte-  
rie, et cetera-  
rum finem,  
est notitia seu  
sensu significat.*

ne obiri quidem potest, si interne tangas arte-  
*Gracilis si-  
milis et validus  
pulsus est, o-  
mnium diffinien-  
tium confusio-  
natio. Dele-  
tationis arte-  
rie, et cetera-  
rum finem,  
est notitia seu  
sensu significat.*

riam. Siquidem liberare oportet manum om-  
*Gracilis si-  
milis et validus  
pulsus est, o-  
mnium diffinien-  
tium confusio-  
natio. Dele-  
tationis arte-  
rie, et cetera-  
rum finem,  
est notitia seu  
sensu significat.*

nibus voluntariis motibus, & veluti languida  
*Gracilis si-  
milis et validus  
pulsus est, o-  
mnium diffinien-  
tium confusio-  
natio. Dele-  
tationis arte-  
rie, et cetera-  
rum finem,  
est notitia seu  
sensu significat.*

ad mouere. Quod si fecerimus, delabatur ma-  
*Gracilis si-  
milis et validus  
pulsus est, o-  
mnium diffinien-  
tium confusio-  
natio. Dele-  
tationis arte-  
rie, et cetera-  
rum finem,  
est notitia seu  
sensu significat.*

nus à grauitate depressa, vel minus contracte  
*Gracilis si-  
milis et validus  
pulsus est, o-  
mnium diffinien-  
tium confusio-  
natio. Dele-  
tationis arte-  
rie, et cetera-  
rum finem,  
est notitia seu  
sensu significat.*

posuit arteriam. Prouide superne attingere tan-  
*Gracilis si-  
milis et validus  
pulsus est, o-  
mnium diffinien-  
tium confusio-  
natio. Dele-  
tationis arte-  
rie, et cetera-  
rum finem,  
est notitia seu  
sensu significat.*

tum licet, interne autem nequaquam. Quatenus  
*Gracilis si-  
milis et validus  
pulsus est, o-  
mnium diffinien-  
tium confusio-  
natio. Dele-  
tationis arte-  
rie, et cetera-  
rum finem,  
est notitia seu  
sensu significat.*

intercedit. Similiter quando tantum sentimus con-  
*Gracilis si-  
milis et validus  
pulsus est, o-  
mnium diffinien-  
tium confusio-  
natio. Dele-  
tationis arte-  
rie, et cetera-  
rum finem,  
est notitia seu  
sensu significat.*

tractionis partem, quantum distentionis, aut pau-  
*Gracilis si-  
milis et validus  
pulsus est, o-  
mnium diffinien-  
tium confusio-  
natio. Dele-  
tationis arte-  
rie, et cetera-  
rum finem,  
est notitia seu  
sensu significat.*

lo minor erit etiam contractionis pars illa que  
*Gracilis si-  
milis et validus  
pulsus est, o-  
mnium diffinien-  
tium confusio-  
natio. Dele-  
tationis arte-  
rie, et cetera-  
rum finem,  
est notitia seu  
sensu significat.*

nō sentitur, pars distentionis parit, aut aliquantū  
*Gracilis si-  
milis et validus  
pulsus est, o-  
mnium diffinien-  
tium confusio-  
natio. Dele-  
tationis arte-  
rie, et cetera-  
rum finem,  
est notitia seu  
sensu significat.*

maior. At vero arterie interna & externa quies,  
*Gracilis si-  
milis et validus  
pulsus est, o-  
mnium diffinien-  
tium confusio-  
natio. Dele-  
tationis arte-  
rie, et cetera-  
rum finem,  
est notitia seu  
sensu significat.*

per accedens pulsus partes dicitur. Quarū exter-  
*Gracilis si-  
milis et validus  
pulsus est, o-  
mnium diffinien-  
tium confusio-  
natio. Dele-  
tationis arte-  
rie, et cetera-  
rum finem,  
est notitia seu  
sensu significat.*

## GAL. DE DIGNOSCENDIS PULSIB. LIB. I.

de dignoscendis pulsibus, liber  
 secundus.

**D**inceps autem quo partibus pulsus in-  
*Gracilis si-  
milis et validus  
pulsus est, o-  
mnium diffinien-  
tium confusio-  
natio. Dele-  
tationis arte-  
rie, et cetera-  
rum finem,  
est notitia seu  
sensu significat.*

fiunt, accurate exponamus, à distentione  
*Gracilis si-  
milis et validus  
pulsus est, o-  
mnium diffinien-  
tium confusio-  
natio. Dele-  
tationis arte-  
rie, et cetera-  
rum finem,  
est notitia seu  
sensu significat.*

auspiciat: quod princeps hæc pulsuum  
*Gracilis si-  
milis et validus  
pulsus est, o-  
mnium diffinien-  
tium confusio-  
natio. Dele-  
tationis arte-  
rie, et cetera-  
rum finem,  
est notitia seu  
sensu significat.*

pars sit, & plurimum habere cognitionis in se va-  
*Gracilis si-  
milis et validus  
pulsus est, o-  
mnium diffinien-  
tium confusio-  
natio. Dele-  
tationis arte-  
rie, et cetera-  
rum finem,  
est notitia seu  
sensu significat.*

Quies ar-  
terie per ar-  
tios  
pulsu  
partes  
dicitur.

Quies ar-  
terie  
dignoscenda  
ratio.

Quies in-  
terna  
pulsu  
non  
posse  
esse  
dignos-  
ci.

Distentione  
pulsu  
principi  
pulsu  
plurimum  
ad  
pulsu  
dignos-  
ci.

Motus  
que  
in  
sunt.

Pulsus  
celer  
et  
tardus  
que  
sunt.  
Pulsus  
non  
est  
se  
celerem.



naturarum pulsus dissidere ab inculpatissimæ pulsus perpendendis, longæq; vñu exercueris ratio nem simul & tactum, iam decum certò parabis te moderatè tenere in omni genere pulsum mil- losq; etiam, qui aliquo modo ultra hunc sunt, & cetera. Idcirco quicunq; aut corporis nostri opti- mam naturâ, aut violas non nouit, aut ratione quidem perspexit eas, sed vñu vt dignosceret nō laborauit, nihil huic fractus feret hic sermo: si- quidem illa prius sunt ediscenda, postea huc veniendum. Naturæ igitur optimæ pulsus, aliorū quoniam medius, ac veluti mensura & regula quædam existit: cum quo vbi ceteros compara- mus, celeres, tardos, magnos & paruos dicimus esse. Ipse verò qui medius & est & dicitur, nullo nomine quod immoderationē significet, nomi- natur: sicuti neq; homo eo ipso predictus: quem quidem non crassum, non gracilem, non cali- dum, frigidum, humidum, aut siccum dicimus, sed omnibus partibus corporis temperatū. Cæ- terūq; dubitauerit quispiam in hunc modum: Quid omnes quæ in corpore sunt arteriæ, esse æ- quales non possunt, ac proinde nec etiam disten- di æqualiter, vtiq; non poterit pulsus vnus in quantitate distentionis moderatus existere, ne si optima quidem natura fuerit: sed in motu & robore, ceterisq; generibus vnus esse per omnes arterias potest. Quippe similem cum inter se mu- tuò, tum cum corde motum, omnes necesse est habebant: magnitudine verò, vt earum differunt corpora, sic distentiones par est esse diuersas. Ve- rùm hæc qui dicit, ignorat, æquæ in magnis cor- poribus ac in paruis consistat eandem naturam posse. Quod quidem si explorari haberet, neu- tiq; amplius requireret, nec arteriarū quæ in singulis partibus sunt, nec item ipsarū dilatatio- nem, parem magnitudinē esse in vniuersis incul- patis naturis, cum pro magnitudine & paruita- te corporū, illa etiam variet. Porro veficari, foli- um, vtrium, omniū deniq; rerum quæ predicta caultate aliqua sunt, magnas & paruas disten- siones solemus dicere. Dicimus etiam interdum ve- sicam esse distentam maximē: vitem autē & fac- cum, qui viginti eiusmodi veficæ facile capiant, nondum maximam distentionem esse consecu- tos. Censemus siquidem distentionem ad cuius- que caultatē corporis esse æstimandam, non ab- solutē pronuntiandam ad eundem vbiq; modū. Nam est certus in re qualibet modus, in quo nec contendit tunicas, quæ caultatē ipsam comple- ctuntur, nec remittit cōtingit. Vbi igitur aut ten- sio, aut caultas in ipsis percipitur, tum magnas dicimus eis aut paruas distensiones inesse. Vbi verò nec sensibilis caultas sese offēdit, nec tuni- cæ laborant tensis sub ipsa dilatazione, modi- cam sanē & moderatam, naturamq; corporis dis- tensionem illam censemus existere. Similiter igit- ur est iusta quædam ipsius arteriæ distensio, ita vt nec contendatur, vel laxam aliquam sui partē relinquit. Nam vt omnino considat, tunicarū dura natura prohibet. Atq; eam sanē distentionē moderatā & naturalem dicemus. Etenim in na- turis optimis hæctenus dilatatur arteria, quoad vñus expleatur largiter, & nihil ledantur tuni- cæ. Proinde qui regulam velat attendere in ma-

gnis pulsibus & tardis dignoscendis, optima na- tura inuenta, cognitaq; vnus in illa arteriæ cu- iuscunq; magnitudine corporis atque distentio- nis, recordandum illi & æstimandū est, arteriam hac maiorē, quantò oporteat maiorē distentio- nem habere, in naturis optimis. Quæ si tanta re- periat, ut fore coniectabat, sic moder- atum pulsū appellabitur vel maiorē hac, vel minorem, magnum vel paruum. Arteriæ depren- dender in optima natura magnitudinē, aut per- dissectionem, aut ex collectione signorū. Quod si nesciat etiam quanta sit arteria predictis opti- ma natura, certè eorum pulsus memor, si in alte- rum postea incidat, & colligere possit, nam par- sit maiores hunc aut minores, quāliū habere æ- terias: cum magnitudine iam distentionis cōfer- re poterit, coniectareq;, an magnus, an paruus, an moderatus sit pulsus. Etenim si quantū vi- detur arterias maiores habere homo qui com- paratur, tantò maiorem etiam distentionē for- tiatur, moderatum esse illius dicemus pulsū. Quid si arteriæ magnitudō videatur superare magnitudinē distentionis, aut minor quāliū illa sit, magnum tunc, vel parū pulsū vocabimus. Præterea si arteriæ corpus videatur esse maius quāliū pulsus, paruum: si arteriæ minus, & pul- sus maior, magnum. Haud secus in reliquis ge- neribus pulsuum: vt in ipsius motus genere, in quo celeritatem & tarditatem dignoscimus: ita genere quietis, in quo crebritatem & raritatem contentionis, in quo velennam & remissio- nem: ad hæc, corporis arteriæ, in quo duritiem & molitudinem. Nam per hæc omnia, tum mo- deratum in veniētem in optima natura, tum im- moderatos vel ob excessum, vel ob defectū, non inter se, sed cum moderato comparabimus.

# GALENI PERGAMENI de dignoscendis pulsibus, liber tertius.

Celer autē pulsus vocatur, qui pauco tem- pore suum motum absoluit: quemadmo- dum tardus, qui multo. Etenim si hoc prius nobis constet, moderatus pulsus quanto tempore, quantum confecerit intervallum: de- inde alterius offendamus, qui par labitur tem- pus, spaciū minus: multo tempore dicemus hunc motum fuisse. Si quidem si duo pueri di- missi in diuersos locos non æquē distantes sint, & simul reuerſi: alterum, quod iter pauco tem- pore absoluerit, collaudamus: alterum incre- pamus, quod multo. Nam ex viæ longitudine æstimamus, quum paucum vel multum tempo- ris dicimus, non absolutò sermone. Ceterūq; ad dignoscendum celerem pulsū vel tardum, nec quantitatē temporis, nec intervallū (vt iam quod verum est fatear) considerandam cen- semus: imò ne proportionē quidem illorum, de quibus (ad extrinsecum errorem quorū- dam, qui ex solus temporis quantitate, indi- cium ipsiūm pulsūm serbabant) verba fecimus in superiori libro. Nam celeritatem quidem & tarditatem, vt primum occurrit arteria, nosci- mus: rationem verò temporis ad tempus, & intervalli

Pulsus moder- tus quomodo in dicandus sit.

Arteria ma- gnitudo quo- modo cognos- cenda.

Pulsus magnus vel parus quò- do dicendus.

Pulsus in omni genere, moder- tus quomodo ratioq; vniuersi- tatis ratio.

Pulsus celer & tardus quò- do sit.

Pulsuum celer- itatem vel tar- ditatem vt co- gnoscimus, ve- que tempus, nec intervallū quantitati esse collaudandum.

Pulsus naturæ optimæ, aliorū quomodo regulā et mensurā ex- stant.

Arterias inter framentis, & si- milia cum corde similem simplici- tatem ferunt.

Arteria in illa distensio.

Arteria in illa distensio.

intervalli ad intervallum, ut exploremus, opus nobis est longo tempore. Quemadmodum itaque si ob oculos moveri quempia videamus, imperitus ipse indicare poterit motus celeritatem: sic & in arteria contingit. Nam aut incitatum, aut remissum eius motum invenias. Omnia enim corpora quæ moventur, ex locis ubi semper moventur, quo modo moventur, dignoscimus. Siquidem si in eis immorentur, tardum esse motum cum dicimus: si verò descendant leuiter, celerè. Vnus

igitur sensus celeris & tardus pulsus declarat, ex ipso locorum transitu iudicium nobis confirmans. Quare celeritatis & tarditatis facile notitiā consequimur: non penitus consecuturi, si quantitate temporis & intervallorum aucupata, eorum proportionem observare sustineremus. Atqui non sustinemus: nam ut primū aciem intendimus, momento temporis obiectum motumque corpus deprehendimus, ex quo coniucimus transiitū. Quæ igitur eminus ceruimus, ea diutius videntur nobis consistere, vel si agitentur celeritè. Vnde liquet, ratione nos motum colligere, minus sensu deprehendere. Quia verò sensui ratio coniuncta est, & transcursum mentis est velocissimus, se penumero non ratione, sed deprehendi sensu videtur. Non est itaque temporis neque intervallorum quantitas inspicienda, sed ipsa qualitas motus, licet explicatu difficilis: quia etiā dignotio inæqualium celeritatis & tarditatis pulsuum ducit originem. Quippe vnus distentionis sepe initiū motus plane celeris videtur: proximi tardus: iterum finis celerior. Quo minus leuiter palpan dum est, ubi genus hoc pulsuum perpendimus: alioqui extremum motus finem sentiemus duntaxat, uō integrum motum. Ex quibus liquet, eiusmodi pulsus nec paruos, nec languidos esse. Nec enim trifariam positis fecare motum, nec in paruis intervallis, nec in viribus imbecillis. Quamobrem nec in pulsibus leihargicis deprehenderis inæqualitatem. Porro maximus & vehementissimus pulsus validam fert compressionem: atque alius quisque, quantum à vehementia vel magnitudine abest, tantò minorem. Quare qui cuius pulsui inuētur sit contrēctationē appositam, hunc singulari prudentia esse, & expertū in dignoscendo oportet. Moderatus igitur motu pulsus in optima constitutione, non ex intervalli aut temporis quantitate est, sed ex ipsa qualitate explorandus. Quo quidem qui percipiuntur celeris decedere, celeres: qui tardius, tardos voce

mus. Cæteri si pulsus qualis sit, vniuersam distentionem non expectamus, sed ex parte eius, facere de tota coniecturam licebit. Si verò in æquali, integram alique expediet, tactumque pro magnitudine pulsus & vehementia variè applicare. Deinceps de quæsitæ distentionis agamus. Enimvero cum corporis arteriæ dimensiones sint tres, longitudo, latitudo & profunditas: nullarum possumus totam sentire. Ac de longitudine ne quidem apertissimè est. Virique enim arteria, plerumque longa tres cubitos, viginti aut extremum terminū pulsāt, cum tamen tribus aut quatuor duntaxat digitis motus ipsius percipiatur. Sed nec in dimensionibus ceteris, quod diximus ob scurum videtur, cum à corporibus incumbenti-

bus adeo circumvallentur & contendantur arteriæ, ut nec latitudo nec profunditas motus exactè deprehendi possint. Est tamen in singulari corporum naturis aliquid sub ipsa cute elucescens, verum in natura opima, moderatū. Etiam si quid supra hoc secundum longitudinem sit, longum si quid infra, breuem pulsū efficer, qui definiti numero digitorum non possit. Eodem modo iuxta dimensionem secundam, tum lato, tum angusto pulsus cum moderato collatos deprehendes: similiter altos & lumbiles iuxta tertiam: sicut in tribus simul dimensionibus, magnum & paruum. At verò singulos esse in singulis aliis pulsuum generibus moderatos, sed in sola quantitate non plane vnum, sed suum cuiusque corporis partem, antea explicatum est. Quandoquidem igitur dimensiones pulsuum non facile deprehenduntur, danda nobis opera est, ut cōmonstremus rationē qua in optimam singularum cognitionem veniamus: ac primū sane de illa dicemus, quæ circa longitudinem tota versatur. Esse autem eam censendam optimam, quæ motus maximam partem sentiat, clarissimūque. Porro in tribus his, natura videlicet, exercitatione, & applicationis modo, sensibilibus cognitionum omnes differentie sunt fixæ. Nam qui naturam habet oppositissimam ad sentiendum, & probe ipsum tactum exercitatum, quem sensibilibus etiam decenter admoceat, optimus hic explorator fuerit eorum quæ intus sunt condita. At qui hoc aliquatenus est inferior, quammaximè ab illo abest, tam presūmè absolutam cognitionem consequitur. Qui igitur ad tangendum fuerit optimè comparatus, in cognitionis longitudinem pulsus, omnino non premar, imò sepe cōtrectet leniter, ac velut suspēdat manum. Qui modus accommodatus in primis est, parus pariter & imbecillis pulsibus. Quorum quidem, si eos aliquatenus premas, magna

ex parte motus exsoluitur, imò verò perit sepe vniuersus. At modicum pressum non grauit ferunt quidem pulsus vehementes: non læduntur tamen neque quidem, si nihil premas. Qui modus tangendi cum optimus sit languidis pulsibus, nec incommodus vehementibus, nulli alteri est postponendus. Porro ubi diuersas partes secundum arteriæ longitudinem premas, non perinde videtur in omnibus lædi motus. Sed si cordi viciniore premantur, magnā iniuriam subiectis inferunt: si remotiores, se penumero nullam, quæ animaduertere possit, si bene pulsus sit vehemens: interim tamen manifestam, in non vehementibus. Porro ut sensu percipimus differentias latitudinis & profunditatis, sic nos sepe circula rem figuram deprehendere in pulsū manifestè fatemur. Quod igitur ad dignoscendas eas duas dimensiones pertinet, si leniter palpes, aut plurius in partibus necessum est arteriæ oculum percipis, aut in paucioribus. Quo cognito, ad sensum ratio adiuncta, nobis magnam distentionem suggeret esse, quæ multis partibus mouet tactum: parum, quæ paucis. Agē fac circula rem eius occursum esse: quid, nonne clarū est, si insigni sit circūferentia circuli magnitudine, totam etiam crassam esse distentionem

Pulsus diuersos deprehendere ratio.

Sensibilibus cognitionum omnes differentie, in natura, exercitamento, et applicationis modo, constituntur.

Arteriæ cōtrectando modus.

Arteria circula rem figuram in pulsū deprehendi possit.

Distensio magna quæ sit.

Motus celeritatem aut tarditatem, ex locis ubi moventur corpora indicantur.

Motus non sensu, sed ratione colligimus. Ratio est sensus coniuncta. Motus transcursum est velocissimus.

Pulsus maximum vehementia infirmus, seu in valde compressum.

Pulsus moderatus esse ex se lo motus qualitate explorandum.

Pulsus æqualis et in æquali loco quomodo inueniatur.

Arteria diuersa sunt sunt arteriæ, quarum nullam autem percipimus.



arteriæ & vniuersam distentionem gracilem, si circumferentia sit parua? Quod si gibbosiores ac præcipitiores videantur obliqui occurfus arteriæ, præterea cauior quodam modo & humilior in profunditate, adeo vt ne circuli quidem circumferentia cernatur amplius, sed veluti recta linea: profecto apertus est talem pulsus latum fore atq; humilem. E diuerso, si motus obliqui partes, longe citra medium constiterint, ac medium ipsum satis gibbosum appareat, planè is pulsus altus & angustus existit. Si semel angustus eius in latitudine occurfus evadat, vt non modò immineat esse obliquus motus, sed & torus percussus omnino videatur, difficilis cognitiua est, vel potius cognosci non potest, quantum in his est, qualis sit pulsus. Iam verò opportunum est & de rhythmo enā aliquid dicere. Qui quidem cum in collatione temporis distentionis, cum tempore contractionis consistat, prius paranda nobis

*Rhythmus in quo consistat.*

*Distentionis arterie initium, & contractionis finem imperceptibilem esse.*

*Rhythmus distinguendo quod explorandum.*

*Essentiam vniuersam requiritur quoniam qualitas.*

*Rhythmus in solo dignoscitur vniuersa pulsum.*

## GALENI PERGAMENI de dignoscendis pulsib. lib. III.

Est autē in distensione arteriæ veluti quidam ictus, qui, dum tangimus, tactū ferit. Hūc, si violentus sit, propriè existimabimus ictum vocari: si violentia careat, nō item. Comitatur porrò ictus ipse multas ac varias species pulsū. Duri quidem pulsus, vehementis, magni, celeris, alti, convulsivi, & vibrati est comes, atq; commune symptoma. Quare cōfundendi illi pulsus non sunt, sed discernendi suis notis. Cū igitur tactum impelli a pulsu, si illius debeat sentire occursum, necesse sit (impellitur enim non perinde semper, sed nunc plus, nunc minus, interdum vt palpet tantū) quicunq; motus cum protrudat, & longè submoueat, nō sanè violenti ictus speciem refertur. Ac protrudere quidem longè potest motus arteriæ duræ, veluti tactum contundens: & qui robore mouentis eam facultatis veluti evertit: præterea qui magnitudine distentionis progreditur plurimū. Iam etiam, qui quæ fertur celeritate impellit valenter, & qui præ altitudine veluti subit ac intrat: quique quod tensus sit, ægrè mouetur: ac deniq; is, qui ob vibrationem, simul tensionis & duritiæ, celerit̃ occurfus imaginē repræsentat. Ceterum in cōdis in multos quodammodo medicos, qui illos omnes pulsus vel maxime discrepantes, dicant vehementes esse. Erenim q̃ occurfus celeritatis, non eadem sit cum violentia ictus, hinc cognoscere licet, quod nec longius celer pulsus impellere valet tactum, nisi simul sit magnus. Vnde liquet vel etiam ad hanc per accidens, videlicet vehementer rationis. Magnitudo siquidem, non quod longius intrat, sed quod multis in partibus longitudinis pariter & latitudinis &

*Uti qui celeritate possit.*

*Tactum nostrum quod motus regit lani.*

*Impellere tactū solus magnitudinem est, non vehementiam ab multo. Magnitudo pulsum unde cognoscitur.*

profunditatis attingat tactum, cognoscitur. Si enim pulsus circumferentiā quæ fatis magna est perceperimus, ex ea faciliē ascensum, qui ex multitudine profunditatis sit, cōiciemus. \* vel si tactus totum intervallum affecutus nō fuerit, sed externū tantū finem perferentem. Si verò & a primo dilatationis impetu, velimus motū ipsū sentire, magna ex parte magnitudinē interpellabimus, ita vt ne magnus iam esse pulsus videatur: idq; vbi magnitudini vehementia est adiuncta. Nam si in pulsibus qui citra vehementiam sunt magni, aut ascensui occurrat, aut ipsam arteriam cōprimat, mox torus pulsus perierit. Iam verò si magnus pulsus tribus dimensionibus præditus, nisi etiā vehementis fuerit, minime tactum protrudit longius, manifestum vtiq; est, nec alium id sua natura effecturum, qui vna tantū dimensionē operatur, sed quod simul aut vehemens sit, aut certè minime languidus. Omnes itaq; illi pulsus, vt longè propulsent tactum, planè vehementissimè desiderant. Quancumq; & alius etiam, a quibus diuelli durities non potest, violenter ferunt, vt vibratus, & convulsivus. Qui quidem non aliunde comparant ictus violentiam, quā a duritie perpetua. Quamobrem duo tantū genera habebunt pulsuum violentem ferientium, nempe vehementium

*Pulsus nullum alioq; signum tria possit tactū protrudere. Pulsus vehementer ferentis, duo tantū genera habens.*

*Dura qua di-  
cantur.  
Mollia qua  
sunt.*

tium, atq; durorū. Etenim quibus carnis nostrae natura cedit, ea dura vocantur: quae verò carni, vt aqua, haec mollia dicuntur. Fingamus itaq; manum nostram nunc aquae rapido fluctui ex adverso occurrere: nūc lapidi, quem altera manus sensim admoueat: nōne ab aqua perspicue plāne ipsam everti, non pressam tamen: & lapidem ab hac everti, sed pressam ab illo? Nam durum quidem, quod minus progrediamur, obitare per se non potest: sed aut per pondus, aut motum acquiritur impedire interdū poterit: vehementem autē, suapte natura reprimere, cohibere, repellere, ac deturbare intelligitur. Liquet igitur, aliud nos cum vehementia tangimus, aliud cum dura sentire: nam haec premunt carnem tantū, illa impediunt progressum. At quia saepe fit vt ambobus conveniant, atq; id quod occurrit sit durum, pariterq; vehementer moueatur, non potest sensus etiam non duplex nobis offerri: vāus veluti prementis, alter veluti evertentis. Quae si sint ita, vt sunt certe, duri pulsus, in premendo tactu, cognatio pendenda est, vt vtriusq; iclusio violenta conueniat: sed proprium duri sit premere, evertere vehementer. Hallucinatur autem Archigēnes, dum pulsū, cum arteriae status cognoscitur, plenum pulsū appellat: potius is durus, aut mollis, aut moderatus dici mereatur. Dum verò ait, secundo alio pleni pulsus genere cognosci qualitatem substantiae in arteriis obtinere: quam qualitatem intelligit, haud pro dignitate explicat.

*Duri proprium  
est premere.  
Vehementi autē  
proprium evert  
tere.*

*Archigēni singu-  
llis Galenus.*

Ceterū grauissimè peccat tertium aliud genus pleni pulsus assignans, cuius vi, ea quae in arteriis pulsus, innotescant nobis. Quippe tactus, spiritū in arteriis tantum sit, an simul humores aliqui, indicare nō valet. Quineti nullus prorsus est sensus, cum demonstrare valeat, in arteriis contentus sanguis, quomodo sit multus & qualis. Imò verò in ipsa aqua inter cutem neutiquam licet nobis, humorem sit an spiritus, qui in regionibus continetur ventris, ipso tactu explorare, nisi pressu cute canata: quam nec frequenter cauam conspicias in synceris ascitis, & id eò hydrope, quem tympanitem appellant. Sed ad veram notitiam comparandam pulsare cogimur abdomē, vt arēdamus si veluti tympanum resonet: secundo loco alter componere hominē, convertereq; in latera, quò fluctuatione aliquam exaudiamus. Siquidem vt strepitus in motū tympani spiritū nobis annunciat, sic fluctuatio humorem. Vno autē admoto tactu, haud facile deprehenderis, si an sine aqua iussit, tamen si cutis his contabuerit: tantū abest, vt per crassam arteriae tunicam, & quae peritonaei est sexcupla, qd latrat in ipsa arteria noscamus. Praeterea ex magnitudine quidem pulsus, copiam contenti humoris cognoscimus. Sed nō perpetuò hinc nobis (quod ille arbitratur) humidum esse ipsum humorem constat. Solae itaque fluctuationes & strepitus sunt, ex quibus cognosci possint quid sit, aut quale, quod continetur. Sensus autem tactus, manet sui semper similis.

*Alium  
Hydrops  
Tympanem.*

*Contineretur  
humorem qua  
litas, vnde de  
prehendatur.*

## GALENI PERGAMENI de causis pulsuum, lib. I.



Vt immutant pulsus, partim eorū generationis sunt causae, partim tantum alterationis. Ac generationis quidem, tum visus, cuius gratia sunt: tum facultas ab ea, tum instrumēta per quae distenduntur. Alterationis, ceterae omnes, & quae praecedentes vocantur, & quae harum sunt procatartice. Nam triplex sanè, nō in pulsibus modò, sed in aliis cunctis, causarum genus exiit. Vnum quidem pñm atq; praecipuum, quod cōtinens idē appellatur, quia eorū essentiam complectitur, nimirum generationis (vt modo diximus) existens causa. Reliqua verò duo genera, vt hiant pulsus, in causa nō sunt: causae tamen existunt illorū qui iam sunt, mutationis. Quippe humorum crassitudo, abundantia, lentor, acro, efficere nō valent pulsus, alterare valent. Ita frigidum balneum, vel calidum, & hyems, aestasq; breuiter frigus & calor, alterandorum pulsuum sunt, non gignendorū, causae.

*Pulsus a quibus  
mouentur.*

*Causarum ge-  
nera tria.*

*Causa continen-  
s.*

*Causa proci-  
piua.*

*Causa entee-  
dentes.*

*Causarum qua  
pulsus mutant,  
generales vno  
exemplo tradita.*

*Causa continen-  
s alterationis  
pulsuum, est  
vna eisdem.*

*Causa proci-  
piua pulsuum,  
sunt continen-  
s.*

Ceterim quas vltimò cōmemorauimus, procatartice siue praecipientes dicuntur. Quas verò ante has, illae nempe quae circa humores versantur, antecedentes. In summa autem, quae cunctae extra corpus posita, quicquam in corpore immutat, procatartice causae, siue praecipientes vocantur, & ceu incipientes prius quā dispositiones corporum. Quae quidem ipsae dispositione, quando continentes existant, ipsarū antecedentes causae redduntur. Denstetur enim ab occurssu externi frigoris, cutis: cuius densitas, naturalem halitus digestionem reprimat. Repressus ille coaceruetur, tan dēq; sebrim accendat, ob quam visus pulsuum mutetur, ipsiq; similiter pulsus. Hic certe occurssus externi frigoris est procatartica causa: ceterae vsq; ad visum pulsuum omnes antecedentes. Causa igitur procatartica, antecedentibus causis mediante, quia visum pulsuum permutat, quae vna ex cōtinentibus causis existit, dicitur etiā pulsus ipsos variare. Nec enim possit vlla cōtinens causa mutari, vt continens maneat eius effectus. At priusquam continentes alteratio attingat, pulsus immutari non possunt. Ideoq; principes hae, & praecipuae sunt, primaeq; causae pulsuum. Ceterae sunt harū gratia, nec per se alterare ipsos pulsus possunt. Quare illum qui peritus evadere artis de pulsibus velit, in omnibus causarum generibus apprime esse exercitatum oportet. Porro quatenus gignendorum pulsuum origines sunt continentes causae, eatenus etiam alterandorum. Si quidem differenter causarū in quantitate qualitateq; pulsuum differentias in qualitate & quantitate constituunt. At verò cum perpetuò corp ipsum vñ cum arteriis omnibus, quādiu superiores est animal, certissimū habere motum illum pulsatilem homine autem iam vita functo, tum arterias, tum cor, ipso pulsū destitui: sanè constet aliquam fuisse causam, a qua ille motus excitaretur. Quam quidem causam, licet eius essentia nos fugiat, quod facultatē tamen habeat faciendi pulsus, illam facultatem vocamus. Quomodo

*Animae essentia  
gignens autē Gale-  
nos.*

autē omnis facultas, alicuius facultas sit, haud-  
dubie eius nono erit relationi subiecta. Ceterū  
dum robur facultatis, virtutemve dicimus, aut  
contra infirmitatem & vinum, hæc nomina ad  
functionem referimus. Siquidem quæ obit effi-  
cæque functionem causa, interim ad eam melius  
est appositæ, interim deterius. Quo sit, ut modò  
præclarus: postea si res ferat, deterius, fun-  
ctio ipsa obeatur. Ac præstannor ad functionē dispo-  
sino, facultatis virtus & robur est: deterior, in-  
firmitas atq; vinum. Quod verò ad pulsuum v-

*Pulsus singulis in-  
feriuntur & aliis  
tunc de vniuersi-  
tate caloris, quæ  
dicitur animam  
spontaneam.*

*Arteriarum cor-  
pus autem  
inter ceteros  
generatur  
causas.*

*Pulsus varia-  
tionem pro cau-  
sâ altera  
transibit  
Pulsus est effe-  
ctus differens  
aut, qui cau-  
sam  
debeat  
efficitur natu-  
ralis pulsus.*

*Pulsus altera-  
rationes quæ  
quibus causis  
magis præbi-  
sunt.*

tant, & crebrior: ita qui refrigerio indigent, copio-  
sum simul & celeriter, crebriusq; arraliat. Quam-  
obrem peculiaries dixi esse pulsus copiosus calo-  
ri, magni, celerem, crebriusq; nō tamen illi per-  
petuo annexa. Possunt enim ut tales evadant,  
facilitatē validam, atq; ipsa instrumentū molli-  
a. Quod si infirma facultas sit, aut instrumentū du-  
rum, nec magni esse, nec celeres possunt, cū in-  
strumentū quidem sit per duritiā adversus mo-  
vementem facultatē contramax: illa verò tollere  
quarens oportet arterias, per imbecillitatē im-  
posse. Quare ut celer pulsus vel magnus fiat, ita  
oportet causarum genera inter se coactant: nem-  
pe, ut visus illorum generationis virget: facultas  
valida sit: mollisq; arteriarū tunica, aut certe nō  
rigida. Porro ubi solus calor inieruerit, & man-  
sent facultas, tunicaq; arteriarum immota: pul-  
sus necessariō maiores & celeriores fient, vniū  
cum calore augebuntur, donec ad maximam di-  
lentionem pervenerint. Celeritimi verò ne sic  
quidem prius erunt, quā calor ipse superave-  
rit maximam distentionem, ita ut ab ea satis re-  
frigerari non possit: tunc enim celeritate refra-  
cietur motus defectus, atq; sic evadent pulsus ce-  
lerissimi. Ceterū neq; hæc satisfaciunt calori ve-  
hementer incenso. Nam quod tempora inter  
duos motus antea quiescebat, nunc id præfecit  
etiam, adeoq; efficit brevis, ut totus vnus effe-  
ctus cōtinuus nulla intercepta quiete videatur.

*Caloris impulsus  
quidem pulsus  
sunt familliaris.*

*Pulsus celer  
vel magnus  
quidem pulsus  
sunt familliaris  
quæ causâ de-  
beant.*

*Celeritimi pul-  
sus quando ge-  
nerantur.*

Hoc tamen accidit, ubi extrinsecus calor fuerit ac-  
census: tunc enim, cū tres sint prædicti ratio-  
nes in excessibus vniuersis, omnibus simul vit-  
tur. Nam & plurimum consequitur refrigeran-  
tis substantiæ, celeritimiq; & in primis assidue.  
Quorum primū maximos pulsus, secundum ce-  
leritimos, tertium creberrimos reddit. Nec ubi  
liberaliter illam magnitudinem distentionis re-  
frige- rat, irritat celeritatem: sicut nec crebriorem ubi  
ab ambabus auxiliū recipit: sed alterius illarū  
semper defectus, corrigat altera: magnitudi-  
nis, celeritate: celeritatem, crebriorem. Quid mul-  
tis crebrius pulsus causa vna est, prioris ac-  
tionis defectus. Tam quoq; defectus naturalis  
caloris nullus comitatur ex necessitate pulsus:  
familliaris sunt tamen ei parvus & tardus præci-  
pue, mox etiam rarus. Nam vi natura quæ iam-  
pridem refrigerata est, nec multū requirit, nec ce-  
lere refrigerat, sic nec brevis intervallis. Por-  
rō inter magnū pulsū & parvum, naturalis in-  
tercedit & moderatus: cum quo comparantes &  
æstimantes reliquos omnes, qui maiores sunt  
eo, hos magnos vocamus: qui minores, parvos.  
Idem inter celerem & tardum mediū modera-  
tisq; naturalis existit. Sic inter crebrum & rarū,  
durum & mollem, medius sit naturalis. At natu-  
ralis nō item videtur, qui inter vehementem et  
mediū & languidum. Valide quippe facultatis  
est opus, vehemens pulsus: veluti infirmæ, lan-  
guidis. Cuius sane nō est contra naturam firmi-  
tas: imò hæc virtus est, & secundum naturā: infir-  
mitas verò facultatis, vitium, atq; præter natu-  
ram. Iam verò vino modice epoto, cū maio-  
res & celeriores, tum vehementiores appetit pul-  
sus evadunt. In ira autē, & exercitationibus mo-  
dicis, nō perinde appetit: imò si quid illa accedat vehe-

*Pulsus crebri-  
mi qd causâ ca-  
lor extrinsecus ac-  
census.*

*Crebrius pul-  
sus causâ qd  
prioris actionis  
defectus.  
Caloris natu-  
ralis defectus  
quæ pulsus sui  
familliaris.*

*Pulsus magis  
modicus sunt  
naturalis, quæ  
illis qui habent  
inter vehementem  
et languidum.*

*Vino modice o-  
poto, quales pul-  
sus generantur,  
brevis et ac-  
tiones pulsus  
quales.*

\* Disputat autem contra magnam Archigenem,  
quod celeritas pulsus non a robore ponus, q; a  
facultatis imbecillitate proficiatur. At neutrum  
sequitur necessariō. Magis tamen peculiaris ce-  
leritas robori facultatis est, abundantiæq; calo-  
ria, nec non molitudini instrumentorū: tarditas  
autē contrariis. Eodem modo validæ facultati  
maginatio, & copiz calor, tum etiā mollibus  
instrumentis familliaris existit: parva verò con-  
traria. At crebrius nulli instrumentorū: cōmemo-  
rari inliaret: magis tamen facultatis imbecilli-  
tati est propria, copiciq; calor, ac duritiei item  
instrumentorū. Similiter raritas magis ad cōtra-  
ritatē declinat, non tamen illi perpetuō annexa. Si  
amplius in corpore fuerit collectus calor, ani-  
manti cū maiori erit opus respiratione, tum  
maioribus pulsibus: quæ maioribus: cōtinuū  
etiā celerioribus & crebrioribus. Ut enim qui si-  
tubundi sunt, nō multū modò, sed & celeriter po-

50  
40  
50  
60

vehementius, id adeo est minutū, vt animadverti  
ægrè possit. Cdm igitur in cōfesso sit, à facultate  
distendi arterias, probabile est ipsam plus & ce-  
lerius eas attollere validam, minus autem & ra-  
dius infirmam. Vt autem priora repetam, quorū  
pulsū postulat generatio vñ cautam, huic per-  
petui adhærebunt, quāq; fidelissimum signū  
existent: vt vehemens, valens facultatis: languis-  
cus, imbecillus. At quorum tū plures interit  
causæ, constituit generatio nequit, hos familia-  
res causis esse dicemus, non autē significare cer-  
tam ex illis aliquam. Eodem modo, si ex vna ali-  
quando causa pulsus proficiat, sed non sem-  
per ab ea, familiaris quidē omnibus causis erit,  
quæ efficiunt eam: ebitanter verō nullam ex eis  
indicabit. Neg enim si celeritas pulsuum ad sit,  
itañ robur quoq; necessarii facultatis adfue-  
rit. Imò est, cum maior sit vsus generat animas  
spiritus: & est cum calor sit copia, vel in-  
strumentorū molliēs, vel horum quædam, vel  
omnia simul. Haud aliter si magnitudo sit pul-  
sum, erit vel facultatis robur, vel impendū ani-  
malis spiritus maior, vel calor in corde abun-  
dantior, vel mollitudo organorū, vel quædam  
horum, vel vniuersa. Qui igitur optime consi-  
tus ac temperatus fuerit, si homo si calidior solio-  
to evaserit, atq; hæc re sit alteratus duntaxat, ve-  
hementiam pulsuum non immutaverit: nec  
duriciæ, nec mollitudinis genus: sed in magni-  
tudinem & celeritatem vertet, interum etiam in cre-  
britatem, pro vt magis vel minus eius calor in-  
creverit. At si frigidior iusto sit factus, primū ra-  
ritas peripica erit, deinde tarditas, postremo  
paruitas. Nam cum vbiada facultas exiit, est  
pauid minor sit vsus, primam actionem nec par-  
vam necesse est, nec tardam esse: secundam verō  
post longius tempus, quim si virget vsus, est  
consentaneū rationi. Iam si maior fuerit refrigera-  
tio, eodē magnopere vsus ipse remissus, vñ de-  
lauescat celeritas motus, atq; minor statim e-  
rit distentio. Si plurimū sit refrigeratio progres-  
sa, necessum est pulsus ipsos rarissimos quidem  
esse, ceterum nec tardissimos, nec etiā minimos.  
Nam perfectē tardus vel parus, si valida facultas  
sit, vel si admodū sit ipse vsus remissus, nunquā  
sient pulsus. Eadem & in respiratione est ratio.  
At verō vbi non modō vsus, verum etiā facultas  
mutatur, quatuor tum differentie diuerse in vni-  
uersum erunt. Quarū prima quidem circa facul-  
tatis imbecillitatem, calorūq; augmentū verita-  
tur. Si igitur magnopere sit imbecillus facultas,  
calor autē igneus, parus & tardus pulsus, creberrimi  
orientur. Sin noxa sit modè data, æque fiunt  
crebri, sed in distentione & motu mediocres. Secun-  
da coniugatio in imbecillitate & perfrigera-  
tione consistit: cui pulsus componit cum imbecil-  
litate, tum parus, tardusq; sicut pulsus prioris co-  
iugationis: sed nō æque vel illi, ad extremam de-  
venat crebritatem, nisi vbi omnino facultas pro-  
strata fuerit: tunc enim pulsus minimus erit, in-  
termittetq; & deficiet frequenter. At si modicē sit  
facultas infirma, valida quæ refrigeratio, creber  
minimè evadit pulsus, q̄ videlicet vsus faciat ta-  
lus facultas satis. Tertia coniugatio fit, vbi calor si-  
mul atq; facultas augētur: quā qdē coniugationē

vehementissimi pulsus & maximi comitantur,  
sed non petinde celerissimi. Creberrimi verō ferē  
non sunt apertē. Quarta coniugatio est, in qua  
coeunt robur facultatis, & caloris penuria: cuius  
sanē sunt pulsus magnitudine moderati, sed  
tardiores, & latis rari. Nam cum sit parvus tum  
pulsus vsus, totūq; facile magnitudo disten-  
tionis tuncatur, laud immodē durissimē quie-  
scunt arteriæ: tamen ob facultatis robur, disten-  
tionis nō impeditur apertē vel dilucidē quanti-  
tas. Quia ratione etiam, nec multū prepollet tar-  
ditas. In vniuersum autē, ipsius scētis qualitas;  
seruientis nature respondet. Porro molle instru-  
mentū, quia promptē in omniē partē extenditur,  
facile dilaturur: durū non absq; magno negotio.  
Iam cories est promptitudinis distentionis, mā-  
gnitudo: tenax & cōrumaciæ, paruitas: itēq;  
celeritas, prioris generis: sicut aliterius, tarditas:  
non tamen ex æquo & magnitudo & paruitas.  
Paulo enim celerior est pulsus profectus à molli-  
tudine instrumentorū, eo quem preceat duri-  
ties: maior autē p̄cursulo: quia tunc ipse arteriæ,  
quīs duriores interim sint, ad celeritatem  
quandō motus sunt faciles: ad magnitudinē verō  
distentionis, ineptissimē omniū. Nam opus  
est, vt in omniē partē effundatur facile, quod ma-  
ximā dilatanonē sit effecturū: huiusmodi enim  
est molle. Ceterū vbi à natura longissimē aut ad  
mollitudinē, aut ad duriciē, corpus arteriarū re-  
cesserit, tardior mollis pulsus fit durus: magni-  
tudinē tamen nō modō cum etiam nū superat. Iam verō  
cum durorum instrumentorū dura distentio  
sit, ac proinde minus expleatur vsus: mollis con-  
trā, inignis distentio fiat, & quæ vsus par sit ex-  
plendo, meritō cum duris pulsibus crebritates;  
cum mollibus raritates coherent. Quod si quan-  
do incidat, vt cum durine concurrat refrigera-  
tio, & calor cum mollitudine, tum pulsus duri,  
mollibus evadent rariore. Si igitur durum cor-  
pus arteriarum sit coniunctum cum innati calo-  
ris refrigeratione, pulsus efficiet iusto minores,  
tardioresq;. Si superet durities, minores quā  
tardiores. Si autem refrigeratio, contrā tardio-  
res quā minores. Ad eundē modum crebri-  
tes, si durities refrigeratione superior sit: sin vin-  
cat refrigeratio, rariore. At si par sit visusq; à na-  
tura flexus, tanto sient pulsus minores, quantū  
tardiores: à raritate verō & crebritate nō abdu-  
centur. Est altera coniugatio, in qua cum calorē  
superat mollitudo. Quæ etiā tres necessariō pri-  
mas differentias producit. Interim enim par mol-  
litudinis est & caloris mutatio: interim prepol-  
let vel mollitudo, vel calor. Quare si quantū na-  
turam mollitudo reliquerit, tantūdem deficiat  
etiā ab ea calor, magnus necesse est, & celeres  
fieri pulsus: nō tamen itatim crebros, sed vbi ge-  
nerandorum eorum vsus vincat magnitudinem  
distentionis. Si mollitudo præfret, magnitudo  
etiā superabit celeritatem. Si verō ita prepol-  
leat calor, vt vsus a ctio complere nequeat, cele-  
riores vt sunt necesse est, quim maiores pulsus,  
simulq; etiā crebri. Quod si abundē natura sup-  
atur vsu, æque magni atque celeres. Sed & tertia  
erit causarum complexio, quæ pulsuum in hoc

Ipse qualitas,  
fronem natu-  
re sequitur.  
Mollis instrumentū  
tunc facile disten-  
datur, iustitiam  
quæ datur.

Pulsus diffi-  
cillime, pro mol-  
litudine vel du-  
ritate organorum.

Duri pulsus  
crebriores, mol-  
libus rariore  
anomalie effi-

Calore pulsus  
cum mollitudo-  
ne instrumento-  
ri, quæ pulsus  
differentia o-  
manant.

Pulsus qui  
non vñ sem-  
per causā ad se  
referant, eamq;  
fideliter indi-  
cant: qui vero  
sua familiaritas  
tantum ipsi  
sancti decider.

Celeritas pul-  
sum à quibus  
causis oriri pos-  
sit.

Pulsus mag-  
nitudo oriri  
ex quibus voca-  
buntur possit.

Facultas exi-  
stente valida,  
minimū pulsus  
sua perfectio ius-  
ta vel parus.

Pulsus differre  
in quatuor ali-  
facultas simul  
atq; vsus mutan-  
tur.

Caloris fit ad  
natura in  
mentis duri-  
tate, quae pul-  
sus diffinitus  
admittit.

Frigiditati mol-  
litas organo-  
rum si coniungatur,  
quae pulsum  
diffinitum pro-  
ducunt.

Pulsus omnis  
qui moderatus  
fuit, non conti-  
nuitur natura-  
li constanti.  
Pulsus diffi-  
nitus, pro va-  
rietate modis  
quibus facultas  
& instrumenta  
miseruntur.

Continuatio  
causarum va-  
rietatem pulsum  
diffinitum con-  
ducit.

Atque omnis  
reddi crebriores  
ob defectum qui  
accidit illis.

genere variant, ubi calori sit adiuncta duri-  
tas. Quum igitur uterque plurimum a natura de-  
clinat, pulsus erunt celerissimi, creberrimi: mi-  
ni autem nequaquam (nisi simul) facultas obla-  
ta fuerit: sed aliquatenus iusto minores. At si im-  
modicus calor sit, & instrumentum non magno  
pete durum, vel paululum a moderato variet,  
tantum abest ut iusto fiat distentio arteria-  
rum minor, ut etiam maior evadat. Erit autem  
celeris, vira causarum excellat: maxime tamen  
cum calor: quo tempore luculentior erit & bre-  
uior. Superest coniugatio ex mollitie & frigida-  
te. Quia vero magnus pulsus hic quovis est mol-  
litudinis affinis, & parvus frigiditatis, vira lon-  
gus a natura defleat qualitas, illi necesse est  
pulsus assuementur. Enim vero omnes natura-  
les pulsus inter excessus moderatos & medios  
annumerantur: non tamen quicquid sunt mode-  
rati, etiam naturales exsunt. At vero quot ex-  
cellentiam caloris affectus sequuntur pulsuum,  
tot etiam vici generandi animalis spiritus. Sic in-  
strumentorum durities facultatis imbecillitati  
coniuncta, parvos pulsus, & tardos, & crebros  
concit: robori, parvos & crebros, non etiam  
tardos, imò longe interim quam par sit, celeriores.  
Verum si instrumentum sit molle, facultas autē  
valida, maiores quidem manifesti pulsus sunt,  
at aliquanto tardiores, rarioreque. Quod si ad  
mollitudinem instrumentorum infirmitas adiun-  
cta sit facultatis, si quidē æquus utriusque, similis  
modus fuerit a natura flexus, moderati simul  
& naturales videbuntur si pulsus esse, nisi quod  
erunt mollitie varii. Sin valde immodicus sit,  
parvi, tardi, atque crebri fient. Si vero imbecillitas  
multo præponderet, tunc etiam eruit parvus, tardus,  
creberrimus. Si superior sit mollitudo, accedent pul-  
sus ad moderatos. Reitat iam ut omnes simul  
committamus differentias continentium causarum  
pulsuum: ex quibus octo coniugationes con-  
stantur. Dux, quum remissa facultate pariter &  
vici, modò mollis solito sit instrumentum, modò  
durius. Dux altera, ubi languescat facultas, &  
vici auctus sit, instrumentum vel molle, vel du-  
rum. Præterea alij dux, quando valida sit facultas,  
sed remissus vici, vna cum variante instrumen-  
torum differentia. Reliquæ dux, quum valens  
facultas sit, auctus vici, accedat instrumento-  
rum, quam diximus, differentia. Ac languida qui-  
dem facultate simul & remissio vici, omnino in  
parvitate & tarditate mutantur pulsus, in va-  
riis differentia instrumentorum. Ceterum non  
redduntur necessarii crebri vel rari. Sed si par-  
va facultas offensio sit, nec insignis instrumen-  
torum duritia, nihil crebritatis pulsus variant: si-  
quidem non pulsus modò, sed vniuersæ actio-  
nes crebriores ob defectum evadunt, qui earum  
accidit singula. Si defectus, vici æstimamus. Quæ  
ergo remissus luc fuerit, parvum læso facultatis,  
nisi per instrumentum viciam duritiem, nihil  
in actione desiderabitur. At si facultas sit ma-  
gnopere læsa, modicè vici remissus, instrumen-  
tum bene dura evaserit, non poterunt non pul-  
sus fieri, quum postulat vici, minores: itaque im-  
perfecta simul officium: ac quanto quidem im-  
perfectius, tanto etiam crebrius. Verum propt-

facultas plus vel minus, aut vici offensio est, et-  
iam pulsus ipsi necesse est plus vel minus ad par-  
vitate trahantur & tarditatem. Nec verò exis-  
tendum est, alterationem pulsuum quæ ex om-  
nibus simul causis moderate oblastris procedat,  
maiores oportere ea esse, quam facit vna. Pos-  
sunt siquidem, vel ob vnicam tantum causam ex-  
acte affectam, ad viciam devocare ipsi pulsus  
alterationem. Igitur facultas extreme defecta,  
minimos efficit pulsus, etiam si molles quod tunc  
instrumentorum sunt, vergeat autē necessitas. Ita-  
que ad pulsus extremos consuecudos, interdum  
plures cause desiderantur, interdum satis est vna.  
Maximus quippe pulsus nequaquam fieri potest  
ob facultatis robur summum, cura opem alia-  
rum: minimus autē nonnunquam ob imbecillita-  
tem sit solam. Quare ante omnia in pulsuum al-  
terationibus, attendenda quantitas est causarum  
offensionis. Vt autem ad tertiam & quartam coniu-  
gationem explicandas nos convertamus, ubi lan-  
guescat facultas, vergeat vici, duritij instrumen-  
tum sit, potissimum ad creberritatem, deinde ad par-  
vitate, postea ad tarditatem, pulsus videbitur verge-  
re: non necessario tamen, nec perpetuo, nec etiam  
in quolibet illorum, nec simul concurrunt om-  
nia. Etenim ubi læx insigniter sint omnes cau-  
sæ, minimi, creberrimi, & tardi ipsi pulsus sunt.  
At si offensio sit instrumentorum & facultatis  
parva, ac generationis eorum multus vici, hi non  
erunt iusto minores, nec tardiores: imò interdum  
manifeste celeriores: maiores autē si non aperte,  
pares certe perspicue moderatis. Si vero insignis  
ma facultas sit, & maior vici, vna cum molli-  
tudine instrumentorum (quod in quarta coniu-  
gatione contingit) si quidem permittit pulsus ho-  
non crescat, nec longè a natura abint facultas  
& instrumenta, multo magis increfcat pulsus in  
magnitudinem, quum in celeritate. Crebrior  
etiam iusto erit, sed non penitus ac ille tertij cõ-  
plexus, quod vici quum illa magis luc san-  
ficiat. Quod si paululum vici & facultas a natu-  
rali statu defleant, instrumenta verò multum ad  
mollitiem deficiant, ad mediocritatem pulsus ho-  
rum affectu accedat, tum quantitate distentio-  
nis, tum qualitate motus, præterea quietis tem-  
pore, tantumque vna occurrat mollitudinis situm  
naturalem excedat. Si verò non ita defleant  
multum vici & instrumenta, facultas autē vellemen-  
ter laborer, tales pulsus ad modum parvi erunt &  
crebri, modicè verò tardi. Si autē durum sit instru-  
mentum, facultas valida, & vici remissior (hoc eni-  
m erit quantum coniugationi) minores pulsus gi-  
gnentur, non tamen necessarii tardiores, si vici  
nec crebriores. Verum si admodum remissus sit  
vici, & instrumenta modicè dura, non minores  
modò, verum & perspicue tardiores atque rario-  
res fient. Si vitium vici, a vno instrumentorum  
vincatur, ab vno de fuit in pulsus parvus, & cre-  
ber. Si vero instrumenta sint mollia (quemad-  
modum per sextam coniugationem) nequaquam mi-  
nor quum naturalis, quod quidem cõspici pos-  
sit, pulsus ipse videbitur, nisi singulariter vici sit  
immixtus: & omnino hoc rarior apparebit, quod  
dissolutor sit vici. Porro si vici aucto faculta-  
tis valente, mollia sint instrumenta (hanc enim  
constituo

Facultas extre-  
mi duri-  
tate, quæ pul-  
sus diffinitus  
admittit.

constituo coniugationē septimam) prorsus magni erunt pulsus & celeres: crebri verò non semper, sed vbi modici ipse visus incrementum. At si astentiarum duræ sint tunice (quæ octaua & vltima est coniugatio) si parua quidem durities sit, sed visus insignis mutatio, maiores, celeriores, crebrioresq; quam iustum sit, ipsi pulsus evadent. Sin autē æquo vtræq; causâ, nec illo admodum longo intervallo, si natura desierit, pares quidem naturalibus, sed celeriores atq; crebriores fient. <sup>10</sup> Iam si insignis læsio visus & instrumentorū sit, vt hæc planè duriora sint reddita, ille vrgeat impensè, celeriores etiamnum moderatis erunt, minoresq; & crebriores. Cū igitur à valida facultate vehemens discludi pulsus non possit, nec mollis à mollibus instrumentis: si quando pulsus deprehenderit celerem (qualem diximus familiarē esse robori facultatis, visuiq; vigenti, & molitudini instrumentorum) si quidem cum neutro illorum celeritas sit coniuncta, intelligas <sup>20</sup> eum pulsus oriri à solo vsu vrgete: si verò cum altero, omnino ex illo orietur, quod signum tale producet, necessariūque etiam ex incremento visus. Non possunt siquidem celeres pulsus existere, sicut nec magni, nisi visus possit. At quatenus ad robur, vel imbecillitatem facultatis trāsit, ex propriis eius pulsibus diagnosci licet. Eadem est ratio & in qualitate instrumentorum non secunda. Quamvis autem pulsuum generationis sit visus; colligendum est ex commutatione magnitudinis, crebritatis atque celeritatis. Si enim pulsus maximus sit, crederimusq; & celerissimum, summè vrget visus. Sin magnus tantum, & paulo celerior sit, non tamen maximus, nec creber, visus nō erit magna immutatio. Ex alius enā signis, citra pulsus, ipse visus cognoscitur. Nam siue copiosus sit calor, siue exhauriatur animalis spiritus, id haud magno negotio exploratur: quod videlicet calor quidem tactum nō fugiat, ac præterea spirandi difficultate, siti, atq; interno <sup>30</sup> la borantis sensu prodatur: animalis autem spiritus absumatur in iis qui exerceantur immodicè, ac per halitum digeruntur: & quibus humores fluunt ad interna.

### GALENI PERGAMENTI de causis pulsuum, lib. II.

**I**næqualium pulsuum quidam in arteriæ vno motu labefaciunt æqualitatem, alij illam everunt in pluribus: quam medici collectivam <sup>40</sup> inæqualitatem appellant. De cuius sanè causis primo loco considerabimus. Comitantur enim eiusdemodi pulsus inæqualem cordis temperiè, visuiq; instrumentorū & facultatis. Nam aut obstruccionibus, aut compressionibus, aut duritiæ, aut plenitudini superveniunt, sic vt intelligas plenitudinem quæ estimatur ad vires, seu faciliatatem. Cū igitur tres causæ sint continentes pulsus generationis, instrumentorum, facultas <sup>50</sup> & visus: non potest ex visus alteratione constitui collectivâ, quæ aperta sit, inæqualitas: quod nec repentè, nec cumulatè adeo vniquam immutari visus possit, vt pulsus (verbi gratia) prior sit magnus, vel celer, vel crebro: alter tardus, vel parvus, vel rarus. Cæterum non quos ratio collig-

git esse impares, vocare inæquales solemus: sed quos dalcuèdè compemimus sensu tales existerè. Porro iracundia (quæ videtur innati caloris esse veluti quidam seruator) habet sanè interdum & ipsa inæquales pulsus. nō illos quidem sua sponte (semper enim habere tales) sed vbi adiunctus ad eam aliquis timor fuerit. Iurè ergo tunc inæquales apparent, cū nō tantum à diversis alterentur causis, sed etiam natura cōtrariis. Nam propter vindictæ cupiditatē, alij, magni, celeres, vehementes: quia verò timor est maior accipien- <sup>60</sup> di mali, quàm spes inferendi, parvi, humiles, languidi, & tardi sunt. Quare invicem vtrique pro causæ propolentis natura, videtur variari: ac excellit modò quidem ira, modò metus. Quinam ipse timor vehemens existens, inæquales efficit pulsus, idq; nō vsu, sed facultate obnoxia, nec imperante omnibus instrumentis. Non tamen omni facultatis læsioni succedit collectivâ inæqualitas. Siquidem cū per se infirma est, gignit pulsus nō ira crebro inæquales. Vbi verò iussuè natura est valida, opprimitur aut à copia humorū, aut etiam cōtumacia instrumenta sortitur, tunc illâ inæqualitatē efficit. Cū itaq; delapsa in imbecillitatē insignē facultas arteriæ fuerit, pulsus <sup>70</sup> gignitur languidi, parvi, tardiq;. Sin illa, quantum ea est, valeat, sed aliqua copia opprimatur, variōs ita & inæquales efficit pulsus: plurimos qdè languidos, tardos & parvos, cū videlicet graviores est pressa: plurimos autē vehementes, celeres atq; tardos, vbi leuiori. Quod si nec admodum grauis, nec nimis levis offensio sit, cōtrarij ex æquo, parēq; numero ipsi pulsus conspirant.

At instrumentorū vitia, in hunc modum gignunt inæqualitatē. Vbi enim circūflectas regionis arteriæ, quæ ad hoc destinatæ sunt, vt illam distentam excipiant, aliud corpus incidendi, non possunt per illud resistere arteriæ distendi suæ. Itaq; singulari actionū defectus, tandem confertim vni magnū opus absoluit, quod alioqui visus nō expleatur. Quo tempore volenter & vehementer agere ipsa facultas cogitur, vt explodatur omnino illa, quæ sua instrumētā obfederūt, & prohibuerūt mori. Ac sic sanè maior prioribus, & vehementiorē, & celeriorē, necesse est pulsus evadere, qui enā crebrior vel ab ipso principio fuerat: quādoquidem impariū visui actionum, necessariò comes est crebritas. Siquidem <sup>80</sup> pariter imperū facultas in omnibus quæ cōsequuntur distributionē, retinetur, æquè magni semper fierēt, & vehemētē, & celeres pulsus: quia verò non retinet, sed refert se ad priuū motū, ne incassū defatigetur, varia prorsus & cōiuncta inæqualitas. Accidit enā interrim inæqualitas ob sanguinis copiam, aut in venas, aut in arterias ipsas infusam. Ea tamen facillimè sanguinis detractio sedatur. Siquidem sanguinis copia in venis, vicinas arterias nō secus ac timor præter naturā cōstringit & premit, si per vniū vacuum sectiōnem, subito arteriis amplius exhibet locū. Quod verò sanguis in ipsas arterias infundens, præcipue si crassus vel lenius sit, viam intercipiat spirituum, variāq; & difficillimas edat inæqualitates, nemo est qui nesciat. Vbi igitur aut valdè comprimentur, aut obstruuntur arteriæ, vel si integra sit

iracundia est  
veluti innati  
caloris seruator.  
Iracundia, dum  
est timor ad  
conflus, pulsus  
inæqualis effi-  
cit.

Timorem esse  
officiū iracundie  
cōtrarium.

Timor vehemētis  
quæ ratione  
pulsus inæquali-  
ter efficit.

Facultas arteriæ  
extrema imbecilla,  
vel aliqua mole humorū  
tam opprimitur,  
quā pulsus edat.

Instrumentorum  
vitia quorundam  
inæqualiter pulsus  
efficiunt.

Pulsus nec celer  
nec pressus esse,  
nec magnus, nec  
si visus pulsus.

Calor quidam  
signa deprehendit.

Animalis spiritus  
ex quo, spiritus  
absumitur.

Pulsus inæqualis  
est quibus  
causis præfatus  
fuerat.

Pulsus generat  
motu causâ cō-  
tinentem sunt  
tri, instrumentum  
vni, facultas et  
visus.

Pulsus inæqualis  
latens acciden-  
ter dicitur ob  
longuam copiam  
in venis aut in  
arteriis infusam.



facultas, inæqualitas corripit pulsus. Quod si vna cum instrumentorū affectu, facultas etiā perpessā fuerit, clarissimū est magis variam inæqualitatē existere. Verū si instrumentorū illius status sit, sed magnopere facultas infirma, decurtata inæqualitas fiet. Ab admones enim dignis viciā facultas, minores semper imbecillioresq; pulsus creat.

*Facultatis obli-  
sone diversis  
varias pulsus  
inæqualitates  
producat.*

*Decurtatorum  
pulsuum digri-  
men.*

*Pulsus abolitio  
a deficiente pul-  
su quomodo dif-  
ferat.*

*Pulsus decurta-  
toris proci.  
Pulsus intermit-  
tentis.*

*Pulsus interci-  
dentes.*

*Decurtatoris ex-  
cretionem qui  
pulsu inducit.  
Intermittens  
pulsus a quibus  
causis oritur pos-  
sit.*

*Inæqualitatem  
in vno pulsu  
causa.*

Ceterū ipsarū facultatū imbecillita-  
tum, quæ quidem prima & exigua existit, minores languidioresq; nō autem decurtatos pulsus efficit. Quæ verū est hæc tantū maior, vt iam facultati hinc onem applicati digiti, hæc pulsū decurtatorū est causa. Quorū h quidem, qui ad primum reuertitur motū, recipio digi vocantur, minorem imbecillitatē ostendunt: qui verō alicubi resistunt, maiore. Quemadmodū si perfectē pulsus deficeret, extremam imbecillitatem nuntiaret. Verū hæc omnia exploranda esse applicatis arteriæ digitis, non suspensū, a pessimisū est. Differt autem abolitio pulsus, ab eo deficiente: quod illa quidem veluti priuatio sit totius functionis: hic, dimidiat tantū amissio. Qui sanē deficiens pulsus quantū decurtatus est grauior, tantū leuior existit ipsa pulsus abolitio. Atque hi quidē tres status qualitate noxæ differūt. Quartus est reciprocōrū decurtatorū: nempe omnium leuissimus. Quinque huius additū intermittentū, qui præcedit deficientium statum. Quod enim in vno aut altero erat, aut certē in numero pulsuum certo, id status deficientium in omnibus efficit. Porro interci dentes pulsus, contraria ratione ac intermittentes, noscuntur: qui quidem etiam inter æquales, qui a certum sunt, consistunt: incidūtq; vbi valens facultas copia humorum, vel instrumentorum obstructio impeditur. Vt ergo ad repellenda quæ molestant, maiores sæpe & vehemensiores addit, celerioresq; pulsus: ita plures quoque in eiusmodi præteritū statibus, atq; alti pulsus sunt: itaq; decurtatoriam excretionem portendunt. Nec verō tantum facultatis infirmitas inducit intermittentem pulsus, sed instrumentorū etiam valida obstructio, compressio & constructio, vbi in sensibilibus arteriæ allicere valeat. Nunc verō de causis inæqualitatis in vno pulsu est agendum. Solent igitur celeriter quidem primū concitata arteria, deinde parua interposita quiete, motu quodam tardo reliquā distentionem absolvere, dum & visus vrget, & facultas, quantum in ea est, obsecundat: interrompitur tamen ab instrumentorū vno, aut ab humorum insigni abvndantia. Etenim facultatis robur, prioris motus celeritas indicat: sicuti vrgetem visum, motus qui sequitur quietē. Quippe nisi visus vrgeret, nunquā inceptum motū huiusmodi absolveret: sed vbi inhibitas primū eius motus esset, ubi defineret distentionem, vnumq; huiusmodi parū pulsus. Est & alia discretio distentionis per mediā quietem distincta, in qua motus vtrinque est celer. Videriq; tunc facultas propriam contentionem tueri, copiamq; humorū reluctari: quare discretio hæc omnī est saluberrima. Est præterea quidam alius status medius inter vtrumq; vbi motus secundus medius est inter tardum & celerē, hoc est, moderatus. Hæc sunt tres differentie di-

stentionum quiete interpellatarum. Sunt præter hæc & tres alie, vbi tardo priore motu, alter vtriam variat: vt aut tardus, aut celer, aut moderatus fiat. Ex quibus pessimus est, qui pulsus vtrinque motū tardum habet. Ac longē hoc com-  
modior, in quo celer alter: medius inter vtrūq; vbi sit moderatus. Haud aliter cū a primo motu moderato, alter tribus modis conuertitur, cō-  
modio tem significabit statum celer motus: per-  
niciofiorē tardus: medium moderatus. Quint-  
etiam tempus quietis, quod fuerit in singulis ha-  
rum differentiarum longius, hoc est deterius. E-  
diuerso, diuturnius motuum tempus meliorem  
declarat statū. Præterea vtriusq; distentionis ma-  
gnitudo, optima: contra pessima est paruitas. Si-  
militer vehementia optima, remissio pessima.  
Quod si omnia quæ cōmemorauimus mala, in  
vno pulsu cōueniant, hic illorum pessimus erit:  
contrā, si omnia cōmoda, optimus. Transien-  
do autem ad eos pulsus, qui totius distentionis  
habent quidem perpetuum motum, non vniuer-  
sum tamen pari celeritate, certe qui iam inde ab  
initio in celeritatem insurgunt, minus onerari  
facilitatem annunciant: qui contrā, magis. Cete-  
rim facultate oppressa, nullus horum existit. Est  
autē propriū us qui in contraria affaitione mutan-  
tur, non solum grauiam facultatē, sed etiā obstrui  
& premi instrumenta. At in cōtraria affaitione mu-  
tari intelligo, si cum moueantur celeriter, subito  
fiant tardi: aut si ex tardo primo motu euan-  
descentes. Oriuntur enim hi, cum ex obstructio-  
bus & compressionibus, tum ob facultatem lu-  
morum collisionem onerantur. At verō vibratus  
pulsus sit, facultate existente valida, instrumento  
toto duro, visus vrgete. Quorū si absit quicquid,  
minimē vibratus existit. Ceterū violenta duræ  
arteriæ distensio, proximē illius generationē cō-  
stituit. Vrget autē visus, vbi functio ipsi nō satis-  
facit, idq; aut ob propriā imbecillitatē, aut cōtra-  
māciam instrumentorū, vt etiam maiorē visum.  
Cum igitur in proposito pulsū genere facultas  
requiratur vegeta: relinquatur vt vel visus incre-  
te, vel redvndantibus instrumentis, vel vtriusq; lun-  
ctus, distensio in vibratis pulsibus ipsi visui sit im-  
pat. At visus; abvndantia caloris augeatur, vel ex-  
haustio animalis spiritus. Contramāciam instrumen-  
ta sunt, ob obstructiones, compressiones, atq; du-  
ritiem. Quæ sanē durities inflammati, scurtho asse-  
ctis, resiccatis, perfrigeratis; ac deniq; distensio  
accidit instrumentis. Itaq; iam omnes inuenimus  
causas originis vibratorū. Nam intemperata in-  
æqualitas, si pgradiatur, vibrationē quidē auge-  
bit, nō tamen causa est eorū generationis. Dicto-  
rus autē pulsus (qui fieri nō potest, quin sit vibra-  
tus) in hoc gignitur modū. Vbi parte illa arteriæ,  
quæ tangimus, duriores sint frigidioresq; atque  
ita difficilis moueatur partes vtrinque fixæ, quas  
nō attingimus: ac deinde partē mediā distensio-  
ne sua cōciderint, retraxerintq; intro, ac secum  
rursus extulerint, si necesse est ipse tactus sei-  
niatur. Atq; huiusmodi pulsus est dicorū tan-  
tum, nō autē vibratorū perspicuus. Alter verō qui  
iuxta & satis vibratus est & dicorū, sit ad hunc  
modū. Vbi enim arteriæ sublate cum vibratione  
pars illa quæ sola cure est interclā, ractetur faciliē,  
alio

*Distentionum  
pulsus quomodo  
interpellatur  
tres differentie.*

*Pulsus in  
contraria affaitione  
mutantur,  
quod propriū.*

*Vibratus pul-  
sus vnde fit.*

*Visus pulsuum  
quidē vrget.*

*Visus pulsuum  
ab vndantia cal-  
oris augeatur,  
vel exhaustio  
animalis spiritus,  
instrumenta cō-  
tra māciam quomodo  
fiant.*

*Dictorū pulsus  
quomodo generatur.*

*Dictorū tantū  
pulsus qui dicitur,  
Dicorū vibra-  
tus vnde.*

aliæ autē partes vtrinq; sint, crassitudine numeroq; onerētur corporū incubentibus, adeo vt ne motus quidē eorū occurrat rangentibus: necessē est, parte hac, quæ est aperta, omni sū sub-lata, reliquis non manifestis, quæ vtrinq; sunt, adhuc attolli: et ac proinde etiā media, quæ delata iandudū est, de integro vni cum illis quæ vtrinq; sunt, attolletur, ita vt redeat, occurratq; iterū foris ipsam rangentibus. Planū est igitur decursum pulsum, interim ex magna intemperie ortū tra-  
 10 hère, parūq; durie arterie: interim ex ingenti duritie, cōiuncta cum intemperie aliqua, vel crassi tudine, vel colluue humoris, vel carnis. Capri zanti verō pulsus hoc dū durior convenit, quod b; pulsar, causa autē nō cōuenit. Neq; enim cum in situm entorū duritie necesse illi est, nec cum in temperie, vt iungatur. Verū vbi facultas cōten nonē naturā retinet, arcetur autē a motu, vel ob humōrū colluuiem, vel obstruccionem, vel com pressione instrumentorū, quæ tū diltentionē intercipit. Cuius altera pars post quietē, iurē ro-  
 20 buibor est illa, quæ eam antecedit, quod ab impe ru collectæ facultatis oritur. Quod si etiam ille secundus impetus inferior: atq; imbecillior fue rit, erit sanē is caprizans deterior pulsus, non ta men dicitur caprizans. At vndolū & vermicu lantes pulsus, sola differunt quantitate, sub vno cōprehenſi genere. At sunt sanē inter eos nōnula, qui in durities partibus arteriæ, inæqualitatē, idq; in vna diltentione, sortitū. Sunt autē illorū generationis causæ, imbecillitas facultatis, vel co-  
 30 pia humorum, vel instrumentorū summa molli ties. Nam cum vis à principio in artenas per means, totum vas attolletur pari firmitudine ne queat, hic quæ propinquior est parti principi, motum primū auspicatur: sicuti quæ remotior, feruiat quod Erasistratus perpetuo fieri, cete rum falsū, arbitrat. Siquidem nemo igitur, et

Vndolū & vermiculantes pul sus sola differe nti quantita te.

Arteriarū par tes onerantur pro natura mo di si habent, autem mouen tur tempore.

Vermiculantes pul sus.

Duritie pul sus vnde pro ducunt.

languidiorēq; necessariō earum motus sient. Si autem verum sit illud, reperiri nōnunquam mi nores motus in partibus origini propinquiori bus, ad inæqualitatem intemperie arteriarum causa id genus pulsuum est referenda. Si quidem instrumentū à pari robore, eodēq; si humidita te & calore sit modico temperatū, facilius ac ma gis mouetur: squalidum autem, aut impenſe lu midum, aut frigidum, lentius movēq;. Annue ntes autem & circūuolantes pulsus, fieri aliquan do simili modo possunt: expe alius de causis ac cidere. Si enim valida sit facultas, corpora autē incumbētia artēnis marcescant, qua parte illo rum maxime marida, atque eo leuiore, emica re motus possint, ibi enim maxime illius magni tudo elucescit. Quod si huius partē dilata non ē alius vtrinq; minoribus comparēs, decuratum motum in vtrūq; partibus cernentū quod fieri in facultatibus validissimis nequit. At ve-  
 40 ro ex situ arteriæ sit inæqualitas pulsuum, vbi tē duntur in illas corporis partes, in quas dila torentur. Porro in inflammationē, febrili, absces sus, & crudorum quorūdam generatio tubercu lorū, ac breuiter omnes præter naturā tumores, vicinas partes ad sese trahere valent. Squallida præterea durities, frigēq; immodicum, nec non conuulsia intentio, ac breuiter intemperatura inæqualis, artēnas ipsas distorquet. Conuul sius autem pulsus ab ipsa specie, & affectu, quē denotare solet, recte nomē accepit. Tetidi enim ad vtrūque artēnam putuēns, statimq; homo eonulsione corripitur. Est enim confusio vna (vt rectē dixit Hippocrates) & conspiratio vna, & omnia consensum omnibus, estq; omniū na tura cōmunis. Nam nisi hoc esset, duo animalia esset, non vnum, quisq; nostrum. Cor igitur ce rebro artēnas, vinculum societatis, transmittit: cerebri nēros cordi, pari vicissitudine: qui quanquam non magis sint, mandatū tamē ra nonis perficere possunt. Singulis præterea arte rus fibræ à neruis deducēte ad societatem coha rent, per quas sit mutus quidam, non modō ac tionum, sed affectuum etiam consensus. Nihil itaq; mirum, si cum vniuersum neruofum genus coniunctum artēnis sit, cōmunis appareat affe ctus. Vt autem de alii, humilis, laxi, angustī, longi, & brevis pulsus etiam generatione dica mus, sciendum est, in valentibus omnibus & æ grotantū pleriq;, dum dilataitur artēnx, nos ea rum superficiem a supernam multū clarus petci pere, quā partes obliquas, & quod illa propius ad nostrū accedat tactum, & quod cum a paucio ribus interpositis corporis ferat. Proinde si re ctē expēdas, namralis pulsus est altior, q; deficiat semper eius in latū motus, præpollat autē in al tum. Verū quia in aliorū omniū nobis est mensu ra, & veluti regula quēdā, nec alitū ipsum, nec angu stū vocamus, sed moderatū, atq; inter omnes excelsus mediū. Et etiā lōgus & brevis ad hūc co latus dicitur. At verō dū moderatū est pulsū di-  
 50 cimus, nō sensum, sed naturā pporionē & me diocritatē, cōstitutum ē equalitatem nōrmā. Nā si p sensū iudicā facias, in illo pulsū lōgitudi pre stat pfunditatem: quē ad modū hec latitudini. Equi dem alios pulsus in pcedia & anst indicationē

Annuntiari pul sus, circumuolā tes, vnde gū gantur.

Conuulsio ex situ artēnis causā.

Conuulsio pul sus causā.

Confusio in totū corpore est vna.

Nerui totum principium non est vna, Arteriarū summa nō sunt fibræ à neruis deducēte.

Arteriarū summa nō sunt fibræ à neruis deducēte.

Pulsus naturalis est altior semper videtur.

Pulsus moderatus quod dicitur.

Pulsus altior, latior, vbi carnis est.

*Pulsus alii qui  
sunt decendi.*

fieri manifeste cōperio: latos autē vt plurimū in  
excretionibus decretoriis. Pulsus igitur modera-  
ti memores, si quidō offendamus ipsius motus  
admodū altitudinē autē, latitudinē autē aut ni-  
hil, aut parū, rectē vocabimus eos pulsus alios.  
Quod si latitudinē manifestū incrementū acce-  
dat, eos magnos simul & altos dicemus. Si am-  
bo increuerint, altitudo simul & latitudo, sed nō  
multū latitudinē altitudo superet, hos magnos  
appellamus duntaxat. Cū verō eadem propor-  
tione altitudo adaucta latitudinem vincat, qua  
etiam in naturali pulsu superaret, is pulsus ean-  
dem, quā moderatus, retinebit speciem. Itaq; nō  
altus, vt neq; ille, sed maior tantū alio videtur.  
Quintē eadem est & in lōgitudine ratio. Nam  
vbi eadem proportione augetur, qua profundi-  
tas & latitudo, vniuersum pulsū, vñ diximus  
modū, repræsentat maiore. Quare vt magnus sit  
pulsus, nō requiritur vt pares sint motus qui in  
dimensionib; trinis augentur, sed tantū vt pro-  
portione æquales existant. At consistit eorū pro-  
portio, vbi nulla præter naturā insignis in crassi-  
tudinē mutatio, aut in gracilitatē corporis fiat:  
præterea nec siccitas immodica, vel humiditas,  
vel maximē distentionis necessitas. Perit autem,  
aut perturbatur, cuiuspiā horū præsentia. Vt, si cē-  
tera omnia se rectē habeant, facultas autē cōpel-  
latur ita magnā facere distentionē, vt eius tumo-  
rem circūiecta arteriis loca nō capiant, in eo asse-  
ctū necessum est altus pulsus appareat. Dū enim  
in eā attollitur magnitudinē distentionis arteriæ, vt  
nūquā coarctetur, naturalē trum dimensionū  
proportionē turbatur. At coarctata, tantū detra-  
het de illa dimensionē quantū est progressu pro-  
hibita. Quo circa iratus, licet corpore sint optimē  
cōparato, sit pulsus altus. Distentionis enim sum-  
mum excessum, ne in quodē cōmodē ferat habi-  
tus, sed iam ex uno premitur, & ex obliquo arte-  
ria. Sola ergo pars illius ea, quæ inistrata sola cu-  
te est, nempe suprema, omni calorē excipit: qua-  
re necessariū sit altus pulsus. Ceterū multis gra-  
cili corpore, nec facultate admodum firmā, pul-  
sus, si irascitur, magni, & nō alti videtur esse. Nā  
cū in altis pulsibus tantū facultatis robur desi-  
deretur, vt maximā distentionē moliri possit, &  
quā loca arterias ambientia excipere nequeant:  
manifestū vtiq; est, in cūmemoratos affectus nō  
posse alios pulsus incidere. Iam verō vbi natura  
li robore facultas aliquatenus deficiatur, & lan-  
tudo sit insignis locorū, pondusq; accedat arte-  
riæ ex superioribus partibus, hic pulsus collatus  
ad moderatū, est lanior. Etenim aut altitudo im-  
minuit, aut latitudo aucta, potest latum pulsū  
efficere. Invenitur autē motus nonnūq; qui qua-  
tuor occurrat digitis, sed ita angustus & obicu-  
sus vt subilis scdin speciem referat: atq; is quidem  
pulsus lōgus vocatur. At talis quidē pulsus, qui  
videlicet hōiem aut pulum refert, nō solum tuni-  
carum maximā siccitatē ostendit, sed etiam indi-  
cat facultatē imbecilliorē, quā quæ possit con-  
tumaciter in instrumentū distēdere. Quis igitur si hæc  
vera sunt, \* non firmiter talis pulsus sit brevis tan-  
quod huiusmodi pulsus, in tenui corpore, cō-  
tētiq; & aliquotino dñiori cute accedat? Etenim  
si cutis remissa & crassa, magnā partem motus \*

*Pulsus magnus  
quandō quod  
requiritur.*

*Iratus si pulsus  
altus.*

*Pulsus latus  
quandō acci-  
dat.*

*Pulsus lōgus  
quandō quod  
significat.*

obscurat, vtiq; tenuis simul cōtētiq; totū ome-  
nino seruabit. Vnde liquet conspurare gracilitatē  
totius corporis oportere, & dūrinem cutis simul  
& in instrumentorū, cum facultatis imbecillitate,  
nō summa tamē, ad talem pulsū gignendū. Ac  
vocatū quidem per excellentiam lōgus: pro-  
priē autē tenuis & gracilis. Nam propriē & abso-  
lutē dicitur lōgus, cuius neutrum aliquarū dīc-  
tensionū percipimus. At verō brevis sit pulsus,  
vbi in parua quapiam particula, arteria sola cute  
contegitur, ob idq; sensibilibiter pulsus: partes au-  
tem ex vtroq; illius latere omnes in profundum  
merguntur, vnde prodere motū nequeunt sensi-  
bilem. Dicitur etiam per excellentiam hic pulsus  
brevis. Propriū tamen eius nomen est, crassus &  
turgidus. Nam qui simpliciter brevis est, vel ex  
compulsiua nascitur, vel ex paruitate. Proximū  
est vt dñ ordinatus & inordinatus agamus. Qui  
quidem quandoquidem inæquales omnes sunt:  
sed in eo variant, quod æqualitatē hū certis orbi-  
bus seruent, illi cōfusi vnde quaq; sint: intelligē-  
dum est, causam, quæcumq; inæqualitatē efficit,  
semper firmam in ordinatus & hanc esse: in inor-  
dinatis autem, nequaq;. Insuper ordo, vt æquali-  
tas, naturæ, si quid aliud, est similis. Quare si  
alterum eorum fit cōturbatum, minorem signifi-  
cat offensionē: sin vtrūq; maiorem. Concur-  
runt autem ambo in inordinatus: alterum in or-  
dinatus qui sunt inæquales. Quod verō ad mu-  
tationum rhythmorū causas pertinet, si rectē qui-  
dem est demonstratū, alibi per arteriarum dila-  
tationes æream quandam substantiam: in con-  
tractionibus autem excrementa externi, & quasi  
fulsione ad vñorum humorum: certē necessum  
est, cū distentionis vñus inder, maiorem fieri,  
celtiorēq; distentionem: cū contractionis,  
contractionem. Quamobrem, quibus in statu-  
bus plurimū infunduntur humores, ac prouide  
plurimum excrementū colligitur (semper enim  
quantitati confectorū succorum, excrementorū  
respondet quantitas) quæ sunt vñq; ad iuuentu-  
tem in us nouissimū cedat contractiōni distentionis.  
In quibus autem paucissimi (quod contingit in  
senibus) longē maius est distentionis tempus tē-  
pore contractionis.

### GALENI PERGAMENI de causis pulsuum, lib. III.

Quandoquidē pulsuum alterationes, quæ  
ex primis & præcipuis causis pñfiseuntur,  
abvnde \* sermo antē habebit enarratū,  
illas nunc explicabimus: quæ ab aliis omnibus  
sunt, quæq; non per se planē, sed quod manent  
primas, causæ pulsū vocantur. Ceterū quia hæc  
partim præter naturā sunt, partim naturales, par-  
tim etiam inter has medix, quas nō naturales ap-  
pellant: raroni videtur consensū, vt à naturali-  
bus exordiamur, idē eundem sequētes ordinē,  
quē in libro rythmibus descripto obseruauimus.

Viri igitur \* in vniuersum, mulieribus habent  
pulsū longē & maiorem, & vehementiorē, pau-  
lō tamen tardiorē, si citi & satis rariorem. Si-  
quidem eū mas fit calidior & siccior forma,  
necessum est vñum generationis pulsū, & in in-  
strumentorum \* constitutionē, differre in illis: ac  
proin-

*Pulsus lōgus  
quis propriē  
dicitur.*

*Pulsus simplex  
per brevis quo  
fit.*

*Pulsus ordina-  
tus inordinatusq;  
causa.*

*Ordo æquali-  
tatis: natura se  
mutat acci-  
dat.*

*Hyphorism  
mutatōne cau-  
sa.*

*Arteria dilata-  
ta trahit ex  
tē, contracta  
expellit pul-  
sionem.*

*Excrementū  
quātitas respē-  
det quātitati  
confectorū  
succorum.*

*Causarum dis-  
tinctionis  
simples.*

*Viri in vniuersum  
habent pulsū  
longē & maiorem  
& vehementiorem.*

promde ipsos pulsus. Atqui copiosi caloris magnū pulsū esse familiarem ostendimus. Igitur cum mas sit nō calidior modō, sed multo calidior femina, virgī maiores, ac multo maiores quā illa pulsus habebit. Siquidem pro naturali temperamento, maior tantū, non multo maior erit ipsius viri pulsus: si autē accesserit à peculiaribus viri institutis virgī differentia (illa enim in ocio vivit, licet in multis laborib.) vt sanē multo ita calidior vir reddatur, sic pulsus est q̄ femina longē maioribus. Addidimus autē sermōni particulam illam, *in uisum*, vt studiosius vice sumuli esse, ad tonus re pericrutandū naturam. Sic enim statim de naturali differētia viri & mulieris meditabūtur, reperitq̄ vniuersum genus in omnibus animalibus, masculinum valentius fœmineo esse. Ceterū secundum alias differentias præter naturam (vt videlicet si hominem frigido præditū temperamento, molliterq̄ educatum, cum biliosa viragine cōferas) certē in muliere ipsa reperies quā in viro pulsū longē maiorem. Naturalis itaque differentia, vt maris quidem ad fœcunditatem, maiores tantū, atq̄ vehementiores: vt viri autē ad mulierē, multo maiores ac vehementiores pulsus producit: quod nūquam viris naturale robur laboribus crescat. Quinetiam & facultatis robur, quod maribus adeit, & ipsum aliquando conferet ad magnitudinem pulsū. Quippe valdis facultatibus magni pulsus peculiari exsunt. Taceo totū corpus virile, ad perspiratū esse optimē comparatū, purū, excrementisq̄ vacuū, neq̄ compressū; fœminis autem cōtrario modo dispositū. Quare vt illorum habitus ad magnitudinem, sic harum ad paruitatem pulsus videtur aptus. Nam et si ipsi adsit instrumentorum mollities, quæ ad pulsus magnitudinem facit, plures tamen fortiores quā alie, sunt paruitatis causæ: nec plurimum viri à mulieribus differunt mollitudine. Quod si multo mulieris instrumentum sit mollus, cum facilius sic fit cessurū humoribus infestantibus, id ipsum erit etiam in causā, vt minores in eis pulsus fiant. Est autem mulieris pulsus celerior quidem pulsū virorum, non tamen excessu insigni. Si quidem cum eorū pulsus sit multo minor, quā vt possit vsū explere, augeat quantum potest celeritatem: cui etiam ob causam accedit crebrietas. At verō infans masculinus maiorem tantū, vehementiorem, rariorem, non item multo, pulsū habet, quā infans femella. Qui natura calidi sunt, multo habent maiorem, celeritorem, atque crebriorem pulsū: non autem multo vehementiorem. Ceterum imprementarum calidos (vt mors est) dicimus, qui humiditate, siccitateque temperati cum sunt, caliditate exsuperant. Hi igitur quō calidiores sunt temperati, eo maiores habent, celeriores, atq̄ crebriores pulsus. Cur autem non multo vehementiores, id quidem iam exposuimus prius, de ipsiq̄ nonnihil postea dicetur. Graciliores cura viliū affectū alium, maiore, rarioremq̄ multo, vehementiorem paulo pulsū fortuntur. Nam cum gracilitas ipsa, regiones artierum magis dilatat, leuiorāq̄ incumbētia corpora reddat, pulsibus magnitudinem hand con-

temnendam conciliat. Atqui, vbi pari relicto vā, crescit magnitudo, rariore tūc necesse est pulsus fiant, idē tantō, quāto scilicet sunt maiores. Maiores verō erit multo, proinde rariore etiam multo erunt. At vehementiores esse apparebūt, nō quod viliū acquisierint robur, sed quod magis prodant quā habebant tensionem. Pro ætate hoc pascio pulsus variatur. Infātis pulsus creberrimus est, rarissimus senis: omnes qui inter hos intercedunt, proportionē seruant, prout vel ad puerū, vel ad senem accedūt propius. Celerissimus item pueri pulsus, tardior senis exiit. Reliquarū ætatum pulsus ambigūt inter hos. At senex à puero, longē magis raritate, quā celeritate distat. In velenētia & magnitudinis differentia, maximus est, vt in ætatibus, pulsus iuuenū, minimus senum, mediū & paulo maior pulsus puerorū. Iam vehementissimus iuuenū, languidissimus senū, mediū inter hos, puerorū est pulsus. Etenim cum calore nō paucō pueri præditi sint, substantiā quoq̄ que refringeret illū, nō paucam postulant. Quinetiā substantiā animalis spiritus in illis nō tantū nutrire oportet, vt in adultis, sed etiam vā cum in dūmētis augeri. Itaq̄ his nominibus pueri magnus dilarationibus egent. Quia verō etiam humores exhausti plurimos (videlicet nutrimenti & incrementi ratione) ob idq̄ fuliginosorū excrementorū aceruū pro totū corpore habitū contrahant, virgī deliderant etiam artierarū maximas cōtractiones. Maximū ergo, similēq̄ celeritū pueri vtriusq̄ morū requirunt: sicq̄ infra vsū est suocō in iis. Nam licet quāximē celeres sint, & magni, vñ tamen non expleant: quare hūc crebris opus est motibus. In senibus autē planē contrā habet, calor paucus, cui par est generatio fuliginosorū excrementorū, spiritusq̄ animalis nutritio. Iure itaq̄ habent contrarios illis pulsus, paruos, tardos & raros. Sunt ergo pulsus puerorū magni, si cum magnitudine eos artierarū cōbras: paru autē, si quantitatē tantū distentionis spectes, eimq̄ ad pulsus iuuenū cōbras. Sed tamen nō maximos pulsus fortituntur pueri, ne si ad magnitudinem quidem eos artierarū perpendas. Si quidē q̄ nec facultas eorum perveniat ad summū robur, & coarctentur in eis molles artierarū tunice, multū de maxima distentione detrallatur, tamen si pulsus eorū mediū superet. Porro mollitudines instrumentorū, quæ remore à coarctatione sunt, ad pulsū magnitudinem conferūt: quæ verō premittit atq̄ grauat, ad paruitatē: præcipue si facultas destituitur robore. Cum autē vtriusq̄ motus plurimus infans vñ sit, minimis sensibus, & omne interpositū tempus ætati vtriusq̄ vsū remittit, magis autē cōtractionis: rationi consoni est, vt quantū à pueris recedant ad senes, tantō semper vtriusq̄ motū habeant tardiorē: magis autē cōtractionis. Ergo ex his nascūtur differentē rhythmorū pro ætatibus. Est autē vehementissimus iuuenū pulsus, & languidissimus senū. quoniam illis quidē facultas validissima est, his debilissima. In aliis etiam ætatibus, pro robore illarū vel imbecillitate, pulsus remissione & velenētia differunt. At verō pro anni temporibus, mediū quidē Vire pulsus maximi & velenētiissimi sunt, vt in tē-

Max est calidior & facilius femina.

Viris naturale robur laboribus crescit.

Facultatibus valdis magni pulsus peculiari exsunt.

Mollitudo instrumentorum, ad pulsus magnitudinem facit.

Mulierum pulsus est quāvis vñ minor celerior.

Calidiores nature pulsus.

Biliosum fœmineo ætate de firmius.

Senes pulsus est maximus.

Puerorum pulsus celerissimus, magnus, & creberrimus.

Senum pulsus paruus, tardus, & rarus.

Mollitudo instrumentorum, quæ de pulsus magnitudinem conferunt, & quæ grauat, quando sunt.

Graciliores pulsi sunt quales.

Autumnus quā  
lesit pulsus.

poribus: celeritate verō & crebritate commode-  
rati. Pari modo medio autumno. \* Progre-  
diens autem Ver, nōnihil de magnitudine & vehemē-  
tia detrahit, sed augeat celeritatem & crebritatē,  
ita vt ineunte estate iam languidi, parui, celeres,  
crebriq; fiant. Autumni progressus cuncta im-  
minuit, magnitudinem, vehementiam, celerita-  
tem, & crebritatem. Sic ineunte hyeme, in paru-  
tatem convertitur, remissionem, tarditatem,  
& raritatem. Respondet autem initium veris, ex  
tremis autumnis illius finis, initio huius. Aesta-  
tis item principii, suo, & principii hyemis, suo  
fini. Proinde quæ pari spacio a media estate &  
media hyeme in vtranque deflexerunt partem,  
similiter variant. Porro media estas, partim con-  
venit cum media hyeme, partim dissidet. Nam  
parui vtrobique & languidi sunt: sed celeres: cre-  
briq; estate: tardi, tamen hyeme. Non perinde ta-  
men parui estate ac hyeme: sed estate minus.

Pulsus differen-  
tia secundum  
tempora refer-  
tur ad vsum,  
facultatem, &  
instrumenta.  
Ver medium  
esse temperatū  
fieri, quo tem-  
pere habent  
optimi corpo-  
ra. Pulsus peculia-  
res optima con-  
stitutionis cor-  
porum, quales.

Nec ita hyeme languidi, vt estate. Quæ igitur se-  
cundum tempora accidunt, ad has referuntur  
tres causas: ad vsum, facultatem, & instrumenta.  
Nam pro vt in ipsis horum singula variant,  
mutantur pulsus. Ac medio quidem Vere, aëris  
status nos amplectentis, temperatissimus est:  
itaq; corpora etiam sunt sana. Siquidem eo præ-  
cipue tempore, facultas est robustissima, & mo-  
deratissimus calor, necnon instrumenta ipsa li-  
bera ab omni excessu. Vnde & pulsus corpori-  
bus quidem optimè comparatis, maximi & ve-  
hementissimi fiunt. Nam hi peculiares sunt vali-  
dæ facultati, & moderato vsui, instrumentisq;  
naturalis lege constitutis. Si verò vsus nonnihil  
modicioritatem excedat, non modò magni & ve-  
hementis, sed etiam celeris fient. Quod si ne sic  
quidem functio expleat vsuum, mutatio transi-  
bit in crebritatem. Aestate porro crescit vsus, sed  
languescit facultas. Quamobrem aliquid tenus  
decrevit illa vehementia simul & magnitudo:  
sed tamen hæc minus. Nam quia vrget vsus,  
augetur nonnihil: vnde etiam celeritati & cre-  
britati accedit momentum non contemnendū.

Hyeme augen-  
tur facultas,  
sed pulsus vsum  
moderat.

Hyeme contrā, quā in estate, est validior facul-  
tas, non æquè tamen ac Vere: sed vsus remittit-  
ur generationis pulsuum. Quare languidiores  
pulsus hyeme quā in Vere sunt, & vehemen-  
tiores quā in estate: ceterum satis sunt parui,  
quod & facultas infra summum se robur, & vsus  
remissus admodum: quæ ipsa in causa rem-  
issionis est, cur tardi, rariq; existant. Iam verò vbi

Crescentia plu-  
rimū habet  
calidi seasonis.

Hippocrates dixit, Quæ augentur, plurimū ha-  
bent calidi: non simpliciter calidi dixit, sed inna-  
ti addidit, vt qui alterum se ferre, calidum acqui-  
situm esse, cuius magna copia iuuenibus suppe-  
rit. Est enim temperatus calor natiuus, acquisi-  
tus autem in temperatus, & quasi igneus. Simili-  
ter quando inquit, Ventres hyeme & Vere natu-  
ra calidissimi sunt: de calore natiuo intelligit.

Calor innatus  
est temperatus,  
vt acquisi-  
tus intem-  
peratus.

Quæ quidem cum obtineant astate paucissimā,  
adventitio calore abundat: vnde marcescit po-  
tius, quā nutritur, corpus. Ad hæc, is adventi-  
tius calor tantū abest vt functiones meliores red-  
dat, vt eas etiā longè inferiores efficiat illis, quæ  
a moderato proficiuntur. Pro regionibus  
etiam, perinde vt pro natura temporū, In vele-

menter calidis, sicuti media estate in magnope-  
re frigidis, vt media hyeme in temperatis, ita vt  
medio Vere. Ad hæc proportionē, quæ mediū  
locum sortiuntur. Similiter alij status aëris nos  
circumdantis, calidi quidem, temporibus calidis,  
frigidi frigidis, mediū medio Vere respondent.

Prægnantius pulsus, maiores, crebriores & ce-  
leriores sunt: \* cetera verò tuerentur In eis liqui-  
dem, præter vsum, priorum mutatum est nihil.  
In crescit autem is, & augetur, quod mulier non  
sibi iam soli respicit ac pulset, sed fetui etiam co-  
gatur: quare celeriores, maiores, & crebriores  
sunt pulsus. Somni etiam, si quid aliud, inter  
naturalia censetur, qui & ipsi variant pulsus:  
initio siquidem minores, languidiores, tardio-  
res, rarioreq; illos efficiunt: \* procedentes, tar-  
ditatem pedetentim augent, & raritatem, præ-  
sertim à cibo: tunc tamen sunt maiores, vehe-  
mentioreq; pulsus: tandemq; si diuturni si fue-  
rint, ad remissionem & paruitatem redeunt,  
tarditatem & raritatem seruantes. Etenim fa-  
cultas concoctrix per somnum se intro recipit  
magis. Cum ergo intro moueatur, conficiatq;  
materiam, primò quidem veluti imbecillior res  
ditur, oneratur: paulò autem post, dum ali-  
mento fruitur, quod conficit, confirmatur ipsa,  
calorq; animantis augetur. Quia igitur oneratur  
facultas initio somni, atque debilitatur, o-  
portet minores pulsus & languidiores existere:  
at mox ea confirmata, è diuerso maiores, vehe-  
mentioreq;. Cur autem concoctiones per som-  
num exactius fiant non in ventriculo modò,  
sed in arteriis & venis, non est huius loci expli-  
care. At verò quibocquidem dormientibus motus  
caloris qui fortas tendit, est imminutus: vi-  
get autem, qui intro: contractionem quidem  
oportet celeriore fieri, distensionem vero tar-  
diorē: ac proinde totus ille pulsus non est ab-  
solutè tardus, potius quā in veloci, sed tantū alte-  
ra parte tardus. Nam si motus qui intro pergit,  
præpollcat, prorsusque confideat: ac rursus inde  
incipiat, qui foras tendit, haudquaquā hic pul-  
sus distensionem producat plurimam. Si verò  
præpollcat motus qui cōcitarur foras, contrariò  
existente debili, minimè sanè sic ab extremo or-  
ditur collapsu in distensionem, ac summā tandem  
assequitur magnitudinem. Porro dormientium  
pulsus, quæ parte foras mouetur, similis est vigi-  
lantium pulsibus: quæ intro, permixtum videtur  
distare, quod terminos interius motuum sensus  
nostrum non assequatur. Minor tamen est & lan-  
guidor, præsertim in ipso principio. Præterea tar-  
dus in distensionibus est, & in contractionibus  
velox, introq; recurrens magis. Quare si vehe-  
mentem eum in contractionibus dicas, nihil er-  
res. Etenim excrementū fuliginosum, quod tunc  
ex confectis succis copiosius colligitur, arteria  
extremè vehementius desiderat. At verò vbi  
absolutè cōfecti sunt, si in somno perma-  
neat homo, immo deratus erit vtiq; talis som-  
nus: ob idq; meritò vterque motus erit minor,  
tardus, imbecillus & rarus, cum nimirum som-  
nus sit moris frater. Nam si alimenti elabora-  
tionem excipias, quæ communis somno cum vi-  
uentibus adest, cetera mortem referunt: non  
videre

Prægnantius  
pulsus maior,  
crebrior &  
celerior.

Somni qui  
pulsus faciat.

Concoctrix fa-  
cultas per som-  
nū se intro re-  
cipit magis.

Contractio  
arteriarum &  
venarum cur  
celeriores vbi de  
latationibus  
fiunt.

Somnus post cō-  
fectionem per-  
durat, immo de-  
deratus erit  
vbi moris  
est frater.

videre, non audire, nihil intelligere, vel cogitare, vel sentire, ratione carere, ac breuiter, protinus esse. Quod itaq; aliud est somnus, illo communi ablato, quàm ad interiù via? Qui experiscuntur, euersigunt pulsus magnos, vehementes, celeres, crebros, & cum quadam vibratione habent: qui mox mediocritatem assequuntur. Non perinde autem in somnum incidimus vigilantes, ac ex somno euigilamus: quòd hoc ferè subito, illud omnino pedetentim fiat. Etenim turbulenta insomnia, vel si quis vociferetur, perstrepat, aut ipsum dormientem tangat, celerem sic, & subitanè còcitat mutationem. Quare tunc pulsus illi quos nuper còmemorauimus, clarissimè percipiuntur. Fit autem somnus, vbi natiuus calor aut ex fangione, & nimia siccitate ad alimentum sese còuertit: aut ob immodicam humiditatem foras nequit progredi. Quorum primum quidem saluber & naturalis exiit: secundus autem, qualis est in comatibus & lethargis. Cui opposita est phrenitidum & vigiliarum nò naturalium vigilania, vbi deficcatus natiuus calor est, & quasi inflammatus, atque idcirco foras etiam mouetur immodicè. Ascitrix habitudinis corporis, perinde pulsus vt naturales immutari. Nam gracilis natura, si quadratus euaserit, ei qui talis natus est, asimilem pulsus habet: ac sic de ceteris habitudinibus est dicendum, semotò tamen omni virium immutatione. Iam etiam temperantia corporis ascitrix, pulsus naturalibus temperantibus mutantur similiter. Calida siquidem calidis, frigida frigidis, asimiles pulsus creant. Nam temperamentorū in humiditate & siccitate distriunt, continetur in habitudinibus corporis. Siccis quippe gracilitas, corpulentia est humidis familiaris. Præterea duritia corporis, sicca temperantia: mollitudo, humida comitatur: atque ita pulsus his molles est, illis durus. Verantem mutationes alias, quæ causis naturalibus carent, recenseamus: exercitationes quidem, si moderate sint, vehementes, magnos, celeres & crebros pulsus efficiunt: sin autè multæ, auresq; laborantis excedant, paruos, languidos, celeres & crebros in summo. Nimirū immodicæ, adeò vt agram se possit homo mouere, et multis interpositis quætionibus, aut nihil prorsus possit, sed remissæ vires impenitè sint, pulsus mirè paruos & languidos, tardosq; & raros. Quòd si perueniunt eo sit, vt vires oppressæ sint, pulsus creant nullis propriis. Etenim facultas in exercitationibus, vniuersam adhibet contentio nem: vnde pulsus excitantur vellemus: vñs autem incrementis, vnde magni, celeresq;. Cum vero ille duplici ex occasione augeatur, nempe & exhalatione spiritus, & incremento caloris: ob id nimirū crebri fiunt pulsus, quòd eorum vñs laud satis magnitudine & celeritate còpletur. Quòd si adeò quis laborare cogatur, vt non modò superiores facultates labores sint, sed continenter necesse habeat interquiescere, huic vniuersum corpus refrigeratur. Quare pulsus ob imbecillam facultatem, languidi sunt & parui: ob frigoris, nec celeres, nec crebri. Balneæ calidæ, moderate si sint, pulsus creant magnos, celeres, crebros, vehementes: si immodicæ, paruos &

languidos, tamen adhuc caleres & crebros. Quòd si hic non cessetur, paruos languidos, tardos & raros. Etenim ex balneis commodatioris, si quis eis opportunè utatur, videlicet vbi de fesi fuerimus, incalectimus, refrigerati, refecti, naufragæ affecti, aut inxquali intemperie fuerimus, aut denique evacuationem desiderauerimus, manifestè corpus iuuatur. Nam corpori restitunt mediocritatem temperamenti, vires corrigunt, opportuno calore augent, ac denique vñs cum sudoribus nonnihil & statuum discutiunt. At immodicæ balneæ, ipsam facultatem dissolunt, vsuq; præter modum intendunt. Frigidæ balneæ, illòd paruos & languidiore, & tardos, rarosq; pulsus efficiunt. Postea, prout id sit quod induxerunt, omnino vel torporem conciliant, vel robur. Quæ torporem induxerunt & refrigerantur, paruos & languidiore, & tardos & raros efficiunt. Quæ exaltescerunt, & robur concitarunt, magnos, vehementes, celeritate & crebriate moderatos. Etenim balneæ frigidæ statim refrigerant omnino: postea verò vel confirmant, vel obruunt facultatem, vñsq; perfrigerant. Itaq; pulsus præ ratione immutantur causarum. Porro in lotionne frigida, arteriarum motus plus intrò quàm foras fertur: quòd & calor illuc illuc magis fertur. Cibus adeò copiosus, vt opprimat facultatem, pulsus inæquales atque inordinatos concitat. Modicus, magnos, celeres, crebros, vehementes. Parciore quàm qui satis nutriat, non itaq; ac moderatus, ceterum minus mutat, neque id dicit. Vinum pulsus ceteris vt cibus variat: hoc verò interest, quòd illic immutat, & citius mutatio à vino profecta recedit, quàm illa quæ à cibo: quòd item celeritatem amplius & magnitudinem, quàm vehementiam & crebriatatem augeat. Etenim apposino quam facit vinum, celeris est, quòd humidum sit & calidum. Præterea, quæ asistat ac subito nutriunt, hæc celeriter permeant. Quamobrem, vt celerem, ita minimè diuturnam à vino appositionem corpore accipiunt, cum facili digeratur per habitum. Porro quòd nutriat, pulsus ita vt cibus variabit: quòd autè amplius quàm ille calfaciat, insigniorum addicet illis & magnitudinem, & celeritatem. Iam verò in choleris, magnis alui fluxionibus, ac omnibus densisq; his, quæ immodicè corpus vacuant, ipsam facultatem debilitant, còtinenter pulsus vermicalantes accidunt. Vbi autem oppressa est à febre cacoëthes facultas formicantes oriuntur. Siquidem vt pulsus vermicalans sit, tardus omnino esse atque rarus debet. At in acutis febribus (cuiusmodi necessitatio sint cacoëthes) non sustinet pulsus caloris copia, vel tardum in summo, vel semel fieri rarum. Ceterum tardus est, aut certe nò celer pulsus, vbi facultas opprimitur.

### GALENI PERGAMENI de causis pulsuum, lib. IIII.

In hoc autem libro, de causis pulsuum præternaturam dicamus, ab animi perturbationibus oris. Ite igitur alius est pulsus, ita pulsus quæ magnus, vehemens, celer & creber. Siquidem in

Balnearum modum daturum còmoda.

Balnea immo dicuntur facultati dissolueri. Balneæ frigida quomodo pulsus immutent.

Pulsuum pro diuersis variis modis mutatis.

Vinum quàm celerem ipsi pulsus immutat.

Vini appositio ad corpora, vt celer sit motus diuturnus effici.

Vermicantes pulsus quibus afflicti accidunt. Formicantes pulsus quomodo generantur. Cacoëthes febri.

Somnus est via ad interiorem. Experiuntur pulsus.

Somnus quo fit modo.

Somnus naturalis qui. Somnus præter naturam. Pulsus immodicus. Ascitrix habitudinis, pulsus vt naturales immutatur.

Ascitrix temperantia, perinde vt naturales permutatur pulsus.

Pulsus pro exercitacione variatur modum.

Vini pulsuum motus, ob exhalationem spiritus, & incrementum caloris.

Pulsus pro variis caliditatem balnearum modis.





inftar fuliginis acrem, qui mordicat & erodit, irritatq; cerebrū itaq; ad delirium perducit. Si putritio fit, nec fons & cra similis, fed caligui cras fe turbulenti, quali nubem quandam ad caput attollens, lumentat id grauitatē cerebrū, cogit in grauem formam delerri, atque sopor hominem. Recte ergo, cum pulsus in maiorem crebritatem mutantur, aut peripneumoniā, aut syn-  
 copem nuntiant. Peripneumonia, quod occupet semper, offenditq; lateris inflammationē vicinā  
 10 partes, vt quæ à calido gignatur feruentēq; humore, atq; facile mobili syncopem verò, ex affectu facultate, vel per neruorum lesionem, vel soporem, cum ex putris humoris vaporantibus cerebrū ipsum repletur. Quod si læsio progre-  
 di ad ramulos valeat, consequetur offensio neruorū sic vt sopor, si nequeat. Ac talibus quidem humoribus, rariore: contrariis, puta biliosis, crebriore iusto modo pleuritidis pulsus  
 20 eueniunt. Porro autem medius est inter raritatem & crebritatem modus in pleuritide, vbi quī morbum committit humor sanguineus sit. Sic etiam modus medius duntaxat ex tali humore, ac moderata inflammatione oritur. Augetur verò, aut ob inflammationis immodicam magnitudinem, aut ob humores biliosos. Itemq; per contrariā imminuitur. Suppurator pulsus ini-  
 30 tium statim pulsū refert vigētēs inflāmāōis: nonnūquam est inæqualis & inordinatus ob vincta instrumenta & facultatem imbecilliorē, sed omnibus hæcticus. Vbi verò iam pus adfuerit, cetera quidem sit pulsus similis, æquior  
 40 ram en. At quum erumpit, laquidior, lanior, tardior & rarior. Qui igitur multum puris interstio racem & pulmonem collectum habent, hī suppurati appellantur. Qui sunt, vbi maxima iuxta costas inflammatio, pervenit ad suppuratiōē. Interim affectus in comitatur peripneumonia. In vniuersum autem, omnes quibus inflammatum  
 50 est, suppurati siue purulenti dicuntur. Marcoris nomen translātum ē marcescentibus sūmis est, quæ \* penuria alimenti extinguuntur. Vbi igitur animantium natiuus calor eodē modo marcescit, oportet esse languidos pulsus. Si quidem sic affectus, redditur facultas languida, ac proinde etiam sunt parui. Iam celeritate etiam quādi-  
 60 videntur præditi, quod neq; hæc abesse à febricitantibus possit. Quia verò & febricitant, & facultate sunt imbecillæ, itaque pulsū habent parvū, &

tionē, quæ nondum discussa sit, emarcuerunt, la-  
 guidos & celeriores, mirę crebros pulsus ha-  
 bent, ac decurtatos magnitudinē in vno ictu. At  
 verò hæcticus pulsus omnibus marcescentibus  
 inest: estq; eis communissimus. Post illum au-  
 tem inæqualitas diffinitionis magnitudinē de-  
 curtata: quæ etiam adest plerisq; deinde crebritas:  
 etenim hæc quoque omnibus qui ex inflāmā-  
 10 tione marione marcerunt, perpetua schæret. Pausi-  
 autem marcescentibus in aliam inæqualitatem  
 pulsus, ac illam quæ penes magnitudinem est,  
 permutatur. Plethysici habent pulsū parvum  
 & languidum, ob facultatis imbecillitatem;  
 ac non nimium celerem, vt plerique febri-  
 citantes, quod vrente febris non detineantur. Ceterū  
 hæbēt & hī, vt febri, sic pulsū hæcticum.  
 Peripneumonicorum magnus est pulsus & lan-  
 20 guidus, mollisq; similiter itque lethargicorum  
 pulsus, nisi quatenus præpōlet inæqualitate, &  
 in vno pulsū, & collectiua, quam vocant: in vno  
 ictu, nam veluti interpellatur, vndo iustq; ac in-  
 terdum bis feriens redditur. In collectiua autem,  
 cum alias differentis fortitur, tum modō inter-  
 mittit, modō intercurrit. Neq; enim est mirum,  
 vel magnum esse pulsū illorum, vel languidū,  
 vel inæqualē, ob pulmotus inflammationem,  
 visceris tam laxi & mollis, situlæq; in manibus  
 30 vndiq; infinitis caui, tamq; vicini cordi. Nam quā-  
 laxum est & molle, & vndique vacuum, à pituitio-  
 siore atq; crassiore inflammatur sanguine. Talis  
 enim fluxio, tunicam vasorum irrigat, frangit  
 autem vim facultatis, quæ in illis est: quo fit vt  
 magnos simul & languidos pulsus efficiat. Quia  
 verò cordi est ipsum viscās coniunctum, multi-  
 40 formis inæqualitas gignatur: namque pulmonis  
 arteris oppressis, contractis, atq; languidis red-  
 ditus. Raro itaq; in peripneumonia pulsus discur-  
 tus cecidit: quod in visorū duritiem posuēt. Il-  
 pro offensa magnitudine, vel intermittentes pul-  
 50 sos, vel intercurrentes cernunt. Cum autem fe-  
 bre teneatur acuta omnes peripneumonia, at-  
 que habeant solum in vno in vno comitis, si mi-  
 gnior esse videatur febris, pulsus erit admodum  
 creber: si maius coma, minus creber exiit.

Lethargicorum pulsus, pulsus peripneumoni-  
 60 corum est similis, magnitudine, remissione, mol-  
 litudine: sed eo est tardior, rariore, ac minus in-  
 æqualis, intermittens potius quā intercurrentes.  
 Est cum diuturnus fiat. At vndosus semper in al-  
 na quidem soporibus est. Gignitur autē lethar-  
 gus etiam ex putris humorē. Vnde merito e-  
 nus pulsus similis est peripneumonicorū pul-  
 sui: verū hoc tardior, quod procul sit à corde re-  
 motum cerebrum. Est autē intermittens potius  
 quā intercurrentes, cum longē frigidior sit, atq;  
 vt ita dicā, letaliior morbus lethargus, quā per-  
 ipneumonia. Etenim affectus frigidus, facili-  
 70 que valde refrigerat, proprius pulsus intermit-  
 tes existit. Pleuriticoorū pulsus est parvus, modū  
 ceterū contentus. Rarissime autem conspectus est  
 magnus. Est præterea durus, neruosus, mirę ce-  
 ler & creber. Habet præterea nonnulli vndosi:  
 atq; interm subtemere tibi videbatur: interm  
 80 etiā præcises cum conuulsione quadam. Etenim  
 febriū propriū celeritatis symptoma hic obuiet

Marcorum si  
 mal cum inflā-  
 matione, quæ  
 sine pulsus

Peripneum  
 pulsus

Peripneumonia  
 si febris, sic  
 pulsus hæcti-  
 cus

Peripneumonia  
 corum pulsus

Pulsus sub-  
 stantia laxa,  
 mollior, vnde  
 fit, putris  
 inflammatio

Peripneumonia  
 in omnes ad  
 esse febrem ac-  
 tam, animisq;  
 comata

Lethargicorum  
 pulsus

Lethargus si-  
 re, ex putris  
 humoribus

Peripneumonia  
 si febris, sic  
 pulsus hæcti-  
 cus

Lethargus esse  
 putris humoribus  
 morbus per-  
 ipneumonia.  
 Pleuriticoorū  
 pulsus

evidentissimè, in vitroque termino distentionis, præcipue extremo. Invenies enim inæqualitatem in positu genus, insigniter aliquando in illo appa-  
 re limò rotam subinde artemam, sua sede de-  
 terra, cõspicias atrolli potius cum vibratione e-  
 bullentè, quàm more pulsus distentã. Pari modo  
 detractam potius, quàm contractam. At verò  
 immodica eius crebritas proxumã denunciat syn-  
 copam. Nec sanè causas illorũ quæ diximus in-  
 venire magni laboris fuerit, si scias generari à bi-  
 10 lioso humore plenum, ut lethargum à purito  
 so. Præterea lethargum præcipue gignit in cere-  
 bro plenum verò in tenui meningè, atq; septo  
 transverso. Quæ si memineris, etiam parvos me-  
 rito pulsus & duros esse, nõ habebis necesse di-  
 scere. Atque si affectus calidus est, pulsus autem  
 parvi, omnino etiam crebri sunt. Porro phreni-  
 corum pulsus rarissimè vndosus percipitur, &  
 mollitudo valet. Quod verò subtre mere im-  
 becillæ facultatis sit signum, alibi à nobis osten-  
 20 sum est. Vbi enim arteriarum facultas ob caloris  
 copiam distendere illas amplius conatur, idq; tu-  
 nica durities probubear, quodammodo videtur  
 pulsus subtreinere: id quod tunc potissimum ac-  
 cidit, vbi syn copia imminet: quo modo vbi con-  
 vulsio, etiam morus pulsuum est convulsivus. At  
 hoc phrenicæ pulsus habet perpetuum, vt cum  
 convulsione quadam motus eorum abruptur-  
 tur, non autem paulatim definit: calor siquidem  
 viget, sintque dura instrumenta. Iam verò in-  
 30 signis illa crebritas, rui ab imbecillæ facultate  
 exoritur, syn copiam inditare portendit. Est &  
 alius quidam affectus ex phrenitide & lethar-  
 go conitatus: quo quidem qui tenentur, vt plu-  
 rimum oculis consequunt, somnolentique sunt  
 & stertunt. Rursum oculis fixis, inconnuienti-  
 bilisque diutissime, vt catochis, inuentur. Quod  
 si illos ad colloquium compelles, difficiles sunt,  
 ad respondendumq; tardu: plerumq; etiam stultè  
 loquuntur, temerè respondunt. Horum igitur  
 40 pulsus sunt crebres cerebri, peninde vt phreni-  
 corum, minus tamen: & roboris uem minus q;  
 illi obtinere. Latè autem sunt, ac breues. Exter-  
 num motum non habent subitò truncatam, sed  
 alio modo veluti intrò se propicientes subterfu-  
 giunt, ac concitatur contractio nem, & quasi sus-  
 furantur distentionem. Catochorum pulsus ce-  
 tere lethargicis similes sunt, magnitudine, tardi-  
 tate, crebritate: vt nec tonus huius affectus spe-  
 50 cies latè ab illo distet. Catochorum tamen nõ  
 imbecillus est pulsus, nec mollis, sed in his sanè  
 humiliter distet: vt etiam in hoc, quod laxatur le-  
 thargicus atq; innemiscit totus habitus, contrã  
 strigitur cogitans catochis. Præterea æqualis est  
 catochorum pulsus, inæqualis lethargicorum.

Convulsorum ipsum corpus arteriæ videtur  
 compactum, & vndis coactum esse, veluti in-  
 strum eitu cauum ex vitro sine distentum. Mo-  
 tus autem ipsius arteriæ est in modum chordæ  
 sursum deorsumq; agitatz, inæqualis, idq; mini-  
 60 me certis temporibus. Cæterã vehemens & ma-  
 gnus convulsorum pulsus videtur. Est verò hic  
 nõ imbecillus nec parvus: non peninde tamen  
 vridetur, vehemens vel magnus. Istus enim  
 imponit, dum ob tensionem validus, ob vibra-

nem exilire apparet. Paralyticorum par-  
 tus pulsus, languidus, tardusq; est. Nõnulli ra-  
 rus quoque, alius creber, sed nonnihil inordinatè  
 intermittens. Est enim parvus & tardus, quia  
 morbus est frigidus: languidus, quod facultas  
 infirmior. Comitialium & attonitorum pul-  
 sus sunt similes: quare quæ de comitialibus ex-  
 ponemus, eadem de attonitis, sed cumulatius,  
 sunt accipienda. Vnum affectus non vique adeo  
 10 invaluit, nulla insignis in pulsus mutatio cernit-  
 ur. Tantum est convulsus intentus iure vtrumque  
 arteria. Sin autem affectus superet facultatem,  
 illæ qualiter atq; tensionem valdam sibi con-  
 trahit pulsus: necnon minor, languidior, rarus,  
 tardusq; efficitur. Si morbus opprimat larula-  
 rem, languidos, parvos, celeritq; pulsus concil-  
 liat. Angiæ pulsus tensione quadam prædi-  
 tus est, convulsusq; perissimè. Magnus est & vn-  
 dosus, vt pulsus peripneumonicorũ. Cæterum  
 20 si peripneumonica species superior sit, in peri-  
 pneumonia: si verò convulsiva, in spasmus  
 angina definit. Quicunque autem ex anginis  
 suffocantur vehementer, parum illi habetur  
 rarum pulsus: vbi verò iam animum agunt, cre-  
 brum atq; inæqualem. Plus autè vel minus ten-  
 sionis habet angina pulsus, pro vi humoris in fau-  
 ces aulens aut bis horis, aut putatissimè fuerit.  
 necnon pro ipsorum instrumentorũ in alprena-  
 de diuersitate. Siquidem nervosiora & conten-  
 30 nora vlemennas pulsus tendunt: carnosa &  
 remissa, illum vndosior emittunt. Orthop-  
 noxa acuta (talis enim est, quæ diuturna) inæ-  
 qualem habet pulsus, & inordinatum, deficien-  
 tem quoniam nihil. Quæ mediocriter est grauis, cre-  
 brum. Quæ violentissima, tardum & deficien-  
 tem. Quæ iam perit hominè, crebrum, & lan-  
 guidum. Cæterum pro diuersitate offensæ, vel  
 creber magis, vel rarus sit pulsus. Nam celer, ob  
 facultatis imbecillitatem sit nunquam. Vteri-  
 40 si si cationis pulsus, vt si conuelleret, proten-  
 sus est, atq; rarus. Quod si exinalis sit suffocatio,  
 creber, inordinatus, & nonnihil deficiens. Cum  
 enim nervosus sit loci affectus, par est vt pro-  
 tendatur pulsus, quasi cõvulsus exsistat. Quia ve-  
 rò affectus est frigidus, adiuncta est rantes. At  
 vbi oppressa iam prioris facultas sit, rectè sit cre-  
 ber, inæqualis, & nonnihil deficiens. Os ven-  
 triculi affectus, si duntaxat sit inflammatum, ita  
 pulsus immutat, vt solet corporis nervosi in-  
 50 flammatio, si comprimatur, vellicetur, languet-  
 scar, singulatur, vomat, nauseat, fastidiat, do-  
 leat, pro genere cuiusque symptomatus. Nam  
 vellicat ones, vomine, nausea, singultus, lan-  
 guor, non solum parva & languidum red-  
 dunt, & interim modicè celeriorum, sed etiam  
 admodum crebrum. Sola verò compressio,  
 rarus, tardum, paruum, & languidum, qua-  
 lis etiam per caninam famem conspicitur. Por-  
 60 rò omnes affectus qui in crebratem mutant,  
 si sint diuturni, vel grauiore evaserint, pul-  
 sum gignunt vermicularem. Qui verò in rari-  
 tatem, non solum commemoratas differentias  
 adaugent, sed speciem etiam inæqualitatis in  
 vno pulsus generant, vt multis locis petulium  
 corpus arteriæ videatur: nimirum ob ipsius in-  
 stru-

Phrenicorum  
 pulsus pumodi  
 ta crebritas,  
 præsertim duri-  
 tas hinc copiam,  
 Phrenicorum à bi-  
 lioso produs  
 humore.

Lethargum ab  
 humore priuati-  
 so exortur.  
 Lethargus gignit  
 in cerebro.  
 Phrenicorum g-  
 gni in tenui  
 meningè, & in  
 septo transuer-  
 so.

Phrenicorum  
 pulsus quod-  
 nam adfæ per-  
 petuo.

Catochorum  
 descriptio &  
 pulsus.

Catochorum  
 pulsus.

Catochorum  
 pulsus.

Catochorum le-  
 thargicis &  
 formam.

Convulsorum  
 pulsus.

Convulsorum  
 pulsus.

Paralyticorum  
 pulsus.

Paralyticus est  
 morbus sine  
 gignit.

Comitialium  
 pulsus est pul-  
 sive appetit  
 eorum similitudo.

Angina pulsus.

Orthopnoxa  
 pulsus.

Vteri si suffoca-  
 tio pulsus.

Pulsus differe-  
 tie pro variis  
 aut vtriusque  
 affectibus.

Fames canis.

*Hydropum fit  
pulsus spedit  
quam pulsus  
effertur cum  
fortior.*

*Afines.*

*Tympanites re  
plet vasorum  
corpore florido.  
Inaetate cu  
bus humida  
si vasorum  
corpore habi  
tam.*

*Elephantiasis  
pulsus.  
Inaetate  
pulsus.  
Inaetate  
pulsus.  
Inaetate  
pulsus.  
Inaetate  
pulsus.*

*Veritatem epo  
nem qualiter  
pulsus  
monet.*

strumenti intemperiem. Aquae inter cutem pul  
sus. Ascitae parvus crebrior, subdurus, & cū qua  
dam tensione est. Tympanita longior, non im  
becillus, celerior, creber, subdurus, cum quadam  
tensione. Illius quam anafasca vocant, vndosus,  
laxior, mollisq. Ascitae siquidem, copiam acer  
tamen nō modicam secundum ventrem humore  
aquofo, simul magnas arterias intendit, grauat,  
refrigeratq. At tensio nam quidem nomine men  
tū reddidit pulsū cum tensione quadam subdu  
10 rum. Quia verō facultas lefa & refrigerata est,  
minorem. Iam quō minorē iusto, hoc etiam cre  
briorem, praefertim vbi adiuncta sit febris, Tym  
panites minus grauat, verū nō minus tendit:  
quare pulsus etiam subdurus gignit, cum nōnul  
la tensione, sed aliquanto celeriore, minūq. im  
becillus, quam ascitae: at crebros, aīdem de cau  
sis acīle. Longiores, ob leuitatem tegumentum ar  
terias corporū, quae quidem in tympanite adeli  
etiam spiritui vniuersum corpus replet. Anafas  
ca autē, quae imbut vniuersum corporis habi  
tatum humiditate copiosa, tunicas reddit arteria  
rum molles, ac proinde pulsus molliores, vndos  
15 sos, lanoreq. efficit. Elephantiasis pulsus par  
uus, languidus, tardus, creberrq. est. Inaetorum  
pulsus est, si absit febris, minor, durior, crebrior,  
non languidus, nec celer. Vm enim possidet de  
ficandi staua bilis, vt muria, & mare. Quamob  
rem tunicae arteriarū indurando & deliccādo,  
pulsū quodq. reddit duriorē atq. minorē, ac  
20 proinde etiam crebriorem. Ceterū nec languid  
us est, nec celer, quia nec imbecillitas, nec fe  
bris adest. Qui sumperunt veratrum, su pau  
lo ante vomitum, vbi comprimūt, pulsū hab  
ent latum, rarum, languidiorem, atq. tardiorē,  
interea dum vomunt & diuellunt, inaequalem  
& inordinatam. Cū rectus habere ceperint,  
ordinatum quidem, sed inaequalem ad adhuc, mi  
nus tamen quam antea. Vbi verō iam ad natura  
lem reuertuntur statim, aequalem ac maiorem  
quam dudum, velenētur cōm. Qui horum syn  
copa corripuntur, conuelluntur, atque singul  
tiant, paruum hi, & languidum, inordinatūq.  
& celeriorē, atq. multū crebrum sortiuntur.  
Qui ex his suscitantur, paruum, languidum, in  
ordinatum, inaequalem, non autem crebrum, nec  
celerem, sed potius tardum. Repraesentat etiam  
nonnihil vndosi & lati, atq. interdum parū ar  
tēne tensionem.

## GALENI PERGAMENI

de praecognitione ex pulsibus,  
liber primus.



Vod non tantū \* futurorum pra  
sentia sit, sed praesentū etiam atq.  
praeteritorum, istud Hippocrates  
demonstrauit. Cuius quidem qui  
pulsus futurus sit, cum in iis quae de  
diagnosticis pulsibus, deq. differentiis, & cau  
30 sis pulsuum a nobis tradita sunt, prius exerceri  
oportet. At verō causā pulsū diximus esse  
vnum genus, eorū generationi coniunctū, quod  
scilicet naturale exitu: alterum autem contrariū,  
nempe causā prae naturam: ac tertium de

nique causarum non naturalium. Quae tria ge  
nera referuntur ad illorū essentiam veram: aliud  
autem quatuor, ad apparentem. Quod quidem,  
quia proprium est in primis praefragendi com  
mentationi, diligentiūssimē est explicandum. Por  
rō nullus pulsus mutari potest, nisi efficiat eius  
facultas, vel tunicae arteriae, vel vīus, quāmobrē  
fit, in aliqua sit mutatione & alteratione. Vbi  
igitur pulsus, exempli gratia, maior equo videat  
40 tur, expcandū est, facultatē sit robustior:  
an hīc eadem manserit, mollis autem euaserit tu  
nica arteriae: an quod increuerit vīus, talis muta  
tio acciderit. At si facultas robusta sit, pulsus ce  
rit velenētur. posuimus autem eum maiorem  
duntaxat videri. Quod si tunica tantum arteriae  
emollita fuerit, pulsus necessariō erit mollior. Si  
igitur neutrum appareat, clarum est mutari ali  
quatenus esse vīum pulsū generandorū, quē  
esse docuimus duplicem: primum atq. maximū,  
tutelam naturae caloris: alterum, animalis spiritus  
generationem. Sic voco illum quo vītur animā  
ad voluntarias fluctuantes. Ceterū si parua fiat  
a natura & alteratio ob vīum, sola peripicua erit  
magnitudo, nō dum autē celeritas. Si maior, in  
crecet magis magnitudo, & clarē celeritas ap  
parebit. Sin adhuc amplificabitur, magnitudo  
celeritq. augēbuntur, atque accedet praeterea  
crebritas. Sui autem nō sit factus maior pulsus,  
sed talis esse videatur, gracilius solum aliqua  
de causa euasit hominis corpus. His cognitis, in  
eundem examen est, primum in corporibus sim  
pliciter sanis: motus in iis, vbi adiunctus est ali  
quid ascitius motus: postea in corporibus sim  
pliciter aegrotantibus: ac postremo in iis, quib  
50 us alterio quēpiam adest externa. Etenim in  
corporibus inculparata valetudine praeditis, doce  
bit magnus pulsus & temper amētum hominis,  
& corporis habitudinem. In corporibus vbi ad  
iunctus est ascitius status, illum propellere mo  
tum, cui magnus pulsus est peculiaris. At in iis  
qui aegrotant simpliciter, indicabit magnus pul  
sus calidam & morbi cōstitutionem. Si vna cum  
morbō recens aliqua \* externaque alteratio ad  
sit, illum vincere motum, cui magnus pulsus sit  
familiaris. Reue: caudus autē ad memoriam pul  
sus est moderatus (qualis reperitur in corpori  
bus optime temperatis, atq. ab omni qualitate  
adversata alienis): quē nunc inuenimus, mag  
60 nus, in comparatione illius considerandus  
est, ex qua causa in magnitudinem ipsam excre  
uerit. Aut enim ex gracilitate corporis, aut ex ca  
lore temperamenti, aut ex ascitio motu. Ceter  
um motus ascitius mox desinit permanent ve  
rō amplius ob gracilitatem & temperamentum.  
At verō omnium alterationū quae corpori acci  
dunt, certissimā assequimur in illis corporibus  
cognitionem, quorum naturam noscimus. Hīc  
autem non agnoscimus semper, quare nec in ex  
actam vbi quae cognitionem veniemus: verū  
a cognitione absoluta tantum aberimus, quantū  
ab ipsius naturae cognitione. Igitur mutationes  
pulsū ex causa externa, in hunc modum sunt  
discernende: Quae ex balneis, cursibus, frictio  
nibus, exterisq. motibus sit, non est diuturna,  
sed mox ad pristinū statum reuertitur. At ma

*Pulsus vīum  
esse mutatum,  
qua ratione de  
prehendimus,  
pulsus genera  
dorum vīus est  
duplex: tutela  
naturae caloris,  
& animalis  
spiritus consti  
tutio.*

*Pulsus modera  
tus in quibus  
ad reuertitur.*

*Ascitius motus  
mox desinit.*

*Pulsus modus  
datus a causa  
externa, quom  
modo discerē  
da sunt.*

gnitudo pulsuum ex vino & cibo profecta, diuturna existit: Hæc ex vehementia exploratur, quæ illi coniuncta est. Nunc tantum is propositus est, qui duntaxat fit maior. Iam enim magnitudo quam ira concitat, adiunctam habet vehemennam: quæ alioqui prædentem non latet, si oculos iram respiciat, vniuersumque corpus. Etenim calor quidam copiosior secundum peccatus iratorum, non secus quam exercitatorum, percipitur. Atque hi sanè sunt artificiales modi causarum dignoscendarii. Externos autem, ubi minime in tentatores, ac pessimos sycophantas; fraudulentosve incidis, partim per investigationem, partim ex eo quod non discesseris ab ægroto, quam optimos fore iudicò. Nam qui sinit dum medicus non semper ægronis adest, nec illi volunt veritatem exponere, hi sunt difficillimi, & medicum requirunt accuratè prudentem. Qui sanè ad veritatem pervestigandam esse primus scopus debet ipsius accessiones rēps: dein ægrotantis cōsuetudo & mores. Sunt siquidem qui medico imponant, nihil magis habeant in votis, quam vt coarguant illum, cumq; nihil firmi scire demonstrent. Quare tunc habenda omnia suspensa sunt, distinguendq; tum quæ propria ars ratione perneant ad dignoscendum, tum quæ adveniunt extrinsecus. Alij contra sunt can didi, mo desig; nec cellis quicq; dissimulant: ve: quare in his nō clām factum, est suspiciū dum. Porro cū magnus pulsus nūc ad moderatum, nunc ad alium quemlibet referatur: cūque duplex sit hic quilibet, aut minor moderato, aut maior: deinceps de incremento ad magnitudinem est descendum vtriusq; pulsus: dico enim minoris eo qui mediocris est, & maioris. Commune igitur est omnis ad magnitudinem incrementi, solum auctum calorem esse, quo scilicet tempore nec facultas affecta sit, nec instrumenta, sitq; immotus ægrotans. Proprium autem est defluxu illius in naturā, vnius magnitudinis incrementum. Reliquorum duorum etiam, nempe celeritatis & crebritatis nonnunquam. Cōmutatio nis etiam pulsū in paruitatē, tres numero sunt differentij. Aut enim ex moderato, aut ex maiore quā hic fit, aut ex minore, mutationes in paruitatem contingit fieri. Vocatur autē qui moderato est maior, absolute magnus: qui minor, parvus. Si igitur pulsus cuiuspiam homini minor quā dudum, mutatione prædicta præterea nulla vilius generis. Etenim minor solito pulsus sit, aut cū imbecillior facta sit facultas, aut instrumenta duriora, aut vsus remissus. Nunc autē nec imbecillior facta facultas est, alioqui coniuncta sit cum paruitate remissio: nec corpus arteriæ durius (neq; enim tum minor tantum, sed & durior pulsus esset) superest ergo solum esse alteratum vsu: ac si id tēp oris quiescit homo fuerit, quantitati refrigerationis quantitatē respondere mutationi. Quæ quidem mutatio accidit ex maiori pulsu, q̃ qui sit naturalis. Nam de naturali statu ob frigiditatem mutatio ad paruitatē, simul etiā rariorem cum atq; tardior em reddit. At imminutio ex magno supra modum aucto, statim adiungit sibi celeritatis & crebritatis aliquid: quod qui multū vltra modū sit auctus, tribus in gene-

ribus variet. Quamobrem qui magnitudinē tantū imminuit pulsus, & reliqua seruat immota, luc est qui paulo maior sit iusto, solusq; ex paruo incremento maioris constat. Iam verò, quemadmodum ubi corpus calit præter modū, magnitudo planè prima, mox celeritas, inde crebritas appareret in pulsū: sic enim ubi refrigeratur, raritas pri mo percipitur, dein tarditas, ac vltimo loco paritas. Porro causæ refrigerantes totidem numero sunt, quod numerantur calfacientes. At si quidē frigidas nos circumstant, inspiratiq; & aqua frigida, vel balneum, vel medicamentū corpori inuictū, refrigerat. Quiescēt longa quies, & vel vti latebrē, & pruitosus cibus, medicaminaq; refrigerantia, ac breuiter, metas diuturnas, corpus frigiditas efficiunt. Ex conuulsis in corpore humoribus, qui frigidi tēp oramento cū antea quiescerēt, nūc cōmon, aut tenuiores quo dammodo calidi sunt effecti, enā corpus refrigerat.

Arteriæ vltitudo semper æqualem latitudinē diffensionē habet: sed fit vt occultetur aut arceatur sepe à corporibus circumiectis & oppositis, vel vniuersus motus, vel certè eius quædā pars: idq; aut in profunditate magis, aut in latitudine, aut simul in vtraq; diffensione. Vbi igitur per totum corpus sensu nostro pulsare nulla arteria percipitur, is affectus dicitur pulsus priuatio: re vera tamē in corpus viuū nunq; cadere potest. Neq; enim est vnq; quin cor vnā cū arterijs, in omnib; agiteretur. At verò longi dicuntur pulsus, quibus sensibilibus motus longitudo naturalē excedit: breues, quibus infra naturalem statū est: quibus par est naturalis status, moderati. Tantū enim animus daturus semper de motu arteriarū, quantum permittit: a diacena corpora. Vnde fit, vt corpulenti breues pulsus sortiantur: graciles verò, longos, & quadratis, moderatissq; esse moderati videantur. Iam etiam apparens motus huius, non æquē semper vt profunditas, latitudo impeditur. Verū ubi arteriarum regiones in obliquo, vel adipis, vel carnis, vel vaporum, vel humorū sint plene, ac incumbens supernè cū nulli eas oneret, latitudo istarū obscuratur: motus: & magis si veliemus pulsus & magnus, quantum in ipso est, fuerit. Cū verò regiones vicię sunt min dē, rugosa aut quæ eas tegit cutis, magis profunditatis motus later in eo corpore, ac potius si non vehemens pulsus & magnus, quod in eo est, sit. Si igitur pulsus in venias longiorem iusto, si quidem vna latitudo eius profunditatisq; in creuerit, vide gravior homo solito, an calidior euaserit, remotio motu aduentio. Nam si factus gravior sit, idq; tantū, quantū est pulsus maior, vnum hoc tantū eum immutauit. Sin autem nō tantū, non hoc modū est causa, verum etiam calor. Quod si in eadem consistenter latitudine corpus, solus mutatus est calor. Sin crassior euaserit, duplo auctum calorem aestima. Sin longior sit factus pulsus, & latior, nō autem perinde auctus profunditate, sed moderatus, huius præter superiores notas, necesse est rugosioris euaasis & supernè arteriæ incumbenti cutem. At si conuertas membrū, vt quæ eius pars modū su perior erat, nunc sit inferior, nulla tum profunditas videbitur impedita. Atque hi quidem duo pulsus

Refrigeratio causa est mori re sunt, quæ calfacientes.

Tumor duntaxat corpus refrigerat.

Pulsus priuatio est corpus vti quod modū i cadere potest. Pulsus longi qui non dicuntur. Pulsus breues qui. Pulsus moderati.

Latitudo motus quando in pulsu obscuratur.

Causarū digno sciderum quæ sint artificiales modi.

Causarū digno sciderum quæ sint artificiales modi.

Frangendi quorundam sycophantarum morum.

Pulsus mutatio in paruitatem tres modos sunt differentia.

pulsus, in primo libro de eorum differentiis, omnium primi inter vigintiseptem pulsus constantes ex dimensionibus ternis, sunt in tabellam relati. Reliquorum autem vigintiquing haud difficile fuerit causas simili etiam methodo investigare. Igitur ubi supra proportionē profunditatis & latitudinis longitudine fuerit extensa, corporis significat gracilitatē: non tamen ubi \* imminuta infra proportionem profunditatis est, corpulentiam denotat, sed vel naturalem quandam conformationem, vel situm arteriarum inaequalem. At verò quæ quidem in omnibus primo, ac magno distincta sunt pulsus, eadem enī in vicinio, nempe breui, angusto, humilique (qui nimirum vocatur parvus) sunt distinguenda. Si in naturali comparata sit corporis habitudo, hic pulsus uō solū videtur parvus, sed enī talis existit. At cum crassior sit, si \* quantum homi seipso crassior evasit, tantū sit pulsus minor, erit tum quidem quod ad ipsū attinet, moderatus: sed ob corporis crassitudinem minor moderato videtur. Si longē sit crassior quā pulsus minor, is pulsus quantum in ipso est, mediocri erit maior. Sin autē minus sit crassus quā parvus pulsus, hic, si eius naturam speciet, naturali erit minor. Quod si gracilius corpus sit, quā videtur pulsus parvus, is sanē est parvus natura, sed non penne videtur parvus, ac verē est: quod gracilitas, quatenus a natura recessit, hætenus ei speciei magnitudinis augeat. Similiter etiam in aliis pulsibus omnibus adhibenda eadem est distinctio, quæ de parvo & magno pulsū est adhibita: sciendūque illorum quentū vel paruum esse natura, vel magnum, vel moderatū. At tres hi pulsus in quantitate distinctionis possint fuisse, quod ad ipsius rei naturā attinet. Videtur verò esse vigintiseptem, ob crassitudinem vel gracilitatē corporis, vel ob rugositatem, vel regionū arteriarū inaequalem angustiam, vel proprietatē cōformationis. Tam verò longus, angustus, & humilis pulsus, quod quidem ad suam naturam pertinet, idem erit & parvus: nimirum longitudine ipsa accedente ob tenuem habitudinem corporis. Quod autē & languidus sit, hunc evadit perspicuum, quod nunquam facultate valente, pulsus esse parvus ad summū possit. At dum enim nihil est necesse coniunctam esse huic pulsui. Oportet tamen cor vñ cum arteriis esse refrigeratū, atque enī annuum perfrigerari. Quod verò refrigeratū esse, lesam esse facultatem sit: refrigeratū autē, mutatū vsum, vñ intelligere oportet. Facilitas essentia singularum partium, in singularū illarū posita cōmodo temperamento est. Nam tum demū suum quæque munus obit strenuē, ubi sit temperatissima. Contrariā malē fungitur, si intemperata sit: atque hætenus malē, quatenus sit intemperata. Ad eundem modum cordis corpus cum immodicē fuerit refrigeratum, calcfactum, humectatū, aut exiccatum, pulsus pro xus intemperiei modo facit languidus: id quod illi est facultatē oblesam esse. At verò consuetudinē habere cum sanguine in ipsius contento sinibus, & cum spiritu, qui calidior longē ac naturalis status requirit, sit, aut cum eo qui in involucri cor ambiente cōstitit, vel in pulmone, aut cum ipso etiam involucri cor ambiente,

& pulmone: vsum est tantū variatōe, citra facultatis offensam. Ac sic eandem ratioē habere, refrigeratum esse, & refrigerari. Nam si in ipsa cordis temperie frigidum elementū præpollat, facultas læditur. Sin verò in tunica cor ambiente, & in pulmone, sanguinē & spiritū, quos eius ventriculi continent, vsum est remissio. Tam humiditates & siccitates, si in ipso corpore cordis consistant, nocēt facultati: si in quopiam vicino, non immutatur vsum. Si quidem proba temperatura, intemperiesq, ex quatuor sunt elementis: vsum verò incrementa vel remissiones, duntaxat ex calido & frigido. Porro ubi iam ad vltimū vsum dissolutionē deveniat, corporis vicini cordi vehementer refrigerati, non poterit etiam cordis corpus nō in temperatū exire: id quod nihil est aliud, quā facultatem debilitari. At verò ubi cum duritie coniunctus est pulsus ille oblongus, angustus, & humilis: necessariū etiā ei adesse vel languidus, vel medius inter languidū ac vehementē: declaratur esse is affectus in corpore, qui reddit arteriam duram. Hæc est siccitas, vel contractio a frigore, vel tensio. Siccitas quidem in ardentissimis febribus, ubi pessimē inveterant: ac præcipue in marcere torrido, certisq, melancholicis & quartanæ febris generibus. Contractio fit si rebus refrigerantibus. Tensio ab affectibus convellentibus, & ingentibus inflammationibus. Ex scirrhis verò contractio arteriarū & tensio nascitur, cum aliis, tum vel maxime vbi lien & hepar scirrhus indurantur. Sed tætu eiusmodi affectus deprehenditur, & per vtiñas, & alui excrementa, peris rum linguis, tum vniuersi colore corporis, atque adeo etiam per febrium genus. Qui autē alij corporis affectus pulsū creant durū, partim originem ex recentibus offensionibus repentinam trahunt, reliqui omnes pedetentim. Offensiones quæ inducunt eiusmodi affectus, sunt vini potio & frigide intemperstia. Saepè etiam fructus refrigerantes, balneūq, frigidum. Deprehendens noxam à vino illatam, cum subito pulsus non durus modò, sed maior etiam sit, celerior & vehementior. Cæteras à viuo in cōmuni discernes, quod nec magnitudinem adiunctam, nec vehementiam, nec celeritatem habent: singulas autem scōrum, ubi symptoma aliquod apparuerit, eorum quæ fructibus id genus ingentis solent supervenire: ut delirium, exempli gratia, quod à vinosis fructibus proficiscitur. Iam verò si nervorum originem aliquis dictorum affectuum occupet, convulsivas dispositiones inducit. Sic enim illas appello, quas ante mortem, convulsivæ ali quod necessariū comitatur symptoma. Ac moriturus sanē omnes in hunc modū affecti, etiamnum calidi, contrā ac illi, qui corripuntur symptomata: hi siquidem vehementer etiam frigidi, vivunt adhuc. Est autem operæpretium nosse, omnes duos simul & parvos pulsus, quamcūq, finim fieri vibratos: & si qui vibrati non sunt, eos aut ob vitalis facultatis imbecillitatem, aut remissionem vsum, aut vtriusque concursum, non admittere vibrationem. Nam si quidem vsum magnam postulet distensionem, vñq, operari valeat vitalis, sed vñum refrigerat corpus

Gracilitatem  
corporis quo  
pulsus significat.

Temperiem in  
temperamentis  
cordis ex qua  
tuo elevatus  
constat.

Siccitas in quibus  
motibus arterias innadat.

Contractio.

Facilitas va  
lentis nuncupat  
pulsus esse parvum  
ad summū  
possit.

Remissio facultatis  
intelligitur  
parvus, in cōmuni  
modum  
parvus temperato  
modum cōducere.

Nonnulla à  
vino, quomodo  
deprehenditur.

Convulsivæ di  
stensionis qua  
fiat.

Duos simul &  
parvos pulsus,  
quomodo fieri  
vibratos.



*Vibratio pulsus  
quid sit accidat.*

*Vibratus pul-  
sus si adsit, non  
nihil robori  
facilitat pos-  
sede declarat.*

*Moderatus pul-  
sus quot modo  
dicatur.*

*Celerior pul-  
sus, calidior,  
tardior, frigidi-  
or, tempera-  
mentum dicitur  
vari.*

*Celeris pulsus  
modi magnitudi-  
nis, modis adu-  
ginis crebritatis.*

*Mutationes pri-  
mae et simplici-  
ssimae pulsus  
in celeritatem  
et languiditatem.*

arterie, quod attolli in magnam distentionem  
præduritie non possit, vibrato in cum statum  
incidit. Nulla præterea ratione fiat arterie vibra-  
tus motus. Quocirca hic pulsus qui videtur vi-  
bratione carere, aut extremam imbecillitatem  
virtutis, aut remissionem visus declarat maxi-  
mam. At vibratus si sit, non nihil roboris facul-  
tatem possidere portendit, nec pulsuum visum  
propterea dissolutum existere. Ad eundem modum  
si pulsus citra vibrationem longior sit natura-  
li, angustiorque & humilior, non longissimè ta-  
men à natura in singulis his recesserit, sed ali-  
quantulum: si quidem etiam sit durus, frigidi-  
tatem, vel facultatis imbecillitatem indicat, vel  
vtriusque simul. Atque hæc ex cōsequentiis discer-  
nuntur. Sin verò simul & durus sit, & vibratus, il-  
los significabit affectus, à quibus durus pulsus  
producitur: facultatē tamen uō imbecillam, vt in  
illis, nec dissolutū visum. Quanta verò vtriusque sit  
noxæ, in facultate indicabit vehemētia & remis-  
sionis differentia, vñ cum quantitate ipsius vibra-  
tionis in visu, differentia celeritatis & crebritatis,  
cum vibrationis item quantitate. Reliqua ex an-  
te dictis coniciuntur. Haud aliter si non paulum, nec  
multū tribus differentiis pulsus ille à naturali re-  
cedat, sed mediocriter & moderate, ex dictis no-  
tato discrimina. Celer etiam pulsus dicitur, inter-  
rim cōparatus cum moderato, interim cum quo  
libet alio. Præterea ille ipse moderatus, nūc ab-  
solutē dicitur, quem in optima natura conspici-  
mus: nunc de vnoquoque homine, qui inculcata  
sanitate fruatur. Atque hic ex comparatione ab-  
solutē temperati æstimatur, docetque quale nam  
sit ipsum temperamentum. Ac celerior quidem  
calidior, tardior frigidior temperamentum de-  
clarat. Venim solam non est repente mutationē  
in celeritatem & tarditatem, nec in sanis, nec in  
affectus corporibus. Nam qui calidior est tem-  
peramento, quā simpliciter moderatus, si vi-  
deatur habere celeriorē pulsuum, cum habet ne-  
cessariū maiorem. Et cui pulsus est aliqua ex oc-  
casionē celerior solito, omnino etiam est maior:  
neuter tamen horum necessariū esse crebriori: si-  
quidem crebritas illis, vbi calor accumuletur co-  
piosior, accedit. Itaque cum celeritate, modū ma-  
gnitudinis, modū etiam crebritatis est coniuncta. Si  
militer mutationes in tarditatem pulsuum, par-  
tim ex moderato statim in raritatem simul mu-  
tantur: subinde etiam in paruitatē, vbi amplius  
visus sit imminutus: partim ex statibus nō natu-  
ralibus, nunc aucto visu, sepe vñ cum mutatio-  
ne in paruitatem, interim cum raritate, nonnun-  
quam cum mutatione in vtriusque. Cæterum mu-  
tationes pulsuum ob immixtum visum, in tarda-  
tem fiunt, cum raritate & paruitate. Habes pri-  
mas & simplicissimas pulsuum mutationes in ce-  
leritatem & tarditatem: quæ quarum causæ antecede-  
ntes & primitivæ, eadem inveniuntur ratione,  
atque illas quas de magnitudine & paruitate expo-  
sumus. Mixtæ verò mutationes atque composi-  
tæ, cum vehementia, vel remissione, vel duritie,  
vel mollitudine cōiunguntur. Quæ etiam examina-  
ndæ discernendisque sunt eadem via & ratione, quæ  
cū de longo, angusto & humili disputaremus,  
declaramus. Vt, exempli gratia, si simul & ce-

lerior esse & mollior videatur pulsus, animad-  
vertendum est, tantōne celerior sit, quanto mol-  
lior, an magis. Nam si quanto est mollior, tanto  
etiā celerior sit, à sola mollitudine ipsa mutatio  
est facta. Sin celerior quā mollior, nō à mollitudi-  
ne tantū, sed etiam ab visu aucto. Contrā si mol-  
lior quā celerior, quanto mollior est, tantū  
detrahitur solus visus remissio. Similiter in aliis cō-  
iugationibus danda opera est, vt præpollentem  
causam nitigemus: magnitudinē quarum ex  
proportionis excessu deprehendens. Cum igitur  
in distentione arterie quatuor generales sint  
differentiæ: prima, eademque inter omnes ma-  
ximè pulsuum propria, quæ in qualitate consistit  
motus: secunda, quæ in quantitate distentionis:  
tertia, quæ facultatē: quarta denique & vltima, quæ  
tunicam arterie indicat: hoc certè postremū ge-  
nus, non est proprium pulsuum, sed adventitium.  
Cæterum tum ipsum, tum penultimum genus,  
causam semper à qua gignuntur, manifestè de-  
clarant: duo autem reliqua genera superiora, nō  
perpetuò. Etenim duobus obvenit generibus  
posterioribus, vt ab vna vtriusque causa consti-  
tuitur: primis verò duobus, vt ab omnibus causis,  
quas tres demonstravimus esse: quare in primis  
illis ad inveniendam causam, quæ in vltimis, pluri-  
bus opus est distinctionibus. Porro secundū ge-  
nus, quod circa distentionis quantitatem verita-  
tur, hoc præter cætera habet, quod septem & vi-  
ginti pulsuum differentias cōplecti videtur, quæ  
tamen sunt tres duntaxat. Porro vehemens  
pulsus à facultatis semper robore fit: proinde a-  
quantō vehementior fuerit, tanto facultatis ma-  
ius esse robur significabit: languidus, ex facultatis  
imbecillitate: quare a quantō languidior sit,  
tanto facultatem ostendit imbecilliorē. Haud  
aliter durus pulsus efficitur ab arterie tunica du-  
ra: mollis à molli. Præterea quantitas pulsus du-  
ritie et mollitudinisque, quantitatem duritiæ molli-  
tudinisque arterie declarat. Cæterum qui medius  
est inter durum & mollem, qualis dicitur moder-  
atus, primus natura est inter eos, solisque dicitur  
naturalis. At inter languidum & vehemen-  
tem hac ratione medius est nullus: quod languidus  
sit oriundus ex facultate imbecilla, & deici-  
scente à natura: vehemens autē à firma & reclusa  
sine habente. Verum alio modo, inter languidū  
& vehemētē medius a liquidus esse possit. Modus  
autē dignoscendus per tactum adiubuit est. Nam  
cū à pulsu evertitur, eum vehemētē voca-  
mus: vbi tactus evertit pulsuum, languidum: vbi  
neutrum sit, medium eum pulsuum dicimus inter  
vehemētē & languidum: qui quidem nō alter  
atque languidus, præter naturam est. Porro altera-  
tiones pulsuum, quæ quidem in remissionem  
& vehemētiam fiunt, illæ certè & solæ fre-  
quentius fiunt, hoc est, citra vlla aliarum differ-  
entiarum miscellam, atque etiam ab vna causa:  
vt si cæteris causis naturalibus modum servanti-  
bus, facultatis robur sit paululum auctum, aut  
imminutum: interdum tamen ab vna quidem  
causa gignuntur, at non solæ: quemadmodum  
vbi facultas aut imbecillima, aut robustissima  
effecta fuerit. At mutatio pulsuum in duritiem &  
mollitudinē, si quidem ab vna causa procedat,

*Distentionis ar-  
terie quatuor  
generales sunt  
differentiæ.*

*Quantitas di-  
stentionis ar-  
terie, septem & vi-  
ginti pulsuum  
differentias cō-  
plectitur.*

*Vehementem  
pulsuum à firmi-  
tate semper ro-  
bore fieri.  
Pulsuum durum à  
molli vnde  
proficiunt.*

*Medius pulsus  
qui naturalis  
sit duri nullus  
inter languidum  
& vehemētē  
posse.*

*Medius pulsus  
inter languidum  
& vehemētē  
quemadmodum di-  
gnoscitur.*

omnino aliquod vna generum aliorum mutabitur. Quod si sola consistit, ex concursu plurimum causarum gignitur. Simul autem & sola & ab vna causa nequaquam fiat, nisi minimo plane spacio à natura recesserit. Causae antecedentes quae robur facultatis adaugent, partim in ipso infuso corpore: ac liuiores quidam sunt semicochi & crudi, quia iam concoquantur: & naturae ad iudicationem impetitur: ac praeterea iracundia. Partim adueniunt extrinsecus, ut vinum, cibus, modicae exercitationes, & omnia quae intemperiei corrumpunt. Deprimunt vero facultatem in media, vigilis, sollicitudines, motores, vacuationes immodicae, vehementes dolores, vel cum quadam proprietate accidentis, ut quem stomachici affectus appellant, qui animi deliquium inducit. His adiunge omnia quae cordis vel artenarum creant intemperiem. Mollem reddunt arteniam humidi cibi, frequentiores balneae, somni multi, mollior vita, & deliciae: quae omnia intra septa naturae manent. Praeter naturam autem sunt, simulque idem moliantur, lethargus, coma, hydrops, & si quae sint alia quae largo humore ac maxime pituitoso arteniarum tunicae imbuunt.

Igitur praesentem constitutionem singularum coniunctarum causarum pulsus primam omnium indicat: quae cognita, antecedentes & externae causae, quae coniunctas introduxerunt, depellegenduntur. Atque in hoc praetoriorum praecognitio consistit. Nam futura foris, ex iis quae comitantur dispositiones, praesagia sumuntur.

### GALENI PERGAMENI de praecognitione ex pulsibus, liber secundus.

CONTRACTIO etiam habet et quatuor genera pulsum, quot scilicet dilatio. Siquidem vel locior & tardior, maior & minor, vehementior & languidior (in naturam ipsam spectet rei) sit contractionis motus: ac praeterea etiam arteriae corpus, aut durum, aut molle redditur. Haud dignoscas tamen horum generum, praeter tarditatem & celeritatem, vllum. Porro tum diffentio tum contractio arteniarum, naturalis caloris tuctur medio critate: diffentio, veluti inspiratio quaedam, excessum caloris refrigerando, & ventilatione quod extinguitur incendendo: contractio in modum expirationis fuliginem expurgando. Ergo celeritas contractionis indicio erit fuliginosorum excrementorum ingentem colligi multitudine, expurgatque id temporis, quoad quocumque inueniatur. Tarditas contractio, nec eius multum coactuati excrementi, edoque evacuatione desiderati. Atque acuatior quidem magna copia fuliginis, \* vbi humores putrescent: quo tempore necessum est febres accendi: pauca autem, dum corpus bonos humores continet. In aliis statibus qui medijs inter hos sunt, pro portione singularum statuum. Inter eundem & dormiendum, plus: per vigilas & inedia, minus. Eadem plane ratione pro ciborum natura, ex illis qui prauos humores gignunt, plus: minus ex iis qui probos. In febribus ad eundem modum, in accessionibus, plus: aliis temporibus mi-

nus: adeoque plus ex crasis & lentis humoribus, qui pituitosi sunt, et quos crudos appellant: ex biliosis minus & melancholicis: medio modo ex sanguine, qui & ipse putrescit in inflammationibus: unde oriuntur febres, cum alijs, tum illis, quarum adeo est immodicus ardor, ut eutem deviant, & carbunculos generent. Eisdem ferejaturae sunt herpes depaenctes in omnibus, quippe his, ipsi humores putrescunt. Alio autem modo putrescentes in alperis artens succi, Pulmonem eorum suo vitio contaminant: quod vitus tempore etiam ipsum putrescit. Colliguntur autem in alperis artens id genus succi, vel per distillationem à capite, vel ex plenitudine, vel peripneumonia, vel pulmonis affectu, vel angina, vel ex transalato pure. Originem hunc ducunt putredinis, quod minus probe expuantur. Nam ut sunt vitiosi, & locus calidus, maturam desiderat evacuationem. Subinde etiam fit, ut cum pulmone rumpitur vas, immittat sanguinis aliquid in ipsas artenas asperas: qui quidem diuturnitate putrescens, itabem excitat. Quod etiam deviat celerius, quem vasa emittunt exulcerata. Ergo in omnibus his, contractio arteniarum secundum quantitatem augetur, et si sensu id plane non percipitur. At celeritatis clare incrementum dignoscitur. Nunc ab crebritate, raritatem nos convertamus: quarum duplex est vtrique, quod etiam quietibus conngit arteriae duplicibus effectibus ab diffentione ante contractionem: alteri post contractionem ante diffentionem. At quidam ambabus effectum est commune: aliquid proprium vtrique. Comune, quod duabus de causis abbreviatur, vel quod prior productus sit motus, vel quod sequens anticipet. Contra protenduntur, si vel breuior fuerit prior motus, vel si remoretur posterior. Vtrique proprium, quod denotare possunt. Illud autem ab eis constat significari, quod ex productio altero motu, vel anticipante altero potest prodire aut contra, ab abbreviato altero motu, & morante altero. Quando enim syncerus calor, paucissimisque excrementis pollutus, diffentionem maiorem & celerior concitat: contra qui confusus excrementis est putribus, contractionem: vbi ex anticipatione vel magnitudine diffentionis pulsus creber fuerit, calor purum indicabit plurimum increuisse in corpore. Vbi vero quod maturius incipiat contractio, impuri corporis, atque excrementis referti caloris, arguet. Nec aliter, cum rarior pulsus externa quiete sit: siquidem ob diffentionem breuioratur, indicabit esse refrigeratum calorem: fin ob contractionis moram, humosa imminuta esse excrementa. In quiete interna & diuerso, si ex productione contractionis creber sit pulsus, suppullulare abundantiam humorum excrementorum: si ob maturiorem diffentionem exorsum, auctum calorem esse. At vero cum rarior in hac quiete pulsus est, si ob imminutam contractionem, pauciora excrementa annuntiabit: imminutum calorem esse, si ob diffentionis moram. Quod si coniuncta ambo sint, ut & protendatur motus prior, & alter anticipet, siue in externa hoc quiete, siue accidat in interna, compositum declarauerit affectum ex illis, quorum singulatum significabat vtrunque.

Idem si pulsus sit rarior, in vtra hi coeherent ambo quiete, contractus prior motus, & alternitudo tardatus, erit status tunc quoque duplex, atq; ex utroq; compositus. Cæteri externa quies clare sentitur, interna autem ne obscure quidem. Eam tamen cōiectura quis assequi possit, ex utriusq; motionis impetu. Iam vero contractio ipsa, interm nō tam diuturna est, quā diuturnio: interm x quē diuturna est, cum diuturnior sit, non tamen quintuplo (vt ait Herophilus) sed paulo maior. Inæqualium pulsuum quidam in vno ictu inæqualitatem sentiuntur: alij verò in plurium æceruo, quam collectiuam inæqualitatem appellant. Omnes autem in vniuersum, aut ex obstruccionibus, aut ex compressionibus instrumentorum, aut ab vbiuita humorum, ad facultatem collata, aut cordis inæquali intemperie constant: itaq; inæqualitas in cōmodior, quæ circa vnum pulsuum, quā quæ circa æceruum, versatur. Iam verò intermissio motus arteriæ, siue in vno pulsu, siue conuogata in pluribus, periculosa est aliis inæqualitatibus omnibus. Vt igitur a collectiua (quæ apertior est) auspicemur, facutas ipsa gignit intermittentes pulsus, vel grauata, vel impedita ob crassitudinem aut copiam humorum obstruentium, aut opprimen-  
torum arterias, aut etiam occupantium spacia, in quibus illæ distendi solent. Est cum inflammatio vel scirrhus corpora incumbenta arteriis infestans, earum distentionē coëctat. Si verò ipsarum arteriarum tunicas tale quid occupauerit, malus periculum imminet: si cæci extremum malum, si cordis corpus inuaserit: nam hi subito syncope corripuntur. At interperies cordis nō est periue existialis, sed est longē mitior inflammatione. Cuius quidem interperiei comes facultatis imbecillitas est: pulsusque languidus, præteralem affectum, indicat nihil. Nam moderato cor prædium temperamento, pulsuum e-  
dit vehementem: prauo, languidum. Paruum itaque & languidum pulsuum sola interperies reddit: non tamen continuū inæqualem, nisi humoribus contentis in ipso corde, & in arteriis & venis coniunctis illi, sit facultas inferior: aut etiam ipsius cordis corpus, inæquali intemperie affligatur. Sunt autem raris pulsus intermittentes finitimi: hoc ab eis differentes, quod rhythmum vniuersum amittant. Qui quidem cō periculosiores existunt, quod fuerit ipsa intermissio maior. Porro si arteria duorum pulsuum tem-  
perate moretur, haud scio an quispiam esse super-  
stes possit: ad vnius pulsus tempus, aut paulo amplius, intermittente arteriarum motu, sæpe-  
numero confiximus hominem liberari, præsertim quæm ætatem senilem ageret. Etenim facultates languidæ, à paruis fere occasionebus offenduntur: firmæ autem, tantum delinuntur à maximis. Proinde qui habitus sunt valente, diuig à morbis immunes fuerunt, periclitantur si eis prehendantur. At imbecilli, quiue assidue  
obiciunt ad omnes sunt causas, facillimè reuertuntur: quod scilicet horum nemo, quā à qualibet lædatur vel minima, magnam causam expectet. Itaque intermittentes pulsus minus per-  
niciosos percipiunt senes quā iuuenes: mox

pueri ab illis, quod concoquant digerantq; per-  
halitum, humorum copiam & crassitudinē, quæ  
intemperies inæquales produxit: cum nimirum  
concoctrice facultate sint validissima, corporeq;  
mollissimo, ac facillè perspirabili. Iam verò natu-  
ralis arteriæ motus, sanitatē refert: vitiosus, mor-  
bum: omnino intermissus, mortem. Et quem-  
admodum soluere apoplexiam ingentem quid-  
dem est impossibile, leuem autem non facillè sic  
intermissio diuturna pulsuum vt tollatur, siue  
non potest: brevis autem potest, haud tamen ci-  
tra negotium. Cæterum diuturnam voco, quæ  
excedit duorum pulsuum curriculum: breuiem,  
quæ intra duorum pulsuum tempus manet. Iam  
mora à pulsibus intermittens vt repentina cor  
ripit, non aliter ac ab apoplexia. Vtrobique enim  
cordis calor extinguitur, destitutus respiratio-  
ne. At raritas quidem ab intermittente pulsu di-  
feruntur diuturnitate temporis: interdum enī,  
quod raritas interim habet æqualitatem cōiun-  
ctam omnium ictuum: intermittens autem pul-  
sus necessarii inæqualis existit. Ad hæc, ingens  
frigiditas raris pulsus producit: quæ quidem  
vel corpus cordis, vel sanguinem spirituumq;  
illius, vel \* consentientem ei aliquam partem oc-  
cupat. Si igitur corpus ipsum cordis prehendant,  
ita languidos, tardos, & paruos reddit pulsus,  
vt ipsa præpotens est. Quæ verò à parte profici-  
scitur alia, raritatē longius quā cætera genera,  
à natura auerit. At mors tum minus potest de-  
clinari, vbi frigiditas corpus cordis inuaserit:  
quāq; & repentina etiā in altera differentia ori-  
tur. Ac moriantur quidem priores illi inter dor-  
miendum potius. Alteri autem, hi cum illo mo-  
do, tum etiam inter loquendum. Intermittentes  
pulsus perniciosiores sunt raris: & si quidem ge-  
neratio ipsorum sit raritate producta: solutio  
autem, est reditus quidam per raritatem, in cō-  
moderationem pristinam. Raro pulsus aduer-  
satur creber, si cæti intermittenti intercurrens.  
Fit autem ipse intercurrens ex crebritate inæ-  
quali, quod functionem obeat cor minus ple-  
nam, quā vñs posulet: id quod sit sanè, vbi  
ab humorū colluue oneratum est cor, aut in stru-  
menta obstrueta, aut in artēu coacta. Quæ quid-  
dem causa erat etiā intermittentiū. At disident  
inter se, quod repugnat in intercurrentibus, ac  
deceat cum noxiis causis facultas: in intermit-  
tentibus autē, hoc nō sustineat facere. Quare iu-  
dicationem sæpe amulerunt pulsus intercurren-  
tes. Iam verò omnes ardens inæ febris, pul-  
sum crebrum sentiuntur: quarum quedam extra  
periculum sunt. At qui in syncope sunt crebri pul-  
sus, propter remissionem (quæ perpetuō cōiun-  
cta est cum omnibus syncoptis) existunt peri-  
culosi. Cæteri raritas nunquam vacat periculo,  
sicuti nec remissio, nec paruitas. Sola autem ex-  
trema vehementia in pulsibus, non modò vacat  
periculo, sed est etiam maximè vitilis. Magni-  
tudo autem summa, vbi coniuncta est cum molli-  
tie morbofa, periculum nunciat: si cum salubri  
aliquo arteriæ statu, nihil subest ei mali. Præterea  
veloces pulsus tardis sunt securiores: si quidem  
summa celeritas, summa rarditate est securior.  
Summa quippe rarditas, non secus ac raritas,  
tum

Herophilus.

Collectiua inæ-  
qualitas.  
Inæqualis pul-  
sus vnde g-  
gnatur.

Intermissio ar-  
teriæ periculosa  
est aliis inæ-  
qualitatibus  
omnibus.  
Intermittens  
pulsus vnde  
excitantur.

Interperies cor-  
dis est mitior in-  
flammatione.  
Cordis intem-  
periei comes est  
imbecillitas fa-  
cultatis.

Inæquali pul-  
su gignitur in-  
temperies.

Pulsuum duobus  
motu intertransi-  
sit Calenus do-  
bitat an quip-  
piam videri  
possit.

Valide facultas  
ter talem dis-  
cuntur à ma-  
ximu occasio-  
nibus.

Imbecillitas cor-  
poris cor vbi  
moderant in-  
mores, facili-  
mi reuertatur.

Intermittens  
pulsus mor-  
tem periculosus ob-  
iacet siue cor  
parum, quidem  
vnde.

Pulsus omni-  
no intermissus  
mortem replet.

Raritas ab in-  
termittente pul-  
su quomodo de-  
stinatur.

Rarus pulsus  
vnde excitatur.

Intermittens pul-  
sus cor parum  
fuerit siue raris.

Intermittens pul-  
sus intermissio  
in aduersatur.

Intermittens pul-  
sus vnde cor-  
rumpitur.

Ardens in febris  
nunquam raris  
pulsibus crebris  
fortiuntur.

Raritas pulsus  
nunquam raris  
periculo, siue  
nec remissio,  
nec paruitas.  
Vehemens pul-  
sum est vnde.

Velocis pulsus  
tardis sunt siue  
nom.

tum incidit, cum calor natiuus extinguatur. Celeritatis incrementum procedit ab vii vrgente, atq; à valida facultate. Verum formicans pulsus, nec omnino est celer, nec summum arripit creberrimus. Densus pulsus perinde est, vt mollissimus, periculofus. Nam ex firmitate, aut inflammatione insigni visceris, aut ex contritione per frigus, aut ex siccitate ab ardentissima febre profecta, aut ex valida convulsione hic ex alto comate, & leucopilegmata, atq; ex

*Bernicani pul-  
sus.  
Densissimus pul-  
sus vnde acci-  
dat.*

*Mollissimus pul-  
sus causa.*

*Pulsus omnium  
periculosus.*

*Pulsus vehementi-  
ssimus, opti-  
mus.  
Inequalitas in  
tenuitate in vno  
pulsu, mortis  
nuntiatio.  
Dissimilis inter-  
mittentia, qui  
nuntiatio perni-  
ciosa.*

*Vibratio quid.*

*Inequalitas in  
vno pulsu, tam  
si est quàm col-  
lucta deter-  
ior.*

*Corde facultas*

*Cor moueri ra-  
tione, quatenus  
à particu-  
laribus excitat  
ad motum.*

*Capitans pul-  
sus.*

dicrotus, qui ex genere est intrò retractorum: & comitatur nonnquam inaequalem cordis in-  
temperantiam. Etenim si vni cùnctis, vt quæ-  
dam sint partes cordis præcædix, alie fusosæ  
fulgine prætorcentur, ad contrarios profiliunt  
motus, vt hic quidem distentionem moliantur,  
ille consolidant. Ac tunc hæc distentioni contra-  
ctio potest succedere tribus modis. Primò, cum  
distentionem, prius quàm mensuram impleat,  
contractio exceperit: secundò, vbi profusus com-  
pleta succedat, externa quiete deperdit: tertio  
denique, dum distentionem vñdem perfectam  
contractio retrahit, cæterum debiliorem redditam,  
reliquum permittit compleri. Haud alter enim  
contractioem distentioni, vñne absolutam com-  
sequitur, nec permittit consistere: vñne etiam  
prius quàm sit completa, impeditam & victam  
excipit: vñne quàm retrahit nonnihil, superat-  
tur tamen. Atque hic articularum motus sunt in-  
terdum vel citra affectum cordis, aut propter ea  
rum inaequalem interperiem, aut facultatis im-  
becillitatem, aut etiam duritiem tunc. Porro  
ipsius facultatis essentiam, nihil aliud putamus  
esse, præter qualitatem temperamenti. Tres au-  
tem affectus hæcenus, originemq; bus sententiam  
pulsuum inuenimus: vnam vibrationem, hæc sola  
re ab illis distinctam, quod cum breuitem pulsus  
longitudinem habeat ex vtraque parte arterie,  
obiciat vibratio sit: quamobrem dicrotus, non  
vibratus videtur. Alteram, in qua non vibratus  
est pulsus, sed arteria dura, & imbecilla facultas,  
vt à corporibus decumbentibus opprimatur, as-  
liqua tamen parte iuxta cutem sita, attollitur li-  
berè. Atque hic quidem duo pulsus vno dicroti  
sunt, tum duri. Tertius qui ex intertemperie nasci-  
tur, haud est dicrotus, sed bis modo pulsans, nec  
necessariò durus: postsumus tamen eum dicro-  
tum appellare. Etenim interperiem qua cordis  
corpus affligitur, comitatur pulsus bis senens:  
consequitur etiam ille, cuius externa quies est  
amissa, & cuius impeditur distensio. Est & al-  
iud frequens genus inæqualitatis in vno pulsu,  
vbi arterie principio propinquior pars, prius  
mouetur. In quo genere vñdosus atq; vermicu-  
lans pulsus consistunt, il molli arteria & non va-  
lida facultate profecti. Ac vermiculans quidem,  
non modò non validam, sed infirmam etiam fa-  
cultatem denunciat. Vñdosus autem, interdum  
non satis firmam, ac nonnquam mediocriter  
validam, cum præferum sudorem decretorium  
promittit. In humidis enim reperitur & phtho-  
sis morbis: in quibus etiam tarditatem & rarita-  
tem, magnitudinemq; solet acquirere. Quod si  
alitudinem præterea, & vehementiam sit na-  
ctus, decretorium haud dubie sudorem signifi-  
cat. Magis hic sperandus est, si plures vehemen-  
tes & alii appareant, quàm còtrarij. Qui si æqua-  
liter etiam fiant, salubre simul & breui pollicen-  
tur sudorem, maxime si còcòdonis morbo ap-  
pareat indicia. Vñdosus itaq; pulsus, ex humidis  
molliq; arteria oritur, similisq; ex facultate modi-  
cè affecta: vermiculans autem, ex molli quidem  
verum ex imbecilla insigniter facultate. Quobis  
etiam sine febribus solet superuenire vñdosus  
sive largis euacuacionibus. Decuratorià pulsus

*Dicroti pulsu*

*Essentia facul-  
tatis nihil esse  
aliud præter  
qualitatem tem-  
peramenti.  
Pulsuum bis se-  
nentium quon-  
tationem tres.*

*Vermicani pul-  
sus infirmam fa-  
cultatem denun-  
ciat.*

*Vñdosus pulsus  
quòd sudorem  
decretorium pro-  
mittat.*

*Vñdosus pulsus  
ex humida mol-  
liq; arteria na-  
scitur.*

*Vermicani pul-  
sus sicut cura se  
breui accidet.*

*Decurtatorum  
pulsus duplex  
genus.*

*Decurtatorum  
pulsus duplex  
secundum rationem.*

duplex est genus: alterū in vna distentione, alterum in acervo. Quod in vna distentione fit, facultatis imbecillitatem vna cum corporis gracilitate arguit. Est autem ad modum digiti arteria tangenda. Deinde si animadvertatur interea in arteriæ primis partibus maior pulsus, vel vehementior, vel vterque postremis minor, vel languidior, vel ambo: primus digitorū applicatorum est attollendus, perspicendūque, vtrum similis illi qui antea erat, quā huc sustolleretur, sequentes digiti motū percipiant, an vehementiorem atque maiorem. Ergo si motū similem, digiti sequentes sublati digitorū, sentiant, sua sponte arteria decurtati distentionem habebat: quod nobis infirmæ facultatis à corde prodentis, vestigium erit. Nam illa quando recte se habet, vique ad finem arteriarū omnium contentio quæ attollit eas, similiter permeat. At in pulsibus decurtatis, paulatim remittitur, tantūque efficitur imbecillior solito, quāquam tunc est à principio remota. Quod si elevato tu primo digito, postea motum percipias validiorem, ac maiorem quā antea: declarat ille quidem etiamnum facultatis arteriæ imbecillitatem, sed minorem certè quā alter: quod illic facultas temeretur à principio discedens: hic maneat, quantū in ipsa est, par, sed grauata ab insectis digitis, imbecillius moueatur arteria: quod quidem minus habet periculi. Neque enim ita ipsius cordis, vt arteriæ: quā tangimus, ostendit affectum. Alterum autē, potius cor esse imbecillum significat. Porro si omnino pulsus desiciant, tum multo magis declarabitur facultatis imbecillitas: quo tempore sunt submouendi omnes digiti, ac deus spacio paruo interposito, de integro ad mouēdū. Bisnam autem ipse aboletur pulsus: vel quia prorsus nō pulsant arteriæ, id quod extremum est malum, vel quia pulsant quidem, sed ita languide & parum, vt fugiant sensum: estque sanè hic affectus, si citra deliquim aliquid de animi reputinam accidat, dissimilium. Reciprocatur autē motus, modò ex vltima pulsus abolitione, modò ex paruo pulsu & languido. Sed ille quidem "deficiens reciprocus dicitur, hic reciprocus decurtatus. In huiusmodi testuandis, sic debemus partem componere, quācumque tangamus, vt subter arteriam nostrā sit tactus. Omisū verò sunt pessimi pulsus, qui ab amisso motu minime reciprocantur in verso membro. Minus his, qui in verso illo videntur moveri. Quibus etiam minus, qui sunt decurtati, non tamen perdunt planè omne motum. Iam etiam his minus reciproci decurtati, adeoque si multis simul occurrant digitis. Ceterum numerus digitorū, quibus motus sit occursumus, sius cuique est arteriæ. Ad quē rem magno opere refert naturam tenere ægrotantis. Quibuscūq; enim natura sua pulsus exiit minor: sicuti & aliquibus breuior. Quod si nos nature ipsius ægroti proprietates lateat, ex cōmuniorebus dissentientibus coniecturam faciemus, temperamenti scilicet, & habitudinis corporis. At in temperamento, præsertim calidi & frigidi differentiam expendimus: in habitudine, gracilitatis & corpulentie. Ac fit interdum, vt amba inæquales pulsuum, tum quæ in vno pulsu, tum quæ

in acervo consistit, concurrant. Sepe quoque illa quæ in vno pulsu consistit, nō adeo: quæ autem in acervo, manifestè conspiciunt. Latet autē inæqualitas vnius pulsus, aut ob affectionis exiguitatem, aut ob ipsorum pulsū breuitatē. Vtrūque itaq; genus decurtatorū pulsuum, significat facultatis imbecillitatem. Verū si in vna fiat distentione, etiam gracilitatem indicit. Fit igitur decurtatus pulsus in quibusdam, ex causis præternaturam: in nonnullis tamen inuenitur ex propriæ conformatione: quo modo innuens & circumuens pulsus. Qui quidem fit, si arteria ita sit conformata, vt eius pars duntaxat media, nudæ cuti subiecta sit: partes autē vtrinque aliis demergantur. Quāquam fit etiam ob facultatis imbecillitatem, quæ attollere onus non potest. Ex horum etiam genere est pulsus tremulus, qui non perinde est conspicuus. Quia verò imbecillitatem facultatis sequitur tremor, necessarium est ideo etiam tremulum pulsuum languidum simul & parū esse: quæ de re fugit sensum. Pulsus igitur tremulus, facultatem imbecillam, tunicam arteriæ mollem, corporis gracilem nunciat habitum. Videtur autem quicquæ ordo perturbationi eiusdem generis præstare, propterea quod ordo nature nostræ in primis familiaris existit. Ordo etenim fixam quodāmodo causam esse & perpetuam, indicare videtur: perturbationi autem illius, variantem, nec in vna manentem vel magnitudine, vel specie, vel regione. Ceterum talis causa non perniciosior, sed incertior censenda est. Itaque nihil certi, nihil ordinis perturbationi firmi habet: nec tale, quale ordo, vel bonum, vel malum.

### GAL. DE PRÆCOG. EX PULSIBVS LIB. II. de præcognitione ex pulsibus, liber tertius.

**D**inceps agendum de iis pulsibus est, qui dispositionibus præter naturam peculiaribus existunt. Etenim quicquid præter naturam est, aut affectus sunt, aut causæ horū, aut symptomata. Cū igitur ex affectibus, hi quidem similia sunt, hi autem instrumentorum parum sint proprii: exordiar à similiarum affectibus, qui quidem sunt octo numero, ab intemperie omnes profecti. Quorum quatuor dicuntur simplices, calor, siccitas, frigiditas, humiditas: quatuor compositi, frigiditas siccitati, caliditas siccitati, frigiditas humiditati, caliditas humiditati cōiuncta. At verò pulsus per intemperiem, nisi arteriæ sint affecti, vel cor, alterari nō quebit: possunt tamen arteriæ nihil leso corde affici. At affecto corde vt innoxie permaneat arteria, impossibile est. Ceterū frigida & calida intemperies cordis promptè in omnes arterias permeat: humida & sicca ægrius. Peculiares igitur pulsus copioso calori sunt, magnus, celer & creber. At magnus, non tantū calorem excellentem, sed & instrumenta requirit mollia, facultatēque validam: itaq; non erit calide intemperiei perpetuus. Celer etiam firmam postulat facultatē, ac instrumenta quæ distendantur promptè: quare nec hic quidem perpetuus erit. Creber similiter, si largè

*Decurtatus pul-  
sus significat fa-  
cultatis imbecil-  
litatem.*

*Pulsus innuens  
et circum-  
uens causam.*

*Pulsus tremu-  
lus quid indica-  
ret.*

*Ordo est fami-  
liaris nature  
nostræ.  
Ordo pulsuum  
quid indicet.*

*Perturbatio ut  
dicitur quod fixa  
fuerit.*

*Pulsus aboleri  
bisam.*

*Pulsus deficiens  
reciprocus.  
Pulsus recipro-  
cus decurtatus.  
Arteriæ tāgen-  
do tactus.*

*Rerum præter  
naturā esse tria  
distinguitur, affe-  
ctus, causæ,  
symptomata.  
Affectus similia-  
rium particula-  
rē sunt octo nu-  
mero: quatuor  
simplices, qua-  
tuor compositi.*

*Corde affecto,  
necessarii sunt  
accessarii affectus.  
Calore paulatim  
pulsus qui  
fuit.*

si large vbi à magnitudine & celeritate sit fa-  
ctum satis, nulla si ratione: si non expleatur vi-  
tus, fiat: proinde perpetuus ne in quidem fue-  
rit. Quamobrem ex peculiaribus nullus erit  
inseparabilis. Si igitur calor solus increverit,  
& in naturali statu maneat facultas, instrumenti-  
tque, quum mutato ipsa est parva, magnitu-  
do tantum pulsuum augetur: quum maior, e-  
tiam celeritas: vbi insignis, iam etiam crebri-  
tas. Proinde maximus pulsus, idemque celestis  
nimus & creberrimus, summum incrementum  
caloris significabit. At si celeritimus & creber-  
rimus sit, non autem maximus, hoc nisi fa-  
cultas sit imbecillior, vel arteria durior, accide-  
re nulla alia ratione possit. Similiter vbi ingens  
sit crebritas, nec simul celeritatis & magnitudi-  
nis par incrementum, calorem quidem etiam  
tunc oportet esse copiosum, sed vel facultatis  
imbecillitatem, vel instrumentum durum.  
Ceterum imbecillitas erit adiunctus languis-  
tus: dumtaxat durus pariter & vibratus. Si du-  
rus citra vibrationem sit pulsus, ac summe cre-  
ber, imbecillam facultatem vni cum calore ma-  
gno nuntiabit: & quum talis languidus sit, mi-  
nabitur syncopem. Est autem aliud, cor & in-  
caluere & incaluisse. Extremum vbi à substantia  
quam in suis ventriculis continet, ipsum cor  
caluit, potest firma facultas esse: vbi vero & in-  
caluit, & in eandem incidit caloris intemperan-  
tiam, qua tenebatur sanguis & spiritus ven-  
triculorum, tunc sanè eam intemperiem sequen-  
ter necessariò imbecillitas facultatis. Quod si  
incaluerit largius, & per ipsum totum calor fe-  
brilis permeauerit, febrem excitat hecticam. A  
calore itaque cordis ipsi pulsus variantur. Qui  
quidem calor duplex quum sit, aut est certe à  
pulsibus humonibus generis, unde aciem quili-  
tatem atque fumosam contraxit aut cum a vapi-  
da quadam & suauis humiditate coniunctus,  
sola quantitate à natura recessit. Ille igitur prior  
constans & æque solubilis est secundum autem,  
nò vique adeo obfirmatus: qui quidem balacis,  
exercitationibus, cibo calido, vini potus, atq. ex  
animi affectibus \* niori & iracundia solet in-  
peruenire. Porro calor qui diuersus est à natu-  
ra, breuem habet externam quietem: celerita-  
tem autem, quàm pro portione distentionis, cō-  
tractionem. Qui quantitate sola variat, maio-  
rem, simul & celeritatem distentionem, contra-  
ctione. At qui etiam saliginosus est, longè opti-  
orem distentionem, contractionemque celestima-  
rum reddet. At verò si cor quidem calidi-  
us sit, frigidiores autem arterie, ipsa motuum  
exordia simul, utrobique sient, si modo venæ à  
corde facultatem supra lesionem recipiant. Cor  
tamen singula arterie maiorem, celeritatem, ve-  
hementioremque pulsuum habebit. Extremum mo-  
tus principium à corde illæ omnes habent: æ-  
que autem speciem fortissimè singula, prout cū  
ipso corde temperata consenserint. Porro  
nonnunquam accidit, vt arterie eodem tempo-  
re nò accipiant ex corde influentem facultatem:  
verum quæ cordi propioris sunt, prius: poste-  
riores, quæ remotiores: quod. possumus even-  
tū, si arterie frigidiores & cor imbecillius coi-

uerint. Nonnunquam etiam in corde ipso  
percipitur temperamentorum pugnantia. Nam  
modò frigidus visceris corpus æquo est, &  
in ventriculis contenta subitanea calidior: mo-  
dò è diuerso, substantia frigidior, cor autem  
calidius: vbi etiam pulsus huius moderatè si-  
miles. At vbi aer quem inspiramus, inie-  
ctus putredine sit, putredoque ipsa ad cordis  
corpus pervenit, lebrum pulestem ac leta-  
lem accendit: quæ quidem ex caloris acedine,  
ipsoque caloris genere agnoscitur: & ex pulsu  
etiam, qui parum à natura modo recedens, in  
eodem statu perpetuo manet, quemadmo-  
dum in hecticis febribus, quarum sanè duo  
hæc propria sunt signa, si perpetuo tibi illæ vi-  
deantur similes, nec invagationem vllam æque-  
litionis, nec incrementum, nec vigorem, nec re-  
missionem habeant, nec febriatque, se percipiat  
ægtotus. Hos pulsus nihil est necesse maiore  
iusto, atq. interm nec crebriores quidem esse: at  
omnino celeres tamen, cum febrientium pulsi-  
bus vniuersis ad sit perpetuò celeritas. Ceterum  
quibus puridus ille calor, non corpus corpus  
invasit, sed humores in ventriculis illius conten-  
tos, (depreliduntur enim affectus hanc pelle, si  
febrim primum percipiant, nec dein æqualiter  
semper febriatque, ad hæc, si pulsus non habe-  
ant pervallidum) multi horum feruntur. Fri-  
gidæ intemperaturæ ipsius cordis, pulsus par-  
uos, tardos, atque raros efficiunt. Ac primum sa-  
nè crebritas immutabitur, dein celeritas, ac vlti-  
mò magnitudo, si quidè illæ facultas sit nam si  
ipsa fuerit offensa, ad paritatem & tarditatem  
ponus, quàm ad raritatem pulsus migrabit. Ce-  
terum vbi facultas laboret plurimum, etià con-  
iuncta frigiditas sit, pulsus extemque quidem, si sit  
parus, sed non tardi extremè, nò nonnunquam  
moderatos similes: crebriorem tamen non abin-  
diant priusquam, sed etiam adaugent. At vbi pau-  
lulum debilitata facultas sit, & frigiditas vigeat  
plurimum, longissimè ad raritatem pulsus de-  
scedunt, parum ad paritatem, medio modo  
ad tarditatem. Eodem etiam arterie modo, si  
in nativa temperamento constant, mouebun-  
tur. Nam si corde frigidior existente, ipsæ ca-  
lidiores sicut æquo, tantum alterabunt pulsuum  
illius, quantum à natura recesserint: Vacant hu-  
iusmodi affectus febre, quod, si nò refriger-  
rato corde à lucis frigidis, iisdemque lentis &  
cras. At verò si perinde ut cor arterie etiam  
iusto sint frigidiores, remissionem motuum il-  
lus augebuntque in genere eodem. Accidit  
autem interdum frigidus iusto esse cor, sumi-  
diorumque ex remissionem plenum: quo tem-  
pore pariter & minor & rariò distentio sit, con-  
tractio vero celerior. At si ipsum corpus cor-  
dis incidit in intemperiem aliquam iniqua-  
lem, necesse est pulsus ipsius cordis, adeoque  
arteriarum omnium, variè inæquales fieri. Si  
quidem & collectus, & circa vnum pulsuum in-  
æqualitas, in omni genere accidit, quod \* sub-  
sta sit in magnitudinem, paritatem, celerita-  
tem, tarditatem, remissionem, crebriorem &  
raritatem, mutatio. Verum in duritia & mol-  
litudine, substa mutatio fieri vocam non

Crebi in se  
nonnunquam  
variè tempera  
menta

Pulsuum se  
brum pulsus  
parum à natu-  
rali recedens.  
Hæc tamen se  
brum duo si-  
gna propria.

Febrientium pul-  
sus vniuersis  
ad sit semper ce-  
leritas.

Frigidæ cor-  
dis temperaturæ  
qui comitantur  
pulsus.

Cor, si febrerit  
inæquali intem-  
perie, pulsus vari  
inæquali effi-  
ent.

Calore preclia-  
rium pulsuum  
vbi erit in se  
parabilis.

Hæc tamen febre  
quando excre-  
uit.

Pulsus à calore  
cordis variat.  
Cor, calor du-  
plex.

Arteria habent  
motum princi-  
pium à corde.  
Arteria vltima  
quoniam vltima  
est, omni tempore  
à corde influen-  
tem facultatem  
recipere.



potest. Non vibratus autem interdum & vibratus, subita quadā vicissitudine sese in affectibus excipiunt, adiuncta ad cordis intemperiem duritia vel tensione arteriarum. Porro pulsus bis feriens, intemperiei corporis cordis propriū symptomā est. Cæterū si durities accesserit, iam hoc indiciū labefactatur: nam in dicrorum conueritur cōmune plurium affectuum. At vibratus dicrorus gignitur, vbi pulsus qui modicus est vibratus, demittit in longitudo. Dicrorus verò non vibratus, æquē est ac vibratus durus: sed talis per suam tarditatem efficitur, & corporum omnium incumulentium. Iam verò vbi cordis corpus præter modum est calidum, materia autem contentæ in eo frigidiore, aut etiā partes illi adherentes, tribus id contingere differētiis potest. Aut enim illud tantō calidius est, quāto hæ frigidiore: aut multō illud calidius, quā hæ frigidiore: aut minus illud calidius, quā hæ frigidiore. Quarū prima differētia pulsū repræsentat ad vñguem moderatū, magnitudine, celeritate & crebritate. Ad remissionē autē tantū depellat, quanto spacio naturalem temperatū viscus ipsum reliquit. Sunt autē pestilentes non paucæ febres inde ab initio heclicæ, distāntes ab omnibus aliis febribus, quæ ex magna putredine oriuntur. Præterea maiorem interdum sequuntur & itam à principio quædam heclicæ febres: aliter nescio an inde ab initio fiat heclicæ. At successu temporis, multis aliis succedūt heclicæ, quas perpetuæ æqualitas satis manifeste declarat. Non ita autem firma in huiusmodi affectibus ex vñga quidem Investigari nō potest: ex pulsibus autem in initio adhuc atque primis diebus per febres heclicæ nō facile cōparatur, cū specie cōmūnem habeant tunc cum diutius febribus. Verū elapso triduo, iam clariore sunt etiā pulsū indicio. Siquidem apertē hæ celeriores, quā decet, pulsus habent, tantōq; languidiore iusto, quānim calor increuit. Deinceps de illis febribus dicamus, in quibus cor calidius est, quā vicina frigidiora. Nam in huiusmodi affectibus, pulsus celeriores simul & maiores, & crebriores, languidiore iusto erūt. Longius tamen ad remissionē & celeritatem, minus ad crebritatem & magnitudinē, divertent à natura. Stabilis & cōstans humor generatio est, ut cæterarū heclicarum. Quod si non ita longē viscus à natura desciscat ad calorem, vicina ei longius ad frigiditatem: minores pulsus in his & rariore erunt: at celeritate vel similes erunt naturalibus, vel tardiores. Similes, si non multō frigidiora vicina sint: tardiores, vbi multō longiori intervallo, hæc ad frigiditatem à natura descixerint, quā ad calorem cor. Remissio hīc etiā quantitatē caloris respondebit. At verò si frigidus iusto sit ipsum cordis corpus, materia porro, reliquaq; vicina, eo calidiora, erūt & hīc tres numero differētiæ, & variabunt pulsus in vnaquaq; sicut superiores. Primū æquē refrigeratū sit cor, vt incaluerant vicina: tardior æquo erit pulsus, si insignis fuerit alteratio: cui etiā remissio responderet. Ceterū si viscus sit frigidus omnino, quā postuler naturalis mōdus, & vicina similiter calidiora, febricitabile vtiq; homo,

Pulsus bis feriens, intemperiei corporis cordis propriū symptomā est.

Pestilentes non paucæ febres esse ab initio heclicæ.

Heclicæ febres quædam ab initio fiunt.

Heclicarum febrium notitiā ex vñga in vñga fieri nō possit.

Diaria febris vel putrida quando febri citatis humoribus

nō heclicæ tamen febre, sed vel diaria, vel ea quæ humorū putredinem sequitur. \* Vtriusq; autem sunt propria signa. \* Diariæ quidem cōiunctæ cum frigidiore corpore cordis, si ex æquo à natura vterq; pulsus recesserit, nihilq; magnitudinē à naturali differat, nec crebritate ferē, nec celeritate, nl vtrq; insignis sit mutatio. Erit autem tunc tantō languidior pulsus, quāto viscus frigidus. \* Eius autem quæ humorū putredinem sequitur sunt indicia, par semper magnitudo in pulsū: nō tamen vt in eo qui secundum naturam erat: nec eadē erit paritas in aliis generibus. Verū vbi à natura æ parum recessus est, nihil ferē: vbi maiori intervallo, apertē in contractione pulsus celerior sit. Iam etiā clarē in extrema quiete crebrior & languidior apparet tantō, quāntū refrigeratum est cor. Pingamus rursus, magis refrigeratum cor esse, quā vicina incaluerint, siq; febris eplēmera: horum pulsus manifeste languidiore erunt, & minores: at tardi non peninde apertē, sed \* pro ratione excessus, quo vicinis partibus est cordis corpus frigidus. Si verò sit febris putrida, pulsus languidus aderit, peninde vt superior: sed illo enī minor in distinctione, tardiorque: at contractio naturali celerior erit. Ponatur rursus tertium genus cōmutandōnis, hoc est, minus ad frigiditatem cor declinasse, q̄ ei cōiuncta ad calorem: ac febrē esse diariā: pulsus habebit hoc corpus tantō q̄ par est imbecilliores, quāto corpus cordis fuerit intemperatius: ac maiore & celeriores naturali, sed maiore q̄ celeriores: ad hanc crebriore erunt. Hæc omnia sunt accipienda, pulsibus nec in duritiā, nec in mollitudinem apertē mutatis. Omnes febres diariæ, in magnitudinē, celeritatem, crebritatemq; pulsus, quāntū in ipsis est, mutant. Nam si cōcurrat alius affectus, nullam oportebit mutationē esse, ex illa, & hac, quæ comitatur febrem. Similiter febres heclicæ, pulsus in eadē differētiā conuertit, quāntū in his est: ampliusq; in his mutatur celeritas. At quæ ortæ sunt ex putredine humorū, in vigoribus vtrūq; habent motū celerem, & distinctionis, & contractionis. Præterea crebritatem ex æquo mutant, cū externæ quietis, tum internæ. In initio accessioneis, non peninde, sed magis augent contractionis celeritatem. In incrementis cū hanc, tum etiā externam quietem plurimū concitant, vt pulsus in illa creberrimus esse videatur. Atq; hī pulsus febriū per se sunt proprii. Reliqui omnes qui febriennibus accidunt, alios potius affectus, quā febres, sequuntur. Quorū etiā affectuum sunt duo genera: aut facultatis, aut instrumentorum vitium. Quippe ad causas inveniendas, quæ immutant pulsū, tria hæc sunt animadvertenda, instrumentū, vñga, & facultas. Porro pulsus qui ab inflammatione excitantur, ab iis quoque humorum putredo efficit, sola distinguuntur duritia. Siquidem pulsuum ortorū ex inflammationibus, duritiam occurrit existit. Quare si durum occurrit, quem efficit tensio arteriæ, discernere ab eo vales quæ generat frigiditas atq; duritia, tres prædicere hinc causas præteritis poteris, potum frigidum, meracius vinum, inflammationē. Siquidē indurefcunt ex immodicis frigide potionibus arte-

Diaria febris vel putrida propria signa.

Febris putrida propria signa.

Diaria febris quales pulsus mutant.

Febres putrida quales pulsus mutant.

Causa mutationis pulsus vt instrumentū, vñga, & facultas.

*Heftica febris  
rursum a  
principio oritur.  
Heftica nūquā  
aliter una in  
pulsu, nec vbi  
arrit.  
Celeritas febris  
perit in pro-  
pria.*

*Pulsus in vtrāq;  
parit motu  
lento, accensio-  
nis motu nū-  
ciat.  
Causarum na-  
tura duplex.*

*Causa anacero-  
dinae qua di-  
cuntur.  
Causa exte-  
ria, seu proci-  
perit, i. e. qua  
necitur.*

*Inaequalitas  
pulsuum in vna  
accensio, i.  
qua indicat.*

*Vigor accensio-  
nis qua fit.*

*Causa in duri-  
tate arteriarum  
qua fit.*

arteriarum tunicae, & à vino immodicè poro ex-  
icantur. Iam verò febris heftica + rarisime à  
principio oritur, quamquam eo tempore non-  
nunquam finit. Ad hæc, nec magnus pul-  
sus, nec vehemens, vñquam cum febribus hefti-  
cis coërit: sed si altervtrum habeant horum, mi-  
nime sanè sunt hefticæ. Si simul vtrūq; habeant,  
plane sunt duriæ, si quidem eorum contractio  
non properet. Propria est enim eius quæ sequi-  
tur putredinem humorū, celeritas. Cæterum in  
remissionibus accessio aut, celeritas contractio-  
nis exoluitur: ininò autem gignitur, ac per incre-  
mentum augeatur. At vbi iam propè vigor adue-  
nit, iugeus incrementū suscipit distentionis cele-  
ritas, contractiois pari celeritate manente. Vbi  
verò viget iam plane febris, in illa accessione  
ad summā celeritatem distentio pervenit, immi-  
nuiturq; celeritas contritio. At verò pulsus  
in vtrāq; partem mutatio (si adiecerimus \* dis-  
tentionē) accessiois iuthum nunciat. \* Disten-  
ctio autē ipsa erit, si mutatio citra alienam occa-  
sionem acciderit. Atq; occasiones quidem ipsæ,  
partim externæ sunt, partim ab ipso corpore o-  
riuntur: quarum vtrāq; sunt notæ. Verum cla-  
rioris doctrinæ gratia, appellabimus quæ proce-  
dunt ex corpore causas, vnde vel facultas, vel in-  
strumenta alterantur, aut cedentes: harum autē  
ipsarū causas, quæ extra corpus posite induxe-  
runt alterationem, externas, seu procaciteticas.  
Porro inaequalitas pulsū, quæ serè invadit vñ  
cum accessioibus, compressarū vel obstructa-  
rum modò arteriarū, vel copix humorū oppri-  
mentium facultatē, est signum. Quæ igitur pul-  
sum mutationes sunt, dum cordis calor auge-  
tur, aut confluit in totū humores, apertæ ac-  
cessionis initium annunciant, si quidem ab aliis oc-  
casioneibus finit remotæ. Exsumat autem con-  
venit, vbi æcerus materix humidæ initio ac-  
cessionis ad cor pervenit, in primis quidem, mor-  
tis periculū esse: quod periculum maxima muta-  
tio pulsuum in raritatē, tarditatē, parvitatēq;  
prænuñciat. Nam si his insignis remissio succel-  
serit, ex templo peribunt. Sin autem abrit remis-  
sio, contendit natura eam superare, atq; arteria-  
rum motū maiorem, celeriorē, crebriorēq; ex-  
citāt: vtrāq; motus celerior quidē fiat, sed cla-  
rius contractiois, incrementūque breui manife-  
stē, donec augeat accensio. Tandem vbi mate-  
riam superaverit, calor quasi flamma succēditur:  
atq; in est vigor accessiois, vbi fuliginosum natu-  
ra excrementū, expiratione & cōtractione ar-  
teriarū expellit. Quod verò est veluti cineritum,  
sed per insignes quosdam meatus educit. Hoc in  
partibus inflammatis, pus est in ipsis vasis, sedi-  
mentū vrinx. At si cor siccius quā pro modo  
naturæ evaserit, vñ secum omnes alterabit  
arterias: id quod interdum in vna animalis par-  
te ipsis arteriis accidit, interdum autem in plu-  
ribus. Est cum sint contra quā cor affectū ipsæ  
arteriæ, sed tamen eius affectionē recipiūt: ita vt  
conferat illis medius quidam affectus in humi-  
ditate siccitatēq;. Præcedentes causæ quæ indu-  
rant arterias, sunt aqua sulfurea aluminosūq;, &  
omnia breviter quæ exicandi vim possident.

Quæ quidem interiores vbiuicque arterias in-  
valent, pulsū reddit duriorē. \* In corde autem  
siccā intemperie productū siccā victus ra-  
tio, diutius administrata: præterea medicamen-  
torū exiccantū tumulus tum pono, in quibus  
est vinū merum: ad hæc cibi potioniq; abstinentia,  
immodicus labor, senilū, solitudo, tristitia,  
diuturnæ vigilix, febris heftica, præq; cæteris,  
marida. Causæ humidæ intemperiei sunt oedema-  
mata, quæ partes diutius tenuerunt: leucopile-  
gmatis, quæ ipsum etiam cor mutāt: omnia de-  
niq; principum viscerum oedemata cum arterias  
humectant & cor, tum pulsus efficiunt molles.  
Pulsuum causæ mollitudinis medicis sunt, ci-  
borum copia humidorū, multū otium, somnus  
longus, balneæ à cibo. At durior pulsuum causa  
ostendimus esse parvitatē, vt mollum magni-  
tudinem \* comitem: quas quidem celeritas atq;  
tarditas, crebritasq; & rarietas cōsequuntur. Sunt  
autē primæ ac veluti cōiunctæ causæ generatio-  
nis pulsū, vñus atq; facultas. Porro in corde nō  
excitantur tumores, qui pulsū duriorē efficiant,  
quemadmodū in aliis visceribus inflammationes  
& scirrhi: siquidem prius homo correptus syn-  
cope intereat, in illorum tumorum auspiciis.

### GALENI PERGAMENTI de præcognitione ex pulsibus, li- ber quartus.

Eliguum autem in hoc libro fuerit, cæte-  
rarum partium dispositionē, quibus cor  
consentientis cōmutat pulsus, omnes expli-  
care suo ordine: vbi hoc ante omnia admonue-  
rimus, totius corporis pulsus, antequam cor con-  
sentiat parti prius affectæ, fieri nō posse vt in cō-  
munem alterationē trahatur: in parte tamen ali-  
qua, licet oñsionē cor non percipiat, arteria-  
rum motus variari posse. Partes animalis respi-  
rationi seruientes duæ tantū sunt, pulmo & tho-  
rax. Nutritionis multo plura quā duo intri-  
amenta, iecur, ventriculus, intestina, lien, renes, &  
vtrāq; vesica. Celerrimam cordi & omnī maxi-  
mam uiam, dat pulmo. Sedem habet enim om-  
nium ei cōiunctissimam, illig vasis maximæ af-  
finis est, & confluens per maximā ostiā in ventri-  
culos eius. Quamobrem si quando solito cali-  
dior evaserit, continuò cor calfacit: si vti & re-  
frigerat, frigidior efficitur. At humiditatis & sic-  
citatē intemperiem, uou perinde ac illas, sed citi-  
us etiam has tamen, quā cætera instrumenta,  
impartit. Vbi igitur bb pulmonē exalfactū, cor  
prauum calorem contraxerit, pulsus efficit, qua-  
les solet vñus auctus efficeret. Qui affectus si sit  
diuturnior, in periculū vocabitur illud, ne in fe-  
brem hefticam incidat. Atq; perinde respiratio  
& pulsus alterabuntur, siue solim per se cor in-  
temperatum sit, siue consentiat pulmoni. Maio-  
rem tamē in toto sinu thoracis æstus percipiet,  
qui ex pulmone laborat, calidiusq; plane expira-  
bit, & sinit etiam altero magis, & calidioribus &  
ritu fauibus atq; bugna, eaq; maior ex parte sic-  
cior eritq; si ingrauescat malum, cum alpredine  
quadam nigrescat. At si pulmo refrigeratus sit,  
cor ei consentiens, pulsus primò in eam altera-  
tionem adducet, quæ vñus exolutum consequi-

*Correptum  
qua prius.*

*Humida intem-  
peria causa.*

*Pulsus molli-  
or duri qua  
efficitur.*

*Pulsus generati-  
onis prima  
causa est, vñus  
atq; facultas.  
Certe nūquā  
obvius tumo-  
res qui pulsus  
duriorē efficiant.*

*Pulsus totius  
corporis, ante-  
quam cor oñs  
trahat parti prius  
affectæ, pertra-  
hi in cōmunem  
alterationem  
non possit.  
Respiratio  
organum.  
Nutritum or-  
ganum.  
Pulmonis sima.*

*Cor pulmoni  
in vna parte  
pulvis pulvis  
siccus.*

*Pulmonis cell-  
ula maiore  
felli nota.*

tur: processu temporis, vbi hec tunc frigiditate contracti, pulsus excipit, quales huic, si polleat, tribuuntur. Ceterū quibus primus refrigeratus est pulmo, frigidam respirationē persequitur. Si siccitate fuerit imtemperatus pulmo, à primo pulsus penè nihil mutabit: tandē cōsente illi corde, ipsos duiores efficiet. His fauces, ramentū nihil linant, promptē arefēt. Humida imtemperies vuidas reddit fauces, siccū exinguit, temporeq; ad mollitudinem pulsus ipsos traducit. Atq; ex simplicibus his, discernere cōpositas imtemperies licebit. At verō fluxionū omnīū quæ in pulmone impingunt, cōmūis est inæqualitas pulsū: verū minor quidē, à subtilibus simul & paucis: insignior autē à crasis & viscidis, copiosis fluxionibus, pñficiūtur: quod videlicet hī magis obstruant, grauent, & cōprimant. Duriore q; oportet fiant pulsus, per imtemperiem siccā, & inflāmatos induratosq; tumores pulmonis: contra, molliores, per edematā. Frigida intēperies parū, tardā, rarāq; respirationē gignit, non aliter ac pulsus. At fluxiones frigidæ, pulsus similes mutant: respirationē autē, nec parū, nec tardā, nec rarā reddunt. Quia enim cōstrictus pulmo est, paucus spiritus recipitur: qui cū naturæ nō faciat satis, cōtingit vt altera cūo, itatim celeris efficiatur & magna. Respirationis itaq; species est omnibus fluxionibus eadem: non omnibus accidit similiter suffocatio, \* sed calidioribus omnibus magis: quidē quidem largiore attrahi spiritū natura nō postulat. Solā imtemperiem nullū suffocationis periculū excipit. Porro si arteriæ tantū asperæ sint oppletæ, nihil pulsus duritia variant: sin læues, quia totius animantis artēx intēduntur, pulsū efficiunt duriore. Imtemperies thoracis eisdem alterationibus inducitur, ac paulū antē illæ pulmonis: tumores, pro multitudine & genere humorū qui efficiunt eos. Variat autē, quod cinus cor, ac magis pulmonē q; thoracē consentiat: & quod interim pars thoracis affecta sit = musculus, interim succingens costas mēbrana. Maior siquidem tensio oritur, vbi duræ partes & spissæ intumescūt. Vnde etiam pleuritidis semper duriore pulsū quā peripneumonicū habent: æqualem tamen, nō vt illi inæqualem. Iecinore affecto pulsus ex intēperie variant, vt superius docuimus. Si excitati sint tumores præter naturā, conueniūt serē etiā in his, sed minus ex inflammātionib; indurecūt, quā ex thoracis inflammātionibus, & tantū quidē, quantū quā ex pulmonis magis. Nunq; autem ex thoracis vel iccinoris tumores pulsus molles gignunt, quod nec instrumenta ea vnq; edematē pūritio affligantur. At cor cōsentit iccinori, vinculo caux venæ. Consentit atq; septo transverso cor præter omnes alias thoracis partes, quod ex ipsa caua vena in illud venæ inferantur. Tensionē verō nullā perinde alla pars infert arteriis, præcipue si nervosa eius pars sit affecta. Quod si à solis excrementis \* quæ in eo gignantur, absq; febre inten datur, dolor ac dyspnœa ab ipso principio oriatur, postea putrescentibus excrementis febricitabit. Si ex fluxione quæ alundē in ipsum decumbit (omnino autē hæc sit vel sanguis bilis, vel calidi sanguinis & tenuis oportet

nam crassum sanguinē & pūritatē lentā, propter densitatē, nunq; recipiat) necessariō ibi delirabunt, pulsūq; habebūt insigniter durū: itaq; etiam parū, ac proinde cerebrinū, cūm animū etiā copiosus sit calor. Iam verō omnia quæ magnis pleuritidibus accidunt, respondent symptomatibus partis nervosæ septi transversī: tum quod succingens costas tunica multis nervis prædita sit, tum quod adhæret septo transverso, membranisq; thoracē interfecitibus, per quas ad cor cōnnuatur. Ac maximū sanē indicium ex tialis pleuritidis est, si pulsus sit magnopere durus, ob idq; similiter parvus, & ob ambo hæc, calor emq; cerebrinus. Pleuriticus nanq; cum tali pulsū est nullus vnq; seruat. Ceterū hī minus, quā quibus inflammāti est septū transversū, delirant: siquidem propius accedit ad cerebrum, diaphragmatis nervorū exortus. Ventriculus imtemperie affectus, pulsus ita vt superiora immutabit. Si tumore secundū fundum, aliorū more. Si ad eius os in consistit, pulsus ob nervorū multitudinem erit durius: non ita durus tamen vt ex septo transverso, aut costas succingente membrana. Siquidem quia nō nervi insigni sensu præditi futuri erant, ob id molles & magni sunt cōditi, atq; à principio ipso producti. Ignor ob mollitiē ipsā, & quod ea pars sit carnea, nunq; ex ore vetriculi ita durus sit pulsus, sed tum parvus, tum creber: quia propter eximīū sensum deo fatigatur spīritū, deicūtiq; facultas: quæ quidem paupis per quidem illic copiam humorū sustinet, sed degrauiatur, pulsūq; inæquales, atq; interdum languidos efficit. Cetera instrumenta nutritionis, quæ propiora quā sunt cordi, & magnis vasīs ei copulata, celerius & magis id in cōsensum trahent: quæ remoniora sunt, & parvis affixa, minus & tardius. Eodem modo quæ dura & cōtenta, nervisq; prædita sunt plurimis duris, facili hæc duos pulsus efficiunt: quæ contra, molles. Quæ sensu vigent, vtroq; in cōmodo facultatem efficiunt. Porro qui inclusi in spissioribus corporibus & conspatiuntur humores, iū maiorem dolorem, q; qui in rarioribus & mollioribus sunt, concitant. At verō si cerebrū, aut illius etis meninges, laborēt inflammāone, necessariō febris atq; delirīū sequitur: nō necessariō autem per aliarū capitis partiū inflammātionē. Nam musculorū temporalū inflammātionē, si magnæ sint, febres, deliria, spasmos, soporēq; frequenter inducūt, non tamen semper: quippe si parus sint, nunq; talia symptomata excitant. Cerebrū ipsum vbi in morbofā imtemperiem incurrat, symptomata necessariō, qd imtemperie familia re est, inducit: in calidioribus immoderatis, si quando soli per se acciderint, delirīū siccitā cōstitūti, vni cum vigiliis. Vigilia siquidem proprium est siccitans symptoma: vt humiditas, somnus profundus: ac refrigerationis, faruitas. Ceterū si cum frigiditate humiditas coeat, altus sopor inducitur. Si verō longē calidus humidusq; cerebrū, qd sit quē, evaserit, sopor vigiliis atq; delirio iūctus oritur. Vehemēs frigiditas cerebri, siccitā cōvenit, morā prius universū corpus. Si cerebrū à modū calidū sit, nec addit siccitā, in cōsistētia arteriū pulsus moderati erūt: magnitudine verō,

Fluxionum omnium in pulmo nem inuenitur, cūmuna q; mæ qualitas pulsuum.

Pulmo frigida fluxione inficitur, tū quasi edat respirationem.

Fluxiones calidas pulmonis eadē conueniūt species respirationis.

Thoracis intemperies, tumoresq; quæ quali pulsus alterationē inducunt.

Iecinor affectionem qualem pulsus producat.

Edematē nec thoracem, nec iccinor inficitur vagant. Cor cōsentit hepatis, vinculo caux venæ. Cor qualescūt cōsentit septo transversū.

Septi transversī, si affectus, vt pulsus variat.

Pleuritidis talem qui pulsus significat.

Diaphragma inflammatur cor deliria facit. Ventriculus afficitur qualem pulsus efficit.

Ovis ventriculi necno qualem.

Cerebri aut ne nervorum inflā mationem nec faciū febris atq; delirium sequitur.

Cerebrum aut perit afflicto qualem symptoma indicat. Vigiliae rede.

Somnus profusus, faruitas, Vigiliæ sopor.

verò, celeritate, & crebriitate hæc tunc superabunt, quatenus præcursus calor nanquā excesserit. Si non modò sit calidus, sed siccus præter naturam, statim vitæ etiam tenuis minime, quæ tegit cerebrum, in eandem affectionem incidit, vnaque cum ex omnes nervi atque arteriæ inde pulsus nascitur durior, quæ eandem tumorem excutit & contenditur. Quod si ex bilioso humore asplectitur cerebrum in affectu calidi & sicci devenit, tunc magis tenditur arteria, si vero ex calido ac velut si feruētis sanguinis, siccitas minor & maior tunc est ipsas meningas corripit, cum nervos atque etiam arterias. Si igitur arteriæ corpus cum siccitate videtur durius, altervtrū est eulibet modū obasidendi ipsius cerebrum, vel intemperiem calidam & siccam, vel copiam bilii inflammationem autem, si cum tensione. At si cum ambabua dispositionibus, affectus puta consistat esse ex sanguineo & bilioso humore. Ac delirant sane omnes in hunc modū affectus: modicè tamen qui sola intemperie laborant, habentque infirmas omnes voluntarias actiones. Qui verò a bilioso humore affliguntur, non eas habent infirmas, sed delirant impetuosè. Qui ex atra bile feruēte ob putredinem id patiuntur, facili mente alienantur: quorum pulsus etiam sunt duri, siccitatis atque tensionis ratione: simulque parvi ob duriem, & iusto celeriores, quia februnt: nec non crebri, quod vili non fiat satis. Humidæ intemperantix cerebrum, molles tempore efficiunt pulsus, somnolentiamque hominē. Si ad illas febrilis calor accesserit, morbus appellatur lethargus, pulsusque speciatim referat arteriæ cōtente, quanquā illa sit mollis. At magni pulsus in morbis hæc omnibus hætenus erit, quatenus auctus sit calor. Celeritas aut omnino minima est, aut hæc nihil profusus intēditur: crebriatque similiter. Si vero ex bile simul & pituita ipse affectus sit mistus, nec profusus vigilant, nec alio sapore tenditur, sed somnolenti desipiunt, genalique atrollere nequeunt: quare pulsus eorum etiam sunt miscellanei. Si morbo frigida citra materiam in cerebro oriantur, cui cor cōsentiens, & minores, tardiores, atque rariiores in quo pulsus ædētur, idque absque ulla tensione. Sin autem cum ea intemperie materia etiam melancholica affluerit, aut crassa & glutinosa pituita, fiet ut arteriæ tendatur, ac proinde pulsus durior videatur. Si humida & sturulentia pituita comitata sit intemperiem, sine tensione mollior pulsabit arteria: Si mista fuerit pituita, simul mollis erit, & nonnihil intensus pulsus. Neque autem obscurus est, quin si pulsus sit mollior, erit etiam maior quā antea. Subtilia meminxit quæ a diffusionē cerebrum, absque illo perpeti dictorum quicquid non potest, neque enim absque meningē cerebrum dedit statim huius affectu vltro citroque communicant. At dura meningis, quia longissimè a cerebro distat, est, affecta esse sola potest. Genius affectus si insignis sit, ut cor ad cōsensum atque arteriæ sollicitet, pulsus, quemamodum in affectibus cerebrum, alterabuntur. Calidi itaque affectus illius vim augent: frigidi cum hūc remittunt, tum arterias sensum indurunt, præcipue eas quæ corde sunt aliores. Sicci intenti & duri pulsus efficiunt, huiusmodi molles: artem non ita molles & duri, ut cerebrum, sed duriores & minua mollem. Si quidem corpora sua sponte dura, si ipse affectus indurantes

inciderint, maximè cōtrahent duriem. Quæ autem natura sunt mollia, si iu humectantes & soluteres incurrit, semel remittuntur atque mollescit. Sin dura arripitur affectibus humectantibus, aut mollia indurantibus, nequaquam affequeuntur extremū sibi cōtrarium statum. Porro qui cerebrum & pulmonis gratia molles sunt pulsus, ita sunt molles, ut nullus alius. His præ ceteris vicinior est ille, qui ex ieciniore & bene oritur a demata affectis. Nam scirrhus etiam hæc viscera obfusa, pulsus satis duros efficiunt: minua, si sint inflāmata, quæ laborant scirrhus. Cerebrum atque pulmo, fortassis ne scirrhus quidem admittunt duris enim corporibus & spissis huius affectus, non rarie & mollescentes familiariter existit. Ignorant affectus supra omnem modū frigidi, pulsus duros efficiunt, alioquin nequaquam. Ad hæc autem viciniores affectus, promptius in mollitudinem atque duriem transiunt. Quæ verò longius distat sunt, aut si cor interpositum addit, minus: Quod si tenes, non est quoddam dubium in cetera morbis facies, colli, & artuum, quales pulsus gi gnantur. Nam pars affecta si sit spissa atque dura, pulsus efficiunt duros, siue inflāmata, siue scirrhus affectus, siue supra modum refrigerata ipsas arterias sollicitet. Si sit carnosior, atque vel inflāmata sit, vel scirrhus induruerit, duros quidem, sed minua superioribus. Sin ordema habuerit, molles. Cōsistent autem arteriosis celerius vicinæ omnes ar teriæ, & cor venosæ secundū has: tardissimè autem nervosæ. Iam verò cum insigni lien scirrhus esset affectus, frequenter cōspeximus non cōfite curam aquil inter cutē, quæ indurata ieciniore ne cessariò succedit, sitque tum pulsus prædictus signa vtriusque affectus, existens partim mollis, partim durus & tensus. Oritur porro hydrops ob hæmorrhoidum mensuram immo dū vacuum est, aut suppressionē insoluit. Tenses, verū extra inguina sunt, statim tamē febres propter vasa viciniora accendunt. Etiam superne a renū regionibus vena & arteria descendunt per peritonæi foramina ad testes, vasa sanè magnitudine insigni. Præterea ipsa erythroides tunica adnata peritonæo est: ob idque si sit inflāmata, pulsus efficiunt duri, ac proinde minores. A testibus inflāmata non perinde durus oritur, sed magna tamen, febres ratio ne. Quæ enim partes arteriosæ & venosæ sunt, maiores pulsus excitant: quæ nervosæ, aut omnino nihil, aut paruos ac terenos & spissimos generant. Ac præsentem quidē cognoscio nihil est aliud, quæ affectu invēno. Cognoscio autem præteritorem est invenno causam, quæ induxerit affectus. At ex præsentibus præsigna a futurorum sumuntur. Vnde igitur ac primū quod præcognoscere cupimus, est, qualē exitū habiturus sit morbus. Secundū, quo tempore iudicabitur ad salutē aut mortē. Tertium, quoniam modus erit aut salutis, aut mortis. Quæ omnia ex dispositionibus præsignantur, ex quibus morbi genus, & facultatis imbecillitas, vel robor, dignoscitur. Morb. porro cognoscitur ex loco affectu, eiusque dispositione. Facultas ex eodem modo temperamento, vel intemperie corporis solidiorū. Nam si imbecillitates quedam ob spiritū acciderit animalē, breves sunt illæ, & symptomata ratione cōsequuntur. Ergo si facultas visum morbi sit sustinendo; homo necessariò servabitur: si

Pulsus mollis, si morbus esse, qui ex affectu cerebrum & pulmonis oritur.

Scirrhus duri tantis corporibus, familiariter existit.

Partes spissas et duras, pulsus duri efficiunt.

Aquam inter cutē foras, non foras indurata venosæ.

Hydrops testis. Testes inflāmati esse statim febres accendunt.

Cognoscere quo tempore optineat.

Morb. vnde cognoscitur. Facultas vnde cognoscitur. Saluti sive quandoque ad salutē, et quando sit deplacata.

Duriorum quæ arteriæ affectus signatur.

Cerebri intemperiem humida quæ signatur. Lethargus quæ de signatur.

Meningis tenues affectus non possunt esse, cerebrum, brevis atque huiusmodi illa. Meningis durior affectus quæ pulsus signatur.

quidem nihil \* delectū fuerit extrinsecus. Sin autem facultas sit impar moriatur in est necesse. Si verò qui sunt evaluri, co liberabuntur tempore, quo natura morbi superauerit \* abfolutissimè. Qui autē sunt morituri, nunc peribunt sanè, cum facultas adeo vincetur à morbo, vt functio aliqua necessarii ad vitā penitus extinguatur. At ratio tum salutis, tum morbi, indidem etiā præficietur. Porro functiones requirunt ad vitam, vbi extinguuntur, hæc quidē suffocant, hæc vitalem facultatē prosterunt: alie simul & hanc prosterunt & suffocant. Quæ igitur facultatem vitalem suffocant, à thoracis, pulmonis, asperæ arteriæ, gutturis, fauciumque procedunt dispositionibus, nonnullæ enī in ipso corde consistunt. Quæ facultatē prosterunt, ab stomachicis dispositionibus (quas sequitur syncope) hepaticis distentionibus, ob quas \* oborū visu nō pmouetur, præterea ex longis doloribus, vel vehemētibz, ad hæc ex omnibus hæc febribz, ac breuiter cordis ingenti intemperie ortæ, deiciunt illam. Similiter animalis facultatis imbecillitas quidē comitantur maximas intemperantias cerebri: quæ verò veluti suffocationes sunt, tum repletiones vetriculosos illius, obstructionisq; meatuū illuc ducentium. Proinde cum status facultatis ad vnguæ pīpētus sit, locūq; affectus, a ciliis disposito, hæc ad futura prænoscentia peritissimus erit. Cognoscitur autē ipsa facultas & ex actionibus, & ex intemperie agentium. At verò vbi oēs pulsus per se languidi sunt, facultas vitalis est imbecilla: id quod accidet per vniuersum corpus, si ipsum cordis corpus intemperatum fuerit: in vna parte, si sola illa pars. Vbi verò earundē arteriarum nunc languidus pulsus sit, nunc vehemēs, facultas nō est per se quidē imbecilla, sed ab vndāntia humorum degenerat: quæ inæqualitas ob eandē occasionem fit & in cæteris differentiis pulsuum. Ceterū si pulsus vehementes & magni, numero contrarios vincat, minus facultas à copia ipsa offenditur: sin parui & languidi, magni. Præterea inæquales in vno ictu, si fines motuum validiores & celeriores efficiat, nūciat facultatē robustiorem ceteris, quæ languidiore & tardiores effecerint. Si verò in tali constitutione alius pulsus videatur, statim is magnus erit, ostendēq; naturam plenitudine superiorem. At languidus pulsus nunq̃ alius existet. Verū magis & minus vehemēs, quò aliorū simul & vehemērior evalent, robur facultatis, motūq; minimè impeditum declarat. Omnes igitur liuiscemodi pulsus iudicium morbi cum excretionē futurum indicat. Quare contractionis motus est spectandus: ea siquidē semper abicit priorem illam celeritatem, idq; nunc magis, nunc minus. Melior autē iudicio expectant soler, contractionis celeritate plus exoluta. Quod si etiā signa cōcoctionis accesserint, optimam iudicationem hæc status pmittit. At pulsus magnus & vehemēs, si non præcedat eum inæqualitas, non semper excretionem portendit. Alti autem semper quidem, sed si inæqualitas nō præcesserit, modicas excretiones præuinciat: copiosas, cū multas sequatur inæqualitates, quæ declarant facultatem copia onerari. Non est autem eadem facultas vitalis & nutritiua, natura-

liuē. Illius siquidē hoc vñ opus est, generatio pulsus. Naturalis, id qd familiare est ad nutrimentum, allicere, & qd est alienū, excernere: præterea retinere, alteratq; familiare alimentum. Hæc appē ad nutrienda corpora desiderantur, sicut ad natū caloris mediocritatem tuendam, distictio & cōtractio cordis & arteriarum. Quam facultatem neq; in stirpibz, in veniis, neq; in animalibus frigidis: cuius generis sunt ostra, & quæ petri, vel alius solidis corporibus adnascuntur. Animalia calida, maxime sanguine prædita, apertissimā hanc facultatē, & vehemētissimā obtinent. Hæc in cōtractio nibz pulsuum tanq̃m erit excernit, merum fuliginosum, qd obesse potest caloris mēdiocritati in distictio nibz item, qd se refrigeret, allicit. Altera facultas nutritiua, conueniētiā attrahit alimentum, excernitq; in commodum. Distincta igitur facultatum principia sunt, ipse tñ mutuo in singulis instrumentis inter se cōfunduntur. Nam arteriæ, quatenus nutrantur, facultate nutritoria gubernantur: cuius excernere alimen- & excernere est munus: quæ ad modum alterius vitalis, fuliginosa excrementa expellere. Quæ cū ab vndant, maxime à simul & celeritatem cōtractionem ipse artemq; moluntur. Vbi verò nullā hæc excrementa fuerint, humores autem, qui putrefecit ante, sint affectu cōctionem, ab altera naturali vbi cōcoctionē excrementa expellunt. Quæ facultas sanè nō per solas arterias & venas dispergitur, sed per omnia animalium membra, pēq; carnem, neruon, ligamenta & ossa, diffeminatur. Hæc igitur est illa facultas, quæ iudicationes efficit: cuius quatenus arteriæ participes sunt, nutrimenti excrementum expellunt. Altera facultate pulsatrice, quam solæ ipse obtinent, in cōtractionibus recrementum fuliginosum expellunt: distentionibus autem refrigerium allicit. At vñ nō perpetuo per vniuersū est actionis, sed præpollentis vius excellit nonnunq̃. Itaq; ex se etiam pulsus figurat, si quidem et facultas respōdeat. At verò si humidum excrementum præpollat, cōtrahitur plurimum: distenditur autem nō plurimum cor cum arteriis, sed hætenus distenditur, vt satis refrigerari ab extrema cōtractione suppetat iis. Sin autem paucus fuerit humoris calor, copiosissimus aut mundus & purus & quasi flammæus, in plurimum distenduntur: at contrahuntur eatenus, quatenus satiat fiat alteri vsui. Quare semper quæ magnitudine distentio fit & cōtractio, nisi casu nobis admoventibus digitis, fiat repentina mutatio. Vnde alius pulsus excretionem significat, cōcoctus qui inducunt febrem humoribus superveniens. Semper enim omnis excretio, nature lege pfecta, sequitur cōcoctionem: quippe secum dum ventrem conspicitur natura excrementū à cōcoctione excernere. Cæteras excretionē quæ cibi cōcoctionem præcedunt, nunc q; vellat ab illis quæ cōtinent, nunc q; degenerat, ante tempus cōcoctionis molitocogitur. Haud alter totus corporis facultas, potestquam satis familiare succum singularum partium concoxit, tum demum excrementum excernit, nisi quid eam irritet importunè. Copia excrementorum, tum ex plethoricis signis quæ præcesserunt, tum ex præfenti caloris inflammatione

Facultas vitalis opus. Facultas ad vitalis opera.

Facultas vitalis quibus necesse, & quæ petri, vel alius solidis corporibus adnascuntur.

Contractio arteriarum erit in fuliginosum. Distinctio erit arteriarum attrahit alimentum.

Facultas ad vniuersum corpus distenditur. Quæ cū ab vndant, maxime à simul & celeritatem cōtractionem ipse artemq; moluntur.

Expulsiuam facultatem esse, quæ cōcoctionem

Alius pulsus quando excretionem significat, cōcoctus namque humoribus superveniens.

Excrementorum copia vnde degenerat.

Facultas requisitam ad vitam, et diffinita.

Proasensu futurum qui sit peritissimus modum.

Facultas vnde moriatur.

Pulsus languens quid per vniuersum corpus, & quando in vna parte accidat.

Cum morbi cum excretionibus, qui pulsus indicent.

*Excretionem  
pejorima quæ.*

tione prænotificatur, ob quæ ipsi calorē pulsus ma-  
gnū videntur & alii. Quare p̄sumimus omnī sunt  
excretiones, in quib. pulsus est minimē magnus:  
at ceteri in contractione. Porro autē si etiā se plus  
intus recipiat, fumū dī excrementi affluens in pri-  
mis est nunciū, similisq; morbi crudi. Si præterea  
sit pulsus languidus, syncope periculum immi-  
net. Si verō piruato fior sit morbus, cum ab inæ-  
qualibus pulsibus muratur fiat in plures vehe-  
mentes & magnos, indicatio fiet per abscēsum. 10

### GALENI PERGAMENI de diebus decretoriis, lib. I.



**S**oluciones morborum qui non  
paulatim, sed subito finierūt, certas  
esse cognoscimus, aliqua excretio  
copiosa, vel insignis abscēsus \* defi-  
deratur. Nam qui morbi citra hæc fi-  
niuntur, in iis recidiva timenda est. Quare tunc

*Solutioni mor-  
borū sua, quæ  
adefsi debent.*

*Recidiva timen-  
da, quando re-  
mota.*

*Critica retri-  
tione gravis  
paulatim sym-  
ptomata, ægrī  
quæ maxima  
perturbatio.  
Crisis quæ.*

*Crisis acutior  
singulis diebus.*

*Indicium tot  
dierum quod  
dierum decre-  
toriorum exis-  
sit.*

*Indicium tot  
dierum quod  
dierum decre-  
toriorum exis-  
sit.*

10 ægrū modo dīs omnibus observare oportet, ne quæ  
omino sanis vel in cibo, vel in potu, vel balneo,  
vel motu, vel deniq; in aliis quibuscumq; concedi  
mus, agere ipsum permittamus. Si namq; cōquie-  
scens morbus exiguus fuerit, forsā ob tam exa-  
ctam victus rationem prius subsederit, ut pos-  
sita nūq̄ revertamr. At si malignior existat, etiā  
tunc, cum hoc viū dī modo vius fueris, redibit,  
sed tamen non cum summo discrimine. Si verō  
tanq̄ planē soluti neglexeris, evadet multo gra-  
vior quā antē. Firmū itaq; solutionē vehementer  
20 morbi, oportet solutoria signa præcedāt. Præ-  
cedunt autem ipsæ criticæ excretionē abscē-  
susq; gravis quædam symptomata, ac nō medio-  
cris in ægrī corpore perturbatio: adeo ut nihil il-  
le ab iis distare videatur, qui in foro de capite iu-  
dicatur. Quam sanē turbationē subitam, nos ap-  
pellamus crīsim: eandē finire interdum quidem  
ad salūtē, interdum autē ad exitium, affirmamus.  
At verū ipse crīsis singulis diebus accidit, sed  
neq; parces numero, neq; ex equali fide. Hoc in-  
tercedit etiā discriminis inter illas, quod aliæ sa-  
lubres, aliæ perniciose accedūt. Quædam enim  
cum pluribus & diffusionibus symptomatibus,  
40 & maiori certamine, nōnullæ statim ab initio tu-  
tissime eveniunt. Quoniam in hoc plurimū disse-  
runt, quod hæc deficientes, illæ perfectæ sunt: nec  
minus, quod aliæ certis statim diebus indicare  
prius, sūt: aliæ repente, & ex improviso eveniūt.  
Tot autē iudiciorū, quot dierum decretoriōrū,  
differentiæ existunt. Ceterū in duodecimo & de-  
cimo sexto, nullum unq̄ iudicium vidī. In septi-  
mo, ne vel numerus omnes adhuc possum. In  
sexto iudicatur, sed cum difficilibus symptomati-  
bus, & periculo nō mediocri: ad hæc, absq; fide,  
imperfectē, obfcurē, sine nominē, & ad perniciem.  
Etenim multi morbi iudicantur septimo die abso-  
lute pariter & secūrē, apertiq; cum signis salu-  
tibus: duodecimo autē rariādeō, ut nobis nō  
dum sine vi. Porro imperfectā indicationē voca-  
mus, ubi ex morbo quippiam relinquatur: in  
50 dam viue incertū, quam morbi sequitur recidiva:  
periculosam, quæ cum grauib. symptomatibus  
accidit: obfcurā, quæ intra excretionē, vel evi-  
dentem abscēsum evenit: sine signis evenire di-  
citur, quæ nullo priore die indicata est: mala,

quod in ægrī perniciem omnino definat. Rur-  
sus absolutam eam dico, quæ ex morbo nihil fa-  
cit reliquū: fidam, firmā, securam, certam, quæ re-  
dit nūq̄: tutam, quæ sine periculosis symptoma-  
tis accidit: manifestam, cui excreto quædam, aut  
abscēsus insignis atq; cōspicuus adest. Cum bo-  
nus accidit signis, quæ ab indicē die præmōstra-  
tam fuerit: bona deniq; est illa, quæ in sanitatē  
definit. Ceterū nō fati est, rariā vidisse dico: ali-  
quem indicantē morbos, vris decretoriis dica-  
tur, sed oportet in illo crebrō iudicia fieri: præte-  
rea ut cūis sit bona, perfectā, securā, manifestā,  
rata, necnō præmonstrata. Quis igitur vel septi-  
mo, vel undecimū, vel decimum quartū, vel al-  
ios quosdam eis similes, nō dixerit decretorios?  
nemo, opinor, cum omnes notæ indicationis in  
illis adiint. Est enim decretoriōrū dierū natura  
quædam propria & eximia. Quare cognito ipso  
rum, ad curationes morborū nō leve momentū  
adfert: ne videlicet iis timeamus, qui fidis die-  
bus sunt iudicari: aut tenuem victum eis minui-  
gamus: neve peridīs indicatos diebus, parū ac-  
curatē observemus. Primū igitur omnīū dierum  
decretoriōrū septimū dicimus, idē nō numero,  
aut ordine. Est dignitate & potentia: omnes  
quippe decretoriōrū notas forsitur. Nam pluri-  
mus iudicat, & absolute: item cum manifestā ex-  
cretionē, vel abscēsu, & sine periculo vehementi-  
ti: estque ut plurimū quartus index illius. Nam si  
vrim, vel spūi, vel deiectionis, vel appetentiæ,  
vel cogitationis, vel sensus mutatio manifesta in  
quarto die cōtingit, rationū consonum est, ut si-  
milis iudicatio cōsequatur illam in septimo: bo-  
na videlicet, si ad salutem: mala, si ad mortē mu-  
tatio illa aspiraverit. Plerumq; itaq; bona iudicia  
eveniunt in septimo: quāq̄ nōnulli etiam in eo  
morianr, alij evidenti conversione ad peiora  
vergentes, in sequenti quodam decretoriō inter-  
eant. Sextum verō diem, quātū pauciores in eo  
iudicantur, quā in septimo, tantū cum mali-  
gniore inveniō, ut qui ferē ex adverso natura  
septimo oppositus sit. Quinetiam qui in quarto  
ad peiorē statū recidunt, pleriq; sexto moriuntur.  
E cōtrario rursus si bona conversio cōtingat, sep-  
timū expectabit. Quod si raro interim ad me-  
liora conversionē in quarto die factā excipiens  
sexus, cum iudicaverit, dici nō potest quānta cū  
perturbatione, periculo, & metu id fiat, quasi æ-  
ger statim adeo fato sit functurus. Nam si quæ  
excretio accidat, omnino cōsternantur, pulsus li-  
piorum cōcidunt, color albit, tremūt & collabuntur.  
At septimus dies, pro excretionis portione  
reficit semper iplos magis ac vixit: Præterea  
sexto die maligna, acna, feridissiq; maiori ex p̄te  
tamen delituit, nūm vomitatio autem sudores  
equales, toto manet corpore: validiq; videntur  
quales si q̄ oboriatur, \* interceptantur. Inter-  
tūdū paroides malignæ, vel arcuatus morbus,  
vel alius quidam abscēsus, alterū certamen, quō  
discutiatat requirit, emergit. Sed neq; in vris  
boni quicq̄ inveniri. Etenim trūd, decolores,  
renues, boni nihil, quod subsiderit, habentes: sed  
copia tantū conducit, in die sexto videntur. At  
hæc moderatissima levisimāque sunt, quæ illo  
die incolumi futuro contingant. Nam plurimō

*Decretoriū dies  
qui existant.*

*Decretoriōrum  
dierum cogiti-  
tio ad curatio-  
nem morborum  
non leve momē-  
tum adfert.  
Septimus dies  
est inter decre-  
toriōrū principia.*

*Septimi quatuor-  
tus est index.*

*Sextus dies  
quinetiam malis  
quæ sit pericu-  
losa.*

*Septimus dies  
quinetiam malis  
quæ sit pericu-  
losa.*

*Sexto die quæ-  
dam excretionis.*

*Septimus dies  
quinetiam malis  
quæ sit pericu-  
losa.*

*Septimus dies  
quinetiam malis  
quæ sit pericu-  
losa.*



alios syncope statim corripuit, vel sanguinis larga effusione, aut evacuatione immoedia exanimatur, vel in catodiem aut infans perduxit: alius denique permittit insanabile conciliavit. Nil sane frequenter in mente venit septimi dies naturam regi cuiuspiam assimilare, sex vero ryanuo. Ille siquidem longe clementior, seu benignus aliquis princeps, is quos indicat, vel supplicem partem adiuvet, vel illustrat victoriam: hic est contrario, vel perniciem illius, quem iudicandum suscipit, gaudet, vel in salutem dolere, quatinus ubi animus expleat, & male agrum, qui in ipsum incidit, traheret, & longa punitione exerceat. Est itaque sextus dies decretorius quidem, sed malus: quemadmodum septimus, bonus. Ceterum sexti dies vi septimi quartus est index. At vero natura septimi, maxime imitatur decimumquartum. Proximi his sunt nonus, vnde decimus & vigesimus: prope hos vero septimusdecimus & quintus: post hos quartus: hunc sequuntur tertius & decimus octavus. Sexti autem naturam nullus exacte aliorum dierum imitatur. Si alii quando in octavi diem, vel decimum, subita morbi solutio incidat, similis ferè ei est, que sexto accidit. Verum raro in his soluitur, nec cum fide, nec bene, nec perfecte, sed obscure simul & intra notas: quare aliterque esse naturæ cum supra dictis apparuit. Quemadmodum autem in his subitò morbus non soluitur, ita neque in duodecimo, sexodecimo, & nonodecimo. Medius autem inter eos qui subitò morbum non solvunt, vel decimum, subitam iudicationem faciunt, videtur mihi esse decimus tertius. Atque huiusmodi quatuordecim dierum, ad vigesimum usque differunt est. Ceterum cum exactum morbi principium iterare semper per laboriosum morbus sit, in quibus obscura principia sunt, omissis, decretorius dies in manifestissimis experiantur: initio morbi tempus illud in universum existimantes, cum ægri manifeste incipientes sentire decubuerint: id quod cernatis, & exercitatis, & lotis, facillime subitoque plerique cōtingit. In quæ sanè modum Hippocrates iudicationem ipsas, à primo die quo febricitavit homo, non ab illo quo doluit capite, vel cuiusmodi aliud quippiam est passus, accurate exploravit: quod in principis huiusmodi de experientia dierum decretoriorum sit medicus sita. Porro quemadmodum vndecimus quatuordecimus est index, ita septimi quartus. Si igitur vel quarto vel vndecimo facto indice, crisis quolibet modo attingit vel septimum, vel decimumquartum, illorum ipsam crinem esse, arbitrari est opus. At si iudicium extra illos dies cadat, vi neque in illis incipiat neque compleatur, constat non adhuc esse dicendum, morbum in septimo aut decimoquarto iudicatum fuisse: verum in alio quopiam die, qui totum crinem in se comprehendat. Quod si nullo indice prius habito, crisis contingat subito, duos attingens dies, vnde inquam sit distinguere, proportionem accessionum, natura dierum, numero decretoriorum temporum, ac tempore iudicii exploratis. Sicut autem exploratur accessio, apporitur. Nam si pger diebus imparibus laboraverit magis, dici imparis erit magis proprium iudicium: quemadmodum paribus, si paribus: quod quidem in accessionibus iudicia maiori ex parte cōtingunt. Dierum autem natura observatur hoc pacto: Si ambigua vtrumque dierum

vel decimi sit iudicium, si quidem salubre, perfectum, atque sine periculo sit, non est magis, si imperfectum, malum atque periculosum, decimi. Quod vero ad numerum decretoriorum temporum pertinet (sunt enim tria: nempe decretoria accessionis initium, decretoria motionis principii, ac denique ipse iudicii finis) qui dies sibi tempora duo vendicaverit, magis sibi iudicium assumat. Sic & ipsum tempus iudicii, vtra die longius fuerit, illi magis iudicium attribui debet. Si itaque quatuor hæ notæ vno die introducitur, huiusmodi quoque iudicium attribuetur. At si vna ex his relinquatur, ei ascribes similiter, sic tamè vti iam alterum etiam diem exstimes ipsius crisis esse participem. Si vero æquales sint notæ, iudicium vtriusque diei paribus esse commune. Interim non duos modò, sed tres etiam dies iudicium attingit. Ac tunc sanè, quantum ad temporis longitudinem attinet, medius esse præferendus: non tamè universum ei iudicium tribuendum. At vero si præceps ac subita in ægotantis corpore perturbatio, morbi solutione præcedat, crisis fit appellanda, vi neque primò, nec secundum diem, decretorius esse censendum. Sin autem soluto simpliciter appellanda est crisis, hi quoque erunt decretorii. Quare omnes febres dierum solutione partim primo itam die, partim secundo nascuntur. Ad hæc perturbatio illa, que fit ante exactam solutionem morbi, ab soluto sermone dici crisis meretur: aliarum autem nulla absolute: verum que ad perniciem

Decretoria tria tempora tria.

Indicia que in corporis sunt, quibus dolores sunt erubescit.

Crisis quid.

Dies primus atque secundus apud polares erant quomodo possunt. Epheorus quid de iudiciis.

Dierum ordo post viginti.

Dies facilius decernendi cum morbo corporis que sunt.

Dies omnes post quadragimum cancelantur patitur morbi quod ab eis sub quo in crisis, terminantur.

Septimus dies quatuordecimus nonus.

Sextus dies tertius quartus simul.

Quartus dies sextus etiam est index. Septimus quoque dies imitatur. Sextus diem quoque reprobant.

Diei qui subitò morbus non soluitur.

Principium morbi in vena, laborum est exstis. Initium morbi quod sit.

Vndecimus quatuordecimus est index. Quartus septimus autem index.

Accessionis prope quomodo exploranda sit. Indicia maiori ex parte in accessionibus sunt.

Accessionis prope quomodo exploranda sit. Indicia maiori ex parte in accessionibus sunt.

Accessionis prope quomodo exploranda sit. Indicia maiori ex parte in accessionibus sunt.

Indicia que in corporis sunt, quibus dolores sunt erubescit.

Crisis quid.

Dies primus atque secundus apud polares erant quomodo possunt. Epheorus quid de iudiciis.

Dierum ordo post viginti.

Dies facilius decernendi cum morbo corporis que sunt.

Dies omnes post quadragimum cancelantur patitur morbi quod ab eis sub quo in crisis, terminantur.

Dies omnes post quadragimum cancelantur patitur morbi quod ab eis sub quo in crisis, terminantur.

dies, continere videtur Hippocrates: sexagesimi tamē, octogesimo, centesimo rationē habet. Ab his alios quē septimē mensibus, alios septē annis finiri ait, alios verō in binis annorū hebdomadibus, vel in terminis. Vbi igitur morbus acutus nullum signū periculosum portendat, & quarto die evidens quiddā cōcoctionis nota apparuerit, septimo crisis futura est. Quare signa periculosa salutarij in primis sunt cognoscenda, vni cōcoctionis indicia, ut hęc pręfagire valeamus. Porro si periculosa symptomata quarto die adsint, vni cum nota cōcoctionis, iudiciū, si parib. diebus accessio fiat, sexto expectandū est: q. si hunc excessit, octavo: si imparib. diebus, septimo. Bonis signis apparētib. septimo die disciuntur morbus: at letalia signa, cum cōcoctionis nota cōiunt nūq. Hęc autē nō minus q. periculosa & salutaria inspicenda sunt: q. si quarto apparuerint, septimo aderit mors: quæ crisis est mala. Ceterū animum advertere necesse est letalū signorū magnitudinē & copię. Si nanq. multa & magna die quarto evenerint, accessioib. distinguendū erit de morte futura, cognoscendūq. hominē sexto die moriturum, si diebus parib. ipsa accessio sit facta: quemadmodū si imparib. septimo. Interdū sextus hominem iugulat, vel si accessio cōtingerit in imparib. idē propter morbi celeritatē, magnitudinem, & symptomatum in quarto die eventum copiat. Est itaq. quartus dies suapte naturæ index septimi: hoc est, si nihil extrinsecus accidat, quod inclinationē illius interceptat. Etiam vbi malum aliqd extrinsecus præter spem venerit, morbusq. peracutus fuerit, & vires acri imbecillæ, signū malum, quod quarto die se ostēdit, septimū nūq. non expectat: verū sexto morietur æger, præsertim si paribus diebus accessio mea, in vaserit. Quod si nihil extrinsecus sit cecidit, & morbi motus laudis præcepit & velox, egēq. validus sit, si qdem manifestum in quarto die malum indicium fuerit, septimo interibit die: si verō obscurum, excedit hunc quoq. Iam vero si accessiones paribus diebus cōtingerint, octavo: si imparibus, nono æger decedit. At si quarto die bonum indicium videatur, in nullo autem æger veretur discrimine, fieri non potest, quin septimo die iudicetur morbus, si nihil extrinsecus sit peccatum. Committuntur autem quiddā peccata, interdum qdem ab ægro, interdū ab ipso medico: est cum assensitum culpa, & ob ea quæ extrinsecus accidunt, similiter delinquatur circa p-  
grum, vnde virtus diei obscuratur: id quod perpendens Hippocrates ait: Natura quidem sufficit, peccatur tamen in hanc extrinsecus cataplasmate, vñctione, totiaq. & partu comedis. Præterea cursum in ipso statim aphorismo iusto, id est actus cōfirmamus, ait: Opacetur autem non solum ipsum, medicum scilicet, quæ res postea tsa-  
are, sed & ægrum, & assensitum, & exteriora. Quo in loco exteriora intelligit omnia illa, quæ extrinsecus accedētia possunt aut obesse, aut prodesse ægrotanti. Hæc igitur quatuor genera, quæ plures habent differentias particularē, & si naturæ motus præcipiant, ordinem circuitus non subvertunt. At vbi quartus dies evidens iugensitum attulerit, si nec medicus quid peccaverit,

nec æger, nec ministrorum quisquam, ad lixæ etiam nec extrinsecus error admissus sit, necessariū morbus die septimo iudicabitur. Cum autem omnis circa victus rationem error, iudicium ipsum impediatur, nec victus ratio proba siue præcognitione vigoris & crisis morbi vñquam institui possit, vñque non alius quisquam medicus recte curaverit, alius præfagiet exactē: sed quicunq. præstantissimus fuerit, is simul præfagietque & medebitur. Porro si levis error quarto die vni cum bonis indicia cōtingent, eveniet sanē etiam die septimo crisis, non tamen exactē incul pabilis: si nā magnus, ut à septimo in sequentem aliquem differatur, magnitudo ipsius noxæ indicabit, an nono vel vñdecimo die, morbus sit iudicandus.

culum sunt, diuis.  
columnarum proutmittunt, ita tamen vacant periculosis symptomant, ob errata letales huius. Imo vero qui iniussimē existunt periculosi, multis magnisq. deinceps cōmissis erroribus, in letalium naturam degenerant: id quod mirum esse non debet. Nam si in rectē valentibus delicta graua, morborum letalium sunt cause, quid in ægrotis est expectandū? At vero si in letali morbo dies quartus signum letale habuerit, septimo die mala expectanda est crisis. Ceterum si peccatum aliquod non ita exiguum interea temporis accedat, septimum diem crisis nō expectabit: sed si accessiones quidem ipsæ fiant diebus imparibus, morbus autem sit peracutus, & peccata non admodum levia in ipso quarto cōtingerint, miraculum nō est in quanto hominem interire. Si autem accessiones fiant paribus diebus, nec morbus sit peracutus, nec magna levis errorum, sextum diem expectabit. Vbi vero diem mortis cognoveris, considerandum est inde, in qua possimulq. cuiusq. accessione parte æger grauetur maxumē, grauiorq. adsint symptomata. Quippe non ignorandum est, in pessimo accessiois tempore hominem moriturum. Ac proinde non magis nego q. fuerit, vñ diem, sic etiam crisis horam prædicere. Si igitur secundus dies (exempli gratia) & quartus, longē vellemētiore accessione, quam primus, tertius & quintus, afferant, ad sextum diem mors prædicenda est. Quod si etiam cuiusq. accessiois pars (gratia exempli) sit circa sextam horā grauisima, non fuerit difficile præfagire, in die iudicationis, illa eadē horā hominem moriturum. Nam tamen si speculatio hæc interdum falli possimul, maiori ratione hæc hoc verum esse deprehendimus. Ceterum in omni principio non licet futura cognoscere, nisi quis morbi speciem à damulsi per speciem habet. Porro si quis primo die acuta febre infestetur, nullum autem ei adsit signum periculosum, sed in vñis aliqua cōcoctionis nota apparuerit, intra quatuor diem soluetur morbus. Si verō quæta letalia signa primo statim die deprehendantur, æger intra quatuor morietur. At si à tertio scilicet: nullum verō adsit signum letale, sed nec aliqua cōcoctionis nota, fieri nō potest, ut hic quatuor decedat. Quod si nec cōcoctionis, nec longitudo morbi iudicia adsint in secundo, quæ tentione morbus statim accipiat

Vitæ ratio  
probo, in præcognitione  
vñq. & crisi  
morbi, non q. d.  
ingitum pñq.

Morbi facies  
ob delicta prædicantur, atq.  
interdum letali  
sunt.

Moriturus huiusmodi in pñq.  
no letum decessura tempore.

Horam crisis  
pñq. etiam dñq.

Horam crisi  
pñq. etiam dñq.

Horam crisi  
pñq. etiam dñq.

Si longitudinis indicia adfint, secundum quater-  
nionem excedet, hoc est, dñ septimū: ex qua qui-  
dem præcognitione, qualis debeat esse nutrien-  
di modus, perdisce. Siquidem quō longius ab-  
fuerit status morbi, ac morbus ipse clementior  
fuerit, cō nutries vberius. At morbi qui ad deci-  
mum quartum omnino sunt crudi, tardiusq; mo-  
uentur quō dñ modo, nō finiuntur ante quadra-  
gesimū diem. Quare signorum vires maxime cō-  
gnosceret oportet. Vt igitur quartus septimi, sic  
vndecimus decimi quartus est index. At vigesimi  
& vigesimiprimi, index est decimiseptimus: ma-  
gis tamē vigesimū, vt decimū octauus & solius vi-  
gesimiprimi. Cōsiderare autē in vniuersum opor-  
tet, totius morbi mortū, omnisq; indicia & sym-  
ptomata vt vñq; quædam animi. *AMENI*

— de diebus decretoriis, lib. II.

**Q**uanta sit providentia nature, quāvis or-  
do & ornatus in motibus suis anima-  
lū generationes, ortus, & incrementa in-  
dicant. Siquidem cuiusq; animantis conceptus,  
suū tempus est statutu, natura sollicit ordinatos  
semper motus feruante. Post partū etiā animan-  
tia singula in crescunt, perficiuntur atq; fāscitū,  
idq; præstitit temporibus. Cæteriū si recorderis  
quantopere providentia & ordine superetur ca-  
dāca hæc atq; inferior natura, ab æthere illa &  
æthere, vtq; huius nostri substantię motui non  
ordinē, sed illius perturbationē tribuere: necnō  
quicquid in ea pulchrum ordinatūq; est & arti-  
fiosum, omne id ā superna illa natura omnino  
emanare parabis: si vñ inordinati omne & er-  
raticum, ā nostra proficiat materia. Est autē na-  
tura in nobis quædam res ordinata. Quæ quidē  
vñ superarit materiā proportionibus quibuscūq;  
certis, ordinatisq; periodis, suas motiones perfici-  
cit. At quæ aliquando præter rationē eveniunt,  
ordinēq; cōfundunt, tunc ipsi obveniunt, cūm  
nō planē materiā vicerit, sed impeditur ab ea;  
prohibetūq; moveri proportionibus suis. Si igitur  
cælestes substantię, necnō quæ terrenis ani-  
mantibus insunt, certa quāda proportione ma-  
nifeste moventur, nemini sanē debet videri mirū,  
si decretoriū dies numerū ordinatum sortiuntur.  
Constat autē vñquāq; septimanā esse perfectā  
periodum. Quippe medium ipsius ab vtroq; ex-  
tremo æqualiter distat, ob idq; ad ambo finalem  
cōiunctionem sortiuntur. Etenim quartus dies mor-  
bus qui primo die non cessatur, soluit: vndeci-  
mus quartus, quos septimus nō disculsi. Quod  
si morbus maior sit, q̄ vt iudicari quarto die pos-  
sit, solutio quidem ipsius in eodem \* præparabi-  
tur, huius autem septimo die adicietur. Pari mo-  
do qui septimo nō desierunt, eos natura solvere  
vndecimo die molitur: quare vñ in ipso eos iu-  
dicat, atq; decimo quarto disponit. Verū septima-  
na præcipuas sibi vendicant vires, dein quater-  
nionē. Nec negligere tamen oportet dies inter-  
calares, tertium potius, quartum, sextum & nonū.  
Porro si vñ vigesimū diem tres septimanz finiant  
vt (vt Hippocrates arbitratur) oportet haud du-  
bit decimū septimū diem esse vigesimū indicē:  
enclidē autē vñ primo dierum decretoriū

ordine, decimū octauū & vigesimū primū. At  
si integræ hebdomadae connumerandæ sint, deci-  
mū octauus vigesimiprimi erit index: rationē  
verō nullam decretoriam habebunt, decimū sepi-  
timus, & vigesimus dies. Cū autem nō solū  
iudican morbos decimoseptimo die, sed fāscit  
iudicari & absq; recidiv timore, proficitur  
Hippocrates, sanē inter validos & primos decre-  
torios debet annumerari. Quare si cōstituerimus  
decimū quartū diem vt finem secundæ, sic in-  
tium tertie septimanz existeret (quod Hippocra-  
tis doctrinæ est consensio) vñq; decimū sepi-  
timus primi quaterternionis in tertia septimana erit  
finis, atq; index vigesimi, tertiam hebdomadam  
terminans. Quippe vigesimū die plures abso-  
lute fuisse factas morborū iudicaciones, experie-  
tia didicit etiam Hippocrates: id quod naturam  
decimiseptimi satis ab vñdē cōprobat. Quin et  
in permixtis aliis diebus, qui ex ordine decimi-  
septimi sunt post vigesimū, fuisse morbos inte-  
græ ac feliciter iudicatos meminit: vñ in vigesi-  
mo quarto, vigesimoseptimo, trigesimo quarto,  
quadragesimo, & octogesimo: in nullo autē eo-  
rum, qui ā decimū octauo procedunt, facta  
putantur ne per septimanas integras, tale quid cō-  
tingisse prodicit: excepto vigesimoprimo, in quo  
aliquando morbi facta sunt crisi. Constat itaq;  
decimiseptimi ordinem altero longē fortiorē  
existeret: ipsūq; decimū septimū decimū octauo-  
tū, & vigesimū vigesimoprimo, quod pertinet  
ad iudicandū vim, multis numeris antecellere.  
Porro quāto vterius morbi processerint, diuturnioresq; evaserint, perturbatio quæ præci-  
pit immutationem præcedit, tantō magis cō-  
quiescit: iudiciūq; ipsa tunc paulatim venientia,  
duos aut tres dies in totum occupant. Vnde me-  
dicorum nōnulli diuturnos morbos minime iu-  
dicari pronunciant. Quāq; certē nihil aliud esse  
iudiciū, q̄ solutionē morbi, vel testimonio Dio-  
cles, liquet. Non tamen putandum est, diuturnos  
res morbos necessariō absq; vñā cōspiciā iudicari  
excretionē: aut eorum crisiū plures semper  
dies occupare. Aliquantū quidē morbi dūnt  
ni fuerūt iudicati die vñco, idq; per excretionē.  
Differūt autē huiusmodi omnes inter se dies,  
tam natura, tum vñ. Natura sanē, quia omniū  
pulchrē evenientibus ad quaterternionis circuitus  
iudicia omnino perveniūt: erratis autē quibuscū-  
dam, in coincidentes recidunt. Vñ verō, nam ad  
futurā crisi cognitionē quaterternionis circuitus  
sufficit. Cæterū ad iam factā crisi iudicandā,  
omnibus semper opus est cognus. Est autē lōge  
tutior crisi quæ nono die accedit, quā quæ oc-  
tauo. Porro certitudo iudici, ad bonā victus ra-  
tionem indicatis morbo præscribendam tonda-  
ci. Prænotare autem quando crisis adveniat, ad  
notandum iudicatos est necessarium. Dierum igitur  
differēntias haud ignoris. Hippocrates, me-  
ritō eorū tantū in prognosticis atq; aphorismis  
meminit, quī secundū quaterterniones inter se cō-  
plicantur. At quippe in prognostico: Febres, si-  
ue sanas ab iis quā evadat, siue pereat, æquali  
dierum numero finiuntur. Verū vt saluberrimæ  
febres, quæ videlicet transfusim fulcianturn otio,  
die quarto vel quæta: quiescere solent: ita pesti-

Naturæ me-  
diū vnde colli-  
gi possit.  
Cū vñ vberius  
rem eo dñm  
quō longius ab  
fuerit status, et  
morbus clemen-  
tior fuerit.

Decimus septi-  
mus est index  
viginti & vñ  
viginti primi,  
magis tamē  
viginti.

Natura in sin-  
gula providen-  
tia.

Naturam hāc  
inferiorem ā  
cælesti magnopere  
superari,  
ab eaq; quā-  
quid habet bo-  
ni, recipere.

Natura quid.

Septimanā  
esse perfectā  
periodum.

Septimum diē  
absolvere quod  
quartū dies  
potest.

Intercales  
dies.  
Vigesimū diem  
esse finem tñ  
septimanz.  
Decimū septi-  
mū diem esse  
viginti indi-  
cē.

Decimus qua-  
rtus vt finem secu-  
ndæ, sic in-  
tium tertie septima-  
næ erit.

Vigesimū diē  
plures abso-  
lute fuisse factas  
morborū iudicaciones.

Decimiseptimi  
ordinem, alio-  
quin q̄ decimū  
octauo, fā,  
longē fortiori  
existeret.

Crisim nihil  
aliud esse q̄  
solutionē  
morbi.

Dierum deco-  
retoriorū dif-  
ferēntia duplex.

Iudiciū iū factū  
& faciendū  
iū, quod  
enclidē.

Hippocrates de  
diebus decre-  
toriis sententia.

mae quæq; & quibus periculosissima signa ad-  
sunt, die quarto, vel citius interficiant. Primum  
itaq; eorum insulsius sit finitur. Secundus quater-  
nio in septimū diem produciatur. Tertius in vnde-  
cimū. Quartus in decimumquartū. Quintus  
in decimūseptimū. Sextus in vigesimū. In apho-  
risma etiam sic ait: Septimorū quartus est iudex.  
Alterius septimanæ octauus initium. Contempla-  
torius autē rursus vndecimus. Hic enim est quar-  
tus secundæ septimanæ. Cōtemplatorius iterū de-  
cimūseptimus. Hic etiam quartus est à decimo-  
quarto, vt septimus ab vndecimo. At in primo  
Epideiōn, omniū dierum mentionē fecit, sic di-  
cens: Est autē primus decretorius circūitus, qui  
paribus diebus decernunt, quartus, sextus, deci-  
mus, decimūquartus, decimūoctauus, vigesi-  
mus, vigesimūquartus, vigesimūoctauus, trigē-  
simus, trigēsimūquartus, quadragesimus, sexa-  
gesimus, octogēsimus, centesimus, centesimus vi-  
gesimus. Eorum qui imparibus circūbus iudi-  
cant, primus est tertius, dein quintus, septimus,  
nonus, vndecimus, decimūseptimus, vigesimus  
primus, vigesimūseptimus, trigēsimus primus.  
Decretorius itaq; fortissimus omnium est dies se-  
ptimus: quē dies quartus prænūciat, hic duo  
habens, vt & decretorius sit minor, & index se-  
ptimus. Deinde vndecimus & decimūquartus,  
randem naturā & proportionē invicē cōseruant,  
quā cum septimo quartus. Post hos frequen-  
ter quodē decimūseptimus ad vigesimū, raro an-  
tem decimūoctauus ad vigesimūprimū, eadem  
rationē habet, quā cum septimo quartus, & vnde-  
cimus cum decimoquarto. Hi igitur quaternio  
no aucti, ad viginti perveniūt. Coincidit eis no-  
nū, quintus, & tertius. Ac plurimos quidem no-  
nū iudicat, secundam vim quintus obtinet, &  
post hunc tertius. Sextus malus est decretorius.  
Decimūtertius omnium imbecillissimus decretorius.  
Cæterum omnium qui nō decernunt fortissi-  
mus, in medio quodā virtutis vtiorūq; est situs.  
Vehementissime itaq; sunt crises, quæ a decimū  
quartū diē veniūt: minna his, quæ ad vigesimum  
vīq; pertingunt: inde ad quadragesimū produ-  
cēte, adhuc imbecilliores evadunt, sed in illo ab-  
solutē exoluuntur. Proportio autē dierum decre-  
toriorū ppetuū servatur. Vt enim decimūquar-  
tus & secundæ septimanæ finis est, & tertius prin-  
cipium, ita trigēsimūquartus quintæ terminus  
est simul, & sextæ initium. Quare tres septimanæ  
vix viginti diebus semper deficiunt: idēq; sexa-  
gesimus, nō sexagesimūtertius, decretorius exi-  
stet. Pari modo octogēsimus, & centesimus, &  
centesimus vigesimus. Respondebit ergo trigē-  
simūquartus decimoquarto circūitus, enim ex  
duabus septimanis distans sita fiat: & quadrage-  
simus vigesimo, vt qui tertiam hebdomadam cō-  
iunctā expleat. Dicuntur autē minores circūitus  
illi, qui diebus quaternis fiunt. Secunda parte  
obnūnt, qui diebus septem cōplentur. Hos acce-  
dunt qui septimanis duabus constant, licet im-  
perfecti quodammodo. Omnium perfectissimi  
sunt, qui ex trinis septimanis constant. Morbi  
tamen ipsi, partim quidem diebus, partim men-  
sibus, partim annis fortiter suas iudicationes.  
Atq; in horū singulis, differentie quædam parti-

culares existunt. Proponitur igitur adolefcentē va-  
lido morbo correptus, qui in primo quaternio-  
nē discit enudans, in eo certe est aphorismus il-  
le imitandus: Vbi morbus est peracutus, sit ma-  
ior extremi doloris adiutus, tenuissimūq; victu  
est utendum. Quare nihil ei alimēti exhibeatur:  
Imo etiā ab aqua, quantū poterit, ipsum abstinere  
iubeo. Si vero septimo die crīsim sit habiturus,  
paullū hūc victus rationē immuta, vel mīlūm  
ei exhibeas, vel aliā quampiā potionē morbi na-  
turæ familiārē. Quod si esset facile dissolvatur in  
edra, eiusq; ostendatur vētriculus, pensant cremo-  
rē exactē percolatu quonidē modicē, pinabis,  
memor illius procepti. Sed aliquid tum cōsuetū  
diutius gratis, tum ne vasorū magna fiat inanis,  
ingerere oportet. Atq; ita septimus dies anset,  
nequāq; agrū nutrire cōvenit, sed pūde, vel an-  
tra, minus ei exhibendum. Rursus, si tertio vel  
quarto die morbū finitū in spes addit, nec mali-  
gnitatē à omachi, nec suspicere inanitionē habi-  
tus, ipseq; etiā aget validissimis vīrib. sit faciliq;  
longā mediā toleret, nec morbus aut oxymeli,  
aut mīlūm requirit, sit certe ad septimū vīq; diē  
a cibis potēt abstinere. Quod si ad tertium vel  
quartū quaternio nē crīsim futura videatur, nō ita  
abstinere poterit, nec sola ponere servari. At ve-  
ro peracutus morbus vocatur, qui rātū ad septi-  
mū vīq; diē extenditur. Qui longius procedit, sim-  
pliciter acutus. Cæterū exactē peracutus is est, q;  
vīq; ad diē quartum progreditur: nō exactē, qui  
ad septimū vīq; produciatur. Similiter qui vīq; ad  
decimūquartū extenditur, exactē acutus vocatur:  
nō exactē vero, q; durat vīq; ad vigesimū: quā-  
q; est & ipse etiā acutus. Est & aliud morborū ge-  
nus, ad quadragesimū vīq; diē pvenit, qd ab  
acuto nō integrē iudicatu dicit originē. Nōnul-  
li præterea statim ab initio tanquā prohibiti, ad  
quadragesimū, adducitur: quorū duplex natu-  
ra est. Aut enim remissionē ex paroxysmō in ex-  
actā integritatē deficiunt, aut semper cōtinua fe-  
bris perdurat. Noui em cōplures a quibus dra-  
gesimū vīq; diē cōtinua febre cōsistat esse: licet  
enim voco illā, quæ nunq; remittit: de quib. sermo  
nem videtur fecisse Hippocrates in prognostico,  
vbi ait: Exultare autem oportet, q; facili spirā-  
tio in omnib. acutis morbis, quibus febris copu-  
latur, quib; intra quadraginta dies iudicantur,  
magnum ad salutem habet momentum. Atque  
hoc sanē vīnimo prædictum genus, acutum ex  
decidena vocari debet. Nullus autem morbus  
a primō acutus in vigesimū diem illabitur, qui  
nō prius iudicium expertus sit. Qui verō ab ini-  
tio submersi leniū apparet, & inde ad quadra-  
gesimū perferre tales, sed rursus intendi vī-  
dentur, hos iure diuturno appellaveris.

### GALENI PERGAMENI de diebus decretoriis, lib. III.

Ignitur non omnes dies de morbis decernere,  
experimento cōstat: sicut & q; septimanis cir-  
cuitus validissimæ sunt virtutis prædix: post  
hos quaternarij, quidam verō extra hos coinci-  
dant. Imo quōd nec omnes septimanæ invicem  
separentur, sed aliquæ ipsarū etiam cōiungan-  
tur: nec omnes quaternarij, sed horum aliqui

Quaternio de-  
ficienti valde  
morbo curro  
pbi.

Confutandus  
esse aliquod cō-  
mendatum.

Peracutus cum  
venit dicitur  
morbus quē  
tenuis ad se-  
ptimum vīq;  
diē extenditur.  
Peracutus ex-  
actē morbus.  
Acutus exactē  
morbus qui.

Morbosum qui  
ad quadragesi-  
mū vīq; perve-  
nit dicitur na-  
tura duplex.  
Cōtinua febris  
dicitur quæ  
quam remittit.  
Spirare facile  
in quibus ac-  
tu morbus ad  
salutē magis  
habuit momen-  
tum.  
Acutus ex de-  
cidena morbus.

Diuturni mor-  
bi qui.

Septimus dñ  
omniū decre-  
toriorū fir-  
tissimus.

Quarto dñi  
quæ adfect.

Coincidentes  
die.

Sextus malus  
dñ decretoriorū.  
Decimus ter-  
tius dñ in me-  
dio decretoriorū  
et maxime  
dñ virtutis  
conficit.

Decimūtertius  
dñ semper  
proportione  
servat.

Cōtinua fe-  
bris qui.

Actus morbi  
in partem dierum  
numerum, tempus  
per totum  
adveniat.

Inferiora hoc  
omnia recipere  
omnium  
a superioribus,  
sol autem ipso-  
rum, enim, et  
etiam recipit.

Luna opera  
sua efficitur in  
feriora.

Luna mensis  
atque dies eius  
disponit.

Nam lunam  
quandam facit,  
lunam quendam  
deficit lunam.

Lunam a solis  
recessu sui om-  
ni mutationem  
recipit.

Lunam for-  
ma.

Luna opera in  
inferiora, cum  
ipso a solis.

Luna est qui  
sub lunam  
plurimum immo-  
tatur, et  
dicitur futu-  
rum, pallor,  
et caput gra-  
vitatum con-  
tinet.

Luna Solis  
adversus oculos.

Sol noster  
adversus oculos  
disponit.

Tempus  
est.

Sol veluti  
quidam  
maximus est.

Luna est veluti  
princeps  
inter solem atque  
nos omnes.  
Mutatio  
qua a facili-  
te luna gra-  
viter diffi-  
cilius mutatur.

separentur, aliqui coniunguntur. Insuper, quod acu-  
tis morbis impari dierum numero, longie pari, iu-  
dicia omnino accident. Porro clausas horum ratio-  
ne nobis indagantibus, duo prima omnium quae  
sunt primordia esse statuenda videtur: mordi-  
nam videlicet, quod et hac mensis materiae pro-  
ficiscitur: ordine vero ornatque procedens, quod  
coelestibus originem fere acceptum. Omnia siquidem  
hac inferiora a bilis venustate & ornametum  
suscipiunt. Fruimur namque superiorum omnium,  
astrorum virtute. Verum Sol maximè hunc orbem ex-  
ornat, & cōtinuè disponit. Quippe veris, citatis,  
autumni, & hyemis autor nemo alius exat: nec  
alius tam manifestè vel ex ceteris huius animalia  
gignere potest, vel maturare fruges, vel ad con-  
summationem propagationem animarum imitare. Ma-  
gna sane & Lunae opera in hac rerum substantia ap-  
parent, verum Solis effectibus inferiora. Et enim  
mensis huius perpetuè, atque omnes eius dies dispo-  
nit, idipsum evidenter adeo in mariis bellis: quan-  
tum & hoc ipsum Solis beneficio debet. Non enim  
lumen forsitur, cum Sole primum fruatur: tantum  
semper eius panno illucescit, quātam Sol aspiciat.  
Prius autem deficit, lucis experte redditur, ubi  
terra suo intervētu ipsam obtinebant. Quapropter  
a Solis recessu omnes sustinet mutationes.  
Et enim plena est, cum diametrum apparet. Aequa  
portione dimissa, cum est quadrangula. Cubosa,  
cum triangula. Falcata specie refert, sexangularis.  
Ac tū primū recens est, cum post Solis congressum  
ostenditur. Obicitur autem omnino, cum sub ipso  
Sole coruscet. Igitur fructus augeat, incrementa  
animantia implet, mēstruū statuto tempore cō-  
servat mulieribus: comitialiumque circuitus gignit,  
quatenus Solis plus, vel minus participat. Om-  
nia siquidem quae facere nata est, ubi falcis figuram  
repraesentat, languida sunt: in valescunt, cum ple-  
na fuerit. Quapropter & fruges interea adauget  
& maturat celeritè: ferarum occisa corpora in ra-  
bem visu suo referit: hominūque corpora sub eius  
lumine, vel aliter immorantur diutius, pallor, &  
capitis gravitate cōciliat. Ceterū ut Luna Solis  
auxilio in omnibus indiget, ita Sol nihil vel ma-  
ximū alterius cuiusdam astra, vel ipsius Lunae opem  
dehiderat. A nullo enim impeditur, quo minus  
testatè faciat, cum in vertice nostro cōstitit: aut  
frigus adducat, si bumilis eius cursus fuerit: aut  
tequin ostiū vtrumque cōstituat: cum modicè obli-  
quis videtur. Sed ipse veluti rex quispian maxi-  
mus est: Luna verò, ut princeps nō me diocri in  
ter illum & nos medius cōstituitur, merito terre-  
strem hanc regionē gubernat: nō potentia ceteros  
planetas, sed vicinitate exuperans. Porro ve-  
hementiores mutationes eveniunt, ubi ipsa cum  
Sole coit: dein autem, in apparitionibus plenius  
nimis: maiores huius cōiunguntur, dum medio orbe ap-  
paret: obfcurè, dum curvata in cornua, & falcata  
videtur. Et enim diametrum Lunae stans, & dis-  
tinguens displicentius, maximè cōtrarias ipsius  
Lunae dispositiones (maximè enim Lunae incre-  
mentū, eiusdem immutationi adversatur) earū  
omniū est validissima. Dein vero duae dispositio-  
nes de choromni, in quibus Luna per mediū vide-  
tur secta, veraque ipsius differenciam, dico au-  
gmentū & decrementū, ad aequilibrium fecant:

prior quidem augmentum, decrementum secunda.  
At omnium extremè obfcurissimè: astra nos am-  
bientia & permutaciones in falcatis, incurvisque ap-  
paritionibus sunt: magis autem, in ipsis incurvis,  
tam verò plenitudines Lunae; celeritimas muta-  
tiones efficiunt: aequalitas verò, inaequales, di-  
sturnit. Nam quid ante Lunam apparentē ma-  
nifestè pronācie, nō est. Longum autem hoc tem-  
pus occultationis est, integrè ferè signi cursum  
explens. At mutatione ex incremento ad immu-  
tationem, punctum ex aetere distinguit: quod pun-  
ctum a Luna quasi momento abfoluitur. Quare  
breves plenitudinis cōmuniones existunt, ad  
tūm cōiunguntur. Tūta igitur crisis eva-  
det, quādo in toto mense stans secūdo die fieri,  
quo primo & manifestè Luna; & longo statim  
post super terrā iam apparet; & lumen sensibile  
de se mittit; ad hanc umbram evidenter ostendit.  
Primus autem dies tantū Luna supra terrā vagan-  
tem habet, quādiu adhuc Solis est lumen post  
occasum tenet. Quare in hoc Luna simul cum  
Sole occidit: abinde verò & prior est occidit, &  
secunda die prius elucescit: nam cūminus, nūc ma-  
gis apparet. Atque hoc accedit longitudine a So-  
le recessus: Plurimū autem Luna triduo in coitis So-  
lis morata, planè invisibilis est: quādo nōdum hinc  
terrena immutatur potest. Cuius circuitus vice-  
nis diebus septenisque; & tertis ferè diei parte per-  
agitur. In tanto enim tempore totū signiferi or-  
culum percurret. At quod it circuitus, quo nobis  
lucet, eidē quidē numero cōveniat, perspicue  
intelligi, si occultationis tempus ex toto men-  
struo tempore eximas. Quod autem mēstruū  
tempus nō omnino triginta diebus consistit, sed mē-  
nus vniū ferè diei dimidiorū quodque mēstrum  
alios quāli mēstrum & imperfectus, dies viginis  
uero formatus: alius verò, utpote abfolutus, trigin-  
ta, siquidē consistit. Quemadmodū igitur autem  
integrum Sol abfoluit, ita Luna mēsem, immu-  
tatione per septimanas ei accidit. Nam vtrinque  
tempus, & quo post primū apparitionē in mediū  
orbem accedit, & quo inde plene efficit, septem  
diebus abfoluitur, ambo quatuordecim. Simili  
modo, si inde, cum ita ali portione est diuisa, ad  
secundam diuisionē eiusmodi ratio nō subduxe-  
ris, & hos dies, reliquosque, cum planè ab oculo  
Luna declinata est, septē invenies. Quod autem  
aer nos circūstans, maximas mutationes sortitur,  
dum Luna primū occultatur, ac dein rursus  
se ostendit, nemo mortalium ignorat. Itaque mēsem  
a Luna immutatū secundū septimanas, ac prout  
de cetera omnia, admodū est perspicuum. Itaque ve-  
rò quae omnib. substantiis accidunt, horum  
causam Luna habere observata est, maximè in te-  
tragonis & diamentis stationibus ac immutationibus.  
Nam si Luna in rursus existente semen conceptū  
fuerit, vel enī partus cōgērit, magnas eius mu-  
tationes inuenias, cum in leone, scorpio, & aqua-  
rio signiferi ambis. Verū in leone terra quos se-  
ptimanas vniū exitum scorpio diamentra duas  
septimanas habet. Itaque quādo in aquario, secunda  
quadrangulans statio necessariō in tertiam se-  
ptimanam procedi: quod Luna vicinis diebus,  
septenisque, & particula quādam adiecta, maximè  
tertia diei parte, vniuersum signiferi ambitum  
peragat.

Luna vocat  
trium tempus  
quālongum  
est.

Plenitudo con-  
iunguntur  
omnes, de  
sternat. etiam  
sternat.

Crisis tunc quā  
do accidet.

Luna circuitus  
vniū signi  
diem & ter-  
tia ferè diei  
parte peragitur.

Septem mēstrum  
omnino consistit  
triginta diebus.

Sol autem  
abfoluit.

Mensem a Luna  
immutatū per  
septimanas, ut  
alio omnia.

Luna motū  
efficit  
omnino  
permutaciones,  
quā in corpore  
suo accidunt.

Luna indicare  
plurimam aut in-  
solentem progre-  
ssum ventis; ut  
modo agri, sed  
jano etia pof-  
fu

Circuitu dif-  
ferentia.

Duriorum  
morborum in-  
dicationem con-  
fiderum tem-  
poris anni.

Mutationes  
validissimas ef-  
ficat quae cum per  
septimanas de-  
ret proprii con-  
tingunt.

Tertio die ef-  
ficat principia de-  
cretoria acutis.

Extremis cum  
morbis citius,  
interdum tar-  
diorum, quoniam  
portat a natu-  
ra expellitur.  
Expulsi enim  
crisis in morbis  
facile.

peragat. Nec verò agris tantum luna, sed etiā sa-  
nus, dies quales tandē futuri sint, prænūciare po-  
teft. Etenim Luna, si planetas salutares ac tēpera-  
tos afpexerit, fauftos ac bonos, pducet dies mo-  
lestos autē, si intemperatos. Ad hæc, alterationes  
magnas, quas in tetragonis & diametris perfe-  
ptimanas fieri diximus, in letalibus quidē mor-  
bis, letales & ipsas in falubribus, bonas evenire  
est necesse. Lunæ igitur tetragonæ, diametræq;  
stationes, in principis bonis, bonas faciunt alte-  
rationes: in malis, malas. Circuitu autē aliq̃ nu-  
mero quodā diēru constāt, aliq̃ mensibus. Ceterū  
qui diebus cōstant, septimani sunt, & Lunæ  
modo incedūt. Qui mensibus, ad Solē referūtur,  
eodem modo eveniunt. Ac sic illud intelligē-  
tum est, qd ait Hippoc. xitius morbos ly eme,  
hymales ætate solui. Hoc enim diuturnorū an-  
nalsūmve morborū iudicationis tempus statum  
est, quādamō acutorū decimusquartus. Cūm  
enim i mensis principio ad vsq̃ plenilunū tem-  
pus, totius lunaris circuitus dimidiū existat, tan-  
dem rationē habet cum intervallo, qd ab hyme  
ad æstatē vsq̃ intercidit. Quin etiā i plenilunio  
ad occultationē tempus, spacio qd ab ætate ad  
hymē vsq̃ porrigitur, pportione respōdet. Sed  
horū utroq̃ bifariū sectio, in acutis morbis est  
septimana: diuturnis, clarissimorū syderum exor-  
tus: quorū ratione ver, æstas, hymes, & autum-  
nus, describūtur. Quemadmodū autē septimana  
acutorū morborū est decretoria, sic temporis an-  
ni mutatio, diuturnos morbos discit. In hy-  
eme qdem cōstitutum morbiū dissolvitur. In  
vere cōstatum, æstas. Simili ratione per statem cō-  
tractum, autūnus: in hoc paratū, hymes. Ceterū  
anni tempora singulis partib. bifariū diuisis, mē-  
sis quaternionib. proportionē respōdent. Et quē  
admodum anni temporis cuiusq̃ & initium et fi-  
nis, syderum manifestorum ortu & occasu descri-  
bitur: ita etiā mēdicatur singuli, alienius rursus ly-  
deris exorte distinctus. Itaq̃ vniuersas particu-  
lares morborū mutationes, vel tanq̃ ad propriū  
ipsorū principib. vel ambiente nōd astris conuer-  
sionē, evenire est necesse. Quirigitur ex proprio  
principio mutātur, Lunā sequūtur: qui vero ceu  
ab aere nobis circumsūso immutātur, in toto qui  
dem anno, Solem in singulis mensibus, Lunam.  
Hinc iam accidit, mutationes validissimas esse,  
quæ cumq̃ per septimanas dies propriē cōtingūt:  
his ipsis ferē cōmūscantur, quas aer excitat. Atq̃  
in acutis qdem morbis coincidenter decretoriū  
sunt plures: quoniam & corpus mutationi accō-  
modum, in motu & perturbatione vehementi cō-  
stitutum est: in longioribus, via & ordine magis  
septimanarū circuitus procedit. Principiū igitur  
diēru qui acutē decernunt, & cūm quādam pertur-  
batione morbos immutāt, tertiū dū ab ipso prin-  
cipio statuerē oportet: quippe qui nullū iā cum  
prima septimana cōmunionē habeat, sed ex co-  
incidentib. sit. Iam verō perturbationis violētia,  
naturā ea quæ molestant, etiā ante tempus propu-  
lsent expellūt: id quod aliqui neunq̃ factura  
fuissent ante cōtione perfectā qua interdum iā  
absoluta, sæpius tardari solet, propter facultatis  
(quæ aliena exemit, & crises in morbis efficit)  
in firmatē. Fūrtitū iudicationē optime, cūm

iā omnia in animantis corpore fuerint accuratē  
edcōcta. Perniciosum autē est, si quando ipsa cri-  
sis præveniat. Nam idonea simul cum iis quæ le-  
dunt, excernūtur: id qd sit natura incitata, vel ab  
exteriore quodam, vel ab iis quæ in ipso corpore  
detinentur. Atq̃ vnum qdem ex illis quæ naturā  
stimulant, & veluti provocant, accessio est, nullā  
quietem, nec moram edcedens, verum incitans,  
monitūq̃, & ceu pugni indicia. Vnde acutorum  
morborum in diebus imparibus iudicium con-  
tingit. In his enim & accessiones fiunt. Nā secun-  
da accessio ab initio ad tertium diem delabatur,  
tertia ad quintum, quarta ad septimum, quinta  
ad nonum, omnes deniq̃ in imparibus fiunt. At  
dies ipsi primariā decernendi virtutē nō habent,  
sed per accidē id cōsequuntur: q̃ videlicet in ac-  
cessionib. iudicentur morbi, illi autē in dies im-  
pares incident. Neq̃ enim septimā, vel quartū nu-  
merus, crisis est autor: sed quod Luna innouan-  
te, et terrenā immutante, motū quoq̃ circuitus  
ad hos principes numeros venire contingat, me-  
ritū in ipsis tanq̃ iura alterationum tempora in-  
veniuntur. Quippe mutationes nō numeris, sed  
Lunæ terrena debent. At cū id quod mutat in  
motu cōstat, tempus mutationib. necessariū cō-  
iunctū est: quare necessariū & numerus. Luna i-  
taq̃ omnia terrena immutat, atq̃ in septimanas  
precipue magnas mutationes inducit: dein autē  
paruas in quaternionibus. Porro tertius & quin-  
tus dies decernunt, non ex lunari circuitu ralem  
facultatē sortiti, sed quod tertius violētia accef-  
sione crism quatto die futuram prævertat. natu-  
ra autem quarto die defatigata, minimūq̃ irrita-  
ta conquiescat, ac postea in quinto ad iudicium  
moueat. Iam verō & nonus, inter duos decre-  
torios septimum & vndecimū mediū, vel nō fa-  
ctum in primo die iudicium, vel vndecimo fa-  
cturum, ipse sibi vendicat: at rarius quidem septi-  
mi, sæpius vndecimi assumit crism. Porro in diu-  
turnis morbis, vt accessionis vehementia, sic nu-  
merus coincidentū diēru minuitur. In omnibus  
autem ferē dieb. peracuto morbo iudicari con-  
tingit, quoniam vltimus decretorius ipsorum est  
septimus: & ante hunc nō quartus modo, sed ter-  
tius, quintus & sextus aliquando decernunt. At  
peracuti omnes morbi vel cōtinuam febrem, v-  
ni formemq̃, i principio vsq̃ ad crism sibi habē-  
re comutem: vel aliā, quæ est manifestas habeat de-  
linationes & accessiones, nō tamen tertio quo-  
que die manifestas tantum habet, verum in ipso  
rum quoq̃ diērum mediis, quemadmodū & fe-  
misteriana. Proinde prima peracutorū differen-  
tia, veluti vna quādam accessio est. Quamobrem  
nihil (quantum ad accessionem pertinet) impa-  
res partibus præstant, cūm febris singulis diebus  
æqualis existat. At in altera differentia, cūm qui-  
dem veluti ad septimum diem festinat, & secun-  
dum ipsius rationem in eodem finiturus est: me-  
dię verō accessionis magnitudinē, naturū ante suū  
tempus venire ad crism compellit, vel si extrin-  
secus aliqui eveniens ipsam irritet, crisis haud-  
dubie sexto die præerumpit. Etenim in secun-  
do die natura aliquo modo est valida: item in  
quarto magis quā in sexto: sed nondum in cer-  
tante venire aude: in sexto autem accessio

Crisis optima  
quid sit.

Accessio morbi  
naturam com-  
mutat.

Acutorum mor-  
borum iudicia  
in diebus impari-  
bus fiunt, quia  
et accessiones.

Dies nō prima-  
rii, sed ex acci-  
dentis decernūt.

Dies tertius &  
quintus quæ ra-  
tione decernūt.

Noni diei facul-  
tas.

Peracuti mor-  
bi: quorū vlti-  
mus decretori-  
us est septimus  
non cōtinuam fe-  
bre diutius indur-  
tate contingit.

Peracutorū  
morborum do-  
plex differentia.



vehementia frequenter eam ad certamen provocare vel in eo deicere prius, q̄ quæ infestè excreuerit, exanguiturq;: vel eorū magnā partē propulsa: reliquū verò adhuc nō potest sed imbecilla & defangata prorsus cadit, & victa iacet. Deinde si postero tempore recreari & reficere possit, morbi paulatim concoquit. At si morbi reliquæ robore illius maiores sint, tandū æger supervivet, quādiu natura sufficere poterit mortis tamen postea.

*Vigintus cur decem sit quia viginti minus sit.*

*Annus.*

*Menstrua Septimana.*

*Vigintus dies quos morbi dicit.*

*Apparitionis lani tempus quantum.*

*Quaternio quæ separatur, et quæ rursus coniungatur.*

*Actus morbi a morbi sunt tempus ut exigit, non tantum omnes breves morbi contrarij existunt actus.*

porie: & omnis diuturnitas, necessarii tardus. Nō tamen si brevis tempore sit, acutus statim fuerit (cū multæ ephemeræ lēge brevissimæ sint, omnib; periculo vacet) nec si tardus, longi tēporis.

### GALENI PERGAMENI de crisib; lib. I.

**T**emporis morbi tempora sunt quatuor in vniuersum: principium videlicet, augmentū, status, & declinatio. Quædam verò ægritudines ob earum magnitudinem, atq; aggrauantem imbecillitatem, in ipso statim augmenti tempore hominem iugulant: sicuti & quædam aliæ in vigore. Desinunt aut ea tempora minimè dicti numero. Porro an ipse morbus augeatur, non ex eo tantum cōiecturari oportet, quod accessiones anticipent (sepe enim talis anticipatio, morbi proprietatē consequitur, potius quā incrementum, cum & quartanæ, & tertianæ, & quotidianæ febris quidam circuitus vsq; ad integrā solutionē sit anticipare sint visi) sed quod etiā longiores & maligniores existat: id quod similiter est in intermissione & declinatione considerandū. Voco enim intermissionē, quidō febris in quietem desierit: declinationē, omnē eius partē, quæ vigorem ipsi subsequitur, vsq; ad secundæ accessionis principium. Enim si accessio (exempli gratia) consue tam anticipet horam, longior etiam fiat, & vellemior, maligniorq;, & cū multis prauisq; symptomatis accidar: ad hæc, ipsum declinationis tēpus fiat breue, nec omnino facillē, nec symptomaticum accessionis omnino expertis, is certē morbus ad magnitudinem creuit. Si verò accessionis initium tarder, longitudo autem eius ac magnitudo minor existit, cessetq; etiā malignitas, necnon intermissio vel declinatio sit facilis totarū, longiuscula, omniq; accessionis delens \* symptomata, haud dubie declinationis morbi hæc fuerint aperta indicia. Vbi verò quæ ad accessiones duas pertinent, actualia fuerint, morbum demonstrant consistere. Quare Hippocrates ait, ad morbi incrementum nōscendum, esse accessiones invicē conferendas. Iam verò sepe quiddā in morbis nullum reperitur sensibile ipsius vigoris tempus: sed habente adhuc quarta si ita cōtingerit accessione indicia augmēti, quinta superuenit accessio, declinationis habens principium. Simile quiddam accidit in morborū augmentis.

Nam sepe prior accessio principii simul habuit, ascensumq; & vigore: dein secūda videtur manifestē inclinare. Genetosi autē medici est munus, futurum statim præcognoscere, cū omne victus rationē ad ipsum inspicere infirmat. Eadē ratione principium atq; augmentum morbi, nō ubi iam perfectæ sunt, sed multo antea præstat cognoscere. At accessiones & constitutiones (quædam modis inquit Hippoc.) morbi indicant & anni tempora, & circuitus successus incrementa, siue quoti die, siue alternis diebus, siue in longiori tempore fiant. Præterea si in laterali morbo spiritum statim appareat, incipientē morbi facit breuiorē: si verò posterus, longiorem. Porro quæ propria sunt morbi accidentia, simul cum morbo iaculant, incipiuntq; reliqua verò omnia mox appa-

*Tempora morbi sunt quatuor.*

*Tempora morbi non desunt dicti numero. Anticipatio accessiones non semper morbi incrementum arguit. Intermissio morbi vnde cōiectura oportet.*

*Intermissio. Declinatio.*

*Morbi anticipatio ad magnitudinem notat.*

*Declinationis morbi argumenta.*

*Morbi vigoris indicia.*

*Status morbi dicitur quælibet quanta vicius ratio esse debeat.*



Inflammationem  
non esse flammam  
in principio  
sentire.

Incremētum  
non esse  
passus dignitas.

Vigoris  
non esse  
passus dignitas.

Excrementum  
non esse  
passus dignitas.

Excrementum  
non esse  
passus dignitas.

Excrementum  
non esse  
passus dignitas.

Excrementum  
non esse  
passus dignitas.

Excrementum  
non esse  
passus dignitas.

tempus quo ipse morbus est crudus, colligere ex hac eius dictione licet: Cōcocta medicari & mouere, nō cruda, nec in principis, modo non gliscant. Eodē illa pertinet. Quicquid inflammationem suū principio morborū solvere tentant, ex eo quidem qd distentū est atq; inflammationem, nihil admittit: neq; enim credit quāda adhuc passio, quę verō morbo resistunt, & sana sunt, colligescere faciūt. Præfinites autē manifestū aliquē terribiliorū vitium: parū ascensus, quemadmodū sibi, bēta-  
ras indicia inspereris, memineris Hippocrati-  
carū admonitionū, quibus ait: In principis quidem omnia sunt imbecilliora, in statu vero, fortiora. Ad hæc: Vbi morbus peracutus est, statim exitum habet labores. Cōtingit autē nōnūduas accessiones, vbi maxime aliquid facit fuerit, in vicem vero æquales, circumquāda et ipsius vigoris tempus: nōnūdu verō vni omnī aliarū præcedentū relinquarum sequentiū, esse maximam. Ad tres autē extendi accessiones vigoris  
tempus, in morbis acutis nō admodum accidit in diuturnis vero, nō modo ad totū, sed ad longē plurimū. Alii igitur excrementū optimū (ait Hippocrates) est molle atq; coniunctū, quod ea hora exierit, qua tempore sanitatis confueuerat. Quantitas verō eius, sit pro ratione cibi assumpti. Tale enim vim cōcoquendi in inferiori ventre validā liquidō ostendit, ac digestionē optimē fieri, nullāq; ventris partibus inflammationem in esse. Nō meminit autē coloris vigoris excrementi, quoniam nō magnū vim habet ad inferiora vētris indicandam dispositionē. Iam vero tale excrementū cōiunctū cum sit, nō aliquid est, & breue. Quod si præter dictū, est subrūsum fuerit, & nō admodū distendit, exquiliū secundū naturā se habebit: ac neq; in vētre, neq; in circumstantibus organis, aliquid erratū esse significabit. At si vel rufum purū, vel nullo modo subrūsum exierit, sed etā secundum ciborum colorem, alterū duorū significat, scilicet plus rufi bilis in ventrem defluere, aut nihil omnino. Horū verō primū quidem si circa initia fiat, biliosiorē morbum ostendit: si verō declinationis tempore, corpus expurgari integrū. In cōcoctum autē alui excrementū est album, tenue, alperū, humilis, expers, ac ciborū retinens qualitatē. Secundum præter hæc est excrementorū gēnus, quod nō ex ciborū sed ipsius nature, sed ex cōiunctibus a toto corpore ad ventrem superfluitatibus qd aliquid etā indicare potest. Ergo si sit viride, indicium bilis æruginosæ existit: si autē nigrū, vel atrū bilis, vel sanguinis eo in loco peritū. Si autē veluti humidū quoddā in excremento apparuerit, vbi non fuerit tale aliquid intra corpus assumptū (id quod semper subintelligere oportet) partū internarū validū frigus, ac veluti mortificationem ostendit. Si verō pingue, pinguis colliquationis est signum: quemadmodū etiam si plurinosum, colliquationē solidarū partium portendit, quæ longē periculo sior existit. Præterea qd vehementer fæcet, vehementem putrefactionem indicat. Excrementū stridē, illarū quidem sibi cum tenui humiditate permixtū esse declarat: organa autem in vni cōcocta, atq; in angustā restricta. Spumofum vero sit velut æquale feruente, vel cū aliquis

flavulentus spiritus colluctatur cum humiditate. Ac primū sanē inmoderate caliditatis corpus colliquatū: secundū verō, est in æquale perturbationis effectus. Variū autē, variū corpus affectū esse obnoxii ostendit. & ob hoc ipsum, & diuturnū & malignū existit. Etenim simplex affectus facilius cōcoquitur, & mitius est, q̄ multiformis, periculosior. Vinarū autem illa optima est, quę vinarū sanorū simillima. Quicquid verō est talis, simpliciter est incocta, vel præter hoc, etā perniciofa. Vinarū igitur optimē cōcoctam, in illis quę supremū sanitatis obtineos gradum explorare oportet. Talis enim est subrūsa, vel subrūsa magis subrūsa q̄ subrūsa: statim enim & hæc mediocriter crassitudine possidet. Nam quę hæc ipsa crasior est, aut tenuior, cōcoctioem imperfectam significat. Siquidem altera nondum in humorem cōversa est, altera verō adhuc cōtributa existit. Cæteri cū triplex sit vinarū turbiditū differentia: quæ vel cū tales mixtæ fuerint, paulū post resident, vel semper similes permancēt, vel p̄re existunt minguntur, postea verō cōtributur: prout quidem ex dictis ternis, bona autē prima, media verō inter vtriusq; est secunda: Siquidem quæ statim residet, parū aliquid inæqualis turbiditatis superesse demonstrat: quæ vero semper permancēt similis, vigere adhuc quę et in sanguine agitationē ostendit. At quæ extrā cōtribuitur, debet incipere cōcoqui: quare a meritō deteret magis nam longiorē tēpore, & virtute forti, indiget ad cōcoctionē. Porro quæ ad summū incocta est, illa omnino malignitate superat: est enim aquosa exquilitate, ac p̄inde veluti desperata cōcoctionis accedit, ad cōcoctionē venosæ nature exiit: quæ admodū ventris cruditas. Vbi verō vna ipsa celestiter mingitur (hæc enim passio saporis & dia bete vocatur: estq; talis, qualis circa aluum intestinorū leuius: oempe extinctio vtriusq; virtutis, retentio simul & alteracitudo) tunc sanā inter omnes vinas crudas ea p̄xima existit. Sed post ipsam est aquosa, quę quidē solius facultatis alteracitudo imbecillitatem demonstrat. Huic proxima est altera vna, que in multis apparet morbis, ut videatur mixtā habere formā vini tironis & albi. Gignitur autem ex ipsa alba & aquosa, ut quæ pauco liquorē ex bilis rufa suscepit. Atq; hæc sanē vna proxima accedit ad crudam. Post hæc est suppalida. Palida verō iam & subrūsa est. Optima autem omniū vinarū, subrūsa & subrūsa existit. Etenim cū adhuc cogitur sanguis, vna que mingitur, leuem, æquale, albi ac multam facit hypostasim. Perfecta cōcoctione, color quidem vinarū intenditur, minus autē subfudit. Quod si diutius homo a cibo abstinet, vna magis rufa reddetur: si quidem aliquid alimentū supra modum calit, præsertim si dulce fuerit & pingue, in amarā bilem cōvertitur. Porro color rufus ad flauū proximē accedit: in hoc autem differit, quod rufus quidem magis ad albū, flauus autem ad splendidum vergit. Quantū verō flauo rufum est albus, tantū illo pallidū. Quantū rufus minus albus est flauus q̄ rufus, tantū flauo rubicundū. Iam vero in pueris ferē omnibus, & perfectam ætatē habentibus, quę coloris vitam degunt, aut quovis alio modo sunt pleni,

Excrementum  
non esse  
passus dignitas.

Vinarū  
non esse  
passus dignitas.

Vina cruda.

Diabete.

Vinarū cruda  
non esse  
passus dignitas.

Vina suppalida.

Vina palida.  
Vina subrūsa  
& subrūsa, o  
mnia optima  
exiit.

Color rufus  
non esse  
passus dignitas.

Color flauus.  
Color rubescens  
dicitur.



quicquid interiacet temporis, erit principium morbi. Quantum autem desit ad periculum illud cōcoctionis indicium, & ad morbi motum, & naturam, & anni tempore, & regione, & ætate, & tempera-  
tura ipsius laborantis, inuenitur. Nam si morbus natura longus extiterit, quemadmodum febris amphimerina, & videatur tardè in hoc ægrotante moueri: tempusq; anni sit hyems, & regio frigida, ætatisq; & natura laborantis ad frigidū declinari, multū interim temporis ad manifestū signi generationē desiderabitur: quod totū tēpus principio erit contribuendū. At verò perfecta cōcoctio est, quādo in urinis subsederit aliquid album, leue, æquale, & continuū: debilis autē est, quando ex aquosa mediocriter suppalida facta fuerit: aut etiā turbulenta existens, talis permaneat. Rura-  
ta enim manifestus indicium semper expetit, vel solam nebulam albā, vel suspensionem aqualem, cōtinuā atq; albā. Præterea rubens nubecula, & subsidentia talis, & absq; subsidentia probè colorata urina, & crassitudine mediocri, principij finem declarat. Sic & in latere & pulmone passionibus, ea que propriè supra vocatur, venarum subsidentia asseruntur. Nihil verò omnino expuere, sed rursū tantummodo sicill habere, tale quiddam est, quale in urinis extremè crudum, qd nominamus aquosum. Quod si ab eo quod est nihil expuere, & ad expuendū quidem, verū liquida, & omnino cruda, fiat transmutatio, debilis & occulta ea permixtio erit: nec absolutum erit tunc ipsū principij tēpus. At vbi æger coeperit expuere pauca cōcocta, ac reliquo omnitem pore hunc vsq; ad statū, plura & meliora, & facilius exereuerit, tūc sanè expirabit principij, augmen-  
tumq; morbi inualecet. Cū verò exquisitè cōcocta fuerint & multa, rursūq; sine difficultate, tunc istius est tēpus. Quādo verò finiliter exquisitè cocta, & nūc molestia educta, sed eorū copia imminuta fuerit, dolorq; nō amplius adsit, tunc cessare statū oportet, subsequi autē de-  
clinationem. Sciendum autē est, secundum ipsas præcognitiones temporum, vnde cūq; diem esse indicem decimi quarti: si cūq; & vigesimi decimi septimi. Cōtingit autem laborantem pleurinde, die quidem decimo septimo pauca quædam cōcocta expuere: sequi autem crīsim, sed imperfectam vigeliem: ac postea tandem iudicari absolute morbi trigesimo quarto: quemadmodū contigit in Anaxione, cuius Hippocrates meminit tertio Epidemiorum libro. Porro primi dies sunt indices, tum decretorij, valentiores quidem sunt vltimis, vbi morbus est breuis: eo tamē producto, iōge imbecilliores redduntur. Igitur perfecti ac iam finiti principij manifestum & firmū est signum manifestū cōcoctio: pauca autē, & morbi natura, & tempus anni, & ætas laborantis: ex abundanti verò, & regio in qua ægrotat, & mo-  
dus vias qui antecesserit victus, cum nondum morbo corruptus esset. Specialiora verò in dicta futuri finis primo ægritudinis tempore, cōcoctionis indicia sunt. Ceterum si integre cruditis indicia in primis quatuor diebus morbi permancant, longū erit huius morbi principij tem-

pus: si verò debilis mediocriter in ipso apparuerint, iōge quidē & hoc erit, sed vbi prius fuerint. Si autē parua fuerint cruditas signa, futurū etiā principij tempus erit exigū. Meminisse autē cōuenit illas aphorismi: frigidū sudores cum acuta quidem febre, morbi significant: cum minon verò morbi prolixitate. Que sanè prolixitas vniuersis ipsius morbi temporibus cōmunicabitur. Iam verò post summū vigoris tēpus sepe qdē nulla sit crīsis, sed paulatim soluitur morbus, longo tempore concōctionē recipiens: arliu iuscemodi solouem absolute crīsim non nominō. Si quā verò confertim fiat permutatio, & multo magis adhuc & agitationē que illam præcedat, ita appellare consueui.

## GALENI PERGAMENI de crīsim, lib. II.

Di-  
necips autē, quo pacto quis primo statim die possit morbi naturā cognoscere, gignūciendū. Ceterū diem per totum hunc sermonē nostrum, in ea significatione accipiemus, vt nō solum lucem, sed etiā noctem complectatur. Si cūq; diem ex triginta diebus cōstare dicimus: nō id tempus tantum, quo Sol supra terram fertur appellantes diem, sed nōctem etiā vi copulantes. Atq; in hunc modum annum quodammodo dicimus trecentos & sexaginta quinque dies cōtinere. Morbus est dispositio quedam huiusmodi: sedens que quidem duplex sapè consistit. Simpliciter tamen dispositionē, nemo qui perspicaci sit ingenio, in primo die ignorabit: habet enim propria indicia. Eam verò que cōmista est, nō omnibus per initia cōtingit agnosce-  
re. Oportet autē in omnib; simplicibus dispositionibus sic exerceri, vt earū singulas seorsim, & iam perfectas promptè noscamus. Simplicem itaq; morborum singulorum dispositionē, ante omnia ipsi per se ipsam cognoscere expedit: primum quidem ac maxime, ex his que secundum propriā insunt substantiā: deinde iam ex his que se plus et accidunt. Velut in ea febre que tertiana dicitur, non hoc tantum aduertat, si tertio quoq; die fiant accessiones desinētes integræ. Nam si dux tertiane fierent, aut dux quantanæ: dux quidem tertianæ quolibet die, per tertium autē dux quantanæ accēderetur. Quare vel duas tertianas vnam sic quotidianè putares, vel duas quantanas vnam tertianā. Forma itaq; accessio-  
num maxime inspicenda est. Porro exquisitè tertianæ longissimus terminus, septem absoluit circūbit. Primi autē tertianæ plurimæ, vt etiā cōtinuæ & ardentes, æstiuo tempore, vbi secundum naturā se habet. Et enim quemadmodum hyems præ omnibus anni temporibus humidissima, & frigidissima existit: sic ætas, sicillissima simul & frigidissima, quomodo propriā naturā retineat. Nec enim debet existimare, qd propter anni temporū appellationes, singulæ ægritudines accidat tales sicutet vel tales: sed propter ambices ætatis temperaturæ. Nam qualem hic naturā sortitur, ita etiam nos afficit. Similiter etiam regio & tem-  
peries hominis calida & sicca, plurimūq; febrib; feracior est, ita que tēperamentum contrariè possident. Quod si etiam viciū calidioris & sicciore vias

Sudores frigidi  
quid indicant.

Crīsis debilis  
est agitata præ  
cedens morbi  
permutatio.

Diem  
Morbis

Anni cōstitutio  
et tertianæ finis  
vnde agitur  
dies  
Morbis quid.

Simpli-  
ter dux  
tertianæ  
esse per  
se inspicenda.

Tertianæ dux  
appellatur hinc  
dixit singula  
dies.

Quantanæ dux  
appellatur  
tertianæ quoq; dux  
accessionem facit.

Tertianæ re-  
pentina longis-  
simum terminum  
supra absolutum  
existens morbus  
hyemū compo-  
nit.

Æstiuo tempo-  
re.

Amphimerina  
febris dicitur.

Causa huius  
absoluta imbe-  
cilisq; signa.

Principij finis  
que indicant.

Spina in pleura  
tūc, vnde ætatem  
subsidentia  
finit per se  
finis.

Statim tempus  
in pleura  
quando si ad-  
esse significabitur.

Declinatio in  
pleura  
quando si ad-  
esse significabitur.

Vnde cūq; diem  
esse indicem  
decimi quarti.

Vnde cūq; diem  
esse indicem  
decimi quarti.

Primi dies in  
morbo breui-  
ter valentiores  
sunt vltimis  
morbo contra se  
longe.

visus aliquis fuerit, hoc est, la horibus, vigiliis, curia, & anxietatibus, cibisq; paucioribus & bilioforibus, ubi etiam in hoc ipse seipso biliosior reddetur, ac proinde calidior & ficcior. Atq; hæc sanè quæ diximus, cõmunia sunt ardenti febri & tertianæ generatoni. Etenim terti-

*Febres ardentes  
et tertianæ  
quæ generant.*

*Tertianæ ad  
anxietatem  
febri dictantur.*

na accessio ab acutissimis maximèq; aduentibus febribus nullo modo relinquitur: sed hoc di-  
scrimen interest, quod in hac, per totum corpus bilis defertur, atq; ideo vehemens fit rigor, bilis-  
que supervenit vomitus, atq; vniq; & sudores bi-  
liosi adsunt: in aliis verò aduentibus febribus,  
quæ nullam habent intermissione, flava bilis in  
vasis vna cum sanguine cõnnetur: id quod certè  
est in causa, vt remana febris per sudores vomiti-  
scq; finiatur: in aduentibus autè, singulæ accen-  
siones ad infebrecitatione nō perveniunt: quon-  
iā qui earum est causa humor, non expurgatur.

Sed quidō in his bilis agitur vehementius, ac  
velut effrægitur, a naturæ invalecente impetu-  
lunt, tunc rigor supervenit, & febris solvitur. Nā  
ardens febris, si superveniat ei rigor (vt inquit  
Hippocrates) solvitur. Quod verò non modò  
causa frigida, sed etiam acris et calida, rigorem  
faciat, in libro de symptomatum causis ostendimus.  
Etenim acres & mordaces humores vehem-  
entius emoni agitant, & per sententia corpo-  
ra violenter delant, stimulant, pungunt & feriunt:  
atq; hinc sensum inaequalem, rigorem, cõfusio-

*ardens febris si  
superveniat ei  
rigor, solvitur.  
Rigor fieri a  
frigida & a ca-  
lida causa.*

neq; invehit. Tertia itaq; febris, quæ ex fla-  
vâ bile motu ortu habet, rationabiliter statim ab  
initio rigore affect nō mediocri: hoc ipso primū  
ad quartanæ rigore differente, quoniā in illa qui-  
dem pungi videtur ac percussu corpus (talis enim  
est in tertianis febribus sensus rigoris) in quarta  
na autè frebre similem frige factiōne habet, quā-  
bis per gelu, tempore hyverno sentitur. Quippe  
in quartana febre atra bilis redundat: sicut in  
quotidiana, putrui. Tertianā igitur febrem mi-  
nime quidem licet ab eo rigore vehementi, pun-  
gente atq; feriente carnem, oriri. At quartana  
febris nō primo statim die cum rigore invadit ve-  
hementi, sed per gradiente ipsi, atq; aucta, vni-  
etiam rigor quidam grauis, ac velut ossa cõn-  
dens, augetur. Quotidianas autè nō comitatur  
rigor, nec in initio, nec in progressu, sed frige-  
factio dūtaxat. Præterea quartanæ febres paruos,  
debiles, rardos & raros adeo pulsus efficiunt in  
invasiōibus, vt nulla altera dispositio: tertianis  
verò parui quidè ac debiles, rardisq; acuti, cum  
invadunt, pulsus necessariò adsunt. Verū tarde-  
ras acraritas nō paruo ab iis intervallo relinquitur,  
quæ in quartanis occidunt. Nam in quartana  
rum principis videbitur tibi acriora quoddam  
modo ad interiora retracta, impediūq; in terti-  
ana verò, nec aliud tale percipies, tarditalisq; pro-  
prie accidit ad eum qui secundum naturā est mo-  
tus: ac præterea certus ordo æqualitatis pulsibus  
inest. Habet etiam tertianā febris per incremen-  
ta, æ qualem liberamque celeritatem: statimq; ad  
magis modum atq; vehementiā excitatur, hisq; om-  
nibus frequentia cõrespondent: in eo ipsi villā  
adest infamiam onis signi. Iam igitur & sitim in-  
vehit, & hominē exurit, & paulo post in vigore  
cõsistit: calor æqualiter quaque versus exten-

*Quartanā  
quæ ab atra  
bilis quæ  
dicitur a pi-  
tuita.*

*Quotidianæ  
non rigore, sed  
non refrigeratio-  
ne quodam  
variatur.*

*Tertianarum  
quæ ardēt  
ferventia in pul-  
su discernuntur.*

*Tertianarum  
signa et sym-  
ptomata.*

tur nihilōq; plus thorax extremioribus caleat: &  
summam impossueris, in primo occurru quidem  
percipitur calor multus & acris, quig; velut quo-  
dem cum vapore effertur: paulo post verò supe-  
rarur a manu: non vt in febribus malis & ad-  
ventibus accidit. Ac iam sane bibendi tempus æ-  
grotanti inest. statimq; post potū plurimus va-  
por calens per tūtem exhalat, sudoris nunciū,  
bilisq; super venit vomitus, venitq; solvitur, &  
bilioium minuitur. Incipit itaq; sudor vapidos  
calidusq;, velut in balneis: totum verò ipsi corpus  
æqualiter fudit, talisq; est pulsus, qualis in  
us quicquid valentes exercitantur & balneatur:  
velox scilicet, magnus, vehemens & creber. Sed  
præter hæc omnia statim ad infebrecitatione des-  
cendit, vniuersum accessiones tēpus ultra duode-  
cim horas nō protrahit. Sæpius autè septē horas  
accessio cõtinet. Nōnunq; citius aut tardius, sed  
non multò, finitur. Descripsimus itaq; veram &  
exquisitā tertianam. Quod si vtrius reddatur ru-  
fa, aut subflava, apparatusque crassitudo medio-  
cris: ac paulo post, vel albam nebulam, vel supu-  
sionem optimam fecerit, febris ipsa ultra quartā  
circum non progreditur. Rustiore verò vtrius  
existente, neq; suspensione aliqua, nec nebula  
in primo circuitu apparente, ad septimum exten-  
detur. Quod si præter alia signa, in vrinis ap-  
pareat subsidencia lævis, æqualisq; circa primū sta-  
tionem dem, ultra tertium circuitum ipsa febris nō  
divagabitur. Inguente autem accessione quartana,  
eximia quædam ad tarditatem ac raritatem  
fit pulsuum conversio. Solet porro quartana fe-  
bris maxime oriri in autumnō, præcipue si tem-  
poris ipsū frigidam & siccam, & inæqualem for-  
natur temperaturam. Quod si etiam regio talis  
februm fit generatrix, & ægrotantis natura atræ  
bili obnoxia, talisque victus ratio antecesserit,  
quæ huiusmodi aggregant humorē: & si eo tem-  
poris quartanæ febres populariter fiant, hominū  
lenolus fuerit, vel febres erraticas passus: si au-  
gmentum & status plurimū contraria fuerint, te-  
nuisq; & albe & aquosæ vrinæ reddantur: si in-  
quā hæc omnia indicia in prima accessione ad-  
sint, quartanam esse febre non dubites. Sed  
quotidianam a tertiana distinguere facilius est.

Nep enim primo statim die cum rigore invadit,  
sed progressu temporis refrigerationes potius  
quā rigores ipsa advenit: neq; vllus ordo  
aut æqualitas pulsibus asidet, cum primū accen-  
siones sunt. Sed nec devrūt laborantes, nec de-  
nudare corpora, & pallia iactare cogit: nec mul-  
tū ac frequenter respirare, ac velut flammam  
ex ore efflare, frigidūq; potum expetere. Verū  
isti cum febricitant, minime sentiunt: vtrināq; ipsi  
in primis diebus tales sunt, quales quartanas in-  
cipiētib; adsunt. Atq; in primis diebus minime  
sudent: sed progrediente tempore hoc etiam  
illis advenit. Eger autem hæc febris, natura hu-  
midior, virag; o ciosa, & plena crapulis. Quare  
in generis asidue fit: æ perrarum est, quin & os  
ventriculi, & hepar in ipsi male afficiatur. Sed et  
cruditates antecedunt plurimū, & coquēdi mo-  
re, & acidi ructus: & cum primū febre incipit,  
præcordia vltra naturalem habet intumescunt.  
Color his cum pallore albus talisq; morborū

*Tertianæ cor-  
pus quæ accen-  
sione tempore  
ad potū dedit.*

*Tertianæ acris  
signa ultra duode-  
cim non protrahit  
horas.*  
*Tertianæ cu-  
qualitate de ser-  
pente.*  
*Tertianæ bre-  
viter solvantur  
quæ vtrius non  
dedit.*

*Quartanarum  
febris signa  
& symptomata  
ta.*

*Quotidianæ et  
tertianæ febres  
discernuntur.*

*Quotidianarū  
febris indicia.*

*Quotidianæ  
cur aliquid  
potus inveni-  
ant.*



hybernium tempus est ferax, & status temporis humilis, & eiusdem naturæ locus: frig accensio num principiu circa vesperam. Ita quidem quotidianæ, tertianæ, & quartanæ, prima die in vicem eliciuntur. Continuas autem febres, quæ idem genus cum his quas diximus habent, similiter primo die vir exercitatus cognoscet. Etenim exquæ sita ardens, cum omnia alia feræ exquæ sita sita iudicia, eo solo differt, quod neque cum rigore invadit, neque ad infestationem desinit.

Quæ verò quotidie accessiorem facit, quando temporis statum, & ætatem, & naturam corporis, & vias rationem antecedentem, ac præterea pulsuum formam, colorumque eundem habuerit cum exquisitis quotidianis, non pervenit autem ad infestationem, idem genus cum illis obtinet. Eodem modo & quæ quarto quoque accessiorem facit sine vlla intermissione, nulla interposita febris quæ, eiusdem est generis cum quartana. Et palam est, quod nec rigor in accessiones antecedit, neque sequetur sudor. Quæ igitur in sola flava bile febris accenditur, sine aliquo affectu viscerum, si quidem manente adhuc iura vasa bile accendantur, exquisita febris ardens dicitur: si verò per totum corpus deferatur, tertiana. Sic & si ab atra bile fiat febris, cum per totum corpus delata fuerit, quartana efficitur: cum immobilis, illa quæ quarto quoque die exacerbat: quadam dñ si ex pituita ortu habeat, vel quotidianæ sunt, vel quæ accedunt singulis diebus.

In vniuersum autem voco continuam febrem, quæ ad infestationem, antequam ex toto solvatur, non definit: etsi declinato aliqua sensibilis in ea deprehendatur. Cum verò nec declinatio aliqua sensibilis fiat, semper verò à primo principio febris viget ad crism simul periculauerit, erit hæc ex genere febrium deurentium, ab aliis verò acutè differet. Sed necin primo die, necin secundo est huiusmodi febrem præcognoscere, nec aliter vel le. Sæpe enim est genus agnoscere, quod scilicet biliosa sit, deurentis, & peracuta. Atque huius generis febres omnes in prima septimana diuiduntur: si verò tertiana pura fuerit, intra septimum circuitum. Omnino autem diuturnæ sunt, & quotidiana intermittens, & illi adhaerens continua, & scvri & quartana, & quæ per quartum exacerbat. Quaræ erunt vniuersa simplicium febrium genera. Singula verò ipsorum in duas primas differencias sciuntur: vel enim intermittentes, vel febres continuæ erunt. At si morbus compositus fuerit, non præque facile cognoscetur. Dupliciter verò genus febrium compositum constituitur: in prima quidem sectione, vel quia ex quas diximus febres citra aliqui membri affectu misceantur: vel quia ex membri cuiuspiam inflammatione accendantur. Quæ igitur citra membri affectum constitunt, dupliciter compositæ: aliquando impleant, nonnunquam verò per totas confusæ. Sic quoque membra inflamata: nam ex ipsis quadam sanè veluti complicantur tantummodo, quædam verò veluti confusione quadam habent dispositionem. Ac febres sanè, quædam complicantur vnius generis cum aliis eiusdem generis, vel vnius speciei cum aliis eiusdem speciei. Cotingit verò nonnunquam, ut etiam differentes misceantur. Nam

quotidianæ tertianis, & his quartanæ, & quæ eisdem speciem seruant, in vicem plerumque implicantur. Quod fit, ut idem homo tres interdum habeat quartanos circuitus: sed hos quidem non est difficile agnoscere. Quandoque verò aliqua ex intermittenti genere cum continua, difficillimè vix explorabilem facit mixtionem. Porro quemadmodum febres, ita & patientia loca missionem recipiunt: vel quia differentia membra propriam singula febrium accendunt, ut len & secur: vel quia dispositione mixta, veluti inflammatione cum erysipela se, aut erysipela cum inflammatione misceantur. Pro differentia enim affectuum particularum, atque etiam earum affectuum, solent enim ipsæ febres variari. Vbi igitur singula accuratè distinctæ, tunc facile missionem deprehendit. Nulla autem est nec species, nec genus, quod circa tertiam vel quartam diem, cum natura sua, immutetur nequeat. Invadat igitur febres aliquæ horrida, atque omnino inæqualis in pulsibus, & in eo qui per totum corpus sentitur calore, ut scirpus propius statum esse exultetur, vel medium augenti obnoceat. Rursum verò horrida fiat, & pulsus minores, debiliores, tardiores, atque ranores habeat: & calorem quidem ab extremis partibus recedentem, circa ventrè atque thoracis, copiosum. Hanc non absque ratione quispian bemitriti fore speraverit, vel potius iam esse: multa autem temore de noscetur. Sed hæc quidem mixta est, ex biliosa pituita quæ febre, non invicem complicatur, sed per se totas confusæ. Quæ autem ex complicatione fit, quadrupliciter consistit. Vel enim tertiana quotidiana committit: vel ea quæ quotidie accessiorem habet continua, illi quæ per tertium continua est: vel tertiana ei quæ singulis diebus accessiorem facit continua: vel quotidiana ei quæ per tertium continua est. Si quæ verò febris in primo die exquisita tertiana deprehendatur, deinceps sequenti die similem priori omnino locent accessiorem, hæc duplex tertiana existit. Sic autem & duæ & tres quartanæ sæpius invicem complicantur, quæ accessiorem forma à quotidiano distinguunt. Tria igitur sunt omnia quæ ex humorum putredine febrium accendantur genera: quædam enim ex flava bile (hæc plurimæ sunt) quædam ex atra, quædam ex pituita constitunt. Aliarum autem omnium febrium varietas, ex miscella horum humorum nascitur. At ephemeræ & hæc febres, alia duo constituunt genera, ab us, quæ dicitur acutæ febres: dicitur. Porro febres acutæ, vel aliquo dætorum humorum copulantescente, vel membrum phlegmone obfeso, gignitur. Merantur autem nonnulli, quod post intermissam febrem cito continua misceat, quod quæ nulla intermissione succedente febri, interdum solæ intermittentes mutuo inter se misceantur: id quod accidit non in tertianis tantum, sed quodammodo intermittentes, sed etiam in ipsa quartana. Cum enim plures invicem copiantur, siue eiusdem generis, siue diversæ, accidunt febres secunda plurimè anticipet advenire, utique prima in exactam integritatē definat. Deinde rursus tertia eidem succedit, antequam perfectè solvatur. Hoc verò maxime accidit in longioribus accessiionibus. Etenim trium tertianarum complicatio, in secundo statim die nobis

Quartana in-  
cessione tribus  
post vnam re-  
currit: simul ha-  
mone acria.

Patientia loca  
quomodo effe-  
ctus sunt imple-  
ant.

Hemorrhia si  
bre deturqu-

Hemorrhia et  
flava et biliosa  
pituita, feb-  
res per se totas  
confusæ, vel ex  
istam vniuersi  
quod fieri qua-  
drupliciter pos-  
sunt.

Tertiana dup-  
lex quando  
adfectu delinquit.

Febrium putredine  
intra septima-

Febrium acuta  
quibus genus ex  
accessiorem  
pupis.

mani-

Adhuc enim ex-  
quisita sunt  
natura, & ætatem  
corporis, & vias  
rationem antecedentem,  
ac præterea pulsuum  
formam, colorumque  
eundem habuerit

Citius qua-  
rtana de jure pte

Cautione enim  
intermittens  
tota per se de-  
finit, per se  
modum  
generatiōis.

Febres continua  
per se de-  
finit, per se  
modum  
generatiōis.

Deurentis fe-  
bris.

Tertiana pura  
intra septimam  
diem definit,  
siue deurentis,  
siue continua  
sit.

Febrium genus  
compositum  
constituitur dupli-  
citer.

Febres quædam  
inter se mis-  
ceantur.

Febriū quæ ex  
loco partibus  
accidunt, forma  
composita  
est. Plurimum  
signa, & Symptoma-  
ta.

manifeste est conspecta. Earū verò febrium quæ  
ex locis partibus accidunt, forma composita  
est. Quædam enim loci indicia præ se ferūt: quæ-  
dam autem eius, ob quam consistunt, causæ. Vel  
vni in morbo laterali locus quidem patiens est,  
totaque fluctans membrana. Quæ quidem cum  
inflamata sit, necessario dorem inuenit, quoniam  
neruosa est: sed hunc pungentem, & longe  
extensum, quoniam pars affecta, est membrana.  
Quæ quidem cum vnum sit ex spirandi instru-  
mentis necessario difficilem habebit respiratio-  
nem animal. Quia verò & cordi & pulmōi pro-  
xima est, necessario & febricitabit, & itam in-  
stabitur tui: nō tamen itam expuet. Sed si qui-  
dem multū ac crassum ab inflammatione desuxe-  
rit, tunc rufi expuet: si verò paucū & tenuē, irri-  
tabitur quidē necessario, ita vt rufus moueatur:  
nō tamen expuet, anteq̃ collectum simulq̃ cō-  
coctum ad multitudinē crassitudinē conuer-  
teretur. Nunquid verò magis puritofus, vel be-  
tiosus humor, is qui inflammationē, & forma  
sputorū cognoscet. Nam si sputa sunt humo-  
sa, fluxum maximē pituitosum ostendunt: si  
autem, biliofum impermittit: quæ vtriusque sunt,  
amarum quidem & ita referuntur: & non  
paucū in serofum humiditatem cuiusdam miki-  
ri significant: & multo amplius, quæ nō pā-  
da quis expuerit. Sic & nigra, atra bilis maxum  
ostendit: licet quæ magis rubida sunt, plurimū  
quidem sanguinis: minimum autē amaræ bilis, in  
eo qui inflammationem facit, contineri significat.  
Atq̃ idē inter omnia sputa hæc sunt minora: si  
vni nigra, magis exaltata. Pulsus igitur pleuritico-  
rum, quæ quidem duram præ se ferūt tensionē,  
neruofum quide locum affectum ostendit: quæ verò  
terre similis est, inflammationis affectum. Quæ  
velox simul & frequens, ac magnus, ad inflama-  
tionem consequi febrem. Quæ singula quæ  
dictis sunt, maiora aut minora sunt, vel magnam  
esse, vel paruum ostendit dispositionem. Igitur  
aut simplex est febris, aut composita: vel cum loco  
patiēte, vel ephemeræ, vel hectica. Si simplex o-  
mnino fuerit, humoris indicia asert, ex quo geni-  
ta est. Si verò composita, ex quot simplicibus fe-  
bribus composita est, totidem numero humorū  
multitudinem indicabit. At si hoc indicet, illud  
etiam significabit, nūquid morbus diu durabit,  
an citō iniurius. Nam si humor pituitosus extite-  
rit, necessario diuturnus erit: longē verò magis,  
si atra bilis naturam referat. Quod si ad flauam  
bilem inclinet, minimē quidem diuturnus erit.  
Sic & locus patiens, qui quidem motu multo ex-  
ercetur, calidiorq̃ est, ac rarus, & principatim ge-  
nitur, acutiore fore morbum potest. Qui verò  
atq̃ in motu continuo est, frigidiorq̃ ac densus,  
& ite principatim extitit, ad longius tempus de-  
bere extendi significat. Eodem modo & disposi-  
tio, si quidem difficile motum libuerit, frigi-  
diorq̃ fuerit ac densior, diu duraturum: sin autē  
facile moueatur, calidiorq̃ fuerit, & rarior, citō  
solum iri. Similiter & de causis est iudicium.

Symptomata  
res ostendunt  
differencias hu-  
morum quæ  
tam pleuritico-  
rum.

Ipse minor  
quæ sunt  
pleuritico-  
rum quæ  
causis  
magis.  
Plurimum  
signa quæ.

Febrium diu-  
sa.

Febrium longi-  
tudinis ex  
humoribus depre-  
hendi possunt:  
natura humoru-  
rum ex quibus  
generantur, vel  
diffinitionem  
patentem à qui-  
bus procedunt.

Causis respici-  
mus: calidiorq̃  
duram febriū  
fieri proprie.

dum. Post has, earum, quæcumq̃ membrorum  
sunt principatim habentium, facile mobiles ca-  
lidiorq̃ dispositiones. Ephemeræ verò & hectice  
febres, sine magna perturbatione, & minime sub-  
itas faciunt permutationes. Ergo in omnibus in-  
flammatiis particulis conspicio ipsa, quæ locum  
probe distanti prohibet, itam quidem putrescit  
humores, itam quidem calorem excitat,  
quas & in reliquis omnibus putrescentibus in-  
guitur. Cuius caloris modus, cum simplex fue-  
rit, necessario alicui earum, quas diximus, febriū  
aseimilatur: vel potius vna ex illis est, vel ad a-  
maram bilem, vel ad atram, vel ad pituitam at-  
tenuis. Omnis enim humor qui inflammatione  
nem efficit, vel flauæ bilis est, vel atræ, vel pitui-  
tæ. Si igitur impermittit multaq̃ flauæ bilis fue-  
rit, tum facit erysipelata, & eos qui herpes no-  
minantur: si vni nigra, caneros, & phagede-  
nas, aut elephantos, aut aliquem ex his adeo in-  
curabilibus morbis. Quæcumq̃ verò ingruente  
pituita in tumorem attolluntur, hæc eadem  
nuncupantur. At qui sanguis atræ bilis est permi-  
stus, duas gignit inflammationes: erysipelati-  
bus verò similes, qui amare: indurata, qui pitui-  
tæ. Quæ verò ipse secundum naturam se habens  
sanguis, trahit in locum fluxionis obnoxium put-  
rescit, luc quidem affectus inflammationis est. Sim-  
plex verò ex ipsa febris accenditur, maximē e-  
phemeris similis, quæ ex inflammationibus in-  
guinum accidunt: nam & ipsa inguine inflam-  
matio ex optimo sanguine fit. Liqueat autem, q̃  
cum his putrescere coepit, non amplius bonus  
remanet, sed iam ad amaræ bilis naturam tran-  
sit. Atq̃ in hoc illud seruat, triplex esse genus  
vniuerum simplicium febrium. Quæ enim ex  
sanguine putredine fit, iam quodammodo bi-  
liosa est. Etiam sanguis ex moderato calore gi-  
gnitur: flaua autē bilis, ex maiore: atra verò ex  
impenso immodico. Quicquid igitur pingue ac  
tenue in sanguine est, fit flaua bilis: crassum ve-  
rò, ac velvni fax, quando immodicē exaruerit ex  
calidum, atra. Flaua etiam bilis quandoq̃ in a-  
tram convertitur, cum assata fuerit. Omnes igitur  
quæ in particula aliqua accenduntur febres,  
vnum aliquem ex dictis, vel simplicem, vel com-  
positum characterem habebant. Qui verò sin-  
gulas per se febres exquirere cognovit, earum is  
missionem nō ignorabit. Ephemeræ febres so-  
lius spiritus sunt passionis, absq̃ humorū putre-  
dine, aut membri inflammatione, nisi inflamma-  
tis inguinibus accidunt. Earum autem genera-  
tionis sunt occasione communes, vigilia, credi-  
ditas, tristitia, timor, curæ, iracundia, deuitio, res  
frigeratio, lassitudo, ebrietas, & quæcumq̃ simi-  
lia. Communiter omnino pulsus promouetur ad pa-  
uiat atq̃ frequenter, & non nūq̃ ad magni-  
tudinē. Exquirere autē seruat eam quæ secundum  
naturā est, æqualitatem, mollitiem, & ordinem.  
Sic & vrina, nōnullæ quidem, suspensiones, nō-  
nullæ verò subsidentias bonas habent, quædam  
autē nebulas. Omnes calor probe coloratæ sunt,  
sicuti & in omnibus calor vapidus est: atq̃ ab o-  
mnibus ipsis absunt maligna accidentia. Commu-  
nes autē sunt omnib. & vrinae rufiores. Ceterū  
is qui ob tristitiam febricitans, acrimonia positis

Conspectio fe-  
brem quæ ratio  
nō regnat.

Inflammatio  
græca vel fle-  
uicula, vel atra,  
vel pituita-  
ta. Bili quæ elat  
tenore. Atra bilis quæ  
in tumore ge-  
gnat. Pituita quæ  
indurata.

Sanguis prode  
nt proprie du-  
lam inflama-  
tionem.

Sanguinem po-  
trecentem ad  
amaræ bilis  
naturam tran-  
sire.

Humorū gene-  
rationis atque  
transmutatio-  
nis.

Febrium multo-  
rum ad vna  
buique singu-  
las simplicium  
accidit.

Ephemeræ fe-  
bres, si singu-  
las sunt, quæ  
fuerit.

Ephemerarum  
febrium causa.  
Ephemeræ fe-  
brium causa.

Tristitia que  
figura arguit.

Oculorum ex  
genio seu e-  
tiam animi of-  
ficio arguitur.  
Vagabundus  
oculus signa-  
tur. Interdum  
signa-  
tur. Febris et  
laseris signa-  
tur. Ephemera ex  
densa causa.

Ephemera ex  
bubone orta  
que arguitur.

Febrilis non fe-  
brilis in pri-  
mo diebus, sed  
in progressu.

Crisis per oculi  
laseris dicitur  
subita permuta-  
tio morbi ad  
salutem. Crisis mala.  
Crisis imperfecta.

Crisis per oculi  
laseris dicitur  
subita permuta-  
tio morbi ad  
salutem. Crisis mala.  
Crisis imperfecta.

Crisis per oculi  
laseris dicitur  
subita permuta-  
tio morbi ad  
salutem. Crisis mala.  
Crisis imperfecta.

Crisis per oculi  
laseris dicitur  
subita permuta-  
tio morbi ad  
salutem. Crisis mala.  
Crisis imperfecta.

Crisis per oculi  
laseris dicitur  
subita permuta-  
tio morbi ad  
salutem. Crisis mala.  
Crisis imperfecta.

Crisis per oculi  
laseris dicitur  
subita permuta-  
tio morbi ad  
salutem. Crisis mala.  
Crisis imperfecta.

adeft, q̄ multitudo calorif: ficuti qui ob iram,  
contrario modo. Sed & tenuitas corporis in iis  
qui triftitia, q̄ in iis qui cura vexati funt, manife-  
ftus apparet, & oculorum cōcauitas, & mōftra  
quēdā decoloratio. Et hęc quidem cōmūia o-  
mniū crīf aliorū, q̄i quocūq; modo cōgrato  
fibus implicati fuerint, indicia funt. Sed præci-  
pue ex oculis funt discernendi: hęc enim ex his  
crīf in fanis animi affectum cōfcre. Eos qui vi-  
tuta vigilaerunt, diftinguit decolorationis mo-  
dus: fubrimada præterea ipfif: eſt facies, palpe-  
brisq; nō facile attollit, oculofq; habent præhu-  
midos. Iracūdia neq; oculorū cōcauitas, nec ma-  
nifeſta ineſt decoloratio. Sed nec magnitudo pul-  
ſu auctur. Eorū verō qui febricit ex laſitudine,  
cūctis eſt ficcor, q̄ in aliqua alia febrim ephē-  
merarū. Quę ex denſata cute febres oriūtur, fo-  
le inter omnes ephemerarū in paſſione aſtricta  
cōſiſtunt, faciliq; diagnoſcūt ex tactu: ficuti &  
ante febres quę ex laſitudine fiūt. Caliditatis  
autē morus iūis quodāmodo augeſcit. Earū ve-  
rō febrū ephemerarū, quę ex bubone accendun-  
tur, pulſus maximū funt, veloces atq; frequentes,  
calorq; plurimus, qui poſt ſtatim ſtatim ex pro-  
fundo attollitur, ſed ſuauis. Præterea rubas fa-  
cies magna ex parte ipſis ineſt, & maior tumor  
& vrinę ſubaltis. Cōmūia autē his febrim in-  
tē equalitas pulſuū. Quia verō nulla hęc crīf  
febrim in primis diebus, ſed in progreſſu tēpo-  
ris fi, de illis non agemus impæſentiarum.

### GAL. DE CRISISVS LIB. III.

**V**bi morbus ſubito ad ſanitatē peruenit,  
ea permutatio omniū organa eſt, atque  
ideo ipſam per excellētiā crīſim voca-  
mus. Ea alia autē permutatiōib; quę quidē  
ad ſubitā mortē ſit, mala crīſis exiſtit. Quę ve-  
rō aliquam eſtate dignam mutatiōē efficiunt,  
nōn tamen inſeſſam ſolutiōē, imperfēctę crī-  
ſes vocantur: ſicuti & quę ſenſim emoriente vel  
ſtante, vel morbo contingunt: quę ſolutiōes  
ſimpliciter non crīſis vocari debent. Solā igitur  
ſubita ad ſanitatē conuerſio, ſimpliciter crīſis vo-  
catur: quę ſi ſubitis quibūdā excretiōib;,  
aut eſtate dignis abſceſſib; q̄i cūq; enim al-  
ter quęcūq; retrocedunt malignius. Antecē-  
dantē autē huiusmodi excretionē abſceſſuq; non  
mediocriter perturbatio in ægrotante corpore.  
Nam anxietates, vigilię, demētie graves ſom-  
ni, reſpirationes difficiles, vernigies, ſenſuum  
difficultates, dolores capitis, collis, ſtomachi, &  
multorum aliorum membrorū: nonnullis verō,  
aurium ſoniſus, & vane ante oculos apparent  
imagines, & lachrymę involuntarie effluunt, &  
vrina reſinetur, & labrū agitatur, & aliquid tre-  
mulum ſit obſtūo præterea, & præſentis igno-  
rantia, & vehemens rigor accidet, & plurimum  
acerbiſſo conſuetam accipit horam, & multus  
vritus, ſitūq; inexpugnabilis ſequitur: claudunt  
& ſalutē, ſicuti fuerentes, nec poſſunt in eorū  
ſua recumbere. Deinde repente multus ſudor ei-  
rumpit, aut vomitus nō exiguis inſequitur, aut  
venter ſubito ſoluitur, aut abundantia ſit ſluxus  
ſanguinis, aut hæc omnia ſimul contingunt, va-

de non parvus invadit timor adſtantes. Vigila-  
tur quālē ſit habitura exiſti præſentis crīſis, agno-  
ſcas, prævidēs autem futurā, primū ac maximū  
omniū expendēdo excretionē ſunt ex vrinis, ſi  
ui excretionē, atq; ex ipſis ſpūis. Quippe nemini  
vidi intereuntē, quę præcedentibus cōſe-  
ntiū, cūq; ipſam navit. Non tamen iniqui  
omniū ignori dignitas exiſtimanda eſt: ſed in  
morbis quidem thoracis atq; pulmonis, præci-  
pue ſputa ſunt exploranda: non tamen vrinatū  
contemplatio explorenda: ſed & excrementa  
ſunt inſpicienda. Si verō tantū febricit abſq;  
aliquis viſceris affectione, aut ſi etiam aliquid  
eorum quę circa hepā, renes, veſicā, atq; ſple-  
nem habentur, phlegmone obſeſſum ſit, maxi-  
mū vrinis eſt intendendū animus. Sicuti ſi crī-  
ſis ventriculalem paſſiōē conſiſtat, primū excre-  
menta alui inſpicienda: ſed neque interim ſunt  
negligendę vrinę. Primū igitur & maximum in-  
ſtantis horę crīſis inſpiciunt ſunt concoctionē.  
Secundū autem, quod ab aliqua die indicatio-  
ria, indicata prius fuerit, cui annexa ſit dies ipſius  
indicandę ſit cultas. Deinceps verō inſpicere o-  
portet, quid morbi, & moris: ac poſtea, ſi  
forma ipſa excretio reſpondeat. Etenim  
ſi febris ſit, vel ſanguis eſt naribus pro-  
fluens, vel ſit vehementer rigorem ſudor plu-  
tus & calidus per totum corpus manabit: aut per  
vomitum, aut per alium, bilioſum aliquid excre-  
tetur. Ita & tertiana vomitibus & excrementis  
bilioſis, & ſudoribus toto corpore fluſſibus,  
ſinit debet. Parvum autem puerū in febrim  
excrētū quō ſidiano, & multi per totum cor-  
pus ſudores ſunt. Finis autem & pleniſſimū ſit  
dus multus, præcipue ſi calidus eſt capite ſuſcit,  
ſudante ſimul reliquo corpore. Contingit etiam  
interdum, vi per ſanguinem ſuſcit, & naribus  
pleniſſimū etiam ſoluitur. Non tamen lethargus,  
aut pericūpationis ſignis ſanguinis amittit. Inter  
ipſas autem pleuritidis morbus obſinet locū. Leth-  
argus etiam hepatis ſoluit inſtāntiōes, ſi ſi-  
mul adſit acuta febris, ſanguis eſt naribus pro-  
fluens: ſicuti & reſignata omnes, quę ſub præcor-  
dis ſunt, ſeruentes & acutę inflammationes.  
Oportet autem per directum fluere ſanguinem,  
ex dextra quēdē nare, pātente hepate, vel lo-  
cis ſub dextris præcordiis poſitis: ex ſiniſtra autē,  
lietie, & locis vicinis. ſuaſ crīf & ſudor bonis  
omnes quę ſunt inſta præcordia inflammationē  
calidas & acutas. Hepatis verō cōvexę quidē  
partes patientes, fluxibus ſanguinis eſt nare dex-  
tra, ſudoribus bonis, copioſisq; vrinis ſoluitur.  
Cave autem partes excrementis bilioſis atq;  
ſudoribus non ſit verō & vomitibus. Sudores ta-  
men omnibus febrim proprii ſunt, & præcipue  
per vrinis. Finiunt autem quartanę febres, ſi  
atq; ſimul cum eis atq; varia excrementa: ſem-  
per tamen verō, ſi bilioſa ſimul & pueriſſa. Sol-  
vunt etiam parvitas, lethargos, reliquosq; om-  
nes affectus capitis. Porro ceteri abſceſſus, fe-  
bres, & diſtantes ſecurę ſoluit conſue-  
tudo. Sed & excretionē atq; naturā parit  
ratio antecēdens. In qua ſi quo argu-  
tus, præſentis ſtatu tēporis ve-  
landa. Atq; ex his quę diximus licet  
exer-

Crisis bona  
est expendenda  
ad cognoscendam  
prophetiam  
crisis  
ac præcedendi  
fuerunt  
variisq; etia-  
m post crisis  
nas præcedit  
habuisse, non  
vnde Galenus  
respondet.  
Excretionem cor-  
poris, quę ex  
quibus morbis  
parvitas  
respondenda.

Crisis bona est  
inducenda  
inducenda.

Ardenſis febris  
plena est quibus  
excretionibus  
ſit.

Tertiana febri-  
lis curatio  
bala testatur.  
Quædam autem  
febres quę ex  
crisis adſi-  
t.

Parvitas quibus  
excretionibus  
ſoluitur.

Sanguis eſt naribus  
fluens atq; dexte-  
re præcordiis,  
quibus febres  
inflammationes.

Hepatis parvitas  
quibus excretionibus  
ſoluitur.

Sudores autem  
parvitas  
ſoluitur.

Sudores autem  
parvitas  
ſoluitur.

Sudores autem  
parvitas  
ſoluitur.

accidit vixis presentem crifim cognofcere. Ad  
præcognofcendum vero futurâ, illa quæ nuper  
diſimus, vnâ cum natura morbi fimiliter expen-  
denda funt. Poſt hæc autem & acceſſionis circui-  
ventus veniunt conſiderandi, an per tertium, vel per  
quartum, vel per fingulos dies eueniant, vel nullo  
modo eueniant, ſicut in ſynochis accidit. Si enim  
propærauerint, ac ſemper proportionabiliter an-  
tiſcipuerint horâ, aut multo vehementius inſeſſen-  
t, & per tertium occurſauerint, citiſſimè crifis  
ſubſecuturâ denunciat. Si verò lente moueantur,  
atq; cadê in vaſerint hora, & ſingulis diebus ſiât,  
poſt longius tempus crifim futurâ portendunt.  
Præterea cõditiones inſpicere oportet, quarû inſi-  
gnis permutaciones, ſi in diebus indicatoriis  
accident, indicia ſunt, quòd ſequentes indicato-  
riæ dies ægrotû abſoluent morbo. Minimè autē  
contingit, febrem omnia ſigna ſecuriſſimâ ha-  
bentem, nec illam, in qua ſunt omnia maxime  
perniciôſa, alteram quidem nõ liberare, alteram  
verò nõ occidere in primo quaternario ægro-  
tantem. Cũ autem vnaquæque acceſſio qua-  
tuor habeat partes, principium, augmentũ, ſta-  
tum, & declinationem, vel hæc omnes breui tem-  
pore acceſſio percurrit, vel tardo: vbi nonnullas  
quidem crifis, nonnullas verò ſeriatim. Si omnes  
igitur celeriter peragat, manifeſtũ inde fit, quòd  
ad crifim propæat: omninoq; huiuſmodi febris  
eſt de numero intermitentũ. Nec enim contin-  
git, vt illa quæ omnes celeriter peragat, amplius  
continũ permaneat: ſicvri neque vt quæ in om-  
nibus partibus proluxurante ſeruat, fit intermit-  
tens. Voco febrem intermittentem, quæ ad infe-  
bricitationẽ peruenit. Porro febris ſynocha lon-  
gius eſt ſtans: \* imò vero tota hæc febris ſtans  
eſt. Cũ igitur morbi ſpecies, & magnitudo, &  
motus & mos, inter ſe diſtinguantur: & ſpecies  
quidem ſit ex proprijs accidentibus cognita: ma-  
gnitudo verò, ex eorũdem quantitate: motus  
ex tempore acceſſionis partũ: mos, ex acciden-  
tibus ſuperuenientibus: his quoq; adiuncta con-  
ſideratione temporis ſunt, & naturæ, & regio-  
nis, & ſimilium: quicquid moritur æger, aut ſer-  
uabitur, ad hæc ſua reſpectus inueniet, ad ſpec-  
iem, & motum, & magnitudinem: ſed præcipuè  
motum expendere oportet. Virum verò per tri-  
duum terminatur morbus, alii non, primũ qui-  
dem ex motu ac magnitudine perſpicies: dein-  
cepſa autē ex ipſius ſpecie: poſtea ex anni tem-  
pore, & ex alijs quæ ei ſdem ſunt ordinia, & ex ſu-  
peruenientibus accidentibus, quæ vel vnâ cum  
crifis ab initio intra dũt, vel paululum anticipat.  
Nam cũ ſuperveniẽtia accidẽtia diuiduntur tri-  
ſariam in ea ſubdit quæ mori morbi naturæ ſu-  
ſcendere apta ſunt, & in ea quæ antea non pro-  
ſeſſim crifim ſignificant, & in ea quæ non ſolum ſi-  
gnis, ſed etiâ cauſe crifis exiſtunt. primũ quidem  
ex his ſimpliciter ei genus: ſecundum verò & ten-  
acum nõ ſemper, neq; idem facere neq; offendere  
eſt apertum, ſed variatur ſecundum tempora. Si æ-  
ger igitur primo die habeat ſigna ſalutis manife-  
ſtiſſima, huic in primo quæ terminatione ſolus mor-  
bis. Virum verò per ſolutionem vel quæ terminati-  
onem, iudicantur omnino: parva autem quantitat

ſoluuntur. At dies crifis ex ipſo motu inuenitur.  
Nam ſi febris ſynocha fuerit, nulluſque accide-  
rit error, ſperandum eſt crifim quarto futuram  
die. Si verò continua fuerit, magnitudinẽ ac mo-  
tum inſpicere oportet. Conuenit namq; in tempo-  
re vel quinto die crifim fieri: ſi tẽmo quidẽ, ſi mor-  
bus fit magnus, ac motum habeat velocem: in  
quinto autem, ſi nec valde magnus ſit, nec mo-  
ueatur velociter. Oportet enim crifim in idẽm  
tempus incidere cum acceſſione. Ob id quarto  
acceſſionis quinto die continuatur crifis videat.  
Continuat enim febris, quæ in acceſſionibus cri-  
ſim habent, tertio die, vel quarto rationabiliter  
ſinitur. Aduaut morus celeritate morbi ma-  
gnitudo, & anni tempus, & regio, & ætas, & quæ  
cumq; alia amare bili conueniunt. Tardius autẽ  
morus inſunt contraria. Cæterũ principũ ſigna,  
ſi diuſus perſeuerant, diuſum fore morbum  
ſignificant. Augmenti verò, ſi in quarta vel ſep-  
tima die apparuerint, ſperandum aliquid in qua-  
rodecimo eſt: id tamẽ vndecimo deſignabitur.  
Nam ſi ſigna tria in eo die coniuncta fuerint, &  
morus velociter, & febris magnitudo, & mani-  
feſtum cõditionis indicium, ſic crifis in quarto-  
decimo. Si verò ſolum manifeſtum cõditionis ſi-  
gnum die vndecimo appareat, nec tamen morbi  
magnitudo, aut morbi velocitas ſeſſinarint, tũc  
vltra de decimo quartũ differunt crifis. At ſi nec  
die quarto decimo aliquid innotuerit, ſic, qd  
ſit ex quæſitiũ, nunc ad diem decimiſeptimũ eſt re-  
ſciendum. Si enim in eo appareat aliquod ſi-  
gnum, id ſideliſſimè eſt, quod ſi perſeueret, crifis  
ſimiliter viginti dies præmonſtrabit. Quæ igitur cri-  
ſes poſt ſigna optima, & ex quæſitiũ factæ fuerint  
cõditionẽ, ex neceſſariõ erunt optimæ: quoniam &  
ſola cõſilio, crifis celeritate ſalubre offendet. Ex-  
quiliata verò ſit cõſilio reſpõte ſtama. Cũ igitur  
forma victus ad ſtatu inſtituat, & crifis optima  
in illo ſit, vñq; omnium crifim ipſe eiſ regula.  
Quæ emuliculi eſt proximior, altera magis di-  
ſtante eſt pñor. Quare in nulla re adeo exerci-  
tandũ eſt medicus, vt in ſtatu præcognitione.  
Etenim quicquid morbi ſtatu tempus præterierit  
inſtitutum, hi ſine crifis perierunt, & paulatim ſol-  
uuntur: nullamq; periculũ eſt, ſtatu tempore e-  
lapſo, quantũ iudicio allequi poſſum. Qui vñq;  
perierit in declinationibus, omnes q; aut pro-  
prio ſunt, aut errore medicorũ extingui, nequa-  
quam vñq; morbi. Vbi enim natura ſuperior eua-  
ſit, reſiſtũq; vehementiori morbi conſtat, & quæ  
infeſtabant oppreſſit (hoc enim eſt ipſa cõſilio)  
fieri non poſſet, vt deinceps ſuccumbat. Quod ſi  
a morbo nõ vincatur natura, mortem ſubſequi  
nullo modo contingit. Si quidẽ nihil aliud mors  
eſt, quàm omnimoda nature proſtratio. Igitur  
an moriturus ſit æger, nec ne, præcognoſcere nec-  
mo, niſi ſtatu tempus præſciat. Vt autem ſci-  
re non poſſimus, an portando oneri quicquid  
ſuſtineat eſt, ſolumus robore, oneris magnitudi-  
ne, ac vix longitudine antea nõ explorati: ſic  
nihil de ægrotantis ſalutẽ prius pronũciare lice-  
bit, quàm magnitudinem morbi, naturæ robur, ac  
iuramentum inueniariamus. At verò ex tri-  
bus ſic cognouerimus, nunquid liberabitur an  
moriatur æger, colligere ita poterimus aliquid

Synochas dicitur  
ſi eſt a contin-  
nua febris.

Criſis in idẽm  
tempus debet cum ac-  
ceſſione.  
Continua fe-  
bris, quare tan-  
to vel quatuor  
die ſinitur.  
Morus celerita-  
tem, tardita-  
tem, aduaut  
na.

Criſis optima  
qua.

Vñq; rationẽ  
inter ſtatu  
ſapientia.

ſtatu morbi,  
euanſi crifis  
eſt regula.

ſtatu præ-  
cognoſcere maxime  
cura eſt medi-  
ci debet.

ſtatu tempore  
claſſe, ſolus  
paulatim mor-  
bus, aut quicquid  
eſt perueniunt.

Mors eſt omni-  
moda nature  
proſtratio.

Prædictum ſi  
ſtat vel morbi,  
debet prius ma-  
gnitudinem mor-  
bi, naturæ ro-  
bur ac fortitudi-  
nem, colligere.

Si longitudinis indicia adiint, secundum quater-  
nionem excedit, hoc est, diē septimū: ex qua qui-  
dem præcognitione, qualis debeat esse nutrien-  
di modus, perdiscis. Si quidem quō longius ab-  
suerit status morbi, ac morbus ipse clementer  
fuerit, eo nutries vberius. At morbi qui ad decimū  
quartum omnino sunt crudi, tardiusq; mo-  
uentur quodāmodo, nō finuntur ante quadra-  
gesimū diem. Quare signorum vires maxime co-  
gnoscere oportet. Ut igitur quartus septimū, sic  
vndecimus decimūquartū est index. At vigesimū  
& vigesimūprīmū, index est decimūseptimū: ma-  
gis tamē vigesimū, vt decimūoctauus & solus vi-  
gesimūprīmū. Cōsiderare autē in vniuersum opor-  
tet, tonas morbi morū, omniūq; indicia & sym-  
ptomata vt vult quilibet animi vna valeamus.

### AMENI

— de diebus decretoriis, lib. II.

Natura in sta-  
gno providen-  
tia.

**Q**uanta sit providentia naturæ, quāvis or-  
do & ornatus in morionibus suis anima-  
liū generatione, ortus, & incrementa in-  
dicant. Si quidem cuiusq; animantis conceptus,  
suū tempus est statutus, natura subicit ordinatos  
semper morus seruante. Post partū cūa anima-  
tia singulari incrementū, perficiuntur atq; fasci-  
culi, idly præstans temporibus. Cæterū si recorderis  
quanto pere providentia & ordine superetur cæ-  
denda hæc atq; inferior natura, ab æthere illa &  
caelesti, vniq; huius nostræ substantiæ motui non  
ordinē, sed illius perturbationē tribueris: necnō  
quicquid in ea pulchrum ordinatūq; est & arti-  
fiosum, omne id a superna illa natura omnino  
emanare putabis: sicut inordinatū omne & er-  
raticum, a nostra proficiat materia. Est autē na-  
tura in nobis quædam res ordinata. Quæ quidē  
vbi superat materis proportionibus quibuscūq;  
certis, ordinatisq; periodis, suas motiones peri-  
cit. At quæ aliquando præter rationē eveniunt,  
ordinemq; cōsumunt, tunc ipsi obveniunt, cūm  
nō planē materiam viciunt, sed impediunt ab ea,  
prohibentq; moueri proportionibus suis. Si igitur  
caelestes substantiæ, necnō quæ terrenis ani-  
mabus insunt, certa quadā proportione ma-  
nifestē mouentur, neminē sanē debet videri mirū,  
si decretoriū dies numerū ordinatū fortiantur.

Natura quid.

Constat autē vniūquāq; septimanā esse perfectā  
periodum. Quippe medius ipsius ab vtroq; ex-  
tremo æqualiter distat, ob idq; ad ambo similem  
cōmunionem fortitur. Etenim quartus dies mor-  
bos qui primo die non cessant, soluit: vndeci-  
mus rursum, quos septimus nō discussit. Quod  
si morbus maior sit, q̄ vt iudicari quarto die pos-  
sit, solutio quidem ipsius in eodem & præparatur,  
solus autem septimo die adicietur. Pari modo  
quod septimo nō desierunt, eos natura soluere  
vndecimo die molitur: quare autē ipso eos iud-  
icat, aut decimoquarto disponit. Verū septima  
næ præcipua sibi vendicans vires, dein quater-  
nionem. Nec negligere tamen oportet dies inter-  
calares, tertium post, quintum, sextum & nonū.  
Porro sint vigesimū diem tres septimanæ finiun-  
tur (vt Hippocratis arbitratu) oportet haud du-  
bitē decimūseptimū diem esse vigesimū iudicē:  
excidere autē a primo dierum decretoriorum

ordine, decimūoctauū & vigesimūprīmū. At  
si integræ hebdomades connumerandæ sint, de-  
cimūoctauus vigesimūprīmū erit index: ratio-  
verō nullam decretoriam habebunt, decimūse-  
ptimū, & vigesimū dies. Cūm autem nō solū  
iudican morbos decimūseptimo die, sed firmi-  
ter iudicari & absq; recidivæ timore, proficiatur  
Hippocrates, sanē inter validos & primos decre-  
torios debet annumerari. Quare si cōstituiamus  
decimūquartū diem vt finem secundæ, sic ini-  
tium tertiæ septimanæ existere (quod Hippocra-  
tis doctrinæ est consentanea) vtq; decimūse-  
ptimū primi quaternionis in tertiā septimanā eris  
finis, atq; index vigesimū, tertiā hebdomadam  
reminantis. Quippe vigesimū die plures abso-  
lute fuisse factas morborū iudicationes, experie-  
tia didicit etiam Hippocrates: id quod naturam  
decimūseptimū sanē ab vnde cōprobat. Quin et  
in permixtis aliis diebus, qui ex ordine decimi-  
septimi sunt post vigesimū, fuisse morbos inte-  
gre ac feliciter iudicatos meminit: vt in vigesi-  
moquarto, vigesimoseptimo, trigesimoquarto,  
quadragesimo, & octogesimo: in nullo autē eo-  
rum, qui a decimo octauo procedunt, facta sup-  
putatione per septimanas integras, tale quid cō-  
gruē prodidit: excepto vigesimoprīmū, in quo  
aliquando morbi facta fuit crisis. Constat itaq;  
de cūmseptimi ordinem altero longe fortiores  
existere: ipsūq; decimūseptimū decimo octauo  
& vigesimū vigesimoprīmū, quod perinet  
ad iudicandi vim, multis numeris antecellere.

Porro quāto vterius morbi pro cesserint, dis-  
tantioreq; evaserint, perturbatio quæ præcipi-  
tem immutationem præcedit, tantō magis cō-  
quiescit: iudiciūq; ipsa tunc paulatim venientia,  
duos aut tres dies in totum occupant. Vnde me-  
dicorum nōnulli diuturnos morbos minime iu-  
dicari pronunciant. Quam q̄rē nihil aliud esse  
iudiciū, q̄ solutio nō morbi, vel testimonio Dio-  
scoridi, liquet. Non tamen putandum est, diuturnos  
res morbos necessariū absq; vlla conspicuis iudica-  
tioni excretionē. At eorum crisiū plures semper  
dies occupare. Aliquando iudiciū morbi diutur-  
ni fuerūt iudicari de vnicō, idq; per excretionē.  
Differūt autē huiusmodi omnes inter se dies,  
tam natura, rum vī. Natura sanē, quia omnib;  
pulchrē evenientibus ad quaternionis circūitus  
iudicia omnino pervenit: erratis autē quibus-  
dam, in coincidentibus recidunt. Vīa verō, nam ad  
fuisse crisiū cognitionē quaternionis circūitus  
sufficit. Cæterum ad iam factā crisiū iudicandū,  
omnibus semper opus est cognitis. Est autē lōge  
ruror crisiū quæ nono die accidit, quāq; quæ oc-  
tauo. Porro certitudo iudicij, ad bonā victuaria  
tionem iudicatis morbo præscribendam conda-  
cit. Prænoscere autem quando crisiū adveniat, ad  
nondum iudicandos est necessarium. Dierum igitur  
differēntias haud ignoras. Hippocrates, enev-  
rit eorū tantū in prognosticis atq; aphorismis  
meminit, qui secundum quaternionem inter se cō-  
plicantur. At quippe in prognostico: Febres, si-  
ne sanas ab iis quæ evadit, sine perat, equalis  
dierum numero finiuntur. Verū vt saluberrimæ  
febres, quæ videlicet tantissimis fulciuntur nonis,  
die quarto, vel antea: quietescere solent: ita præsi-  
mæ

Decimus qua-  
tus vt finis  
da, sic octavo  
tertia septima-  
na erit.  
Vigesimū di-  
plures absoluti  
fuisse factis  
morborum iu-  
dicationes.

Decimūseptimi  
ordinem, alio-  
ro quā a dec-  
mo octavo sit,  
longe fortiori  
existere.

Crisim nihil  
aliud esse q̄  
solutio morbi.

Dierum decretoriorum differē-  
ntias dispice.

Indiciū iā factū  
ob faciendo co-  
gnitis, ad quid  
conferat.

Hippocratis de  
diebus decretoriis  
sententia.

Naturam hūc  
inferiorem a  
caelesti magna-  
pore separari,  
ab eaq; quæ-  
dam habet bo-  
na, respice.

Septimanam  
esse perfectam  
periodum.

Septimum diē  
absolvere quod  
quarto non  
potuit.

Intervalles  
dies.  
Vigesimū diem  
esse finem crisiū  
septimanarū.  
Decimū septi-  
mū diem esse  
vigesimū iudicē.

50

50

50

50

50

me quæq; & quibus periculosisima signa ad-  
sunt, die quarto, vel citius interficiunt. Primum  
itaq; eorum insultus sic fitur. Secundus quat-  
tio in septimū diem producit. Tertius in vo-  
decimū. Quartus in decimumquartū. Quintus  
in decimūseptimū. Sextus in vigesimū. In apho-  
risimis etiam sic ait: Septimorū quartus est index.  
Aliterius septimanæ octauus initū. Contempla-  
torius autē rursus vndecimus. Hic enim est quar-  
tus secundæ septimanæ. Cōtemplatorius iterū de-  
cimūseptimus. Hic enim quartus est a decimo-  
quarto, vt septimus ab vndecimo. At in primo  
Epidemiōn, omnīū dierum mentionē fecit, sic di-  
cens: Est autē primus decretorius circuitus, qui  
paribus diebus decernunt, quartus, sextus, deca-  
mus, decimūquartus, decimūoctauus, vigesi-  
mus, vigesimūquartus, vigesimūoctauus, trige-  
simus, trigemūquartus, quadragessimus, sexa-  
gesimus, octogessimus, centesimus, ceterisimū vi-  
gesimus. Eorum qui imparibus circuibus iudi-  
cant, primus est tertius, dein quintus, septimus,  
nonus, vndecimus, decimūseptimus, vigesimus  
primus, vigesimūseptimus, trigemus primus.  
Decretorius itaq; fortissimus omnīū est dies se-  
ptimus: quē dies quartus præueniat, hæc duo  
habens, vt & decretorius sit minor, & index se-  
ptimi. Deinde vndecimus & decimūquartus,  
san dem naturæ & proportionē in vice cōseruan-  
tes, quā tūm septimo quartus. Post hos si euen-  
tū quidē decimūseptimus ad vigesimū, raro ad  
tem decimūoctauus ad vigesimūprimū, eadē  
rationē habet, quā cum septimo quartus, & v-  
ndecimus cum decimoquarto. Hī igitur quater-  
na ratio aucti, ad viginti perueniūt. Coincidūt eis no-  
tus, quintus, & tertius. Ac plurimos quidem no-  
tus iudicat, secundam vñ quintus obtinet, &  
post hunc tertius. Sextus malus est decretorius.  
Decimūquartus omnīū imbecillissimus decretorio-  
rum, ceterum omnīū qui nō decernunt fortissi-  
mus, in medio quodā virtutis vtiorūq; est situs.  
Vehementissimæ itaq; sunt crises, quæ ad decimū  
quartū diē veniūt: minus his, quæ ad vigesimū  
vñq; pertingunt: inde ad quadragessimū produ-  
cē, adhuc imbecilliores evadunt, sed in illo ab-  
soluēte exoluuntur. Proportio autē dierum de-  
cretoriorū ppetuō seruatur. Vt enim decimūquar-  
tus & secundæ septimanæ finis est, & tertie prin-  
cipium, ita trigemūquartus quintæ terminus  
est simul, & sextæ initū. Quare tres septimanæ  
viginti diebus semper deficiunt: ideoq; sexa-  
gesimus, nō sexagesimūtertius, decretorius exi-  
stet. Pari modo octogessimus, & centesimus, &  
centesimus vigesimus. Respondebit ergo trige-  
simūquartus decimoquarto circuitus, cūm ex  
duabus septimanis disiunctus fiat: & quadra-  
gesimus vigesimo, vt qui tertiam hebdomadam cō-  
iunctā expleat. Dicuntur autē minores circuitus  
illī, qui diebus quaternis sunt. Secundas partes  
obtinēt, qui diebus septem cōplentur. Hos acce-  
dunt qui septimanis duabus constant, licet im-  
perfecti quodam modo. Omnium perfectissimī  
sunt, qui ex trīs septimanis constātur. Morbi  
tamen ipsi, partim quidem diebus, partim men-  
sibus, partim annis sortiūtur suas iudicationes.  
Atq; in horū singulis, differētiæ quædam parti-

culares existunt. Proponatur igitur adolefcēs va-  
lido morbo correptus, qui in primo quatermio-  
nēst discutiendus, in eo certē est aphorismus il-  
le imitandus: Vbi morbus est peracutus, statim  
etiā extremi dolores adsunt, tenuissimūq; victū  
est vtendum. Quare ad hūc alimētū exhiberi-  
mus: Imo etiā ab aqua, quantū potest, ipsū abstinere  
iubeto. Si vero septimo die crīsim sit habiturus,  
paululū hūc victū rationē immuta, vel nullūm  
ei exhibere, vel aliū quampiā potionē morbi na-  
turæ familiarē. Quod si eger facile dissoluatur in  
edra, eiusq; offendatur vētriculus, potius cremo-  
re exactē percolatū quondie modicē, ppinas,  
memor alius precepti. Sed aliquid tum cōstitu-  
dinis gratia, tūm ne vasorū magna fiat inanisio,  
ingerere oportet. Et si iam septimus dies insit,  
nequāq; egrū nutrire cōvenis, sed pndie, vel an-  
tea, minus est exhibendum. Rursus, si tertio vel  
quarto die morbū finitū in spes adit, nec malu-  
gnitatē stomachi, nec suspicere inanitionē habi-  
tus, ipsiq; etiā eger validissimis virib. sit faciliq;  
longā inediā toleret, nec morbus aut oxyteli,  
aut nullām requirit, is certē ad septimū vñq; diē  
a cibis poterit abstinere. Quod si ad tertium vel  
quartū quatermiōnē crīsim futura videatur, nō ita  
abstinere potest, nec sola potione seruari. At ve-  
rō peracutus morbus vocatur, qui rārū ad septi-  
mū vñq; diē extenditur. Qui lōgius procedit, sim-  
pliciter acutus. Ceterū exactē peracutus is est, q  
vñq; ad diē quartum progreditur: nō exactē, qui  
ad septimū vñq; producit. Similiter qui vñq; ad  
decimūquartū excedit, exactē acutus vocatur:  
nō exactē verō, q durat vñq; ad vigesimū: quā-  
q; est & ipse etiā acutus. Est & aliud morborū ge-  
nus, ad quadragessimū vñq; diē pvenit, qd ab  
acuto nō integrē iudicatio ducit originē. Nōnul-  
li pereterea statim ab initio tanquā prohibiti, ad  
quadragessimū pducūt: quorū duplex natu-  
ra est. Aut enim remissiones paroxysmorū in ex-  
actā integritatē desinunt, aut semper cōtinua fe-  
bris perdurat. Noui em̄ cōplures ad quadra-  
gesimū vñq; diē cōtinua febre cōstictos esse: lic e-  
nim voco illā, quæ nunq; remittit de quo. sermo-  
nem videntur fecisse Hippocrates in prognostico,  
vbi ait: Existimare autem oportet, q facili spiri-  
tio in omnib. acutis morbis, quibus febris copu-  
larur, quly intra quadraginta dies iudicantur,  
magnum ad salutem habet momentum. Atque  
hoc sanē vñmō prædictum genus, acutum ex  
decidentia vocari debet. Nullus autem morbus  
a primō acutus in vigesimū diem illabitur, qui  
nō prius iudicium expertus sit. Qui verō ab ini-  
tio submersi lentīq; apparent, & inde ad quadra-  
gesimū perferant tales, sed rursus intendi vi-  
dentur, hos iure diuturnos appellamus.

### GALENI PERGAMENI de diebus decretoriis, lib. III.

Igitur non omnes dies de morbis decernere,  
experimento cōstat: sicuti & q septimanis cir-  
cuitus validissima sunt virtute præditi: post  
hos quaternarij, quidam verō extra hos cōci-  
dant. Imo quod nec omnes septimanæ in vicem  
separentur, sed aliquæ ipsarū etiam cōiungan-  
tur: nec omnes quaternarij, sed horum aliqui

Quoniam dolo-  
rentis valde  
morbo corre-  
pti.

Constitutio  
esse aliquid cō-  
stitutum.

Peracutus cum  
morbus dicitur  
morbus qui  
tantum ad se-  
ptimum vñq;  
diem extenditur.  
Prædictum ex-  
actē morbus qui  
acutus exactū  
morbus qui.

Morbus qui  
ad quadra-  
gesimū vñq;  
diem pvenit  
natus de morbo  
duplex.  
Cōtinua febris  
dicitur quæ  
quæ remittit.  
Spiritus facili  
in quibus ac-  
tus morbus ad  
salutē magis  
habere momen-  
tum.  
Anticet deci-  
dentia morbi.

Diuturni mor-  
bi quo.

Septimus est  
omnium de-  
cretorum for-  
tissimus.

Quoniam dicitur  
quod adit.

Quoniam dicitur  
quod adit.

Quoniam dicitur  
quod adit.

Quoniam dicitur  
quod adit.



Acutis morbis  
impari diebus  
numeri, longi  
pari solis  
adveniat.

Inferiora hac  
omnia recipere  
omniumque  
a superioribus,  
Sol autem ipse  
ram animalia  
etiam recipit.

Luna opera So-  
lis officium suum  
firmat.

Luna mensis  
atque dies eius  
disponit.  
Necesse est  
quando fiat,  
Lunam quando  
deficit laetari.  
Lunam a solis  
recessu suum  
et mutationes  
recipere.  
Lunae forma.

Luna opera in  
medietate, quia  
ipsa est plena.

Luna eis qui  
sub lunae in-  
fluens immor-  
tali dicitur fu-  
turi, pallidum,  
et capiti gra-  
vitatem circuli-  
at.

Luna Solis au-  
tem opus.

Sol videtur a-  
stri opem du-  
derat.

Temporibus or-  
tu.

Sol veluti rex  
quasi in ma-  
iestate est.

Luna est veluti  
princeps in-  
ter fideles atque  
non medius.

Mutationes  
quae a facilitate  
lunae profici-  
untur diffi-  
cultate multas-  
plices.

separantur, aliqui coniunguntur. Insuper, quod ac-  
tus morbis impari diebus numero, longis pari, iu-  
dicia omnino accidunt. Porro causas horum ratio-  
ne nobis indagantibus, duo prima omnium quae  
sunt primordia esse statuenda videntur: mordi-  
ciana videlicet, quod ex hac mensura materia pro-  
ficiatur: ordine vero ornandi procedens, quod  
caelestibus originem fert acceptum. Omnia siquidem  
hac inferiora ab illis veniunt, et ornamentum  
suscipiunt. Fruimur namque superiorum omnium,  
astrorum virtute. Verum Sol maxime hunc orbem ex-  
ornat, et cunctis disponit. Quippe veritas, citatitas,  
austinitas, et hyemis autorem nemo abus extrahit: nec  
alium tam manifestum vel ex terrestri specie animalia  
gignere potest, vel maturare fruges, vel ad cultum  
& generis propagationem animantia meritate. Ma-  
gna sane & Lunae opera in hac rerum substantia ap-  
parent, verum Solus effectibus inferiora. Etiam  
mensis hunc perpetuo, atque omnes eius dies dispo-  
nit, idque evidenter adeo in marinis bellis: quanquam  
& hoc ipsum Solis beneficio debet. Non enim  
lumen in fontem, cum Sole primum fruitur: tantum  
semper eius portio illucet, quae tam Sol aspiciat.  
Propterea autem deficit, lucis expertus redditur, ubi  
terra suo intervallu ipsam obtinebrant. Quapropter  
a Solis recessu omnes sustinet mutationes.  
Etiam plena est, cum diametrum apparet. Aequa  
portione dimissa, cum est quadragula. Gubiosa,  
cum trigula. Falcata specie refert, sexangularis.  
Ac tunc primum recens est, cum post Solis congressum  
ostenditur. Obscuratur omnino, cum sub ipso  
Sol coruscatur. Igiter fructus augeat, in crassitie: a-  
nimantia implet, mensuram suam tempus con-  
servat mulieribus: comitialiumque circuitus gignit,  
quatenus Solis plene, vel minus participat. Om-  
nia siquidem quae facere nata est, ubi falsis figuram  
representat, languida sunt: invalescunt, cum plena  
fuerit. Quapropter & fruges interea adauget  
& maturat: celeritatem ferarum occisa corpora in ta-  
bem visu suo resoluit: somnorum sopitus sub eius  
lumine, vel alteri immortali diuinum, pallor, &  
capitis gravitatem cohibet. Ceterum ut Luna Solis  
auxilio in omnibus indiget, ita Sol nihil vel maxi-  
mi alterius cuiusvis astrum, vel ipsius Lunae opem  
desiderat. A nullo enim impeditur, quo minus  
testatur faciat, cum in vertice nostro consistit: aut  
frigus adducat, si humilis eius cursus fuerit: aut  
per quinque vtrunque constituit: cum modice obli-  
quus videtur. Sed ipse veluti rex quispian maxi-  
mus est: Luna vero, ut princeps non mediocriter in-  
ter illum & non mediocriter constitutus, merito terre-  
strem hanc regionem gubernat: non potentia cete-  
ros planetas, sed vicinitate exuperans. Porro ve-  
hementiores mutationes eveniunt, ubi ipsa cum  
Sole coe: deinde autem, in apparitionis plenitu-  
dinem: minores huiusmodi coniungit, dum medio orbe ap-  
paret: obscurae, dum curvat in cornua, & falca-  
ta videtur. Etiam diametrum Lunae statio, seu di-  
stingens dispositionem, maxime contrarias ipsius  
Lunae dispositiones (maxime enim Lunae incre-  
mentum, eiusdem immutationi adversatur) eam  
omni est validissima. Deinde duo dispositio-  
nes dichoroni, in quibus Luna per medium vide-  
tur secta, vtraque ipsius differantiam, dico aug-  
mentum & decrementum, ad aequilibrium secant:

prior quidem augmentum, decrementum secunda.  
At omnium extremis obscuris in quibus astra non  
bientis & mutationes in falcatis, incurvis ap-  
paritionibus sunt: magis autem, in ipsis incurvis.  
Iam vero plentudinis Lunae, ceterarum muta-  
tionum efficiant: novilunium vero, in quales, di-  
urnitas. Nam quid ante Lunam apparentem ma-  
nifeste pronunciet, non est. Longum autem hoc tem-  
pus occultationis est, integrum fere signum cursum  
explens. At mutatione ex incremento ad immu-  
tationem, punctum exacte distinguit: quod punctum  
est Luna quasi momento absoluitur. Quare  
breves plentudinis commutationes existunt, du-  
turnae conditionales. Tura igitur citius eva-  
det, quidam in toto mense stans secundo die fiet,  
quo primo & manifestum Luna, & longo satietate  
pore super terram apparere, & lumen invisibile  
de se nutrit, ad hanc vnam evidentem ostendit.  
Primus autem dies tandem Luna supra terram vagan-  
tem habet, quam diu adhuc Solis est lumen post  
occasum tenet. Quare in hoc Luna simul cum  
Sole occidit: ubi deinde & prior est occidit, &  
secunda die prius elucescit: non minus, nunc  
magis apparet. Atque hoc accedit longitudine a So-  
le recessus. Plerumque autem Luna in medio in cornu  
Solis morata, plane invisibilis est: quo nodum hinc  
terrena immutare potest. Cuius circuitus vice-  
sus diebus septendecim, & tertius fere die parte per-  
agitur. In tanto enim tempore totum signum  
circuli percurrit. At quod in circuitu, quo nobis  
laetetur, eundem quidem numero & ceteris, perspicue  
intelligit, si occultationis tempus ex toto men-  
struo tempore cunctas. Quod autem mensuram re-  
pus non omnino triginta diebus consistit, sed mi-  
nus vtriusque diei dimidiorum quodque mensum  
ulius quasi in velis & imperfectas, dies viginis  
uem fortissimam verum, neque absolutus, trigin-  
ta, siquidem consistit. Quae dimidiorum igitur annu  
integrum Sol absoluit, ita Luna mensum, immuta-  
tione per septimanas ei accidunt. Nam vtriusque  
tempus, & quo post primam apparitionem in medio  
orbem accedit, & quo inde plene efficit, septem  
diebus absolutur, ambo quatuordecim. Simili  
modo, si inde, cum in quali portione est dimissa,  
ad secundam dimensionem eiusmodi ratione sub duxeris,  
& hoc dies, reliquosque, cum plane ab oculis  
Luna declinata est, sepe invenies. Quod autem  
aer nos circumstant, maximas mutationes fortis-  
simae, dum Luna primum occultatur, ac deinde rursus  
se ostendit, nemo mortalium ignorat. Itaque mensum  
a Luna immutat secundum septimanas, ac proinde  
cetera omnia, ad modum est perspicua. Iam ve-  
ro quae omnibus subsistentibus accidunt, horum  
causam Luna habere observata est, maxime in te-  
tragonis & diametris stationibus ea immutat.  
Nam si Luna in tauro existente semen conceptum  
fuerit, vel ena partus cogerit, magnas eius mu-  
tationes inuenias, cum in leone, scorpione, & aqua  
rati signiferi ambis. Verum in leone tetragonis se-  
ptimanam vnius existit in scorpione diametrum duas  
septimanas habet. Ita quoque in aquario, secunda  
quadrangularis statio necessaria in tertiam se-  
ptimanam procedi: quod Luna vicinis diebus,  
septenis, & particula quadam adiecta, maxime  
tertia diei parte, vniuersum signiferi ambitum  
peragat.

Luna muta-  
tione tempus  
quoniam longum  
sit.

Plerumque om-  
nium huius bre-  
vis constituit, di-  
urnitas omnia  
flumina.  
Crisis tunc quod  
de accidet.

Etiam

Luna circuitus  
vtriusque signum  
diebus & ter-  
tia fere die  
parte peragitur.

Septem non em-  
nino vtriusque  
triginta diebus.

Sol autem  
absolutus.

Mensem a luna  
immutat per  
septimanas, et  
alia omnia.

Luna motu effi-  
citur in vtriusque  
permutationem,  
quae in vtriusque  
hinc accidunt.

*Luna indicat  
primum autem  
primum progre-  
sum cuiusq; nō  
modo agri, sed  
sancti etiam pō-  
fō.*

*Circulus dif-  
ferentia.*

*Diuturnitas  
morborum in-  
dicationis tem-  
poris, etiam  
pōfō.*

perat. Nec verò agri tantum luna, sed etiam sa-  
tus, dies quales tandē furui sint, prænūciare po-  
test. Etenim luna, si planetas saluaret ac cōpera-  
tos aspererit, fuisset ac bonos pōderet dies: mo-  
lestos autē, si intemperatos. Ad hac, alterationes  
magnas, quas in tetrāgonis & diametris per se-  
ptimanas fieri diximus, in leralibus quidē mor-  
bis, leralis & ipsa: in salubribus, bonas evenire  
est necesse. Lunæ igitur tetrāgonæ, diametrix  
stationes, in principis bonis, bonas faciunt alte-  
rationes: in malis, malas. Circuitus autē alij nu-  
mero quodā diebus consistit, alij mensibus. Ceterū  
qui diebus cōstant, septimani sunt, & Lunæ  
modo incedūt. Qui mensibus, ad Solē referūtur,  
eodem modo eveniunt. Ac sic illud intelligen-  
dum est, qd ait Hippoc. xstius morbos hyeme,  
hyemales xstare solui. Hoc enim diuturnorū an-  
naliumve morborū iudicationis tempus statum  
est, quē admodū acutorū decimusquartus. Cūm  
enim i mensis principio ad viq; plenilunij tem-  
pus, totius lunaris circuitus dimidiū exstat, ean-  
dem tanonē habet cum intervallo, qd ab hyeme  
ad xstare viq; intercidit. Quinetiā plenilunio  
ad occultationē tempus, spacio qd ab xstare ad  
hyemē viq; porrigitur, pportione respōdet. Sed  
horū utroq; bifariū secto, in acutis morbis est se-  
ptimana: diuturnis, clarissimorū syderum exor-  
tus: quorū ratione ver, xstas, hyems, & autum-  
nus, describūtur. Quemadmodū autē septimana  
acutorū morborū est decretoria, sic temporis an-  
nui mutatio, diuturnos morbos discunt: vt hye-  
me qdem cōstitutum morborū ver dissoluat. In ve-  
re cōstitutum, xstas. Simili ratione per xstarem cō-  
tractum, autūnus: in hoc paratū, hyems. Ceterū  
anni tempora singulis partib. bifariū diuisis, mē-  
sis quaterannii. proportionē respōdent. Et quē  
admodum anni temporis cuiusq; initium et fi-  
nis, syderum manifestorum ortu & occasu descri-  
bitur: ita etiā medicas singulū, alterius rursus syde-  
ris exortu distinguitur. Itaq; vniuersas particu-  
lares morborū mutationes, vel tanq; ad propriū  
ipsonū principit, vel ambigens nōs acriter cōuer-  
sionē, evenire est necesse. Quirigitur ex propriū  
principio mutātur, Luna sequūtur: quorū ceu  
ab aere nobis circūfuso immutātur, in toto qui-  
dem anno, Solem. in singulis mensibus, Lunam.  
Hinc iam accidit, mutationes validissimas esse,  
quē cuiq; per septimas dies propriē cōtingūt:  
q; via ipsi serē cōmiscētur, quas aer excitat. Atq;  
in acutis qdem morbis coincidentes decretoriū  
sunt plures: quoniā & corpus mutationi accō-  
modum, in motu & perturbatione velenētū cō-  
stitutum est: in longioribus, via & ordine magis  
septimanarū circuitus procedit. Principiū igitur  
dierū qui acutē decernunt, & cūm quādā pertur-  
batione morbos immutāt, tertii diē ab ipso prin-  
cipio statuere oportet: quippe qui nullā tā cum  
prima septimana cōmunionē habeat, sed ex co-  
incidenb. sit. Iam verō perturbationis violentia,  
naturā ea quē molestant, etiā ante tempus pro-  
pullare cōpellit: id quod alioqui neunq; factura  
fuisset ante cōditionē perfectā quā interdum iā  
absoluta, sepius tardari solet, propter facultatis  
(quæ aliena ex. erit, & crises in morbis efficit)  
infirmi. Fiant itaq; iudicationes optime, cūm

iā omnia in animantis corpore fuerint accuratē  
cōcocta. Perniciosum autē est, si quando ipsa cri-  
sis præveniat. Nam idonea simul cum iis quæ le-  
dunt, excernūtur: id qd sit natura incitata, vel ab  
exteriore quodam, vel ab iis quæ in ipso corpore  
detinentur. Atq; vnum qdem ex illis quæ naturā  
stimulant, & veluti provocant, accessio est, nullā  
quietem, nec motum cōcedens, verum incitans,  
mouēsq;, & ceu pugna in iudicē. Vide acutorum  
morborum in diebus imparibus iudicium con-  
tingit. In his enim & accessiones fiunt. Nā secun-  
da accessio ab initio ad tertium diem delabatur,  
tertia ad quintum, quarta ad septimum, quinta  
ad nonum, omnes deniq; in imparibus fiunt. At  
dies ipsi primariā decernendi virtutē nō habent,  
sed per accidēs id cōsequuntur: q; videlicet in ac-  
cessionib. iudicentur morbi, illē autē in dies im-  
pares incidant. Negi enim septimi, vel quarti nu-  
merus, crisis est autor: sed quod Luna innouat,  
et terrens immutante, motū quoq; circuitus  
ad hos principes numeros venire contingat, me-  
ritō in ipsi tanq; stata alterationum tempora in-  
veniuntur. Quippe mutationes nō numeros, sed  
Lunæ terrēna debent. At cūm id quod mutari in  
motu cōstitat, tempus mutationib. necessariō cō-  
iunctū est: quare necessariō & numeros. Luna itaq;  
omnia terrena immutat, atq; in septimanis  
præcipuē magnas mutationes inducit: dein autē  
paruas in quaterannionibus. Porro tertius & quin-  
tus dies decernunt, non ex lunari circuitu talem  
facilitatē sortiē, quod tertius violenta accessio-  
ne crism quæ die futuram pperat: natu-  
ra autem quarto die defatigata, minimēq; irrita-  
ta conquiescat, ac postea in quinto ad iudicium  
mouetur. Iam verō & nonus, inter duos decre-  
torios septimum & vndecimū medius, vel nō fa-  
ctum in septimo diē iudicium, vel vndecimo fu-  
turum, ipse sibi vendicatur: rarior quidem septi-  
mi, sepius vndecimi assumit crism. Porro in diu-  
turnis morbis, vt accessionis velenetia, sic nu-  
merus coincidentū diē minuitur. In omnibus  
autem serē dieb. peracutos morbos iudicari con-  
tingit, quoniā vltimus decretorius ipsis mor-  
bis est septimus: & ante hunc nō quartus modō, sed ter-  
tius, quintus & sextus aliquando decernunt. At  
peracuti omnes morbi vel cōtinuam febrem, v-  
niformemq;, ad principū viq; ad crism sibi habēt  
eomitem: vel aliā, quæ etiā manifestas habet de-  
clinationes & accessiones, nō tamen tertio quo-  
que die manifestas tantum habet, verum in ipso  
rum quoq; diērum mediis, quemadmodū & se-  
miterriana. Proinde prima peracutorū differen-  
tia, veluti vna quædā accessio est. Quamobrem  
nihil (quantum ad accessionem pertinet) impo-  
res paribus præstat, cūm febris singulis diebus  
xqualis exstat. At in altera differentia, cūm qui-  
dem veluti ad septimum diem festinat, & secun-  
dū ipsius rationem in eodem finiturus est: me-  
diq; verō accessionis magnitudinē, naturā ante suū  
tempus venire ad crism compellat, vel si extrin-  
secus aliqui eveniens ipsam irriter, crisis haud-  
dubie sexto die prærumpt. Etenim in secun-  
do die natura aliquo modo est valida: item in  
quarto magis quā in sexto: nondum in cer-  
tamen venire audeat: in sexto autem accessio

*Crisis opina  
quidē fuit.*

*Accessio morbi  
naturam com-  
mutat.*

*Acutorum mor-  
borum iudicia  
in diebus impa-  
ribus fieri, quæ  
et accessiones.*

*Dies nō prima-  
rii, sed ex acci-  
dēs decernūt.*

*Dies tertius &  
quintus quæ ra-  
tione decernūt.*

*Noni diē facul-  
tas.*

*Peracutos mor-  
bos (quorū vlti-  
mus decretori-  
us est septimus)  
in omnibus se-  
re diebus iudi-  
cari contingit.*

*Peracutorum  
morborum dis-  
tinctio.*

*Tertio dicitur ef-  
fi principit acutē.*

*Extremis aut  
interdum citius,  
interdum tar-  
dus, quam ex-  
pōrtat a natu-  
ra expellitur.  
Expōrtetur  
crisis in morbo  
facit.*

vehementia frequenter eam ad certam provocare velin eo delictur prius, quæ infestâ excreuerit, exinquitur: vel eorû magnâ partē propulsa: reliquâ verò adhuc nō potest sed imbecilla & defangata prorsus cadit, & victa iacet. Deinde si postero tempore recreari ac refici possit, morbus paulatim concoquit. At si morbi reliquæ robore illius maiores sunt, tandiū æger superviuet, quâdiu natura sufficere poterit: moritur tamen postea. Decernit autem vigesimus, & vigesimus primus, sed multo magis vigesimus: quoniam huiusmodi morbus diurnus iam est, & paribus diebus accessiones sūt: dein, quia septimana nō integris septem diebus constat. Etenim vii annus ad trecentos sexagintaquing. dies particulam diei maiorē quarta adiectâ habet: ac mensis ad triginta dies absolvendos, vnius diemidii desiderat: sic & septimana, sexta maximē diei parte, vt septē integros habeat, indiget. Quâ obrem tres septimane nō vni & viginth dies integros, sed minus ferē vnius tota dimidia parte cōsequuntur. Ob quod etiâ, numerū huiusmodi di nō magis viginth, quā vni & viginth diebus vicinum, vtriusq. parū cōvenire videat. Quoniam igitur vigesimus exactē periodum propinquū sibi vendicat, tales iam morbi in veterascūt, & accessiones paribus diebus accipiūt. Quorū autē accessiones in imparib. accidit, horū & iudicia ad vigesimū primū delabuntur. Non solū autē Lunæ circuitus, sed mensurâ etiam tempus apparitionis, virtutē quandâ in nos possidet. Quod quidem tēpus, septē & viginth dies propemodū necessariō cōtinet: ideoq. septimana eius minor ad huc prius dictâ mentō evadeat. Siue enī ad triginta, tres illos coitionis dies, in quibus nihil de ære decernatur, auferre cogites, siue ad viginth nouē cum dimidio, reliquū tēpus, quo Luna manifestum de se lumen præbet, priore modo septē & viginth dies, altero viginth sex & dimidiū habebit. Cum ergo apparitionis manifestē efficacitē tēpus sit dies vigesimū sextus & dimidiū: significet verò circuitus expleat viginth septē dies cum tertia vnius parte, liquet medium ipsorū fore vigesimū sextū diem, ad hęc dimidiū, & tertā maximē & duodecimā vnius diei partē. Horū itaq. nihil supputari potest per dies integros citra frauduram, nec septimana, nec quateruio, nec mensis, nec annus, nec aliud quicquid omnium. Quoniam verò inter septimanas ipsas duæ solū primæ separantur, tertia copulatur: perspicuū est quæ rationes quoq. nō nullas necessariō cōlūgi, alios separari. Itaq. septimus termino & primus coniunguntur, quod vnius septimana primæ bifariē diuisæ particula vterq. sit. Tertius à secūdo disjungitur, quoniam & septimana secūda à priore distincta est. Tertius autē quarto copulatur, quoniam secūda septimanæ vterq. particula est. Hic itaq. rursum quo artus propter tertiā septimanā à secūda eductâ, quanto copulabitur. Adiungetur etiâ sextus quateruio quoniam in decimo septimo die, tertia tertiæ septimanæ pars vterq. existens. Porro fallunt nōnulli medicū, omnē morbus breuem esse curū existimantes: sicuti & omnē tardū, diuturnū. Siquidē omnis a curus, qui ex moris celeritate hunc in modū vocatur, planē exigi etā re-

poris: & omnis diuturnus, necessariō tardus. Nō tamen si breuis temporis sit, acutus statim fuerit (cum multæ ephemeræ lōge breuissimæ sint, omnium periculo vacet) nec si tardus, longi tēpons.

### GALENI PERGAMENI de crisibz, lib. I.

**T**empora morbi tempora sunt quatuor in vniuersum: principium videlicet, augmentū, status, & declinatio. Quædam verò ægritudines ob earum malignitatem, atq. ægrorantis imbecillitatem, in ipso statim augmenti tempore hominem iugulant: sicuti & quædam aliæ in vigore. Desinunt autē ea tempora minimē diuturno. Porro an ipse morbus augeatur, non ex eo tantum cōiudicari oportet, quod accessiones anticipent (sæpe enim talis anticipatio, morbi proprietatē cōsequitur, potius quā incrementum, cum & quartana, & tertiana, & quonidāz febris quidam circuitus vtriusq. integræ solutionē sit: anticipare sint vtriusq. sed quod etiâ longiores & maligniores existat: id quod similiter est ut intermissione & declinatione considerandū. Voco enim intermissione, quidō febris in quietem desierit: declinationē, omnē eius partem, quæ vigorem ipsū subsequitur, vtriusq. ad secūda accessiois principii. Etenim si accessio (exempli gratia) consue tam anticipet horam, longior etiam fiat, & vellemenor, maligniorq., & cū multis prauis symptomatis accidat: ad hęc, ipsū declinationis tēpus fiat breue, nec omnino facile, nec symptomaticum accessiois omnino experte, is certe morbus ad magnitudinem crescit. Si verò accessiois initium tardet, longitudo autem eius ac magnitudo minor existat, cessat etiâ malignitas, necnon intermissio vel declinatio sit facilius tolerata, longiuscula, omnique accessiois delens symptomata, haud dubie declinationis morbi hæc fuerint aperta indicia. Vbi verò quæ ad accessiones duæ pertinent, ætalia fuerint, morbum demonstrant consistere. Quare Hippocrates ait, ad morbi incrementum noscendum, esse accessiones inuicē conferendas. Iam verò sæpe quidē in morbis nullum reperitur sensibile ipsius vigoris tēpus: sed habente a diu: quærat si ira cōtingit accessiois indicia augmenti, quinta superuenit accessio, declinationis habens principii. Simile quiddam accidit in morborū augmentis. Nam quæ prior accessio principii simul habuit, ascensumq. & vigorem: dein secūda videtur manifestē inclinare. Generosū autē medicū est munus, futurum statim præcognoscere, cū omne victus rationē ad ipsū inspicies insitruat. Eadē ratione principii atq. augmenti morbi, nō vbiā perfecta sunt, sed multo antea præstat cognoscere. At accessiones & constitutiones (quemadmodū inquit Hippoc.) morbi indicant & anni tempora, & circuitus successus incrementa, siue quoti die, siue alternis diebus, siue in longiori tempore fiant. Præterea si in laterali morbo spūmum statim appareat, incipit morbi facit breuiore: si verò posterius, longiorem. Porro quæ propria sunt morbi accidentia, simul cum morbo iungunt, incipiunt: reliqua vero omnia mox appa-

Tempora morbi sunt quatuor.

Tempora morbi non desinunt diuturno. Anticipatio accessiois non semper morbi incrementum arguit. Incrementum morbi vnde est intermissio.

Intermissio. Declinatio.

Morbi incrementum ad magnitudinem ducit.

Declinationis morbi argumenta.

Morbi incrementum indicia.

Status morbi dicitur quādiu et quādiu vultu ratio esse debet.

Vigesimus cur decernat magis quam vigesimus primus.

Annot.

Mensis. Septimana.

Vigesimus dicit quoniam morbus dicit.

Apparitionis luna tempus quantitas.

Quateruio qui separatur, et qui rursus coniunguntur.

Acutus morbi temporis sunt tempora breuia, non tamē omnes breues morbi cōtinuati existunt acuti.

*Plurimide pro  
prie symptomat.  
ta.*

*Spurum ubi  
quum esse cru-  
de pleuritidis  
Spurum nō bo-  
num duplex.*

*Spurum conu-  
lsum, morbum  
sunt breuius,  
Spurum prauū  
maligntius,  
periculosū ac  
periculosū indi-  
cat.*

*Expulsiōnes  
que periculosas  
erubant,  
Spurum facile  
bonum.*

*Vrina nigra,  
perinde ut spu-  
rum nigrum,  
periculosū pra-  
monet.*

*Principium se-  
cundum lati-  
tudinem conti-  
net in prima  
accesione.*

*Suprafluitas  
partis cuiusq;  
stomachum pro-  
prium diffinitionem  
inducit.  
Excrementa al-  
ia quibus esse  
debet.*

**¶** Invadunt igitur vna cū laterali morbo febris acuta, lateris dolor pugentis simul, tussis, & difficilis respiratio. Mox autē apparēt quēdā, vti ipsi morbo, propria nonnulla, vt cōmuni omnib; de-  
briorib; nō. Propria sanē ipsius morbi, primum q-  
dem, si nihil cum spūto educatur qd sufficiens cru-  
di morbi est indicium. Secundo autē, si educatur  
qdem, sed nō bonum. Est autē & hoc duplex: vnu  
qdem, qd solum caret coctione: alterū verō, qd  
etiā prauum existit. Ab his omnibus, id quod co-  
ctum est, separatur: quod etiā propriū spūtum ap-  
pellat. Si igitur hoc statim appareat, morbum faci-  
lit breuiorē: cū verō nullo modo educitur, aut  
crudum, lōgiora diū morbi ostendit. Si qd autem  
prauum expulitur, periculi imminere significat:  
mortē verō, si prorsus malignum fuerit. At que  
proprie expulsiōnes vocantur, ex his, que cum q-  
substauz, & subruis, & suballidiz, & sub spūmo  
fuz, & tenues existunt, solā cruditate significat:  
nullū verō insignē malū prænunciāt. Quē verō  
sine alia cōmissione sunt flauz, rufiz, crassz, spu-  
mosz, viridiz, viscosz, rotundz, atq; his etiā ma-  
gis nigraz, sunt perniciosz. Præterea facilitas ex-  
pulsiois, bona est: vt difficultas, malū id qd pul-  
dit in prognosticis docuit Hippocrates, dicens:  
Spurum oportet in omnibus doloribus, qui pul-  
monē & latera infestant, celenter expulsi ac facile,  
cōmittimq; vehementer videri flauum spūto. Eadē  
autē & in vniis, & in aliis excrementis facili-  
da distinctio est, quā in ipsius spūto fecimus. **¶** Si-  
dem nōnulla eorū coctionis sunt signa, nonnulla  
vero cruditate: quz dā morbi indicia existūt.  
Etiam vt nigrum spūtum, præter id qd crudum  
est, etiā mortē portendat: sic & vrina nigra, nōn  
cruda solius, sed etiā lateralis existit. Est autē  
plurimum crudum, quod album est ac tenue: quod  
aquosum vocamus. Porro quoties de principio  
morbi fecit sermone Hippocrates, nō de indi-  
uisibili illo primæ accessiōis insulso, in quo ni-  
hil possumus obseruare, sed de alio quodā prin-  
cipio, qd sensibile habet latitudinē, nobis suam  
mentē exposuit. At verō principium secundū la-  
titudinē, cōmuni quodā imaginatione, absq; v-  
lo artificio, continetur in prima accessiōe. Atq;  
idcirco quz dā statim cū incipiunt, statim acce-  
pisse dicuntur, quemadmodum in primo Epide-  
miarum, vbi ait dicens Hippoc. Statim enim con-  
tinua est, quz incipiens florescit ac viget. Nā ver-  
bum illud, incipiens, non dicitur hoc loco de vero  
morbi tempore, sed de eo qd subsequitur exal-  
situm principium, quod vt plurimum ad tertium  
di extenditur. Cuiusq; itaq; partis supersuilitas,  
cam que illi inest dispositione ostendit: si cocta  
qdem fuerit, salubre: cruda autē, ægram. Aliis ex-  
crementis (Hippocratis auctore) optima sunt que  
molitia & coherencia existunt: & que eandē ex-  
tus horā ferat, quā in sanitate habuerunt. Quā-  
titas verō esse debet pro ratione cibi, qui assumi-  
tur. Nā si excrementa talia fuerint, ventrē inferiōrē  
sanescere indicant. Et spūtum quoq; cū fuerit  
exquisitē simile illi quod sanie advenit, integrā  
sanitatem in instrumentorum respiratiōis signifi-  
cat. Si quo modo autem al naturalis modo neces-  
serit, tantum ea læta esse demonstrat, quantum  
ipsam formā naturalem amiserit. Quod verō illi

qd secundum naturā est, maximē cōterarium vide-  
tur, existit erulum, magnāq; patigntum mem-  
brorum imbecillitate indicat. Quod vti ofe cau-  
se aliquod signum habuerit, quē ad modū iugrū,  
est perniciosius, ita etiā in vniis res habet. Nam  
& hæ, que sanis similes sunt, venosum iugrū iugrū  
torū genus læta robustū ē indicat. Quē verō  
crudiores sunt, quāde imbecillitatem, quā significat.  
Rufusque que maxime iugrū sanis cōtrahit, hæ quē-  
dem omniū sunt crudz, & maxime in iugrū, ve-  
nōsi generis imbecillitate declarāt. Quz iugrū ve-  
rō & superacris causz præuatē ostendunt, vel  
vri nigra, hæ vtri penitus exinates. Hæ itaq; ma-  
signorum genera, singula quz coctionis præ-  
bent indicium: vti qdem, eius que fit in vniis  
desectiōnes autē, eius que in venter: spūta verō,  
eius que in respiratiōe mittuntur, sanguinis præ-  
prolium ē nātibus, iudicis & tumoris quia  
zta aures sunt, reliquisq; deflexis, si in tempore  
qdem sit oportuno, prodire possunt: nisi peni-  
ua autē, nihil iuuat. Nō sunt autē eadē decreto-  
ria, & que coctionis indicia dicuntur. Sequidem  
fieri nō potest, quin ista omniū vbi bene, vel malē  
se habet. At cōcoctionis signa, saltem qdem  
hominū: nō tamē per cūm omnino, futurā pra-  
cipue ostendunt. Porro in febrib; vniuersis, quoniam  
venosi generis sunt passionēs (nā & arterias in  
hoc genere cōprehendimus) ad vniū præcipue  
attendere oportet. In his autem qui laterali mor-  
bo afficiuntur, primum qdem spūta, secundo lo-  
co, vniū: quoniam is morbus dāmorū febrib;  
iungitur, vt in passionib; ventris, si sine febre fue-  
rit, nōa excrementa inspicere oportet: si autē cum  
febre, etiā vniū. Proprium igitur vniū cuiusq;  
morbi principium, coctionis signis determina-  
tur: potēq; vti ad multos quæstiones exten-  
di. Ceterum tunc finitur, cū primum cōcoctio-  
nis signa apparuerint. Reliquum verō deinceps  
tempus vti ad statum, ita alterum tempus est, qd  
augmentum & ascensum vocatur. Dein post hæc,  
status: qui est vehemensissima totius morbi pars.  
Vltima verō omnium est declaratio. Coctionis  
igitur signa (sæpius enim que vniū sunt, repe-  
tere cōcui) nunq; malē apparent: decretoria au-  
tē, vbi malē: sicq; enim in augmentis, neq; in  
principiis, sed in statibus ista q; parere conuenit.  
Quippe nec iudicia nec vniū nec aliter  
meta, nec tumores post aures, nec prolium san-  
guinis, autē cōcoctionis morbi veniū, vniū  
crullis hincunt morbos. Hæc igitur si vlti cau-  
te, morbos excrementa solvere: quz verō vlti  
horum indicatū sunt signa, deliria existunt, vi-  
gilie, graues opores, dolores, iachymz, respul-  
si di difficultates, oculis tenebre obortē, & que-  
cunq; similia: que omnia si absq; coctionis signis  
in morbi principio apparent, pessimam iugrū  
dispositiōis indicia. At reliqua tria que coctiō-  
nē ostendunt signa, etiāq; in prima protinus ac-  
cessiōis hora apparuerint, ad bonum apparēt.  
Sic vt igitur non habetur exquisitū principii  
cognitio, anteq; incipiat ascensus: ita neq; ascensus,  
anteq; statum invadat. Exercitandum itaq; hoc in  
loco est, vt ingruentē cognoscamus statum: de-  
inde, vt præcognoscamus. Quod verō principii  
morbi intellexit Hippocrates esse, totum illud

*Vniū indicit  
imbecillitatem  
quē sit in  
venis.*

*Quæstio ad  
vniū  
Hippoc. 1.*

*Vniū causa in  
vniū  
Hippoc. 1.*

*Decretoria si  
gna a signis  
coctionis quā-  
dam differat.*

*Decretoria si  
gna a signis  
coctionis quā-  
dam differat.*

*Vniū esse  
signum  
coctionis  
quādam  
differat.*

*Vniū esse  
signum  
coctionis  
quādam  
differat.*

*Vniū esse  
signum  
coctionis  
quādam  
differat.*

*Vniū esse  
signum  
coctionis  
quādam  
differat.*

*Vniū esse  
signum  
coctionis  
quādam  
differat.*

*Vniū esse  
signum  
coctionis  
quādam  
differat.*

*Vniū esse  
signum  
coctionis  
quādam  
differat.*

*Vniū esse  
signum  
coctionis  
quādam  
differat.*

tempus quo ipse morbus est crudus, colligere ex hac eius dictione licet: Cōcocta medicari & mouere, nec in principio, modo non gliscant. Eodē illa pertinet. Quicquid inflammationis

*Inflammationis non est, statim in principio solvenda...*

*Incrementum ter minus vnde pusile dicitur.*

statim in principio morborum solvere tentant, ex eo quidem qd differunt est atq. inflammatum, nisi admittat neq. enim credit crude adhuc passio: quæ vero morbo resistunt, & sana sunt, colligere faciūt. Præfines autē manifestū aliq. terminū vltimæ paræ ascensus, quemadmodū sibi, si sta-

10

ras indicia inspexeris, meministi Hippocratis carū admonitionū, quibus ait: In principis quidem omnia sunt imbecilliora, in statu vero, fortiora. Ad hæc: Vbi morbus peracutus est, statim extremos habet labores. Cōpugit autē nonnūq. duas accessiones, vbi maxime aliquid factū fuerit, in vicem vtriusque, circumferebere ipsius

10

vigoris tempus: nonnūq. verū vni omnī aliquid præcedenti reliquarūq. sequenti, esse maximam. Ad tres autē extendi accessiones vigoris tempus, in morbis acutis nō admodum accidit in diuturnis verō, nō modo ad rotidē, sed ad longē plurimū. Alii igitur extremū optimū (ait Hippocrates) est molle atq. coniunctū, quod ea hora exierit, qua tempore sanitatis consueuerat. Quantitas verō eius, si pro ratione cibi assumpti. Tale enim vim cōcoquendi in inferiori ventre validū liquidd ostendit, ac digestionē optimē fieri, nullamq. vntis partibus inflammationem

10

inest. Nō meminit autē coloris ipsius excrementi, quoniam nō magnē vim habet ad inferiora vētris indicandam dispositionē. Jam verō tale excrementū cōiunctum cum sit, nō cessauit, etia erit & leue. Quod si præter dictū, est subrufum fuerit, nō admodū fortidum, exquisitū secundum naturā se habebit: ac neq. in vētre, neq. in circumstantibus organis, aliq. quid erratū esse significabit. At si vel rufum purū, vel nullo modo subrufum exierit, sed erit secundum ciborum colorem, alterū duorū significat, scilicet plus rufæ bilis in ventrem defluere, aut nihil omnino. Horū verō primū quidem si circa iniuria fiat, biliosiorē morbum ostendit: si vero de declinationis tempore, corpus expurgari integrē. Incoctum autē ali-

40

ui excrementū est album, tenue, alperū, humidū expers, ac ciborū rennens qualitatē. Secundum præter hæc est excrementorū genus, quod nō ex ciborū sed passio. ne, sed ex cōsuetudine atq. a toto corpore ad ventrem superfluitatibus qd aliq. erit indicare potest. Ergum si sit vinde, indicium bilis aruginose existit: si autē nigra, vel atra bilis, vel sanguinis eo in loco peritū. Si autē veluti humidū quoddā in excremento apparuerit, vbi non fuerit tale aliq. intra corpus assumptū (id quod semper subintelligere oportet) partū internarū validū frigus, ac veluti mortificationem ostendit. Si vero pingue, pinguis colligationis est signum: quemadmodū etiam si glutinosum, colligationē solidariū partium portendit, quæ longē periculosa existit. Præterea qd vehementer fæcet, vehementem putrefactionem indicat. Excrementū stridēs, statū quidem sibi cum renui humiditate permittū esse declarat: organa autem in vni coacta, atq. in angustā restricta. Spumofum verō sit, velut aliqua feruente, vel cū aliq. in

60

statulentus spiritus colluctatur cum humiditate. Ac primū sanē inmoderate caliditatis corpus colligantis: secundū verō, est inæqualis perturbationis effectus. Variū autē, varius corpus affectibus esse obnoxii ostendit: ob hoc ipsum, & diuturnū & malignū existit. Etenim simplex affectus facilius cōcoquitur, & minus est, q. multiformis, periculosa. Vntari autem illa optima est, quæ vnti sanorū simillima. Quæcūq. verō nō est talis, simpliciter est incocta, vel præter hoc, est perniciofa. Vnti igitur optimē coctam, in illi qui supremū sanitatis obtinent gradum explorare oportet. Talis enim est subrufa, vel subrufam magis subrufa q. subrufa: statim enim & hæc medio cret crassitudinem possidet. Nam quæ hæc ipsa crasior est, aut tenuior, cōfectionem imperfectam significat. Siquidem altera nondum in huiusmodi cōfecta est, altera verō adhuc cōtributa existit. Cæteri cūm triplex sit vntariū turbidū differentia: quæ vnti cum tales mixtæ fuerint, paulo post residerit, vel semper similes permanet, vel puræ quidem minguntur, postea vero conturbantur: prout quidem ex dictis tertia, bona autē prima, media verō inter vtrāq. est secunda: Siquidem quæ statim residerit, parū aliq. inæqualis turbulentiæ superesse demonstrat: quæ verō semper manet similis, vigere adhuc quæ est in sanguine agitationē ostendit. At quæ extra cōtribuitur, debet incipere cōcoqui: quare a merito deterrima est: nam longiori tēpore, & virtute forti, indiget ad cōfectionē. Porro quæ ad summū incocta est, hæc nunq. malignitate superat: est enim aqua

si exquisita: ac, punde veluti desperare cōfectionē accidit, nec quicq. venosæ naturæ existit: quæ admodū ventrem, crudatū. Vbi verō vnta ipsa celeriter inligitur (hæc enim passio latet & dia bete vocatur: estq. talis, qualis circa alnum intestinorū leuitat: nempe extinctio vntisq. virtutis, retentio vntis & alteratice) tunc sanē vntiter omnes vntas crudas præsumat existit. Sed post ipsam est aquosa, quæ quidē solius facultatis alteratice imbecillitate demonstrat. Huic proxima est altera vnta, quæ in multis apparet morbis, vt videatur mistā habere formā vni tenuis & albi. Cingitur autem ex ipsa alba & aquosa, vt quæ paucum liquorē ex bilis rufa susceperit. Atq. hæc sanē vnta proximē accedit ad crudam. Post hanc est suppalida. Pallida verō iam & subrufa est. Optima autem omnī vnta, subrufa & subrufam existit. Etenim cū adhuc cogitur sanguis, vnta quæ mingitur, leuem, æquale, albi ac multam facit hypostasim. Perfecta cōctione, color quidem vntæ intenditur, minus autē subsidet. Quod si diutius homo a cibo abstineat, vnta magis rufa reddetur: si quidem q. quid alimenti supra modum calsit, præsertim si dulce fuerit & pingue, in amarā bilem conuertitur. Porro cōdior rufus ad statū proximē accedit: in hoc autem dissolvit, quod rufus quidem magis ad albi, flavus autem ad splendidum vergit. Quantū verō flavo rufum est album, tantū illi pallidū. Quatē rufus minus album est flavum q. rufum, tantō flavo rubicundū. Jam verō in puris ferē omnibus, & perfectam atq. habentibus, quæ octiduum vitam degunt, aut quovis alio modo sunt pleni,

*Excrementum vntis corpus affectibus esse obnoxii ostendit. Vntariū quæ sit optima.*

*Vntariū turbidum differentia exploranda.*

*Vnta cruda.*

*Diabete.*

*Vntariū cruda rufa quæ exstat passio. Vnta aquosa.*

*Vnta suppalida.*

*Vnta pallida. Vnta febrilis & subrufa, cū multum oporuit exstare.*

*Coloris rufi statū diffinitionem.*

*Color flavus. Color rubescens dicitur.*

*Excrementum coloris, quo indicat vim habet ad inferiorem vntem indicandam dispositionem.*

*Excrementum album, quod vntis, quæle non est, solus.*

*Excrementum album, quod vntis, quæle non est, solus.*

*Excrementum rubescens, quod vntis, quæle non est, solus.*

*Vrina in quibus habent subsidentiam plurimam.*

*Subsidentia vrinae hordeacea crassioris similis quod fraxinea.*

*Vrina lenuis representans furfuraceam, quod andromeda.*

*Vrina nigra cum minima parte.*

*Vrina color quando fiat.*

*Vrina limida, vrina fusa, vrina oleaginosa, vrina opacata.*

*Colicosis frigida.*

*Subrufa vrina, subsana vrina.*

*Subrufa vrina.*

*Vrina quae in vasis multo rarior, quod cum parva aut nulla coacta.*

*Vrina inflata ut patet, nisi praesentia sit in morbo.*

pleni, satis multum habent vrinae subsidentia. quia in his omnibus planum crudi humoris colligitur. Quare is qui ex ocio & repletione febricitat, si famurati restitit debeat, in vrina plurimum necessarium subsidet. Contra is, qui ex inedia & labore rubida simul & biliosa vrinae excernuntur. Soluitur appere morbus plerumque priusquam subsidet aliquid: sufficitque in his & nebula, & suspensio optima, quales est alba, laevis, equalis. Nec vero vrina rufam, simpliciter vituperant Hippocrates, sed quamdiu rufa simul atque subtilis esset: quod tunc cruditatem significaret. Caterum quae hordeacea crassiori in vrina sunt subsidentiae similes, grandis colligationis & ardentissimi incendii sunt signa. At quae folia representant, sunt vasorum partes superficiales, quae scilicet contabuerunt. Ita & furfuraceae: nisi quod illis crassiores atque minores sunt. Nigrae vero subsidentiae, vel excedent caliditatem, atque igneam ostendunt: vel ex frigida re vehementem, exinctionem. Pesissima igitur est omnis denigrata vrina: ad vrinae minorem vtiquam leuissimam videtur, ex ea qui replem minuerunt. Minus vero perniciosa est, si sola sit hypostasus nigra: atque adhuc minus: si solum id quod in medio pendet, ac multo minus etiam si nebula. Color vero viridis si in transitu ad nigram, & estque vel viri quoddam in initio nigri. Nam hic morbus malignus fuerit, & vomitibus, & alui excrimentis, & vrinis viridibus, postmodum nigram supervenit. Color autem liquidus, est tamen frigiditatis effectus: odor grauis, putrefactionis. Quod si vel viri oleum emungitur, colligationis est signum: tales quidem vrinae praevalent. Quae autem bono colore sunt praeditae, & subsidentias habent albas, & laeves, & aequales, aut nebulas quiddam, aut suspensa similia, omnes vrinae bonitate praecellunt: & praesertim in quibus subsidentia laevis fuerit. Secundum bonitatis obrintem locum, in quibus suspensa sunt ita. Tertium, in quibus nebulae. Haec igitur coctionis sunt signa. Reliquae vero omnes partem cruditatem, partem perniciem portendunt. Nam quae alba, & quae tenuis, & quae subulenta, cruditatem. At quae farinosa hordei crassiori, aut solus, aut furfuribus similia habet: quaeque nigra, aut viridis, aut limida, aut oleaginosa, aut formida est, perniciem significat. Subrufa & subflava, si tenuis sit, media est inter exacte coctam & crudam: si crassa, etiam in qua alba quiddam & laevis supra effertur, aut subsidentia divisa, vero, minimam sibi continet, si quidem morbum leuissimum ostendunt. At subrufa, & viridis, habentem statim subrubeam atque laevem, postquam sunt quidem salutariae, sanae, sed temere estis in diuturniores. Iam vero in vitiis quid est atque mulieribus, vrinae nigrae sunt pessimae: in pueris autem quae similes. Quoniam igitur ita est signum vitiis ut fidele est, vt ex aquilae ostendat singula ex futuris temporibus: nec quae secundum concursus signa sunt complicata, sola possunt ludacriter expectari. Idcirco necessarium est signi cuiusque naturam accurate considerare, si quis vult recte praecognoscere, vrinae vi vniuersam quae praecognitione faciat. Et enim saepe vnum signum forte, multis debilibus idellus exiit. Omnino autem male quis vitiis insisteret, nisi per fida signa,

statu futurum praecognoscit. Triplex in vniuersum signorum omnium est diuersitas. Nonnulla liquidum cruditatis & coctionis sunt signa: nonnulla salubris & mortis: tertium autem signorum genus est, quod crassibus adiacet. Coctionis igitur cruditas non signa, alui excrimenta, & vrinae, & spura, statueret oportet. Mortem autem atque salutem nuntiata sunt, quae vna cum his excernuntur, & quae per totum apparent corpus. Quamvis autem crues attinet, aliquid quidem valent nonnulla ex his: est tamen proprium atque precipuum eorum signorum genus. At cruditatis atque coctionis signa, propria vim habent semper stabili, siue statim in primo die, siue in sequentibus appaeruerint. Quiddam itaque horum signorum in vrina, & alui excrimentis, & spuris apparent: quiddam in dispositione totius corporis inveniuntur: quiddam in naturalibus, & animalibus, coctionis operationibus. Haec tamen non omnia fidelia sunt, in omnibus morbi tempore. Et enim criticorum symptomatum duplex natura est. Siquidem eorum aliqua sunt tangi causa, & signa: aliqua tangi signa duntaxat. In his vero est vniuersa eorum natura, & constantia significans in diuersis morbi temporibus. In his autem totum est praecognitionis studium. Nam in alio quidem tempore secundum aliam dispositionem critica sunt: secundum vero aliam dispositionem, symptomata, vel signa praevalent: critica autem non item omnino. Coctio igitur celeritate crasis, & salubrem securitatem significat: cruda autem & incocta, & in malos coevertit abcessus, cuius defectum, aut vellementes labores, aut mortes, aut eorumdem malorum reversiones. Porro si quis primo statim die, nullum habens signum periculosum, sed potius salutaria omnia, acutem quidem febricitare: vti non autem mingat bene colorem, ac medio citre crassam: si certe in primis quatuor diebus crisim est habiturus, & eo magis, si nebula aliqua vel si spura optima in vrina videatur: magis adhuc, si hypostasis bona se ostendat. Cuius rei non igitur Hippocrates, aut Aristoteles febre, quae tam signis securissimis iuxta, quero soluitur die, vel prima. At quae malignitate excellit, & cum signis gravissimis accedunt, quarto die vel citius occidunt. Si vti igitur quae omnia habet signa tumida febris acuta, in primo periodo decretoniorum dierum solutionem habet: sic quae isti proximae adiacet, die septima non transcedet. Similiter etiam in signa, & cum grauis facta signis, quatuor absterge a malignissima, & cum grauisima accedente signis, tamen tardior est moris inducet. Si itaque primo die vrinae quid ex aquilae aquae, febris vero debilis, hoc tamen longum praerogatur tempus, sed quantum hoc erit, in primis diebus cognoscere non potest, nec cognitum est vtile. At praesens principii tepus non solum innotescere datur, sed etiam saepe praecognoscere quo finietur. Atque in his quidem adeo diuturnis iustitiae est temporis principii longum periculis et tunc angustia. Nam si statim in prima die, in vrina apparent aliquid signum coctionis, iam hic principii transitum est. Similiter etiam cum principii, nec praecognitione quidem tunc inquirere oportet: led satis putare, si dum adeo, cognosci possit: & cum tempus ad afolem coevertitur, manifeste deprehendatur. Si itaque aliquid manifestum apparcat coctionis signum,

*Signorum diuersa triplex.*

*Coctiois signa.*

*Signa mortis & salutis.*

*Decretionum signa.*

*Criticorum symptomatum duplex natura.*

*Criticorum symptomatum duplex natura.*

*Criticorum symptomatum duplex natura.*

*Criticorum symptomatum duplex natura.*

*Criticorum symptomatum duplex natura.*

*Criticorum symptomatum duplex natura.*

*Criticorum symptomatum duplex natura.*

*Criticorum symptomatum duplex natura.*

*Criticorum symptomatum duplex natura.*

*Criticorum symptomatum duplex natura.*

*Criticorum symptomatum duplex natura.*

*Criticorum symptomatum duplex natura.*

*Criticorum symptomatum duplex natura.*

*Criticorum symptomatum duplex natura.*

*Criticorum symptomatum duplex natura.*

*Criticorum symptomatum duplex natura.*

*Criticorum symptomatum duplex natura.*

*Criticorum symptomatum duplex natura.*

*Criticorum symptomatum duplex natura.*



quicqd interiacet temporis, erit principium morbi. Quamquam autem desit ad perspicuum illud cōcoctionis indicium, & à morbi motu, & natura, & anni tempore, & regione, & ætate, & tempera-  
tura ipsius laborantis, inuenies. Nam si morbus natura longus extiterit, quemadmodum febris amphimerina, & videatur tarde in hoc ægrotante  
moueri: tempusq; anni sit hyems, & regio frigida, & aëris & natura laborantis ad frigidū declinat, multū interim temporis ad manifestū signū  
generationis desiderabitur: quod totū tēpus principio erit contribuendū. At verō perfecta cōcoctio  
est, quādo in vrinis subsident aliquid album, leue, & quale, & continuū: debilis autē est, quando ex aquosa mediocriter fuppallida facta fuerit:  
aur etiā turbulenta existētia, talis permaneat. Rursum etiam & tenuia ad idem genus spectat. Sed nihil horum iam principium esse finitum ostendit.  
Hoc enim manifestū iudicium semper expetit, vel solam nebulam albā, vel suspensioem æqualē,  
continū atq; albā. Præterea rubens nubecula, & subdientia talis, & ebsq; subdientia probe colorata vrina, & crassitudine mediocri, principii suum declarat. Sic & in lacerum & pulmonū  
passionibus ea que proprie signa vocantur, videntur subdientia assimilari. Nihil verō omnino  
expuere, sed rursim tantummodo siccat habere, tale quiddam est, quale in vrinis extremē crudū,  
qd nominamus squofum. Quod si ab eo quod est nihil expuere, & ad expuendū quidem  
verū liquida, & omnino cruda, fiat transmutatio, debilis & occulta ea permuto erit: nec absolutum  
erit tunc ipsam principii tēpus. At vbi æger cæperit expuere pauca cōcocta, & reliquo omni  
tempore hinc vsq; ad statū, plura & meliora, & facilius excreuerit, tūc finē exprimit principii, aug-  
mentūq; morbi inualefcit. Cū verō exquilit cōcocta fuerint & multa, eductaq; sine difficultate,  
tunc statū est tempus. Quādo vero hinc  
liter exquilit cōcta, & sine molestia educta, sed eorū copia imminuta fuerit, dolorq; nō amplius  
adst, tunc cessare statū oportet, subsequi autē de-  
clinationem. Sciendum autē est, secundum ipsas præcognitiones temporum, vnde cū die est  
esse indicem decimi quarti: si vni & viginti decimo septimi. Cōtingit autem laborem plenitudo,  
die quidem decimo septimo pauca quædam  
concocta expuere: sequi autem crisim, sed imperfectam vigesimo: ac postea tandem iudicari absolute  
morbi trigesimo quarto: quemadmodū  
contigit in Anaxione, cuius Hippocrates meminit tertio Epidemicorum libro. Porro primi dies  
rum indices, tum decretorii, valentiores quidem  
sunt vltimis, vbi morbus est breuior: eo tūc productū,  
lōge imbecilliores redduntur. Igitur perfecti  
ac iam finiti principii manifestum & firmū,  
est signum manifesta cōcoctio: tunc autem,  
& morbi natura, & tempus anni, & ætas laborantis  
ex abundantiā verō, & regio in qua ægrotat,  
& modus eius qui necessent victus, cōm oñdum  
morbo correptus esset. Specialiora verō in  
dicia futuri finis primo ægritudinis tempore, cō-  
coctionis indicia sunt. Cæterum si integrē cruditas  
in indicia in primis quatuor diebus morbi per-  
maneant, longū erit huic morbo principii tem-

pus: si verō debilis mediocriter in ipso apparuerit,  
lōgum quidē & hoc erit, sed nō prius similiter.  
Si aut parua fuerint cruditas signa, futurū  
etiā principii tempus erit exiguū. Meminisse autē  
cōvenit illius aphorismi: frigidus sudores cum  
acuta quidem febre, morbi signum sunt: cum mi-  
noris verū morbi proluxant. Que si nē prolux-  
tas vniuersi ipsius morbi temporibus cōmuni-  
cabitur. Iam verō post summū vigorē tempus sepe  
qd nulla sit crisis, sed paulatim soluiatur morbus,  
longo tempore concoctionē recipies: at huiusmodi  
soluonem absolute crisi non nominamus. Si qua  
verō conferim fiat permuto, & molro magis adhuc  
agitationē que illam præcedit, ita appellare conueni.

### GALENI PERGAMENI de crisis, lib. II.

**D**Eincept autē, quo pacto quis primo statim  
die possit morbi naturā cognoscere, est ad-  
iudicandum. Cæterū diem per totum hunc  
sermonē nostrum, in ea significatione accipimus,  
vt nō solum lucem, sed etiā noctem complectatur.  
Sicvñ & mensem est triginta diebus cōstat  
dicimus: nō id tempus tantum, quo Sol supra  
terram fertur appellantes diem, sed noctem etiā  
ei copulantes. Atq; in hunc modum annum  
quodammodo dicimus trecentos & sexaginta  
quing; dies cōtinere. Morbus est dispositio que  
dam functiones lædēt: que quidem duplex læpe  
constitit. Simpliciter tamen dispositionē, nemo  
qui perspicaci sit ingenio, in primo die ignorabit:  
habet enim propria indicia. Eam verō que cōmista  
est, nō omnibus per inia cōtingit agnoscere.  
Oportet autē in omnib; simplicibus dispositionibus  
fieri ea que exerceri, vt earū singulas seorsim,  
& iam perfectas promptē noscamus. Simplicem  
itaq; morborum singulorum dispositionē, ante  
omnia ipsi per se ipsam cognoscere expedit: primum  
quidem ac maxime, ex iis que secundum propriā  
ipsi insunt substantiā: deinde iam ex iis que  
sepius ei accidunt. Velvñ in ea febre que tertiana  
a dicitur, nō hoc tantum aduertat, si tertio  
quoq; die fiant accessiones definientes integrę.  
Nam si due tertianę fierent, aut due quintanę:  
due quidem tertianę quolibet die, per tertium  
vult due quintanę acciderēt. Quare vel duas  
tertianas vnā sic quotidianę putares, vel duas  
quintanas vnā tertianę. Formas itaq; accessio-  
num maxime inspicere debet. Porro ex quibus  
terminis longissimos terminus, septem absoluit  
circūdo. Funt aut tertianę plurimę, vt etiā cō-  
tinuę & ardentes, ætius tempore, vbi secundum  
naturā se habent. Etiam quemadmodum lycim  
præ omnib; anni temporibus humidissima &  
frigidissima existit: sic etas, siccissima simul &  
calidissima, dummodo proprii naturi reuocet.  
Nec enim debet existimare, qd propter anni tem-  
porē appellantes, singulę ægritudines accidere  
tates scilicet vel tales: sed propter ambiētis æris  
temperaturā. Nam qualem luc naturi sortitur,  
ita etiam nos afficit. Similiter etiam regio & tem-  
poris hominis calida & frigida, plurimam febri-  
litate erit, iis que temperantur contrariis pos-  
sident. Quod si etiam victu calidiori & siciori  
vltus

*Amphimerina  
febris dicitur.*

*Concoctio  
absoluta con-  
coctis signa.*

*Principii sunt  
que indicant.*

*Spas in pleu-  
ride, vnde  
subdientia  
signa perfici-  
t.*

*Status tempus  
in pleuride  
quando cō ad-  
effi significat.*

*Declinatio in  
pleuride quā  
de adst.*  
*Vnde cūm of  
se iudicari de-  
cimū quarto,  
viginti est in-  
dez decimo se-  
ptimo.*

*Plenitudinem in  
dicari possit de  
trigesimo qua-  
to.*

*Primi dies in  
morbo breui-  
ori valentio-  
res sunt vlti-  
morum: contrā in  
longis.*

*Sudores frigidi  
quid indicant.*

*Crisis absolutā  
est ægritudo præ  
cedens morbi  
permutationē.*

*Diem.*

*Morbi.*

*Anno amplius  
est vltimus  
quod ægritudo  
dicitur.*  
*Morbus quid.*

*Simplicem despo  
sitionem esse per  
se agnoscendam.*

*Tertianę duas  
copulatas in modū  
duo singula  
dicunt.*  
*Quintanas de  
as copulatas.*  
*Tertio quāq; die  
accessiones fieri  
possunt.*

*Tertianę ex-  
quisita longis-  
simos terminus  
septem absoluit  
circūdo.*  
*Hyemū tempe-  
rat.*  
*Æstatis tempus  
calid.*

visus aliquis fuerit, hoc est, laboribus, vigiliis, curis, & anxietatibus, cibisque paucioribus & bilioforibus, nōne etiam in hoc ipse seipso biliosior reddetur, ac proinde calidior & siccior? Atque hæc sane quæ diximus, cōmunia sunt ardentium febrium & tertianarū generationis. Etenim tertiana accessio ab acutissimis maximèq; aduentibus febribus nullo modo relinquitur: sed hoc discernimen interest, quod in hac, per totum corpus bilis defertur, atque ideo vehemens fit rigor, bilis, quæ supervenit vomitur, atque vring & sudores biliosi adsunt: in aliis vero aduentibus febribus, quæ nullam habent intermissione, flava bilis in valis vna cum sanguine cōtinetur: id quod certe est in causa, ut tertiana febris per sudores vomitusque finiarur: in aduentibus autē, singule accessiones ad infebrecitationē nō perveniant: quoniam qui earum est causa humor, non expurgatur. Sed quādo in his bilis agitur vehementius, ac velut effructur, & naturæque invalescenti impellitur, tunc rigor supervenit, & febris soluitur. Nā ardens febris, si superveniat ei rigor (ut inquit Hippocrates) soluitur. Quod vero non modò causa frigida, sed etiam acris & calida, rigorem faciat, in libro de symptomatum causis ostendimus. Etenim acres & mordaces humores vehementius emont agitant, & per sentientia corpora violenter delant, stimulant, pangunt & ferunt: atque hinc sensum inæqualem, rigorem, cōcussionemq; invehit. Tertiana itaque febris, quæ ex flava bile mora ortū habet, rationabiliter statim ad initio rigore affert nō mediocrē: hoc ipso primū ad quartanæ rigore differret, quoniam in illa quidem pungi videtur ac percussū corpus (talis enim est in tertianis febribus sensus rigoris) in quartana autē frebre similem frigefactionē habet, qualis per gelu, tempore hyverno sentitur. Quippe in quartana febre ara bilis redundat: sicuti in quotidiana, pituita. Tertiana igitur febre, minime quidem licet ab rigore vehemēti, pungeat atque feriat carnem, oriatur. At quartana febris nō primo statim die cum rigore invadit vehemēti, sed progrediente ipsa, atque aucta, vnde etiam rigor quidam gravis, ac velut ossa cōtundens, augetur. Quotidianas autē nō comitantur rigor, nec in initio, nec in progressu, sed frigefactio dūtaxat. Præterea quartanæ febres parvos, debiles, & raras adeo pulsus efficiunt in invasionibus, vnde nulla altera disposicio: tertianis vero parvi quidē ac debiles, tardius aerari, cum invadunt, pulsus necessariō adstant. Verū tarditas adeo parva ab his intervallo relinquitur, quæ in quartana accidit. Nam in quartanarum principio videbitur tibi afferta quodammodo ad interiora retracta, impetūq; in tertiana vero, nec aliq; tale percipiūq; tarditatis prope accedit ad eum qui secundum naturā est motus: ac præterea certus ordo æqualitatis pulsibus inest. Habet etiam tertiana febris per incrementa, qualem liberatimq; celeritate sentimus: tantumque magnitudinē atque vehemētiā excitant, his omnibus frequentius cōrespondentē: neque ipsi viliā adesse infestationis signū. Iam igitur & sitim invenit, & hominē exviri, & paulo post in vigore constitit, calor æqualiter quaque versus extendi-

tur nihilōq; plus thorax extremisq; calet: & si manum ippoſueris, in primo occurrit quidem percipitur calor multus & acris, quæ velut quodam cum vapore effertur: paulo post verū superat à manu: non ut in febribus malis & adventibus accidi. Ac iam tunc bibendi tempus ægrotanti inest. statimq; post posui plurimus vapor calens per lumen exhalat, sudores nunciat, bilisq; supervenit vomitus, ventrisq; solutur, & saniorum munusq;. Incipit itaq; sudor vapidis calidus, velut in balneo: totum verò ipsi corpus æqualiter sudat, talisq; est pulsus, qualis in his quæ recte valentes exercitantur & balneantur: velox scilicet, magnus, vehemens & creber. Sed præter hæc omnia statim ad infebrecitationē desinit, vniuersum febremq; tepus vltra duodecim horas nō protrahit. Serpius autē septē horas accessio cōtinet. Nōnunq; citius aut tardius, sed non multō, finitur. Descripsimus itaq; veram & exquisitā tertianam. Quod si vrina reddatur rufa, aut subflava, appareatque crassitudo mediocriter: ac paulo post, vel albam nebulam, vel suspensionem optimam fecerit, febris ipsa vltra quartū diemcum non progredietur. Rufiore verò vrina existente, neq; suspensione aliqua, nec nebula in primo circuitu apparente, ad septimum extenditur. Quod si præter alia signa, in vrinis appareat subſidentia lævis, æqualisq; circa primū statim diem, vltra tertium circuitum ipsa febris nō divagabitur. Ingruente autem accessione quartana, eximia quædam ad tarditatem ac raritatem sit pulsuum conversio. Solum porro quartana febris maxime oriri in autumno, præcipue si tempus ipsum frigidum & siccum, & inæqualem fortior temperaturam. Quod si etiam regio talis febrium fit generatrix, & ægrotantis natura atque bilis obnoxia, talisq; victus ratio antecesserit, quæ iuviusmodi aggregant humores: & si eo tempore quartanæ febres populariter fiant, hominē siemofus fuerit, vel febres extrinsecas passus: si augmentum & status plurimū contraria fuerint, tuncq; & albe & aquosæ vrinæ reddantur: si inquit hæc omnia inducia in prima accessione adsint, quartanam esse febrem non dubites. Sed quotidianam à tertiana distinguere facilius est. Neq; enim primo statim die cum rigore invadit, sed progressu temporis refrigerationes potius quam rigores ipsi adveniunt: neq; villus ordo aut æqualitas pulsibus adsidet, cum primū accessiones sunt. Sed nec devrūt laborantes, nec denudare corpora, & pallia iactare cogit: nec multum ac frequenter respirare, ac velut flammam ex ore efflare, frigidūq; potum expetere. Verū isti cum febricitant, minime sinitur vrinæ ipsi in primis diebus tales sunt, quales quartanas incipientibus adsint. Atq; in primis diebus minime sudant: sed progrediente tempore hoc etiam illis advenit. Eger autem hæc febribus, natura humidiore, vitioq; oſiosa, & plena erapulis. Quare in pueris assidue fit: ac perrarum est, quin & oris ventriculi, & hepatis in ipsis male afficiatur. Sed et cruditates antecedunt plurimæ, & coquēdi moræ, & acidi reſtus: & cum primū febre incipit, præcordia vltra naturalem habuit intumescunt. Color his cum pallore albus, talisq; morborū

Tertiana terra  
piu quo accessio  
tempore  
est puto dida.

Tertiana accip  
piu vltra duode  
cim non protrahit  
horas.  
Tertiana ex  
quisita descriptio.  
Tertiana bre  
viter finit  
que vrina indicat.

Quartanarum  
febrium signa  
& symptomata  
sunt.

Quotidianæ et  
tertianæ febres  
differunt.

Quotidianarū  
febrium indicia.

Quotidianæ  
et tertianæ  
febres invadunt.

Febres ardentes  
& tertianæ  
que gerantur.

Tertianæ ad  
arcentiumq; feb  
rium dicitur.

Ardens febris si  
superveniat in  
rigore, soluitur.  
Rigor fieri a  
frigida & a ca  
lida causa.

Tertianam fe  
brim oriri a  
flava bile per  
corpus mata.  
Rigor tertianæ  
& quartanæ  
gerantur dif  
ferent.

Quotidianæ  
quæ debiles atq;  
febres quoti  
dianæ sunt a pi  
tuita.

Quotidianæ nō  
cum rigore, sed  
cum refrigeratio  
ne quadam  
invadunt.

Tertianarum  
quartanarūq;  
signa & sym  
ptomata.

hybernium tempus est ferax, & status temporis  
humidus, & eiusdem natura locus: hinc accessio  
humidum prius circa vesperam. Ita quidem quo-  
tidiana, tertiana, & quartana, prima die invicem  
dilecti nuntur. Continuas autem febres, quæ idem  
genus cum iis quas diximus habent, similiter pri-  
mo die vir exercitatus cognoscit. Etenim ex quâ  
illa ardens, cum omnia alia feruâ exquiritur ter-  
tiane iudicia, eo solo differt, quod neq. cum ri-  
gore invadat, neq. ad infirmitatem tendit.

Quæ verò quotidie accessiorem facit, quando  
tempora itantur, & ætatem, & naturam corpo-  
ris, & visus rationem antecedentem, ac præte-  
rea pulsum formâ, coloremq. eandem habue-  
rit cum exquisitis quotidianis, non pervenit  
autem ad infirmitatem, idem genus cum il-  
lis obinet. Eodem modo & quæ quarto quoq.  
die accessiõe facit sine vlla intermissione, nul-  
la interposita febris quiete, eiusdem est generis  
cum quartana. Et palam est, quod nec rigor in ea  
accessiones antecedit, neq. sequitur sudor. Quæ  
igitur in sola flava bile febris accenditur, sine ali-  
quo affectu viscerum, si quidem manente adhuc  
intra vasa bile accendatur, exquisita febris arda  
dicitur: si verò per totum corpus deferatur, ter-  
nana. Sic & si ab atra bile fiat febris, cum per to-  
tum corpus delata fuerit, quartana efficitur: cum  
immobilis, illa quæ quarto quoq. die exacerbat:  
quædammodû si ex pituita ortû habeat, vel quoti-  
diane sunt, vel quæ accedunt singulis diebus.

In vniuersum autem voco cõtinuam febrem, quæ  
ad infirmitatem, anteq. ex toto soluitur, non  
desinit: et si declinato aliqua sensibilibus in ea de-  
prehendatur. Cum verò nec declinato aliqua sen-  
sibilibus fiat, semper verò à primo principio febris  
vsq. ad crism similes perscuerauerit, erit hæc ex  
genere febrium devrntuæ, ab aliâ verò acutæ  
differet. Sed nec in primo die, nec in secundo est  
huiusmodi febrem præcognoscere, nec aliter vti-  
le. Sat enim est genus agnoscere, & scilicet bilio-  
sa sit, devrnta, & peracuta. Atq. huius generis fe-  
bres omnes in prima septimana duæ dicuntur: si  
verò tertiana pura fuerit, intra septimum circui-  
tum. Omnis autem diuturnæ sunt, & quonida-  
na intermittens, & illi adhaerens continua, sicut  
& quartana, & quæ per quartum excrecit. Quæ  
tria erunt vniuersa simplicium febrium gene-  
ra. Singula verò ipsorû in duas primas differen-  
tias sciuntur: vel enim intermittentes, vel fe-  
bres continue erunt. At si morbus compositus  
fuerit, non requæ facile cognoscetur. Dupliciter  
verò genus febris cõpositum cõstituitur: in pri-  
ma quidem sectione, vel quæ ex quas diximus  
febres circa aliquam membri affectû miscetur:  
vel quia ex membri cuiuspiam inflammatione ac-  
cenduntur. Quæ igitur circa membri affectum  
cõstitunt, dupliciter cõmiserunt: aliquando im-  
pliciter, nonnunq. verò per se totas cõfunde. Sic  
quoq. membra infirmata: nam ex ipsis quædam  
sunt vel tri complicata tantummodo, quædam  
verò vel tri cõfusionē quandam habent dispo-  
sitionum. Ac febres sanæ, quædam complicata  
vnius generis cum aliis eiusd. generis, vel vnius  
speciei cum aliis eiusd. speciei. Cõtigit verò  
nonnunq., vt etiam differentes miscantur. Nam

quotidianæ tertiana, & his quartanæ, & quæ est  
dem speciem seruant, invicem plerumq. implican-  
tur. Quo fit, vt idem homo tres interdû habeat  
quartana circumsistens: sed has quidem nō est diffi-  
cile agnoscere. Quandoq. verò aliqua ex inter-  
mittentiu genere cum cõtina, difficillimâ vizq.  
explorabilem facit misceonē. Porro quæma deno-  
dum febres, aut & patientia loca multationem reci-  
piunt: vel quia differentia membra propriâ singu-  
la febrem accendunt, vt lien & secur: vel quia dis-  
positiõe missa, veluti inflammatio cum erysipe-  
la, aut erysipelas cum inflammatione miscetur. Pro  
differentia enim affectuâ particulârâ, atq. et  
earum affectuum, solent etiam ipse febres varia-  
ri. Vbi igitur singula accurate distinctæ sint, tunc fa-  
cile misceonē deprehendes. Nulla autem est  
nec species, nec genus, qd. circa tertiam vel quar-  
tam diem, cuius naturæ sit, insinosecere nequeat.  
In vadit igitur febres aliqua horrida, atq. omni-  
no inæqualia in pulsibus, & in eo qui per totum  
corpus sentitur calore, vt serpius propius statum  
esse existimetur, vel medium augmeti obniterē.  
Rursus verò horrida fiat, & pulsia minores, de-  
biliores, tardiores, atq. rariore habeat: & calo-  
rem quidem ab extremis partibus recedentem,  
circa verò ventrē atq. thoracē, cõpulosum. Hanc  
non absq. ratione quispian hemistiq. fore spe-  
rauerit, vel potius iam esse: & multis autem tem-  
poribus nō soletur. Sed hæc quidem mixta est, ex bilio-  
sa pituitosiq. febre, non invicem complicata,  
sed per se totas cõfusa. Quæ autem ex cõpli-  
catione fit, quadruplîter consistit. Vel enim ter-  
tiana quondianæ commista: vel ea quæ quondianæ  
accessionem habet continua, illi quæ per tertiu  
continua est: vel tertiana ei quæ singulis diebus  
accessiõnem facit continua: vel quondiana ei  
quæ per tertiu continua est. Si quæ verò febris  
in primo die exquisita particula deprehensa, de-  
inde sequenti die simplicem priori omnino tegeret ac-  
cessiõnem, hæc duplex tertiana existit. Sic autem  
& duæ & tres quartanæ sæpius invicem compli-  
cantur, quæ accessiõni forma à quondiana dis-  
tinguit. Tria igitur sunt omnia quæ ex humorû  
poreidine febriam accenduntur genera: quædam  
enim ex flava bile (hæc plurimæ sunt) quædam  
ex atra, quædam ex pituita cõstitunt. Aliorû au-  
tem omnium febrium varietas, ex miscella horû  
humorû nascitur. At ephemeræ & hæcicæ febres,  
alias duos cõstituant genera, ab iis, quæ dicuntur  
acutæ febres, distincta. Porro febris acuta, vel ali-  
quo dictorum humorû cõputrescente, vel mem-  
bro phlegmone obfesso, gignitur. Mutantur au-  
tem nonnullæ, quod possit intermittens febris ci-  
cõtina misceri, quodq. nulla intermissione ac-  
cedente febris, interdû sola intermittentes mu-  
tuò inter se miscantur: id qd. accidit nō in tertiana  
tantu, sed quondianis intermittensibus, sed  
etiam in ipsis quartanis. Cum enim plures invicem  
cõplicentur, huc eiusd. generis, hinc diuersæ, acci-  
dit vt febris secunda plurimû anticipet adveni-  
re, anteq. prima in exactam integritatē definat.  
Deinde rursus tertia eadem succedit, anteq. iam  
perfectè solvantur. Hoc verò maxime accidit in  
longioribus accessiõnibus. Etenim trium tertiana-  
rum complicatio, in secundo statim die nobis

Quartana cõ-  
stantibus tribus  
vixit vnum cu-  
demq. simul ha-  
mone accipit.

Patientia loca  
quomodo effi-  
citur fieri imple-  
tunt.

Humiditas si  
febris devrnta

Humiditas si  
febris devrnta  
hæc ex bilio-  
sa pituitosiq. fe-  
bre per se totas  
cõfusa, vel ex  
sistem videri si  
cõfusa est: quod  
fieri quæ-  
druplîter pos-  
sunt.

Febris parula  
in vna genera.

Febris acuta  
quæ ab ipso re  
occidit in vna  
papat.

Quartana cõ-  
stantibus tribus  
vixit vnum cu-  
demq. simul ha-  
mone accipit.

Humiditas si  
febris devrnta

Humiditas si  
febris devrnta  
hæc ex bilio-  
sa pituitosiq. fe-  
bre per se totas  
cõfusa, vel ex  
sistem videri si  
cõfusa est: quod  
fieri quæ-  
druplîter pos-  
sunt.

Humiditas si  
febris devrnta  
hæc ex bilio-  
sa pituitosiq. fe-  
bre per se totas  
cõfusa, vel ex  
sistem videri si  
cõfusa est: quod  
fieri quæ-  
druplîter pos-  
sunt.

Humiditas si  
febris devrnta

Humiditas si  
febris devrnta  
hæc ex bilio-  
sa pituitosiq. fe-  
bre per se totas  
cõfusa, vel ex  
sistem videri si  
cõfusa est: quod  
fieri quæ-  
druplîter pos-  
sunt.

Humiditas si  
febris devrnta  
hæc ex bilio-  
sa pituitosiq. fe-  
bre per se totas  
cõfusa, vel ex  
sistem videri si  
cõfusa est: quod  
fieri quæ-  
druplîter pos-  
sunt.

Humiditas si  
febris devrnta  
hæc ex bilio-  
sa pituitosiq. fe-  
bre per se totas  
cõfusa, vel ex  
sistem videri si  
cõfusa est: quod  
fieri quæ-  
druplîter pos-  
sunt.

Febris quæ ex  
loco partibus  
accidit, for-  
mam esse com-  
positam.  
Theoriam ge-  
neratam, signa,  
& symptoma-  
ta.

manifeste est conspecta. Earum verò febrium quæ  
ex loco partibus accidunt, forma composita  
est. Quædam enim loci indicia præ se ferunt: quæ-  
dam autem eius, ob quam consistunt, causæ. Vel  
vni in morbo laterali locus quidem patiens est,  
totaque inter singula membrana. Quæ quidem cum  
inflammata sit, necessario dolore invenit, quoniam  
nervosa est, nec hunc pungentem, & longe  
extensum, quoniam pars siccata, est membrana.

Quæ quidem cum vnum sit spirandi instru-  
mentum necessario difficilem habebit respiratio-  
nem animal. Quia verò & cordi & pulmone pro-  
xima est, necessario & febricitabit, & statim infe-  
stabitur rufi: non tamen statim expuet. Sed si qui-  
dem multo ac crassum ab inflammatione defuxerit,  
nunc rufi expuet: si verò pauci & tenui irrita-  
bitur quidem necessario, ita ut rufi moueatur:  
non tamen expuet, antequam collectum simulque cõ-  
coctum ad multitudinem crassitudinemque ser-  
uerit. Nunquid verò magis pituitosus sit, vel bi-  
liosis humoris, qui inflammationem præ se for-  
ma sputorum cognosces. Nam si sputum muco-  
sum, fluxum maxime pituitosum ostendit, si sua  
autem, biliosum impermittit: quæ verò sunt,  
amaram quidem & ista referunt bilis, & non  
patum serosum humiditatem cum, & miferi  
significat: & multo amplius, quæ ad paucis  
quæ expuerit. Sic & nigra, atra bilis humum  
ostendunt: si enim quæ magis rubida sunt, plurimum  
quidem sanguinis: minimum autem amaræ bilis, ita  
et qui inflammationem facit, contineri significat.

Atque ideo inter omnia spura hæc sunt minora: si  
viti nigra, magis exualis. Pulsus igitur pleuri-  
ticorum, qui quidem duram præ se fert tensionem,  
nervosum esse locum affectum ostendit: qui verò  
seræ similis est, inflammationis effectum. Quæ  
velox simul & frequens, ac magnus, ad inflama-  
tionem consequi febre. Quæ singula quæ  
diximus, maiora sunt minora sunt, vel magnam  
esse, vel parvam ostendit dispositionem. Igitur  
aut simplex est febris, aut cõposita: vel cum loco  
petiète, vel ephemeræ, vel hecica. Si simplex om-  
nino fuerit, humoris indicia afferit, ex quo geni-  
ta est. Si verò composita, ex quorū simplicibus fe-  
bribus composita est, eodem numero humorū  
multitudinem indicabit. At si hoc indicet, illud  
etiam significabit, nūquid morbus diu durabit,  
an citò finietur. Nam si humor pituitosus exstiterit,  
necessario diuturnus erit: longè verò magis,  
si amaræ bilis naturam referat. Quod si ad fluxum  
bilem in dinet, minimè quidem diuturnus erit.  
Sic & locus patiens, qui quidem motu multo ex-  
ercetur, calidiorque est, ac rarus, & principatum ge-  
nitæ acutioris fore morbum potest. Qui verò  
in motu continuo est, frigidiorque ac densus,  
& iste principatus exstiterit, ad longè tempus de-  
bere extendi significat. Eodem modo & dispositio,  
si quidem difficilem morum habuerit, frigi-  
dioreque fuerit ac densior, diu duraturum: sin autem  
facile moueatur, calidiorque fuerit, & rarior, citò  
solum iri. Similiter & de causis est iudicandum.

Eas igitur quæ cum magno ac repente acci-  
dunt sunt solutiones morborum (quæ  
crises vocantur) febrium earumque  
humoribus acceduntur, proprias

dum. Post hæc, earum, quæ cum membrorum  
sunt principatum habentium, facile mobiles ca-  
liditatis dispositiones. Ephemeræ verò & hecicæ  
febres, sine magno perturbacione, & minime sub-  
iles faciunt permutaciones. Ergo in omnibus in-  
flammatis particulis conspectio ipsa, quæ locum  
probe distat prohibet, statim quidem putrefa-  
cit humores, immixtum quendam calorem excitat,  
quod & in reliquis omnibus putrescentibus ge-  
nuitur. Cuius caloris modus, cum simplex fue-  
rit, necessario alius earum, quæ diximus, febriū  
assimilatur: vel potius vna ex illis est, vel ad  
amaræm bilem, vel ad atram, vel ad pituitam ste-  
nens. Omnino enim humor qui inflammans no-  
nem efficit, vel fluxus bilis est, vel atræ, vel pitui-  
tæ. Si igitur impermixta multæ fluxus bilis fue-  
rit, tum facit erysipelata, & eos qui herpes no-  
minantur: si citi si nigra, caneros, & phagedæ-  
nas, aut elephantos, aut alique ex his adeo in-  
curabilibus morbis. Quæcumque verò ingruente  
pituita in tumorem stolluntur, hæc ordinata  
nuncupantur. At qui sanguis atræ bilis est permi-  
stus, duras gignit inflammaciones: erysipeli-  
tas verò similes, qui amare: inulatas, qui pitui-  
tæ. Cùm verò ipse secundum naturam se habens  
sanguis, trahit in locum fluxionis obnoxium per-  
tinet, hic quidem affectus iustissimo est. Sim-  
plex verò ex ipsa febris accenditur, maxime e-  
phemeris similis, quæ ex inflammationibus in-  
genitum accidunt: nam & ipsa inguinit in inflam-  
matione ex optimo sanguine fit. Liqueat autem,  
cum hic putrefactio cõperit, non amplius bonus  
remaneat, sed iam ad amaræ bilis naturam tran-  
sit. Atque in hoc illud servatur, triplex esse genus  
vniuerum simplicium febrium. Quæ enim ex  
sanguinis putredine fit, iam quod immo dicitur bi-  
liosa est. Etiam sanguis ex moderato calore gi-  
gnitur: fluxus autem bilis, ex maiore: atra vero ex  
impenie immo dicitur. Quicquid igitur pingue ac  
tenue in sanguine est, fit fluxus bilis: crassum ve-  
ro, ac veluti sex, quando immo dicitur exstiterit ex  
caliditatem, atra. Plana enim bilis quando in in-  
flam cõvertitur, cum aësa fuerit. Omnes igitur  
quæ in particula aliqua accenduntur febres,  
vnum aliquem ex dictis, vel simplicem, vel com-  
positum characterem habebunt. Qui verò sin-  
gulis per se febres exquisitè cognoscitur, earum le-  
uissimum non ignorabit. Ephemeræ febres so-  
lius spiritus sunt passionis, absque humorū putre-  
dine, sunt membri inflammatione, nisi inflamma-  
tio in sanguine accidat. Earum autem genera-  
tionis sunt occasiones cõmunes, vigilie, credu-  
ditas, restitio, timor, curæ, iracundia, desitio, res  
frigeratio, lassitudo, ebrietas, & quæcumque simi-  
lia. Cõmuniter omnium pulsus promouetur ad par-  
uitatem atque frequentiam, & nonnulli ad magnitudi-  
nem. Exquisitè autem servat eam quæ secundum  
naturam est, æqualitatem, molliem, & ordinem:  
Sic & vixit, nullæ quidem, suspensionis, non  
nullæ verò subdientias bonas habent, quædam  
autem nebulas. Omnes verò probe coloratæ sunt,  
sicuti & in omnibus calor vapidus est: atque ab  
omnibus ipsis est sunt malignis accidentia. Cõm-  
unes autem sunt omnibus, & vixit rufiores. Cæteri-  
us qui ob tristitiam febricitat, acrimoniam possidet

Conspectio fe-  
brium quæ ratio  
non gignat.

Inflammationis  
genus vel fluxus  
nobilis, vel a-  
tra, vel pitui-  
ta.

Bilis quæ edas  
remouet.  
Atra bilis quæ  
leuissimum ge-  
nus.  
Pituita quæ  
inducit.

Sanguis probe  
est proprie di-  
ctum inflama-  
tionem.

Sanguinem po-  
tiusmodum ad  
amaræ bilis  
naturam  
transire.

Humorū genera-  
tionem aliquæ  
manifestationes  
sunt.

Febrim multo  
acutius ignora-  
bit, qui sangui-  
nis principatum  
cognoscit.

Ephemeræ fe-  
bres, spiritus  
sunt, non fluxus  
sunt, non passio-  
nes.

Ephemerarum  
febrium causa.  
Et humoris autem  
febrium indicia.

Sputorum colo-  
re ostendunt  
differentias ho-  
morum: quoniam  
nunc pleuritici  
dant.

Spura minora  
quæ sunt ad  
pleuritici, & quæ  
crisis indicia  
magis.  
Pleuriticorum  
pulsus quales.

Febrim diuisi-  
onem.

Febrim longè  
inducit ex bre-  
uitatem depre-  
bendo possunt  
notitia humorum  
ex quibus  
generantur, vel  
dispositionum  
passionum à quibus  
procedunt.

Crises exoptima  
multatque cali-  
dorem febrium  
sunt propria.

*Trophiscum que  
signa arguant.*

*Oculorum ex  
quo, si sunt  
tremor aut  
fusus cognosci.  
Vigilia maceratum  
signa.  
Tracudum  
signa.  
Fetor ex  
laxitate  
signa.  
Ephemerum  
ex  
densitate  
signa.*

*Ephemerum  
ex  
bubone  
signa  
que arguant.*

*Hecticum  
signum  
si  
fusus  
in  
prima  
die  
signum  
prognosis.*

*Crisis per  
tremor  
signum  
subito  
per  
tremor  
signum  
ad  
salutem.  
Crisis male.  
Crisis impar  
signa.*

*Crisis per  
tremor  
signum  
subito  
per  
tremor  
signum  
ad  
salutem.  
Crisis male.  
Crisis impar  
signa.*

*Crisis per  
tremor  
signum  
subito  
per  
tremor  
signum  
ad  
salutem.  
Crisis male.  
Crisis impar  
signa.*

adeat, quod multitudine caloris: sicut in eis qui ob iram, contrario modo. Sed & tenuitas corporis in eis qui trinita, & in eis qui curis vexati sunt, manifestum apparet, & oculorum coarctatio, & insolita quædam decoloratio. Et hæc quidem cuncta omnino etiam aliorum, dum quocumque modo contrarios humores implicati fuerint, indicia sunt. Sed præcipue ex oculis sunt discernendi: si cerenim ex his etiam in sanis animi affectum cõducere. Eos qui in vigiliis, dum neque oculorum coarctatio, nec manifestum inest decoloratio. Sed nec magnitudo pulsus aufertur. Eorum verò qui febriunt ex lassitudine, cutis est sicciore, & in aliqua alis febrium ephemerarum. Quæ ex densitate cutis febres oriuntur, solent inter omnes ephemerarum in positione stricta cõstituant, facilius dignoscuntur ex tactu: sicut & arde febris ex lassitudine sunt. Caliditate autem morbus uris quod modo suggestit. Eorum verò febrium ephemerarum, quæ ex bubone accenduntur, pulsus maximi sunt, veloces atque frequentes, calor plurius, qui post statum statim ex profundo extollitur, sed suavis. Præterea rubi facies magna ex parte ipsi inest, & maior tumor, & uris subalbe. Cunctis autem his febribus inest æqualitas pulsui. Quia verò nulla hecticarum febrium in primis diebus, sed in progressu temporis fit, de illis non agemus impræsentiarum.

### GALENI PERGAMENTI de crisisibus, lib. III.

**V**bi morbus subito ad sanitatem pervenit, ea permutatio omnium optima est, atque idem ipsam per excellentiam crisi vocamus. Ex aliis autem permutacionibus, quæ quidam ad salutem morbi fit, male crisi exiit. Quæ verò aliquam effatu dignam mutationem efficiunt, non tamen integram ipsationem, imperfecte crisi vocantur: si vni & quæ septem emoriente vel vitæ, vel morbo contingunt: quæ solutiones simpliciter non crises vocari debent. Soli igitur fusiva ad sanitatem conversio, simpliciter crisi vocatur: quæ si subitis quibuscumque excretionibus, aut effatu dignis abscedit ut. Quicquid enim autem quæcunque, retrocedunt malignius. Antecedunt autem huiusmodi excretiones abscessus non mediocriter perturbatio in agrotantis corpore. Nam anxietates, vigilie, demeritis graves somni, respirationes difficiles, vertigines, sensuum difficultates, dolores capitis, colli, stomachi, & multorum aliorum membrorum: nonnulli verò, autem somnii, & vane ante oculos apparent imagines, & lachrymæ involuntarie effluunt, & uris rethentur, & labrum agitur, & aliquid tremulum sit oblatio præterea, & præsentium ignorantia, & vehementer rigor accedit, & plurimum acerbisio cõsuetat anticipat horam, & missus est, & vni pugnabilis sequitur: clamant & salunt, sicuti fuerint, nec possunt in eodem sua recumbere. Deinde repente in multos sudor erumpit, aut vomitus non exigui insequitur, aut venter subito soluitur, aut abundantia fit fluxus sanguinis, aut hæc omnia simul contingunt, vni

de non parvus invadit timor adstantes. Virgatur qualis sit habitura exitus præfens crisis, agnoscas, prævidens autem futuram, primis ac maxime omnium expendens coctiones sunt ex uris: alui excrementis, atque ex ipsa spuma. Quippe neminem vidi intereunte, qui præcedentibus coctionibus, etiam ipsi habuisset. Non tamen ex quo omnia signorum dignitas eximanda est: sed in morbis quidem thoracis atque pulmonis, præcipue spuma spuma exploranda: non tamen vrinam contemplatio exploranda: sed & excrementa sunt inspicunda. Si verò tantum febricitet absque alicuius visceris affectione, aut si etiam aliquid eorum quæ circa hepar, venes, vesicam, atque plieum habentur, phlegmone obfessum sit, maxime vrinis est intendendus animus. Sicuti si circa ventriculum passio consistat, primum excrementis alui inspicunda: sed neque interim fuit negligende vrinæ. Primi itaque & maximum instantis bonæ crisi indicium sunt concoctiones. Secundo autem, quod ab aliqua die indicatoria, indicata prius fuerit, cui annexa sit dies ipsius iudicationis facultas. Deinceps vero inspicere oportet, quæ morbi, & morum: ac postea, si formæ ipsius excretio respondeat. Et enim si febris, si sit, vel sanguis & quibus profluat, vel post vehementem profluat sudor multus & calidus per totum corpus manabit: aut per vomitum, aut per alium, biliosum aliquid excreta. Ita & tertiana vomitibus & excrementis biliosis, & sudoribus toto corpore diffusis, finiri debet. Quartana autem pituiti in febribus excretionem quodammodo, & multi per totum corpus sudores finit. Finis autem phrenitidis sudor multus, præcipue si calidus & capite fluxerit: sudor similis reliquo corpore. Contingit etiam interdum, ut per sanguinem bene & nobis phrenitis etiam soluitur. Non tamen interdum aut per hanc morbi fluxum inueniuntur. Inter ipsas autem pleuritis in medium obinet loci. Lienis etiam hepatis soluit inflammationes, si simul adit acuta febris, sanguis & narius profluens: sicuti & reliquas omnes, quæ sub præcordiis sunt, & acutis inflammationes. Oportet autem per directum fluere sanguinem, ex dextra quid eminare, præsentem hepate, vel locis sub dextris præcordiis positus: ex sinistra autem, lienis, & locis vicinis. Iam etiam & sudor bonus omnes quæ sunt iuxta præcordia inflammationes calidas & acutas. Hepatis verò coarctæ quidem partes patientes, fluxibus sanguinis & naris dextra, sudoribus bonis, copiosis & vris soluitur. Causæ autem partes excrementis biliosis ex sudoribus nonnunquam verò & vomitibus. Sudores tamen omnibus febribus proprii sunt, & præcipue excrementis. Finiunt autem quartanas febres, si autem similis est atque varia excrementa: semitertianas verò, si biliosus simul & pituitosus. Solunt etiam paronides, leishargos, reliquosque omnes affectus capitis. Porro ceteri abscessus, febres, & diurnas secum solvere consueverunt, & quædam etiam naturæ præter naturam antecedens locus in quo appropinquat, peritendit itaque temporis veranda. Alii ex his quæ diximus licet

*Coarctatio  
signum  
expendens  
signum  
ad  
salutem  
signum  
prognosis.*

*Crisis bene  
signum  
prognosis.*

*Ardeat febris  
signum  
prognosis.*

*Tertiana  
signum  
prognosis.*

*Quartana  
signum  
prognosis.*

*Phrenitis  
signum  
prognosis.*

*Sanguis & naris  
signum  
prognosis.*

*Excrementa  
signum  
prognosis.*

*Sudores  
signum  
prognosis.*

*Vomitus  
signum  
prognosis.*

*Sudores  
signum  
prognosis.*

*Sudores  
signum  
prognosis.*

*Sudores  
signum  
prognosis.*

*Sudores  
signum  
prognosis.*

*Crisis futura  
praecognoscenda  
qua requiratur.*

*Synocha febris  
virescentem habere  
crisis.*  
*Crisis autem  
et tunc fieri  
non, quae rati-  
onem.*

*Crisis per  
motum  
qua rati-  
onem.*

*Accessiones  
quae  
fieri  
non, quae  
rati-  
onem.*

*Intermittens  
febris  
synocha  
fieri  
non, quae  
rati-  
onem.*

*Crisis saluta-  
ris  
fieri  
non, quae  
rati-  
onem.*

*Salutis  
fieri  
non, quae  
rati-  
onem.*

excedit vicia praesentis crisis cognoscitur. Ad  
praecognoscendam vero futuram, illa quae super  
dicimus, vni cum natura morbi similiter expen-  
denda sunt. Post haec autem & accessioni circums-  
pectus veniunt considerandi, an per tertium, vel per  
quartum, vel per singulos dies eveniant, vel nullo  
modo eventis, sicut in synocha accidit. Si enim  
propterea, ac semper proportionabiliter an  
tiopauerint hori, aut multo vehementius infe-  
stauerint, & per tertium occurruerint, cito crisis  
subsecutur denunciatur. Si vero lente moueantur,  
atque eadem invaserint hora, & singulis diebus fiat,  
post longius tempus crisis futura portendunt.  
Præterea colutiones inspicere oportet: quarum in-  
signes permutationes, si in diebus indicatoria  
accidant, indicia sunt, quod sequentes indica-  
tores dies exigit absoluunt morbo. Minime autem  
contingit, febrem omnia signa securissima ha-  
berentem, nec illam, in qua sunt omnia maxime  
perniciosa, alteram quidem non liberare, alteram  
vero non occidere in primo quartario exagran-  
tem. Cum autem vnaquaeque accessio qua-  
tuor habeat partes, principium, augmentum, sta-  
rium, & declinationem: vel has omnes breui tem-  
pore accessio percurrit, vel tardo: vel nonnullas  
quidem citius, nonnullas vero ferè in omnes  
agitur celeriter peragat, manifestum inde fit, quod  
ad crisis preparat: omninoque huiusmodi febris  
est de numero intermittenti. Neque enim contin-  
git, ut illa quae omnes celeriter peragat, amplius  
continuat permanere: sicut neque fit quae in om-  
nibus partibus proliatam feruat, fit intermittens.  
Voco febrem intermittentem, quae ad infe-  
bricitationem pervenit. Porro febris synocha long-  
e est status: \* imò vero tota haec febris status  
est. Cum igitur morbi species, & magnitudo, &  
tempus, & morbus intersit distinguantur: & species  
quidem sit ex propriis accidentibus cognita: ma-  
gnitudo vero, ex torumdem quantitate: motus  
ex tempore accessionis partium: morbus ex acciden-  
tibus superveniens: his quoque adiuncta con-  
sideratione temporis, & naturae, & regionis,  
& similibus: nunquid morietur exger, aut fini-  
nabitur, ad huiusmodi resciens invenies, ad speciem,  
& motum, & magnitudinem: sed principie  
indem experire oportet. Vtrum vero per cri-  
sim terminabitur morbus, an non, primum quidem  
ex motu ac magnitudine perspicies: deinceps autem  
ex ipsius specie: postea ex anni tempore, & ex aliis  
quae eiusdem sunt ordinis, & ex superveniens acciden-  
tibus, quae vel vna cum crisi ab initio invadit, vel paululum anticipant.  
Nam cum supervenientia accidentia diuidantur tri-  
partim in ea, quae sunt quae morbi natura in-  
ferre accipit, & in ea quae affluunt pro-  
pter crisis denunciant, & in ea quae non solum si-  
gna, sed etiam causae crisis exilunt, primum quidem  
ex his simplex est genus: secundum vero & tertium  
non semper, neque idem facere neque ostendere  
est aptum, sed variatur secundum tempora. Si ex-  
ger igitur primo dea habeat signa salutis manifestissima,  
huc in primo quaterione solus mor-  
bus. Vtrum vero per solutionem vel per magnitudinem  
& paritatem distinguat. Alioquin quidem, iudicantur omnino parva antea quatuor

soluunt. At dies crisis ex ipso motu invenitur.  
Nam si febris synocha fuerit, nullissime accide-  
rit error, sperandum est crisis quare futuram  
die. Si vero continua fuerit, magnitudinem ac mo-  
tum inspicere oportet. Conviert namque in tertio  
vel quinto die crisis fieri: in tertio quidem, si mor-  
bis sit magnus, ac motum habeat velocem: in  
quinto autem, si nec valde magnus sit, nec mo-  
vetur velociter. Oportet enim crisis in idem  
tempus incidere cum accessione. Ob id quoque raro  
accidit, ut in tertio die continuatur crisis videat.  
Conviert itaque febres, quae in accessionibus cri-  
sim habent tertio die, vel quinto rationabiliter  
finiuntur. Adjuvat motus celeritate morbi ma-  
gnitudo, & anni tempus, & regio, & aetas, & quae  
cumq; alia amare bili conveniunt. Tardius autem  
motus infunt contraria. Ceterum principia signa,  
si diutius perseverant, diuturni fore morbum  
significant. Augmenti vero, si in quarta vel septi-  
ma die apparuerint, sperandum aliquid in qua-  
rtodecimo est: id tamè vndecimo designabitur.  
Nam si haec tria in eo die coniuncta fuerint, &  
motus velocitas, & febris magnitudo, & mani-  
festum coctionis indicium, fiet crisis in quarto-  
decimo. Si vero solum manifestum coctionis si-  
gnum die vndecima appareat, neque tamen morbi  
magnitudo, aut morbi velocitas festinaret, tunc  
ultra decimum quartum differere crisis. At si nec  
die quarto decimo aliquid innotuerit, tunc, si  
fit exquisita, tunc ad diem decimoseptimum est re-  
ficiendum. Si enim in eo apparuerit aliquid si-  
gnum, id indicium erit, quod si perexquisitum  
crisis viginti diei praemonstrabit. Quae igitur cri-  
ses post signa optima, & exquisita factae fuerint  
coctione, ex necessitate erunt optime: quoniam si  
sola coctio, crisis celeritate salubri ostendit. Ex-  
quisita vero sit coctio tempore status. Cum igitur  
forma victus ad statum induat, & crisis optima  
in illo fiat, vix omnium crisis ipse erit regula.  
Quae enim huius est proximior, altera magis di-  
stante est ponitur. Quare in nulla re adeo exerci-  
tandus est medicus, ut in status praecognitione,  
de terminis quidem morbi status tempus praeterierit  
inducant, si hinc crisi prelevat, & paululum so-  
luta sit: nullumque periculum est, status tempore e-  
stipio, quam iudicio assequi possum. Qui vero  
perierit in declinationibus, omnes qui aut pro-  
prio sunt, aut errore medicorum extincti, nequa-  
quam vix morbi. Vbi enim natura superior eva-  
dit, resurgit vehementior morbi conari, & quae  
infestabant opprimit (hoc enim est ipsa coctio)  
fieri non potest, ut deinceps succumbat. Quod si  
in morbo non vincatur natura, morbum subsequi  
nullo modo contingit. Siquidem nihil aliud mors  
est, quam omnimoda naturae prostratio. Igitur  
an morietur sit exger, nec ne, praecognoscit ne-  
mo, nisi status tempus praecient. Vt autem se-  
re non possumus, an portando oneri quispian  
luctus est, aut in labore, oneris magnitudi-  
ne, ac via longitudine antea non exploratis: sic  
nihil de exortibus salute prius pronuntiare lice-  
bit, quam magnitudinem morbi, naturam, & robur, ac  
juramentum naturae enigmamus. At vero si ex tri-  
bus us cognoverimus, nunquid liberabitur aut  
morietur exger, colligere ita poterimus aliquid

*Synocha diu  
in esse a conti-  
nuata febris.*

*Crisis in idem  
eius tempus  
debet esse ac-  
cessione.*  
*Continua fe-  
bris, quare ter-  
tio vel quinto  
die soluitur.*  
*Mors declina-  
tionis tardis-  
sime adven-  
tans.*

*Crisis optima  
qua.*

*Vires rationis  
nulla status  
infestat.*  
*Status morbi,  
autem crisis  
est regula.*  
*Status praec-  
ognitus maxime  
cura esse medi-  
ci debet.*

*Status tempus  
classis, solum  
paululum mor-  
bi, autem, ab-  
esse periculum.*

*Mors est mod-  
este naturae  
prostratio.*

*Praedictum si  
tali vel morbi,  
debet prius ma-  
gnitudinem mor-  
bi, naturam, &  
robur, ac juramentum  
naturae enigma-*



de crisis tempore & modo. Nam si morbus inve-  
niatur salubris, & neq. eius acumen, nec magni-  
tudo feriment, nec error aliquis committatur. cur-  
a negrū, statim tempus crisis expectat: quae sanē  
optima erit, vt quae morbo cōcocto fiat. Si verō  
vel propter morbi magnitudinem, vel morus cele-  
ritatem, ante statū crisis venire cogatur, tūc haec  
deterior optima erit, quantum statum anticipauerit.  
Quod si neq. vīq. ad statum sufficere possit,  
necellum est egrum ex hoc morbo interire, non  
tamen omnino propter ista. Crises quāq. vel in

trijm declinationibus, ob virium imbecillitatem  
monitur. In totius aut morbi declinatione, nul-  
lus vnquā exinguitur propria morbi ratione,  
sed ob errore cōsistim. Quandoquidē vbi mor-  
bi status praeterit, natura evasit superior: alio-  
qui nō declinasset morbus. Fit autē semper velle-  
mentior pulsus, equalior & ordinatior, in opti-  
ma declinatione. Debiliior verō, inordinatior, &  
inequalior, in exitiali. Tres itaq. sunt omnes mor-  
tis modi, iis qui fine crisi moriuntur. Primus quidē  
in accessionū principiis, q. in magnis inflama-  
tionibus principalū membrorū connngit pluri-  
mum, vel ob humores multitudinē, crassitudinē,  
& tenacitatē. Secundus in tempore status, q. mor-  
bi vi natura superata. Tertius in declinatione,  
qui rarissime accidit, vigore soluto vitali. Mor-  
bi verō nullus cōtingit cum crisi. Neq. enim mor-  
bum depellere in huiusmodi moris modis ab  
initio natura tentavit. Vbi verō tentaverit, sed  
succubuerit, malam crīsim talem eventū appē-  
lōisq. omnino cum excretionibus, aur abscēsi-  
bus momentaneis. Si vti autē in malis crīsis  
est plurima incertitudo cōsistit, ita in bonis  
scientia, & firmitas praevalet. Determinant siquē-  
dem sunt, itaq. ordian naturae motus, si & vali-  
da sit, & dominetur materiei, appriatq. perficiat  
operationes. Indeterminat verō, inordinatq. &  
incogniti, si quando succumbat. Porro si mor-  
bo permiciose existente, quarto die letalia signa  
se ostendant: si quidem imparibus diebus acces-  
sio fiat, septimo accedet crisi: si verō paribus, se-  
xto. Certior tamen expectatio faciet ipsius  
morbi motus. Nam si is acutē moveatur, crīsim  
sexto die venturū significat. Sin verō tardē, ad se-  
ptimū differetur. Cūm verō dies indicatrix nul-  
lum de mala crisi futura signū ostenderit, praeco-  
gnitio eius minimē facilis erit. Est autem primū  
& maximū morbis morallibus istud, quod sine  
crisi mors sit subsecuturā, vnde imbecillitas. Se-  
cundum verō, si nullum adit signū cōsequenti:  
& praeter haec, si magnus timor morbis malignisq.,  
& moveatur celeriter. Cūm enim haec affuerint,  
omnino absq. crisi mors subsequetur. Mortis au-  
tem dies praecognoscitur, quasi superet mor-  
bus naturam considerādo, & grauiores accel-  
erationes inspicendo. Si enim status dignus fuerit  
excessus, & parū resistere aditū vīs naturae vide-  
atur, mors citō subsequetur. Si verō cōtraria affue-  
rint, tardius. Si rigitur, grātia exēpli, multus ex-  
cessus, nō tamen manifestus: an ad vnum diem,  
vel duos extendi poterit, hoc cerē distingnetur  
accessionū circuitibus. Quo enim die debet ac-  
cessio fieri in illo morietur. Cōfitei rursus mor-  
bum esse exitialem, nec nullam possit habere vi-  
rium adesse: liquet primū ex hoc morte nō esse  
propinquū. Deinde inquirēdū est, an crisis he-  
ri possit. Si vtiq. virtus robusta fuerit, & mor-  
bus moveatur velociter, & aliquid signū cōcū-  
tis affuerit, nō extra rationē est, quod natura re-  
tabit crīsim. At si virtus quodammodo succubue-  
rit, ac morbus tardū habuerit motū, nullūq. ad-  
fuerit cōsequenti signū, in hoc subseq. huius crī-  
sim expectet. Itaq. optimae crīses in statibus sūn-  
t in accessionibus verō, si salus sit subsecuturā, vel in  
perfecta, vel nō secuta. Ar in moriuntur, vel in te-  
rimunt

Mors est nec  
propter in tota  
morbi declina-  
tione, nisi ob  
rem cōsistim.

Mors est in  
modis, in qui  
absq. crisi mo-  
riuntur.

Natura motus  
quādo determi-  
nat, ordinatq.  
que fiat, et quā  
do sit cōsequē.

Mortem absq.  
crisi accēssū  
quā indicat.

Mortis dies qua-  
vis cognosce-  
tur.

Crisim quādo  
ritabatur natura

Crisim optimae  
heri in statibus.

Crisis quo mor-  
bi si ipse fiat,  
Mors quo mor-  
bi tempore ac-  
cidat.

Permutationis  
morborum tres  
differentiae.

Crisis imperfecta.

Crisis per ab-  
scessum quando di-  
catur.

Permutationis  
morborū, cum  
egressi interi-  
tus, et in mo-  
do.

Crisis non bo-  
na.

Arrestatio.

Quasi mor-  
bus, accessus  
debet trāire il-  
lus in vniuersa  
lia tempore.  
Morbus ad  
declinationem  
pau pertingere  
minimē potest.  
Crisis ut mo-  
riatur quāvis,  
non esse accessus  
nam.

Crisis non sit  
absq. certami-  
ne.

Mors absq. cri-  
si subitū morbo  
evasit.

Mors absq. crisi  
quādo accēssus  
in accessio-  
nem principis

statu, vel parum ante ipsum fit. Mors autē, in tri-  
bus temporibus, principio, augmento, & statu.  
Porro vbi quis subito liberatur a morbo, omni-  
no huic aliqua evacuatio effatu digna, aut ab-  
scēsus cōtingit, praecedente tamen insigni qua-  
dam perturbatione. Arque hunc sanē solutionis  
modum vocamus crīsim. Est & alius solutionis  
modus, vbi scilicet nō omnino absoluitur eger:  
quo crisis dicitur imperfecta. Vbi verō morbi

paulatim & citra perturbationē soluitur, solatio  
illa per abscēsum crisis vocatur. Ar tres quidem hi  
sunt modi permutationis morborū, cum egres-  
sus est evaluus: tres verō alij istis proportio-  
nates, cum videtur esse moriuntur. Vel cum subito  
moriuntur, cum perturbationibus, evacuationib.,  
vel abscēsisbus momentaneis: vel mortem non  
subitē quidem ex istis, sed multo deterius evadit.  
Vocatur autē haec duae crīses nō bone: quarum  
prima quidem perfecta, secunda imperfecta exi-  
stunt. At tunc loquimur de permutationis, quo  
homini paulatim duci ad mortē, a relictio ducit-  
ur, in & quartus modus subitae permutationis  
ad peius, sine magnis excretionibus, vel materiei  
in aliquē locū affluxibus, quam neq. crīsim ap-  
pello. Statuens igitur aliquā esse vitalem poten-  
tiam, stude vt agnoscat, ipsius iam robore, vt  
in imbecillitate, disponit nō ē. Vbi verō in his ex-  
ercitatus iam fuerit, cura deinceps, vt omnes  
morborū tam in magnitudine, q. in more differ-  
entia, & post haec futuri status praecognitionē,  
perdit. Quae vbi accurate didicimus, tunc te ex-  
cerce oportet in cōprehendenda per exquisitā  
cōiecturā, tam morbi magnitudine, q. egrotan-  
tis robore: & quanto hac tempore possint per-  
durare. Si vti enim qui signa omnia bona pra-  
stet, in primo quatenione integrē liberabitur.

Ista qui omnia mala, infra primū quaternarium  
monetur. Ceterū qui quidem liberatur, omnia  
morbi tempora vniuersalia pertrahit. Moritu-  
rus verō ad declinationis tempus pertingere mi-  
nimē potest: imo nec necessariū ad statū. Con-  
tingit quippe illic in augmenti & principij etiā  
tempore mori. Crīsim verō subire nō est necessa-  
rium, & maxime si in principio morbi moriatur.  
Hoc autē accidit, vbi natura a morbo plurimum  
superatur. Tunc si quidem nec cessare adversus  
ipsum aggreditur: atqui sine certamine non fit  
crīsis. Sic igitur est quartus modus moris, qui  
nulli salutarū assimilatur. Nemo siquidē subito  
morbo evasit sine crisi. Multū verō sine hac sub-  
ito interire, plurimum in accessionū principis, il-  
li praeterit qui propter in aeternā mutationē &  
crassitatem, aut inflammationis magnitudinē, ex-  
altatior laborant. In accessionū etiam particula-

10  
20  
30  
40  
50  
60  
70  
80  
90  
100  
110  
120  
130  
140  
150  
160  
170  
180  
190  
200  
210  
220  
230  
240  
250  
260  
270  
280  
290  
300  
310  
320  
330  
340  
350  
360  
370  
380  
390  
400  
410  
420  
430  
440  
450  
460  
470  
480  
490  
500  
510  
520  
530  
540  
550  
560  
570  
580  
590  
600  
610  
620  
630  
640  
650  
660  
670  
680  
690  
700  
710  
720  
730  
740  
750  
760  
770  
780  
790  
800  
810  
820  
830  
840  
850  
860  
870  
880  
890  
900  
910  
920  
930  
940  
950  
960  
970  
980  
990  
1000

rimant subitò, vel magnam ad peius mutationē efficiunt. In principio autem morbi, crises non fiunt. Quando igitur futura crisis ostenditur, & nox precedens molesta fuerit, & post ipsam accessus velis invaserit eū quibuscūq; acribus denubus, necesse est in eadem accessione fieri crisin. Quas autem futura sit crisis, vtrum per sanguinis fluxum, vel vomitum, vel sudorem, vel per aliquod aliud exis, quæ sæpe enumeravimus antea, auctor bonarum disciplinarū Hippocrates accuratissime exposuit, cum in primo Epidemiarū libro, tum vel maxime in cōmentario prognosticorū. In universum autem, nihil aliud oportet considerare in modo crisis, præter naturæ ipsius inclinationē. Distinguentium autem est, an calidus & acutus sit morbus, crisisq; in primis fiat periodicus: quippe necesse est tunc post crisin, non abcessum, sed excretionem subsequi.

At tardi & durior morbus per abcessum quiescere consuevit: præcipue si vnde actiois & cruda longo tempore exierint. Nam si multum & optimè in subidentia habuerint, rationabile est morbum potius paulatim concēdum, non per abcessum solvendum esse. His præstitis, deinceps considerandum est, si quidem per excretionem debeat terminari morbus, anquid profluviū sanguinis, vel vomitus, vel sudor, vel alui subductio sequatur: si verò per abcessum, quodnam membrū, & quis articulus abcessum suscipiet. Cæterū in his qui per excretionem debent terminari, dupliciter distinguere oportet: si futura excretionis signa, si affuerint: & alioquin, si minime adsint. Si igitur præter rationem alius præsumitur, vel vrinæ, iam præpē crisi existente, rigorem sperare oportet. Quis si acciderit, distinguendū tunc est, nunquid sudor post ipsam sequatur, vel vomitus, vel subductio ventris, vel aliqua horum, vel omnia. Et primū quidem ad morbi speciem est mispendium. Si enim exqualitate fuerit incendens, statim certior erit rigoris ipsius præcognitio. Quod enim incendit, biliosum est. Atqui biliosus humor, ubi vehementius movetur, rigorem facit. Post hæc autē & illud considerandum est, nunquid vrinæ tantum, vel etiam alui cōpēssio, rigus. Si enim ambobus, necessario rigor plurimus subsequetur. Si vrinæ solis, considerare oportet, nunquid alui excrementa plura quam prius, vel pauciora ante crisin exierint. Si enim plura, manifestus morbus naturæ ad hunc locum est agnoscendus: si pauciora, ad sudores. Si verò & vomitus signa adfuerint, per has ambas crises iudicabitur. At si vomitus signa non adsint, solos sudores expectare oportet, & magis quando agrotantes deliraverint in crescentē accessione, & partes exteriores calidiores ac rubidiores exierint, & vapore quidam calidus exeat, quibus ante nō adfuerat. Quod si pulsus etiam vndosus fiat, & infirmus molli aduici crudi amplius sudores expectare oportet. Vnde autē pulsus, vomitus magis sudores præcendit. At alius, omnimodis excretionis est index, perinde ac vehementis. Si verò magis exierint, motus ad exteriora potius, quam ad interiora, signū exitus. Cū verò vterq; fuerit modo duplici, hic quidē qui ad exteriora, per fluxum

sanguinis est naribus, atq; sudores: alter autem qui ad interiora, per alium atq; Romachiē vndosus quidem pulsus, sudores: magis autē, simpliciter sanguinis fluxus præcendit. At motus superante ad interna, cum non adfuerint signa vomitus, per ventris excrementa fieri crisis: si vero adfuerint, & venter insigniter subducatur, per ytragperiōietat. Inqualis autē pulsus, in plurimis quidem crisis sit, & præcipue cū non sunt sine periculo & pugna. Vomitus signa sunt, oris vetriculū morbus, vnde cum dolore & capitis, obortu vertigines, agitatio labri inferioris, magnūq; spiritus tenuis deluxus. Propria verò signa profluviū sanguinis, quidam fulcoris motus oculis apparere, quoniam humor est fluxus. Obfusions autē, quoniam multus, & totius simul status ad superiora, spiritus meatus oblerat. Ita autē & oculi lachrymannur, ob multitudine fluxus. Eodem modo rubidi aliquando videntur in malis: nonnumq; & naribus. Proprium verò signum sanguinis fluxus est naribus est, etiam præcordiora tendit sine dolore. Nam & hoc nō parum indicium est sanguinis ad superiora tendentis: fieri enī difficultas respiratiois, quæ cōtingit sanguine transeunte in thoracē. Si verò præcordia cum dolore extendantur, non modo fluxum sanguinis nuntiānt, sed etiam aliquem ibi adesse inflammationē significant. Sed & dolores capitis, qui quidem veluti mordaces sunt, vomitum: qui verò quodammodo graves atq; exiterdentes, pulsantesq; & calidi, sanguinis fluxus propriè significant. Sæpiam vicerum, præcordiorū existentū inflammationē, causæ sunt ac signa sanguinis fluxus, quando morbus per excretionem est iudicandus: Cæteri si ex contraria parte fluxus sanguinis, malum est: bonū autem, si secundum rectitudinē viceris. Vt inquit Hippocrates.

Quare præcordia dextra per dextrā arem bonū afferit crisin: per sinistram autē, sinistra. Si verò per excretionē alius sit crisis subsecuta, manifestum quidem nullum est signum: sed ex eo quod actum quidē crisis signa, defuncti autē vomitus, & fluxus sanguinis & sudores colligere licet. Quoniam vel si nullum horū signorū adfuerit, non hoc tantū modo, sed etiam per hæmorrhoidas, fieri crises conuigat, & mulieribus per purgationes menstruas. Non tamen impossibile omnino est talia distinguere. Gravius omnino lumborū effusus dignus, & tensio & dolor, in sinistra hic antecedit. Hæmorrhoides verò, non omnibus sunt conueniētes. Quibus autē sunt conueniētes, hoc difficile foret distinguere. Igitur alius omnibus, quando adfuerint signa cōtentionis & crisis, vomitus verò nō adfuerint, vel fluxus sanguinis, vel sudor, omnino venere turbabitur. Si verò morbi ad abcessum conuerti videantur, cōueniētiū quiddam omnia indicia sunt, vbi ægri sales deploratissimi sunt, quod neq; morbus solutur, neq; vrinæ vrinæ, si multum habens substantiam, sed cruda & tenuis appareat. Propriè vtrūq; est motus duobus duobus morborū, si argueris difficultatem respiratiois, etiam repenti incendens: breui quidem liberetui si tali respirandi difficultate: sed excipiat ipsam itram dolorē, capitis grauitas, inextinguibilis dormiendi incertitudo,

Inueniunt pul-  
sum quod, et  
crisis hanc  
venit hanc  
quæ sit

Sanguinis fluxus  
signum proflu-  
uii quæ præ-  
cedit

Præcordiorū do-  
lor, signum est  
quoniam fluxus  
de naribus, et  
signum est  
in parte vultus

Signum præ-  
cordiorū præ-  
cordiorū, si  
signum est  
signum est  
signum est

Menstruas præ-  
cordiorū, et  
signum est  
signum est  
signum est

Crisis & ab-  
cessus, si  
signum est  
signum est

Natura ipsam  
indicationem  
tamen esse  
sufficientem,  
ad  
crisis modum  
intelligendum.  
Item morbi  
per excretionem,  
et durior  
per abcessum,  
magis solentur

Item quando  
expletur fluxus

Biliosus humor  
vehementer mo-  
tus, rigorem fa-  
cit.

Sudores cricis,  
quid sit expe-  
ctando sunt.

Vndosus pulsus  
nūciat sudores.  
Pulsus cricis  
excretionem  
significat.  
Pulsus magis  
per purgationes  
san-  
guinis fluxus  
naribus.

furditatis. Huic siquidem in glandulosis post aures partibus, necesse est abscessum oriri. At si morbus fuerit in veteratibus, neque vltimum ex his signis affuerit, sed in ægroto ex locis interioribus vel graustis, vel tenuis, vel æ incensum, vel dolor aliquis apparuerit, huic abscessus ad partes inferiores est expectandus.

### GALENI PERGAMENTI de præcognitione lib. vms.

#### CAPVT I.



Videtur fieri nequeat, ut que in singulis morbis sunt euentura ægris, præcognoscatur, quamplurimi medicorum autem, et clariſſime Epigenes.

Postquam enim multos reperire est non in Medicina modo, sed etiam in ceteris artibus, qui apparere, quam esse, maluit: si quid in disciplinis inter optimis, negligi cepit: contra exquiri ea, et quibus vltimo plurimi fiant: dicere iniqua & agere in alienam gratiam, adulari, diuites & primarios ciues manere officio sissime saturare, committi postmodum, domumque reducere: cunctantibus insuper satelliitum instigare, scurrasque agere. Atque hunc est orta cõmunis illa omnium artium infelicitas, que nostra ætate interit. Nam quod quidem ad medicam professionem pertinet, si quando aliquis medicorum qui recte applicat artem, aliquod symptoma ægroto affore prædixerit, tarum quiddam & mōstrosū ipsū vulgo videtur: tantumque abest, ut admirationi sit, qui hoc prædixerit, ut etiam bene secū in aggreſſus, ni vel vltimū postorē aliquem advenſent. Iam verō aliorū medicorū in videri adeo grandem in se concubant, ut ab eis tandem circūveniat veneno (quo illi præcipue insidiant solent) aut pro splendide eruditionis sue præmio, cõgatur in exitum abire: id quod olim fuit Quinæ passus, qui cum Romanis medicis, multis nominibus antecelleret, Roma tamē est pulsus, idque falso quod prædicat: quod ægroto perderet. Quare multi in ceteris viri, prauitate, qua licet nostra ætas detestetur, exploratū habentes, et quibus frequenter hominū, ceu a valida quadam tempestate & procella, in solitudinis salutarem portū sese recipiunt.

Atque erunt profecto hi multitudini ignoti: ceterum non & amici primū & maxime diu immortalibus deinde viris quoque optimis. \* Quinetiam vitam tranquillam agent, sinēteque versutos illos esse apud vulgus admirationi. Porro dicitur & præpotentium mollitudo, malorum omnium esse causa videtur: qui voluptatibus præferentes virtutem, eos quoque nihil faciunt, qui que verē bona sunt, norant, et alios docere possunt: sed potius totos sese iis dedant, qui voluptatem cõstant, hos diantiosos admirantur, hos evēniant sublimē, adeo ut salutorū & aurigarū imagines inter deorum simulacra erectas videas. Viros autē etiam ceteris suscipiunt, quatenus totū opus indigent. Geometria igitur & arithmetica, ea dumtaxat ratione in præcio sunt, quod ad supputandas sumptuum rationes, aut domos extruendas, vltimū ferunt. Astronomia verō & divinatoria, ad præcendendas hereditates videntur. Musica, quatenus oblectare potest audiri. Philosophia

autē harū omnium domus, & demonstratio disciplinā, omnino negligit: nisi quando rhetoribus sophistica arte, instrumento sanē maligno, uti in oratione est animus. Haec in medicina disciplina necessarii illum vltimū tantummodo spectant, neque hunc satis exasperat, sed, ut Plaro quodam ait, si quidem pueri & infantes, de medicis & coquis ferre iudicium debeant, non parum proculdubio coquis medico præferetur.

#### CAPVT II.

Cum igitur primū Romam veni, horum omnium ignarus, nihilque eiusmodi suspicatus, studui non equidem ex solis verbis, sed ex operibus ipsis, & moribus curando, & futura præcognoscendo, omnibus innoteſcere, quovis mihi tandem eveniret: per paulo ante dicebam. Etenim tunc in Eudemo Peripatetico mirē quartanam febrem ab aliis ignoratam prædiximus: qua quidem ubi se manifeste correptum sensit, in eum miris laudibus exultavit, ceu in conſectando pulvis, ad modum consummatum. Nam antea in sola philosophia me credebat præcellere, medicinam verō obiter attingisse: tamen non ignoraret patrem meum apertis infomus admonitū, ex professo me ipsam medicinam docuisse. Cum igitur ceteris medicis videretur, ut summo mane eius diei, in quo febris invasura erat, Eudemus Theriacē biberet, ipse, ubi illi alierant, rogavit me, coquid mihi spei in pharmaciū foret. At ego nihil cunctatus, respondi, pharmacum non modō nihil prædixi altariū, sed potius ex simplicibus quartana duplicem effecturū. Eam quippe illius medicamenti vim esse, ut vitiosis saccos adhuc crudos moueret, & ad perturbationē perducere valeret: conſequere autem, aut per halitum digere, nequeat, præsertim inente iam hyeme. Nec verō aliter conſigiti, si ego ei affirmaram.

Nam postridie summo mane accedentes medici, propinquant illi Theriacem, & ex vna & simplici, ordine singula exposuerunt. Aderat enim forte quadam, si qui in urbe Roma dignitate & eruditione erant celebres: ut puta Sergius, & Paulus, qui paulo post prætor creatus: Flavius quoque, & ipse vir consularis, & Aristotelice disciplinæ studiosus: præterea Boethus, & Barbarus (erat enim hic Lucii Imperatoris aunculus, qui tunc Mesopota miræ prætorū gerebat) cum ipsis Seuerus etiam vir consularis, & Aristotelice disciplinæ addictus. Dein verō, postea ex tribus illis quartanis, quam di singula solvenda essent, prædicarem, quemadmodum etiam earum potius prædixerat, non modō ex prædictione ipsā (que ad votū successit) sed ex curatione etiam insignē gloriā mihi consecutus. Atque inde prima mihi invidiæ origo exiit, quoniam & ob artem operis, & ob vix integritatem, & ob administrationis consilium. Porro ad Epigenes medicus, vltimū ex Quinæ discipulis, qui mirum in modum me irriterat quod Eudemon, tres & sexaginta annos natum, triplici afflicto quartana, hyemēque media, curandū susceperat, parum abuit quin postea, ubi vidit eventum recte, obrueretur terra. At Martianus calliniari cepit

Cognovimus multos præfatos de vltimis, quosdam pueri & infantes ferri in decem debiles.

Galenus Eudemum Peripatetice afflicti febrem quartanam prædixit.

Galenus infomus admonitū, ex professo me ipsam medicinam docuisse.

Theriacē postea quatuordecim annos, conſequere autem, aut per halitum digere, nequeat, præsertim inente iam hyeme.

Barbarus Lucii Imperatoris aunculus.

Galenus biberet Eudemus a tribus quartanis.

Galenus Flavianus, Aristotelis discipulus.

Martianus.

veras praedictiones, eam non ex Medica disciplina, sed ex diuinatoria quapiam arte profectas.

## CAPVT III.

Cognoui autem atque praedixi Eudemo, crissim illius quartanae triplicis certa quadā nocte futurū, ex pulsu ipso. Siquidem arteriarū morus plurimū se efferebat in alrū, secundum vtrūq; dimensionē: quod numrū cōtingere solet, cum natura infestans succos & corpore excernere nititur. Rescensens igitur illi omnia ea, quae ceteras excretiones praenunciant: excretionis verō eius quae per diectionē fit alui, nullas neq; proprias, neque efficaces esse notas asserens: tandem quia nullus ex ceteris excretionibus signa tūc apparebant, dixi alui profuuiū esse expectandū. Cuius rei successum vbi vidit philosophus, iam nō solita moderatione, sed clamans dicebat omnibus, En amici, Pythias Apollo per os Galeni vult, nō sanitate modō agria, sed diem etiā variari, in qua omnino sint liberandi. Ipse em̄ oportuno vfu Theriacis medicinis quantis afflicto, in sanitate asseruit, quas ex intermissione illius exhibitione incideram: nec quicquid praeterit, quin omnia vni praedixerat, euenerunt.

## CAPVT IIII.

Cūm verō apud Eudemū conquerer de illa animi prauitate, quam medicis ineffe videbam, qui in vrbe Roma clari habebantur: Nolim, inquit ille, persuasum sit tibi, viros natura probos, cūm in hanc vrbe venerint, malos aliqua ex parte fieri: ceterū qui iam antea prauo animo extiterant, cūm hic & negotiorū materia abvident, mercesq; multo amplior, quā in aliis vrbibus, vndiq; allicitas eos, cernantq; quotidie multos si bi ditari similes, multiplices actiones eorum accuratē imitari contendunt: itaq; multis de causis ad summam illam improbitatem deveniunt. Quod si forte improbi ab aliquo deprehendantur, habent alios in tanta vrbe quos adoriantur, ut, vtpote suorum morum ignaros. Vnde maxime fit, vt eadem semper perpetrare flagitia possint. Qui verō paruas ciuitates incolunt, capi lacri magnitudine nequeunt: tum quales sint, facilius a suis concubus dignoscuntur: nec si quid delinquit vel minimum, crimen ipsum ita callide operire norunt. Contrā eventus ius qui hic degunt. Nam quae improbi agunt, plurimos latent, vnde in tanta illa malitia facili augefcit. Et enim ignorant atq; imparatis imponere est facile. His audina, me breui Roma discedere iam constituisse respondi, vt quamcūctissime fieri posset, illorum declinarem improbitatem. Ad hac ille: Non rescinere, inquit, hoc decreuissē te. Quāquam si rescissent, cūm ipsi asiduo meorū soleant, eadem de te quoq; suspicarentur. Quem admodum enim ipso, in doctū pariter atque inopem, ideo vrbe hanc petiuit, quod in patria vitam agere nequeat (Ius enim quae committunt quotidie, illuc diu latere possent) alios etiā eadem de causa huc cōstare existimant, nec nisi pecunia onustos, abituros sperant. Cūm hac & alia multa dixisset, adiecit postremū, veneno quoq; mihi molituros insidias, vbi ad nocendū alia via deesset. Sic quippe innocentem quandam in arte maxime exercitatum, vna cum duobus fa-

milis, fuisse ab ipsis extinctum. Ad haec ego: Quatnā pbi ago praceptor longē charissimē, quod mihi adeo exquisitē, canctā quae ad eorū improbitatē pertinent, enarraueris. Ego enim posthac milia cauebo sedulo, tum ipsis cedens, tum insciam ipsorū dissimulans: atq; ex hac vrbe maxima, populiq; frequentia admirabilē, in parvū & paucorū ciuium cōcedam, & in qua omnes invicem nouimus, genus, eruditionē, mores, rem familiārē, acdemū omnem vitae rationē cuius vniuscuiusq;. Haec cūm ira facere decreuissē, insciam eorū & improbitatē redarguere destini. Restitui tamē interum praeter cōplures alios, tum Charilampis familiārē, tum Diomedem rhetorē in sandalario, morbo diuturno afflictum. Quae omnia, digna magna laude sunt visa. Quare me omnes magnopere suscipiebāt atq; venerabatur: magnūq; vbiq; erat Galeni nomen. At velut indes gloria, sic pari quoq; passu augebatur inuidia.

## CAPVT V.

Eo tempore Flauus Boëthius, vir consularis, summus virtutis amator, atq; discendi avidus, petuit a me, vt nōnulla ex dissectionibus, hoc est, quae ratione vox cōformetur, animantisq; respirant, exponerem. In quem vsum herdos atq; porcellos nō paucos iam comparauerat. Siquidem non hac modō animalia, sed & pedestria ferē vniuersa, eandem earum partū structurā sortiuntur. Ad illud igitur spectaculum omnes sunt conuocati quicunque Romae vel in Medicina, vel in Philosophia clari habebantur. Inter ceteros autem aderat Adrianus rhetor, qui nondum causas & cutabat, sed adhuc cum Boëthio familiariter vivebat. Aderat & Demetrius Faurini amicus, necnon Alexander Damascenus, Boëthi praceptor, ad cōtradicendum promptus. Cūm itaq; multis diebus haberetur conuentus, monstraui primū, inspirationem thoracis eleuatione fieri: depressione verō, expirationē. Dein musculos quibus attollitur, & nervos qui ex spinali medulla procedunt, ostendi. Præterea, quod spiritus, si absq; violentia foras feratur, tacitam facit expirationē: cūm verō vi multa, strepentem atq; sonoram, quam enīam efflationē vocamus. Monstraui insuper, aërem solum, dum efflatur, ac circa gurguris eunti a cartilagine corporibus repercutitur, vocem efficere. Cartilagines verō ipsas a musculis, musculos a nervis moueri: qui si absq; iudiciū, aut excipiuntur vinculo, animal metum redditur. Quae omnia Boëthius per notatiorē cursum cōferibi iussit, eorum cōmentaria apud se habere percipiens.

## CAPVT VI.

Iam verō rogatus interea sum, vt mulierem quandam inuiderem, quae noctes integras insonnes ducebat, ac subinde de cubitus formam permutans, sese in lectulo huc & illuc iacebat. Quā quidem cūm febre omnīq; affectu corporis vacare perspicere, hinc illā Pyladis cuiusdam amorē detentam cognoui, quod eius nominē audito, non vultus illi modō permurabatur, sed pulsus etiā cōtrahēbatur sibi omnimodam iniquitatem, vt qui satis perturbatū animū indicaret. Eiusmodi nāq; pulsus in iis inuenias, quib. rem arduū aggressurus fluctuat animus. Nec dissimili

Galeni postula  
remittit.

Galeno degen  
to Rome, & cum  
gloria, ex aqua  
augebatur na  
medo.  
Rome habi  
tans.

Adrianus Rhe  
tor.  
Demetrius.

Inspirationem  
fieri dilatato  
thorace.  
Expiratione fit  
thoracis depressio.  
Expiratione tacti  
ta, & iussu, quomodo flit.  
Efflatu quid.  
Aer solum efficit  
vocem.  
Nervi mouent  
largius muscu  
los, si absq; iudici  
tur, nec excipi  
antur vinculo,  
moris animal  
reddunt.

Galeni qua  
rentes quomodo  
dam morbo  
Romani ex li  
bidini aggre  
re cogunt.  
Insuper pul  
sus iussu iis  
qui faciem illi  
quod maxime  
fuit aggre  
ssus.

Galeni qua  
rentes quomodo  
dam morbo  
Romani ex li  
bidini aggre  
re cogunt.

Galeni oppor  
tuno Theriacis  
vfu, a quantita  
te triplicis labor  
vni Eudemū.

Roma olim Me  
dicorum huc  
multa stipen  
diis infelices, mul  
ti maior mer  
cedem atq; splend  
ore propo  
nunt.

In pauca impo  
rante est facile.

quoque ratione deitis cuiusdam æconomum, nō morbo, sed morore cōfici debenda, quōd vniuersis administrationis, ad quam cogebatur, rationē reddere pro dignitate non posset. Ex animi enim constatione & amore, pulsus statim evasiant.

## CAPVT VII.

Haud absimili industria Boëthii filium, qui sepius recidebat in morbum, animas verti, ob eduliz, quibus clam explebatur, id ipsum perpeti.

## CAPVT VIII.

Cū autē Boëthii vxor laboraret muliebri profluvio, cui supervenit postea grandis in vētre tumor, tractareturq; ab obstericibus, perinde ac si prægnans esset, cōgit vt in prima balnei domo, grauisimus dolor suberit eam invaderet. Ab eo verō aquosæ humiditatis vim ad eō grandem excrevit, vt animo protinus linqueretur. Igitur clam more mulierularū auditō, insilio acturū, cāmq; in vinas excipiens, nardino vnguento eo ventris periculi: iussiq; altantibus, vt partūs officiis, hæc manus conciliaret, illa pedes, alie bene olentia naribus admovent. Atq; ita sanē celerim illam restitui. Erāt autē interficandum quæ spectabat ad ventris regionem, admodum mollia & præhumida. Fuit porro visum medicis vniuersis, qui illuc confluximus, optimū fore, si immodicā illam humidū affectus sobolem exciteremus, ita tamē vt curatio nō per siccantia tantum, sed quæ exalfacere simul possent, procederet. In maris itaq; arena, & quidē exalfacta, eam reclinauimus. Talem autem ipse illi victum institui, vt q̄minimo pora vteretur: frictiōesq; & vinctiōes vniuersis admovent corpori, quæ solo melle cōstaret: primū quidem elixato q̄primē, dein iussit fontanæ per artem aquæ, refrigerato. Sicvī verō superfluas humiditates per cutim cōmodissimē digeri iudicauit & ad vestiam, per eā quæ vrinæ proritant, deduci, & per alium deici. Atq; hæc quidem diebus septem ad vacationē illa magna, sumus experti. Postea vero, vbi mihi soli Boëthius vxorem suam permisit pro arbitrio meo tractandam: primū quidem aquam ducentē medicam entro illam curavi. Dein propinavi illi, asari, apion decoctū. His duobus diebus petactis, cū nihil iam profluvium apparet, rursum de tertia modicū quippiā ex medicamento alui purgante exhibui. Post hæc diebus singulis melle illeui, corpūq; perfricui, ex molissimo primū lincto, postmodū ex asperimo.

victus interim, vel ex carnibus mon tanarū autū erat, vel ex fixatilibus piscibus. Quibus per dies quindecim petactis, cū ne minima quidem affectus nota extaret, præcaendi modū postulavit Boëthius. Mense demū exactō, cū adeo bene colorata foret, vt distaret nihil a naturali habitu, quadringentos auros mihi dono dedit.

## CAPVT IX.

Cæteri invidi apud illos insignes medicos nō parum Boëthius auxit, magnificē de me prædicans. Itaq; sibi in animo erat, de me loqui apud Imperatorem M. Aureliū Antoninū, qui tunc Romæ agebat. Nam Lucius vrbe aberat, ad Parthiciū bellum cōpescendum. Dum hæc sūt, bellicos tumultus in patria sedatos audio: quare ita-

tim Roma digredior, simulans me proficisci in Campaniā. Primū itaq; Capuī peti, dein Brundisium, vt ibi nauim quæ Dirrachium, mox in Græciam transueheret, expectarem: metuens ne quis ex vrbis primatibus, aut ipse quoq; Imperator, vbi discessum recessisset meū, missus qui me prosequerentur milibus, Romæ quasi fugitiuū reducerent. Postero deniq; die, Casopolim appuli. Non multo post, cū Lucius Romæ reuersus esset, alterū bellum, quod cum Germanis est gestum, innotuit habuit. Cū itaq; mox vrbe exissent, bellum aggressuri, Aquileæ, vt delectus haberent, & copias cogerent, hyemare placuit. Interim ad me mittunt, qui imperet, vt illō me conferam. Cū verō Lucius hyeme media migrasset ad superos, frater caduere Romam asportato, & lustris mortuorū peractis, apparatū in Germanos susceper, meq; insequi iussit. Quod autē vir probus & benignus foret, facile persuaderi potuit, vt me Romæ dimitteret, cū præsertim breui reditus videretur. Igitur toto expeditionis illius tempore, finis memor insire præstantium medicorū, tum philosophorum, qui Romæ agebant, optimū iudicavi ab eis secedere, modō in hunc, modō in illum locum: idq; cōmodum ipsius filium secutus, qui sub Pitholao educabatur. Nam huic Imperator Antoninus iusserat, vt si quādo puer egrotaret, curam mihi illius cōmitteret. Cū verō vltra opinionem protraheretur bellum Germanicū, scripti interim multa, partim ad rem medicā spectantia, partim ad philosophicam. Quæ omnia post Imperatoris reditum, amicis estagitantibus tradidi, persuasus nemini alteri ea esse legenda. Nam si vel minimū suspicatus fuisset in manus indignorū ea peruentura, profectō nec iis dedissem.

## CAPVT X.

At verō Sextus Antonini filius, acutissima febre detinebatur, adeo vt septimam diem citra iudicationem pertransire non posset. Scpe nauq; irritata crisis eam diem prævenit, quæ tū morbum erat iudicatura: id quod Sexto evenire posset, quarta die cognoram: rēmq; omnē Pitholao prædixeram, affirmans morbum septimā diem pertransire non posse, sed sexta vel septima die asuturam iraq; Quod si sexta, morbum omnino reuersurum prædixi: sin septima, crisiū habiturum firmissimam, cāmque omnino perfudores. Postquam igitur sexta die, quod prædixeram modo, morbus iudicatus est, rursus de cimaginta illum febris invasit. Interrogante verō Claudio Severo, ecquid de recidiva illa sperarem: respondi (quod & Sexto & Pitholao paulō antē dixeram) accessione illam post triduum habiturū suū finem, assuturūq; sudorem post decimū septimū diem, ad secundam noctis horam: quod præfagium ne tantū illū quidem fesselit.

## CAPVT XI.

Credidit etiam aliquod ipse Imperator, nec minus Medici qui peregrinationis suæ comites fuerant, initium febris accessionis sibi adesse. Ascitus sum itaq; & ego, atq; in palatio cubare iussus. Venit autem primis facibus quidam missus ab Impatore, quin os vocavit. Igitur cū ex tribus medicis qui manē ipsam inviserant, duo

Pulsu variari  
in perturbatione  
animi.

Boëthii vxorem  
laborantē iussit  
cautius videri,  
quia ratione ro-  
puitur Galenū  
aut.

Boëthii vxorē  
qualem vultu  
rationem inspi-  
tauit Galenū.

Boëthii vxorem  
quæ ratione cu-  
raretur Galenū  
laborantē pro-  
fluvio muliebri

Boëthius ab ro-  
puitam vxorē  
quadringentis  
auro Galenū  
donavit.

Galenū vi-  
sisse Romæ in  
pente Marco  
Aurelio Anto-  
nino.

Galenū in pa-  
triam redire.

Lucij interitus.

Marci Aurēlii  
elementis Galenū  
iussit. Claudius si-  
quibatur in t-  
telia Galenū,  
dū Marcus Au-  
relius infestabat  
bellum Germani-  
cū.

Crisis, dum im-  
itatur, prævenit  
decursu dū.

Galenū Sextus  
Antoninus sibi  
prædictū quod  
dam horam dū  
recedam ut  
h.

duo pulsus tetigissent, ambobus pariter visum est febrem iam ad venturam. Vbi verò me quoque pulsus cōterere iussisset, quidem bona quadam fortunas talis natura exquisitissimum nactus, pensitans omnibus, habiturique cum eratis, tum naturæ ipsius ratione, ac semotum pulsuum sentiens, qui accessu non principia significare solent, me nū tale suspicari doli: sed potius ab assumpto cibo stomachi angorem quendam sentire. Ille verò quantum agnitionem hanc faceret significavit, ut iterum repens, ita et vtdicia: Profecto id ipsum: Vt dixisti res habet. Nam si frigidiori alimento grauius me lenno. Quid igitur (subiunxit) oportet me facere? Cui sic respondi: Si quando in quemvis alium ita affectum incidido, vinum inieciō pipere propinare consuevi. Quia verò medici in regibus, securissimis medicamentis vtuntur, satis erit lanam calidam nardino imbutam, ori ventris apponere. Consiueuerat et ipse, si quando & venter malè haberet, ex purpurea lana vnguem nardinū calidum applicare. Quare Pitholao, vt hoc faceret, imperaui, nosq; dimiseret. Dum autē vnguentū venter applicuisset, pedesq; incalauisset, calidis manibus perficam, Sabinum vinum cum pipere bibet: dixitq; Pitholao, eo epoto. Singularem sanè medicum nacti sumus, cūq; valde ingenuum. Nec de me loqui cessabat, & medicum præstantissimū esse affirmās, & singularem philosophum.

## CAPVT XII.

At Cōmodus aliquando ē palæstra reuersas, octaua hora prius cibum caperet, febre admodum calida correptus est. Cū igitur pulsus tetigissent, particulam ipsius quam p̄ phlegmone laborare sensi: neque id iniuria: quippe fauces habebat maxime rubrēt & asperas, quas etiam gargarizante ex rhoe & melle magis exasperauerat, iussit itaq; vt pro eo, mulsam sumeret, rosam incoctā: qua per noctem, & insequentem diem, & quæ huc successit noctem, crebrō vteretur. Tercio die manē phlegmone omnis sedata erat, & puer quasi febre liber. Suasi itaq; Pitholao, vt ipsum in balneo duceret, ac postea cum viliu consueto recideret. Quod contitulum tamen Ania, Faustina cognatione coniuncta, non vsq; adeo probauit: vt quæ diametro methodicorū faueret. Porro Faustina me ipsum prehensum manu ducebat, irridens quemdam methodicū, eiq; dicens: Quāto opere præstet doctrina huius Galeni, vestra, modō satis apparuit. Nam cū puer regius, absente patre, vehementi febre per biduum detineretur, non vtiq; passus est ( vt vobis placet) octauam horam incunam ipsum & fordium expectare, sed & mane lauit, & cibū dedit. Cui quidem incensuræ curram, ipse valedicens, subiunxit: Multo magis exolam reddidisti me apud hosce medicos, q̄ Imperatrix. Igitur affectum corporis agnitio, speculatione investigatur: ex cognitione verò exquirit affectuū, tutorum præcognitio colligitur.

## CAPVT XIII.

Iam verò, cū semel in quodam ægro, qui quintum morbi diem agebat, vniuersi medici fecare venam, & rectē quidem, dederant: ipse pressus submouit, si paululum cunctaremur, na-

turam ipsam per se moliturā sanguinis evacuationēq; per dextrā narem. Etenim æger ipse, cū perinde ac si fugere vellet exiliret ē lecto, interrogatus qua de causa id faceret, respondit, videre se rubrā, anguē proserpentē ē recto. Ad hinc dextrā narem ad genū vsq; cernebam esse rubore magno perfusam, qd sans firmū esse solet in illi quum, quod illac sit erupurus sanguis. Vbi igitur ægrum vidi, quasi nares scalperet, digitū in ipsas immittere, ac postea sangumolenum extrahere, iussit vt vas subderetur (iam n. effluebat sanguis) subiunxitq; vacationē eam fore vehementē. Vires siquidē valide erant, necdō morbus crudus, quibus sanē causis immodice vacationes solēt succedere. Cū itaq; ad quatuor libearū & dimidie pondus, sanguis iam cōfluxisset, tunc resupinum ægrū statim, iussit vt frigidam poscam naribus exueret: frontiq; spongiam frigida posca madentem apposui, artib; deuixi. Verū cū neq; his profectus impetum possem suppressere, affixa demum dextro hypocondrio cucurbitula, fluorem statim compescui.

## CAPVT XIII.

Cū verò æconomus quidam incidisset in morbum, sortēq; eius cura aliis quibuscūq; medicis demandata, crism in septima per sudores habuit. Postidie autē cū pulsus eius tetigissent, vbi intermitteētē sentire, malignū quēpiā affectum delitescere suspicatus, magnopere sunt decepti. Nam cū me ob eam rem cōsuluissent, perduxissentq; ad ægrum, ipse pulsus eius contritiā, monui vt ad refectionis victum traderent: esse enim rurō & integrē iudicauit. Quippe illam pulsus intermissione, naturalem ipsi, non ex maligno quopiam affectu, existerē: id quod postea fci esse deprehenderit. Vbi enim pulsus vel in vnica tantummodo pulsatione, vel pluribus sibi inuicem subsequētib; vnā comprehēnsus, nū aliud, intermissione illa excepta, præter naturam habere videatur, scire licet, affectum illum ab ortu ipso exiissē.

## GALENI PERGAMENTI

de præfatio ex insomniis sumenda, liber.

**L** Se etiam ex insomniis, corporis dispositionem coniecturis quibuscūq; deprehendere. Si igitur incendium quis per somnum videat, eum itaq; quidem bile infectari significatur. Si verò fumum, aut caliginem, aut profundas tenebras, aut bile grauiatur. Rursum si imbres somniet, in eo frigidam humiditatem redvndare indicatur. Sic qui niuem, qui glaciem, qui grandinem, phlegmatis\* frigidū est plenus. In his autem & tempus, & consuetudo viuendi ratio obseruanda venit. Etenim si nix aliqua conspergi sibi videatur, si quidem id post inuasionē paroxysmi cum horrore, rigore, frigoreq; veniens, somniet, tum plus est temporis, q̄ corporis affectioni tribuendū. Sin verò remittente iam paroxysmo, huiusmodi somnium sese offera, firmiores nobis præbet significationem, frigidus in eo humor prævalere. Quæ certior fuerit, si præterea

Galeni quæ ratione prætorum eadem effectum san-  
guinis fluxum per narem.

Vacationes  
intempestivæ quibus  
causa quæ  
aut facit.

Galeni prætorum  
revelationem ē  
nari dextra, aff-  
fusa coarctata  
la hypocondrio  
dextra, compes-  
cent.

Intermissio in  
pulsu, si in na-  
turali an præ-  
ter naturam,  
quando de-  
gustanda.

Insomnia invol-  
tione loci adfer-  
re ad cognoscen-  
das dispositiones  
corporis, ex  
Galeni variis  
probat.

Galeni fuit  
probatum regni  
ipsius huius.

Naro huius  
affectionis nō  
fuit florum,  
etiam quoniam  
nari medici,  
supradicti, Ga-  
leni.

Vinum cui inieci  
tum fuit pipere,  
vniuersi autem  
in vntucale, d  
frigidiori ali-  
mento vntu-  
cali, nardino  
pulsam, atq;  
in omni appo-  
sita.

Galeni dicit Mar-  
ci Imperatoris  
magistri cam-  
mulatorum.

Commodus mor-  
bus.

Corporis fuit  
et mulla, in  
qua res dicitur  
fuerat, la-  
tis Galeni  
Commodus fuit  
an nixu ex-  
sternat.

Insomnia Galeni  
probatum  
tunc dicitur.

Phlegmatis fuit  
autem ex aff-  
ctu cognoscen-  
te parat.



cibus pituitosis vñs non fuerit: quibus sumptia, leuissimodoloresolent evenire phlasiar, vel si per vñ uerum corpus talis dispositio nō adit. Cūm igitur in somnis quadam cras sibi alterū factū lapideum cerneret, p̄ter omniū op̄inioneē eo crure factus est paralyticus. Palatitū autē qui in ci- sternā quādam sanguinis plena stare sibi erat vi- sus, sanguine ab vñdare cōsecutus, vacationēq; indigere. Quidā crisi instante sudaturi, lauare, ca- ledariūq; aquarū lacus se natare somnabat. Sic inexplēbiliter bibere, visio est sinbundoī homi- num frequens: quemadmodū insatiabiliter ede- re, famelicorū: & veneri indulgere, eorū quibus semen abvñdat. Videtur namq; in somnis anima corporis, p̄sūm dī ingressa, externis relictis sensi- bus, eas quæ corporis sunt, dispositiones senti- re: & omnibus quæ ipsa cupit, tanq̄ iam præsen- tibus, per hanc imaginationē perfrui. Quæ qui- dem animalis vis interdū ad eā multitudinē hu- morū grauat, vt vix mouere se possit, aut gra- uia quædā ferre onera, nōnulli sibi videtur. Ecō- versio quoq; accidit, vt adeo stitilis temperarij cōplexo corporis, vt nunc volare, nunc veloci- simē currere, per in somniū se putet. Sic etiā in vñ nō stercoreq; agere quidā se somniat, q̄ eos nimī- rum, corruptos, fœdōs, putridosq; humores ha- bere, aut intestina stercore opplata, est iudiciū. Cōtrā aliq; in odoratis locis versari se putat, pro- pter diuersam ab illa dispositionē. Quapropter quæ in somniis se facere putant regi, q̄z ipsissimē nobis & ad defectus, & ad excessus, & qualitates deniq; humorum cognoscendas, conducunt.

## GALENI PERGAMENI

quomodo morbum simulantes sint

consequendi, lib. vñus.



Vñ malez sint causæ, quas propter egrorare se homines simulant, vide- tur & in istiusmodi omnibus ventri- tis inuestio ad medicū spectare. Ete- nim phlegmonem, erysipelas, & tu- mores laxos, per pharmaca apposita extrinse- cus, ex industria excitatos, medico ab illa quæ ex ipso corpore, p̄sistuntur, licet discernere: sicut & sanguinē ex oris partib; profluentē, ab eo qui ex stomacho, ventre, organivē spiritalibus pro- venit. Nam deprehēsi sunt quidam, qui sub sinē tussis, quoties vellet, sanguinē excreare: vñula quādā in hoc prius circa gingivas aperta, sicq; cōparata, vt qñ videretur, lingua illā sugētes, sta- timq; post tussientes, sanguinē, quasi ex inferiori- bus reddidit, exqueunt. Sic & delirare nonnulli, desipereq; se & alios, simulauerunt. Fur autē sepe, vt dolor quispit illa simulatur, vt ingēs, serēq; in- tollerabilis esse videatur. Equidē ipse quēdā nō ul, in concione vocatum ā ciuib; , qui postq; id sibi minime ex vñ fore vidisset, propterea q̄ in- teresse nollet, colica se passione torqueri singe- bat: id q̄d ego certis cōiecturis deprehēdi. Nam & remedia respuebat, quibus fuerat aliās eodem in morbo aduersas, & cōcione dimissa, extemplo conuertere desit. Quā & ipsa viuenditatio quæ p̄recesserat, talis erat, vt colicā in eo dispositio- nem gerere nō posset: quomodoquidē ex \* cruditate refrigerationēq; huiuscemodi gigni solent asse-

ctus: quoniam neutrum in illo p̄recesserat. Hoc igitur, q̄ nō ratione anteactū victus, ortus morbus ille esset, potuisse cognoscere, medicū erat experien- tiar opus. Alterū verō istud, q̄ ob cōctionem simu- lare huc illum suspicatus eram, medicūq; p̄ntū non fuerat, sed capitis, & rationis eius, quæ com- munis dicitur, q̄ licet omnibus sit communis, pauci tamē in exactā, p̄fectāq; habent, vt in ve- nire in quoq; negotio possunt, qd faciūdum, dī- cendū ve sit. Experientia igitur medicū si con- iungatur hęc externa facultas, alia quoq; simila singentes, validosq; dolores simulantes, depre- hendere licet. Quemadmodum ipse nuper, cūm vñroq; genu vehemētissimē dolere se pedissi- mus quidam diceret, statim doloris eius fictio- nem deprehendi: ex eo partim suspiciōē sumē, q̄ ad illam fortē diem dominus ex vrbe profecta- rus erat: partim ex adolecenti moribus, qui ra- his esset, vt facili in huiuscemodi mēteretur, q̄m amore mulierulæ cuiusdā flagraret, ob quam in vrbe restare cupiebat. Quocirca per thapsiam ad morū, sibi in genu tumore maximum excitare rat. Ego verō, cūm p̄fecto domino pharvacum impoluissē, qd doctorem quidē nihil leniebat, verūm thapsie solum qualitatē infringidare pote- rat, post horā vñā illam cōstētē habui, nihil am- plius se doloris sentire. Quod & ex phlegmone doloris natus fuisset, nō solum per id infringidū non refecisset, sed etiā redditus fuisset vehemē- tius. Potest verō quæ ex eo, q̄ leuius morbum se- gnat, iudiciū sicut doloris sumere. Accidit enim istud omnino sepe: non ad advertentibus illis q̄ mor- bō vehemētē simulat: quod in alium se, alidūq; habitum, illi qui verē laborant, magnitudinē vi- delicet doloris agitat, p̄sistunt. Præterea si ve- rē morbo vehemēti p̄matur, qd vix perpeti- auxiliū parari sunt, accersuntq; ipsi vñro medi- cos, vt agant qd illis lubet, quō affectus ipse cu- ratur. Sīp verō leuiter, penititū venon dolent, hu- iusmodi auxilia resingūt: neq; longiora ieiunia, neq; mordaciū pharvacorū oblatiōē ferentes. Quæ sola quidē, cūm grauitur se laborare dicūt, huiusmodi dispositio nō, cōferre, nos illis affir- mare oportet: quāciūmodū & sectiōnes, & vñio- nes, & omnis cibi potaq; , cui videmus eos esse obnoxios, abstinēt. Morbū igitur simulantes, & magnitudō doloris arguet, & nosip̄i depre- hendemus, cūm ex aliis multis, tum ex medicina- lis experientie notionibus: in quibus sunt lan- guere, infringidari extrema, trāsire, interdū quo- que frigidū iudare, pulsus inæquales (qui quidē in etiā accidūt, qui medicocriter dolent) pluresq; minorū, q̄ maiorū: & obscurorū, q̄ vehemētū, habere: præterea interrogatō de morbi specie, p̄- curatē affectū mēbri dispositiōē explicare pos- se. Quādā namq; dolores longē latēq; se disten- dentes habet: quædam verō tanq̄ fixos, vñq; tantūm parti inhaerentes. Sic a lix pungunt, pul- sūq; alie quasi diuelliunt: alie quodammodo obstupescere, alie grauari videntur: nonnullæ deniq; vomitus, quædā ventris perturbatiōes, quædam caliginem inferunt.

EPITOMÆ GALENI OPERVM SECTIONIS SECVNDÆ FINIS.

Anima in som- niis, corporis profundum in- gressa, videtur solas corporis dispositio- nes sentire.

Ratio com- m.

Thapsia facit- las.

Doloris fictio- de p̄fecto do- mino sumi- tur.

Simulantes do- lorem quæ ra- tione depre- hendit possunt.

Morbosus sp̄- cius dicitur.

Colici affectus ex cruditate refrigerationēq; huiuscemodi gigni solent asse-

# EPITOMES OMNIUM GALENI OPERV M SECTIO TERTIA.

ILLVSTRISSIMO ET CLEMENTISS. PRINCIPI, COSMO  
MEDICES, TVSCORVM DVCI OPTIMO ET MAXIMO, AN-  
dreas Lacuna Secobiensis, Doctor Medicus, miles Sancti Petri, S. D.



**P**rimani corporis fabricam civitati optimè institutæ esse similem, diuinus ille Plato profes-  
sus est, clementissime Princeps: neq; id iniuria. Nam si constitutionem vtriusq; dispen-  
sationemq; accuratè expendamus, nihil planè reperiemus in ciuitate, quod longè cumu-  
latius absolutiusq; humano etiam non insit corpori. Etenim fortissima quæq; ciuitas, so-  
let esse valido cinctâ muro, quo in cursiones hostium atq; insulas arceantur. Vice muri cuiusdam est  
corpori etiam extima cutis, quæ tuetur ipsum ab iniuriis extrinsecis. Ciuitatem qui volunt in expu-  
gnabilem reddere, minimeq; insidiis obnoxiam, solent semper optimi duces vnam tantum illi por-  
tam amplam relinquere, ex cipiendâ comestibus peruiam: plures autem veluti canales & aquæ du-  
ctus, ad illius expurgandæ excrementa. Similiter etiam natura os vnicum corpori humano imdidit,  
per quod nimirum ingrederentur quidem omnia quæ ad partes eius alendas pertinent: sermo autem  
elideretur, instruendus animis hominum pietate & doctrina, maximè necessarius, ac præterea va-  
rios meatus, per quos excernerentur quæ nõ erant futura ex vfu. Optima quæq; ciuitas, præsertim si  
duratura sit, vnica tantum, sed prudentissimo, iustissimo, & clementissimo debet esse Principi sub-  
dita: quandoquidem Polyarchia semper fuit seditioni opportuna. Princeps autem ipse à ciuium com-  
mercio abstractus, à fidijs stipulatoribus custoditus, in sublimiori fortiori, vrbis parte se cõtinere, vt  
illinc, veluti ex quadam specula, vniuersos ciues suos contueri, & si quæ coniuratio oriatur, eam sa-  
cile restinguere possit. Non aliter, dubio procul, ratio ipsa in homine, quæ reliquarum omnium facul-  
tatum est imperatrix, in cerebro, sublimiori corporis parte, veluti in arce quadam cõsistens, membris  
vniuersis sibi subditis imperat, eisq; viuendi leges imponit. Eius autem stipatores, ac veluti incorru-  
pti quidam satellites, sensus exteriores existunt: qui nunquam nõ facientes & excubias, explorant quæ  
singula, quæ aut rationi ipsi, aut cuiuspiam subiectorum illi membrorum, obesse aliqua ex parte possint,  
quicquid tandem perceperint, æclutum sensui cõmuni renunciant: qui ceu duæ quidam, ipsi rationi  
coniunctus, illis præfectus est. Iam verò vt Principibus adsunt nonnulli viri à secretis, quos in ex-  
pediendis negociis magna sollicitudine liberant: sic adest rationi memoria, vniuersa quæ illi occur-  
rant, si alicuius ponderis sint, quamfide libere afferuans: eaq; dum occasio postulat, subitò, veluti ex  
promptuario quodam, suppeditans. Solent habere Principes & pace & bello, milites quosdam sa-  
cramentarios, tum ad repellendâs iniurias extrinsecas, tum ad continendos in obsequio & fide ipsos  
animos ciuium. Non secus profectò diuinus ille architectus noster, rationi vni irascibilem, à Plato-  
ne Dupondia vocatam, adiunxit: vt si quando ratio immeritò ab aliquo infestaretur, confestim hæc  
excandescens, illi ferret manus auxiliatrices, omnemq; vim propulsaret. Collocauit autè natura hanc  
ipsam, quæ irascimur, facultatè, in cordè: vt media exquisitè esset inter rationem atq; cupiditates, quæ  
in iocundior sitæ, atq; illinc varias excursions facientes, ad modum seditiose existunt, rationisq; plurimū  
negocij facessunt. Quocirca inter ipsas & vim irascibilem, natura etiam vallam quoddam firmissi-  
mum, diaphragma nempe, interiecit, ne videlicet imparatam illæ iracundiam opprimerent, insur-  
gentesq; postea contra rationem, arcem illius expugnarent. Reperiuntur in ciuitate opificia hominū  
varia: cum alijs, oratio exempli, conficiant panes: alijs culinaria exerceant: alijs petrimenta omnia ex-  
purgent: alijs deniq; diuersas merces per totam vrbem in cõmunem vsum traducit. An nõ etiam in  
corpore humano ventriculus cibos concoquit, hepar sanguinem gignit, melancholicum succum ex-  
purat, lien, vesica vrbisq; vniuersam, vniuersum corporis habitū (veluti bauli quidam) sanguinem  
copiosissimū riuant, arteriæ vitalem spiritū, ac breuiter, nerui animalcm, qui autor est motus & sen-  
sus? Corporis itaq; nostri harmonia ciuitatis optimam refert constitutionem: imò verò respublice, ciui-  
tatisq; vniuersæ, ad exemplum corporis humani sunt conditæ, cum arti natura ipsa tempore & di-  
gnitate antecellat. Quemadmodum iouitur si in aliqua ciuitatè princeps quidem, vt par est, domi-  
tur: ceteri autè omnes, militesq; eius decretis audiunt: atq; vniquisq; opifex suo rectè fungatur mu-  
nere, salus reipublice constat: labefactatur verò, si cõtraria accidant: sic etiam quandiu in nostro cor-  
pusculo ratio ipsa gesserit habenas imperij, affectus autè omnes atq; cupiditates obtemperauerint: sim-



nas alias secatur. Siquidem eorū que superfluit, nōnulla planē sunt ex genere naturali: vt si cui se xus adnascatur dignus: nōnulla verō toto gene re præter naturam: veluti si in ventre gignantur vermes, aut in vesica lapis. Similiter deficientiū particularum, nōnulla quidem penitus abolire sunt, nōnulla verō ex dimidio præcisæ: vt rursus, autē, aut natura, aut morbo. Ex his tamen, quæcunq; functionem impediunt, eadem ratione in morborū genere cōntrahunt. Quæcūq; verō partem aliquam operationi dicant, vel refrigerit, vel non satis et alimēti transmittit, causæ morborum dicuntur. Quædam tamen & morbi, & morborū causæ censentur: vt si quæcūq; radici- bus præciderat. Nam & vocem perturbat, & pectus & pulmōnem refrigerat. In magnitudine etiam varij morbi contingunt: vbi scilicet totum corpus, vel pars aliqua, aut in prima generatio- ne, aut ob aliquem affectum præter naturam, vel prodigiosam contrahit molem, vel præter modum est imminuta. Qui morbi in deprauata cōpositura consistunt, varias differētiās sortiunt. Alij quidem sunt, vbi naturalis partū situs variatur: alij vbi ligamenta nēis soluantur, ac relaxantur: alij vbi illa impensè faciunt stricta. Quippe immōdica lingue vincula, loquēdi mō- dendiq; impediūt functionē: pudendorū verō, abaveriū neq;atū, impedimento sunt, quo mi- nus procul rectius excutatur semen. Reliqui autē est quintū ægritudinis genus, nempe vna- tis solutio, quæ tam similibus q̃ dissimilibus partibus accidere potest. Nam si in manu (grana exēpli) neruus aliquis præciderat omnino, talis solutio erit cōmuni & toti instrumenti. & ipsi præcisæ particule, quod si nō integrè, sed aliqua ex parte præcisus fuerit, solui nerui præpria iudicatur affectio, instrumentū verō nequaq; nisi ex accipiente. Sed pro differētia particularū, continui solutio varia fit nomina vendicat. Siquidē quæ in osse sit, ab omnibus fractura vocat. Quæ verō in carne cōtingit, vlcus, vulnus, atq; ruptu- ra. Quæ nervosis particulis accidit, cōvulsio no- minati cōsensu. Diximus itaq; simpliciu differētiis morborū super est autē nunc, vt ad cōpositio- nis dignotionē veniamus. Erit igitur iuxta hæresim priore in particula similari morbus cōpositus, dum illius, hi quidē adstringuntur, hi ve- hō relaxantur, marces. At iuxta eos, qui elemēta esse alterationi obiecta cōtendunt, quatuor nu- mero cōpositi morbi censentur: nempe calidus simul & humidus, calidus simul & siccus, frigi- dus iuxta & humidus, frigidus atq; siccus: dum vtraque videlicet qualitas excellit plus q̃ nature cōgenat. Quod si enī qualitatibus illis plus iusto auctus, accedat pariter humorū affluxus, toti- dem morbi nascuntur, differētes nimirū ab illis, qui in vadit sine humorū colluue. Similiter sola- tis cōnui miscetur morbis cōpositis secundum vnam & alterā sectam, necnō simplicibus, quo- rum a principio mentionem fecimus. Porro om- nes inflammationes simul & exacerbat particule, tres quidē necessariū nōnūq; quatuor morbos parantur. Vno autē impræmentū in inflam- mationem, rubentē renitentiūq; tumorē, & qui do- lem intulit. Quia verō omnes terē id genus tu-

mores, mutuo inter se cōmiserunt, rariū repe- rire aliquē ipsorū purū atq; fructū licet, necesse- riō dicendum est, erysipelas, hæcitem, carbun- culum, cancerum, atq; alios id genus tumores, ef- se cōpositas ægritudines. E quibus carbuncu- lus quidem semper cum vlcere invadit, cetera ve- rō interdum citra vlcus infestant. Gignitur autē erysipelas a rufa bile, ab atra cancer, inflammatio a sanguine, a pituita deniq; edema, existens tu- mor laxus & cedens. Qui humores tamen spe- cie sint humidi, potentia tamen nō omnes humi- di sunt. Quippe atra bilis sicca est & frigida: fla- va, calida & sicca, vt pituita, frigida & humida: ac sanguis deniq; humidus simul & calidus. Igitur de morbis cōpositis similibus particulatū dictū nobis cum sit, ad eos qui in instrumenta discedit, sermone iam convertamur. Propriū dissimilariū partium dicemus morbi cōpositi, qui plures atq; diuersas partes simul afflixerint: ex accedenti au- tem, qui vnicam tantum instrumentorū particu- lam occupauerint. Etenim si lippitudine obli- deatur tunica in cumbēs corneæ, cum lippitudo quidem sit inflammatio ipsius partis, inflammatio autem omnis existat cōpositus morbus, nemini dubitū est, lippitudinē futurā etiā morbum cō- positum, tunica quidē ipsi propriū, ex accedente verō vniuersū instrumentū. Ceterum si per vlcus, fissurā, ac deniq; angulorum cōactū simul ipsius oculum perforauerit, constitutio talis totius oculi dicitur ægritudo cōposita, cum nimirū vno eodēq; tempore diuersæ particule contri- bentur. Nihil autem refert, si diuersa, vnicam esse cōpositam ægritudinem, an plures, sed in di- uersis partibus constituta.

## GAL. DE DIFFERENTIIS MORBORUM LIB.



Vnc verō ad morborum qui secun- dum sectā generosiorē partes simi- les invadit, causas discūdas nos cōvertamus, idq; ad calore immode- rato auspici. Vniuersa corpora plus æquo incalecere solēt, vel ex morbo impro- bo, vel ex putredine, vel ex cōmuni alterius cor- poris fermentatione, vel ex attritione, vel ex ali- mēto ad accendēdū caliditate accommodato. Cete- rum vbi q̃ immodica exercitatio vltus fuerit, si calor inde ortus non occupauerit totum cor- pus, lassitudinē tantum inducit, videlicet articu- lorum & musculorū, ad q̃s præcipue mouendi munus spectat. Si verō extēditur per vniuersum corpus, febrem accendit. Ex ita enī, quæ calorū iuxta cor, est veluti quidā feruor, vbi si per totum corpus diffunditur, solet febris succedat. Num- r̃q; enī præter naturā, vbi humores putrescent, calor interdum cordi sensim communicat, ac de- niq; excitat febrē. Quare hic venit intelligēda se- cunda & tertia causa calorū præter naturā. Nam ex putredine & ob vicinā partē cōrumpentis, ex in tumor febris calor accendit. Quarta spe- cies tamen consistebat in attritione, & quidem meritis. Nam si ob attritam cutem cohibeantur diffusi ex, quæ prius diffusi cōfluuerāt, si qdem fuliginosa fuerint, in specus cordis conuersa, eos exstunt, protinusq; febrem accendunt. Calido-

Carbunculus in vadit semper cum vlcere.

Tumor non præter naturā sed humores tribuitur.

Humor qui non quod sit præcisus.

Dissimilariū partium morbi cōpositi, qui sunt dicuntur.

Lippitudo est inflammatio tunicae cōvulsio corneæ.

Quædam præcisæ perturbationes, quæcūq; radices præciderat, perturbat, & pectus & pulmōnem refrigerat. Morbi in magnitudine.

Morbi in deprauata cōpositura.

Varietas solutio vniuersæ perturbationis, quæcūq; morbi tumores.

Relatiōnis cōtinentiæ præcisæ de vniuersa pro differētiis partibus.

Similariū morborum cōpositio rum differētiis quatuor, iuxta differētiis partibus elemēta.

Affluxus humorū quatuor differētiis morborum cōpositum. Solutio cōtinentiæ, inflammatio simul & exacerbat particule, quæcūq; morbi similis partibus, inflammationis quid.

Calor cōmodus a quib; accendit accendit huius partibus.

Mouendi munus ad attritam & musculorū partibus. Tra est calor qui vniuersum corpus feruor.

Febris ex attritione quomodo oritur.

rum etiam alimentorum vñus (in eo etiam quintũ genus constituebamus) inter dum febrem accendit: sicut & acuta medicamentũ, siue remedia sint, siue delecteria & contraria. Non autem ex æquo omnes hæc ob causas febricitant: quod nec semper illis cõtingat par quantitas aut æquitas causæ: quodq; animantiũ corpora plurimũ alterum ab altero differant. Etenim ad hoc vt accendatur febris in corpore, oportet vt corpus ipsum sit accommodatũ & habile ad excipiendum febrem caliditatẽ: causa autẽ efficiens existat valida, tempusq; & patientis proximitatẽ formatur, vt vi delucet in actione immoretur diutius, & passivo corpore superior evadat. Porro causæ quæ in corpore humano præter naturã oriuntur, causæ antecedentes vocantur: procatartice verò, siue evidentes, quæ extrinsecus advenientes occurrunt. Frigiditas etiã plurimũ existunt causæ, veluti frigidorũ propinquitat, alimentorũ quantitas atq; qualitas, adfrictio etiã atq; laxatio, oculi deniq; & motus immo deratus, quibus ex occasione constat etiã ipsum ignẽ extinguiri. Prima igitur species causæ occurrunt extrinsecus, siue contactu ipso, siue etiã potentia, solet frigiditas morbi inducere. Ob secundam verò, nempe ob frigidiora alimenta, nonnullos correptos vidimus attonito aut epileptico morbo, aut alio quopiam modo refrigeratos: id qd ex ebrietate vel maxime accidere solet. Quandũ vini modicũ hauitũ, cum familiare alimentũ sit, minus calorem

causa: sic etiam & rarefactio, vbi plus q̃ ex vñũ sit dissipat dispergitq; natium calorem, frigidus efficitur corpus. At verò perinde ac adfrictio ipsa interdum vniuerso corpori, nonnunq; alicuius parti accidere solet: eodem etiam modo habet & rarefactio. Porro quæ extrinsecus admoventur, partem ipsam raram vel consipatã reddere possunt. At vincula arctissima, & vitæ membrũ priuant, & ipsum impense refrigerant. Sed iam de sicca affectibus oportum est vt dicamus. Si quis multo magis distetur, q̃ pro modo alimentũ assumptũ, vitanq; cibis siccioribus, facile in siccam ægritudinẽ delabatur: præsertim si curis & anxietatibus, necnõ vigiliis torquetur. Sicca etiã tẽperies aeris, balnea quæ dehectã vim obtinent, necnõ medicamenta, quæ intrus & foris administrata, exsiccat possident facultatẽ, similiter corpora exsiccant. Humidorũ morborũ omnes sunt causæ cõtrariæ: nempe maxima ciborũ humectantiũ colluuiis, molluscũ viuendi ratio, animi summa tranquillitas, ac deniq; balnea rum dulciũ vñus immo deratus, maximeq; post cibũ. Ad idem facit desidiosa vitæ, pluriarum copia, humida temporis cõstrunctio, ac breuiter, humectantia medicamenta. Iam verò causæ cõpositorum morborum, similiter cõpositi sunt. Si n. calida simul & sicca in vñum aliquod cõspiret, calidus simul & siccus sequetur morbus. Indẽ est cogitandum & in aliis combinatiõibus. At sæpius causæ naturæ similes, corpus ipsum immutat. Pleurigi tamen viribus pugnant cõtrariis, ita vt aliquod cõtingat corpus simul fieri calidum atq; frigidum, siccũ & siccum & humidum, plus quid naturæ cõueniat, etiãsi minime id fieri possẽ videatur: quæ inæqualis intẽperies vocatur. Advertendum autẽ est rursus, corpora ipsa interdum à solis qualitatib; alterari, quandoq; etiã ab illis qdẽ, sed accedẽte aliquo affluxu, humidũ qdẽ specie, facultate verò non item. Flaua siquidem bilis potestate est calida & sicca: atra, sicca & frigida: sanguis, humidus atq; calidus: pituita deniq; frigida & humida. Quorum humorum singula, interdum synceri & puri, interdum invicẽ misti, solent in imbecilliorẽ partẽ cõfluere: ob idq; sumores partium variatur. Etenim cum quatuor sint facultates, quib; quælibet pars tum animalis, tum plantæ, prædita est: attractrix, retentrix, alterantrix, expultrix: excrementum omne aut qualitate, aut quantitate ostendat: nec sit par robur oĩm particularum: semper quæfortior est, excrementum vñũ ad imbecilliorẽ ppetit. Omnium autẽ imbecillissima est cutis, totius corporis excrementa recipiens. Assignari iam causas morborum singularium particularium, ad organicos deinceps nos conuertamus, exordium à formatione vñatũ sumẽtes. E variant enim interdum naturalis figura, dum ob maximã materię colluuiẽ, aut ob qualitatem in cõmodo, impedito seminis motu, in vterõ deprauatur ipsius sortus formatio. Secundò autẽ potest vitari alicuius particulæ forma, dum in facies nõ rectẽ ab obstrictibus excipiuntur (facile siquidẽ pervertuntur, molles fluxilesq; cum sint) aut ruditer in voluntum fasciis, aut lac tabe factum signant, aut perpetim educitur, siue inopia victus ratione, siue exercitius intemperitiis.

Ee ij

Pulvis cum vino  
mixtus ex æ  
quo emittitur.

Pulvis gignens  
de quæ requiritur.

Causæ anteceden  
tes dicitur, quæ  
in corpore oriuntur:  
vi præcatartice, quæ  
advenientes extrinsecus.

Apoplexia vnde  
dicitur, quod  
interdum est  
vniuersa, quod  
est in parte.

Vinum modicũ  
hauitũ, cum  
familiaribus  
alimentiis sit,  
minus calorem  
auget.

Arteriarum in  
terceptiones itam  
vocem eripere.  
Igitur cordis  
calor, per meatũ  
gutturis cum  
ambiente hõis  
aerẽ cõmmerciũ  
habet.

Arteriarum  
superficies  
superficialis  
est.

Rarefactio quæ  
raram reddit.

Admota extrinsecus  
causa.

Sicca intemperies  
causa.

Humida intemperies  
causa.

Compositorum  
morborum causa  
cõposita sunt.

Cõtrariis inter  
se pugnantibus  
corpus simul  
poteat fieri  
calidum & frigidum.

Humorũ singula  
seperant.

Tamen partium  
varietate præ  
ter naturam  
fieri solent.

Excrementum  
omne qualitate  
aut quantitate  
ostendit.

Forma vñatũ  
seminis in vterõ  
deprauatur.

Forma vñatũ  
seminis in vterõ  
deprauatur.





*Symptoma est quod sequitur morbum.*  
*Symptoma largi principis quod sit.*

*Symptoma a passione movetur quo diffinitur.*

*Symptoma proprium delicti, ad complexum.*

*Alimentum laesum est duplex, altera ad naturalem functionem pertinet, alia animalis ad complexum.*  
*Sensibile animalis functionis est quod complexum.*

*Motus functionis variatur per instrumentum diversitate.*  
*Gubernatrix anima functionis est duplex, sensibile alia non laborat in motu per instrumentum.*

*Tactus quidem reliquos sensus, multo gravius efficitur, tantum reliquos in tactu, ab exterioribus sensibus non ab internis, sed ab exterioribus affectibus, in functionibus suis consistantur ac ne id quidem per se, sed ex accidenti, quod videlicet in se habeat facultatem tangendi. Est enim tactus omnibus sensoriis sensus quidem communis reliqui vero quatuor, seu quisque tantum est proprius.*

*Quamobrem oculi sepius graui dolore cruciantur, committitur sensui tangendi. At vero vigiliis & ventris, sunt triplex communis sensus symptoma. Mortis facilius triplex reperitur symptoma immobilitatis, diminutus motus, ac denique depravatus. Ceteri depravatus motus, alius tremulus est, alius convulsivus, alius palpi-*

actionem. Porro quod morbus veluti umbra sequitur, id morbi symptoma vocatur: quemadmodum functionis lesio. Est autem symptoma large sumptum, omnis a naturali statu mutatio: ob idque quicquid animalis præter naturam accidit, ea significatione est symptoma. Quamobrem morbus quoad tenens etiam symptoma dicitur, si cum de causa præter naturam. Dicitur autem a passione symptoma (tamen interdu in idem coeant) quia passio quidem omnino in motu verificetur, sitque interdu secundum naturam: symptoma vero non in motu tantum, sed in habitu etiam & permanentia esse possit, omnino præter naturam. A morbo vero differt, quoniam neque affectus necessarius est, neque actionem ex necessitate laedit: quæ sanæ ad conservandum morbus desideratur. Porro symptoma proprie strictèque sumpta (de quibus agere est animus) differentia triplici continentur. Alia quidem nostri corporis sunt affectus, alia functionis lesiones, alia ambo hæc comitantur. Vt sunt extremitatum immobilitas cum extremitatibus, tum suppreSSIONES. Ceteri sub actionis lesione, privatio quoque nihil inaudiat, quemadmodum immobilitatis, insensibilitatis, atque cruditas: quæ quidem actionis lesiones sunt. Hæc igitur symptomatum differentias deinceps examinemus, ab actionis lesione auspicamur. Actionis lesio duplex est: altera enim ad analem, altera vero ad naturalem functionem pertinet. Actiones siquidem duplices potissimum numerantur, naturales videlicet & animales. Rursus animalis dividitur in sensibilem, motuam atque gubernatricem. Quorum membrorum singula rursus in alia seclitur. Sensibile quippe animæ functio, quinque differentias sortitur, viuum scilicet, olfactum, gustum, auditum, atque tactum. Motus autem facultas, cum viuum instrumentum habeat, vnum tantum habet motionis modum: variatur tamen per particulari instrumentorum diversitate. Ultima functio animæ, quam diximus esse gubernatricem, in imaginatricem, ratiocinatricem, ac denique memoratricem dividitur. Igitur noxæ omnium sententiæ, communes quidem universalesque sunt, insensibilitas, & difficultas sensus: particularis autem, quæ in singulis sensibus reperitur: quemadmodum in oculis cæcitas: & caligo: in auribus sorditas & hebetatio: atque in aliis similitur, ubi videlicet actio abolita est, aut depravata, aut diminuta. Ceteri tactus in actione sua, quæ reliqui sensus, multo gravius symptoma, cum ab extrinsecus occurrantibus, tum vel maxime ab affectibus interioribus, solet recipere. Etenim alij sensus non ab internis, sed ab exterioribus affectibus, in functionibus suis consistantur ac ne id quidem per se, sed ex accidenti, quod videlicet in se habeat facultatem tangendi. Est enim tactus omnibus sensoriis sensus quidem communis reliqui vero quatuor, seu quisque tantum est proprius. Quamobrem oculi sepius graui dolore cruciantur, committitur sensui tangendi. At vero vigiliis & ventris, sunt triplex communis sensus symptoma. Mortis facilius triplex reperitur symptoma immobilitatis, diminutus motus, ac denique depravatus. Ceteri depravatus motus, alius tremulus est, alius convulsivus, alius palpi-

rans, alius denique vibrans. Porro si convellatur vnum verum corpus, animæque princeps potestas simul sit impedita, id symptoma epilepsia vocatur: apoplexia autem, dum totius corporis perit omnino motus, simulque principes actiones colubentur. Hæc itaque motuam actionem sunt vitia. Proximè est, ut gubernatricis functionem in officium tradamus, ac primò imaginatricis. Hæc enim interdum tota corrumpitur exolutique, quemadmodum in cataplexi: interdum aliter vitatur, ut in delirio: est cum deficit atque debilitatur, quod in lethargo contingit. Sic etiam ratiocinatio, nunc exolutur penitus, ipsūque symptoma est amentia: nunc deficit atque remittitur, vocaturque id symptoma fatuitas: nunc lesitur ac depravatur, quod symptoma vocat delirium. Plerumque siquidem in vitio simul consistit delictum, tum parum probe imaginis, tum parum apte ratiocinatio. Est quod duntaxat in altero. Interdum quippe ratio vitatur, imaginatio hinc lesitur atque memoria illæsa. Quemadmodum etiam ratiocinatio integra, contingit tum imaginatione, tum memoriæ vitari. Quod autem in memorandi potentia consistant vitia, nemini opinor obicium. De animalium itaque actionum symptomata dictum nobis cum sit, ad naturalium symptomata examinanda nos convertamus. Methodus autem eorum in veniendum est, naturalium facultatum cognitio: in quarum singulis duplex reperitur symptoma, alterum abolire functionis, alterum ad rite obire: quod quidem hoc est duplex: alterum quod in diminuta, alterum quod in vitata actione consistit. Exemplum autem ponamus in excoctione ventriculi: quæ interdum quidem tota corrumpitur, interdum remittitur ob imbecillitatem, interdum vitatur. Quorum primū symptoma dicitur pyrosis: secundum, excoctionis tarditas: tertium pravitas & vitia vocatur. Præter appetitricis functionis symptomata sunt, abolita appetentia, & immodica cibi cupiditas. Circa nutritionis actionem, si copiam minime atigerit, atrophia & phthisis accidunt. Vitiatam vero nutritionem sequuntur, leuce, ophiacia, alopecia, & reliqua id genus symptomata. Cum igitur naturales facultates sint quatuor, attractrix, retentrix, alteratrix, expultrix, sanè in singulis naturalibus organis, quatenus naturalia sunt, duo de ceteri omni possunt symptomata tribus videlicet in vnaqueque facultate obgestum animalibus verò, quiddecim. Quod si animale instrumentum simul & monendi & sentiendi vires obtineat, duo de viginti symptomatum formas habere poterit. Ventriculus igitur duodecim sortitur symptomata, quatenus est excoctionis organum: totidemque quatenus pars similis: quæ nutriti desiderat. Siquidem omnes particule quæ nutrimentum suscipiunt, duodecim recipiunt symptomata: nempe tria (ut diximus) secundum singulas facultates, ubi videlicet aut nihil trahunt, aut languide, aut vitiose: ubi id ad attractum est, aut non retinet, aut languide, aut vitiose: ubi id iam retinuerunt, aut penitus crudum relinquunt, aut diminutè concoquunt, aut in alienam qualitatem convertunt: ubi excrementa ipsa expellere nequeunt, aut languide, aut perperam: hoc est, citius aut tardius, quam animali expediat. Ex quibus

*Motus depravatus, epilepsia quod, apoplexia.*

*Imaginatrix functionis symptoma.*

*Ratiocinatrix functionis symptoma, amentia quod, fatuitas, delirium.*

*Ratiocinatio interdu vitatur, ad imaginem, cum memoriæ laesum, ut videtur.*

*Naturalium facultatum singula duplex est vitia, nempe excoctio, abolita functionis, & vitia obita.*

*Ventriculi alia sunt symptomata, tria, videlicet, abolita appetentia, immodica cibi cupiditas.*

*Appetrix functionis symptoma, malum.*

*Retentrix functionis symptoma, malum.*

*Alteratrix functionis symptoma, malum.*

*Expultrix functionis symptoma, malum.*

*Animalis instrumentum quatuordecim recipiunt symptomata.*

*Similiter particule nutrimentum suscipiunt, duodecim recipiunt symptomata.*

*Similiter particule nutrimentum suscipiunt, duodecim recipiunt symptomata.*

*Similiter particule nutrimentum suscipiunt, duodecim recipiunt symptomata.*

*Similiter particule nutrimentum suscipiunt, duodecim recipiunt symptomata.*

vitij accidit, particulas non nutriti, aut imbecilliter, aut perperam & vitiose. Quod verò in facultatibus similariū particularū dicimus, id enī intelligendū est in his quæ ad instrumentales spe-  
 10 tiant. Porro alteratix facultatis in ventre nunc abolita censetur, vbi cibus talis relinquatur, qualis assumptus est. Imbecilla autē dicitur, quæ tardè concoctioē absoluit: sicut deprauata, quæ in malignam qualitatē cibos ipsos permutat. At absoluta concoctio dicitur, vbi cibus in qualitate  
 20 animi familiarē mutatur. Animā vertendum tamen hoc loco magnopere est, alteri symptomati alterū nōn nō succedere. Siquidē insu-  
 30 ptum cōplectendi tēpus, cōtinuō sequitur dimi-  
 40 nuta cōcoctio. Præterea celeris dīeetionis cibo-  
 50 rum inseparabilia symptomata sunt, excremen-  
 60 torum humiditas, alimentij per corpus immi-  
 70 nuta digestio. Corruptelā cibi sequitur necessariū  
 80 quidem excrementorū factor, nō necessariū ve-  
 90 rō, mordicatio & inflatio. Atq; horū sanē omniū  
 100 iam dictorū symptomatū, quæ in actione obli-  
 110 sa consistunt, sicuti & aliorū duorum generum,  
 120 scēdum est morbos causas existerē. Symptoma-  
 130 tum quæ in corporum cōsistunt affēctibus, pri-  
 140 mæ differentiæ sunt quatuor. Siquidem alia ad  
 150 visum, alia ad odoratū, alia ad gustū, alia deniq;  
 160 ad tactum pertinent. Entem quæ ad visum spe-  
 170 ctant, ex suis quæ cōsistunt in colore præter natu-  
 180 ram, siue in vniuersum corpus occupet, vt in  
 190 arcuans: siue aliquā eius partem, vt in carbuiculis.  
 200 At quæ pertinent ad odoratū, etiam in respiratu  
 210 ac perspiratu deprehenduntur: vt si (gratia ex-  
 220 pli) quod indies expirat ē corpore, siue per arte-  
 230 riam asperā, siue per vniuersā cutim, grauē  
 240 lens ac putre sentiatur. In gustu autē symptoma-  
 250 ta sunt, omnes saporē qui egriū præter solitū ac-  
 260 cidunt: vt si alienas qualitatē percipere sibi vi-  
 270 deantur. Tangibiles differentiæ sunt, vbi et quæ  
 280 subiungunt tactū, genūiū mutantur constitu-  
 290 tionē: vt si cūne quæ antea erat mollis, deprehen-  
 300 datur dura, rigidāq; aut ē conuersio. Cūm igitur  
 310 omne quod naturale est, ex cōmoda temperatu-  
 320 ra nascatur: vitij id quod præter naturā exiit,  
 330 ex aliqua intēperie oriētur. Quobrem cūm hæc  
 340 omnia quæ diximus, prorsū præter naturā sint,  
 350 meritō intēperies ferunt accepta. At qui in-  
 360 temperies omnis est morbus: ergo liquidō consti-  
 370 tat, hæc quatuor symptomatū differentiæ, à mor-  
 380 bis generationē cōstrahere. Quæ verō vel excer-  
 390 nuntur à corpore, vel retinentur in eo præter natu-  
 400 rā (hæc enim ad tertiiū pertinebant genus sym-  
 410 ptomatū) aut tota quidem substantiā, aut quali-  
 420 tatibus tantū, aut deniq; quantitātibus, à natu-  
 430 ræ ordine digrediantur. Atq; ipsa etiā vel immed-  
 440 iatè sequuntur morbos, vel mediātè intercidē-  
 450 tibus scilicet symptomatibus aliis. Jam verō hæ-  
 460 morrhagia, quod ad excrētā substantiā perti-  
 470 net, toto est genere præter naturā, siq; aut ap-  
 480 erto vasis osculo, aut rupto vase, aut eroso. Entem  
 490 yulnus, rupera, erosio, propriū similitudinū partiū  
 500 sunt morbi: at apertio osculorū, ad instrumenta  
 510 pertinet. Accidit enim interdum ipse sanguinis  
 520 suor ob retenticiū facultatis infirmitatē: inter-  
 530 dum quia expulsiue immōdie mouet: nōnūq;  
 540 ob vitiosā functionis uocam. Sic fit etiā mulie-

bre profusio, aut ob dictarū functionū sympto-  
 10 ma, aut quia sanguis est nimis serosus atq; sub-  
 20 tils redditus. Sciendū tamen est, nihil eorū quæ  
 30 tempestiue, hoc est, ad animalis cōmodū, circa  
 40 corpus cōtingunt, quā si toto genere præter na-  
 50 turam sint, verē dici symptomata (quale vitij est)  
 60 quod sequitur morbum, atq; in læsione actionis  
 70 cōsistit: cūm nimirū vnumquodq; eorū sit ele-  
 80 gans & absolutū opus nature, tametiā ad alterū  
 90 symptomatiū genus, nempe ad affectū præter  
 100 naturā, reduci possit: vt si sanguis per nāres, aut  
 110 hæmorrhoidas, commodē erumpat.

## GALENI PERGAMENI

de symptomatum causis, lib. I.



N sensili actione triplex symptomati-  
 10 genus deprehenditur. Vnū, cūm  
 20 primū sensus instrumentū quippiā  
 30 perpeffum est: alterū, cūm sentiendi  
 40 potentia: tertū, cūm instrumentū  
 50 primo sensus instrumentū partium aliqua suū  
 60 affecta. vt, in oculo primū sentiendi instrumentū  
 70 est crystalloides humor, qui à coloribus altera-  
 80 tur. Vt sentiendi est quæ à cerebro per ner-  
 90 uum opticū, qui solus manifestum habet for-  
 100 amen, in ipsum descendente, procedat. Illius verō  
 110 gratia create sunt reliquæ omnes oculi partes.  
 120 Quicquid igitur ex enumeratis sit ipsum, animal  
 130 vel malè vel nihil omnino videbit. Solet crystalli-  
 140 nus humor oculo intēperatus à natura modo  
 150 ducere. At facultas visoria offenditur, vel ner-  
 160 uo affecto vel cerebro. Hæc aut, quærens simi-  
 170 lia sunt, oculo morborū generib. cōstitūtū: qua-  
 180 tenus instrumentalia, tū ob strictionē, tum aliarū  
 190 rerū innixū, atq; adeo diuortio cōtinui, qd quidē  
 200 tam similibus, qd ipsū instrumentū semper  
 210 adest cōmune. Jam verō si crystalloides humor  
 220 perueratur ad alterū angulorū, haud ita notatū  
 230 digna succedere noxa: sin verō vel ad superiora,  
 240 vel ad inferiora declinet, tū quicquid cernitur, di-  
 250 plum esse videtur. Illa porro quæ ex visu sunt pri-  
 260 mo instrumento, variis modis etiā cōtingit læ-  
 270 di: vitiosa si albugineus humor, spiritūse, q an-  
 280 te crystalloidē locatur, vsque adeo copiosus sit,  
 290 vt visioriam facultatem impediāt: aut similiter si  
 300 foramen rhagoidis vel relaxetur, vel coarctetur,  
 310 magis q expediat visionē: aut si in aliquā diuella-  
 320 tur partē, aut deniq; sit rumpatur. Cæterum rela-  
 330 xatio illius, siue ab ortu sit, siue postea præter na-  
 340 turam accellerit, semper visus in cōmodat: aditri-  
 350 ctio autē & immunitio, si quidē à naturatate con-  
 360 tracta fuerit, acutissima visionis est causa: sin ve-  
 370 rō ex morbo talis coarctatio conigerit, visionē  
 380 impedit manifestè: idq; nō quatenus coarctatio  
 390 est, sed quatenus à peluimū causis in ducta. At re-  
 400 liquorū fructus, siue à primo ortu, siue postea  
 410 quis genitus est, acciderit, visioni, in cōmodū no-  
 420 ratū dignū adferre potest. Entem vbi alterū o-  
 430 culum claudimus, dilatat alterius pupillā: q spi-  
 440 ritus antea amobus particulāim distributus,  
 450 vniuersus in vnū cōstat. Idcirco quibus iussu  
 460 altero oculo clauso pupilla clarior apparet, si spe-  
 470 rare debent fore aliquādo, vt visum, punctione  
 480 facta, recuperent. Quibus autem nō dilatatū,  
 490 q omni spe recuperādi visus sunt destituti. Vnde  
 500 liquidō

Symptomata  
 100 dicit non debita  
 110 quæ tempestiue  
 120 atq; ad animalis  
 130 cōmodū circa  
 140 corpus cōtingunt,  
 150 vel si toto  
 160 genere præter  
 170 naturam sint.

Scitūdo est  
 100 triplex sympto-  
 110 matū genus in  
 120 oculo aduen-  
 130 tiū.

Crystallinus  
 100 humor est pri-  
 110 mum sentiendi  
 120 organum.  
 130 Opticus nervus  
 140 solus est cōmu-  
 150 nicans foramen.

Crystallinus  
 100 humor oculo of-  
 110 fendit sicut in-  
 120 ternum primum.  
 130 Visoria facultas  
 140 offenditur, vel  
 150 nervo affec-  
 160 to, vel cerebro.  
 170 Solus autem  
 180 cōmunicans  
 190 nervus morbum  
 200 instrumentū  
 210 partium, opti-  
 220 cum partem.  
 230 Crystallinus hu-  
 240 mor siue foras  
 250 aut deorsum  
 260 peruerit, vnde  
 270 illa videtur  
 280 dupla.

Pupilla foras  
 100 non relaxata  
 110 semper non in-  
 120 cōmodat: cōtra-  
 130 ctio autē si quidē  
 140 à natura sit,  
 150 acutissima vi-  
 160 sionis est causa:  
 170 si verō à mor-  
 180 bo producta, la-  
 190 det visum.  
 200 Oculo altero  
 210 clauso prius di-  
 220 latior alterius  
 230 pupilla.  
 240 Iussu autē  
 250 quibus iussu  
 260 altero oculo  
 270 clauso pupilla  
 280 clarior apparet,  
 290 si sperare  
 300 debent fore  
 310 aliquādo, vt  
 320 visum, puncti-  
 330 one facta, re-  
 340 cuperent.

Alteratix fa-  
 100 cultatis veteris  
 110 loquendo abo-  
 120 lita & depraua-  
 130 ta dicitur.

Symptoma v-  
 100 num fecerit  
 110 alteri.  
 120 Dīeetionem ci-  
 130 borum celerem  
 140 quæ sequitur,  
 150 Corruptelā ci-  
 160 borum quæ se-  
 170 quatur.  
 180 Morbi, quorum  
 190 sint causæ sym-  
 200 ptomatū.

Symptomatum  
 100 quæ in corporis  
 110 cōsistunt affē-  
 120 ctibus, primæ  
 130 differentiæ sūt  
 140 quadruplex.

Naturalis em-  
 100 tas ex cōmoda  
 110 temperatu-  
 120 ra nascitur.

Intemperies  
 100 omnis est mor-  
 110 bus.

Hæmorrhagia  
 100 quævis modis  
 110 fit.

liquidò cōstat, spiritum aliq̃ animalē acerebro demitti ad oculos. Si igitur pupillæ amplior fuerit, spiritus implere illā nō potest: quare diffundi ipsum, dissolui, dissipari est necesse. Si verò angustior, cogitur & cōstringitur, ac densior fit spiritus. At coactūs spiritus cōstricūsus, ad faciendū semel conduci plurimum. E diverso distolutus dissipatusq̃, leniēdi difficultatē inducit. Est autē albugineus humor veluti p̃pugnaculum crystallini, cuius etiā nonnulli essentiaū vident. Quisobrem si imminuat̃ quodammodo, ipse crystallinus arescit, ac super ipsum rhagoides tunica corrugatur & cōcidit, sic vt visio ipsa oblectatur: nimirū externo lumine p̃ exiguū mediū humoris crystallini occurrente. Si verò instrumentum visionis, citra rediū tolerare splendore nō potest: ob idq̃ rhagoides tunica illi est obiecta, nigra existens simul atq̃ corulea, quibus colorib. oculis potissimum recreatur, que insistenti splendor. Verum cōtractio pupillæ, quā admodum amplitudo, si q̃dem ab humiditate superfusa trahat orū, facilem: sin verò si siccitate quadā inexpectabili, desperatā curanonē fortitur. Porro si rhagoides tunica ita sua cōnstricte soluitur, vt tenuis ille humor probatur ad exteriora, maximē visio labe factatur. Ad hæc, si humor ille albugineus seipso crassior fit redditus, exactā cernendi, aciem multo obfuscorē reddit. Quod si plurimum aucta sit crassitudo, visum omnino prohibebit. At si non totum foramen d cōtento ibi crasso corpore obtenebretur, sed relinquitur eius aliqua particula pura, videre licebit, per illā cernenda res, idq̃ nihil deterius q̃ antea: sed vnam quamlibet follā. At si in pupillæ centro exigua consistat suffusio, nāreint̃q̃ partes que in circuitu sunt, parē: quæ si sunt affectū, quicquid spiciant, id vbi fenestratum putant. Vbi verò humor inter corā albidem atq̃ rhagoidem medius, propriū colore mutatur, si quidem ad fuscum declinet, arbitrabitur quis se per nebulā, vel per fumum etiā videre. Sin alio quouis colore inficiatur, huius quoq̃ imaginem, ea quæ spectantur, referent. Præterea, quibus adeo absoluta est cernendi facultas, vni nūmquam quidem visibile constātere possūt, si va pores d ventriculū: sursum iterantur, hōz symptomata suffusioni similia infestabūt. In vniuersum autem, vel parua, vel magna symptomata accedent, pro ipsius magnitudine affectus. Cui spiritus animalis simul & multus fuerit, & æthereus, is, res quæ porro distant, & videre, & discernere potest. Cui verò paucus q̃dem fuerit, sed purus, is vt res propinquas planē discernit, sic distantes haudquāq̃ videt. Quod si humidior simul fuerit & multus, res distantes videt quidem, sed nō ad vnguem discernit: quædammodum cui humidior simul fuerit & exiguus, is neq̃ exactē, neq̃ porro videre pōt. Ceratoidis tunice pars illa quæ pupillæ est obiecta, si crassior densiorq̃ fit, aciem hebetem reddit. Si verò humidior densiorq̃ fuerit, nō modo reddit visum obtusum, sed etiā efficit, vt quis sic est affectus, putet se p̃ tenebras, aut nebulā, aut vaporem, aliquid, aut per fumum, res ipsas cernere. At si humoris nō multitudine, sed colore peccauerint, secundum eiusdem coloris naturam ipsa cæcotentia obonetur. Proinde

qui morbo regio laborant, quicquid vident, id pallere arbitrantur. Quibus autem cæcatoidis pars insigniter vlcera est, aut vulnerata visque adeo, vt ipsum vulnus ad interiora pertingat, q̃ magna ex parte obcæcantur. Vidi ramen quidē puerum, cui iuxta pupillam punctus iussit stylo, sic vt aquosus humor efflueret, ac tota omnia cornea corrugeretur, visum (incredibile quippe) recuperabile, instauratum scilicet paulatim humore qui per vulnus effluserat. Solius etiā corneæ ipsius corrugatio (qualis senectute confectus solet semper accidere) similiter visum ostendit. Ceterum si pupilla simul sit immutata, scire licet, aquosum quoq̃ humorem immixtum exi stere: sin verò æqualis permanset, ad solā ceratoidem affectus pertinet. Corneæ igitur morbi, si fuerint magni, in totum visionem impediunt: maximē si vel phlegmone, vel suppuratone, vel scirrho (quatenus instrumentū est) inficeretur. In hærens verò membrana phlegmone obiecta, ac accident quōq̃ impedire potest visionē. At chymosis, vnguisq̃, nō ex accidenti, sed primaria ratione pupillā ipsam obfuscant: quemadmodū genarum ingentes tumores præter naturam. Grauis admodum surditasq̃ animi nō evincere solent, aut ob aures partē aliquā, aut ob neruū d cerebro descendē, aut ob cerebrum ipsum, si ea in parte, vide neruus oritur, affectum fugit. Igitur nerui cerebriq̃ offensas in his, haud aliter quā in oculorum affectibus, accidit. Reliquarum verō partium uoxæ, illis ad portionem respondent: verū non omnino similis læsio existit. Partes itaque ad auditum pertinentes, quatenus similes sunt, octo temperaturis vixant, ac præterea solutione continui: quatenus autem insituminales, tum hac, tum obstruccionibus in vaduntur, ob tumorem aliquem præter naturam, aut ob fordem obturantem auditorium meatum.

Cum autem lingua sit duplici facultate prædita, ac per vnam quidem sentiat, per alteram voluntariē moneatur: contingit sanē ipsam aut miuimē sapores percipere, aut deprauatē: idq̃ ob tunice, quæ illam involuit, v. l. corporis ipsius, vel mollium neruorum, vel eius cerebri partis, unde illi exoriuntur, affectum aliquem præter naturam. Etenim deprauata saporum dignosio, vbi lingua alieno quopiam humore fuerit imbuta, euenire consuevit. Nam quemadmodum per suffusiones, ipsa visoris facultas foris videtur es cernere, quæ in oculo apparent: ita & gustandi vis, internam linguæ affectionem rebus sensibilibus tribuit: quemadmodum etiā, vbi sonum aures percipiunt, nulla re extrinsecus obdrepente, sed ipsa circa membranas motionē, phantasmata transmittente. Quod videri spectat ad olfactricem potentiam, odorandi sensusq̃ est principium anteriorū cerebri ventriculorū: inseruit autē nasus odoranti simul & respiratori. Si igitur vel cōfundatur ipse, vel eius obstruatur meatus, idq̃ vel ab humore aliquo, vel a tumore præter naturam, olfactandi facultas vel minus probē odores percipiet, vel eos omnino uō sentiet. Obstruccionis etiam osium colatoriorum, præterea cerebri membranarum, atque adeo illæ quæ in processibus anteriorum cerebri ventri-

inter se putant  
omnia obiecta  
pallere.

Visum recupera-  
tisse puerum,  
cui albugineus  
humor efflue-  
bat, cernendūq̃  
sanum corneæ  
gubatur, Galē  
non videt.

Chymosis,  
Vnguis oculi.

Auditus sym-  
ptomata vnde  
prophiciantur.

Lingua inter  
duplex facit  
tatem, confir-  
tem atque mo-  
nem.

Gustandi rō ob  
quarum par-  
tem afficitur  
corrupta, aut  
viciata potest.

Odorandi sen-  
sus esse prin-  
cipium antero-  
ri cerebri ven-  
triculorum.  
Nasum inserui-  
re odoranti &  
respiratori.

Obstruendi vi-  
dē quibus sicut  
labiis sunt.

Spiritus animalis  
demitti ad oculos  
non.

Spiritus albugi-  
nosus cōstric-  
tus, plurimum ob-  
lectat ad visum fa-  
ciendū: ad dif-  
fusiōnem contrā-  
riū.

Rhagoides tunica  
a visum.

Pupilla con-  
tracta quando  
fuerit, q̃ quare  
de seipso cora-  
pionē incipiat,  
Rhagoides tunica  
non quando vi-  
sionē videntur.  
Obiecta quæ  
de fenestrat a  
videntur.

Obiecta quæ  
de fenestrat a  
videntur.

Videtur planē  
discernere obiecta  
quæ, quibus non  
ingrat.

Ceratoidis tu-  
nica.

culorū oriuntur, ac deniq; insignes dictarū partium tum contrusiones, tum secūsiones, olfactricē vim maximē labefaciūt. Ob intemperiem etiā ipsarū partium, solet fieri olfactus vitiosus. Porro tactus (qui sensus cōmūis est omnibus particulis sensibilibus) varia symptomata recipit in ter quæ annumeratur hæmodia, tum torpor. Est enim hæmodia dentis stupor, qui ob ædior acerbosq; cibos magna ex parte oboritur. Torpor autē in toto corpore cōtingere solet, ex sentiendi mouēdisq; difficultate affectus quidam cōpositus. Qui quidē manifestē videtur tum à refrigeratione, tum à compressione corporū neruolorū, ac deniq; à torpēdinis marini animalis contactu, procedere. Vbi verō citra aliquam huiusmodi causā vltro torpor accidet, tūc vel vitæ ignauiam, vel ciborum multitudine, crassitiem, lentitudinē, aut solite secretionis suppressione antecessisse necesse est. Igitur eius causā cōiunctā, affectus nerui est talis, vt facultatē illi à principe parte missā impedire possit. Atqui impeditur, si neruus meatu aliquo preclusus, vel obtractus sit, vel compressus. Si verō meatū nō habeat, sed vti solis radij per aquam, ætērvē transire, eodē modo facultatē à principio per neruorum corpora permeet, ipsa in transitu prædictur, si ad immo dicam crassitudinē neruis ipse pervenerit: id quod illi cōtingit, aut crassius viscidisq; succis nutritis, aut violēto frigore perfrigerato. Torpescunt etiā nerui, vbi vel laqueo, vel manibus confringuntur: aut extrinsecus à vicinis partib; phlegmone, vel scirrho comprimuntur: aut vbi laxata fractive ossibus sūt artiores. Principio igitur stupidi fiunt, deinde omnino & sensum & motum amittunt: quod vi tum ipsorum, dicitur paralyssi, à torpore solā magnitudine differens. Quod si omnes occupaverit neruos, repetēte vniuersum corpus sensu & motu priuatur, succedēte citissimā morte, q̃ prohibita sit respiratio. Si spinæ principū laceratur, solæ partes capitis, quoad vixerit animas, & sentire & moveri possunt. Si tamē cerebro quoq; noxa ipsa acciderit, qui sic afficiuntur, his omniū partū perit simul & motus & sensus. Vivere autem possunt vtriq; tanto tempore, quanto vivūt n̄ qui præfocati strangulatur. Spina verō in inferiori loco affecta, nempe sub cæli neruū propagine, à quibus thorax artollitur, si quidem ingens fuerit affectus, partes inferiores omnes subitō & sentiendi & mouendi facultate priuatur. Si verō nō ita vehemēs affectus videatur, stuporem inducet. Atq; si sanē mortē effugiūt, quando quidē in ipsis respiratio feruatur. At quibus quinta spinæ vertebra affecta est, corū manus omniū & sensum & motū amittunt. Vox autē omnibus illis perit, quibus ea spinæ pars que in ceruicē sit, fuerit inhiñguitur lesa. Porro qui nerui, dum recte valent, facultatē sentiendi suppeditāt, inde lacerat ipsam si affecti fuerint. Cæterū cūm partes aliquid per quem neruū volūtariē mouentur, per eundē sentiendi quoq; vim habeant, duplex necessariō noxa oritur ex ipsius nerui affectu: quæ altera quidē sensum, altera mortē impedit. In terdū tamē quarundā partū motus voluntarius exoluitur, sensu prorsus illæso: sicuti ē cōverso e-

tiā contingit sensum perire: incolumi functione mouēdi: vt in lingua & oculis planē videre licet, ac breuiter in omnibus partibus, quæ per dueros neruos, hoc est, molles & duros, illas facultates recipiūt. At in quibus mēbris duri duntaxat nerui inveniuntur, per quos vtraq; facultas defertur: ex ipsorum vehemēti læsione functiones ambæ labefaciuntur. Nam si ablata cute subiectus musculus, qui in nudus est, videatur immobilis, sentiā tamē rēgentes, exigui ei accidisse noxā parū dū est: nempe q̃ tantū animalis facultatis partē suscepit, quā ad sensum excitā dū sufficit: ad musculū verō mortū, nō item: quippe tangēdi sensus, pari aliquid potius q̃ agere, deprelinditur: promde ab exigua facultate functio eius perfici potest. At musculorū motus in agēdo, nō in patiendo, actionis efficaciam possidet. Is enim totū corpus transferre debet: quā obrem plurima indiget facultate animalis. Delectatio autē & dolor omnibus accidit sensibus: sed in oculis minus q̃ in cæteris euidenter percipiuntur: in tactu & pultu, facillimē sēdē: ab his deinceps in odoratu: atq; hunc tandem auditus sequitur. Si verō affectio præter naturā violentē affligens incidens, doloris (vt Plato inquit) est causa. Vbi vērō corpus ad naturalem habitum redit, idiq; rursus animi, oboritur voluptas. Porro vehementes veniūt in tactu à naturali habitu transmutationes, ob violentem calidi frigidūq; occursum: atq; ob eas res, quæ cōtundere, secare, extendere, aut erodere possunt. Nam siccat humores, nisi calori frigore iungatur, occursum suo inferre vim minimē cōsueuerunt. Cæterū sectio & ruptio dolo rē infert, nō vbi facta est, nisi fortē ex accidit: a-liquosq; vbi etiam motum sit. Jam instrumentū gū standi, quatenus habet facultatē tangēdi, et iam dictis causis diuellitur: quatenus verō ad gustū propriē pertinet, ab amaris, acidis, acerbis atque acerbis: quandoquidem horū singula continuū diuidere possunt. At ab humoribus acerbis resoluti vapores, vim olfactricem infestant: nam & ipsi continuū diuellunt. Auditū vox turbat aspera, grauis, maximāq; & celeritima: quem admodū omnis violentus strepitus. Visum autē, illustris mi splendor est ostēdit corumpuntq; eō quod nimis dillegent. Palsio itaq; molestia quatenus dictū est, oritur omnibus sensibus solet delectatio autem illi aduersa, à cōtrariis nascitur causis. Etenim vt cæruleus color inacidissimū est oculi spectaculum, ita splendor tardicis, qualis in sole cernitur, maximū ipsis dolorem inferre potest. Post hos secundo loco molestus quidem est color albus, delectat verō fuscus: nam ille visificam essentia dissoluit, hic eam cogit citra violētiam. Color siquidē niger hoc nomine visionis essentia aduersatur, q̃ cogit ipsam violentus, quim vt eam reducat ad naturalem habitū. Cæterū id quod nigrum est, si splendissimū minus visum offendit, quia crassiori cōstat substantia, ob idiq; minus efficaciter agit: cūm nimirum omnis res tenuis crassam acubatur superet. Sic igitur sol valde tenuis cūm sit, protinus visum dissolat. Quare si quis diu in dēssimis tenebris versatus fuerit, postea luci restitutus, occidabitur si quodāmodo. Merito itaq; cæruleus color,

vt vilio-

Tactus inest omnibus sensibilibus. Hæmodia vero de prepressione. Torpor affectus cōpositus, à quibus causis oriens solent.

Nerui ipsi sentiri non possunt, præter autem motum, Galenus habet.

Paralyssi à torpore sola magnitudine differt.

Spina quinta vertebra affecta, sensum motum, Vox quibus perit. Materiam quarundam partium voluntariis exoluitur, sensu prorsus illæso: sicuti ē cōverso e-

Tactus pars in dēssimis partibus quædam est. Tangēdi facultas est ab eo quæ facultates perficit possit. Materie cūm plurima facultatis indiget. Delectatio & dolor quibus sensibus maxime, q̃ quibus minor adit. Doloris causa. Voluptas quæ de facit.

Dolorem non facit, nec humores, nisi calori frigore iungatur, occursum suo inferre vim minimē cōsueuerunt.

Costandi sensum à quibus non afficitur. Olfactum acerbis vaporibus infestant. Auditum quæ turbant. Visum quæ offēdunt.

Cæruleus color est optatissimus oculis.

Niger color quæ ratione visum aduersatur.

Tenuis res omnis, crassam acubatur superet. Sic igitur sol valde tenuis cūm sit, protinus visum dissolat. Quare si quis diu in dēssimis tenebris versatus fuerit, postea luci restitutus, occidabitur si quodāmodo. Merito itaq; cæruleus color,

vt visioni iucundissimus est, ita maximā quoque  
præbet utilitatē: sed nō illi, quæ a sole disculsa fue-  
rit. Hinc enim vtpote iam exaratis, contrarium  
remedium (videlicet color niger) est adhibendus,  
qui verò quæ sana, sed fatigata est, color caruleus,  
fulvique, saluberrima spectacula existunt. Porro  
fuscus color, ex albo nigroque contemperatis na-  
scitur: caruleus verò, vbi candor splendori iun-  
ctus, non ita parum in nigrum degenerat. Medi-  
quidem moderatius colores (vtrinq; Plato  
ex contrariis invicem confusis oriuntur. In audi-  
tu verò nō male affecto, vt iucundissima vox cen-  
setur, quæ & lenissima & tardissima est: ita asper-  
tina, cuiusimod, maximā inferre solet molestiā.  
Vbi autem fatigatus auditus fuerit, præter lenē  
ac tardam, exigua quoque est amica. At cum ex-  
trat, lenissima simul & tardissima, atque perquam  
exigua, usque multo magis absolutum silentium.

In hoc sensu manifestior conspicitur delectatio,  
quia crassior consistit essentia: manifestiorq; ad-  
huc quā in hoc, voluptas percipitur a sensu ol-  
factus, quod ipsius quoque essentia fit crassior. Et  
enim vt ær splendoris crassitudine vincit, ita  
vapor (qui extenuatus est humor) ære crassior  
existit. Atqui splendor ad videndi, ac ad audiē-  
di, vapor ad odorandi sensum pertinet: quem-

admodum ad tactum, natura humiditas: ad tactū  
verò, solidū corpus. Gustui igitur, cum a natura  
habitu nō declinat, maximā voluptatē adferit  
omnes succi dulces, pingues, seu corporis ef-

fectus familiarissimi. Si verò ab aliquo ipsum in-  
terstante nuper vitū contraxerit, pingues. Nam q̃  
exasperata partes maximē lenire consuevit. At  
vbi iam morbo afficitur, tunc succi contrarij iis  
qui mo rbi excitant, delectare videntur. Ventri-  
culi etenim visceribus & venis insituit, huius-  
modi succo appetens, quales illi sunt neces-  
sarij. Præcedit tamē iudiciū linguæ, quæ iis potissi-  
mum delectatur iucis, quibus ventriculus indi-  
gere videtur. Cibi enim aut huiusmodi potissima

causa est, veliens ipsam membrana. Porro odo-  
randa via, qd ad ea pertinet quæ extrinseca vel  
voluptatē, vel molestiam adferit, gustandi facul-  
tati proportionē respondet. At vapores qui in-  
trinfecus continentur, si molesti fuerint, possunt  
sensu percipi: suauia verò & omnino delectabi-  
les, sensum latent: quædam modū in viū quoque, &  
auditu, qui in se nullum patiuntur vehementem  
affectū. Delectamur in id genus sensibus, ad na-  
turālē habitū redeunt: hoc autē fit per idonea  
cōtraria. Idoneū autē voco id, quod primario &  
per se, nō per mediū alterna rei intervētū, fuerit  
effectus causa. Quare procarare causas in præ-  
sentiarū spectandæ nō sunt. Iam verò genita  
les partes proprio quodam & eximio sensu af-  
ficiuntur, vnde & validius ima prædita sunt facul-  
tate, expultrice quidem seminis genitali, in ma-  
sculis: in feminis autem tum hac, in testiculis &  
seminaria vas, tum attractrice per totum vte-  
rum. At genitalis seminis tum excretionem, tum  
compressionē, in gena comitatur & cupiditas  
& voluptas. Molestia autem quæ ex redundante  
atque intus retento infecit, paulatim & lon-  
go temporis tractu increscit. Nulla autē est pars  
quæ vel aded exacerbat, vel principium par-

tium vitæ pro suarū affectionū modo perin-  
de afficiat, atque orificium ventriculi, qui stom-  
achus appellatur. Si quidem syncope, arthritide,  
dylpnea, apnea, morius, epilepsia, delirium, in-  
sania, huius partis occasione evincere solent, idē  
consistens lege. Abolitam verò, difficilem, & de-  
pravatam appetentiam, ipsa per se sustinet. Abol-  
itam voco appetentiam, dum quæ nihil omni-  
no appetit: difficilem, eam quæ est imbecilla. At  
depravata, partim ad immoderatam cibi por-  
tionē exhibens veretur, partem ad aliena qua-  
litate desiderat. Etiam cum nutritoria functio  
nō vitalis, sed naturalis sit: haud aliter in anima-  
libus q̃ in plantis perficitur. Idcirco animalibus  
vice terræ subrelecit natura ventriculum, veluti  
promptuarium cibi. Addidit insuper facultatem  
quæ penuriam leuitet: vt animalia ad cibum po-  
tionemq; excitata, eodem implerentur tempore:  
vocatūq; huiusmodi plenitudinē desiderat ap-  
petentia. Hec ortum habet a penuræ sensu, cum  
venæ ex ipso ventriculo trahunt, veluti mui-  
gentes, iugentēq;. Igitur iunctionis sensus est tames.

Prima itaq; symptoma omnium est inanitio. Se-  
cundum est inanitū partū naturalis appeten-  
tia. Hanc sequitur per venas, quæ porriguntur in  
ventriculum, iunctio. Deinde iunctionis sensus. Po-  
sterius ipsa animalia appetentia omnino vitium.  
Quam sane functionē abolere contingit, si vel su-  
cibus sensus percat, vel succus non fiat, vel cor-  
pus non inaniatur. Imbecilla vero erit, si iam di-  
tæ affectiones accedere proximā ad abolitiōē  
videantur. At depravata sit appetentia, si vehē-  
mentis modum excedat: vocatūq; a nonnullis  
canina, vbi vel ob acidi humoris vitium ventri-  
culi mordicus infestatur: vel dum totū corpus  
exhaustum, assidua nutritione indiget. Quippe  
frigidi humoris vitium, rationem quæ succi  
proportionē respondeat, inducit: ac appetentia,  
non aliter q̃ naturale pathema, exoritur: magna ra-  
men cibi & portione desiderium affert, idē pro-  
pter refrigerationem. Si verò salis aut bilioli hu-  
moris vitio ventriculus mōrdicationē, leget,  
portionem magis quā cibum desiderabit. Itaq;  
ad excitandam tamen frigida in ventriculo non  
parū confert. Inter potissimas autem causas, qui-  
bus fames impeditur, calor annuatur, vt qui  
solida quidē corpora laxando dissolvit, atq; ad  
attractionis functionē reddat imbecilliora: hu-  
mida verò fundendo, supra modū extendat. Pra-  
uas autem qualitates appetunt, quibus ventri-  
culi tunica sunt grauo aliquo excremento imbu-  
ta. Qui affectus citra, seu pica dicitur, & muliere  
vitiosis succis refertis infestare consuevit, præci-  
pue vbi vitreo gestant: quanq̃ vitæ genā nōnun-  
quam accidet, vbi ipsi quoque vitati humores ad  
osculū ventriculi confluunt. Similiter circa por-  
tionē quasi priuatio appetit: vbi corpus nul-  
la omnino eget portione, ob frigoris atq; humo-  
ris excessum: vel ventriculus propriā affectionē  
non sentit. Deficiens verò appetentia apparet,  
vbi hac eadem fuerint imbecilliora. At deprava-  
ta portione cupiditas, depravare appetentia  
horum proportionē respōdet. Si quidem immo-  
derata portio appetitur, quando contenti in ven-  
triculi tunica vitiosi humores, aut salis sunt, aut

Os ventriculi  
quæ affectu  
conferit, longē  
ex propria ra-  
tione sit consti-

Nutritoria fun-  
ctio omnino ab-  
olita per se in  
animalibus  
quæ in plantis.  
Ventriculus  
promptuarium  
cibi.  
Appetentia  
quid.

Tames quid.

Appetentiam  
quando aboli-  
ta vel imbeci-  
lam reddo, vel  
vitio contin-  
get.

Canina appe-  
tit: a quibus  
cibus profici-  
tatur.  
Frigidi succi  
appetentia ex-  
citatur.

Si salis bili-  
moris atq; bi-  
lioli vitium.

Fames corā ea  
longē impedi-  
tor.

Citra morbus  
quæ maxime  
infestatur.

Appetentia por-  
tione quibus  
decepti aut  
portio, aut ab-  
stantia.

Color niger fu-  
git, nigrumque  
dysenteriam  
hinc quoque re-  
sultat.

Calores medi-  
ci, et cetera in-  
uicem confusa  
erunt.  
Auditus bene  
afficitur, et ego  
in, quæ vici  
sunt confusa, et  
quæ graua.

Sensibile quo  
maiori volu-  
ptate fruatur,  
et quo crassior  
est natura pos-  
sibilis.  
Vapor est ex-  
tenuatus humor.

Costum quo  
facile delectatur.

Humor succi,  
et asperata le-  
uissimus.

Ventriculus in  
sensu vigens.

Colorendū vi-  
tū, vapores quidē  
interius, vbi  
sunt generati,  
sensu quoque  
dilatati sunt,  
sunt, et latere.  
Sensu natura se  
volunt affectu  
voluntati  
patitur.  
Genitalia autē  
humor vici-  
tū, et ex-  
tenuatus com-  
prehensum, et  
interius in co-  
mplexu, vel  
pari.  
Natura ex re-  
tento semine.  
Os ventriculi ex  
quibusdam est  
suis productū.

bilio si interdum etiā, cum veluti ferner in eo natura ipsius humiditas. At prauas potiones nonnulli appetunt, pro vitio humoris, qui in ipsis vincit, ratione. Est praeterea & aliud symptoma nōnnullū oculum ventriculi infectis, nempe cecidit alia vocata, quae à mordacibus succis oritur. Bulmos etiā, siue inextinguibiles fames, symptoma est eiusdem particular, vbi penuria, imbecillitate, aut refrigeratione afficitur. Mirandum autē nō est, si ob oris ventriculi affectus, animalia maximis interdum ventriculi instrumentis affectibus aligeantur, cum nimirum pars illa per nervos quidem cerebro, per arterias autē cordi, vicino sibi, suas ostensiones cōmunicet. At vero singuli sensus in singulis particulatim instrumentis à sensibilibus alterantur, perficiuntur. Hanc vero alterationē pars alterata sentit, eō quod à cerebro suscipit facultatem, quae ad ipsam per nervū derivatur. Quippe cerebrum nō vt sit sentiendi instrumentū, sed vt sensum instrumentis vim sentiendi largiatur, à natura infunditur est. Nam quod singulis animalis partibus per nervos sentiendi facultatē transmittit, liquidū patet, vbi nervus aliquis est dissolutus. Si quidem pars ea in quam nervus ille distribuitur est, propius sensum amittit. Taceo sensus inter dormiendum, aut ociosos omnino esse, aut debilitari agere: quod tunc exigua facultas à cerebro in reliquis partibus destituit. Quaevis itaque per somnum animalis facultas, naturalis autem validius operari videtur: cum tunc cibum multo melius coquatur nō in ventriculo modo, sed etiam per vniuersum corporis habitū. Est etiā ratio nonnulla, quid animalis membrū, in quo anima rationalis, veluti in archa habitat, aliquando quiescere. Cor siquidem exigua admodū habere quiesce videtur, quod longior nō magnopere indiget. Atres aliter se habet in cerebro: quod quidem per vigiliis officio suo semper fungitur, per somnū verō sentiat. Quamobrem profundius videtur dormire, qui fangit multa exercitatione fuerit: vt pote quibus inter exercitandum plurimū facultatis à principio destituebat: quo circa cerebrū & requie & virtum institutione indiget, tum ob facultatis, quam transmissit, ignitionē: tum ob labores, quibus per multas functiones defatigatus est. Quemadmodū autē exercitatus & propiores sunt ad somnū, & gravior dormitū: ita illi quoque qui cibum ingererūt. Atque hi eō grauiori detinentur somno, quod ingestus cibum humidior suapte natura fuerit. Itidē & si qui plurimo se vino ingurgitauerit, aut balneo multo calidius liberaliter circa caput fuerit vsi. Quippe huiusmodi omnia implere cerebrū suo mādore videtur: qui alioqui nō est in vtilis ei quem multa exercitatio & lassitudo aridum reddidit. Etenim & repleto capite somnū conciliet, satis Aristoteles demonstrat. At verō si à frigida multo opprimatur humiditate ipsum cerebrū, veterisolum lethargicū somnū querebit. Ignitae quae dūtaxat humectet, nō ab re somniferā moriātur: quae verō refrigeret, aut nec somnū cōducit, nec ipsū dormientē inducere vere dicitur: sed pro somno veteris, graue in opore, pro indolentia autē, vel abolitione, vel difficultate sensus efficiendū ob frigiditatis excessum. Rursus sic-

itas immoderatio, & calor, veluti in phrenitide, vigilias infert: quas neq̃ fortuna, neq̃ sollicitudo peperit. Sed apoplexia etiā & morbus cominalis affecto cerebro vniunt. Verū vt profundus somnus sentendi functiones: ita apoplexia eas actiones quae pendunt à voluntatis imperio, offendit. Ad hoc, qualis est infomietas sentiendi functionibus, talis est cōvulsio per morbum cominalē morbus voluntarius. Porro cōvulsio quae per totum corpus fit cura delirium, aut soporem, si ipsius in medulla, quae in ceruice continetur, morbo dependet. Si verō vel manus, vel crus, vel musculi distendantur, aut convellatur violentius, ad illum semper nervum, qui partem mouet, referenda est noxa.

## GAL. DE SYMPTOMATVM CAVSIS LIB. II.

### de symptomatvm causis, lib. II.

Q Vandoquidē iam exposuimus symptoma quae circa sensum versantur, opere precium fuerit deinceps illa etiam examinare, quae sub deprauato motu, seu cōmuni genere continentur: cuiusmodi sunt, cōvulsio, tremor, palpitatio, singultus, rufus, ructus, stertitatio, pandiculatio, & fridor dentium. Quorū facit nonnulla quidem natura, sed coacta ab aliqua causa praeter naturam, alia morbo sequuntur affectus, nihil ad ipsorum generationem cōferente natura: alia denique a natura & morbo simul cōiunguntur ducunt principem. Per rationem opera sunt, stertitatio, rufus, olactatio, pandiculatio, & singultus. Solius morbi, palpitatio, cōvulsio, resolutioq̃. Si vni a morborum cōsuetudine, omnis corporis & tremor. Ad quorū sane omniū particularis proprietas differētia investiganda, sciendum est, quatuor esse facultates, quibus omnia quae aluntur corpora gubernantur: attracticem videlicet, retentricem, alteratricem & expultricem. Cuius igitur iuxta naturae leges animal gubernatur, nullus ipsarum motus esse symptoma censetur. Quod si quippiā in corpore praeter naturā cōstitit, insurgatq̃ ad ipsam deiiciendū expultricis facultatē aliqua, fit interim vt ipsarū moras sensu minime percipiatur, interim vt nō laetis sensum, vtrig tamē in naturam symptomatis transeant. Igitur functionis à voluntatis imperio prodeuntis noxa est, nervorum resolutio, cōvulsio, tremor, stupor. Ceterum si instrumentorū quibus respiratio perficitur, resoluti sunt nervi, apnoea, hoc est, abolitā spiratio: si verō vocales nervi, aphonia, id est, vocas priuatio, vocatur. At linguae paralysis, est sermone, voluntatis opus, omnino tollat, nullā tamen propriam obtinuit nomen. Rursus ischuria, hoc est, vring suppressio, haud abfimile quid dant apnoea significare videtur: vix per ipsam functio, à natura, nō à voluntatis imperio pendens, tollatur. Sed si quis inuitus cogatur micere, voluntate functionis offensa est. Haud aliter alui excrementa, si supprimantur, ad naturalem desiderantur, idip homine inuito, ad voluntariam functionē noxa referri debet. At si paralysis totum corpus invadat, symptoma ipsum apoplexia vocatur. Cōvulsio etiam ipsa pro varietate particularū, varias appellationes sortitur. Nam si man-

Vigilias inducit, si calor excedat, calorem quendam facit.

Apoplexia quae in affectu fit.

Epilepsia quae in nervis fit.

Sensus depravatus symptoma.

Symptomata quae ad motum depravatum se habent, alia sunt naturae, alia morbi sunt opera, alia vero alicuius viti.

Facultates quae naturaliter sunt quatuor.

Motus voluntatis rationis.

Apnoea quid. Aphonia quid. Linguae paralysis.

Ischuria naturalis seu Choniam subdit.

Excrementa in voluntate quae resistenda sunt.

Apoplexia est paralysis vniuersi corporis.

Cerebrum quod est corruptum. Bulmos: quos de accidet.

Oris ventriculi cum principio huius membrum est oris.

Sensuum quomodo fit.

Cerebrū quosum conductum. Cerebrum vero fructuendo partibus per nervos largitur.

Facultas animalis per somnū quosque naturalis operatur voluntatem.

Exercitatio vniuersa, et aliam dormit.

Cibo ingesto cor prius ad somnū redditur.

Cerebrum quae passiva: impleti.

Capitis repleti conciliat somnū.

Veteris causa. Lethargus causa.

Stimula sunt humectantia. Sepius causa de causis quae retinent refrigerant.





*Sternutatio.  
Hære sunt ma-  
ximè respira-  
tionis.*

vel tussis vexabitur. Ad horum genus refertur etiā sternutatio, quæ expelluntur quæ reueria in na- ribus hærent: quæ & ipse motus respirationis existit. Spiritus igitur vehementer motus, earū meatus expurgat, nubicum exemplo, nubes hi- stalas expurgantium, itaq; humilissimi motus, huius opera exsultant. Annumeratur tamen sym- ptomata præter naturā, ob causas naturā ipsam, ut sic mouetur sagittæ. Tussis potior nihil est aliud, q̃ vehementissima estusio, qua plurimus spiritus celeritè & fortis erumpit, impetu suo ex- trahit exploditque excrementa, meatum ipsius obstruentia. Expelluntur autem facili quorum nec nimis aquola, nec lenia essentia fuerit. Certe tum illos humores qui in arteria contumaciter hærent, & qui difficulter expectorantur, magis euellunt sternutamenta: vtpote quæ validiorē, q̃ tussis, habent spiritus impetū, licet aliam gene- rationis suæ causā sortiatur. Quippe nō ob ea quæ aspersis arteriis, sed naribus molesta sunt, spi- ritus violenter emittitur, cum quo ex prioribus ventriculis cerebri explodi nō nihil solet. Proinde tussis capiti nihil cōducit. Sternutatio verō, nisi ob destitutionem acciderit, nō mediocre periculum affert capiti repleto vaporib; Nec mi- rum videri debet, spiritū vnicuique impetu & ex pul- mone & ex capite emitti: nā cum principiū iniur- git, vt expellat quæ infestant nares, vtrōq; vitur expirationis meatu. Hæc igitur sunt facultatis illius voluntate pendente symptomata. Vomitus ve- ro, q̃vis illas proportionē quadā respondeat, ad facultatē naturalem refertur. Vt autē vomitum nauisæ præcedit, sic tussim cerchoni, exiguus ad tussendum impetus. Porro quicquid spiritū in- terceperit, id tussis reticere oportet: sine humore sit, si capite destitū, siue illa plia portio cibi vel po- tus, siue aliquid in aspersis arteriis collectū, vt in peripneumonia, pleuritide, & in convexarū lectio- nis partium phlegmone, aut in gutturis ipsius asperantibus. Est & aliud tussis genus, quod ac- cidit respirationis organū refrigeratū. Sed ita affectū nihil inter tussim debet expugnari: adeoq; est exigua ea tussis, vt spiritus cohibitione suppres- sit, & nec eveniat prohiberi posset. Quippe auge- tur in instrumentis respirationis calor, ob cohibi- tū animi: spiritusq; sub thorace violenter oppres- sus, in omnes artos meatus penetrat. Hæc autē vtrāq; dum sunt, omnia breuiant, ad tempera- mentū equabilitatē perducit. Iam verō interm- peries ipsa, interdū simpliciter qualitate, interdum duplici cōstat: nonnāq; eiusmodi qualitates co- mutaturū quod intemperatū est, vel vti ros qui- dam. Sedenim equalis intemperies nullo dolo- re affligit, eum nimirum particulæ affectu: adit- tam vel vti acquisitis quædam natura. Nullum autē corpus à sua ipsius natura infestatur. Nā q̃ quorum natura motu, corū impetūq; dolore afficiuntur: nō quorū illi mutata aut corrupta est.

*Tussis quid sit.*

*Humores qui d-  
peiores educan-  
tur facili.*

*Sternutatio,  
quam tussis,  
validior a po-  
tiori impulsu  
humoris ex-  
halat.*

*Tussis nihil cō-  
ducit capiti,  
sternutatio in  
nisi plurimum  
caput aut ob  
destitutionem  
accidat.*

*Nauisæ potior  
de vomitu.  
Cerchoni præ-  
cedit tussim.  
Tussis reuocata  
efficit quæ spi-  
ritum inuici-  
pant.*

*Tussis ob res-  
pirationis organū  
spiritus cohibi-  
tionis prohibe-  
tur.  
Spiritus cohibi-  
tio calorē in or-  
ganū respira-  
tionis adauget.*

*Aequalis intem-  
peries aut nullo  
afficit dolore.*

*Dolor quando  
accidit.*

*Inequalis intem-  
peries dolorem si-  
cut inducat.*

recti, vtpote carnis vaporis excrementa sen- tentia, tum ob cōpessū cibi coctionē, tum ob hu- iusmodi motuū quietē. Triplex autē in lassis- dine potest oriri sensus: cōmuniū scilicet, sensus, & vlcerosus idē a causis præter naturā: om- nes corporis partes quantantibus, distendēbus, ex vlceraib;. Igitur vbi tēdi videretur corporis mo- les citra quampiā exaltationē, affectus is lassi- tudo lenissimè frigiditas vocatur, quæ admodū

10 vlcerosa, vbi vlcere sensus transeat per cor- pus apparet: id q̃d motus magis ac, idē, in quie- scentibus, aut admodū magna sit lassitudo. Per- tertius vero lassitudinis genus, quo aut tibi qua- si esse oīa, ne minimū quidem motū tolerare: gri possunt, licet nec per lassitudinē vlcerosam, vbi nimia inueniatur. Ceterū quemadmodū vbi vlcerosus sensus horrent in gri, si cōmoneatur, ita horridus affectus, si aliquos motus accesserit, in rigore transit. Atqui hæc omnia oriuntur ab ex- crementis mordacib;. Differunt verō inter se ex- crementorum multitudine & motu: propterea quod alia magis, alia minus erodant: quodq; ex corpo- ribus ipsi alia sint imberilla, alia facilia, alia e- grius & afficiantur & sentiūt. Pars etiā discrimi- natiua, vbi citius vel tardius motus tū. Ad hæc idē etiā homo, dum quiescit, solū interdum sentit in- equalitatē, dum mouetur, horrore: dū vero ex- citatur, rigore. Quislorem sic affectus consilium mediri, vt ab omni motu se abstinat. Quinē illi sol, balneū, exercitatio, ad motū excitant excre- menta, aliqui quiescentia: quemadmodū & ex- animi affectibus tria. Porro ad seipsū ad motū ex- crementa insurgūt, si vel calidat, vel extenuetur, vel in spiritū dissoluatur. Causa itaq; mota lon- ge est molestior quiescente, præsertim vbi delectur per corpora sensibilia. Cum enim quippiam per hæc transiens, violenter ad cutim fertur, in ipso per carnem cutimq; transitu necesse est vt si- mul, pungat, diuidat, vulneretq; eas partes om- nes, quæ obuiū sunt. Omnis autē causa mor- dax motusque, siue frigidissima, siue calidissima fuerit, & horrore & rigore animantū inducere potest. Ceterū febres tertianæ, vt omnium maxi- mē biliosæ caliditatis sunt, ita præ ceteris maximē horrore possunt efficere: & quod fuerit syncro- res, ed in ipsi vehementior sit rigor. Porro arden- tem febrem rigor superueniens soluit, q̃ bilis quæ interim in venis cōnebat, ad naturā p̃ carnes ad cutem decretoriē excitatur. Quare motio- nis eius, rigor & symptoma est & signū. Nam hu- iusmodi rigore affecti, postea sudat, & liberatur a febre, nimirū eiecit bile. Quæ interdum etiam nō ad cutem, sed ad internas partes impetu fa- ciēs, vel vomitione, vel alui solutione defecit.

15 Sæpenumero & intro & foras eadē die defecit, vt simul & sudore & vomitu & alui defecatione bilis vacuetur. Vbi igitur erodēs appi in parti- culis cōneatur, contrahantur sane, præcipue si il- lud mouetur: quare maximē ad eius expulsiōne- sciunt. Contrahunt itaq; atq; contrahunt se- lē, mox quædā impellunt tamquam cōnect excre- mentis portione. Atq; in hunc lām modū motus vnterius partibus, totum corpus consensio- qualitatēq; vexatur: qualis videretur in iis, qui ante rigore corripit. Similiter etiā concutuntur

20 thoracia

*Expectatio d-  
mau car si d-  
Reuolunt.*

*Lassitudinis tri-  
plex potest oriri  
sensu.*

*Lassitudo lenis-  
sima frigiditas ge-  
nera.*

*Lassitudo vlc-  
erosa motu magis  
accedit quā  
quiescentibus.*

*Horror transi-  
t in rigorem, si  
motus adit.*

*Extremum d-  
quibus causa  
mouetur.*

*Causa mota  
longe est mole-  
stior quiescente.*

*Mordax motus  
quæ omnia car-  
sa, siue frigida  
siue calida, sin-  
tur, horrorem  
rigoremq; modo  
cre potest.*

*Rigor ardens  
febrem, si quis  
perueniens, aut  
soluat.*

*Concusio quæ-  
modo corpus  
accidat.*

thoracis mufculi, ea que carnibus ipforū mole-  
fta funt, per pulmonū arterias expellere properā-  
tes. At verō nōnulli xgri cum egeant reficione  
fputa per regionē pulmonis, nec eam ob imbeci-  
lum thoracē moliri queant, fibi fternutamentū  
provocāt, ita tribus irritatis. Vt ob violentum mo-  
dū impetum, ea expulit, quæ tuſiendo antea  
reuerſe haudquaquē poterat. Illa autē tuſis, quæ  
ob intemperē organorum refpirationis accidit,  
ad horrores rigorisq; genus pertinere videtur.  
Vbi verō quæ corpus incitat, humida ſuapte na-  
ra fuerit, per tuſim ac rigore ad expultrice ſa-  
cultate impulſa, vltro citroq; ſeruitur, donec ap-  
plicuerint ad convenientē evacuationem locū. Sibi  
aſſerſus ſpiritus ſine humore, immo diſſe vel cal-  
idus vel frigidus per corpus trāſeat, in tunc hor-  
rorem excitat, ac nōnunq; rigore: nulla tamen fe-  
quitur cōſpicua evacuatione. Cum ſpiritus & frigida  
& calida cauſa poſſint excitare rigore: calidæ quidā,  
ſi aërea fuerit, refrigeratio latius efficitur au-  
xilium. Si verō ſit humor, eam febris neceſſario  
lequetur. Curatur autē evacuatione. At frigida, ſi  
aërea fuerit, remedia ſunt callidiora. Si verō ſit hu-  
mor, interdū ſola cōcoctio ſufficit, interdum vacu-  
atio, nōnunq; amba cōveniunt. Etenim citra  
febrim nōnunq; oriuntur rigores ob peſſimā  
veluti rationē, vbi quis per ocū ſe implicuerit, et  
ſubinde a cibo ſauet. Qui rigoris ſpeciem vete-  
res ignorarunt medici, q̄ homines ſuperiori illo  
ſeculo, nec tam intemperatē vixerent, nec tā cre-  
bro lauariēt. Attamen rigor ille quo partes vē-  
hemētē quantur & cōcutiuntur, ob frigidos  
ſuccos nunq; excitari videtur: q̄ nō ob craſſitudi-  
nē vehementer moueri nō poſſint. Id verō ſi ri-  
gor per febrē nō intermittit accidit, idip̄ ſperō  
imbecillo, eſſe letalis, vt inq̄ Hippoc. Siquidem  
in euſmodi rigorib; inſurgit natura cōtra res no-  
xias, quō eas expellat: viciā cadit, extinguiturq;  
aut hāc ob rem redditur pernicioſum ſym-  
ptoma. Porro in quartanis febris ſuccus ex ca-  
lido frigidoq; mixtus, rigorem excitat quippe a-  
tra biſ ſuapte natura frigidus ſuccus cenſetur.  
Vbi verō adeo putris efficta eſt, vt febrim indu-  
cat, quāta adſuerit illi putredo, tātus & calor in-  
erit. Cū autē rigor a calido ſimul & rodentibus  
ſuccis fiat, mirari haudquaquē oportet, ſi partes ex-  
tremæ omnes refrigerentur, de cūctis animalibus  
cultate vni cūctis ſanguine ad interiora: qualem  
monim videre nec in cōpſuris. animæ affectib;  
Quod verō ad animæ euſmodi pertinet, quæ-  
cūq; illa fuerit, & doctus alterum ſareri oportet,  
aut q̄ ad omnes functiones vt primis inſtru-  
mentis vitur & ſpiritus & ſanguine, ac vel aſſer-  
tus, vel vtriuſq; calore aut q̄ in his ipſis cōſiſtit.  
Per motum etiam & ſpiritus & ſanguis intus fe  
ſe recipiunt: quo ſit vt algēt partes in ſuperficie  
poſſint: idq; adeo interdum vehementer, vt nō-  
nulli rigore quoq; arripiantur. Per iram verō ſol-  
uitur ac diſperguntur, proindeq; exteriora in-  
caleſcunt. At agonia, affectus ex vtriuſq; cōſtatū,  
inæquales habet monones. Iam & cordis & æ-  
terarū pulſationes, & minimæ, & penſæ debiles  
in trepidantibus eſſe videntur: ſicvni in iratis ma-  
ximæ & validiſſimæ. At in agonia ſunt inæqua-  
les. Per verendum, animalis facultas in primis

quidē ad interiora monetur, ſed rursus aſſeritur  
ad exteriora. Nam ſi nō reſiderit nō vtro un-  
diā, ſed nōmor cenſeri debet. Vt autē in timore cō-  
ſertim, ſic in triſitia paulatim ad interiora ſit mo-  
tus: magnitudineduntaxat ac vehementer, nō to-  
togene differentibus inter ſe pathematibus. Ar-  
qui nōnulli ob ſubitum timorē perierunt: id q̄  
ſoler cōtingere, vbi debilis ſuapte naturæ animi  
ſi ſub valida pectus ratione, conſertim & extin-  
guuntur & luſcuntur. Etenim extincio, affectum  
ex refrigeratione ortum conſequitur: ſuſo cario  
autem, conſurgit ſanguinis vniuerſi ad ipſum  
principiū. At ex irans nemo mortuus eſt vniq;  
vapore quibus neq; calor refrigeratur, neque ro-  
bur diſſoluitur. Per gaudio autē nōnulli ſupra  
modū puſillanimes animi exhalant, quemad-  
modū & nīentes. Iam dolor ē diuerſe cogens  
moueri animū, haud leuiora ſymptomata, q̄ ma-  
ximus nōmor, inducit. Quippe laborantes deco-  
lores ſunt, refrigerantur, cōcutiuntur rigore, tre-  
munt, pulſus habet minores, exolutoiq; ac ran-  
dem ſimilitur ſi qui perterrentur, moriuntur. Nā  
& in ſis fugit inſitus calor ad ſuum principiū:  
animūq; ſimul & ſoluitur, & extinguitur. Per ri-  
gorem itaq; frigus non interiorum, ſed externa  
rū partū ſentitur. Quam ob ſe tunc nōnulli vhe-  
mentia ſi cruciantur, nimirū ipſi interno cal-  
p̄ſertuato. Conſideratur igitur, pugnatq; per ri-  
gores cōtra ea que inſeſtant, facultas, donec ra-  
dicitus euallantur, excutianturq;. Ob incurſio-  
nes autē vehementes, & quia etiā in intimo cor-  
pore cogitur, rursus magna vi calorem reuertitur,  
ſeſimūq; a rigore accendit, in eo certa mīne ma-  
teriam habens auxiliatricē: vnde & febris evadit  
vehementior. Quod ſi aliquando in pugna deſa-  
ngnetur anteaq; dimouere res noxias poſſint, ne-  
ceſſario mors ſubſequetur. At pruritus, qui ex-  
terioriorū leuiter morditum eſt ſenſus, eos  
vexare ſolet, qui aut balneum negligunt, aut ſi  
genitibus redunt, aut cruditatibus ſunt reſerti,  
aut prauis ſucci cibis veſcuntur: ſed præcipit af-  
ſingit infectos plora vel lepra. Vt autē prædicto-  
rum ſymptomatū cauſas accuratius exponā, exi-  
qua quidē eſt, tenuis, falſa, & immota in pruri-  
tu. Tenuis, tenuis, erodens, immota, in ſitu  
dine vicerola. Multa, ſalia, craſſa & breuiſſi-  
ma ploraq; Pauca, tenuis, mordax, ac breuiſ-  
ſima poſſident, ſi horrore. Si vero aut vhelem-  
tius moueatur, aut multo abſciderit, aut ſit morda-  
xor, tam nō horrore, ſed excitare rigorem eſt na-  
ta. Rō intentione autē aut remiſſione eiſius cau-  
ſæ, intenditur aut remittitur ſymptomata. Iam  
tuſis cauſa in pulmōe, gutture ac thorace cōſi-  
ſtit: ſternutamentū, in naribus: ſingultus, verō,  
in ventriculo & gula. Atq; in his omnibus expul-  
ſi facultas, quō excitat moleſtā, ſed ad motū  
vehementiſſimos excitat. Porro ſternutamentū  
ipſum nōnunq; ex accidenſe, humorū in pectore  
deſiſcentiſſimo, remediū exiſtit, licet ex rei gratia  
excitātū nō fuerit. Similiter purgat ventrē & gu-  
lam: quia ratione etiam ſingultus auxiliatur. Sed  
iam opportuniū eſt vt de ſis dicamus ſymptoma-  
tis, quæ circa principes functiones verſantur.  
Quorū ſanē ſis genera comprehenditur. Primū,  
vbi perit omnino functio. Secundū, vbi illa ob-

Stomatitide  
interdū ea ex-  
ponit, quæ rursus  
per tuſim non  
poſſunt.

Rigor vtri  
cauſa calidæ  
frigidæ poſſit.

Rigoris mode-  
la.

Rigor citra fe-  
brim quando  
grauatur,  
interuentione  
vniuerſi moris,  
quā ſuperſer-  
uſa, ſi ſit.

Rigor quando  
ſit letalis.

Arta huius  
quartana quæ  
ratione rigore  
ſignat.

Rigor, homi-  
ni ſola partes  
extrema refri-  
gerantur, nec  
vnde ſanguis  
ad interiora.  
Anima ſubſi-  
ſtit. Galeas  
diſſipat non au-  
da.

Timore perſi-  
ſtente extre-  
ma calidæ ad  
interiora reſi-  
ſtunt.

bre affectū per  
extremam  
ignem quid.

Varietas  
in moratur.

Triftitia quam  
mouetur ſer-  
uitur.

Tumor ſubitus  
quando per-  
ma.

Extinctio  
quid.  
Difficilis  
quid.

Tristitia con-  
ſertim plora.  
Gaudio poſſit  
monitū ex-  
monitū.

Dolor quibus  
videtur ſym-  
ptomata.

Rigor ex-  
terna refrigeran-  
tur, ſi interna  
incaluit.

Rigor febris  
cur ſuperſer-  
uit.

Pruritus quid,  
& quæ cauſa  
ſit.

Pruritus cau-  
ſa.  
Viciſſitudo  
indici cauſa.

Lepra pſora  
cauſa.

Horror cau-  
ſa.

Rigor cauſa.

Stomatitis  
nonqua ex ac-  
cidenſe cauſa  
excremētis  
diſſipat etiam  
diſſipat etiam  
vnde & quæ  
lam.

*Stultitia erit  
a frigore.  
Obtusio a frigore  
regitur.*

*Apoplexia cau-  
sa.  
Epilepsia cau-  
sa.*

*Delirium quod  
ex vado vena  
habet.  
Furor quod  
Mentis.  
Melancholica  
aliminatione.  
Phrenitidis  
generata  
gignitur phlegmo-  
ne in cerebro,  
aut in melan-  
cholia.*

*Atra bilis soli  
ratiouis com-  
pans timore  
magis, et  
mortis expecta-  
tione induci.  
Tenebrae postea  
refusant.*

*Hypochondria-  
ca afflicta.*

leditur. Tertio, quidam in aliena speciem degen-  
tat. At perit quidem functio in stultitia, obliuio-  
neque: qui a frigiditate frigore oriuntur. Quippe me-  
dicamentis quae huiusmodi symptomata facere  
possunt, refrigerant facultates mentis. Haec itaque sym-  
ptomata cerebri corpus esse refrigeratum declara-  
tur. Apoplexia vero epilepsiaque, ex subitanea col-  
lisione pituitae, repletiis ventriculis cerebri, ut  
scit videtur. Proinde horum symptomatum subita  
est generatio & discussio, qualis esse per corporis  
intemperies non posset. At modica offendicu-  
la, ac veluti torpores tum rationis, tum memo-  
riae, ob minorem refrigerationem eveniunt. Porro de  
lirium omne, depravatum est principis facultatis  
motus, & praeus succus, aut cerebri intemperie or-  
tus habens. Ceterum phrenitis dicitur, si febri-  
a adiret: ut mania, si absque febri accideret. Sole autem  
melancholice alienationes, & singulorum succo, pdu-  
ci solent. Na phrenitis non simpliciter ob calidos  
succos accidit, sed cum phlegmone vel in cerebro,  
vel in ipsius membranis producunt. At quae  
deliria in acutissimam febri vigore oriuntur,  
mordacem caliditatem vaporum habent, cerebrum  
occupant. In omnibus autem animi alienationibus,  
si timor atque tristitia diu perseverent, atra bi-  
lis in rationalem animae arcem occupat, timorem  
metuitatem, ac mortis expectationem inducit, ut  
hinc mirandum est, cum videamus in rebus exter-  
nis nihil magis nos, & tenebras ipsas, perterrita-  
cere. Si igitur quippiam tenebris simile rationa-  
li parti animae circumfundatur, hominem semper  
time re est necesse, ut qui timoris causam semper  
in corpore secum ferat: ut in stultitudo illo mor-  
bo, quem hypochondriacum nominant, indices  
videre licet.

### GALENI PERGAMENI de symptomatum causis, lib. III.

**D** Einceps autem de symptomatum quae circa  
num actiones, tum facultates naturales ver-  
santur, dicendum est. Quisdo quidem igitur co-  
coctio nihil est aliud quam alteratio secundum qualita-  
tem, quae ventriculus nimirum molitur, dum sibi ci-  
bos assimilatur: nemo sane negaverit alterationis  
errore fore concoctionis symptomata. Certe si nul-  
la penitus alteratio fiat, hoc symptoma absolute  
vocatur cruditas. Si vero haec quidem alteratio, sed  
non qualem fieri expedit, vocatur & haec cruditas,  
non quidem tam privatio, sed seu vitium conco-  
ctionis existens. At vitium ipsum febri accide-  
re solet. Aut enim tarde alteratur cibi, ut vix pro-  
pria transmutatione suscipiat: aut corruptum  
tur omnino, ut nulla concoctione admittere pos-  
sint: atque huiusmodi sunt concoctionis noxae. Qua-  
rum causa communis quidem est aberratio po-  
tentiae ab scopo aberratio. Cuius aberrationis  
duo prima sunt genera. Vnum, quod in potentia lesa  
est: alterum, quod in externo aliquo errore consi-  
stet. Ceterum potentia bifariam laeditur: aut per sui  
ipsius essentiam, a ut per aliquem morbum instrumen-  
torum. Error autem externus tripliciter accidit. Na  
aut ab excrementis ventriculi, aut a cibis, aut a som-  
ni tempore oriuntur. In propria essentia noxae, in  
semperis quaedam agentium qualitarum existit.

*Coctio quid.*

*Alterationis  
error quod con-  
coctionis sympto-  
ma.*

*Cruditas quid.*

*Concoctio  
vitium causa  
est instrumenti.*

*Facultas tri-  
ariam laeditur.*

*Effluvia san-  
guinis levis  
propria, sunt  
intemperies.*

Ad morbos instrumentorum pertinent tumores  
praeter naturam, abscessusque, & alii affectus contum-  
aces, quibus si crucietur ventriculus, impeditur facul-  
tas eius concoctio. Quod si cum intemperie coe-  
stet igitur instrumentorum affectus, utroque modo facul-  
tas illa paratur noxae. Atque ob haec omnes cau-  
sas ycn tricus melle concoquit, vel nullo extrin-  
seco error incidenti. Et converso autem ventriculi  
non male affecto, interdum non concoquit animal, aut  
propter ciborum ponendum immoquid quanta-  
tem, aut qualitatem alienam, aut quia intempe-  
ratum, aut non recto ingeruntur ordine, aut propter ex-  
crementum invite, aut somnum brevis. Ordine praepo-  
sterum voco, ubi quae aut cydonia, aut punica ma-  
la in primis ingeruntur, mox olera sumat ex oleo  
& garo. Intemperies autem dicitur, ut si in aurora  
antequam hibernus cibis descenderet, aut corpus fue-  
rit modice exercitatum, pradium sumatur. Porro  
corruptele ipsae, quae quidem humores sunt, ex  
indignis humis, magis humis oriuntur cibis: ac-  
cidit vero, ex his qui frigidiores naturae sunt, magis  
que pinguiori. Similiter etiam & in excrementis con-  
tingit. Aciditas siquidem creat, quae piraerosa sunt  
& frigida: humositas, quae bulosa & calida. Nec se-  
cus videri, sicut frigidioribus, quidem morbis aciditas  
sub calidioribus, humositas mutandis efficit. Tar-  
da concoctio fit, quia cibi difficultate corruptumque  
vel quia illos facultas non operatur: vel quia som-  
nus luit brevis, qui ut res vincere possit. Vbi vero  
circa corruptelam cibis omnino concoctione  
privatur, scendum est ventriculum plane esse vi-  
ctum, vel ab immoqua multitudine, vel ab ingenti  
frigore. Ad eisdem reducantur modos quae in  
vitiis cruditates contingunt: illaeque etiam quae in ter-  
ra concoctio gignuntur. Atque haec omnia indicant  
ut nobis praecognita concoctionis ratio. Cum enim  
temperiem huiusmodi, quae ex quatuor ele-  
mentis constat, & quae corporis ventriculi prop-  
rietatem constituit, incertum esse causam altera-  
tionis ciborum, quodque ad haec remedium mediocri-  
ter obfert calidum elementum: facile nobis via  
ostenditur, qua cruditatis causas quoque invenia-  
mus. Igitur in vniuersis actionibus tria sympto-  
matum genera reperiuntur. Quorum quidem pri-  
mum est, abolita actio. Secundum, imperfecta, dimi-  
nutaque: tertium denique, vitiosa seu depravata. Venti-  
culus itaque actione privatur, ubi ne minimi qui-  
dem immutat cibos. Imperfecte concoquit, ubi  
tarde concoquit. Depravate vero, ubi cibos cor-  
rumpit. Eade etiam habenda est ratio, & in coctio-  
ne quae fit in venis, & in vniuerso corpore. Porro  
ex vitiosis succis gignuntur erysipelas, tetter,  
gangraena, phagedaena, carbonum, herpes, alii  
id genus affectus. Circa numerum autem actio-  
nem, privatio quidem & stupor, atropineque de-  
fectus nuntio, gracilitas, aut vitiosa in leuitas, &  
elephantiasi consilium. Quorum sane causa, aliae ad  
potentiam imbecillitatem: aliae ad errorem quae circa  
cibos committuntur: aliae ad studia siue exercitia  
& ea quae extrinsecus animali accidunt, referuntur.  
At vero imbecillitatem potentiae, quae quidem  
proprie sunt, similitudinem intemperiesque vero non  
proprie, instrumentales sequuntur morbos. Error  
autem circa cibos exhibitos, ad multitudinem, succo-  
rumque qualitate refertur. Quemadmodum & stu-  
dia,

*Instrumentorum  
morbi.*

*Cruditas aut  
essentialem vel  
causa causa esse  
se resistentia.*

*Cydonia esse  
indigna in viti-  
um.  
Intemperies  
ciborum yfen.*

*Corruptele fa-  
culis acoctis,  
et quibus cibis  
corruptantur.*

*Concoctio  
tarditas vado.*

*Alterationis  
horum causa  
est temporis  
transcursum.*

*Symptomatum  
genera tria  
reperiuntur  
a privatione  
a diminutione  
a vitio. Vitia  
autem sunt  
abolita  
imperfecta  
diminuta.*

*Succo vitiosis  
quod afflicta  
producant.  
Atropineque  
defectus  
nuntio.  
Gracilitas  
aut vitiosa  
elephantiasi.*

*Imbecillitas  
facultas aut  
quod morbos  
sequantur.*

dia, & ea quæ extrinsecum occurrunt, ad ordinem præposituræ, & iutempeliuū vsum pertinere videntur. Oportet autē nō modō symptomata nosse, verū eius semper causam investigare. Nam si ventriculus ciborū causā nihil omnino cōcoxit, facili id symptoma corrigitur. Si verō ob extremum potentem lapsum, in lenteria, aut iu sympanitē mutabitur. Similis etiā & in sanguificatione, & in cōcoctione illa quæ per totū corpora habitu sit, est inquisitio faciendā. Omnis autē in temperies, si vehemens fuerit, vires deicit. Quod si lingus viciat, frigidus affectus efficit: contrā, si calor: nec secus in reliqua oppositio. Si itaq; ventriculus calore immo dico æstuat, illico corrūpente. Quæ quidem corruptela nidorē cōmunit recte: priuatim verō quilibet cibus id nidoris genus reddit, qd nature suæ propriū existit. Nullus autē cibus, si immo dico fuerit exaltatus, putredine elugere potest. At quæ sic sunt affectu, sicut cruciatur, atq; interdum paruis tenuib; hæcibus corripiuntur. Si ob frigoris vehementē intemperiem cibus omnino crudus permanserit, ita affectu nec sinit, nec leuatur: sed ciborū qualitate percipit, siue ad ructum, siue ad vomitū provocetur. Quod si leue aliquid cibi imprimatur cōcoctiois vestigiū, fueritq; ciborum natura aut modicē temperata, aut frigidior, acidi ructus incitabūtur. Si verō calidiorē intemperie fuerit, aut suapte natura statū excitare possint, vapore spiritūq; ventriculū replent. Atq; in huiusmodi intemperies facili ventriculus labitur. Ad tantā autē vel siccitatis, vel humiditatis intemperiem, vt actio eius aboleatur, ventriculus nisi in multo tempore, pervenire nō potest. In retentrice potentia, triplex etiā reperitur symptoma. Nam aut nihil omnino complectitur, aut debilitat, aut depravat. Cū igitur vel nihil penitus, vel debilitat retinet, ut infānones, tum fluctuationes sequitur. Porro vltimæ imbecillitatis ventriculi causa aliquis morbus existit. Morborum autē qui accidunt illi, alij veluti similes, alij tanq; instrumentalem partē, ipsum solent affligere. Mūscuntur autem interdum & morbi, & symptoma tum retentrice, tum expultricis potentie, vt in ea ventriculū cōmotione, quæ veluti cōvulsio illius est, cuq; per singulū accidit. Ventriculus siquidem per singulū, prout cibos amplectitur: contrariū depravato illo cōvulsivoq; motu, etiā molestia expellere. Etenim quemadmodum per vomitiones expelluntur ea quæ in capacitate stuebant: sic per singulū illa, quæ imbuert ipsius ventriculū corpus. Quod obrem piper, si in tenuissima cōmixtu (vt possit penetrare ipsius ventriculū) sumatur, bibaturq; postmodū calida portio, singulū vel maxime excitat. In vniuersum autē, siue calida sint, siue frigida, quæ permeant ventriculū corpus, excitabūt singulū: qui primum quidem expultricis, dein retentrice facultatis est motus. Nausea quoq; expultricis facultatis est depravatus motus, quod per gulam celerimē vacuetur, qd os ventriculū infestat. Inter hæc namque lenteria: vbi a re quæpiā sic irritatur ventriculus, vt ea in per inferius oculū expellere cupiat. Illo siquidē ad expulsionē vntus orificio, in qd humores cōstribantes inclinant. Quod

si in vtrūq; repit, vt in choletia morbo, vtrūq; orificiū accōmodat. Attractrix etiā facultas, aut omnino nequit cibos attrahere (quod symptoma dicitur gulæ paralytica) aut difficulter trahit, vbi incipit gula resolu: aut depravat trahit: de quo motu iam sepe diximus. Est cū ob innatū carunculam tora gula aut eius pars obstruatur qui morbus instrumentalis vocatur. Cū igitur ventriculus naturaliter habet, supernis partibus ad sese trahit, atq; per inferiores deicit. Vbi verō præter naturā affectus est, etiam ab infernis assumit aliquid. Si quidem nonnulli chyli vomitione sunt redditi: sicut & steruus, per letales voluolos. Satiū tamen est dicere, ventriculū per id genus affectus, nō trahere, sed recipere ab intestinis excrementa violentē cōpressa. Id quod folet contra gerere illis, quibus ob negotia non licuit, quid expediens erat, deicere. Nonnunq; etiam sit voluolus, vbi intestina suo illo naturali cōstitutione moru præstatur. Quinētā indurata steruus tumorēq; præter naturā, obstant aliquido, vt vel nihil excrementorū feratur deorsum, vel nō satis copiose deiciantur. In summa verō, omnia symptomata intestinorū, ad ea quæ de ventriculo diximus, referuntur. Alimenti per corpus digestio (quæ & ipsa naturale opus existit) tunc ad amicum perficitur, vbi quilibet pars peculiaris sibi allicit cibum. Accidunt autē illi tria symptomatum genera. Nam vel imbecilla est, vel depravata vel omnino cessat. Quorū sanē symptomatum causæ dicuntur, aut trahentiū p artū intemperies, aut instrumentorū morbi, aut digerendi alimenti præuitas. Ac per intemperies quidem, facultas redditur imbecilla. Instrumentorū verō morbi, alimētū meatus cōstringunt. Præuitas autem dicitur, si vel crassior, vel glutinosior sit: cibis similiter impedit expulsiōis excrementorum, triplices causæ inveniuntur. Vnā, cū partes quæ excrementa expurgant, sunt imbecillæ: altera, viarū angustia. Postrema est excrementa malitia. Imbecillitatē intemperies parit, angustia verō, vel obstruatio, vel aliquis instrumentorū tumor. Atqui tumorū causa est humorū affluxus. Obstruatiōē facit humorum vel crassitudo, vel lentor, vel innatū tuberculū. Excrementorum autē malitia, est multitudo, crassitudo, & viscositas. Per concoctionem in venis factā, tria redyndit excrementorum genera. Vnum bilis amara, quæ ab hepatis vesica expurgatur: alterum atra bilis, quæ a liene: tertium vltimū serum, quod attrahitur a renibus. Cū autem viarū duo sunt genera: vnum per quod excrementū trahitur, alterum per quod expellitur: vtriuslibet angustia excretionē lardere potest. Nonnunq; etiam horū nullum est lesum, sed excrementū multitudine cū immodica est, vt tota expurgari non possit, vñ cum sanguine per totum corpus defertur. Huius verō immoderationis duplex affertur causa: nē per alteratū potentia male affecta, & alimentorum præuitas. Tam verō pallida bilis, si redundet per vniuersum corporis habitū, regium morbiū: sin autē in vna tantum parte cōstitat, erysipelata & herpes excitat. Atram bilem, si in vniuerso ad sit corpore, elephas: si in vna aliqua parte, cancer sequitur. Pituitū, si per vniuersum corpus in-

Choletia morbus.  
Attrahens facultas symptomatica.

Volutus morbus affligens, ventriculus ab intestinis excrementa suppreffa recipit.  
Volutus vnde soluit oris.

Digestiois choletia symptomatica, est, vbi rum symptomata sunt causa.

Expulsiōis excrementorū nō respondens, causa triplex.

Excrementorum peragantur vntus cum sanguine, tria genera.

Excrementorū via duplex.

Bilis pallida quæ deorsum trahit, per corpus sua.  
Atra bilis quæ morbus parit.  
Pituita quæ morbus parit.

Serum sanguinis  
quod affe-  
ctum producat.

Nutritio est  
naturalis ali-  
mentum prima.  
Alimentum al-  
teratum ef-  
fectum nutri-  
tionis sym-  
ptomata.

Atrophia.

Elipsos quid.

Alphi.

Alimenta ad  
suum naturam  
immutantur  
et, et immu-  
tationes ab illis.  
Perfusa plura.  
Crassum ali-  
mentum.

Alimenta pro  
pauca vnde ac-  
cidit.  
Expultrix im-  
modice immu-  
tatur.

Expultrix fa-  
cultas rursus  
in imbecillam,  
quod accidit.

Sanguis excre-  
tionem emittit,  
amittit rursus  
excreta, propter  
naturam essen-  
tiam.

Sanguis qua-  
si ex pultrix  
rursus posuit.

Vasa quibus  
modum sym-  
ptomata posuit.

creuerit, leucophtegma comitarur. Sin aut in  
vna parte, exedema. Serosa excrementa si redun-  
dent, ascite aequi inter cutem inducunt. Quae si  
nam aliquam partem inuaserint, in ea pustulas gi-  
gnunt. Pro imbecilla aut ipsorum excrementorum,  
variari solet & morbi, & symptomata. Porro nu-  
tricio, ut naturalis actio est prima, sic per se  
necessaria existit: quippe quae species alteratricis  
facultatis censetur. Alimundum siquidem altera-  
tio est: quae quidem, licet nomen diuersum & nu-  
tritionis sortitur, idem tamen varius est opus.  
Nutritio autem a scopo aberrat, si vel nihil om-  
mino agit, vel ab actione perfecta deficit, vel vi-  
tiose agit: idque ob altertricis facultatem, quae sub  
alterationis genere continetur, vel ob materiam tum  
defectum, tum prauiatatem. Ob defectum quidem, ut  
in atrophis, siue hic ex defectu, siue ex priuatio-  
ne dicatur. Hic aut in atrophis defectus, non pro-  
prie ad cibum qui ingeritur, sed ad materiam mem-  
bro datam, est referendus. At prauiata cibi, leu-  
cia & elephantalim, eiusque genera alios affectus  
gignit. Verum ubi caro nigra pallidique fuerit, ele-  
phas nominatur. Nec alter affectus hic gignit  
letum, quam leucae. Iam alphi haud diuersimodum  
dicta habent generationem. Exterius per hos non  
caro vniuersa afficitur, sed corpora superficies  
duntaxat, vel in squamis quibusdam inspergitur.  
Atque albi quidem ex priuita, nigri vero ex melan-  
cholico humore prodeunt. Si quidem alimenta  
carnem maxime permittunt ad suam ipsorum na-  
turam possunt (etenim Persica planta, cum in  
Persia lussit letalis, postea in Aegyptum transla-  
ta, quod inerat noxium amittit) quaque & carne  
etiam, alimenta ipsa immutatur. Omnis siquidem  
res, vel si longe potentior sit, ab illa cum qua ver-  
satur, afficitur. At non solum ob alteratricis facultatem  
imbecillitatem, pars aliqua alimentum priuatur:  
sed etiam ubi astrahendi vis imbecillior fuerit, aut  
expultrix immodice mouetur. Atque rursus immo-  
di ce mouet expellendi vis, ubi retentrix potentia  
grauatur, vel ob excrementorum multitudinem,  
vel acrimoniam, vel ob propriam imbecillitatem.  
Tunc siquidem necesse est, ut cum eo quod redit  
dat, simul etiam id quod vtile est, excernatur: ut in  
lenteria, dysenteria, choleraeque fieri contingit.  
Quod si expultrix facultas sit imbecilla, necesse  
est carnem tunc humidiorum fieri, pluribusque  
excrementis impleri. At redundantia multorum  
excrementorum, ob alteratricis facultatis imbe-  
cillitatem accidit. Pro ipsorum autem excremen-  
torum tum quantitate, tum qualitate, alia alter  
caro immutatur. Quod vero ad sanguinis ex-  
cretionem pertinet, si exipia eam quae feminia  
per singulos menses accidit, reliquae omnes toto  
genere praeter naturam exsunt. Profluua autem  
vteri, vti modum in quantitate excesserint, tunc  
solum praeter naturam censentur. Omnium au-  
tem sanguinis suorum causa, trifariam potest ac-  
cidere. Quippe vel facultas ora valorem aperit,  
vel in sanguinis fluore et naris, est videtur: vel san-  
guis est male affectus, vel valorem aliquod etiam  
male affectum, vel ruptum. Etenim vasa rum-  
pingit, aut ob plagam acceptam extrinsecus, aut  
ob silum, aut ob calum ab alto, aut ob vociferan-  
tione vehemeterem. Sanguinem male affectum

dicere, vel cum adeo viscosus est, ut vasa quibus con-  
tinetur, erodant: vel adeo auster, ut a visis cohere-  
ri non possit. Vasa male affecta dicuntur, si vel mol-  
liora, vel duriora, vel tenuiora fuerint. Si quidem  
quod immodice molle est, facile ob imbecillita-  
tem rumpitur: si cuncti & valde durum, quia non fa-  
cile multum extendi potest. At tenue, ob humi-  
dum has vtriusque affectiones, non solum ab inter-  
nis causis, verum etiam ab externis ut rumpatur  
facile, est habile. Verum non omnia vasa erodi si-  
militer possunt. Nam durum crassumque, erosum est  
conuulsum. Similiter de referantione est dicendum.  
Nam vasa imbecilla, mollia & tenuia, prona sunt  
ut oscula ipsorum pateant robusta vero, & crassa  
& dura, sunt ad talem referantionem inepta. Ce-  
terum referantio accidit ab illis quae ora vasorum  
irritant, & a plenitudine grauante: sicuti quan-  
doque a natura, cum excernit ea quae sibi molesta  
sunt. Sed iam de illa quae vomitu reiciuntur dica-  
mus. Excernuntur igitur haec interdum, & quanti-  
tate & mole sua ventriculi grauati: ut cum plu-  
rimum cibi est ingestum, interdum, & sua mor-  
dacitate contrahunt: ut si vniuersum assump-  
tum vel acidum, vel induratum, vel amarum, vel  
acre, ob vitium coctionis euaserit. Eodem ge-  
nere continentur & biliosa, & pituitosa, & serosa  
excrementa, vel inibi nata, vel ex vniuerso cor-  
pore illuc confluentia. Tertium causarum genus  
ventriculum ad vomitum incitans, est quod haud  
quaquam irritans, in illo coheretur praeter naturam:  
ut videlicet sanguis. Communitur autem dicitur esse  
praeter naturam, quae etiam si sint concocta, mi-  
nime possunt alere. Iam vero recrementorum ad  
infernas partes expulsi, nonnunquam folium tem-  
pus praerunt, vel quia venter copia multi cibi  
grauatur, vel pungitur, vellicaturque ut de mor-  
dente, quam vi alienam expellere nituntur. At di-  
cimus multum cibum, vel quia facultas seipsam  
imbecillior est reddenda, vel quia exiit assumptum  
alimentum immo dicere, vel ob vitium causam. Pre-  
ter iam distas causas, alimentorum tum humidiora,  
tum viscidiora ingesta, ipsam digestionem accel-  
erant. Quae tum celerius delabuntur, cum leuiter  
post eorum assumptionem deambulant. Cum  
autem complura sint intestinorum volumina, per  
quae deferri alimenta est necesse, cibi sane ipsi ob  
grauitatem diu immorari non possunt: quod si eo-  
rum quippiam in ipsi circumvolutionibus si-  
xum inhyreat, id subito ab actione intestinorum  
(quibus inest via expellendi instantia, propelli-  
tur. Tardius si pro consuetudine excernit ven-  
ter, aut ob intestinorum vel imbecillitatem, vel ob  
solum sentium: aut ob alimentorum tum pauca-  
tem, tum qualitatem. Sed musculorum ad domi-  
na imbecillitas etiam demones retardat, pos-  
sertum si duriora sint excrementa: quo tempore  
thoracis musculi etiam auxilio sunt. Pectora si  
pro ratione assumptorum excrementa excernunt,  
ubi plus ex cibis per corpus digeritur. E con-  
trario plura deiciuntur quim pro portione inges-  
torum, interdum ob defectum digestionis per  
corpus, interdum ob excrementi quidam & su-  
perius ad regionem venteris deluxa. Porro aliquid  
excretionem, vel ob imbecillitatem, vel ob morbum  
eveniunt. Imbecillitatem intemperies inducit.

Armor.

Sanguis aut  
quiritate, aut  
qualitate im-  
modicus.

Vasa quibus  
inter male ef-  
fecta dicuntur.

Referantia vbi  
rum vnde ac-  
cidit.

Vomitus a qui  
bus confusio  
mori potest.

Sanguis in  
teritio autem  
per prae na-  
turam.

Demulcentia  
causa.

Cibus multus  
quod expultrix  
dicitur.

Alimentum tardius  
digerere quod ob  
peritiam.

Excrementum  
autem plura  
quam portio-  
nem, quoniam  
pro ratione di-  
gestionis, et  
superius ad  
regionem venteris  
deluxa causa.



At mordant humores contenti. Est & alius affixus deiectionis modus, quæ fit ob sedis musculos reolutos. Quippe huiusmodi deiectiones à voluntariis impetu non pendit: proinde & interperitur, & inordinatur, & aliquid sunt tam vero solent flatus in ventriculo ipsius oriri, cum vel humores pinguiori illis contenti, vel cibi in vaporibus ab imbecillo calore soluntur. Etenim ut ab solentur frigis vaporem haudqua excitat, sic vehemens calor exactissima magna ex parte cibum ipsam cōminuit, & vaporis generationi conuenit: nisi forte is suapte natura sit statulentus. Quæmodum enim frigidissima cōstituitur, maxime spirante borea, ætrem feruentiorem reddit: ac rursus calidissima constituto ætasia, efficit ætrem nos ambiens purissimū: medix verò constitutiones nebulae pariunt: sic in animalis corporibus, si solo moderato, imbecillōq; calore, & statuenti gigni excrementū contingit. Hoc igitur si per os excunatur, ructum efficit: sin autem per sedem, flatū molitur, interim strepitum, interim sine strepitū. Cūm verò per neutrum defertur partem, lassationē, symptoma ventriculi imbecilli, producit: quæ etiam mota per vacua intestina, in illis variis gignit strepitus: qui quidem est acutus atque tenuius resonans, quō purior spiritus fuerit, magis per intestina tenuiora & superiora delatus: eo autē minor, res grauior resonatio sentitur, quō spiritus magis ad inferiora intestina descendit. Quod si intestina ipsa aliquid humiditatis cōtineat, strepitus murmurillus dictus gignitur, qui humidis excrementi deiectionē nuntiabit. Si verò strepitus edivus, purus & clarus resonet, aut intestini ipsius inanitionē, aut in superioris eius parte excrementa dura cōneri significabit. Qui strepitus cū stridere sit, is ab instrumentorum angustia, & inflante spiritu, atq; pauca humiditate procedit. De fluxu & superius partibus in ventriculo sit, ubi facultas privalida, redvndantia excrementa expellit: interdum ubi adeo imbecilla existit, ut ne id quidem quod vile est, ferre possit. Excremit id quod redvndat, tum per cristas, tum per integrā valetudinē: ut in mulieribus singulis mensibus, & in his quibus aliqd membrū est mutilatū: id quod etiam per definitior circuitus cōtingere in aliis mulieribus videmus, qui prioris vitæ exercitia, cum ignavo ocio mutarunt. Atq; excrementū huiusmodi sola quantitate est alienū. Altera quantitate aberrat, magnāq; ex parte in acutis morbis solet excerni per crissim. Inter hæc duo excrementorū genera, est aliud tertium genus mediū: ut in ventriculo semicoctus cibus. Hoc autem per hepaticas affectiones maxime excremitur. Ceterū nominant hepatici, quos ob ictericos imbecillitatem infestat morbus, etis si nulla adsit phlegmone. Hepar igitur, si quando alimentū, quod per mētericā venā attaxerat, nequeat cōnectere, per eandem rursus id semicoctū ac simile aq; in qua fuerunt ablatæ cristas nuper mactat, respuit. Quod si alimentū in hepate accurat cōnectum fuerit, ob aliqd autē impedimētum distribui in corpus non possit, ut ad venam redeat et necessarii. Quo tēpore excrevit sanguis apparet nigrior, splendidiorq; illo, qui naturalis exiit: vtpote ex

sanguine & atra bile cōmixtus. Etenim sanguis solus per se ob refrigerationē nigricans, tantum abest ut splendor vilum acquirat, ut etiam cum quem ab initio habuit amittat. Atra autem bilis eo splendor exiit: quæle magis mortui birmen ledas. Si quidem nō ex refrigerato sanguine, ut grumus, sed ex immodice aliam, feruēte, velv ipsa quidam cinis, gignitur atra bilis. Excremit ipsa est frigida, quia ætrem nō tam caloris exerts: quæmodum nec cinis, nec etiam acetum. Igitur excrementorū excrementorū quatuor sunt differentie. Prima est, ubi sanguis quatenus dictū est, per circuitus quodam emanat. Secunda, cum ob imbecillitatem tenuiora, laud abilitas laudacro ablutatū carniū sanguis deicitur. Tertia (quæ nuper diximus) ex melancoholico solent deiectione sanguine consistit. Ac per hæc tres differentias, & multum est excrementum, & aliam excremitur. Per quantam vero quæ est vitæ in instrumentorū oritur, precipueq; dyenteria vocatur) paulatim & breuib; intervallis deiectionem fieri cōtingit, nonnunq; tunc sanguinis, nonnunq; grumosi: cum quo interdū puris quoq; nonnulli excremit soler: quæmodum & cancerata, & partes quædam membrana intestinalium confusiles. Sæpenumero densum quoq; sterces excremitur, cruentis guttis repletum. Eiusdē generis cum prædicta dyenteria est tinclinos vocatus, ob recti intestini vicis eventiens: qui quidem cetera symptomata dyentericæ similia habet: tensionis vero vehementia, dyentericæ ionge superat. Vrinæ tum suppressiones, tum depravate ex pulsiones, excrementis quæ vel in ventrem retinentur, vel præter morem naturæ eiciuntur, proportionē respōdent. Supprimi igitur, vel ob vesicæ imbecillitatē excremit nō potens, vel ob osioli ipsius angustiam. Quorū duorum morborū ischuria est vnum commune symptomata. Est & aliud symptomata, cum nihil penitus vrinæ in vesicam delabatur, abolita nimirum renū actione. Aliqua itaq; affectus censendus est, cum oppleta vesica, alius cūm vacua, nihil vrinæ redditur. Nam in ea affectione quæ vesica est plena, oportet aut orificium eius angustum, aut naturam imbecillam existere. Os igitur sit angustum, quia obstruitur & cōnert. Atq; obstruitur quidem à grumo, vel crasso pure, vel lapide, vel callo, vel tuberculo, quod in meatu crevit: cuiusmodi in exterioribus partibus accidere cernimus. Conniet autē, aut ob tumorem præter naturam, cuiusmodi est phlegmone: aut ob siccitatem ingentē, qualis per febres ardentissimas gignitur. Sunt verò depreliensi quidam vesicæ operam habentes, qui ventri surgere à corna, ut illam exonerat, postea metere nequeunt: huiusmodi etiam affectus ventri & intestinis solet interdum accidere. Igituriam dicti affectus, vim excremit vrinæ, suā functione defraudat. Qui vero ab his magnitudinem relinquunt, actiones efficiunt obestas, torpidasq; Reliquos affectus tertium genus symptomati (quod in morbis depravatis cōsistit) comitari cōsuevit: cuius multe species habentur. Primam stranguriam appellant, quæ vel ob imbecillitatem vesicæ, vel ob ætrelotum fieri videtur. Secunda species profusio

Fi iij

Difficilis in  
temporibus  
per os volutus  
in superiorem  
flatus in vitro  
per os patet  
in humeris  
et calore rubet  
et.

terviciū  
nudo aere in  
no flante.

Nath in vtri  
usque partem  
que signatur  
impetum.

Striptum à fle  
to prof: tum al  
necesse ad  
que flatus ipse  
truncat inia  
flatus magis p  
ructu: præter  
ceterum, quod ma  
gis illi oritur  
versus defen  
deria.

Striptum mur  
murillus puris  
stridit, quod  
calidius.

Difficilis vnde  
in ventriculo  
accidit.

Excrevit quæ  
sit modis.

Excrementum  
bile quæ mēte  
le abest, quod  
fit.

Hepaticæ qui  
de accit.

Alimentum ob  
hæsit in ven  
træ regem, quod  
de non gigni fit.

Atram bile ef  
se cetero san  
guine splendi  
diorum.

Atram bile gla  
pore ex ferugi  
ne immutata  
est: effig fit  
solum, non ta  
men calore ex  
cremitur.  
Excrementum def  
ferentia quæ  
tuer.

Dyenteria  
signa.

Tinclinos voca  
tus ab vlcere  
nigricans velle.

Vrinæ vnde  
suppres  
ausi.  
Vrinæ, quæ  
dyenteria cau  
sat.

Vrinæ morbo  
re quæ obstrui  
occlusum pos  
sit.  
Vrinæ opus  
que ex tangi  
conuenit.

Stranguria fit  
vel ob imbecill  
tatē vesicæ, vel  
ob longi ætatis  
morbo.

ventris est similis. Solet autem fieri quedam vel-  
vi resolutio, colligatiove, interm vniuerſi  
corpons, interm succorū tantū, quos venę con-  
tinent. Deinde quod ita liquatū est, modū in ven-  
trem, modū tum vīna deſcendunt in ſudo-  
rem degenerat. Igitur venarū ſuccos in ſeroſam  
ſancem ſolutos, renes ad ſeſe trahūt, vbi integrē  
valent, continentēq; ad veſicam tranſmittant.  
Si verō invalidi fuerint, vt ipſos trahere ne-  
queant, tunc venę cuiuſmodi ſerum aut in veni-  
demſtrunt, nimirum ſi craſſius ſit: aut in vniuer-  
ſum corpus pellentes illud, vbi eſt tenuius, ſubi-  
torum habitum ad aquam inter cutem tranſe-  
munt. Quod ſi caro liquata ſit, tum vel venter  
fulſcipit ipſam fluxionē, ſi ſit craſſiſſima, vel ſu-  
dores profluunt, ſi in vapores ſoluat. Reliquorū  
lorū ſymptomata, alia quidem veſicę aut reſū  
quodam affectus indicant: alia quantū vel cru-  
ditatis vel cōcoctionis accerſent ſanguini, oſten-  
dunt. Vt verō ad ſudores tranſeamus, vbi q̄ reſo-

etiam expellendi facultas, vt retentrix, modice il-  
lis eſt imbecilla. Eget autem longiori tempore  
facultas retentrix, quō ſuo fungatur munere: ex-  
pultrix verō breuiori. Pueri igitur, vt alteratix  
facultatis robore iuuenes ſuperant, ſic attrahē-  
di vi ſunt ipſis longe inferiores: atq; ab eis enim  
in duabus reliquis facultatibus ſuperantur. Quā  
quam expulſeris imbecillitas in eis minime de-  
prehenditur, idq; ob temporis breuitatem, quo  
ſuo fungitur munere. Quippe crebrius & deu-  
ciunt & vomūt, q̄ iuuenes, nō ob expulſitricis po-  
tentix robur, ſed ob retentrix imbecillitatem.  
Atq; in cōcoctionibus quę ad ventriculum per-  
tinent, ſi humida molliaq; ſumpſerint, ea perinde  
ac iuuenes concoquant: dura verō deterius  
conſiciunt. Siquidem puerorū calor, ad vaporis  
naturam iuuenum, ad ſiccitatem magis accedit.  
Atqui humidiora corpora humidioribus indi-  
gent alimentis: ſicciora, ſiccioribus. Senes ad o-  
mnes ſerē actiones corpus malē affectū fortiuntur:  
quippe qui iuuenibus anidiores ſint, præterea  
enim frigidi. Quare nec probē concoquant, ob  
caloris penuriam: nec rite nutriuntur, parum  
ob ſiccitatem, parum ob imbecillitatem altera-  
trix potentix. Iam digeſtio per corpus ipſis &  
tarda, & imbecilla eſt, nimirum inſtrumenta vel-  
vi torpentiū nō ob frigiditytem. Porro ad fun-  
ctiones actiuaſ calidum inſtrumentū & ſiccum,  
magis idoneum eſt: frigidum verō & humidum,  
imbecillius. Reliquę dux coniugationes me-  
dium inter has locum obtinent. At verō ſi cra-  
tes ipſas ſpecies, naturaliter frigidū & humi-  
dum corpus minime deprehenderit: quantū ob  
affectum præter naturam, talia reperiſſit con-  
tūgent. In vniuerſum igitur, frigidū vbiq; eſt debi-  
lius & torpidum, ſiue humori, ſiue ſiccitati iun-  
gatur. Haud aliter inter naturales potentias, re-  
tentrix robuſtior quidem videtur in andioribus  
calidioribq; inſtrumentis: imbecillior verō, in  
humidioribus frigidioribq;. Similiter nerui,  
tendones, ſyndesmī, & muſculi, quantō ſicciores  
tanto robuſtiores evadent: niſi adeo modum ex-  
ceſſerint, vt ob duritiem vix ſpecti poſſint. Nam  
ſi ſic ſint affecti, coerpiunt ſpalmō. Contra na-  
turalia inſtrumenta, quō ſunt humidiora, cō ſunt  
ad nutrīcātionem magis idonea, vel ſi ad extre-  
mam humiditatem pervenerint: ad cōcoctio-  
nem verō nō ſunt aptiora, nec ſtipſa, nec andio-  
ribus, quibus ſimilis adſit calor: niſi ſiccum ali-  
quando cibū exhibeas inſtrumento ſiccō & ſqua-  
lido, nō liberaliter ei tribuas humiditatē. Cate-  
rūm & ad digeſtionē per corpus, & ad excrecio-  
nes, corpora admodum dura, ineptiſſima exi-  
ſtunt: quod laud facile vel dilatantur, vel cōtra-  
hantur: quorū alterū attrāctionē, alterū excre-  
tionem molitur. In ſumma verō, calor auctus ad  
omnem alterationē ellicacidiſſimus eſt, niſi ad tan-  
tam, vt colligat, vtiementiam increuerit. Siccitas  
ad robur & firmitudinē coſert, tñ ad cō ſi-  
cruda, vt corpora rigida, immobilia, ac friabilia  
efficiat. Humiditas ad nutrīcātionem quidem  
miſeric facit: ceteris verō functionibus omni-  
bus ad verſatur, excepta qua corpus augeſt. De-  
inceps autem de fluxionibus à cerebro oriundis  
aliquid etiam dicamus. Deſtillationis igitur &  
gravedinis

Colligatio  
partis quibus  
modis ſoluitur.  
Rem ſaculat

Aqua inter co-  
tem quomodo  
generatur.

Syncope quid,  
Sudores critici  
robustas vero  
amittant.

Sudores retinē  
edorem & cito-  
rem eius, quos  
portant, ſuave-  
re.  
Sudores tunc ni-  
mi ſtatu, tum  
ſuppreſſi, cau-  
ſa

Effluvia partis  
ileſa, ſanctis  
impedire non  
poſſit.  
Calor vicinas  
res omni ma-  
xime alterare  
poſſit.

Calidū & hu-  
midum corpus  
quancelerius  
proprio ſibi ab-  
ſimile aſſimi-  
lat.  
Frigidū ſi ſicca  
corpora cui non  
trahatur inſu-  
ſtitiunt.  
Conſecutio.  
Nutritio.  
Appaſio.  
Adheſio.

Parti vim reſi-  
ſtentiā habent  
impulſionem,  
expulſionem  
non admodum  
fortem.

Parti quibus ſe-  
culatibus ſu-  
perant, ut  
quibus ab eis  
ſuperantur.

Parti iuveni-  
ſſis, calidū de-  
ſerunt.  
Nutritio ma-  
gis ſimilis,  
tamen cur ſit  
ad nutrīcā-  
tionem corpus  
maſt efflu-  
vium ſeruat.

Adheſio ſimilis  
alio quā  
ſeruat quā  
ſimilis.  
Frigidū & hu-  
midum a natu-  
raliter nullum  
corpus reperi-  
tur in acribus.  
Frigidū vbiq;  
eſt debiliſ-  
ſimum.

Naturalia in-  
ſtrumenta, quō  
ſunt humidiora,  
cō ſunt ad nu-  
trīcātionem ma-  
gis idonea, ad  
cōcoctio-  
nem verō  
andioribus,  
quibus ſimilis  
adſit calor.

Qualitatem  
quā in quibus  
ſunt effluvia  
ſanctis, ut  
conſecutio,  
nutritio, &  
appaſio.

Coryza  
Coryza

Defectio est  
defectus in vi.  
Gravitas est de-  
fectus ad na-  
m.  
Gravitas est ad  
fuerit deflexa.  
Vox.  
Asinidus.  
Peristoma.

Vires corpus  
quod causis du-  
rari possit.

Vires videri  
mores cruditatis  
et.

Vires quibus  
in corpus plus  
aut minus  
vires pro-  
ducunt.

Causa mulie-  
ris.

Tragifera est  
virescentia  
tunc virens  
pudens et fla-  
vitas spiritus  
vires.

Gravitas spe-  
cialis.  
Calorem vici-  
tudinis videri  
mores.

Ingrata portio  
in quibus causis  
mores.  
Symptomata autem  
quodam modo  
in et vici-  
tudinis  
et quod mores.

gravidinis (hæc coryza illa Græcis catarrhus di-  
citur) cerebri causa existit: vt pars quidem si-  
milaris vel à frigore, vel à solis ardore in inter-  
perem adacta: vi instrumentum vero, quatenus  
infestatur à plenitudine. Cetera destitutio sit, si  
ad os excrementi defluunt: grauedo, si ad na-  
res quemadmodum & rauceo, si ad fauces decu-  
bat. Quod si fluxus humorum invadat, aut vult  
pariet, aut ipsum in tumore attollet. In glandu-  
las que ad sinu oris vtriusq; adiacet, si decumbit,  
aut adas procreat: sicut & peristomia, invadens  
en quibus illis proxima sunt. Ac defertur quidē an-  
xo à capite nonnunq; in ventrē, nonnunq; in alpe-  
ram artici, vtrilibet maxime nocens. Quod ve-  
ro ad vteri corpus spectat, si solida fuerit aut du-  
rum, causa est, cur supprimatur menses. Duratur  
autē vel illico à primo ortu, aut tractu temporis  
post ipsam generationē. videlicet ob intemperie  
aut affectus alios præter naturā. At intemperie  
vteri interdū à natura oritur, interdum sequitur  
morbos, perinde ac densitas. Detinentur etiam  
nonnunq; menses, ob materiā ipsam vacandam,  
vbi vel crassa est, vel viscida: necnon vbi à crasis  
humoribus vala, quæ ad vterum descendunt, ob-  
struuntur. Ad hæc, vixus nihil omnino exernit,  
ob multas excretiones, & viciū tenuē, & cdm  
ad alias partes repunt humores. Minus exernit  
se quo, ob easdem causas, sed remissiores. Plus au-  
tem, ob distensū oculum, & viciū o pipari. Cate-  
rum depravate vteri fluxiones (quod sympto-  
ma fluxus muliebris dicitur) hinc expurgatio per  
hanc partem vniuersi corporis. Ac talem tem-  
perie relictū quod exernitur, quale est quod  
in animali redvndat. Est & aliud ex vtero deprava-  
tum profusū, ob affectum aliquē ipsum in se  
stantem eveniens. Insuper interdum cohibetur  
menses sanguine, ob robustas vires in alias par-  
tes irrumpentes. Ad hunc autē sermonē pertinet me-  
minisse mulierum minime speratū, quibus vte-  
ri meatus coarctat. Iam præcipuus est, cū invi-  
to intumescit inflatq; masculinū pudendum:  
causā symptomatis causā existit statulentus spiri-  
tus. Porro gonorrhæa si pudendo non inteno  
accidit, retentis facultatis in femuribus va-  
sis imbecillitatem sequitur. Si vero inteno pu-  
dendo eveniat, cōvulsionē quodammodo erit affe-  
ctus nimis. Coloris viciū nudum (vt summa-  
tim dicam) faciunt succi à sua naturali specie ab-  
errantes, aut in profundum subeūtes, aut cutem  
veluti illucunt. Particularum vero causæ, ob quas  
succus ad huiusmodi tum morus, tum affectus  
pervenire oportet, sunt affectiones animi: aeris  
nos ambientis vel ad calorem, vel ad frigus muta-  
tio: corporis affectus vel calidiores, vel frigidio-  
res: item sanguis vel paucus, vel plurimus, tum  
foras elatus, tum intro revulsus. Huc accedit etiā  
quodlibet humorum vitium, ad suam ipsius speciem  
vniuersi corporis colorem permuratur potens. A  
naturalī autem figura defleunt partes, immo-  
dicē vel replet, vel inanitz, vel à propriis sedi-  
bus deturbatz, aut revulsæ. Vt autē hunc iam cō-  
mentarium claudamus, operæ precium mihi vi-  
detur addere, quænam symptomata sibi mutuo  
& necessarii succedant, & quæ item nos neces-  
sariū. Ignorū it quod sit, vniūne ex causa fiat, an

ex pluribus, considerandum. Nam si ab vnica  
causā fiat, necessarii causæ efficienti succederet:  
si à pluribus, non necessarii. Symptoma itaque  
quod ab vno alio dependet, necessarii cōsequi-  
tur illud. Vbi verò aliz quedam causæ ad secun-  
di symptomatis generationem accedunt, ipsum  
non necessarii ad primū cōsequitur. Negi enim  
cruditatem (gratia exempli) infansio ex necessa-  
te sequitur, vel mordicatio, vel nauſea. quanquā  
tum horum, tum reliquorū symptomatū ferē o-  
mnium nullum est, quod non aliquando crudi-  
tates sequi videatur. Verū & cruditas magnitu-  
do, & differentia, tum hominis natura, tum sen-  
sus vel acutus, vel obtusus, item singularum cor-  
poris partū & robur & imbecillitas facit, vt a-  
lias aliud symptoma cruditatē sequatur. In sum-  
ma verò, quæcūq; pars cruditatē fecerit, illa no-  
xam percipiet, quæ maxime imbecilla fuerit. Pro-  
inde nullū symptoma necessarii sequi cruditati  
tem, possumus assuecere. Vbi autem alimētum  
minime per corpus digeritur, siue priuatio, siue  
imbecillitas fuerit actionis, atrophiam neces-  
sarii inducet, quemadmodū in lingulis parvulis  
atrophiam potenter noxa. Hæretica expulsi-  
facilitas circa excrementa, aut sanguinis po-  
tentia aberratio, necessarii producti prauī colo-  
ris symptomata.

Cruditatis cau-  
sam nonſan-  
dam  
symptoma se-  
quitur.  
Atrophia sequi-  
tur nonſan-  
dam alimentū  
defectu.

## GALENI PERGAMENTI de causis procatarctæ lib. vñus.



Vas procatarctæ, siue externas,  
siue principientes appellat, vt ma-  
gnus calor, frigēve ambientis, aut  
etiam aliquis animi affectus, invali-  
da foliū corpora cōmouent: ac pro-  
inde à nōnnullis nō causæ, sed morborū occasio-  
nes vocant. Videmus etenim mille simul in thea-  
tro sedentes, eorum numero quatuor duarū  
xat ætati, & in eis à febre vnus solus arripit:  
quod nuper familiarī nostro Menandro conti-  
git: quem nos secunda die inuisentes, lussimus  
caput rosaceo foueri, mox dormire, postmodū  
impensē lauari: ac sic tandem est restitutus. Alios  
etiam complures, ob æstum & labores febrientes,  
reclamantibus ceteris medicis, plurimus bal-  
neis ac victu humidiori vix, similiter persua-  
uit. Non desunt tamen, quī varia connectentes  
sophismata, quas nuper causas procatarctæ  
diximus, eas morborū causas esse inficiantur: q  
videlicet nec semper, nec omnia corpora ledant.  
Qui quidem nō secus habendi sunt odio, ac illi,  
qui spinas & hamos in viis, per quas sunt transi-  
turi homines, seminant. Nos itaq; horum impe-  
diuntur non nulla iam rescindamus, aliqua  
emendamus, alia conteramus, vt antiquam viſ,  
quæ non ad ciuitatem, sed ad artem omnibus ci-  
uitatibus vtilissimā dicit, purgemus. Quod igitur  
tum frigus, tum immoderatus calor, & cōtri-  
stare, & morbos gignere soleant, id indies natu-  
rarum nos docet: cū nimirum vel ipsa ani-  
malia bruza, soleant loca & regiones mutare, vt  
æstate quidē calorem, frigus verò hyeme de-  
clinēt. Quod si hæc noxia quidem, nō tamē mor-  
borū esse causas facit, q nec semper, nec om-  
nibus noceant, iam nō de re, sed de nominibus

Procatarctæ  
causā variatā  
rationē respo-  
ndere solum.

Menandro ut  
infesto febri-  
tem, quo ratio-  
ne sanari Gal.

brevis menses  
regulæ, vt a-  
lium & frigū  
viciū.

disputat: quantum ne sic quidem effugere poterit quin convincat, saltē illas esse causas nōcūmen-  
ti illi, quibus nocent corporib. Sunt porro duæ  
primæ causæ ac maximæ principales in vniuer-  
sum, scopus videlicet, siue finis, cuius gratia hūc  
omnis quæ sunt: ac præterea id, à quo ea sunt.  
Hæc dignitate sequuntur tertia & quarta, instru-  
menta nimirū quibus, & materia ex qua. Etenim  
in humanis artibus, nisi causæ omnes cōspirent,  
nullus vnus effectus absolui poterit. Nam rursū ali  
qua esset lecticæ voluntas, nunq̃ faber illā cōstrue-  
ret. Sed si aliqua sit illius voluntas, careat autē do-  
labra, ferrea, terebello, aliaque supellectili instru-  
mentorū, nec sic lecticā cōagumentabit. Et si hæc  
illi omnia præsto sint, & mox ligna deficiat, ne-  
gata componetur lectica. Sed nec si instrumenta &  
materia parata sint, & voluntas urgeat, absit autē  
artifex, quicūq̃ vnquam compingi possit. In iis ta-  
men artibus quæ casu fiunt, interdum finalis  
causa desideratur, tūc ea nullius gratia fiant. est  
enī vbi id per quod fiunt, abest. At nihil inveni-  
re licebit, quod materia nō egeat, ex qua cōstet:  
& efficiētia, à quo fiat. Semper siquidem est ne-  
cessē, vt sit cōueniens alicuius patientis, quod vi-  
cem materię subeat. & alterius quod circa ipsum  
agat, & efficiētiens rationem obtineat. Hoc autē  
nōnunq̃ instrumento eger, si alicuius gratia o-  
peretur. Interdum sine nutrimento agit, vbi nul-  
lus gratia, neq̃ ex proposito agit. Vbi igitur ex  
frigore vel aestu aëris ambientis aliquis leditur,  
aër ambiens dicitur causa effectrix: materia, corpus  
affectum. Nullus itaq̃ effectus oriri poterit,  
nisi efficiētiens & materia iungantur. Vnde oportet  
vt læz vtraq̃ aliquid ad generationē rei con-  
ferat. Quæ autem ad rei generationē cōducunt,  
merito causæ appellandæ sunt. Repere autem  
licet præter iam dictas, etiam alias causas, acci-  
dentales tamen: veluti interdum spaciū mi-  
nimè impediens, quo faber indiget, vt circa li-  
gnū agere possit: idque nōn quā artifex est, sed  
quod corpus, quod alium ab eo qui continet ma-  
teriam circa quam operatur, occupat locū. Hæc  
siquidem ex accidenti dicuntur, & tanq̃ ea sine  
quibus nō. Solidum quippe corpus interiectum  
inter fabrum & lignū, impedimento est, quo mi-  
nus operari artifex possit. Quod si de medio tol-  
latur, ex accidenti consequitur, vt aëris illius lo-  
cum succedat, cū nūquam in hoc orbe vacuū  
posuit consistere. Proinde cōstat fabrū aëre ex  
accidenti indigere. Similiter ambulantis causæ  
sunt, ipsius voluntas, vis animalis, atq̃ etiā crura:  
ad causæ sine quibus id fieri nequit, aër circumfu-  
sus cedens, paumentūq̃ reuolvens. Quod autē  
ait Erasistratus, si refrigerari febricitandi causa  
est, qui magis refrigeret, ille magis febricitabit:  
maximè absurdū videtur. Nam si effectrix causa  
ipsa id ab ipso patiente apro efficiere possit, qui ma-  
gis refrigeraretur, magis quoq̃ febricitaret. At  
si frigus non omni corpori lebrē adferre potest,  
sed illi tantū, quod ad eam excipiendam est habi-  
le, vtrū non amplius erit necesse, vt qui frigue-  
runt magis, magis quoq̃ febricitent: imò facile  
nōnullos reperas, qui ne semina quidem febris  
cōcipiant, sicut tamē attoniti, vel torpidi, vel tre-  
mulī, vel cōvulsi: vt accidit Alexandro, dum æthi-

no tempore in Cydno, Ciliciæ flumine, se laua-  
ret. At verò nec illud etiā reuera cōfiteri poterit,  
qui magis febricitat, magis quoq̃ ledatur: sicut  
neq̃ hoc etiā, vt si magis ledatur, magis febricitat:  
cū aliquando cōtingat aliquē magis ledi,  
qui tamen nō modò non magis, sed nec omnino  
febricitat. Idem etiam dicendū est de labore ple-  
nitudinēq̃, & alius id genus causis, quas eodem  
paralogismo, ab ordine procatarticarum febrium  
causarū exterminabat. Sed cur interim operā lu-  
dimus, dum hæresim Erasistratorū cōuellimus,  
qui asserunt patriam potius prodendam esse, q̃  
propriū dogma? Adeo enim stupidi simul & per-  
tinaces sunt, vt etiam omnes febres à phlegmo-  
ne exoriri cōtendant: tōtūq̃ nec potū frigiditas  
lis qui ardenti febre tenentur, cōcedant: cum ta-  
men ea opportune exhibita, nisi obstat viscerum  
inflamatio, ægri cōfessum sudent, liberiq̃ à morbo  
reddantur. At si in discernenda hypostasi pu-  
rulentia, ab ea quæ in sanis, & post solutas febres  
cōspicitur, essent exercitii, convincerentur.  
Quippe infans, & vbi febres solute fuerint, id  
quod residēt, album est, nec factorem habet, nec  
colorem, nec leuiorem, qualis cernitur vbi ple-  
gmone vi suppuratio nem cōversā soluitur. Sed  
hæc etiā est lumina impudentia Erasistratorū, quod  
cum fateatur repletionē plethoram efficere: a  
verò, sanguinis paremprosin ad arterias: atque  
hanc deniq̃ phlegmonem: nolit tamen concedere  
re, repletionē phlegmonis causam existere. Nam  
& non parī modo dicemus, quod qui plaga ho-  
mini illata venas colli secuit, non extitit illi cau-  
sa mortis: quoniam causa proxima fuit, non illi  
qui percussit, sed potius effusio sanguinis.

# GALENI PERGAMENI de plenitudine, liber vñus.

Scvī nullū est quod nostra tempe-  
state in ore ferret omnium medicorum  
crebrius verset, q̃ plenitudinis vo-  
cabulū: nec aliud facile inuenias,  
quod magis ab eis ignoretur. Vrautē  
eoa qui ignoranti tenebris occurrunt, quicūq̃ ab-  
surdū tueri dogmata, impræferantur miſſos fa-  
ciamus, cum ingenuis verò ac ventatis amore  
flagrantib. cōfabulemur: duas in vniuersum no-  
tiones, relationē plenitudinis proponamus:  
vnam quidem, secundū robur viresq̃ illius qui  
tale plenitudinē deserat, alterā, secundū excipien-  
tis vasī capacitātē. Dein verò sedulo pericrute-  
mur, quænam sint vniuersæ animantis vires: & quo  
modo plenitudo, quæ secundū earū vñāquāq̃  
consistere potest, sit & agnoscenda, & curanda.  
Postmodū, quorū sint eorū humorū species, qui  
vel vires aggrauent, vel à vasis cōnneri non po-  
sint. Igitur in libris de Placitis Hippocratis & Pla-  
tonis satis à nobis monstratum est, q̃ alia ea vis  
sit, quæ in venis cōsistit, alia quæ per arterias, si-  
cut & alia quæ per nervos diffunditur. Vbi etiam  
docuimus, cor \* facultatis arteriarū fontem argi  
originē esse: neruorū autē cerebrum, sicuti iecur  
venarū. At in libris de Elementis ostēdimus, sub-  
stantiā eorū omnium quæ generationi & interitui  
obnoxia sunt, à quatuor primis qualitatibus im-  
mutari: & ex earum certa quadam temperatūra,  
omnium

*Causa prima  
& maximi  
principis in  
vniuersum,  
sunt sine causis  
gratia sunt o-  
mnia quæ fiunt,  
et præterea id à  
quo fiunt: quas  
philosophi sequuntur  
religiosa, nempe  
instrumenta et fi-  
mul atq̃ mate-  
ria.*

*Effectrix nullus  
absolui poterit  
in humanis ar-  
tibus, nisi cau-  
sa in vniuersum  
non conferret:  
id quod ex quo  
quæ formā cō-  
tingunt, necesse  
est necessarium  
videtur.*

*Omnia enim  
materia ex  
qua et efficiētia  
à quo fiunt.*

*Causa appella-  
da sunt, quæ ad  
rei generationē  
cōducunt.*

*Causa acciden-  
talis sine quibus  
operari non po-  
test.*

*Vacuum nūq̃  
quam datur.*

*Frigus illi tan-  
tum corpori pro-  
ficuum asserere  
potest quod ad  
eam excipien-  
dam est habili-  
tatem: sed non  
sui corre-  
ptio. Item in  
Cydno, Ciliciæ  
flumine, se la-  
uauit.*

*Erasistratus in-  
ferunt, patet  
potius produ-  
dam esse, quā  
proprium do-  
gma.*

*Frigida oportet  
habere in quo  
ardens sicut in  
vniuersum de-  
bit, ab effectu  
non laborat.*

*Peris hypostasi  
sicut dicitur.*

*Plenitudo dicitur  
desuper, vñ  
exterioribus,  
quæ accidet  
alioquin non  
velit illam  
tunc in capiti-  
tatem.*

*Cor est ardens  
non argens.  
Cerebrum dicitur  
non ardens,  
sicut dicitur  
Hippocriti.*

essentiam fa-  
cultatū corpus  
utrumque regu-  
m, et si forte  
quatuor qualita-  
tibus cōstituit,  
et si proprietas  
tempera-  
mentum.  
habetur et si  
sensu affectus.

Agere in spi-  
ritum nihil po-  
test, si forte nec fo-  
luntate.

Idem animus  
diffinitur.  
Concreta vi-  
ditur dura, re-  
sistentia: ut  
pauca, quae  
nihil ex colli-  
da resistunt.  
Plenitudo diffi-  
lis aliquid, ad-  
dunt motu pa-  
sa.

Plenitudo gra-  
uitatis affectus  
diffinitur, ad vi-  
res sensum re-  
ferunt, minime  
aut ad na-  
turalem.

Plenitudo in  
vita vasa reple-  
tur aut in re-  
sistentia.

Plenitudo in-  
vita vasa reple-  
tur, quae ratio-  
ne dependere  
quatur, neq. for-  
tis Galenus,  
neque ab alio  
seruatum repe-  
rit.

omniū corporū substantiam, ac proinde virium  
earum essentiam, quae corpus nostrū dispensant,  
constare: quippe quae non sit, nisi ipsius tempera-  
menti quaedam proprietas. Porro vix ipsa siue fa-  
cultas, causa effectus existit, non materialis sub-  
stantia, panbilitate. Facultas itaq. erit alius a-  
ctionis causa, quam mox necesse est esse morum  
ab agente in id quod patitur. Sicvī & affectus  
qui in patiente est, motus erit ab agente, in rem  
patientem. Vnde vires suam quidem ex alterius  
comparatione nonionem habent: essentiam verō,  
ex habitudine ad alterum. Quod autē in se-  
ipsum aut agat, aut aliquid efficiat, omnem men-  
tis captum excedit: sicvī enī, quod seipsum ali-  
quid cōnneat. Quare non modō ex Herophi-  
leis multū, sed & ex Stoicis iuniores, dum conten-  
dunt ostēdere, quod spiritus atq. ignis & sese, &  
cetera elementa cōtineant, terra verō & aqua ab  
iis cōtineantur, nullā demonstrantē adferunt.  
Nos quippe evidēntissimē cernimus, ita nihil ab  
igne contineri, ut potius ab eo vniuersa soluan-  
tur. Etenim quod durum est, tenētisq. ac  
densum, vel primo aspectu posuit continere vi-  
deri possit: contrā verō, quod molle, cedens, ra-  
rimūq. est, altero indigere ad quod cōtineatur. Dica-  
mus igitur, quod enīcūq. prae multitudine aliquid  
nimis distenditur aut disrumpitur, affectum ta-  
lem ad continentia vasa spectare, nō verō ad ali-  
quas vires: cum verō grauatur, ad sensitiuē po-  
tentiam. Nam neque id ipsum omnino ad vires  
pertinet omnes, \* cum naturalis potentiae hae  
grauitatis affectus nō sit. At verō plenitudinis gē-  
nus, quod ex loci continentis capacitate cōmen-  
suratur, non modō in animantibus reperitur, ve-  
rumetiam in rebus inanimis, quemadmodū In  
vestibus, vineculis, pellibus, vasisq. fictilib. Rum-  
pitur siquidem omnia haec, vbi multa replen-  
tur statuosā substantia. Porro cum quatuor sint  
naturales potentiae, attractrix, retentrix, altera-  
trix, expultrix: alia sunt inquirenda indicia ad co-  
gnoscentiam plenitudinis quae secundū earū sin-  
gulas accidit: nam nec grauitas in istis sufficere  
poterit. Etenim imbecillus ventriculus, vi sensi-  
trix maxima est praeditus, quā sibi grauiā senti-  
re possit. Iam quibus signis artēriarū plenitudi-  
nem, quae ex collatione ad earū vires cōstat, probe  
deprehendere liceat, in cōmentariis de pulsib.  
exposuimus. Venarū verō nec ego signum  
aliquid vniquā, quo id ex scientia haberi possit,  
praescripsi, neq. ab alio quopiam literis manda-  
tum reperire potui. Vt autē de plenitudine agamus,  
quae signillam quascūq. particulā occupat,  
sciendum est, ea membra quae parū sentiunt,  
vel sunt sensus omnino experta, nequaquam parem  
cum ventriculo aut vesica, excrementorum quae  
in ipsis congelata sunt, sensum habere: sed aut om-  
nino exiguū, aut penitus nullum: exiguū quide-  
m, vbi maxima plenitudo adfuerit: nullum, vbi  
illa non multa fuerit. Nam In pulmone, ieco-  
re, renibus, atq. in nōnullis ossibus, alius nō-  
nunquam oboritur alius pondera sensus: quāvis  
certē potius ad membranas referri debet, q. ad  
eorum viscerum carnes. At secūdu cerebrum,  
per q. manifestum sui sensum grauitas interdum  
excitat. In partibus autem sensu vacuis, nullus

potest non modō grauitatis, sed nec alterius enī  
symptomatis sensus haberi. Atqui sensu carere  
videntur nonnulla ossa, adeps, & glandulae quā-  
dam: praeterea medullae omnes, sensus expertes  
sunt. Cerebrum tamen atq. spinalem medullam,  
nōnulli in sententibus particulis collocant. Tu-  
tius tamen poterit quīpiam de carne, quā gib-  
ba lecoris pars cōstat, asserere, quod absq. villo  
sit sensū, cum nervus illi nulla ex parte inferatur.  
De parte autem illius causa, facile dubitatio exorietur,  
cūm nervi qui iecori iuxta portas distri-  
buuntur, adeo sint exiles, ut contexere solam  
membranam videantur. Grauitas igitur evidēnti-  
simū signū illius est plenitudinis, quae ad vim  
sensitiuē spectat. Nam si in aliqua particula quae  
sensu praedita sit, vlla humorū multitudine aggre-  
getur, ita ex illam grauitatis sensus quocūq. excita-  
tur. Nec tamen quonēscūq. pondus loco aliquid  
insidet, ibi etiam humorū multitudine aggrega-  
bitur: quandoquidem si facultas sit imbecillior,  
poterit vel ex ipsius solidioribus membris qua-  
uari, quemadmodum In corporibus resolutis  
contingit. Si quidem praeresolutione imbecillio-  
ribus redditis musculis, sentit ille qui resolutus  
est, in motu grauitatem insignem: ita tamen, ut  
infirmus musculi sibi ipsi minime grauis videatur.  
Grauitas quippe ab altero, & in altero, gigni-  
tur. Potest itaq. musculi fieri se ipso invalidior,  
imbecilliorq. ut verō sibi ipsi sit grauis, id fieri  
nequit. Agē igitur, maioris perspicuitatis gra-  
tia, ponamus nunc ā spiritu per neruum delato,  
moueri musculum: ā musculo vero, tibiam pri-  
mam, cui is inferior. Qua mora, articulus in ge-  
nu, vbi crux vniuersum cōmititur, subinde etiā  
moueatur. Quibus sic constitutis, quisq. verē as-  
serere poterit, & musculum, & totam tibiam, in-  
valido spiritui esse oneri. Quocirca minimē po-  
test exquirere dignosci, quid sit id quod primū  
grauet, quodq. primū grauetur: nisi prius sciat  
id, quod primū in nobis vnaquāq. mouet par-  
ticulam. Ad quod quidem vir tum in discernen-  
dis potentiis, quae nos gubernāt, peritus, tum In  
anatomie exercitiis, desideratur. Iam verō, ut  
nulla est necessitas illis, qui In obsequio functio-  
nibus valeantioris, q. prius foret, effecti sunt, hu-  
mores aliqua ex parte accreuisse (quod Erasistratus  
existimabat) ita perne cessariā videt, ut si qui  
validiores actiones habeant, eis viriū robur ac-  
cesserit. Actio nō siquidem fortitudo, ad viriū ro-  
bur cōsequitur: sicvī & robur viriū, fortitudine  
comitat functionis. At ā sanguinis multitudine,  
cōsequitur nulla necesse est futura: cum neq. si  
is maior sit copia q. antea, validior ex necessitate  
futurus sit homo: neq. si minor, imbecillior:  
sicvī nec si aequalis sit, necessum est illū viribus  
eodē se habere modo. Liqueat itaq. actiones vali-  
das propriā esse ac inseparabilem viriū vigentiā  
notam, sanguinis verō aut atq. nequaquam. Porro vbi  
adeo tensionis sensus, nec tamē exercitatio praee-  
cesserit, ibi necesse est plethoram esse cōgētam.  
Sanguis autē auctus, nō tamē eō, ut venae adhuc  
tensa sint, non dum plethoram absoluit. Vt vero  
tensio, copia humorum propria vasa tenden-  
tium affinis est: ita vicerofus sensus, acrem sequi-  
tur qualitatem humorum, potestq. vel ex solis

Sensu vacuis  
particulis, nec  
grauitatis, nec  
sensu sympto-  
matu vbiū pos-  
sibilem perce-  
pere.  
In illa vniuersa  
insensibilis:  
lecoris gibba  
in singula ossa.

Gravitas est  
certum indicium  
placitū  
non quod ad vim  
sensitiuam spec-  
tat.  
Plenitudinis ad  
vires nō requiri-  
tione necessaria  
magna humo-  
rum collatione.

Gravitas ab al-  
tero & in altero  
gignitur.

Assensum fieri  
tudo ad viriū  
robore cōsequi-  
tur.  
Robor viriū,  
fortitudine com-  
itatur sua-  
tionem.  
Actiones vali-  
de, non aucti  
sanguinis, sed  
vigentiū vi-  
rum sunt in-  
parabile nota.

Virescentia sensus  
acrem sequitur  
qualitatem hu-  
morum.

quandoq; motionibus gigni. Si igitur particula que distenditur, pariceps sensus fuerit, necessum est, vt quæcunq; fuerit ea res, quæ eò ipsam distendit, vt capi oqueat, tensionis sensum in animante excitet. Atq; is affectus qui tuos mēbra occupat, tensio appellatur. Quæ si plenum augeatur, erit etiam necesse, vt quod tendit distendatur. Cæterū nō tantū ex ipso sanguine, sed ex quocunq; substantia humida & statulenta, pos-

*Tensio possunt particula à quocunq; substantia humida & statulenta.*

*Indurcationem humorū quæ sunt secundum magis et minus differentia habent.*

*Acres humores particula exacerati admodum, horrore atq; rigorem excutit.*

sunt partes tensio affectu occupat. In vniuersum autem, id quod grauatur, multum: quod verò pungit, aut mordet, molestem esse dicemus. At plures reperiunt humores mordaces, qui partim in nobis gignantur, partim accedat extrinsecus, omnibus est compertū. Quorū quatuor per se magis & minus differentie extant. Etenim qui modicè mordent, pruritū inferunt, vñ scilla: qui verò magis, rodunt, vt cypa. Sed si aliqua præterea adhuc his fuerint acriora, horrorem excutiant. præcipue quidem, si paraculis admodum an-

tur ex viceribus: prorogato verò, atq; aucto horrore, symptoma illud rigor vocatur. In nobis quoq; mordaces gignantur succi eadem ratione, per has quatuor ideas distincti. Quorū sanè pruriginosi illi sunt, qui modicè exustior acres: vicerolus verò sensum pariunt, qui his sunt mordaciores: qui autē hos quoq; mordacitate superāt, horrorem: scitvi qui præterea iam mordacissimi sunt, his rigorem inducunt. Affectū igitur vicerolus, ex succis mordacibus gignitur. Grauitas autē à multitudine, pro viriū cōparatione. At tensionis affectu, & ipsa quidem humorū multitudinem sequitur, non tamen per collationē ad vires corporū cōuenientium, sed tantū ad capacitatem qua connectuntur illi. Ad hanc ergo affectionē vltimam, tensio tantummodo pertinet: vt ad secūdū grauitas. Vicerolus verò sensus, neutrius est propria nota, nec plenitudinis nuper dictæ, nec secundæ, quæ vires respicit. Ex symptomatibus itaq; alia ad plenitudinē pertinent, quæ respicit vires alia ad eam quæ in infusione consistit: nonnulla præterea nō sunt simpliciter plenitudinis nota, sed huiusce plenitudinis. Quædam verò nullius quidem plenitudinis, sed humorū potius prauitatis & corruptionis sunt signa, aut virium imbecillium, aut tumoris solidorū corporū. Ergo affectio tensiua, nisi exercitationis sit comes, pluri-

*Vicerolus sensus nouitū plenitudinis est propria nota. Symptomatum differentia varia.*

*Tensionis affectus quod indicat.*

*At tamen languor, vires in validiores efficit.*

mam omnino substantiā in corpore quod sensu præditū est, contorneri inuincit: nō tamen qualis sit ipsa substantia, ostendit: nisi alia etiam indicia accedant. Affectiō verò imbecillitas, vires invalidiores ostendit: quod mouens causa impeditur: quemadmodum accidit in languidiori manuum motione: id quod plures constitutiones consequi potest. Nam si in aliquo carneū ac adiposum particulariū genus, vñbus tamē eisdem finēs seruantiūbus, adaugeatur, necesse fuerit motiones imbecilliores fieri, moto nimirum aucto, moeente verò æquali permoeente. Sed si aut vñus quispiam ex humoribus, aut omnes etiā simul excreuant, nec vires aliquoq; simul vñ augeatur, sic quoq; necesse erit actiones in validas reddi: nec secus si humores simul & effusiores creuerint, nullo autem in viribus incremento factū: quemadmodū & si pares illi se habuerint, vi-

res verò imbecilliores evadant. Fieri etiā potest, vt & dematur de viriū robore, & humores vñ cum parenchymate, seu transusione (quæ impresentiarū molē carnis, pinguitudinis significat) vel plures hant, vel pauciores. Horum itaq; vtrumvis eveniat, necessarii evadent actiones imbecilliores. Arbitrari autē quidū solidiora corpora opime nutrantur, posse nonnunquā edī imbecilliorē motum, hominū planē est minimè perpendentiū, faciliatē per vniuersa solidiora corpora permeare: sed perinde ac fistulas, aut cauales quosdā, sic spiritus venas & arterias constituentiū. Hallucinantur etiam, qui inter plethorica indicia, corporis tumorem reponunt: quippe venarū tumor poterit forsan esse plethoricū signum, inseparabilēq; vbi corpus ita se habuerit, vt oculus internus externus, neq; lux illis caleant magis, nec præterea calor immodicus vniuersi corporis detineat. Carnis autē & adipis moles, eorumdem multitudinē indicabit: nō tamen plethorice plenitudinis quæ desiderat evacuationem, signum exiit. Cum autē syncerus sanguis nunq; ita reperitur in venis, quā illi aliq; aut bilis, aut pituitæ, aut feroli excrementi permistum sit: perinde sanè est dicere, sanguinem ipsū augeri, ac si etiā humores dixeris. Venarū itaq; tumor, sanguinis plenitudinē indicat, si tamen is à nulla gignatur externa constitutione prius in valdecente, aut ex fusione, aut ex ebullitione. Cauendum præterea erit, ne particula illa declius fuerit, ne paulo ante cæteris vehementius mora. In summa verò, plenitudo à venarum tumore indicabitur, si omnes corporis partes eandem constitutionē seruauerint, idq; cum medicocti calore. Cæterum tumor imple, tum tensio, cum à singulis humoribus, necnon à statū excitari possunt, plenitudinis quantitatem, potius quā specificas differentias declarant. Siue igitur sanguis eò in incrementis pervenerit, vt citra tunicarū tensionē, naturæ modum excedat, corporis grauis videatur: siue ita sit auctus, vt vasa continenda distendant: vtrunq; certē & multū, & plenitudo dicitur: sed prior illa, secundū vires, hæc penes vasa vocetur. Tam rubor, si nec ex sole, nec ex balneo, nec ex immoderato exercitio, neq; ex calore, nec ex ira verecundiæ, neque ex alia deniq; occasione extrinseca oriatur, sed vndeque corpus æqualiter fuerit affectū, sanguineque plenitudinis nobis indicium exiit. Omnem autem plenitudinē, quæ in venis coegeta est, faciliē motus arteriarū ostendit, ob mutam vasorum consuetudinē: nisi vbi humores contenti in venis, qm̄ aximē ferunt crassi & tenaces. Plenitudinis autem species, vbi in vniuersum illa corpus dispergitur, his notis sunt distinguendæ. Rubor plenitudinis sanguineæ attestatur: color verò sup pallidus, fluxus bilis. Cum autē pituita nimis excreuerit, in album magis q̄ pro naturæ modo, color ipse mutatur: quemadmodū in atrū, si bilis atra.

Opus tamen est, vt cum singulis horum humorum simul sanguis augeatur: aliq; nō plenitudo aut plethora, sed cacochymia potius dicenda veniat. Cæterū si grauitas vel tumor præter naturam accesserit, affectio talis, plethora appellabitur: ipsiusq; humoris vincens species, ex colore

*Focalitas per vniuersa solidiora corpora permeare.*

*Tumor corporis non tantum esse signum plethoricum.*

*Venarū tumor quando corpus in plenitudinem inducit.*

*Plenitudo secundum vires. Plenitudo secundum vasa. Rubor sanguinis, sanguine plenitudinem indicat.*

*Arteriarum motus, venarū plenitudinem indicat. Plenitudinis species quibus notis sunt distinguenda.*

*Cacochymia quid.*



*Pituita in per  
pore adesse  
sunt & p  
da.*

*Pituita in leu  
coplegmatia  
dum erat sol  
per vniuersum  
corpus exuber  
ant.*

*Pituita speciei  
dulcis, et vni  
us ex facili  
in.*

*liquet rade.*

*Vigiliis cor  
fa.*

*Melancholici  
sunt diffideli  
et propter an  
tiam tristes.*

*Pituita in ore  
vtra collecta,  
appetentiam fa  
cit, vtriusq; fa  
ciliter.*

*Melancholicus  
iuvet.  
Inferius diffi  
cultas pro ve  
na et humore  
a periculis.*

*Sanguis tem  
peratus a diuer  
sibus confusio  
ne.*

lore diuidicabitur. Sola tamen bilis nec tumo  
rem, nec pondus (quæ à plenitudine seiungi ne  
queunt) inferre potest. Nam anteq̃ ita ea incre  
scat, alia illi superventura est affectio. At si sola  
pituita augeatur (inter cuius species annuera  
tur humor qui crudus dicitur, fabamq; imitatur  
elixam, q̃ alia pituita, crassior, ac minus flarulen  
tus existens) dumtaxat in leucoplegmata solet  
per vniuersum corpus exuberare. Sunt enim &  
alia pituitæ species dulcis nempe, acida & falsa.  
Vt et ex dulci fiunt somnolenti. ex acida cum red  
vndat, famelicus: quemadmodum sinulosi, ex fal  
sa. A cruda autē, deoctr appetentia, somnolen  
tiq; etiam fiunt. Si quidem si humescat, refrigere  
turq; cerebrum, quod est sententiæ principii, sta  
tim supposita ductio oboritur: quemadmodum si  
siccecat, atq; incalcescat, in vigiliis labitur. Pro  
inde omnes qui vtraq; bile redvndant, insom  
nes degunt. Id tamen peculiare habent, qui atra  
bile cruciatur, quod diffideli sunt, atq; præter o  
mnem rationē tristes. Vigiliæ itaq; & somni cau  
sa, in cerebro ipso cōstitit: appetentiæ autē & il  
lus defectus, ad os ventriculi pertinet. In quo  
quidem si colligat pituita, appetentiones excitat:  
si flava bilis, tum sitim, tum cibi fastidiū pariet,  
dīq; fiet amarulentum. At si atra, morosi, tristes  
atq; formidabiles fiunt, & sine fin: saluūq; plu  
rimū illis scatur. atq; nonnulli eorum sanis videntur  
famelicis, in quibus nimirū atra bilis, acida qua  
litate fuerit affecta: id qd sanē contingit, vbi ipsa  
malignior est reddita. Porro vbi ea veluti fæx  
sanguinis permanet, neq; exacte est acida, satius  
fuerit illam appellare melancholicū succum: nō  
autem melancholiū, siue atram bilem. Quid ve  
ro ad pulsis pertinet, si in plenitudine flava bilis  
redvndet, tales necesse est reddi pulvis, qualis v  
bicor calsit simul & exiccat. Si atra bilis, quales  
quum frigescit & exiccatur. Si pituita, quales  
edi solent in humida frigidiq; cōstitutione. Vbi  
verō sanguis eo omnino secundum naturam ha  
buerit, nulla fiet in pulsu ab antiquo statu muta  
tio: alterantur autem, secundum ipsius sanguinis  
mutationē. At verō ex ocio & humido victu san  
guis humidior seipso redditur: extra autem, ex  
ercitatione, ieiunio, frictione, medicamento alimē  
toq; calfacitibus, necnū meraciori antiquioriq;  
vino, calidior efficitur: quemadmodum frigidior,  
ex recenti frigore. Quod si quispiam alimentis  
temperaturæ siccioris diutius utatur, quæ tamē  
alia nulla intemperie teneantur, sanguis siccior  
evadet. Sed secundum etiam varias complica  
tiones causarum, in diversas incidet sanguis cō  
positas intemperies: idque citra miscellam aliam  
in eo superantis humoris. Quid si ob aliorum  
quoq; humorū militum, illabatur in intempe  
riem, certē absq; cacochymia cōstare talis dyscr  
asia nō poterit: alias tamen octo differentiās for  
titer, sed diuerso modo, quā vbi ille solus &  
per se fuerit talis. Verū in intemperies ad so  
lum pertineat sanguinem, an ad aliquem alium  
illi humorē permixtum, ex his quo diximus, & ex  
aliis multis signis, facile deprehendi potest. Fin  
gamus igitur homini qui febre est vacuus, venas  
in tumorē atrolli, ac totum corpus rubicun  
dus evadere. Statim enim est expendendū, num

& causæ aliquæ occurrerint, ex illis quæ vim ca  
lescendi habent: & si hoc fortē videatur, periti  
terit huius rei dignotio nem tantisper differre,  
donec muno ab illis in corpore vniuerso exira  
ta cōqueuerit. Tunc autē, si qualem diximus, ta  
lis appareat, sanguinē sanē in eo abundare, indi  
cium erit. Mos verō gratiarē, tensionem, pigri  
nam ad motum, pulvis, vigiliam, somnū, appē  
tentiam, fastidiū, præcedentemq; vitæ rationē, ex  
pediri revocare ad examen, expēderēq; an aliqua  
excreto solita, illi suppressa sit, aut exercitatio  
neglecta: & an alimentis pluribus, aut plurimi nu  
merenti sit vsus: vel si post cibum se præter mo  
rem lauerit: solitiūq; sit plethoricis morbis cor  
ripi. Quibus addenda est temporis & regionis  
cōsideratio. Nam hyeme & vere, lociq; tum fri  
gidis, tum temperatis, maior colligitur plenitu  
do: minor verū locus & temporibus calidis atq;  
siccis. Sac etiam qui densa sunt cūi, frequentius  
plenitudinem colligunt: sicuti rarius, qui rara.

*Mentis ma  
ior colligitur  
hyeme & vere.*

## GALeni PERGAMENI de atra bile liber Vnus.



Anguis (qui humor omnibus homi  
nibus est nonisimus) vbi vel ar  
tēna, vel vena fuerit convulserit,  
illi cōfusiū videtur: rubens sa  
nē magis ē venis, flauior autē ex ar  
teriiis manans. Vnde cumq; autē exeat, subito cō  
crescit in grumiū: idq; nō solum extra corpus, sed  
intra illud etiam, in quōvis ipsius loco præter na  
turā cōtēntus. Igitur magna ex parte in hoc hu  
more rubescit color exasperat: & talis exacte opti  
mus sanguis existit. Apparet autē nonnūq; hoc  
ipso flauior & nigrior: sicuti etiam ex cōsistētia  
crassior atq; tenuior. Quin & videtur quādoq;  
in cōcreto sanguine tenuis quædam humiditas,  
contracta à poru, innatare. Interdū & pituitosus  
humor cum sanguine per venas defertur. Extre  
mū hæc differentie humorū nō mutant sangui  
nis appellatiōē. Est & alius quidam humor san  
guis crasso & nigro perisimilis, qui tum per vo  
mum, tum per directiōē excernitur: nō tamē,  
et si diutius aëri ambiēti expositus fuerit, umi  
no densatur. Atq; hic ipse humor aliquādo à vo  
menibus acidus simul & acerbus sentitur: quan  
doq; verō nullam quāritatē manifestam præ se fe  
fert. Cum autē sanguis maiori ex parte dulcis  
esse videat. Pituita autē insipida, vel vti aqua: certē  
si quando in humores sentiuntur salis, morbo si e

*Sanguis vtra  
sua vasa, sub  
ito in grumiū  
cōvertit.*

*Serum sangui  
nis.*

*Atra bilis.*

si quando in humores sentiuntur salis, morbo si e  
runt. Evadit autē interdum ipsa pituita dulcis.  
Porro pituita omnis esse debet coloris albo, mi  
nimēq; cōcrescere. Est & alius humor, qui dum  
vomitur, semper amarus apparet: nō semper ta  
men flauus, sed quādoq; pallidus. At semper qui  
flauus est, pallido crassior videtur. Iam verū, vt  
flava bilis tenui serofisq; humiditati cōmixta, &  
pallidior, & aquosior evadit: sic vbi resoluti plu  
rimū, vitellus crudiorū ovorū apparet similis: ubi  
idq; vitellina appellat. Igitur hæc bilis, siue palli  
da sit, siue flava, siue vitellina, in vasis habet suā  
generationē. At in ventriculo quæ dī alia gigni  
bilis, quæ puri colorē refert: alia quæ ab argu  
nis similitudine, arginosa vocat: alia, quæ istan  
dis imitatur colorē. Quibus omnib. est cōmune, fa

*Salis humor  
est morbosus.  
Pituita omnis  
esse debet colore  
albo, minimēq;  
cōcrescere.  
Flava bilis po  
tens.*

*Bili puri colo  
rem referant  
vitellus ovi  
tor.  
Bili arginosa.*

vt quales sunt, tales permanant. Vt verò ad atram bilem redeamus, ea, quia non concreuit, à sanguine nigro distinguitur: nō tamē ab illis quæ propriè excrementa nigra appellant, eo oomine differit. Hæc liquidem, cum talia sæpius vomantur ac desiciantur, ab atra bile plurimū & facultate & qualitatibus differit. Nam neq̃ acerbum saporem, neq̃ acidum manifestè participat: cum atra bilis tum gustui, tum olfactui talis esse videatur. Ad hæc, excrementa nigra minimè terrā fermentant, vt atra bilis. Quæ quidem \* hac io

re cum sit aceto quæcerimo similis, partiū tamen crassitie ali o quæmaximè dissidet. Quamobrem, quilibet corporis partibus pura & impermixta adheret, eas excedendo exulcerat. Acerū etenim quod tenuius fit partiū, permeat: at bilis atræ crassities, cum illi sedem firmam exhibeat, corro sionis fit causa. Taceo quod nullū animal atram bilem gustare sustinet: siquē nec meram saluginem, in qua nullū animal degere potest. Cuius rei mare mortuū firmum indicū præbet. Pernicio sâ itaq̃ illius generatio censetur, cum ex hu more atro supra modum assato cōtingat. Cæterū ea bilis atra, quæ ex flaua bile immudicè assata ortum habet, tantū hac perniciosior est æstī manda, quāto flaua bilis efficacior est sanguinis sedimento, quod amurce aut facis instar generari est proditum. Igitur vt exacte bilis atræ humore semper externis ad perniciem animadver ti, sic eorum quæ nigra appellantur evacuationē, nō rarū salubrem exitrille cōperī. Porro sanguis qui venâ secta mittitur, nigror esse videtur in sic cis calidissq̃ temperamentis corporū: siue tñ & in huiuscemodi anni temporibus, & regionibus, constitutionibus, virz studijs, victus ratione, ac deniq̃ cibis crassis & siccis: quales sunt, lens, co chleæ, & carnes taurinæ lucinæq̃, præsertim sale asservatæ. Consimilis etiam nature est vinum nigrum, crassūq̃ & austerrū. Pari etiā ratione, quæcunq̃ ægritudines sunt ex calida siccatq̃ in temperie, cuiusmodi sunt febres ardentes, cras sum & nigrum sanguinē gignunt. Vbi igitur per febres ardentes melancholicus humor in cutim ipsam propellitur, carbunculus appellatus produ citur. Si verò ad eam, citra febrem, decumbat, fueritq̃ permixtus sanguini, elephantem gigne re est aptus. Sin autē solus exiit, ab initio quidem nigrū tumorē gignit, qui procedente tem pore terminatur in cancrum. Rursus, vbi acior & contumacior hic humor fuerit, cancrum exul ceratum: vbi autem minor, latentem & citra vl cus productū. Quippe omnes huiusmodi affec tus, & præsertim cancer, ab humore melancholico oriuntur: cæterū vt à calidiori carbunculus, ita ab eo qui minus calidus est, oriri cancer con suseuit. At vbi is humor niger, qualitates obtine re ruitiores, nimirum permixtus sanguini, sub reos elephantos progignit: qui tamen processu temporis longē nigrioris evadunt. Sæpius autē natura, vasorum quæ ad sedem sunt, reclusus ve nam, huiusmodi humorem excernit commistum sanguini: ob idq̃ excretio ipsa lixumorrhoidis ap pellatur. Sæpenumero etiā eundem humore ad crurium venas transmittit, à quo dilatare & di sentz, varicose redduntur, & cutis quæ huius

semodi venas attingit, temporis processu nigrescit. Quod si venas illas turgentes melacholico humore quis moliatur excedere, periculum imminet, ne homo corripatur melacholia: id quod fieri sæpius est visum, nō in vtriusvis modo, verumtū in hæmorrhoidibus, quæ ex lusu sūsmodi humore consistunt. Quod igitur in venis & arterijs humores omnes vnā cum sangui ne cōnventur, ostendit ipsius varietas, tum in colore, tum in consistentiā: id quod etiā ex illis quæ diximus, & quæ in libro de Natura humana, ab Hippocrate prodita sunt, liquidō cōstat. Quæ humores quandoq̃ temperamenti obtinuerunt mediocritatē, animal erit sanum: ægrotabit autē, vbi vel in omnibus vasīs, vel in parte aliqua, eorū aliquis à naturæ modo recessit. Rationi autē est consentaneum, similes affectus oriri in partibus quæ profundo in corpore delatētur, us qui in cute consistunt. Cum itaq̃ flaua quidem bilis in vnam quampiam decumilis partem, genere erysipelas: atra verò, carbunculum atq̃ can crum: mirū sanē esse nō debet, si vtraq̃ in intesti na descendens (quandoquidem internæ partes non foris tantum constitutionē adamantinā) aliis aliud ipsorum erodant, ac cōnnuq̃ prius in sanabilis dysenteriam efficiant. Omnes liquidæ exulcerationes ab atra bile sunt insanabiles: nisi quis curatōnē appeller, vbi affecta pars tota cir cunquaq̃ ad partem sanam vsq̃ disiecta, abscondatur. Quemadmodū igitur intestina citra alicu ius auxilij ipem vicerātur ab atra bile: à flaua autem, difficulter curatōnē admittunt: sic in pro fundo sitis accendit cæteris partibus, atq̃ us præcipue, quæ intestinis sunt nobilioribus. Adde quod intestinorū curatio faciliōr est, eo quod medica menta quæ iniiciuntur per sedem, statim locis affec tis occurrūt: quod sanē in cæteris partibus fieri facile nequit. Porro lien malè affectus, vel ex inflammatione, vel scirrho, vel imbecillitate, ad nigrum cōversus, colorē vitiosum in toto corpore efficit. Quin & ipse semper iecore nigrior existit: & præsertim in animalibus calidioribus & sicci oribus, qualia sunt serratus dentes habenti. Hoc

viscus etiā vel elixū, gustui quippiam acerbū re fert, vt iecori nihil simile appareat. Vnde liquet iecur expurgari à liene: qui nimirū attrahit quicquid in ipso sanguine feculentum exiit: quale vni que est fix in vino, & io oleo amurce. Ex hoc verò quod medicamenta flauā bilem trahunt, auxiliantur eis qui regio morbo laborant: quæ autem aquam educunt, hydropes ascitas eva cuant: siue tñ & quæ nigra expurgat, elephantos & caneros augeri prohibent: in confesso est etiā, v numquodq̃ purgantū medicamentorū familia rem sibi humorē attrahere. Vt autē ad lienem re vertat: quandoquidē vnaquaq̃ corporis partē proprius alit humor: animalū verò serratus ha bentium dentes lien acerbam aciditūq̃ exhibet qualitatē: manifestū est, humore qui illū nutrit, talem etiā existerē: non igitur erit aliam particu lam excogitare, quæ melancholico humorī exci piendo sit destinata. Iam verò, per quas venas à ventriculo in hepatis alimentū suggerit, per easdē à toto corpore in illum etiā humor demittitur, tum in purgationibus quas moliantur medica

Varies humor  
rhodofy si quis  
cabore conu  
tur periculi est  
ne homo corrip  
tur melacholia.

Erysipelas,  
Carbunculus,  
Cancer.

Dysenteria.  
Exulceratio  
omnis ab atra  
bile est insanabi  
lis.

Intestini enim  
curatio, per fa  
ciliōr fit, quia  
ab atram intes  
tinorum p articu  
larum.  
Lien malè affe  
ctus, colorum vs  
que corporis va  
riet.

Lien elixum  
visus quippiam  
acerbum refert.  
Hepar à liene  
expurgatur.

Purgantiū me  
dicamentorum  
singula sibi su  
mularum sunt  
attrahere.

Lienem nutriti  
ab acido humo  
re, qui recipit.  
Ventriculo de  
mitto aliquid de  
humore p calid  
dem venam, per  
quas sibi sugge  
rit alimentum be  
nigna,

Nigra anemisi  
te quomodo ab  
atra differant  
bile.

Atra bile est a  
cida, terramq̃  
fermentat.  
Atra bile dif  
ferit crassitie ab  
acuta.

Atra bilis cur  
cordeas, corro  
ditq̃.  
Atram bilem  
gustare nullam  
animal susti  
net.

Mare mortuū  
nullam in se po  
tissim alit.  
Atra bile qua  
flaua præfusa  
ta vniuersū, aut  
vniuersū pernici  
osissima.  
Atra bilis seme  
per ad perniciē  
excitatur.

Sanguis niger  
quib. scilicet ve  
na vacuatur.

Melancholicum  
siccum pigmen  
tum.

Tumori ab a  
tra bile.  
Carbunculus.  
Elephantiasis.

Cancer.  
Cancer exulce  
ratus.

Flauorrhoidis.

Varicos.

menta, tum in its quas natura in morborū crassibus efficit. Quin etiam in recte valetutibus, nonnunquam optimus sanguis ad ventriculum cōmeat, ipsum videlicet nutritur: id quod in longis inediis cōdit. Porro cū natura quæ ferti format & augeat, prægnationis tempore optimū sanguinem attrahat, in venis relinquitur vitiosissimus, qui post partū tandem excernitur: quemadmodum singulis mensibus, qui nō solum quantitate, sed qualitate etiam superfluous atque inutilis est. 10 At pituitosus humor, ex pituitosis cibariis, in prima cōcoctione, quæ in ventriculo fit, generatio nem obtinet: vel vni bulbosus melancholicusq; in lecore. In cuius quidem cōlutione pituitosus humor etiam in sanguinem vertitur. Quam ob causam nullum ipsi proprium instrumentum molita est natura, ad sanguinis expurgationē, quemadmodum est vitæ vesica & lien. Siquidem hic sanguis à buloso humore & seroso expurgant: lien verò à melancholico humore. Itaque pituitosus humor, qui in ventriculo gignitur, cūm defertur in iecur simul cum humoribus genitis ex comestis & bibitis, vni cum illis concoquitur, in sanguinemq; mutatur. In vniuersum igitur, omnes qui ab humore melancholico proveniunt affectus, statim inter initia medicamentis cum humorem vacuantibus valde purgatis, quo minus augeantur prohibebis, vsque etiam ad caneros. Nō est autē eadem bilis atque in iis qui integra sanitate fruuntur, & in nōnullis eorū, qui olim naturalem habitū sunt egresii. Porro medicamenta singula propriū quendam similēq; sibi succum eliciūt: non autem in naturam suam corporis humores permittunt. Nam si medicamenta morbo regio laborantibus propinaueris: quæ verò bilem educunt, his qui insistantur aqua intercutim: quāminimū proprii humoris videbis vitioque vacuari: atque inde non solum nihil iuueris ægrotantes, verum etiam quāmaximē lacerabis: haud aliter, quam si ipsæ venas incideres. Adverte autem columbas, atque alia animalia pleraque, destituta esse vesica felia.

### GALENI PERGAMENTI de tumoribus præter naturam, liber vnus.



Nec ex corpora quæ naturaliter, & quæ præ naturā se habent, tertia quædam est constitutio eorū corporum, quæ nō secundum naturā affe 50 cta sunt. Siquidem qui crassior vel gracilior est factus, nō adhuc naturalis habitus fines egreditur: sed tantū alter supra naturæ modum, alter verò infra inuenitur: verq; autē secundum naturā est minimē affectus: quāq; certē horum affectuū nō naturalis, excessus quidē, præter naturā existunt: terminus autē eorum excessuum, est actiōnis oblatio. At qui tumorē ex aqua inter cutem contrahit, & qui ex tabe evaluit gracilior, præter naturā sanē vitioq; est affectus. 60 Igitur in præsentī libro, de tumoribus præter naturam, qui tum corpus vniuersum, tum quilibet illius partē occupāt, nobis differere est animus, sumpto à phlegmone initio. Phlegmone dicitur tumor campisarius particulārē, vbi cum tensio-

ne, retentiāq; necnon dolore pulsantī & calido, ruborēq; maiorem sibi tumorē contrahunt. Ex quibus quidem signis sanguinem redvndare in inflammatione ipsā, existimādū est. Cuius sane defluxus, priusquā sit impactus, facillimē his quæ refrigerāt atq; astringūt, repellit, præsertim si tumor fuerit exiguus. Vbi autē fluxio impacta iam tenaciter hæret, nullum ab astringentibus & refrigerantibus auxilium admittit: indiget autem vacuari. Iam verò pars phlegmone obiecta, nō statim ab initio fit immodicē calida, sed procedente tempore, pristina nimirū perspiratione impedita, ex obstructione omnīū meatuū. Idcirco si inibi sanguis diu immoretur, necessum est vt omnino putrescat. Siquidem omnia corpora simul calida & humida, in calidum locū coacta, putrescunt promptē, si nec evacuentur, neq; refrigerentur. Quare & quæ ex ipsius putredine caliditas nascitur, ei supersuper, quam antea habebat. In vniuersum autē, nihil in inflammata particula permanere potest exactē secundum naturam se habens, inflammatione perseverante diutius: sed omnia simul cum carne, cuncti videlicet, nervi, tendones, membranae, atq; vasorū tunice, fluxionē ipsam suscipiunt. Quare & ossa interdū fluxio ipsa invadit: sicuti & ab ipsīs primō affectis, nōnunquam oritur: quemadmodū etiam à nervis, vbi scilicet vulnerant. Cuius igitur, vbi secundum naturā se habet, laxa est, in iis qui crassi nō admodum sunt: & locus edus, cui ipsa incumbit, existit vacuus. nec secus ea quæ in carne sunt spacia, cōspiciuntur in ania. Omnia autē hæc per inflammationes replentur sanguine, ex vasīs quidem per eorū tunicas resudante: in quacūq; autē carnis particula, ad modum roris permisso. Vbi verò procedente tempore vicierit quidē natura: fluxio autē omnis concocta fuerit, ac genitum pus: extra carnē id pellitur à facultate, quæ in ea est, expultrice. Quod si vel meatus naturā 40 lis cōspicius sit, vel locus rarus existat, pus sane partim perspirat, partim sensibilibet effluit. At si incumbens cūm densa durāq; exierit, ibi pus derinetur, atq; eam ei subiecta ipsi carne dimittit: deinceps & sui acrimonia corrodit, & foras egreditur, nisi quis eam prævertat scarificare. Cæterū natura à fluxione victa, nō amplius ad pus, sed ad alienam quampiam mutationē, aliis diversā applicatur sanguis. Porro dum pus corpora exorat, continentiaq; à subiectis ducit: ac deinceps eo vitioq; vacuato, quæ disident inter se, pristina constitutiōne nequeunt recuperare, is affectus vocat sinus. Quinimodū nisi iocelerim percurretur, callum contrahit, procedente tempore durus evadit, nec amplius subiectis ipsi partibus agglutinari potest. Astringitur tamen medicamentis, & virtus ratione exicat, ita vt particula integrē esse sanā videatur. Nō solum tamen ex inflammatione gignuntur abicefus, hoc est, ductiōnes particularum: sed & statim à principio interdū proveniunt, propter humorem aliquē, qui temporis processu exoriet, atq; à cōtenuis cōmēnta displicat. Proinde & in cū omni modo dam speciem humidori ad solidū corporum intus habere apparent: & non raro etiam animantia in ipsīs reperta sunt, omnibus

Phlegmones contrahunt.

Partes calidæ & humida, vbi in calidum locū impacta, nec vacuantur, nec refrigerantur.

Ossa interdum fluxionē ipsam suscipiunt.

Phlegmonis generatio.

Abicefus quomodo fiat.

Sinus quid.

Animalcula interdū reperiri abicefibus.

*Vistula quid.*

*Atheromata.  
Meluena.  
Steatomata.*

*Gangrena.  
Carbunculi.*

*Carbunculorū  
dyscrasia.*

*Atta dicta que-  
lit.*

*Canceri gignit  
atra bilis ut fer-  
uida: que si a-  
cior fuerit, alios  
producit exul-  
ceratos.*

*Glycena quid.*

*Dolor pulsatili  
efficit inflam-  
mationem particu-  
larē, ab arteria-  
rum motu.*

*Erysipelas.  
Herpes.*

*Herpes exedens  
gignit ab a-  
ciori bile: ut  
miliaris, à mi-  
nus acra.*

*Erysipelas phle-  
gmonosum.  
Inflammatio ery-  
sipelatosa.*

ferē quæ ex putredine ortū habent, similima. Fi-  
stula, sinus est angustus & longus, alius sinibus si-  
milis: qui sanē astringit, & rarius diducitur etiā  
ob excrementi effluxum. Iam in atheromatosis  
reperitur quiddam pultri consimile: in meliceri-  
dibus, melle: ut seruo, in steatomatosis. Plerumq;  
autem quædam tunica membranosā singula hæc  
continet. At gangrena carbunculoq; excitantur,  
cūm sanguis tanquam seruens & inflammatio-  
ni propinquus, exvrit cutem. Proinde & cum cru-  
sta sunt, & bullæ vicus præcedunt, quemadmo-  
dum in ambuistis. Quin & acutissimā febrem in-  
ferunt, atq; in discrimen viram trahūt. Nigra au-  
tem prorsus, ac cinerulenta, apparet crusta car-  
bunculorū viceris: nec tamen inflammationis cir-  
cumsantis color, sicuti in aliis, ruber cōspicitur:  
sed ad nigrescit vergit, alio sanē modo quā in  
sugillatis, vel à gelu perfrigeratis. Non enim ve-  
hementer illuet, veluti in illis, tumor: verū habet  
quippiam splendidum, quemadmodū bitumen  
ludaciū. Huiusmodi siquidem est singulita atra  
bilis: unde & malignitas vicerum quæ in carbun-  
culis sunt, accidit. Siquidē sanguis, vel statim ab  
initio, vel in ipso seruo re superaffusus, melācho-  
licus fieri videtur. Verūm citra seruiorem atra bilis  
cancros constituit: atq; eos cum vlcere, vbi a-  
cuiorem illam esse contigerit. Quamobrem & ni-  
griores sunt colore o mnisbus quæ inflammatione  
inestantur, & minus calidi. Venæ autē in his  
repletur & tenduntur magis, q̃ in ipsis inflāma-  
tionibus. Ad hæc gangrena maximis succedit in-  
flammationibus, quæ sanē mortificatio quædā  
affectu partis existit: & nisi caretur celerrimē, vi-  
que adeo pars afflicta extabescit, vt invadat alias  
cōtinuas, atq; sic hominē peramat. Porro in natu-  
rali statu, insensibilis nobis est arteriarū morus:  
in inflammationibus autē, is cum dolore sentitur.  
Arteria siquidem dum dilatur, corpora circū-  
iacentia percunt: atq; ex eorū plaga ob inflāma-  
tionē dolemus. Quod si arterie tunica inflāma-  
tione vrgeatur, tunc ratione percipientis simul  
& petcufæ, geminatur dolor. Si fluxio biliosa in  
aliquam partē decumbat, idq; ab exquisita bile  
profecta, cutē exulcerat: si verō sanies aquosā,  
vel etiā sanguinē habeat, minus erit acris, sed  
particulæ magis in tumorē attollit, q̃ exulceret.  
Hoc igitur erysipelas nominatur, alterum verō  
herpes. Humor autē à quo vnumquodq; horū  
gignit, tum ex colore, tum ex caliditate partis  
affectæ, faciliè dignoscet. Rursus, cūm fluxio  
acris, hæc quidem minus, hæc verō magis, talis  
existat: sciendum est, ab aciori fieri herpes ex-  
edentem, ab altera verō miliarē. Atq; hæc sanē  
fluxio puitum habere mistam mili planē vide-  
tur: vt illa proficiat à meracissima bile: quare &  
cum etofione oritur, affectu semper proximam  
invadente cutem. Verūm si ex æquo sanguis &  
bilis cōmista fuerint, huius affectus forma & na-  
tura, in medio erysipelatis & inflammationis con-  
sistit. Quod si alter ex humoribus longē exvpe-  
ret, ab exvperante affectus nomē sortietur, cum  
additione tamen humoris admitti. Dicitur itaq;  
que erysipelas inflammationis particeps, fluxua  
bile superante: inflammatio verō erysipelatosa,  
vincente sanguine. Similis quoq; etiā aliarū mul-

tionum interpretatio. Quatuor enim sunt affe-  
ctiones, quæ assidue ex humorū fluxione oriun-  
tur: erysipelas, ordema, inflammatio, & scirrhus.  
Erysipelas igitur, vt dictum est, biliosa fluxione  
exvperante o ntrū inflammatio, sanguinea: orde-  
ma verō, tenui puitura: quemadmodum & crassa  
& lenta, altera quædam scirrhorum species con-  
sistit: namq; alterā sex sanguinis efficit: quæ ipsa  
rursus sanguinis sex, est duplex: altera enim speciem  
Hippocratis nigram nominat: altera verō  
& ipsa quidem est nigra, propriè tamen atra bilis  
vocatur. Istius itaq; canceri soboles sunt: alterius  
verō nigre, vta quædam scirrhorū species:  
quæ sanē ab altera quæ ex puita consistit, colore  
distinguitur. Atq; vtriusq; cōmunia sunt, maior  
quā sit pro naturæ ratione tumor, tum dolore  
vacans, tum durus: & quod vtriusq; species quan-  
doq; ab initio gignat, quidq; ex permutatione  
alicuius tumoris immoderatus refrigerari. Scir-  
rhia propinqua sunt tum ecchymomata, hoc est  
transfusiones, tum melasmata, siue denigra-  
tiones. Qui affectus sūt sanguine ex ipsis venis ef-  
fusos, nunc tunicis earum cōtusos, nunc ipsarū si-  
mibus reclusos. Quod si arteria ad aperta fuerit,  
affectus hic aneurisma vocatur. Fit autē, ac vul-  
nerata, cūm ad cicatricē superposita cutis deve-  
nerit, arterie verō vicis permiserit, ipsa nequa-  
q; cōglutinata, neq; ad cicatricē perducta, nec car-  
ne obturata. Ceterū tumor ille compressus digi-  
to cedit. Cūm igitur sanguis quem arterie conti-  
nent, tenuis & fluxus exiit, ac præterea mistus  
subtili spiritus & multo, proindeq; sit enim calidi-  
or eo qui continetur in venis, adeo sanē is ef-  
fluit, vbi vulnerat arteria, vt ægre supprimi pos-  
sit. Cedit etiam in ordinatibus materia premen-  
tibus digitis, & pars ipsa foueæ modo excavata.  
At in hoc affectu pulsus non adeit, vt percipitur  
in aneurismare: & color sibi cōtr exiit. Ad hæc  
ordema digrū latius & maius est aneurisma: nisi  
quidō grumulus adnatus, coalius ex aneurisma-  
te, phacelum, hoc est, syderationē efficiat. Sic e-  
nim vniuersam solidorū corporū corruptionem  
appello, ita vt osibus quoq; insit. Gangrena au-  
tem, solidorū corporum mortificatio est: & ipsa,  
verō ossa nequa-  
q; corripit, maximāq; sequitur  
inflammationem. Repetendum autē rursus hoc  
est: atram bilem, si quidem mordax decubuerit  
in carne, circumpositam cutem exulcerare: si ve-  
rō minor extiterit, caneros citra vlcus inducere.  
Iam verō, qui affectus ex vlcere & tumore cir-  
cumambiente constat, phagedæna vocatur. De-  
pascitur etiā & herpes circumvicinas partes: so-  
lus tamen cutis exulceratio existit: phagedæna  
verō, vni cum cute, attingit etiam subiecta. Que  
vlcera omnia, cacothelica, hoc est, maligna vocant.  
Porro scabies & lepra, melancholici affectus, ad  
solam cutem spectant: quemadmodū si in solis  
venis & carne siant, nomen obinēt cancer. Præ-  
terea elephas affectus melācholicus est, à sangui-  
ne quidem melancholico primā habens gene-  
rationē: tempore verō procedente, atra bilis co-  
pia sanguinē ipsum exvperat: quo tempore cor-  
pus iam & grauius olet, turpesq; & deformatum  
videtur, atq; interdū etiam exulceratur. Iam pu-  
dendum tensiones præter naturam, quæ non  
desistant,

*Oedema.*

*Scirrhorum su-  
cin dicitur.  
Sunt sangui-  
nea duplex spe-  
cies.*

*Ecchymomata.  
Melasmata.*

*Aneurysma.*

*Arteriæ scir-  
rho qualis con-  
stat.*

*Oedema, qui-  
modo ab aneu-  
rysmate diffe-  
ret.*

*Sphaerulus.  
Syderatus.*

*Gangrena.*

*Phagedæna.  
Herpes dyssan-  
thes.*

*Cacothelica.  
Scabies.  
Lepra.  
Cancer.  
Elephas.*

Satyrismus.  
Priapismus.  
Aster.

Caria.

Myrmecia.  
Acrochordones.  
Ptydracn.  
Egypci Clidi.  
Ternaculum.

Tuberculum.

Tubo.  
Myggethlon.

Struma.  
Chera.  
Lernocle.  
Ramex carnosus.  
Ithydroucle.  
Epiplocle.

Aperosis.  
Ramex vari-  
nosa.  
Varicos.

Tubonocle.

Ispipocle.

Hydropis tres  
species.

Epulodes.  
Parulodes.  
Thymus.  
Voa.  
Tonsilla.  
Cacillomia.

Polypodus.

Encanthu.

Vagum oculi.

Traphylomane.

deficit, quidam satyrismū, quidam priapismū  
appellant. Achor autem vlcus est in capis cute,  
quod coniciere pituita salis, & nitrosi esse so-  
bolem. Ac defuit quidem ab eo sanies quedam  
nec aquosa simpliciter, nec ita, vt mel, crassa. Ce-  
ria (quos fauos nominant) cum tumore quodā  
exiguo & suppuratis foraminibus accidit, mel  
leo quodam humore fluens. Qum & alia tu-  
mores præter naturam his minores per cutem  
sunt, numirū myrmecia, acrochordones, ptydra-  
ces, & epinyctides: qui sanē affectus omnibus  
cogniti sunt. Non minus autē est notus furuncu-  
lus: qui quidem mitis existit, vt solam cutem ob-  
siderit: malignus autem, si descendit alius. Sic  
enim tuberculo est similis, ab eo sola duritie dif-  
ferens. Vterq; autē affectus mitis cum inflama-  
tione esse speciei videtur. His tertio loco succe-  
dit bulbo, quarto in quem nonnulli vocant phy-  
gethlo, caliditate simul & generationis celeritate  
id ab aliis tuberculis distinguens. Qui affectus  
glandulosarū parū est inflammatio. Hæ autem  
partes vbi ad scirrhum deveniunt, in affectus  
struma & chera vocatur: quemadmodū etiam  
vbi induritur testis, *testis*, & ramex carnosus  
dicitur. Cū autē in eorū tunicis humor aquo-  
sus colligitur, hydrocele nominatur: a quo affe-  
ctu, epiplocle, & enterocle differunt: quod al-  
terum omne, alterū intestini cuiuspiam descen-  
sum in tunicas testium significat. Quemadmodū  
autē vnum quodq; dictorū nominū partis mor-  
bum indicat, ita affectus cognominatur: sic &  
*aperosis* recens nomē, hoc est, varicosus ramex,  
in parte iam dicta declarat ipsū affectum con-  
sistere. Quāq; veteres, & alias etiam turgentes  
venas *apros*, hoc est, vances nominant. Fuit qui-  
pe in cruribus etiam vances, ob imbecillitatē ve-  
narum quæ inibi existit: & tunc præsertim, cū  
sanguine corpus crasso redūat. Peritonæo vul-  
nerato, vel rupto, nec postea conglutinato, tu-  
mor quidā mollis eam regionē occupat. Quod  
si id in inguine eveniat, tumor talis bubonocle  
nominatur. Si verō circa umbilicum, sic affectus  
*ispipocle* quidam appellat. Cæterū peritonæi so-  
lus nulla haturū affectionū existit: sed & nervi  
propagium musculo affici prius est necessa-  
rium. In hydropicis etiam copia quidem mate-  
rie eadem in regione aggregatur: aquosæ sanē,  
in ascite: flauosæ, per tympanitem: pituitosæ de-  
niq; in affectu anasaræ, & eo quem leucophle-  
gmanam appellant. Porro epulides, parulides,  
thymus, & alia id genus, omnia suppurulationes  
existunt. At vix, gurguliones, tonsillæ, earum  
glandularū quæ in vicem in faucibus mēto oppo-  
nuntur: parastomia deniq; eorum corporū quæ  
in ipsis faucibus sunt, inflammationes existunt.  
Polypodes autē, aut inflammatione, aut tuber-  
culo, aut alia quāpiam suppurulatione in nari-  
bus consistente, gignuntur. Encanthi: verō, in  
magis oculorū angulis sit, tumor non toto ge-  
nere præter naturam, sed sola magnitudine. Va-  
gus autem adnascens quædam sunt membra  
næ exterioræ adnatæ oculis, quæ ab offe circūam-  
biente delata, vix ad indur coronæ exēditur. At  
quæ vocatur traphylomane, hæc quidē solo sitū,  
hæc verō dispositione ipsa, præter naturā existit.

# GALENI PERGAMENTI de tremore, palpitatione, convulsione, & rigore, liber vnu.



Ensis motus in sanis animalium  
corporibus, duplices genere existit.  
Alij si quidem sunt secundū volun-  
tatis imperiū: quos sanē & nervi &  
musculus editos, libere voluntans  
actiones mos est medicis appellare. Alij autem  
a corde & arteriis profecti, functiones appella-  
tur vitales. Est & tertia in venis insensilis motus  
species, de qua impræsentiarū differere nō vide-  
tur expediens. Cæterū motus & nervi & muscu-  
lus editus, quo manus atque crura movemus, in  
tremore & convulsione, morbo suo quo rigore, ac  
nōnunq; palpiratione, apparet. Etenim istiusmo-  
di affectus, in compositi exorbitantēq; sunt mo-  
tus instrumentorū, quæ dum integræ valent, mo-  
tus voluntarios perficiunt. Tremor igitur, imbe-  
cillitate facultatis quæ velit atq; mouet corpus,  
efficitur. Etenim animalium partes graues clim  
sunt, deorsumq; ferri natæ, ex se vique quæq;  
moueri nequeunt: sed facultas à principio musculis  
per nervos delata, quā vehiculum quoddam  
atq; ala, motus ipsarū est. Quæ si exactē defece-  
rit, partes vñ relaxatæ resolutæq; deorsum veni-  
unt, atque instar aui expilæ cōcidunt. Vnde  
membra hoc pacto affecta, omni motu priuan-  
rur. Verū si facultas ad musculos per nervos  
suat, exigua tamē & debilis, vt quantū oportet,  
membra corporis velere, libereq; atque, aut velut  
pondus aliquod ferre, non possit: membrum sic  
dispositū, cum tremore delihere necessariū con-  
spicimus. Si quidem motus coacti violentiq;, quā  
vires debiliū superant, sunt haud dubie tremu-  
li: vt constat in onera grauiā gestantibus. Pari  
quoq; modo si quis nimio corpore fuerit, mani-  
festū siue quid agere, siue libere volente, tre-  
mula quidē manus agendo, tremula quoq; cru-  
ra incedendo ei ob timorem sunt. Timor quip-  
pe facultatis robur, nihil minus q; onus, immi-  
nuuit. Consimili modo senes imbecillitans causa  
tremuli evadunt: & quibus oīa ægritudine labo-  
rant ipsius corporis robur, his haud sine tremore  
perficuntur motus. Tremor itaq; est compositus  
motus, scitq; vbi corpus propria grauitate deor-  
sum vergit, sed rursus à facultate eleuatū sursum,  
particulæ nimirū ipsi vicissim loca mutantur.  
Differunt autem invicem palpitatio & tre-  
mor, cū nimirum non eodem loco quo tremu-  
li, palpiratione correpi afficiantur, nec eadē cau-  
sa, nec præterea idem sit vtriusq; symptoma. Nul-  
lus enim tremit vñq; nisi membrū aliquod mo-  
uere prælegerit. At membra palpitantia, etsi re-  
posita iaceant, nullōq; exagitantur motu, palpi-  
tantid quod mirum esse non debet. Alia siqui-  
dem multa, licet immobilia videantur esse, vtpo-  
te in eodem permanente loco, mouentur nihilo-  
minus tamen. Aus quippe in subtili regio-  
ne æris suspensa, dum sese, quā minus erant, susti-  
net, aliquo vñ motu videt. Is igitur motus (quæ  
immobilitas fortasse tibi apparuerit) ex duobus  
certis motibus, quī in contraria loca ducere  
corpus queant, est multus, Quorū sanē si alterū,  
Gg ij

Motus subtilis  
duplex. vñ vñ  
voluntarius, qui  
ad nervos &  
musculos, qui ad  
cor & arterias  
pertinet.

Tremor quomodo  
fiat.

Motus violentus,  
qui vires su-  
perant, sunt si-  
mi tremuli.  
Tremuli autem  
ad hunc alios  
tremuli,  
Timor facultatis  
robore immi-  
nuat.  
Senes cur tre-  
muli.

Tremor est mo-  
tus compositus.

Palpitatio est tre-  
mor qui diffi-  
rat.

Motus multa  
quæ pœter in im-  
motu videtur:  
vt aui quæ sibi  
in subtili ære  
non regunt sus-  
tinet.

nempe motum sursum, iustulicis, & reliquo deorsum deduci corpus minimo negotio videbis. Osi id etiam stare quàm incedere, iis qui vitibus sunt imbecillibus, haud minus est laboriosum: cum statio sit quoque motus. Sublata namq; anima, quæ & mouet, & corpus erigit, corpus prius rectum, mox stratum facile videremus. Quare non immerito monuit Hippocrates: Si æger se ipsum continere non possit, & ex lectica in pedes corruat, grauius est. Nam iacentem ad pedes delabi, facilius extremis laborantibus firmisimum est iudicium. Etenim stare, aut sedere, aut surgere non posse, graue certe est, sed eo sanè minus graue. At more viuentis decumbere non posse, sed ceu demortui inanimatissimi corpus deorium itrepere, extremi est malum. Quod autem ubi quis manum extensam aliquandiu in illa figura conseruat, aliquo motu moueatur, argumentum sunt utraq; genera muscularum simul & ex æquo tunc operantia. Liqueat itaque, et qui

corpus absolute refrigerat, palpirationi sunt generande idonea. Sicviti illorum contraria, eandem submouere possunt. Calfaciētia quippe attenuant spiritum, corporaq; mollia simul & rara efficiunt, vt ille expirare possit. Verum refrigerantia condensant, congregantque, ac corporis meatus arduos reddunt: insuper crassum, densumque, ac turbidum efficiunt spiritum, qui sua crassitie, corporisq; ipsum continentiu densitudine, retinetur, vt minimè exhalare possit. Merito igitur veteres, iis contra palpirationem sunt vti medicamentis, quæ attenuare & excalcacere possunt: cuiusmodi sunt quæ ex pyrethro, & dardæ & pipere consistant. Aquas quoq; calidas ex terra prodeuntes, & præcipue nitrosas, sulphureas, bituminosasq; cōmendant. Et aqua marina actu calida, murtag, marine vice vtuntur, si mare absit. Porro calorem, nō solum bibitiū, sed etiam ad motum extrinsecus, ad id optinū est medicamen.

Calfaciētia viti.  
Refrigerantia facilius.

Ceterū palpirationis generatio ex frigido duntaxat provenit: tremor verò ob multas & alias causas fieri cōtingit. Nam dispo sito hæc, facilius quæ corpus mouet est imbecillitas: sed causa quæ hanc ipsam imbecillitatē inducere potest, specie variat. Aut enim alimeni defectu, aut exoluto vitali robore, aut violenta vehementiq; refrigeratione virtutem occupante, aut repletione ipsam instar ponderis aggrauatē, admodum imbecillis ad motū facultas redditur. Vnde non sicviti palpitantibus, ita & tremenibus vna duntaxat medicamentorū species congruit, sed varia. Ac pro differentia ipsius causæ, oportet per contraria semper medendi rationē variare. Etenim mulierē quæ post partum nec secundas expellere, nec sanguinē expurgare poterat, indeq; tremore correpta est, secta in malleolo vena, curauit Hippocrates. Quod autē sanguine exuberante, venam incidere oporteat, omnibus notū est arbitror, cum sanguis continetur in venis. Quod verò laborante matrice, in malleolo aut poplite incidere expedit, id docet cōmercium venarū. Siquidem per venas cōmunicantes semper vacuare est opus. Nam si venas, quæ particulæ affectu non consentiunt, pertundas, minimè affectum locum curabis, sed potius sanū offendas. In animalibus itaque motus voluntariū opifex fabricatrixq; facultas est, quæ vniuersas animalium partes gubernat. Huius autem instrumenta, nerui & musculi existunt. Igitur motu priuari, aut non pro dignitate moueri contingit membra, vel ob instrumentorū, vel ob facultatis affectus. Palpirationes itaq; & convulsiones, & membrorum resolutiones, instrumentorū vitia: tremores verò, virtutis imbecillie affectus existunt. A rigore autem distinguitur tremor, quod tremor quidem non sine consilio mouendi partem, contingat: quæ statio verò, quæ vehementer rigentibus insidet, adeo violentè validèq; concutiat corpora, vt quietem agere minime queant, vel si quis vniuersè illis resistat. Insuper tremor, vnius duntaxat particulæ, rigor vniuersi corporis est affectus. Ad hæc, tremere quidem nonnullos, absq; vlla refrigeratione sensibilibi, comperit est. At rigere, absq; hoc vt videatur corpus refrigeratum, est impossibile. Non tamē

Palpirationem qua solam medicamentis.

Palpitatio re frigore tantum provenit.  
Tremor causa diuersa.

Tremor mulieris ob purgamenta post partum retenta, secta in malleolo vena curauit Hippoc.

Mater laborans, vena secanda est in malleolo, aut poplite.

Tremor mulieris ob purgamenta post partum retenta, secta in malleolo vena curauit Hippoc.

Mater laborans, vena secanda est in malleolo, aut poplite.

Palpitatio est organorum vitia.

Tremor, virtutis imbecillie est affectus.

Tremor non sine consilio mouendi partem.

Rigor sine vitio.

Rigor à tremore quæ differt est.

refige-

Statio est motus.

Iacentem in pedes delabi, facilius extremis laborantibus firmisimum est iudicium.

Extensam manum habentem mouetur.

Palpitatio quibus partibus accedat, quibus moueatur.

Palpitatio est dilatatio & contractio præ naturæ ordinis. Tremor est motus involuntarius.

Palpitatio est causa.

Constituentia corporis nostri sunt, continentia, contenta, et qua feruntur impetu.

Palpitatio quibus si famulatur.

Extensam manum habentem mouetur.

Palpitatio quibus partibus accedat, quibus moueatur.

Palpitatio est causa.

Constituentia corporis nostri sunt, continentia, contenta, et qua feruntur impetu.

Palpitatio quibus si famulatur.



refrigeratū esse, & videri, idem esse fataris. Motus præterea in rigentibus, involuntarius omnino est: in tremenibus autem, non absq̃ imperio voluntatis consistit. Porro vt motus aliquis dici rigor mereatur, opus est vt cum refrigeratione sensibili, in æqualis involuntarij totius corporis motus accedat. Quæ sane quæstio, si in nōnullis acerbis solum superficiem concutiat, nec vniuersum corpus commoueat, is affectus horror vocatur. Horror itaq̃ talis duntaxat cutis, qualis vniuersi corporis rigor, affectus est. Cæteri impræsentiarum nō de rigore aut horrore qui sana corpora infestāt, sed de illo qui ægris solet superuenire, disputare consilium est. Igitur morbosus rigor secūdm̃ Hippocratis dogma, refrigeratio quædam est dolorifica, cum in æqualis totius corporis cōsuetudine. At verō rigore affici, innati calidi affectus esse omnibus ferē in confesso est. Verum enim verō calidum hoc innatū, minimū gigni motu aut frictione arbitramur, sed corpus omni ex parte conspirabile, conflui lēq̃ esse contendimus: calidum autem ipsum vō ad ventitū, nec animalis generatio ne posterior, sed primariū, primordiale, insinimq̃ putamus. Natura itaq̃, animāq̃, nihil aliud quā calidū est. Quocirca si hoc spontē semp̃q̃ mobile esse cognoueris, errare minimē poteris. Quia igitur ratio est calor semper exiit mobilis, ea nimirum nec intus solū, nec foras mouetur, sed aliter ipsius motus succedit alteri: citō enim immobile ipsum redderet intus stantior autē, quæ eum dissiparet. Nam calidū moderatē extrinsecū, rursusq̃ moderatē accensum (vt ait Heracitus) semper mobile remanet. Accenditur igitur, vbi appetens nutrimentū versus centrū inclināt. Extinguitur autem, vbi foras & vndequaq̃ dissipatur. Ac mouetur quidem ipsum innatū calidū à suo principio foras, caliditatis ratione: intro vero, atq̃ ad propriū principium illabatur, quia etiam frigiditatis est particeps. Hoc siquidem calidū, & mitum est, & ex calore frigoreq̃ ortū habet. At prima quidem caliditas spontaneā sui ipsius mobilitatem includit, hancq̃ ad operandum maxime eget. Nihilominus tamen magnū quoq̃ à frigore à diuinentum accipit. Nam cum inuatum calidū & eleuare in altum, & secum alimentum rapere natum sit, certē si frigus latior uem calidi non coerceret, penitus evanesceret, atq̃ dissiparetur. Porro animal tunc finem existimat, vbi temperamētū, nature ipsius limitē non excedit: hoc est, cū calor frigiditq̃ temperatura mediocris mutuo inter se miscetur. Si vero altera qualitas immodecē alteram superet, tunc animal laborare morbo, qui congruus sit nature causæ superantis, necesse est. Etenim \* in inflammatione, erysipela, vicerisq̃ serpēna, nec nō carbones, omnesq̃ tum impensē calidi, tum febrilis affectus, dum vis calidi dominatur, vtiq̃ue sūt. At cōuulsiones & tetani, palpatationes, stupores, resolutiones, morbi cominales, atq̃ q̃ affectus qui homines atrocius reddunt, facultate frigoris dominante oriuntur: inter quas affectiones rigor numeratur, qui refrigeratio simpliciter non est, sed tantū secundū sensum. Fuit itaq̃ rigor innati calidi, vehemens, cōsentimū

affligens, ac violenta secundum sensum refrigeratio. Iam vero quemadmodū quod in naturam haud latenter reuertitur, est in cundum: ita quod à natura pari modo recedit, dolorificum fuerit. Quare vnum idemq̃ frigus, alijs quidem delectasse, alijs verō tritina affectus credimus. Nam si frigus corpori extra modum calfacto, ad motum fuerit, id prorsus delectat. At si corpus suam naturā retinetis, cōferim ab vndeq̃ refrigeretur, dolebit vniq̃ & tristitia afficietur. Igitur nec dum alimentū defectū innatū calidum obscuratur, nec dum pabuli copia obruitur, nec dum ob imbecillitatem collabatur, rigorem fieri contingit: sed quoties ipsum valdum existens, intenditur, ac dein coercetur, reprimiturq̃: quod solet flamma vbi cōferim aqua illi instillatur. Calor itaq̃ per eiores, nec substantia nec robore lesus, & vni uersas corporis partes extendi ferrisq̃ propere impeditus autē, versus principium propriū cōfurgit, iusibz permanere non valens (substantis enim semper mobili quies mors est) seipsumq̃ congregans, ac veluti in spirū contrahens, æqualiter quidem, nō autem tamen citra violentiā, extenditur. Vbi vero exiliens infestantibus reluctantibzq̃ rebus occurrit, ac nunc pellit illas, nunc pellitur, idq̃ impulsibus & cōsuctibus variis, tunc sanē corpus mira quassatione ob duplicem illam atq̃ inæqualem mortū, haud citra dolorem cōcutitur, quādiu molestia aduerfuerit. Concussio igitur, quassatioq̃, necnon omnium membrorū tremitus, omniq̃ irregularis, inordinatus, in voluntarij motus, ob calorū innati, factū iam vaporosū, inæquales, validos, violentosq̃ occurfus atq̃ refulationes, rigoris tempore perficiuntur. Quamobrē corpus in rigoribus rigens incalefcit exactius, q̃ cum naturaliter se ipsum habebat. Sudores quoq̃ effundantur ex corpore. Etenim vbi post multos cōsistens molestia fuerit explosa, exacteq̃ iam perfracta erit corpus, tribus de causis id calidius est necesse: utem quod calidum fuerit ipsatione priuariū, in profundo collectū fuerit: quodq̃ postea vehementer ad exteriora se extendit: ac tertio denique, quod per occurfus illos, cōsistens, atq̃ violentos motus, natura calor reaccenditur. Itaq̃ sæpe in huiusmodi reditu de profundo calidū quæ ibi bullens, cōferim humidū quoddā effundit, quod sudorē vocamus. Ob idq̃ in rigore refrigerari, nec rursus calidius prauū est, calidumq̃ succubuisse portendit. Est autē rigor indicij maximū exquisitæ tertianæ, quæ ab iugenti oritur ardore: extenuisq̃ ab ardente continuū deficit, quatenus in ea incenditū ipsum facit intermissiōnem. Nam & sinus inexpugnabilis, & refrigerationis cupiditas, & bilis syzerce vomitus, vomitus peractū quies (quæ omnia signa sunt caliditatis exuberantia) comitantur exquisitū tertianæ. Febris etiā ex iugenti ardore cōtinuis, solet rigor supervenire, easq̃ solvere. Præterea acre calidūq̃ medicamentū vlceri admotū, primō dolorem, mox horrorem, ac demum rigorem inducit. Inflammationi etiam in abscessum conversis, rigor horroremq̃ necessariū accidere nominamus. Ad hæc, res auditu visibz formidabilis, interdum horrorem, rigoremq̃ inducit. Ex qui-

incidit quid.  
Doloris, aut  
quid.

Rigor quando  
obveniat.

Mobilis substantia  
ut quies mori  
est.

Incalefcit corpus  
à rigore ut  
hemorrhagis,  
quādo autem,  
tribus de causis.

Rigores ad  
calidius, prauū  
inciditū est.  
Tertianæ quæ  
modo ab ardore  
in cōtinuū defertur.

Rigor solus  
febris ardoris  
soluere.

Acre vlceri ad  
motū, rigorem  
inducit.

Rigor acris  
inflammationi  
in abscessum  
conversis.

Formidabilis  
inducit horrorem  
et rigorem.

Rigor quid  
significatur.

Horror talis  
affectus est cuti  
solum, qualis totius  
corporis rigor.  
Rigor quid.

Calidum innatū  
non est animalis  
generatio posterior.  
Natura & anima  
nihil aliud quā  
calidum est.

Calidum innatū  
quædam est  
vis, quæ foras mouet.  
Calidum innatū  
est vis motus,  
atq̃ ex calore  
& frigore suū  
utrum habere.

Animal quædam  
& calor,  
& agere de  
calore.

Affectus calidi.

Affectus frigidi.

Rigor est finis  
dum finem refrigerationis.

Rigori causa.

bilis vtiq; liquet, non frigori duntaxat rigore tribuendum esse, cum ab aliis causis, & precipue ab acris & calido humore delato per sensibilia corpora, interdum proficiatur. Ceterum neq; frigidum humore, neq; acrem, ad rigoris generationem simpliciter excellere, sed propriū modū ipsorū vtriq; necessariū inesse oportet. Modus autem fuerit aut corporis mensura, aut humoris qualitas, aut aliquis corporis locus, in quo illum aggregari conueniat. In quiete quoq; moriūq; ar-  
10 que ipsius mononis modo, haud parua differentia oboritur. Vbi igitur flaua bilis non per vasa, sed p carnes mouetur, manifeste gignitur rigor. Hoc namq; solo febris ex ingenti ardore à terra nis differt, quod illæ quidem in vasis bilem cōtineant: hæ autem, extra vasa diffusam per sensibilia corpora. Per quæ quidem dum bilis fertur, accedine sua mitissima inferius, dolorē excitat. In hoc autē duo quedam eueniunt, nempe vřan-  
20 gū cōtrahitur in profunditatem corporis, ob idiq; exteriores partes refrigerentur: & vřille eadem corporis partes quæ à bile punguntur, impellant ipsam facultate expulserit, donec ab omnibus prostrigata partibus, per sudorem aut vomitum, aut deiectionē exterminetur. Hoc etiam  
tis qui non s̄ concoerunt, aut malesuccas repleti sunt, aut in sole ætatis, vel balneo diu sunt immorati, aut seipfos exercuerūt, contingit. Horū namq; aliqui horrore confestim, & dein rigore correpti sunt. Verum non solum mordax causa,  
30 sed vehemens mora, si rigori fieri debeat, desideratur. Atq; hoc sanē ita frigidæ quā calidæ causæ est commune, quod vtriq; corpus cum dolore cōmoueant. \* Idcirco per quantitas atq; terranæ febris, q̄ vis à contrariis oriantur humoribus, rigor tamen invadat. Etenim vt atra bilis est frigida, sic flaua calida existit. Ceterum nō solum ex atra aut flaua bile, sed ex pituita vitra modo frigida (quam vitream appellauit Praxagoras) rigor fieri consuevit. idq; in mulieribus magis, & quæ in ocio vitam traducunt: qui rigor tamen vehemens non est, & quiescentibus, nullōque modo moris corporibus, ipse etiz conque-  
40 scitur. Iis autem qui simili affectu correpti sunt, in principio quidem medicamentū diatrion pepecon propino: subinde verō nostrū ex calamitha: deindēq; ex succo Cyrenaco, castoreoq; cōpositum, quod quartanæ exacerbationibus maxime confert, præsertim quando ingentis rigoris impetu ægrī afficiuntur. Porro quæ quartanæ  
50 correpti sunt febribus, vsq; ad ossa sibi penetrare rigore affirmant: & tales, qualis per immensa frigora, dum iter facerent, eis accidebat. In rigore autem qui tertianæ, pariq; modo ab ingenti ardore ortas comitatur, quasi ab acutis tenuibūq; acubus se perpetui fatentur. \* Nunc verō de convulsione nōnihil dicamus. Voluntariū omnes motus, per musculos abfoluuntur. Vbi igitur musculi in propria retrahuntur capita, ad ea singulæ partes, quibus natura infixi sunt, retrahuntur, cōuellunturq;. Verū si passio aliqua suboritur, quæ in tensionē ipsos adducat, hanc sequitur motus similis quidem naturali, involuntarius tamē: atq; hæc passio cōvulsio appellatur. Nam tendi cōtrahiq; musculū in proprium prin-

cipium, secundū illam corporis partem, cui est infertus reuellere, bene valentibus convulsioq; cōmune profectū est. At si invitū id agatur, præter naturæ ordinē dispositis, minimēq; sanis cōtingit. Tenduntur autem nervi: pennde ac cithararum chordæ, interdum quidem plurimo humore imbuti, interdum à causis excoctantibus arefacti. Euenire etiam potest, aliquam corporis partem aut ob inflammationem, aut aliqua alia de causa, vehementer affectam, nervos sibi vicinos vnā secum reuellere. Porro in febribus ab ingenti ardore contractis, convulsiones accidunt, ob solam siccitatē in signū vřiuersi ueruiq; generis: in phrenitide autem, ob principij nervuorum inflammationē. Ceterum cum corporis partes arterius tenduntur, symptoma dicitur emprosthotonos: cum verō posterius, opisthotonos: \* at cum in vřtrum latus ex æquo inclinant, tetanus. Igitur convulsiones à siccitate ortas, minimē curandas susceperat. Nam qui us sunt affectu, cōtinsimē intereunt. Quæ verō vel ab humore corporis, vel ab inflammatione trahunt ortum, iis, si plenitudinem vacues, aut in inflammationis cōmodis remediis succurras, mederi poteris.

### GAL. DE MORBORVM TEMPORIB. LIB.



Vod in animalibus ætas, idem tempus in morbis significat. Etenim quem admodū ipsi nos generi ad vigore vsq;augecimus: inde iam contrahere incipientes, ad extremam vsq; corruptionem declinamus, si omnes ætates pertransierit finis: ita singuli morbi à prima ipsorum constitutione ad statum vsq; increscunt, donec pro augmenti prioris portione decrescant, in totū dissoluuntur. Hoc tamen discrimen interest, quod animalibus quidem, cum sint corpora, proprium generationis tempus præscriptum est, quo omnes ad vitam necessarīe partes figurantur, formanturq;: morborū autem, cum sint accidentia corporū, nullū huiuscemodi tempus est præfinitū, sed à prima itan generatione augescunt. Figurationē itaq; generationemq; proprietates corporū postulat: accidentia autem ipso ram, cum nullam figurationē desiderent, statim vbi genita sunt, ad incrementū festinant. Si quidem phlegmone (exempli gratia) cum primū in-  
ceptū esse, huiuscemodi speciei habere videtur, qualem habebit vbi erit maxima: sola autem magnitudine differt. \* Porro pars phlegmone obfessa, calidior seipsa evadit, cum tremore maiori, item dolore & tensione. Sed hæc parus primo adim fur: inde autem ad magnitudinem quodam nō omnibus æqualem incrementum. \* Postea verō aut discutitur remediis tum idipse præter naturā, simidq; illius dolor atq; calor resoluuntur, aut certē in pus convertitur. Tempus itaq; nullū inflammationis generationi singulariter præscriptum tribuitur, ab eo, quod augmenti est, diuersum. Febris etiam (qui calor præter naturam est) propriū distinctūq; generationis tempus non habet. Sed vbi corpus primū calidius quā antea febrili calore fieri cœperit, inde aliud atq; aliud tēpus affectionē incrementū excipit, vsq; ad per-

Tensio nervorum inardens ab humoresibus, nervulis à siccitate causis oritur.

Emprosthotonos, non Opisthotonos. Tetanus. Convulsio à siccitate non vřu pot curatio.

Tempus morborum clariorum et ali animalium.

Tempora morborum ab ætate animalis quomodo differat. Morborū generationis nō est certū quoddā tempus præfinitum.

Phlegmones accidentia.

Febris quid.

Rigor fit vřilla na bilis fertur per membra sensibilia. Ardentes febres quomodo à terranæ differt. Rigore extremæ per accēssionē vnde accidit.

Rigor fit à causa non quæstio in se modo.

Pituita vitrea inducit interdum rigorem.

Rigor tamen ex frigida humoribus, curatur.

Quartanæ ex exacerbatione bus medicamentis ex succo Cyrenaco & castoreo auxiliatur.

Tertianæ rigor qualis.

Mtus voluntarij à musculis fuerit.

Cōvulsio quid.

Vigor in singulis  
rebus est ma-  
gista de sum-  
ma.  
Initium morbi.

Incrementum.  
Stans.  
Declinatio.

Circuitus qua-  
riduanus.  
Circuitus ter-  
tiana.  
Circuitus quater-  
tana.

Tertiana se-  
cus descripta.

ad perfectum vigorem, queni in singulis rebus  
summū esse magnitudinē intelligimus. At verō  
principium speciei quadam ab incrementis post  
ipsum, diuersum esse demonstrare conabimur.  
Etenim initium vniuscuiusque morbi esse cōfuerit  
veteres, non primū illum simplicemq; insultum  
duntaxat, sed temporis longitudinem latitudi-  
nemq; notari dignam ipsi tribuerunt. Post prin-  
cipium ipsum, collocauerunt, ascensum; dein, statū;  
ab hoc, declinationem. Ex quibus sanē temporis  
bus circuitus morborū consistit. Ipsorum autem  
circuituum nonnulli describuntur horis vigin-  
ti quatuor, quotidianis vocantur: alij quadra-  
gingta octo, hoc est, duabus diebus & noctibus,  
vocalūdy tertiani. Alios (quos appellat quar-  
tanos) septuaginta duarum horarū tempus de-  
scribit. At hi circuitus omnes, aliquando ad mte-  
gritatem perveniunt, vt in quotidianā, tertiana,  
& quartana febris: interdum ad declinationē so-  
lidā, vel propius ad integritatem, vel longius ab  
illa, accedunt. Igitur in auspiciis tertianæ febris  
(quam exempli gratia propono) horror medio-  
cris oritur. Dein cum maiori horrore extrema  
omnia refrigerantur. Postea verō & rigore & fri-  
gore cōducuntur plurimæ corporis partes. Quo  
tempore pulsus durior, minorq; & prius, reddi-  
tur, necnon in contractionē velocior. Præterea  
quies post contractionē ferè maior coningit:  
post dilationem, eodem cum illa modo: spe-  
riori æqualis, etū aliquando inæqualis. Atque  
hec sanē in quibusdam tertianis, curriculo dua-  
rum horarum æquinodialiū solēt spe cōtinge-  
re: in aliis autē longiori vel breviori intervallo.  
Inde pulsus maior simul & celerior, densiorq; sic  
incipiens, sensim singulis cōmemoratis incre-  
scit: statimq; ægri calidiores quā antea reddū-  
tur. In summa, inæqualitas quæpiam non medio-  
cris in corpore per hoc tempus exuperat. Atque  
hoc sanē est secundum tempus a primo illo, in  
quo ex priori statu fuit vniuersum corpus refri-  
geratum, pulsusq; in contrariam constitutio-  
nem mutatus. Vbi verō febris ad integritatē de-  
sinit, tūc pulsus ad naturalem statum reuertitur,  
si qua fides habēda est sensibus. Primū itaq; tem-  
pus tonus periodi est, quo corpus cum prædi-  
ctis mutationibus pulsū inālsit. Aliud ab hoc  
secundum est, quod pulsū & calorem in con-  
traria mutat, donec tota corporis moles æqua-  
biliter concaleseat. Post hoc tertium, quo calor  
etiā minus augetur, pulsusq; magnitudine, cele-  
ritate & frequentia ei respondētib. Quarta  
constitutio post tres cōmemoratas conspicitur,  
omnibus iam dictis æqualem sibi magnitudi-  
nem pro sensus nostri iudicio seruanti. Ad hæc  
quinta alia, cū illa calor manifestō decreverit: ha-  
bitus autem per cutem excensur, pulsusq; ad na-  
turalem habitum redit, reiciens omnia, quæ præ-  
ter naturam in magnitudine, celeritate, frequen-  
tia, duritiæque conquiescant. Hoc tempore pluri-  
mis ipsorum sudor oritur. Post hoc autem, inter-  
missionis, siue intervalli tempus succedit. Igitur  
primū tempus in integritatē colatens, quod frigi-  
dis sensum præbet, principij vocetur. Secundum  
verō, quod frigus paulatim deponit, tempus in-  
æqualitatis dicitur. Ab hoc tertium, æqualis in-

crementi. At quartū post hoc, consistēti. Quin-  
tum imminutionis. Sextum deniq; integritatis.  
Quod igitur sex hæ temporū differentie in ter-  
tianaarum aliarumq; intermittētū febrium cir-  
cuitibus repetantur, ad sensū vel insinuatō im-  
perita iudicat. Nihil tamen obstat & aliū quo-  
dammodo febris circuitum in duas, sed maiores  
partes diuidere: vnam, primæ accessioneis & pri-  
mo insultu ad extremam vsq; remissionē: alterā,  
quæ in declinationis & insultus secundæ accessio-  
nis medio consistit. Quod igitur ab Hippocrate  
dictum est, in accessioneibus abstinendū esse, pro  
accessione intelligendū exitum tempus a pri-  
mo insultu, vsq; ad ipsam declinationem. Porro  
clarioris doctrinæ gratia, omne id quod acces-  
sionem sequitur, remissionē vocabimus: quæ vis  
in intermittētib; febribus, remissio ipsa ablatio  
etiā dici meretur. Diuisimus itaq; febres de-  
sinentes ad integritatē, quondamam, tertiam am-  
quartam: quarū singulæ sex distincta sortuntur  
tempora. At verō quæ nō intermittunt integrē,  
in quinq; tantū soluntur, ab eis nimirū sola in-  
tegritate remota. Quarum sanē nonnulli quoti-  
die accessioneem habent: quædam tertio quoq;  
die. Quæ verō quarto habent, non frequenter,  
sed raro evenire vidētur, vt pote quæ magna ex  
parte ad integritatem desinant. Ad hæc, febrium  
quotidianarū, tertianarū, & quartanarū, quæ ad  
integritatē nō desinunt, duplex species est. Quæ  
dam namq; magnitudinem, celeritatem, frequen-  
tiam, atq; duritiem pulsus deponunt: quædam  
autem reliqua tria ad naturalem statum deduc-  
unt: at cōseruant celeritatem, hæc magis, illæ mi-  
nus. Verum in quibus febribus citra sensibilem  
sytholen, accessioneis insultus accidunt, tria tempo-  
ra in vnum recidere est necessarium, totidmq; id  
vsq; ad statum fieri incrementū. Nam vbi nō ad-  
fuit conspicua sythole, ibi nec inæqualitas adesse  
potuit. Statum verō nunq; defuisse memini: sed  
semper sensibili æqualitate in omnibus febribus  
aliquandiu permanisse. Insultū etiā milleis si-  
ne dictis conspexi symptomaticis. Quibus febris  
nullus circuitus adest, vt iis quas synochas  
vocant: nec accessio quædam omnia est, neq;  
prædictæ partes. At tamen hæ quoq; secundū di-  
uersa tempora tonus morbi particularis obtinēt,  
aliis modis innotefcentes, & per accessioneis tem-  
pora. Sed nunc tantū de febrium circuitibus,  
nisiq; nō complicatis, sed simplicibus, nobis habe-  
tur sermo. Adverte autē, aliud esse miseri, aliud  
inter se complicari. Semitertiana quippe, ex mi-  
scella & temperamento quondamie & tertianæ  
febris oritur. Potest tamen ipsi semitertianæ co-  
pulari alia simplex febris, vel tertiana, vel quoti-  
diana. At huiusmodi varietas minimē ad hunc li-  
brum pertinet. Cæterū cognitū singularum fe-  
brium temporibus, facili complicatarū tempo-  
ra cognoscemus. Igitur de simplicibus desū ab-  
vndē cum sit, de commissis deinceps differamus  
in quibus interdū horrificus insultus quiddā cōti-  
git, omnes principij peculiare notas habens,  
præter rigorem: quæ inter dnm & huius quan-  
dam imaginē representans. Siquidem vehemēs  
horror, vel aliquod rigoris initium, vel parvus ti-  
gor videri potest. At exactū rigore, qualis in ter-

Febrim nō in-  
termittentem  
reperi temp-  
ra quinq;  
Cautum est  
febrim se re-  
mittentem  
descri-  
bi.  
Quartana nō  
intermittit,  
toto in vno  
statu.

Synochis febris  
bus, non cum  
circuitu adesse,  
at prout no-  
que accessioneis.

Nos non si-  
bolum differ-  
re complication-  
ne caruimus,  
Semitertiana  
ex quibus con-  
stat.

Tertiana ac-  
cessione tem-  
poris seu deseri-  
buntur: quæ  
reperiuntur  
Cuius aliam  
intermittent-  
is circuitibus.

*Signe valentia  
non adest  
firmitas febris  
dur.*

*Semiteriana  
febris accessio  
nonquam in-  
terire desinit.*

*Semiteriana  
febris inuale-  
scere maximè  
dum.*

tianis quartanisq; est, febris miscellanea, cuius-  
modi semiteriana existit, non recipit. Vbi igitur  
signa quædam secunda temporis, febris hæc præ-  
monstravit, initium rursus alterius in vasionis hor-  
rificum efficit, quod nonnulli repetitione appel-  
lant. Aliquando hoc secundum molitur: quibus-  
dam terno facit. Deinde vix æquabiliter simplex  
redditur, ad vigam statum increfcentem. Hæc febris ad  
integritate nunq; desinit. Nā periculum tempo-  
ris vigam ad vigorem habet, declinationemq; line  
perpiratu sensibili: tantū abest, vt integrè cum  
sudore solvatur. Quænam dmo dicitur igitur a primo  
insultu accessio ad vigorem vigam, multo tempo-  
re pervenit, sic a vigore paulatim minuitur: deo  
que postredie altera accessio advenit, horrida  
quidē illa, sed quæ non item cum priori repeti-  
tiones habet. Porro hæc accessio ad vigorem enī  
longo tempore ascendit, nec exiguo inclinat: at-  
que ob hoc ipsum tertio die, eadem quæ primo  
accessio invadit: postea rursus quarto, similis ei  
quæ secundo habita est, idque perpetuo ordine.  
Hanc igitur febrem, quæ maximè in valescit Ro-  
mæ, voco semiterianā. Sunt & alie differentiæ  
particulares febrium, multaq; aliq; circuitum mo-  
di differentiis particularibus variantes, quos ex  
industria omisso, ceu nihil conferentes ad præ-  
sentem commentationem. Atq; hæc tenues de par-  
ticularibus morborum temporibus.

# GALENI PERGAMENI de totius morbi temporibus liber unus.

*Totius morbi  
tempus a quo-  
ritur.*



OTIUS etiam morbi tempora, simili-  
ter ac animantium ætates, conside-  
ramus. Quorum vnum quidem &  
primum, generationi ipsorum tri-  
buitur, incremento secundum, tertium vigori,  
quartum deniq; declinationi, vbi ægni salui futuri  
sint. Nam si vel in ascensu, vel statu decelinerit,  
siq; et talem morbum non omnia tempora per-  
transiisse. Reticulum autem fuerit, pri-  
mum tempus primæ accessionis, totius morbi  
principium existimare: cum nimirum principii  
morbi ad præsidia ferenda, viles præbeat indi-  
cationes. Ad id principium respiciens Hippo-  
crates, ait: Incipientibus morbis, si quid mo-  
uendum videtur moue: cōsistentibus verò, præ-  
stet conquiescere. Præterea nō minus absurdum  
fuerit, morbis qui intra diem solvuntur septimū,  
& us qui prorogantur in annum, æquale princi-  
pium tribuere. Ostendimus autem primo libro  
de Crisibus, totius morbi principium, ipsius cru-  
ditatem existere. Porro inflammationis princi-  
pium, totum illud tempus existit, quo sanguinea  
substantia pars affecta repletur. Cum autem in-  
fluxus cessauerit, & quod in particula contine-  
tur, putrefieri incipit, calor quidam ob putre-  
dinem nascitur, & fæcio magis propter calorem:  
vnde etiam spiritus generatur, atq; ob hæc am-  
bo, particula magis quàm antea distenditur, &  
enam si nihil insular. Hoc igitur secundum tem-  
pus, est inflammationis augmentū. Ad cum hu-  
mor in pns iam vertitur, maximè tunc dolores  
partem ipsam corripunt. Nam in puris genera-

natione dolores, febrisq; magis quàm prius, in-  
ferant. Vocatur autem hoc tempus ægritudinis  
vigor. Quod si humor in pus mutetur, vel dige-  
ratur, minorem tumorem atque tensionem effi-  
ciat: humilimodiq; est declinationis principium.  
Sic itaq; in inflammatione tempora diuiduntur:  
nec secus in febrī, quæ ab illa trahit ortū. At quæ  
ab humore citra inflammationem oritur, mole-  
stantiū humorum cruditeratem pro initio habet.  
Hi vbi concoqui incipiunt, initium finit, atq;  
ascensū siue incrementum advenit. Vbi verò  
maximè cōcoctio perficitur, vigor adest. Quam  
declinatio ē vestigio sequitur; dum symptoma-  
tum magnitudo, & humorum copia est repres-  
sa: restat autem humorū modicum, adhuc con-  
coctionem desiderans. Vicerum quoq; eadem  
habentur tempora. Primum pangit ianæ aquo-  
se, incoctæ & tenues ab ipsis deſcunt. Dein pan-  
ciore atq; crassiores. Postea iam pus tenues. Po-  
stremū minus quidem copia, sed crassius, & al-  
bidum magna redditur: quemadmodum appa-  
ret etiam in pleuritide & lippitudine. Quare nul-  
lus morborum solutorum existit, qui non hæc  
quatuor percurat tempora. Non tamen ex quo-  
dam alio quàm cruditiatis & concoctionis indi-  
ciis, quæ ex recementisprehenduntur, cogni-  
tio ipsorum constat. Etenim fluxionem quæ ex  
cerebro per palatum & nares fiunt, non secus  
quàm lippitudinis, initium quidem est, cum a-  
quei, tenuisq; necnō copiosi & acres, qui fluunt  
humores apparent: nam extremam hæc cruditi-  
tatem significant. At concoctionem portendit,  
crassior & minus acris, modicisq; humor deſe-  
dens. Iam verò quemadmodum in ætatis, nō  
ipsum vigorem modū, sed omnia quatuor tem-  
pora latitudinem habere comperimus: sic etiam  
particularium accessionum, ac totius morbi vni-  
uersa tempora, latitudinem momentaneam ſor-  
tuntur. Vigor itaq; tum accessionis, tum totius  
morbi, sensibilis tempore absoluitur. Igitur vni-  
uersūq; morbi proprium quoddam tempus ge-  
nerationis existit, interim sensui manifestum, in-  
terim minime. Post quod rursus augmenti tem-  
pus advenit, nec id quæ manifestum in omni-  
bus. Post hæc vigoris sequitur tempus, omni-  
no sensibile. Quod si salus futura sit, declina-  
tionis etiam tempus sequetur, & hoc sensui subie-  
ctum, cum nimirum amplam latitudinem ha-  
beat. At verò morborum qui non solvuntur, du-  
plex natura est. Nonnulli enim ipsorum præpa-  
rationem habent, vbi exactè illam absolutam  
sint consequi: alij ex eorum natura sunt, qui  
solvuntur: id quod eis in ægri perniciem accidit.  
Hoc autem contingit tripliciter. Nam aut pro-  
pter ægrotantium imbecillitatem, vel propter  
propriam vehementiam, vel propter vitæque,  
prius penitunt, quàm solvantur. In vniuersum  
autem, nemo servari potest, nisi natura super-  
averit morbum: nec perire, nisi illam morbus pro-  
straverit. Igitur morbi singuli ex sua quidē natu-  
ra magnitudinē quandam possident, quæ vel su-  
pra vires est, vt eas opprimat: vel vinibus egri im-  
becillior, vt ab eis superetur, omnib; probè eve-  
niens. Proinde cum supra vires fuerit, homo  
profusus morietur. At morbi tēpora tunc parim

*Febrim autem ha-  
morum potest  
ut videretur rō-  
pora deſcribere  
tur.*

*Vicerum tem-  
pora.*

*Tempora mor-  
borum non de  
limine cogni-  
ſci, quàm ut  
cruditiatis ex  
coctissimū in-  
dicat.*

*Tempora vni-  
uersa morborū  
latitudinē ma-  
mentaneam  
ſortuntur.  
Morbi cuiusq;  
generationis  
proprium quod  
dē est tempus.  
Tēpora totius  
morbi qua-  
tuntur.*

*Morborum qui  
non solvantur,  
natura duplex.*

*Servari nemo  
potest, nisi na-  
tura superaverit  
morbum, nec  
perire, nisi illū  
morbus proſtra-  
verit.*

*simili*

*Principiū mor-  
bi ad præſidia  
ferenda, viles  
præbet indica-  
tiones.*

*Principiū mor-  
bi totius, est  
cum cruditas,  
inflammationis  
quatuor tempo-  
ra deſcribuntur.*

50

60

simili modo cum prædictis similitur, partim dissimili. Si quidem initium similiter in morbi generatione constituitur. Ascensus autem, haud in confectionis, sicut in iis qui superfluitas sunt futuri, sed in cruditate signis, letalibus consistit. Ergo bene colorata vrina, & medio criter crassa, optimi optimata existit, quantum ad colorem & consistennam pertinet. Conuenit autem præterea, vel encephala, vel nebulam, vel hypostasin salubrem adesse, utcumque morbi natura postulauerit. At cruda vrina est illa, quæ nec suspensum quicquam, nec subsidens, nec nebuli habet: imò quæ nec crassitiem aliquam, nec pallorem assumptis, sed alba est, & consistenna tenuis, aquæ speciem referens. Quod si aut nebulula, aut encephala, aut hypostasis nigricare videatur, talis vrina est letalis: quæmodò si quædam similia fursuri, vel lamis, in ea videantur. Iam verò si aut fœcunda sit, aut pinguior, oleaceam in se continet, mox tem minatur. Hæc igitur sunt vrinæ, magni morbi notæ. Magni etiam esse morbum cognoscas, si spumam pleuritide & peripneumonia laborantibus, vel nigram, vel solum vehementer, vel spumans, vel impenso fœtidum fuerit: vel nihil omnino expuat: idem ingenti dolore, vel spirandi difficultate hominē affligente. Respondent his & alij morbi, qui iecur, ventriculumque exteant, eodem letalium signorum genere comprehensum. Unde in huiusmodi morbis vigorem similitur cum eo qui salubrium est, determinare non licet. Nam ille maximæ accessiones statim definit: hic verò non licet maximas accessiones similitur determinare, cum morbus quidem ipse à principio incoctus persistat: verum intellectum maximum capere oportet. Porro in inflammatione quæ teeminarur, puris generatio, vigoris terminus est: in ea verò quæ non finit, homo etiā in eius ascensu mori potest. Cæterū vires validissimæ usque ad extremam phlegmonem magnitudinē sufficere possunt: quæ magnitudo extrema, vel in gangrænam, vel in putredinē terminatur. Iam verò vno eodemque tempore duobus tribusve morbis homo infestari potest: quorū alius iam inclinat, alius principium tempus adiuc, vel augmenti primordia occupat: tertius plurimū auctus est. Deinde hominē mori contingit, non propter indignantem, vel nunc incipientem, sed ob vehementer auctum. Quæ de causis tria facultati nostræ corpus regentium principia, summè considerabis, quoniam statim prædicta. Dico autem hec, cerebrum, cor & hepatis. Deinde alias quoque vniuersas particulas, ex singulis principijs ortas, nē per uenas, venas, arterias: ad lūx illas, quæ naturam quidem propriam habent, sed ab omnibus principijs reguntur. Nā ex hac speculatione, primum, siue vnus, siue plures, in homine morbi sint, inuenies. Proximū est, cuiusque propria tempora ad præsidiorū inuentionē necessaria inspicere. Et cum circa initium & fines, omnia imbecilliora sunt: in vigore fortiora: quæ licet intercedant, medio consistunt ordine. Igitur in vigore, quod mitigandi vim possidet, in curatione præpollere debet: in principio & fine, quod vehementiā habet. Ad media tempora, pro summo rum proportionē capiuntur. Neque enim quam

quis victus rationem instituit, in venire poterit, neque vñg nutrire, sine certa temporū distinctione. Et enim si vigoris tempore, etiam sine alimentis exalatione sufficere possit æger, optimū si alimen fuerit, donec morbus inclinet, à cibo abstinere. Si verò sufficere citra cibum nō possit, protinus ab initio in quolibet tempore, quod alimentum admittit, alendus est. Atque hoc remissionis est tempus. Voco remissionē modō, secundam pacem tōtus circuitus in duo vniuersa diuisi, nempe accessiōnem & remissionem.

### GALENI PERGAMENI de locis affectu, lib. I.



Ro differentia partium humani corporis, variari affectu curationem cōtingit. Partes igitur quæ in superficie corporis sitæ sunt: vñ cum affectibus quibus vexantur, facile sensibus deprehenduntur. At verò in ima corpore delitescent, excoriatæ cogitationis virum desiderant, cum in partium actione & viā, tum vel maximè in arte secandi corpora, quæ nimirum nos docet accuratissimè proprietatem essentis vniuersusque partis. Si igitur inter tussendum, bronchium aliquod expuat (est enim id natura cartilagineum) maximo sanè vlcere affligi pulmonem existimemus. Nam tamen alpera arteria similibus sit ex bronchiis cōpacta, tum grandis tamen exvleratio, sine præmarura morte in illa gigni nō poterit. Nec verò tantū ex proprietate essentis, sed ex magnitudine etiā excrementi reiecti, affectus locus discernitur. vr, si vñ tussis excreetur aliqua portio vasū grandiscula (quod aliquando conngit) tunc certè credendum est illam educi à pulmone. Quādoquidem venæ quæ in asperam arteriā diseminantur, minutissimæ sunt, & capillorū instar. Similiter si per dysenteriam tunica aliquam compulsiorem alius aliquando reddiderit, non ab re conicere vlcere crassiora intestina torqueri. Necnō ex rebus naturaliter in particulis quibusdam contentis, creberrimè sedes affecta cognoscitur. vr, si vrina per vulnus reddatur, vesicam: sin verò sterua, intestinorū aliquod: at si cibus, ventriculum liquet esse coagulatum. Similiter etiam si vulnere thorace, spiritus per vulnus efflueret, indicat membranam cingentem costas, solutam esse. Præterea sanguis effusus saliendo, arteriam esse vulneratam denunciat. Qui quidem arteriarum sanguis, eo qui à venis effluit, calidior, tenuior atque fluidior apparet. Ex adhaerentibus etiam rebus, affectus sedis notæ petuntur, cum nimirum & ipsæ etiam essentis proprietatem obtineant. Huius generis est remanentia quod quidem ostendit illius partis vlcus, à quo reiecit. Nam si id cum lotio excreatur, vrinæ meatu: si tussido, spiritalium instrumentorum: si per vomitū, gula aut ventriculi: si cum alui excrementis, intestinorum vlcationē significat. Est præterea & alius diuindicū motus sumptus à rebus alibi contentis præter naturā. vr, si in vesica aut renib. cōtineatur lapis, in thorace pus aut deniq alius humor molestus in animalis corpore, illic genitus, vel adueniens extrinsecus. Fingamus igitur

Villus & vniuersa  
medij rationalis  
infusio: vñ  
ipsum morbi  
tempore.

Causa affe-  
ctuum varia-  
tur: pro differe-  
ntia officiorum  
particularium.

Ans. secundum cor-  
pora, docet non  
proprietatem  
essentis vniuersi  
cuiusque partis.  
Sed etiam præ-  
ter naturā.

Magnitudo ex-  
crementi suble-  
uitas.

Rei naturaliter  
in particulis  
quibusdam  
contenta.

Sanguis ar-  
teriarum calidior  
est: vñ tenuior.

Ans. conueniens  
præter naturā.

Vrina optimata  
qualis.

Vrina cruda  
notata.

Vrina letalis  
notata.

Spumam  
signa.

Principia facul-  
tatum regentium  
corpus regentium.

(gratia exempli) aliquē tribus diebus non reddi disse vrinā. Ad hæc, evidēs quiddā tumor circa partem emineat, evidētē repletionem vesicę indicans. In primis est cōsiderandū est, num resolutę excreticis potēntie nō in omine id accidat, an ob obstructā vrinariū meatum: nā vtrūq; potest accidere. Prius tamen revocare in memoriā oportet, musculū qui claudit collū vesicę, ab actione gessere, dum fungitur vesicę suo munere. Cuius quidem musculi actio, paret voluntatis imperio. At vesica ipsa, vrpote naturaliter agens, minime voluntati obediāt. Inest etenim illi, quędammodū ceteris fere omnib. partibus, facultas quędā expultrix, quę vrinā, dum cōtrahitur ab excrementis. Quę sanē excrementi vis, si aliquando fuerit affecta, fieri potest vt supprimatur vrina. Proinde si hominem sic figuraueris, vt decubus sit collū vesicę positus, ac manibus pubis tumorē prefferis, tandem reddetur lotium. Quōd si sic faciendo nihil omnino promoueris, non resolutū eam vim, sed vrinę fistulā cōspicari esse, suspicari oportet. Quippe musculus ei circumdatus, si resoluatur, nō cohibiti, sed præter voluntatem emissū lotiū, est causa. Tristatū autē cōtingit obstrui collum vesicę. Aut enim corpus ipsius in tantum tumorem attollitur, vt meatus inde occupetur: aut aliqd ei præter naturā, vt caruncula vel callus, innascitur: aut et deniq; a re quapī adueniente, meatus ipse obstruitur. Porro corpus eius ad magnitudinem insignem attollitur, si vel in inflammatione, vel scirrho, vel abscessu, vel alio quouis tumore fuerit affectum. In meatu carō quidem oritur, si præcefferit vlcus. Obstruitur meatus, vel à lapide, vel grumo; vel pure, vel crasso lentōq; humore: quę omnia distinguere oportet, ex præfennibus præteritisq; accidentibus. Sit igitur aliquis puer, qui perpetuū pudendum scalpat. Etus autē vrina sit aque similis, in qua fabulosa quędam subdecat: dein vtrō repēntē supprimatur vrina: nunquid optima ratione conieceris, huic lapidem incidisse in collum vesicę? Itaq; supino collocato puero, vt crura relicto corpore sint sublimiora, multafari ipsum conuenies: sic enim feceris, vt lapis à meatu recedat. Quibus peractis, iube vt puer vrinā conetur reddere. Quōd si profluxerit, nōstrā causę, ac simul curationis modum te inuenisse, ne dubitaueris. Sin autem nihilominus supprimatur vrina, tunc demissa genę fistula, simul lapidem à vesicę collo repelles, & evocabis vrinam. At nulla lapidis nota præcedente reteneam lotium, si sanguis simul cum vrina profluxerit, argumentū est grumū aliqū extitisse ipsius obstructionis causam. Quāq; fieri potest, vt ob vlcus vesicę, citra sanguinis profusionem, paulatim grumus concrecat. Potest etiā cōtingere, vt sanguis ex renibus per vretres in vesicam defluens, grumū efficiat. Ad hæc igitur omnia, scitu etiā vbi pus, vel aliquis lentus humor meatū vrinę obstruxit, haud in vrilis est & nea fistula immissa. Sic etiā vbi ob carunculam ab vlcere innatam, veficę ceruicem obstructam esse putamus, & ex præcedentibus vlcere notis, & ex eo quōd immissa vena fistula vrina vacuat, id intelligere possumus. Quispē demissa fistula, dolorem monet in ea meatus parte, vbi vi-

cus esse coniucimus: fractaq; sub fistula carne, sequuntur cum vrinę excretionē, & eror & carnis fragmenta. In omnibus igitur his artificiosa coniectura nobis perq; vrilis est, vt quę inter exactam notitiam, & omnimodam ignorantiam, mediā quoddāmodo existimet. Ceterū cū uisibet partis vīus, magnificet ad affectōrū locorum cognitiōē conducti. Etenim actio, motus partium factius est: at vīus, omnibus inest, vel nihil etiā agenribus. Fit itaq; excretionis vrinę actio, à compressione vesicę, opulantiūbus etiā ab dominis muscularis, vbi vrinam admodum exiguum continet, aut vesica ipsa est infirma. Reliquę autē partes omnes, ad actionē sunt vriles. Porro si vesica minime in tumorē extensa, vrina reddi nō possit, necessum est vel vretres, vel renēs obstructos esse. Quapropter hic rursus inueneri oportet, num anteq; supprimeretur vrina, aut lapidis, aut inflammationis, aut alterius cuiuspiam mali accidentia præcefferint. Neq; interim negligenda est vniuersi corporis dispositio: vt possimus planē discernere, num in ipsis renibus, à lapide, vel crasis humoribus, fuerit obstructio oborta, an in vocatis vretres. Cū igitur singulę actiones corporis, peculiarina fortitur organa, quibus obcuntur, sanē actionē lxi est necesse, instrumentū efficiēte ipsam, quomodo soluitur. Verū inter dum facili affectus productus soluitur, ita vt simulatq; opifex causa femora fuerit, profus ipse conuiescat. Interdum verō vique adeo pertinaciter hæret, vt permaneat diu in sinu, etiā ablata causa. Accidit autē nonnunq; vt efficiens causa pertransiens, nō firmam faciat affectum: veluti cū suffusio similia oculi imaginatur, collectio in ore ventriculi aliquo tenui excremento, vnde vapores sublati ad oculos, similes imagines mouent, quales per suffusiones cernuntur. Oportet siquidem oculos participes fieri eius dispositionis, quę inestat vētriculum, si videndo debeant hallucinari. Itaque necesse est ordini semper ab instrumentō actionis oblati. Dein autē investigare, quismam sit ipius noxę modus: num videlicet dispositio ipsi sit permansens, an adhuc in generatione cōsistat, nec nata perseuerare. Quōd si nunc quog; fiat, vtrum causa quę effectum producit, continueatur in ipsa parte, an per ipsam transeat, inuestigandum. Etenim arefactio in modicē humore, quem crystallodem vācant, perseuerans erit oblatio, & essentia ipsius proprius affectus. Si verō crassus humor in pupilla cōstiterit, essentia quidem nondum ē est lxi, verū accidētē causa in oculo ipso cōsistit. Tunc autem per ipsum transire dicitur, cū evaporans humor in ventriculo cōtinetur. Non autem necesse est ad hoc, vt pars aliqua esse affecta dicatur, in essentia ipsius permanentem esse dispositionem. Nam vbi vlcens dolor aliquod intestinum inestat, firmato in vna quapī parte dolore, vt quasi per foratū videatur, quo pacto quis vel nequaq; intestinum affici dixerit, vel in eo affectum nō consistere? Quis huiusmodi dolores interdum excreto quodam humore vitreo, vel temporis momento soluantur. Is igitur humor vitreus, causa illius doloris extitit. Id siquidem quo tangente afficimur,

Coniectura ut  
efficiat.

Vrina renibus  
à quibus fiat.

Actiōnem lab  
est necesse, in  
strumentū ob  
cens ipm  
quomodo soluit  
lxi.

Oculus est qm  
vbi quę pat  
consideranda

Humor vi  
treat.

Vrina suppres  
sa quę fiat con  
sideranda.

Musculus vesi  
cę collo claudit  
grumū, apē vōlū  
tari.

Vrinam sup  
pressam ob re  
solutam rem  
excrementi quā  
modo expellere  
oportet.

Obstruitur col  
lum vesicę tri  
stam.

Lapide inco  
mmodū colle re  
ficia, indicia.

Vena fistula  
ad quē vrina.

Cervicula collo  
vesicę innata  
argumenta.



*Causa est illi, quo tangente quodam affectu morbo ablati sunt. affectus solatur.*

*Dysenteria cum sit morbus et sit humor.*

*Morbis omnis protinus ab initio tandem si lapsi naturam atque affectionem fortiter, nec differt nisi magnam tendit ad non ab initio et morbo.*

*Morbis exiguus solus vultus a natura.*

*Dysenteria est vultus castellum rui.*

*Admulla lectione, nisi pars quod est effectus affectionis.*

*Agri quid dicitur.*

*Affio quid dicitur.*

*Morbis quid dicitur.*

*Morbis quid dicitur.*

*Morbis quid dicitur.*

*Morbis quid dicitur.*

*Morbis quid dicitur.*

*Morbis quid dicitur.*

*Morbis quid dicitur.*

*Morbis quid dicitur.*

*Morbis quid dicitur.*

*Morbis quid dicitur.*

*Morbis quid dicitur.*

*Morbis quid dicitur.*

*Morbis quid dicitur.*

*Morbis quid dicitur.*

*Morbis quid dicitur.*

afficiuntur, & quo separato quiescit affectus, causam esse, omnibus in consensu est. At verò ipse affectus, nonnunquam a causa aliqua oritur: sed ita oritur, ut sublara causa effectrice, haudquaquam permanens habet dispositionem. Interdum autem partem iam factus est, partem etiam non sit. Serpenter numero etiam si fieri desinat, vitio te ablata clausa, perseverant tamen permanet dispositio. Vel in dysenteria, cuius affectus, mordax humor existit causa: vitio te qui ab initio extergat, abraditque, ac dein temporis tractu viceret intestinum. Quod si antea quodammodo viciis, & per se ipsam humor desinat, affectus ipse nondum dysenteria vocabitur. Si verò viciis ut intestinum exerceat, etiam si humor finiat, non ob id finiat affectus. Hoc autem summo opere venit considerandum, omnem morbum protinus ab initio, ubi primū corpus ipsum lemitis temperatur, quae sanitati debetur, excessit, eandem sub ipsi naturam atque essentiam fortiter, nec differt, nisi magnitudine, & iam absoluto & maximo. Siquidem res similes, cum nulla in figura naturalem deciderent, protinus ab initio eadem essentia constant. Dissimiles vero, & quibus varia est forma, vitio te, essentiam generatione posteriore habere poterunt. Quum itaque causae agunt in corpore, ipsae species affectus ab initio est eadem, tamen ob exiguitatem non plane cernitur: sicut nec in saxo coactum, quā vincta stilla produxit. Ceterum id genus affectus exigui, separati efficiētiis causis, illico a natura vincuntur. Illi quippe dumtaxat externo egeant auxilio, quos ob magnitudinem vincere natura non potest. Igitur ubi primū mordax humor aliquod intestinum erofit, & vis id quod iam factum est, nondum aperte videatur, nihilominus dispositio ipsa sub dysenteria specie comprehenditur. Ut autem hoc intestinum ad inveniendas affectus sedes, nullam actionem laedi, nisi pars quae illam efficit, afficiatur. Verum ut affectus & actio duerit sunt vocem, ita duerit vis quoque earum est visus. Id quidem agere dicitur, quod ex seipso mori obtinet. Affici vero, quod morum habet ab alio. Cum itaque duo sint morus genera, alterationis & lanonis: ubi ad permanentem dispositionem alteratio pervenit, fuerit dispositio praeter naturam, morbus vocatur: vis per abyssionem nonnulli eam dispositionem affectum nomen. Distinguenda tamen est interim propria & primaria affectio, ab ea quae per consensum accidit. Ut autem recta propriam nominis appellacionem vitat, afficitur quidē caput, quando condoleat ventriculo: xgrotat verò, cum proprio morbo laborat. Similiter ventriculi affici quidem dicimus, ubi a visiois molestia humoribus: xgrotare verò, aut per intestine peritiam, aut cum inflammatione, vel viciis, vel abfectum habet praeter naturam. Porro corruptionis ciborum tres primae ac veluti generalissimae sunt differentiae. Una quidem per proprios ventriculi morbos, altera a visiois humoribus in ipso collectis, tertia ab alimentorum qualitate inducitur. Licet itaque visiois ad coctionem, ventriculo non primaria, sed secundaria ratione affecto, minimè quia actio a recta propriam hallucinante: quomodo modum ubi visiois cibi &

corruptioni obnoxii ingeruntur. Si igitur quāvis humorum ructum emittat, igneo quodam calore ventriculi eius esse dicemus praedictum. At deinde rursus distinguendo investigabimus, vtrū ab inter imperis corporis ipsius ventriculi, morbo oriatur: aut a sua bile, exigu vel in ipsius spacio coacta, aut in ructu ita, ut vix ab altero possit, de mulla. At ne hic quidē cessabimus. Nam rursus quaerere oportet, an iecinore malis suo officio tangente, huiusmodi humor accumulatur: an is ex vniuerso defluat corpore: an etiam in iplomet gignatur ventriculo. Ergo si in ventriculo cibis in humorum qualitate mutentur, id non ex sua ipsorum natura, causam calidam: si verò a cessat, cum frigidum esse est necesse. Ut dicemus nunc, num inter imperis aliqua, an vniuerso quāvis humor ventriculi corpus infestet, offerre oportet cibos qui sapientia natura sumaximè corruptionis modo adveniant: ut panis aut chondrum illius, qui in fumū transmutare cibum consueverunt: mel autē his, qui a cibo acidum saporem percipiunt. Dem considerare excrescentia, tum ex quā vomitur, tum quā deieciuntur per alium: num humor aliquis cum illis quidē biliosus & calidus, cum his verò pituitosus ac frigidus excernatur: an nullo vacuo humore, ipsa exigua quandam mutationem obtineat. Quippe ubi circa humoris affluxum igneo calore ventriculus infestatur, panem aut chondrum absque humore videbimus deieci, per quod ex in ipsa facta transmutatio. & Quod si humor quoque grauis in ipso ventre consistens corrumpat cibos, videtur quod ubi deieci fuerint, in huiusmodi humore submersi, & ab ipsius actione manifeste alterati. Id quod a vomitione etiam clarius discitur, si laborans fit proclivis ad vomitum. Nam cogere cum qui nequeat vomere, absurdum est. Atque haec ita deprehenduntur, si in spacio ventriculi non xox coactatur humor. Si verò in tunicis sit imbibitus, ut ad calidum nausea quaedam inanis (hoc est, citra vomitum sitis) vehemens obsequitur, ita a frigido ciborum cupiditas excitatur. Porro calida dispositio, ubi cumque fuerit, semper refrigeranda est. At quoque, aut quo modo, aut qua materia refrigerare conveniat, locus affectus demonstrat. Iam verò vis qui acidū ructu ardunt, exalatur medicamēta (hiera videlicet, quae ex aloē coctat) in potu exhibitio, quosdam olim colicos persanant, quibus mordacū humor defluxit in intestinum, consolidauerat affectionem. Ceterū intestinum proximè ventriculi partes, exhibitum tum cibis, tum potibus: quae verò non ita multum a sede distant, dyisms promptius curantur. Fungamus rursus per ventrem deici excrescentia quaedam, aliquando quidē ramenta, aliquando cruentum tum aliquod, similē aliquando haec ambo: nunc sine intestinum vlcere affectum esse, dubitauerit nemo. At verò vtrum in exilibus intestinis, ac crasis ipsum vlcus consistat, id ex rasura, & exitu tempore, & ex mutatione cum stercore, distinguere oportet. Siquidem infima partium vlcera, nullas omnino vlcum haberi notas alibi excrescentia

*Humor fumo- sus ingreditur ignem calidum ventriculi.*

*Humor in ventriculo cibis ab calidum frigidum.*

*Vomere vultus regredens est, nisi sit ad vomendum proclivis.*

*Nausea inanis indicat calidum vlcus in tunicis.*

*Capitulum ubi vultu excrescit.*

*Locus affectus quid indicet.*

*Diatron popa non vultu ad coctionem.*

*Hiera pira quibus condunt afflicti, longius supra vultu ex potu, huiusmodi pira vultu vultu.*

*Vlcus obducat in tunicis intestinis, ac crasis, quomodo deieciuntur.*

mentis admissas: earum verò partium, quæ paulatim sunt fixæ, viceræ, multas quidæ cum iterore notas habent, sed id leuiter duntaxat. Quæ admodum si multæ sint subtiliores, vehementior erit mixtura. Precipue verò in supremis intestinis viceris notæ iterore accuratè miscetur. Potest ex vno quandoque indicio simul & locus & dispositio deprehendi, aut locus vni cum causa. Ceterum locorum notæ, & ab affectione læta, & excrementis, & positu, & doloris proprietate, & propriis accidentibus desumuntur. Affectu verò, & ab excrementorum specie, & loci natura, & doloris proprietate, & propriis accidentibus. Actio itaque læta, affectum partem indicare potest, hoc modo. Si enim accedens aliquid circa cernendi ostium euenierit, oculis affici cõstat. Excrementorum species partem affectus indicat, vel quid sint ex essentia illius, vel quod ab ea cõtingatur. Positus enim affectus partem cõmmodat. Durus quippe in dextra præcordiorum parte tumor, nõ hienus, sed in coris affectu est nota: in sinistra autè, nõ hepatis, sed splenis affectu indicat. Ad laxæ, si membrano sic rursus frustulū vomendo fuerit reiectum, aut gurgulie, aut ventriculi: si rursus, gurgulie, aut asperæ arteriæ: si excreando, faucium: si cum urina, eius finitima: si à sede, alicuius intestinorum: si per mulieris pñdenda, vteri affectum portendit. Singuli etiã sedes, pro positu varietate, possunt affectum sedem ostendere. Nam si apparentibus per vomitū viceris notis, in anterioribus partibus circa præcordia lennatar dolor, ventriculi: si verò in posterioribus circa dorsum, gurgulie exciceratam esse est indicium. Ex propriis accidentibus enim innotescit affectus locus. Nam ore ventriculi affectu, fastidium inest. Per hepatis verò imbecillitatē, excrementa alui, aque in qua carnes nuper mactatæ ablutæ fuerūt, alui misantur. At in pericæpæ mortuæ, maxillæ videntur ruber. Quæntiam propriæ ipsorum affectuum notæ, in excrementis deprehenduntur: si quidem ramentū, viceris: si in urina fabulosum retinet, lapidis: cucurbitæ verò seminibus excrementa similia, larum verum indicia sunt. A locis enim ipsis, morborū indicia sumuntur, eo quod quibusdam solis morbus ille acculat, quibusdam vero solis nunquã eueniat. Quippe totæ oculi iussus ne laborant. Lapis in vesica & renibus duntaxat nascitur: atque vti nonnullis placet, etiam in colo.

Lumbri in intestinis gignuntur. Rursus impossibile est, vt cor abscissum sustineat: aut pulmo, aut ligamenta, dolorē. Ab accidentū quoque proprietate affectuum indicia oriuntur. Nam quibusdam per tabificos morbos, vngues ad vici eadunt. Intempetivus horror cum febre, inflammationis ad suppurationē transiens indicium est. Lingua nigricans ardens febrem portendit. Pauca tamen affectu sunt notæ, quæ nõ simul affectum sedem ostendant. Ceterū vt actionum notæ affectus duntaxat particula, sic differens earum, ipsius affectu declarant. Ea igitur sola sunt affectu propria signa, quæ per accedens ipsos se quuntur. Porro cum ab vapores vel etiã humores ipsos ascendentes ad cerebrū, mens læditur, nemo sanè dixerit cerebrum rursus laborare primogenio affectu: quanquã omni affectu carere,

ipsum haudquaquã defendi poterit. Quare dicendum est, illud per consensum, siue cõsors legem affici: hoc est, ab altera parte talem affectionē recipere. Sunt præterea nũnullæ actiones, quæ idoneas indagentes materia, ipsam ab aliis partibus præparatam accipiunt. Quæ de se interdū optima ratione cõtingit, nulla existente in actionis causa: ipsam propriis instrumentis noxa, actionē ipsam perire, defectu scilicet eius materie, ex qua fieri cõsuevit: vel in voce accidit, cuius quidæ materia efflano exurit. Hæc autè sit cõtracto thorace ab intercostalibus musculis. Hinc igitur nihil agentibus, animal vocē amittit, & quidẽ nullo interdū in propriis vocis particulis apparente affectu. Sunt verò hæc partes, tres cartilaginee tribus cõmonemusculis: in quos interitur nerui demissi: à cerebro. Est præterea in gutture lingua, siue epiglottis, maximè proprii vocis ipsius instrumentū. Etiam cecidit quidam ab alto, ita vedorūm affigere. In tertio die exiguam admodum vocem emittit. Quarto deinde die omnino obmutat: resoluti simul fuerūt & crura, manibus prorsus illis. Sed nec inspirationem amittit, nec difficultatē spirabat. Nam cum tota sub ceruice spina esset ei resoluta, accidit thoracis, & septum transversum, & musculus superni, numeri quidẽ in sex, mouerunt. Quippe nerui ex spinali medulla, quæ in ceruice est, ipsos descendunt. At nerui musculorū intercostalium, qui efflato efficiunt, omnes affectu erant. Vbi igitur sedata fuit ipsa inflammatio, à septimo die vox restituta est iuueni, & crura motu faciliatē, antea intercepta, recuperat. Huiusmodi ergo noxæ speciem, magis propriè per consensum euenire dixeris, quã vbi ab humoribus in ventriculo contentis, exhalantibusque, caput dolore tentatur. Iam verò, vt ab crura faciliatē quædam, sed circa essentia substantiamque descendere ob plilegmonem prohibita est: sic ad oculos, cum essentia, vbi obtinuit fuerint visorū meatus. Ad guttur autem, quævis materia perveniat per illam ipsam dorfi resolutionem, sufficiens tamen ipsius quantitas nequaquã accedit. Qui verò ab intercostalium musculorū perforatione obmutat, in tota vocis materia amisit. Porro quemadmodum crura resolutionem ob inflammationē spine, ita etiam guttur, vocalibus siue recurrentibus neruis (quos ipse invenit) aut incitis, aut laqueo interceptis. Atque idem est modus quo læditur gutturis masculi, siue recurrentes nerui, siue quæ iuxta arterias sunt, videntur. Vixque enim animalis facultas desideratur, sine qua moveri nemo potest pro voluntatis imperio. Incisis præterea musculus quæ epiglottida monēt, animalis etiã reddit mutus. At laqueus collo circumdatus nõ solum ledit animal inuerm, sed etiam sufficit, ipsum respirare non priuando. Aspera autem arteria, si difficitur, voci quidem nocet, sed animal non prius respiratione. Angina verò, cum sit internarum gutturis partium inflammatio, strangulationis proportionē respondens, respiratione tollere potest, ipsius meatum obstruendo. Idcirco vocis instrumentū maximè proprius affectus est.

Qui autè ex affectu in ciuitate ipse curantem in venerim, ex hoc expleo perducens. Occurrit mihi olim

ipsum haudquaquã defendi poterit. Quare dicendum est, illud per consensum, siue cõsors legem affici: hoc est, ab altera parte talem affectionē recipere. Sunt præterea nũnullæ actiones, quæ idoneas indagentes materia, ipsam ab aliis partibus præparatam accipiunt. Quæ de se interdū optima ratione cõtingit, nulla existente in actionis causa: ipsam propriis instrumentis noxa, actionē ipsam perire, defectu scilicet eius materie, ex qua fieri cõsuevit: vel in voce accidit, cuius quidæ materia efflano exurit. Hæc autè sit cõtracto thorace ab intercostalibus musculis. Hinc igitur nihil agentibus, animal vocē amittit, & quidẽ nullo interdū in propriis vocis particulis apparente affectu. Sunt verò hæc partes, tres cartilaginee tribus cõmonemusculis: in quos interitur nerui demissi: à cerebro. Est præterea in gutture lingua, siue epiglottis, maximè proprii vocis ipsius instrumentū. Etiam cecidit quidam ab alto, ita vedorūm affigere. In tertio die exiguam admodum vocem emittit. Quarto deinde die omnino obmutat: resoluti simul fuerūt & crura, manibus prorsus illis. Sed nec inspirationem amittit, nec difficultatē spirabat. Nam cum tota sub ceruice spina esset ei resoluta, accidit thoracis, & septum transversum, & musculus superni, numeri quidẽ in sex, mouerunt. Quippe nerui ex spinali medulla, quæ in ceruice est, ipsos descendunt. At nerui musculorū intercostalium, qui efflato efficiunt, omnes affectu erant. Vbi igitur sedata fuit ipsa inflammatio, à septimo die vox restituta est iuueni, & crura motu faciliatē, antea intercepta, recuperat. Huiusmodi ergo noxæ speciem, magis propriè per consensum euenire dixeris, quã vbi ab humoribus in ventriculo contentis, exhalantibusque, caput dolore tentatur. Iam verò, vt ab crura faciliatē quædam, sed circa essentia substantiamque descendere ob plilegmonem prohibita est: sic ad oculos, cum essentia, vbi obtinuit fuerint visorū meatus. Ad guttur autem, quævis materia perveniat per illam ipsam dorfi resolutionem, sufficiens tamen ipsius quantitas nequaquã accedit. Qui verò ab intercostalium musculorū perforatione obmutat, in tota vocis materia amisit. Porro quemadmodum crura resolutionem ob inflammationē spine, ita etiam guttur, vocalibus siue recurrentibus neruis (quos ipse invenit) aut incitis, aut laqueo interceptis. Atque idem est modus quo læditur gutturis masculi, siue recurrentes nerui, siue quæ iuxta arterias sunt, videntur. Vixque enim animalis facultas desideratur, sine qua moveri nemo potest pro voluntatis imperio. Incisis præterea musculus quæ epiglottida monēt, animalis etiã reddit mutus. At laqueus collo circumdatus nõ solum ledit animal inuerm, sed etiam sufficit, ipsum respirare non priuando. Aspera autem arteria, si difficitur, voci quidem nocet, sed animal non prius respiratione. Angina verò, cum sit internarum gutturis partium inflammatio, strangulationis proportionē respondens, respiratione tollere potest, ipsius meatum obstruendo. Idcirco vocis instrumentū maximè proprius affectus est.

Qui autè ex affectu in ciuitate ipse curantem in venerim, ex hoc expleo perducens. Occurrit mihi olim

Locus nota  
vnde funditur.

Actio læta par  
tem afficiam  
inducit.  
Excrementorum  
speciem partem  
afficiam indica  
t. Positus indicat  
partem laquei.

Doloris singuli  
afficiat posita  
partem ostendit.

Accidentia pro  
pria indicat lo  
cum afficiam.

Proprium motu  
inducit motu  
rubeat.  
Affectum no  
ta vnde depre  
hendatur.

Lapis in quib  
proprietate part  
bus.  
Abjectionem car  
situatione non  
passi.  
Doloris nec pul  
mo nec ligamē  
tum patitur.  
Horror intem  
pestivum causi  
bre suppuratione  
nem inflammā  
tionem indicat.  
Affectum pro  
pria signa qua  
sunt.  
Affici per con  
sensum quæ  
de dicatur cer  
breum.

Vox materia  
afficiat, quæ sit cõtracto  
thorace ab  
intercostalibus  
musculis.  
Vox proprii  
instrumentum  
sunt tres carti  
laginæ quæ a  
cervicis laryngis  
glottis præcedunt  
epiglottis.

Afficiam per  
consensum spec  
iem dicit.

Respiratio  
notum in vno  
Galieno.

Moveri per vo  
luntatis imper  
io nemo po  
test, sine facili  
tate animalis.

Angina est in  
flammatio in  
ternarum gut  
turis partium.  
Locus affectu  
notus quæ va  
riatione Galieno  
ipsum curantem  
non ostendit.

olim quidam, cui sensus trium digitorum manus, iam triginta diebus perierat, prorsus illa motione: nec iuuabatur quicquid a medicamentis ipsi manus admotis. Cum igitur intellexissem ex illo, cum proficeretur Romam, se decidisse a vehiculo, ac initium dorsi tunc sibi coctum fuisse, nec multo post accidisse digitorum affectu: cōseci inde, » in primo statim exortu nerui post septimum vertebrae, partē aliquam obiectum fuisse inflammationē, eamque iam induruisse in scirrhum.

Quippe neruorum qui a ceruice prodeunt, vltimi pars » humilior, quae descendit per cubitū, in eum tem minorū digitorū diffeminatur, ac praeterea per mediū digiti mediam partē dispergitur. Quam obrem illi spinę parti, » quae affectu particulae principii in se continebat, congruenti medicamento cum succurrissem, digitus suū sensum restitui, cum maxima spectantū omnium admiratione.

Quo autem modo sensus digitorū perierat, motu prorsus illeto, iam audes. Sentire eum, veluti quiddam pati est: moueri autem, eum quoddam esse agere. Quamobrem ut quis moueatur, opus est robore: ut vt sentiat, vel minima facultas est satis. Ob idque uocellum est, ut sensu ipso deperdito, simul exoluantur & motus, ubi per vnum eundemque neruum ambe perficiuntur actiones. Porro omnis voluntarius motus, ad musculorum officium pertinet. Quippe nullus neruorum per se, sine musculo, ullam huiusmodi in animantis particulis actionem efficere possit. Ceterū ad partes mouēdas musculi ipsi aliquod quidem » immediate perueniunt: aliquando vero per medios tendones: quales sunt illi qui mouent digitos. Si igitur affici musculorum neruos contingat, digitorum motus peribit: si uero eos qui ad eum pertinent, tangendi sensus corumpitur. At ubi tota resoluitur membra, eadem uidelicet cōmune principium est laxum, simul & motus & sensus perierunt. Ac tunc locum primario affectum, ex laesore neruorum multitudine duntaxat inuenire poteris. Accidit aut intermedium, ut dextra tantum pars ipsius spinę afficiatur, altera omnino illaesa: aut e contrario, ut illa manente integra, sinistra affectam sustineat: atque hac ratione nonnunquam tota pars sinistra resoluta, dextra illaesa manente: nonnunquam cōtrā, dextra pars duntaxat & afficitur & resoluta. Vbi uero non affecta spina, tantū vnus nerui processus est laesus, eas duntaxat partes resoluunt occupat, in quas ille neruus est distributus. Itaque si spina fuerit affecta, aut aliquod neruorum principii, cōvertenda illuc tota medendi ratio est: alioqui frustra circa resoluta membra occupaberis. Iam uero ob resoluū immoderatū, interdū sedes musculi resoluī solet maximē, siue sed erit quis super lapidē pressus, siue in aqua frigida supra modū fuerit uersatus. Quod si sanē resoluū est sequitur in voluntaria excremento desectio. Quia igitur in anatoe exercitatus fuerit, accuratē praecedenti & praesentia accidentia noris, ac sic ad curandorum morborum experientia methodo & ratione perveneris, is inueniet & locum affectū, & ipsam dispositionē. Ut autem affectū musculi, voluntarias: sic vesicae, necnon intestina obiecta, naturales actiones ledere possunt: eo quod ipsi

cōtractis excernantur ea quae cōtinent. Ac differunt certe plurimū naturalia ab animalibus instrumentis: quod naturalibus quidem, cognata actionis vis inest: animalibus uero instrumentis a principio, veluti lumē a sole, ipsa desunt. Quod obrem solis partibus quae & senescendi & mouendi vim habet, accidit, ut ipsi interdū haudquaquam affectu, nihilominus eorum actio exoluantur: id quod naturalibus instrumentis minime solet accidere. Quoties enim horū actio laeditur, semper ipsa primō afficiuntur. Ceterū animalibus instrumentis omnibus, » naturalis quoque dispensatio adest, cum nimirum & arteriarū & venarū adminiculo indigeat, ad essentia propriam se uandā. Proinde alterari a vicinis, ipsi ut naturalibus: aliterationem uero ferunt, ut animatis euenit.

## GAL. DE LOCIS AFFECTIS LIB. II.

### CAPVT I.

Res sunt exercitatiois modi circa affectum locorum notitia. Quorum vnus circa singulas corporis partes, alter circa causas & dispositiones, tertius circa differentiam accidentium versatur. Igitur a locis sumitur modus, ubi dicimus: Affecto cerebri huiusmodi accidentia sequuntur. A dispositionibus & causis sumptus, existit talis: ut si dixerimus: Inflammationis sciorum, aut refrigerationis, huiusmodi sunt accidentia. Ab accidentibus, ut cum dicimus: Hoc doloris genus haec dispositiones aut hosce locos pertendit.

### CAPVT II.

Halluciuatur autē Archigenes, ubi dolorem stupidum neruis tantū enuene ait. Quippe stupor a frigida dispositione oritur, non neruorum duntaxat, sed etiam venarū, arteriarum, carnis, membrarū, tunicarum, & cutis. Quod si ob id quod haec omnia per neruos sensum habent, ad neruos illam dispositionem refert, cur non reliquas omnes dolorum differentias, proprias esse neruorum ait. Etenim dolor, tristis est sensus: quē ad modum ipsa volupras, blandus. Quod si rem accuratius inspexeris, haudquaquam doloris species dicendus est » stupidus dolor: si uero neque species vlcis inflammationū vlcis: sed utrobique duarū dispositionū concursus adest. Etenim stupor refrigeratio est insignis: idcirco corporibus ita dispositis & sensus & motus difficultatē inducit: quē admodum cōpleta refrigeratio, & sensum & motum omnino tollit. Quod autē stupor dispositio nis, nō doloris aut sensus sit nomen, Hippocrates docet, ubi ait: Stupor enim medicioris dolorē solvere potest. Porro cōstrictas vehementer particulas, atque eos qui torpedinē animal dum adhuc uiuit, tengerint, inscitare eolet in stupor. At quibus membrū aliquid stupidum fuerit, i quicquid tengerint, obscuro & hebeti sensu percipiunt, neque moueri possunt. Si uero moueri cogantur, dolent. Ceterū circa hoc quod moueri tenent, affectū ipsum stuporis haud obscure persentit, sed tunc minime dolent. Stupor itaque nō particulē cuiuspiam proprius affectus est, sed dispositio, quae accidere quidem omnibus potest partibus, ab ipso tamen duntaxat manifestē senti-

instrumentum naturalibus, signa a altum vniuersi.  
Instrumentum animalibus, veluti lumē a sole, ipsa sunt a principio, facilius desunt.

Exercitatiois modi circa affectum locorum notitia, tres modi.

Archigenes opinatur, ubi dolorem stupidum neruis tantū enuene ait.

Dolor, tristis est sensus. Volupras est blandus sensus.

Refrigeratio cōpleta sensum et motum tollit. Stupor medicioris, dolorē solvere potest.

Stupor quousque inscitare solet.

Stupor accidere omnibus partibus potest.

ri, quæ & sua affectus percipere, & moveri pro voluntatis imperio sunt nata. Iam verò ex carne (quæ nusquàm sola ac per se reperitur) ligamensip & tendinibus per ipsam disseminatis, musculorum silentia cõstit: quæ vt permanere posset, venis indigebat, arteriisq. Verùm citra dolorē pulsare, ad solas arterias pertinet, animali etiam nullē rectē valente. Vbi verò ingens inflāmatiō est ob orta, vel erysipelas, vel abscessus, arteriarū pulsus cum dolore sentitur: cum per bonam valetudinē, nec cum dolore, nec sine dolore ipsum discernere mus. Et enim duabus præcipue occasio nibus vehementer dolor particulis inflāmati in fertur: nempe cum moventur, & cum à re qua piam premuntur. Proinde inflāmatum musculo, duplici nomine, ob dilatatā arterias, dolorem percipimus: & quod movetur illæ, & cõpriman tur ab adiacente carne, atq. ipsam similiter cõpri mant. Quin et sine musculo, arteria inflāma toriū affectum sustinet, ipsa per se cum dolore pulsatur. Quod si aliquando per id genus affectus, stupida esse pulsus ipsi ægro videtur, tunc scire licet, dispositionē in musculi nervis ita cõstiter e, vt ad resolutionē tendat. Nam dispositio stu poria, media est inter resolutionē & integrā valetudinē. Ceterū neq. in peripneumonia, neq. in laterali morbo pulsantia potest dolor contingere: idq. ob parvam naturā. Pulmo siquidem, sen sum non habet: morbus verò lateralis, mēbranæ cingentis costas affectus est. \* Cuius quidē pars illa quæ costis adhaeret, necessest comprimatur: quæ verò inter costas est collocata, comprimi nequāq. potest, sed inflāmatiōnis duntaxat ratio ne dolet. Siquidem in eo spacio arteriæ consi stunt, per musculosa intercostales dispersæ: idq. al tius, q̃ vt membrana cingentē costas attingant. At inflāmati interdum intercostalibus muscu lis, dilatatō arteriarū dolorem necessariū infert. Proinde æger pro magnitudine inflāmatiōnis, sentiet in parte inflāmata ipsum dolorē pulsa tilem. Igitur pulsantis dolor (qui vehementes partium sensibiliū inflāmatiōnes sequatur) arteria z ipsas primario affectu molestat: per consen sum autē ceteras partes sensibiles, eo quod à vi cinorum contactu permanant. At neq. in hepate, neq. in renibus vnaquam huiusmodi pulsario percipitur: quomōdō nullus per totū corpus ipso rū, sicut nec per pulmonē, nervosa disseminatur.

Quia verò membrana quæ corū viscerū quodlibet ambit, & per quam dispergitur nervus, sensu prædita est: ob id nimirum in ipsa gravitatis sensus percipitur, vbi tumor aliquis præter natu ram illa infestat auri. Et enim inflammatio, curia, adentq., cum his partibus nullæ insint arteriæ, vbi inflāmatæ sunt, nō pulsant, sed extensio dolore cruciatur. In vniuersum autē, primæ do loris species sunt due: vna quidem, dum subito temperies mutatur: altera, dum cõtinuitas soluitur. Siquidem pars intensa, aut cõpressa, aut con tusa, aut vulnerata, dolet ob continui dinortii. Ceterum nō eandem doloris speciem excitant mordax humor & pluvius: ille quippe tendendo, hic verò tendendo dolorem infert. Quantū autē vim habeat intemperantia ad inducendum dolorem, ex his licet planē pendere, qui vehemēter refrigerati, ad ignem manus affectum cal facere tentant. Quippe intolerabilem sentiunt dolorem, præcipue iuxta vnguium radices. Simi liter etiā per dolores vocatos colicos, vbi frigidissimus aliquis humor (qualis ille est quē vilitreum Præxagoraa nominat) in quopiam intesti no crassior est impactus, adeo torquetur ægri, vt videantur sibi circa veterarū regionem terebro perforari: id quod olim multi etiam cõtingit: ceterū inuicē oleo rutaceo, cum id paulo post conaret excernere, excreui humorem vitro luso perfusilem. Sunt & alij dolores, per quos palus infusus videtur, quæ & ipsi corpus affectū crassum esse significat. Distingrūt autē inter se, aut multitudine, aut crassitudine, aut rei doloris faciētia po tentia siue ea humor fuerit, siue spiritus statuentus. Siquidem paucus pluvius, & tenuis crassus, & permanens moto, ac denique minua refrigerans, eo qui vehementissimum refrigeratū vim obtinet, minore solet excitare dolorem. Igitur siue clauo transfixa est, siue terebro perforari locus videatur, is dolor ad crassum intestinū est referendus. Anqui huiusmodi dolores, ab eo quod lapis impactus est, discerni nō possunt, nisi quis acciderit quæ postea cõsequuntur, expecta uerit. Vtriusq. tamen doloris sunt cõmunia præsidia, & quidē calor in potius, siue ea extrinsecus adhibeantur, siue ea amittantur. Deinde, ni si mitigatus dolor fuerit, eorum medicamentorū quæ dolorem obtundere possunt, aliquod adhibendū est: cuiusmodi existit, quod à Philone in stituitur. Verū si lapis dolorē excitauerit, apie in terdum solas, interdū vnā cū cruore excernitur, in vniuersis subsistent fabulosa quædā. At si in eo affectus cõstiterit, nihil horū videtur: sed pro tinus inflāto quodam & extenso, & flatus com plures, & termina, & excrementa sanibus plena cernuntur. Ea autē licet discernere, si & sup aquā natent, & bubulo hercori simulentur. Quinctū cibum cupidiata, tum concoctio, detenor eua dit, & præsentia, & præcedens, & quæ sequetur. Vētriculū nanq. male affici accidit, vt qui parti pri mario affectū cõtinenter adhaeret. Insuper coli coa nominatos affectus magna ex parte præcedit cruditas, & spiritus flatulentus, & vomitus, & nausea, quæ multo tempore inania permanet, & in præcordiis mordacitas, & fastidium, & indigen tia plurima. Igitur id genus dolores vehementissimē, consistere in crasso intestinia putantur. Qui verò minores sunt, ex duobus alterū neces sariū est: aut quod in his ipsa sunt, sed à leuiori causa orti: aut quod in tenuibus intestinis consi stant. Porro qui mordaces dolores sunt, h̃ à mor daci humore intestinū erodere sūt. Vnde dylen teriam semper huiusmodi dolores præcedat, vr pote per quā intestina vicerentur. Ceterū dylen teria illa, quæ velv faculentū sanguinē corpus eua cuat, haud secus q̃ hæmorrhoides, aut muliebre profluentia. Vt verò ad dolores differētia reuer tar, punctioris dolor potissimū circa membra na cõsistit. Quodrem laterali dolor, punctio nus esse censetur. Id verò hæmodia, siue danti stupor,

menter refrigerati, ad ignem manus affectum cal facere tentant. Quippe intolerabilem sentiunt dolorem, præcipue iuxta vnguium radices. Simi liter etiā per dolores vocatos colicos, vbi frigidissimus aliquis humor (qualis ille est quē vilitreum Præxagoraa nominat) in quopiam intesti no crassior est impactus, adeo torquetur ægri, vt videantur sibi circa veterarū regionem terebro perforari: id quod olim multi etiam cõtingit: ceterū inuicē oleo rutaceo, cum id paulo post conaret excernere, excreui humorem vitro luso perfusilem. Sunt & alij dolores, per quos palus infusus videtur, quæ & ipsi corpus affectū crassum esse significat. Distingrūt autē inter se, aut multitudine, aut crassitudine, aut rei doloris faciētia po tentia siue ea humor fuerit, siue spiritus statuentus. Siquidem paucus pluvius, & tenuis crassus, & permanens moto, ac denique minua refrigerans, eo qui vehementissimum refrigeratū vim obtinet, minore solet excitare dolorem. Igitur siue clauo transfixa est, siue terebro perforari locus videatur, is dolor ad crassum intestinū est referendus. Anqui huiusmodi dolores, ab eo quod lapis impactus est, discerni nō possunt, nisi quis acciderit quæ postea cõsequuntur, expecta uerit. Vtriusq. tamen doloris sunt cõmunia præsidia, & quidē calor in potius, siue ea extrinsecus adhibeantur, siue ea amittantur. Deinde, ni si mitigatus dolor fuerit, eorum medicamentorū quæ dolorem obtundere possunt, aliquod adhibendū est: cuiusmodi existit, quod à Philone in stituitur. Verū si lapis dolorē excitauerit, apie in terdum solas, interdū vnā cū cruore excernitur, in vniuersis subsistent fabulosa quædā. At si in eo affectus cõstiterit, nihil horū videtur: sed pro tinus inflāto quodam & extenso, & flatus com plures, & termina, & excrementa sanibus plena cernuntur. Ea autē licet discernere, si & sup aquā natent, & bubulo hercori simulentur. Quinctū cibum cupidiata, tum concoctio, detenor eua dit, & præsentia, & præcedens, & quæ sequetur. Vētriculū nanq. male affici accidit, vt qui parti pri mario affectū cõtinenter adhaeret. Insuper coli coa nominatos affectus magna ex parte præcedit cruditas, & spiritus flatulentus, & vomitus, & nausea, quæ multo tempore inania permanet, & in præcordiis mordacitas, & fastidium, & indigen tia plurima. Igitur id genus dolores vehementissimē, consistere in crasso intestinia putantur. Qui verò minores sunt, ex duobus alterū neces sariū est: aut quod in his ipsa sunt, sed à leuiori causa orti: aut quod in tenuibus intestinis consi stant. Porro qui mordaces dolores sunt, h̃ à mor daci humore intestinū erodere sūt. Vnde dylen teriam semper huiusmodi dolores præcedat, vr pote per quā intestina vicerentur. Ceterū dylen teria illa, quæ velv faculentū sanguinē corpus eua cuat, haud secus q̃ hæmorrhoides, aut muliebre profluentia. Vt verò ad dolores differētia reuer tar, punctioris dolor potissimū circa membra na cõsistit. Quodrem laterali dolor, punctio nus esse censetur. Id verò hæmodia, siue danti stupor,

Colicus dolor  
oritur ab humo  
re vatro, impa  
cto in aliquo  
intestini crepi  
sculo.  
Oleum rutace  
cum colico do  
lore est reme  
dium.

Dolori qui ho  
mori mouet  
etiam mouet  
infirmitas.  
Crassi magis  
dolor, vt &  
guæstus.

Doloris colici,  
et ceteri qui ab  
impactu lap  
idis oritur, sunt  
cõmunia præ  
sidia calidita  
tis.  
Tholium,  
Colici doloris,  
et oris à lap  
ide signa dant.  
sa.

Colicus dolor  
quæ præcedit  
symptomata.

Dysenteria do  
loris mordaci  
præcedit.  
Dysenteria ho  
pauca.

Dolor procto  
rius.  
Hæmodia.

stupor,

Casus per se m  
peritur non  
quæ,  
hæsiunt tempo  
raria.

Pulsus doloris  
vni quando sit  
tatur.

Dolor inflāma  
tu musculi vs  
de accidit.

Scopus est dif  
positio medica  
inter resolutio  
nem et integrā  
valitudinem.  
Pulsantis dolor  
nec in peripneu  
monia, neque in  
pleuritide oritur.  
Palma caret  
sensu.  
Pleuritis quid.

Pulsantis dolor  
quæ inflāma  
tione sequitur  
et quibus  
non accidit  
partibus.

Extensio dolo  
re quæ affectu  
re partem.  
Doloris species  
prima sunt  
due.

Intemperantia  
doloris infert.

stapor, solis dentibus & gingivis accidere solet, ubi quispiam & austeros & acidos cibos ingesse rit. Ceterum complura alia dolorū genera sunt ab Archigene prodita, sed quæ prius intelligi nequeant: qui sanè vir, ita omnī affectū proprietas descripsit, ac si omnes ipse fuisset periphetus: quod non verisimile est. Præterea ubi ait, hemibraneas sphacelodes circumscribi, hoc est, submoueri à dissectione vasorū, minimè declarauit quidnā sphacelos esset: de cuius vocis significato variè variè opinatur. Dein dolorē pullatorum & rigidum inferri ab arteriis cōtendit, ubi ipse per hemibraneas sphacelodes primogenia affectione laborat. Est autē turgidus dolor, qui à parte primariō affecta, veluti à radice incipiens, celeriter in partes adiacentes transfertur. Id quod non solū in hemibraneis, sed in cephalæa etiā solet accidere. Sed neq̃ illud etiā est verū, affectos nervos protinus inuolueri, indurariq̃: cūm repensiter nōnulli affectus, per quos laxiores evadūt nervi, quemadmodū per atrophiam conspicuum est. In inflammationibus autem & tumoribus præter naturam, manifestè intenduntur nervi. Ceterum inflammationis partibus, præter tensionē accidit ut rubescant, remanant, intumescant, & doleant. Adverte tamen interim, propriæ actionis læsionē, esse singulari partium proprium symptoma. Porro convulsiones nervorum, Hippocratis testimonio, & à plenitudine, & ab inanitione oriuntur, cūm nimirum ner-

vi per eas dispositiones immo dicitē tēdi possint: quemadmodū chordæ in cithara, quæ à contrariis aëris statibus, siue luctuosis fuerit ille, ut rigare ipsas implerēq̃ possit, siue vehementer atidus, ad vicinā tensionem pervenit. Quamobrem citharistæ, ubi instrumenta post usum reponunt, solent chordas ipsas laxare. At quod Archigenes dixit, profundos esse dolores nervorū: id ab accidentibus quæ plurimis nervorum eveniunt, est sumptum. Etenim cūm venæ quidem semper priores in superficie consistant: deinde post eas arteriæ, quibus tandē nervi subdantur: ad circo laborātes tensionē in imo sentiūt. Quāq̃ multi tendones (quæ corpora sunt nervosa) non profundos, sed in superficie dolores habent, si quando ipsos sic quocūq̃ tendi contingit: ut sunt illi qui extendunt digitos. Minimè autem nervis accidere potest affixus dolor, ut falsò prosteritur Archigenes, cūm magna ex parte doloris ipsorum ad infernas supernaq̃ extendantur partes. Iam verò membranarū dolores in latitudinem protenduntur: videnturq̃ esse æquales, quod vni universū illarū corpus æquale existat. Semper tamen ubi intentā particula sensu acutori est prædita, ibi vehementior infestat dolor. Ad hæc pleuriticorū nōnulli iugulū dolent, potrecta in hūc locum succingente costas membrana. Aliquēdo ad præcordia descendit dolor, percepto ipsius sensu in septo transverso, vtpote qd̃ necessariō moveatur, cūm pleurici respirant, idip̃ magis q̃ ceteris ipsius thoracis partes. Vbi enim veluti radix doloris consistit in latere, tum lab orītes, musculi qui illuc sunt, respirare pigritant: ac proinde soli septo transverso respirationis munus cōmittit natura: quemadmodū in bene valētibus, qui

leni, ac minimè violenta videntur respiratione. Igitur cūm in internis partibus lateris inflāmato aliqua oritur, septum transversum intentum impensus dolet. Cūm verò in superia, tunc iugulum potius dolor infestat. Vbi ingens in hepate inflammatio oritur, aut ubi ipsum est induratum, dolor qui tunc iugulum in dextra parte infestat, caux venæ magis, q̃ membranarū tensionem sequitur. Quod autem membranarū quæ oīsibus adiacent, dolores profundi sint, & veluti doliētium oīsū quandā imaginē referant, haud quidem mirandum est. Proprius autē arteriæ venæq̃ dolor, extēse secundum longitudinē corporis, veluti chordæ cuiusdam speciem tēfert, nullam gravitatē inducens. Porro vlcerosus dolor non solū ad cutem, sed ad illos quoq̃ partes, ut ossa extenditur. Pruriginosus autē ad solam pertinet superficiem: nō tamen primariō, pro ratione ipsius propria, sed per accidens, quod nimirū cutis omnes sibi subiectas partes spissitudine lupet. Horum ergo dolorū vterq̃ propriæ dispositionis est accidens. Fiunt autē ob quosdam humores acres: taniēq̃ ipsi inter se, quantū dispositiones à quibus oriuntur, disiciunt. Verū quia crebrò dispositio pruriginosa, vlcerosam antecedit necnon soluta quicquidē vlcerosam in pruriginosam fieri transmutatio asolet, inde est quod de ipsa scripsit indistinctè atq̃ confusè Archigenes. Qui quidem ubi etiā ait, pungentē doliōrem in profundo esse, perperam hallucinatur: quandoquidem ad membranas is, non ad imas partes propriè pertinere videtur. Similiter ubi in fixum dolorem vocat, cūm sinus accesserit, sermo illius absurditate nō caret. Quippe sinus cavitates quædam esse, cūm partium antea cōiunctarum, altera distat ab altera. Vbi igitur fluxione impletur, ita ut adiacentes partes tendantur, tunc tensionem dolorem sentiunt laborantes, nō quidem longo spacio porrectum, sed propriis limitibus circumscriptum. Præterea dum ait, hepatitis dolorē inherētē, hoc est, eodem in loco permanentem, existere, an nō etiā veris cōtraria profert? Si quidem hepatitis dolor, si quispiam alius, vicina corpora ad consensum perducit. Nam & ad iugulum vsq̃ porrigitur, & spirandi difficultatem creberrimè infert: atq̃ interdū tūlsum quoque, & dysenteriam excitat: nec raro nothas coctas infestat. Porro inter vehementer respirandū nonnunq̃ gravitatē in dextra præcordiorū parte sentimus. Ceterum si id citra febrem eveniat, aut obstructione, aut dura dispositione hepatis borare coniciro. Nam ubi inflammatione infestatur, tunc febrem adesse est necesse.

## CAPUT III.

Igitur ad inveniendas affectus sedes, in primis querere oportet, an singulorū locorū, quomodocūq̃ afficiantur, propria signa inveniri possint: an pro affectū ratione alterentur. Deinde, utrum singulorum affectuum propria sint signa: an circa quālibet partem variētur. Postea verò expedit, loci simul & affectus memores, signa ipsa perstringere. Veluti si ira acciderit, ut pulmo in inflammatione laboret, tanta spirandi difficultas orietur, tāq̃ angustia, ut suffocari laborantes videatur, ac rectū ledere cōtētur: quæ affe-

Dolor ab inflāmato hepate.  
Dolor membranarū ambrosiam efficit.  
Dolor arteria & venæ.

Dolor vlcerosus & pruriginosus.

Cutis superat omnes subiectas sibi partes spissitudine.

Dolor pruriginosus.

Sinus quid.

Dolor tensionis quidam accidit.

Dolor hepatitis movet corporis in variis locis adducit.

Hepatis inflammationis horum signa ad illi febrem.

Pulmonis inflammationis horum signa ad illi febrem.

Orthopnea.

Etiam vocat orthopneam. Quinenam calidam  
tentunt \* expirationē, idē maxime si eryipela-  
tis participia ipsa inflammatio fuerit: quomobrem  
vbi plurimū effiant, iuuantur, inspirareq; abvan-  
dant frigido modo aciem desiderant. Spiritū vero  
ipsum modo hoc, modō alio expuunt colore tin-  
ctum. Insuper grauitatis cuiusdā thoracis incum-  
bentis sensum incipuumo agri percipiunt, ac  
dolorem ex imo ad ipsum pervenire, & ad pet-  
ectus, & ad spinam. Præterea febris acuta ipsis ad-  
est. Pulsum verō habent, qualem in libro de Pul-  
sibus diximus. Similiter vbi membrana costarū  
succingens est inflammata, acuta febris misceat,  
similij dolor punctioris, viā cum spirandi dif-  
ficultate. Magna etiam ex parte spiritū colore in-  
fectū apparet, haud fecus q̄ in peripneumonia.  
Igitur vtrunq; affectū, respirandi difficultas ne-  
cessariō cōsequitur, eo quod affectū particula spi-  
ritus instrumentū cūctat. Oritur autē febris, &  
propter affectū ipsum (calidus enim affectus est  
inflammatio) & propter positū. Nam & pulmo,  
& succingens costas membrana, prope cor consi-  
stunt. Si enī in tussis ipsis vt spiritibus conue-  
nit. Sed quod aliquid expuatur, id ab affectū p-  
cedat. Quippe iam ostendimus, omnē inflamma-  
tionem ex affluente sanguine fieri. Quapropter si  
biliosus sanguis fuerit, statum aut pallidū erit  
spiritum: si purior, spumans & candidū. Si me-  
lancholicus, aut nigrum aut luidum. Si nihil li-  
rum insecerit sanguinē, rubrū. Quenā in latera-  
li morbo fæpenumero magis biliosum: in per-  
ipneumonia verō magis puriorum sequi spiritū  
conficiat. Quod autem inflammatarū thora-  
cis partū excrementa, per asperam expurgan-  
tur arteriam in causā certē est, tum positū earū,  
tum formato, vt quæ per solam hanc viam efflu-  
xum sortiantur. At vt ventriculus duos habet  
meatus: ac quod in eo vinosum efflū, supernatate  
solet, vomitionēq; excutit: quod autē in intesti-  
nis subfider, detractione vacuatur: vel vt renū ve-  
sicq; excrementa, mendo excremētū. Nam quæ  
cedvndant in cerebro, per nares præcipue, non-  
nūq; per palatum & aures exterminantur. Sedes  
itaq; affectū dignoscitur & ab accidentibus, & ab  
actione lecta, & ab excrementorū qualitate, & a  
tumoris præter naturam, & a doloribus, & a  
coloris vitio, quod sequitur, vel in vniuerso coe-  
pore, vel in vna quapiam parte, vel duabus, idē  
maximē in oculis & lingua: quibus addere po-  
tes etiam eam affectionē, quæ per consensum af-  
fligit. Fit autē in hūc omnibus exercitatio, vbi  
particularia sub eandē viam & rationē ducitur.  
In primis igitur intueri oportet, num sit actio ali-  
qua lecta: quippe cum ipsa propriū aliquid in-  
strumentū affici necesse est. Deinde, vbi actionē  
esse lectam perspexeris, ad modum læsionis ac-  
cedendo, considera ad quem affectū propriē perti-  
neat. Postea partē affectam expendē, num tumo-  
re quodam, aut dolore infestetur, & quidem ac-  
cuciat cuiuslibet horum speciem investigando.  
Fingamus ergo, vt quisiā inter respirandum,  
in notariā costarū regione doleat: non protu-  
nus hunc esse pleuriticum suspicari debes, sed in  
primis quidē, an tussiendo aliquid expuat, cōsi-  
derare. Id enim si coloratū videris, tunc agrum

dices esse pleuriticū. Quod si tussiendo nihil om-  
nino expuat, fieri potest vt nihilominus pleuriti-  
cus sit ille quidem, sed inflammatio non habet in  
costam adeo & impactā, vt nihil ab ea foras eu-  
ci possit. Fieri quoq; potest, vt ob hepatis infla-  
mationē dolor in eam dictā sede excutetur. Certe  
rum ex differentia pulsus, ex detractionibus, ex  
tumore præter naturā, ex grauitate & pondere,  
ac deniq; ex aliis notis, quæ hepatis inflama-  
tionē sepe solent accidere, iecoranā affectū a pleu-  
ritico licebit nobis discernere. Verū in huiusmo-  
di dispositionibus, solidum firmūq; discernen-  
da indicium, per omne tempus morbi, a pulsū su-  
mendū est: deinde tractū temporis, reliqua etiā  
consideranda. Nam & lingua, & vniuersū corpo-  
ris color alteratur, vbi hepae vitium est. Si vt  
rursus thorace affectio, increfcit tussis, atq; spūta  
ceruuntur. Distinguedi tamen sunt interm  
affectus qui primarij dicuntur, ab in quæ per cō-  
sensum affligit. Nā si in pleuritide vel peripneu-  
monia delirium aliquid incidat, existimandum  
est principem animæ sedem, in qua & sciētia, &  
opinio, & cogitatio consistit, consensu thoraci-  
ci, atq; ob eam necessitudinem affici: in aliis au-  
tem affectibus, vt in herbargo & phrenitide, ma-  
ximē consensu, sed laborat affectū primario:  
vndiq; verō affici, vbi propriū ipsius functio-  
nū aliqua oblecta fuerit. Proprietas enim functio-  
nes dico, quæ a nulla alia parte vt instrumento,  
fiunt. Nam everta viderem animam, & audire,  
haud quaquā negandum est: sed videre oculis,  
& audire auribus. Atq; vt cogit, remittitur,  
existimet, eligat, neq; oculis, nec lingua, nec alia  
quapiam parte vituit. Verum quod a duobus sensib;  
& voluntarij motus sedem habeat in cerebro:  
quodq; cerebrum cōuegiatur menyngibus, alibi  
a nobis est declaratū. Si igitur per solum consen-  
sum cerebro affecto, illa pars quæ primitiuo affe-  
ctū laborat, curata fuerit, primitiuo cerebro pro-  
pria aliqua dispositio eveniat, nullū in ipso ac-  
cidenē relinquetur. Quod si ex cōsensu permixtus  
aliquis in iplo dispositio remaneat, nō solum par-  
ti primariō affectū, sed capiti quoq; eemedia ad-  
hibenda sunt. Quapropter exacte definire, vtrū  
cerebrū, an membrana ipsius primitiuo afficien-  
tur, haud magnam vtilitatem asserere potest, cum  
in vtrāq; dispositione capiti succurratur eadem  
medendi ratio. Præcipue verō danda opera  
est, vt morbi essentā deprehendamus: qua co-  
gnita, facile nobis licebit per contraria curatio-  
nem moliri. Itaq; non tantū affectum locum, sed  
eausm etiam inferentē notam, cōsiderare opor-  
tet. vt, exempli gratia, delirium est eius actionis  
symptoma, quæ a loco motus compote prodit:  
similiter sopor stupidus: sed a contrariis causis  
occurrit. Si quidem & vigiliam, & delirium, cau-  
sa potestate calida efficit. At quoque somno-  
lenti soporosiq; affectus existunt, omnes a frigi-  
da causa proveniūt: id quod ex medicamentorū  
naturā planē discere licet. Quippe frigida spū-  
rem soporēq; calida vt vigilias & varias mo-  
tiones inducunt. Tenus etiam vitius ratio, &  
vinum meracius, vigilias pariunt, præcipue si vi-  
num ipsum fuerit suapte natura calidū, aut etiā  
antiquius valde. Etenim calida causa motum ex-  
citat

Respirandi qua  
adfectus sympto-  
mata.

Inflamatio mu-  
ni et effluens  
sit sanguine.  
Spiritu pleuritici-  
corum spiritus  
dueris.

Thoracis par-  
tes inflammata  
tas expurgant  
per asperam ar-  
teriam.

Cerebri excre-  
menta per quas  
reguntur tra-  
ducuntur.  
Sedes affectū  
vnde dignoscitur  
posuit.

lecoranā affe-  
ctus a pleuriti-  
co quandoq; di-  
stinguitur.

Hepatis affe-  
ctus alteratur to-  
tus corporis co-  
lor.

Affectus prima-  
rius ab in quæ  
per consensum  
accidit debet  
gredi de affe-  
ctus. Animo quicquid  
per se, et quod  
de per consen-  
sum loquitur.  
Propria fun-  
ctiones motus  
quæ dicuntur.

Oritur motus  
et sensus consen-  
sus inter cerebri  
affectum per  
consensum co-  
rariis.

Cerebri etiam  
affectus an-  
tefectus causā  
fuerit motus  
de ratione.  
Essentia motus  
in primis et in  
quasi. Delirium et vi-  
giliis a causa  
calida motus.  
Sopor et  
stus motus a  
causa frigida.

Vinum meracius  
motus inducit et  
vigilias.



*cedit cur vel  
quibus efficiant.  
In quibus cur  
quibus soporem.*

*Affectus proprii  
in quando par-  
ticulari sit.  
Affectus per co-  
muniem quando  
dicatur.*

*Indivisione so-  
pore in viden-  
tiam ex co-  
muniem sopore.*

*Sopore causa.*

citatur, ob idq; vigilas affert: frigus autē ociosum,  
& ad motiones pigrum reddit animal: qua ratio  
ne somnium soporemq; conciliat. Igitur qui hanc  
intelligit, cum per ardentium febrium vigorem,  
hominem viderit & vigilare & delirare, deinde  
inclumante iam febre, & dormire & recte sapere,  
incipere nullam propriam esse dispositionē, sed  
se febri ab vndanti calore delirium fieri, perpen-  
det. Quippe tunc affectus proprius putandus  
est, cum permanere in parte quapiam conspicit-  
tur. At ubi pars aliqua simul cum alia sic afficitur,  
ut irritata quidem vna, altera infestetur ve-  
hemētius remissa verō irritatione, quiescat, tam  
per consensum affici putandum est. Sic etiam cō-  
tingit, ut cum febrium accessiones invadere in-  
cipiunt, sopore laborantes grauentur: quod eo  
tempore cerebrum sit vehementer refrigeratū,  
alioqui paratissimū, ut noxam eiusmodi iubeat,  
cum nimirū frigidiori intemperie sit præditum.  
Gignitur autem sopor, vel ab intemperie frigi-  
da, vel a pituita in cerebro exasperante.

### GAL. DE LOCIS AFFECTIS LIB. III.

**I**gitur ad cognoscendas affectus sedes, curan-  
dūq; illarum affectus, accurata inquisitione  
est opus. Cæterum per artis exercitationem  
comperi, tam remediōrū inventionem, quæ ex  
vera demonstratione oritur, in his quæ ratio con-  
tingunt, experientia longè præstare. Nam experi-  
mentum duntaxat sectantes medici, non ea quæ  
raro, sed quæ crebro accidunt, memoria & imi-  
tatione assequuntur. Quocirca dispositionū ra-  
rō eventumq; nō solum curantem, sed præ-  
venientes etiam notiones ipsarum, negligunt.  
Ego verō semper investigare studui, quæ omnes se-  
des vel afficeretur ipsa, vel alteri consenseret.  
Cumq; tam inventam esse arbitrarer, tunc ad di-  
positionem eius investigandam, atq; ex vtriusq;  
totius curatui generis indicationē sumendam,  
ac denique remediōrū qualitatem, quantitatem,  
idoneitatemq; materiam comparandam, me accu-  
tissimè: haud neglecta interim, ætatis, nature, tem-  
poris, regionis, aliorūq; id genus omnium con-  
templatione. Deprehendi autem possunt affe-  
ctus sedes ab extremis, atq; ab his quæ affectus  
paribus adnascuntur, necnon a functionū no-  
xia: quibus connumeratur & color præter natu-  
ram, figurarū. Verū ubi ulla mīlū patēret aliis  
via, sola functionis lesio fuit satis, ad inventionē  
affectuum parvicularem.

#### CAPVT II.

Cum autem exoletam cuiusdam memoriā  
restituere conaret, primū quidem apud me ip-  
sum investigavi, quænam pars esset affectus, cui  
localia adhiberem præsidia, prius videlicet vni-  
uersū corporis vacatione præmissa, quod præce-  
ptum est in morbis omnibus observandū. Deinde,  
quæ via & ratione invenirem singula reme-  
diōrum. Cæterū affectū sedem eam ipsam exi-  
stimavi, qua princeps animi vi cōtinetur. Medici-  
camenta autem ea adhibenda esse, quæ huius se-  
dis dispositioni reluctarentur. Cum igitur huius  
inquisitionis gratia cōsultissem epitolam quan-  
dam ad Mariū, ab Archigenio scriptam, in qua

iubet, depravata memoria, raso capiti affigi cu-  
cubitulas, nō iniuria sanē inconstantiū hominis  
sum demeritus: quod timirum neglecto corde  
(cui memoris ipse, seu opus cognatū tribuit) ad  
caput remedia trāferret. Nam quid per immor-  
tales deos ex rationēq; locorū notitia (quæ ipse  
ad medendi naturā ait maximè necessariam) exi-  
stere? consequemur vilitatis, nisi ab ipsis ad re-  
mediorū inventionē ducamur. Ad hæc, si affectio  
quo oblectat memoriā, exultat frigida & sicca,  
nullū vsum adierit cucubitula: admora, siue ex  
incisa prius cute, siue integra, admittuntur. Si  
quidem detractio sanguinis, quæ sit, ubi scanti-  
cata prius cutis fuerit, ad extremū ducit pericu-  
lum. At circa viliā scificationē cucubitula ad-  
hibere, solius excitandi caloris gratia viles esse  
censentur: quippe attrahunt ad se hunc morē  
ex animi, id quod magnopere ardeat dispositioni ad-  
versatur. Porro rationalem animi vim in cere-  
bro: virilem, irascibilem vè, in corde: appetitorū  
deniq; in iecore sitam esse, nemini nō persualum  
existimo: ad qd vel ex vulgarium sermone indices  
discere licet. Fatuū siquidē auit carere cerebro:  
timidū & pusillanimi, cor deesse. Tityo verō iecur  
ab aquila erosum, non solum pocis, verum etiam  
pictores, sculptoresq; fingūt. At verō, quæ  
admodum si ratio lex datur, sapientissimo contigit  
lædi memoriā: si si memoria videretur, ratio  
ipsa quodimodo etiā labefactatur, vix potest actio-  
nis vtriusq; noxa procedente ab eadem dispositio-  
ne: quæ ubi vehementius intēditur, simul cum  
memoria ratio quomodo omnino perderetur. At ra-  
tio quidem affectio stultitia vocatur. Sic in lethar-  
go etiā, in omnibusq; soporosis affectibus, vix  
quæ simul perierit actiones. Quod autē affectus  
hic a frigida intemperie oritur, quæ animales ac-  
tiones omnino torpidas reddit, sanē id vel ex  
animalib; ipsis, quæ per frigora latere cogūtur, la-  
tis liquidū cōstat: necnon ex frigide tam medi-  
camentis, tam cibis. Læsa quippe grauius in-  
ducit somnos, si multam quis ipsius quantitatem in-  
gresserit. Verū & capitis grauitates, quæ sine mor-  
daci instanti dolore, somnū soporemq; concu-  
liant quibus apophlegmasimi magnificè opitu-  
lari vident. Igitur ut capitis ardor vigilas, sic re-  
frigeratio inducit soporem. Item biliosi calidius  
morbi, vigilas, deliria, phrenitides: contrā pitui-  
tosi frigidius, ignavia soporemq; efficiunt. Nam  
quod ad vigilas soporēq; per morbos perti-  
net, calida frigidūq; intemperies primū sibi facul-  
tatem vēdicat: altera verō ab hac, ad humilitatē  
audiatremq; refert. Balneæ siquidē, eo quod ma-  
defaciant caput, soporemq; sunt. Haud lectus vi-  
ni moderata potio, omnēq; cibi humectantes.  
Ex ætatis enim, pueritia quidem ob humorē  
est somnolenta. Senes verō ob ariditatē, vigilas  
vexantur. Omnia igitur hæc argumēto esse pos-  
sunt, ad animi ignauiam inducendam, humidita-  
tem præter naturā obtinere secundas partes, friga  
gignitatem verō priores. Cæterū ut humiditas so-  
la, si abvnder, fongos profundusq; somnos in-  
ducit: ita anduxa sola, vigilas. Quod si frigus cū  
humore intendatur vehementer, soporē insu-  
perius constituit: sine hoc verō memoria nocet,  
stultitiāq; inducit. Cum itaque non solum in

*Archigenio in  
cōstantiā demer-  
tatur Galenū.*

*Memoria ob-  
lecta causa frigida  
& sicca, concu-  
bitulas admo-  
tas non esse  
ex vili.*

*Cucubitula si-  
ne scificatione  
non adhiberi, se-  
lum excitandi  
calorem gratia  
funt viles.  
Anima facultas  
sibi singula quæ  
sedes tribuantur.*

*Tityo erosum ie-  
cur ab aquila  
fractum pocis.  
Ratorem la-  
sa, sapientissimo  
lædi concupiscit  
vi & coarctata.*

*Stultitia quid.*

*Frigida intem-  
peries, animales  
actiones omni-  
no reddit torpi-  
das.  
La lœsa soporē  
exigit.*

*Apophlegmasi-  
mi quibus affe-  
ctibus cōstret.  
Vigilias qui  
morbi insistent.*

*Balneæ ex fer-  
porifica.  
Vinum medicū  
sompnū solo  
est promota.  
Pueri car som-  
nolenti.  
Senes car vigi-  
les.*

*Stultitia quid  
inducit.*

Hh iij

*Remediōrū in-  
ventio quæ ex  
vera demonstrati-  
one paratur,  
in qua ratio  
conspicitur, longè  
præstat.*

*Stilla, si ubi  
vnde de proben-  
datur.*

*Memoria ex  
loco expletam  
re, quæ hanc con-  
sideranda.*

frigiditate humiditatem, verumtamen in ariditate & calore, non parum secundum magis & minus, discernere sit: nihil mirum, si multasque in venientiam causae quae animalis actiones ledere possunt. Impraesentiarum autem, clarioris doctrinae gratia, rationalis animae actiones, principales: irrationalis vero, morales videntur. Cum autem bifariam fieri cōtingat intemperies praedictas, duplex quoque erit utriusque dispositionis modus: v. n. quidem, in humidis siccisque humoribus: alter in corporibus solidis, si quando in eandem intemperiem cum mollibus, solidae partes inciderint. Praeterea quia ipsae intemperies inter se sint contrariae, \* sit tamen ex ipsis interdum mixtum quoddam temperamentum: vt in vigilanti sopore, in quo pituitosus biliosusque humor exuperat. Ita in calidi frigidiq. cōtrarietate, eosdem quoque modos invenire licebit, tum per simplices intemperias, tum per cōpositas ex ambabus. Quod si in solidis corporis partibus mixta ex cōtrariis dispositione fieri fateamur, tres sic prodibunt in utraque cōtrarietate intemperies. Igitur humisum afficitur omnes capiti advenire solent, sed inter se differunt, non solum missionis varietate, aut eo quod magis minusve intenduntur, verumtamen quia interdum afficiuntur ventriculi cerebri id genus intemperantia, interdum universa eius vasa, aut humiditas dispersa per corpus cerebri. Accedit ad haec quartus quoque modus, cum videlicet ipsummet corpus cerebri intemperatum redditur.

## CAPUT III.

Quorum igitur vel memoria, vel intellectus perit: intellectus enim amissio, stultitia est: somnos observare oportet. Praeterea, utrum excernant quippiam, vel ex naribus, vel ab ore, quod a capite defluat: an aridae huiusmodi partes sint. Quippe ex his dispositione ipsam consequi coniectura poterimus. Vbi igitur vel perit, vel graviter laesa est memoria, frigida est omnino intemperies cerebri: quocirca calescere ipsam oportet. At vero exicare, vel humectare, non necessarium est: sed si humiditati copuletur, ardescere: si ariditati, madefacere. Ceterum si inter has medium obtinet, ipsum est conservandum. Interdum vero ubi principales actiones sunt laesae, febris quoque accedit: vt in phrenitide & lethargo. Interdum sine febre adest vitium: vt in mania, & melancholia: id quoque modo per cōsensum, modo primaria affectione cerebro laborante, accidit. Etenim ubi propria accidentibus exprimitur huiusmodi vitia: permanentiaque sunt, nec aliis praecedentibus superveniunt, primogenia dicuntur esse. Vbi vero propria accidentibus minime limitant, neque perpetuo permanent, atque ad alias affectiones sequuntur, per cōsensum ipsa evetire dicimus. Nec interim latere nos debet, ubi quis lege cōsortem afficitur, hancque adhuc affectio, quod deletis efficiētiis eam causis, ipsa quoque simul deletur. Sin autem consentientes partes permanent iam habet dispositionem, quia causa efficiens quoque afficitur, ipsa tamen permanet affectio. Quod autem in cerebro consistant omnes principales animae virtutis affectus, pro confesso habet omnes medici, qui studio veritatis tenentur: sicuti & quod omnes nervi qui voluntatis imperio au-

dunt, a cerebro ducant originē. Cōvulsio siquidem universi corpore, omnes profecto autem, talem quamvis affici partē, quae vt in arbo re caudex ramorū, sic ipsa sit cōmunis omnium nervorū origo. Si igitur partes omnes quae infra faciem sunt fixae, cōvulsae sint, primas spinales medullae partes affectas esse putandum est, ac proximis illis opitulandum. Si vero simul cum universi corpore facies quoque cōvulsae videatur, non modo spinalis medullae exortum, sed etiam cerebrum ipsum, a quo nervi faciei oriuntur, curamus. At vero si crura tantum, aut altera manus cōvulsione tenentur, totius membri convulsio nervorū, qui ad ipsum feruntur, principium affectus esse declarat. Ceterum cum omnis morus a voluntate profectus, attractus muscularis in eas quibus innascitur partes, fieri videat: nec fieri possit attractio, nisi ad suam originē retrahatur muscularis, hactenus cōvulsione in cōvulsis partibus factam, hanc solam rationē a motu naturali differre, quod praeter voluntatem sit. Porro ipsam cōvulsione nervorū, ob plenitudinem vel inanitionem fieri, quiverisimile profectus est nobis Hippocrates: id quod vel ex huiusmodi instrumentorum (quae ob utramque intemperiem ambientis aeris, humidam nempe & aridam, adeo tenduntur vt distrahantur) liquido cōstat. Si igitur convulsio fiat vel a labore, vel vigilia, vel fame, vel solitudine, vel arida aestuantiq. sebre, qualis est videre in phrenitis, causamque eius ariditatem, inanitionemque, recte putaveris. Sin vero temulentio cupiam, ac omnino pleno homini convulsio accidat, ob ab re ipsam a contraria causa iudicibus ortum habuisse. Atque inanitioni contraria est repletio. Iam comitialis morbus convulsio est omnium corporis partium, minime quidem perpetua (vt in emprosthotono, opisthotono & tetano) sed quae ex temporis accidit intervallis. Nec solum haec, sed mentis quoque & memoriae, ac sensuum oblesione, a iam dictis convulsionibus generibus differt. Vnde constat in cerebro hunc affectum consistere. Ceterum velox eius discussio, crassum humorem spiritus meatum in cerebri ventriculis obstruentem, hunc maxime affectum peperisse declarat: nervorū principium seipsum quatere, quo excutiat id quod infestat. Itaque non ab ariditate, inanitioneque, sed a crasso & viscido humore, impediēte animale spiritum, quo minus deferatur in corpus, hanc affectionem gigni, argumento est, quod subito & fiat, & solvantur. Siquidem brevi tempore fieri non potest, vt vel cerebrum, vel tenuior ipsius membrana, ad tantam ariditatem perveniat, vt como simile quippiam pariat. In corpore itaque cerebri, a anima suam sedem sortitur: in quo etiam sit tum ipsa ratio cinario, tum recordatio sensibilium imaginum. Primum autem instrumentum ipsius animae, tum in sensibilibus actionibus universis, tum in iis quae a consilio & voluntate proficiuntur, spiritus est animalis, qui in cerebri ventriculis continetur, sed praecipue in postremo: quia non contentendus sed medius ventriculus, quae amplecti multis rationibus cogimur, vt duos anteriores deferere. Satis tamen fuerit ad curationem, tu obesse debet affectum esse ipsum cerebrum: atque in eius ventriculus humorē crassum & viscidum con-

Nervus amicus  
a cerebro ducit  
originem.

Convulsio quae  
differt a naturali  
sola motu.  
Convulsio fit  
ob plenitudinem  
vel inanitionem.

Epilepsia est  
vulsa visumque  
corporis, quae vt  
tempore non  
dicit intervallo.

Epilepsia consistit  
in cerebro.  
Epilepsia videtur  
etiam in aliis.

Anima collecta  
est in ipsum  
corpus.  
in quo & ratio  
etiam inest  
memoria.

Anima primo  
organum est  
animale spiritum,  
qui in cerebri  
ventriculis  
continetur, sed  
praecipue in postremo.

Affectiones principales  
paleae.  
Affectiones morales.

Vigilantia sopor.

Capiti quodammodo  
placuit affici.

Ariditas est  
intellectus amissio.

Memoriae  
causa, vel graviter  
laesa, vel  
causa est inter  
peritiam spiritus  
cerebri, quae ea  
laesanda est.

Affectus primus  
generis sine  
peritiamque  
affectus peritiamque  
affectus peritiamque  
affectus peritiamque.

Anima principalis  
facultas  
affectus, cum  
sistit in cerebro.

prehendi, nunc pituitosum, nunc melancholicū. Pituitosum in præsentia humorē appello, in quo humiditas frigiditasq; ut melancholicū, in quo siccitas & frigiditas dominatur. Accipitur quidem vnum genus est, quod quotidie vel screando, vel vomendo, vel emungendo educitur, vaporoso spiritu plenū, ut ne sensu quidem lateat ipsum esse dissimulare. Alia verō pituita, similis quidem videtur, licet fortassis nō similis existat: qualis est tam crudus humor, qui in urinis subsidet: tum is qui à Praxagora vitreus vocat. Ex quo genere videtur esse & salina, quæ neque fluida admodum sit, neq; aquosa. Verū salina nō vnica duntaxat qualitate gustum solet afficere, nedum vniuersa pituita. Sic atra bilis quoq; ob substantiæ varietatem nō obscuras differentias fortitur. Nam alia est veluti fax fuliginis, quæ admodum spissa existit, fixibus vitu haud abstergibilis. Alia verō, q̄ superior essentia est multo tenuior: atq; vomennibus ipsam & oliscienibus videtur acida. Hæc etiam attollit in bullas terrā, eimq; radit, atq; fermentat. At illa quam fixi vitu similem esse dixi, in terrā effusa nō inducit feruorem, nisi forte in ardenti febre ipsam præstari cōtingat: neq; vlla etiam acida qualitate participat: quare iudicio meo potius melancholicus aut succus aut sanguis, q̄ atra bilis, dicenda est. Igitur ut crassus pituitæ succus, ita luc quoq; comminalem morbum solet efficere, vbi in meabus ventriculorum cerebri retinetur, siue in medius sit, siue potius in. Vbi verō in ipso cerebri corpore abhinet, æm infans speciem, quam Græci vocant melancholiam, inducit. Quemadmodū alter atra bilis succus, qui præstata staua bile nascitur, serina gignit deliramenta, modū cum febre, modū abique illa, in cerebri corpore abundans. Atq; hæc ob causam phrenitis nonnunq̄ est mitior, vbi à pallida bile ortū traxit: interdū vehementior, vbi staua bilis eam peperit. Deliria autē quæ per febriū vigores accidunt, nō propria cerebri affectione, sed per cōsensum fiunt. Quibrem sic delirantes, minimè appellamus phreniticos: quia phreniticos infans nō quiescit mitigato febris vigore. \* Quemadmodū igitur phreniticorū febris, vnū quoddā ex symptomatibus dispositionū cerebri iudicatur, sic ardentū febris symptoma delirij est: quod nimirū sit elatis ad cerebrū multis vaporibus \* calidis. Haud secus gignitur ea affectio, quæ suffusioni est persimilis, à ventriculū dispositionibus ortum trahens. Namq; ventriculū cerebri, cerebriq; ventriculus, suas affectiones trāsmittit, idq; propter neruorū à cerebro ad quos ventriculi descendunt magnitudinem: per quos etiā sensus huic partitū, q̄ vili reliquarū corporis partū, acquirat est. Quocirca fracturas quidem capitis, vbi ad membranas vix perveniunt, biliosas vomitur: capitis autē dolores quomodo cūq; siane, natus est stomachiq; morbus consequatur. Hypochondriacas verō & stauelas vocatas affectiones, melancholicas comitat tristitia: haud secus q̄ acutæ febres delirium, & \* nonnullas oris ventriculi dispositiones, affectio suffusioni persimilis. Sæpe etiam partibus inflammatis, promptius q̄ reliquis, delirij supervenire solet: idq; ascendente

ad caput, interdum per cōtinuas partes solo calore, interdum spiritu vaporoso, vel fumoso, vel fuliginoso.

CAP. IIIII.

Igitur crassi humores qui in cerebri substantia abundant, interdum ei veluti instrumentali, interdum ut simulari nocent. Cum enim meatus obstruuntur, ut instrumentali: cum verō altera temperamentū, ut simulari. Proinde recte ab Hippocrate dictum est: Melancholici magna ex parte comitiali morbo afficiuntur: & contra, morbo comitiali laborantes, melancholici evadunt. Atque horum vtrumlibet magis accidit, pro ut vel in hanc, vel in illam partem infirmitas reptit. Si enim in corpus, epileptici: si verō in mentem, melancholici evadunt. Cuius autem non solum ab atra bile, sed etiam à pituita morbus communis oritur: sciendum est, solum eum qui ab atra bile ducit originem, in melancholiam transire posse. Etenim cum anima ipsa, aut temperamentū actuarum sit qualitatū, aut ab ipsarum temperamento mutetur: bilem ipsam vbi cerebro, veluti parti instrumentali, nocet, ad cerebri corpus converti ait: quod in obstructionibus fieri cōstat. Vbi verō temperamentū mutandū, ei veluti simulari nocet, ad mentem eam repere dicit. Accidit autem cerebro, ut nonnunq̄ vniuerso in venis sanguine melancholicū effusio, ob cōmune vitium, ipsum quoq; lædatur. Nonnunq̄ verō, totius corporis sanguine prius inuocuo, solus is qui in cerebro contentus est, alteratur: idq; bifariam fit. Aut enim aliunde in ipsum detrahatur: aut in ipsomet melancholicus humor generis est, cum videlicet internus calor aut stauam bilem, aut crassum atrūq; sanguinē superaffusa. Si igitur vniuersum corpus redundet melancholico sanguine, curanōnem à venæ sectione auspicari oportet: si verō cerebrum tantū, argit tunc (quod ad hanc dispositionē pertinet) sanguinis detractio non indiget: quāvis ob alia causam sanguis detrahi possit. Vtrum verō melancholicus sanguis vniuersum corpus, an solum cerebrum occupet, sic discernendum est. In primis vniuersi corporis habitum, qualis nam sit, accuratè consideres velim: meminerisq; quod molles, & candidi, & obesi, nequaquā humorem melancholicū possident. Macri verō, & nigri, & hirsuti, & quibus late vena vena, apertissima sunt, ut huiusmodi in ipsis humor accumulatur. Fietq; interdum, ut à admodum rubicundi, assant melancholicum temperamentū cōtrahant: atq; post hos etiam flavi, si prædictæ vigiliis, & malis laborib; & solitudine, & tenui victu educati fuerint. Cuius generis etiam hæc nota existit: nisi hæc morbois aliqua sit restricta, aut cōsueti aliqua sanguinis evacuatio: aut vius fuerit æger cibus melancholicū succi. Porro qui sanguinem melancholicum gignunt, hi ter sunt: caprina bubulig; canis, magisq; hircine & taurine: sed maxime asinorū & camelorum carnes: itēq; vulpine & canine. Magnū ad huiusmodi sanguinis generationē momentum adfert etiam leporis efus, sed multo magis aprorū. Limaces quoq; sanguinē melancholicū pariunt, si frequens sit eorum vius. Præterea omnium animalium terrestrium carnes sale conditæ: necnō

Cerebri quando afficitur ut instrumentum, & quid ut parti simulari.

Melancholici magna ex parte epileptici fiunt, & e converso.

Atra bilis quid sit in cerebro corpus, et quomodo in animam reptat.

Pituita dissimulata.

Atra bilis spiritus.

Epilepsiam hanc à crassa pituita, vel à melancholico spiritu remota, ut meabus ventriculorum cerebri.

Phreniticos infans quomodo de ardentia febre delirij est.

Oris ventriculi affectus accutari ferunt quomodo corpus partibus. Causas atq; accutari cerebri cum ventriculo, unde phrenitis.

Melancholicus sanguis in quibus minimè habetur. Et in quibus, amovendo maxime accutari.

Cibi melancholicum sanguinem gignentes.

aquatilium carnes, vt thunni, balenæ, vituli marini, delplum, canis, atq; cetæcori omnium. Ex oleribus autē, brastica ferē sola, gignere sanguinē id genus cōfuevit: quemadmodum & arborum germina, vbi vel mura, vel oxyhalme conduntur, præcipue lentifici, terebinthi, rubi, canirubē. Leguminū verd o muiū maximē lentes inter melancholicos cibos annumerantur: mox fursuræcus panis, & qui extypha & vitians seminibus factus est. Præterea vina crassa, nigræq; aptissima sunt, vt ex ipfis humor melancholicus fiat. Vetus etiam cæcus, si supercalfactus in ipso corpore fuerit, facili huiusmodi humorē procreat. Sunt etiam nonnulli, qui per febriles morbos contraxerunt melancholicū succum. Ad efficaciorē autem notitiam, non parū conferat anni tempus, ac præterita præsentiq; ipsius cōstitutio: nec non regio, & laborantis ætas. His itaq; omnibus præmeditans, si existimas in vniuersi corporis venis contineri sanguinem melancholicū, quō certiorē habes notitiā, cubiti venam secā, præcipueq; mediam, quæ cōmunis est, & ei quæ humeralis dicitur, & ei quæ per axillam ad manum fertur. Quidd si cum fluens sanguis nō videatur melancholicus esse, supprimatur cōfuetū. Si verō talis appareat, vacua quantum pro laborantis corporis habitu satis esse conciesis. Est præterea tertium melancholiæ genus, morbi comitialis exemplo, vbi ortum à ventriculo suspicit: solentq; medicorum nonnulli hanc dispositionē, hypochondriacū, flauulentimq; morbum vocare. Quem sanē vt Diocles testatur sumpto cibo concoctū difficili, statim ructus acidus comitatur: cum eōq; flatus & ætus. Ad hęc fluctuant in præcordiis, non illic, sed vbi cibos venter complexus fuerit. Interdum etiam ventriculi vehementes dolores, qui nonnullis ad dorsum vsq; extenduntur. Cæterū ægri cibis concoctis quiescunt: moxq; aliis ingentibus, adeo reuertuntur symptomata, quæ interdum eiuanos, interdū etiam à cæna affligunt, ita vt ægri vomant cibos crudos, & piruram subamaram, calidamq; & ad cō nonnunq; acidam, vt dentes torpere videantur. Atq; horū plurima statim ab incunte ætate eveniunt. Vt cumq; tamen acciderint, omnibus protelantur. Cuius morbi causam, calorē immoderatū venarum mæsticacitū, obstructionēq; earundem, à crasso sanguine ortam, idem Diocles assignat. Videtur autē in ipso ventriculo per huiusmodi affectus, inflama non quadam consistere: sanguis autē in parte inflammata contentus, & crassior esse, & atra bile similior. Quo quidem exhalante ad cerebrum, melancholica eveniunt circa mentē symptomata. Frequentissimē etiam videmus, flauū in ventriculo bile contenta, caput dolore affici: illa verd eiecta per vomitum, illic dō dolorē compescit. Atq; inter optimos medicos convenit, nō solum hęc accidentia, verum etiā epilepsiam, aliquando capiti à ventriculo oriri. Cæterū melancholicos vt nunq; deferat timor: ita eorū phantasmata præter naturā, non semper eodem genere cōmmentur. Siquidē alia se testam factum putavit: atq; idcirco obviantibus cedeat, ne collideretur. Alius, ne Atlas, qui mundū sustinere dicit, grauatus sub tanto onere,

illum à sese excuteret, atq; ipse cōminueretur cum eo, pertimescebat. Differunt porro inter se melancholici: nam omnes timent, merent, vitā damnant, odio habent homines, sed nō omnes mori cupiunt. Quippe hocipsum nōnullis melancholiæ caput existit, quod pertimescant mortem. Sunt qui simul & mortem merant, & mortem sibi cōfiscant. Quemadmodū igitur exterius tenebræ pavorem inducunt, sic atræ bilis color, mentis sedem tenebris si similem reddens, timorē efficit. Siquidem cum humores, cum ipsa temperies corporis, possint animę actiones mutare, id quod à nobis est demonstratū in co libello cui titulus est, Quod mores animæ corpora temperiem sequant. Ergo si circa ventriculū prima inceperint ipsius morbi symptomata: quibus auctus melancholicus sequat affectio: deinde alui diectione, vomitu, proba coctione, ructibusq; leuettis qui laborat, hypochondriacū flauosūq; ipsum morbū vocabimus. Accidenna verō ipsius dicemus & marinam, & metū. Vbi verō propria melancholiæ accidenna esse auctiora videntur: circa ventriculum aut aut nulla, aut perexigua cernunt: haud ab re existimaueris, primitiam in cerebro affectionem consistere, ob atram in ipso bilem congestam. Quem morbum minime inveteratū, frequētib; balneis, veltiq; humido & boni succi, nullo alio præsidio adhibito, ipse aliās curat. Nam vbi disturnis ipse morbus est factus, fortiora remedia postulat.

## CAPVT V.

Morbus comitialis, similiter vt melancholia, tribus clauditur differentiis. Verū omnibus cōmune est, quidd afficiat cerebrum, siue primaria affectioe, siue consensu lege. Prima igitur differentia existit, vbi affectus in ipso consistit cerebro: id quod pluribus epilepsias accidit. Secunda, vbi ab ore ventriculi per cōsensum dispositio ascendit ad cerebrum, quemadmodū per suffusiones contingit. Tertia deniq; fit raro, cum à parte alia quavis ipse affectus incipiens, inde, sentiente id ægro, ad cerebrum vsq; perperat. Quale genus morbi ipse adhuc adolelescens primum vidi in puero tertiumdecimæ ætatis annum agente: qui sanē narrabat, dispositionem ipsam à crebre initium capere: mox illinc restā ascendere per femur & eminentes ei lumbos, ac per latus id, ad ceruicem, donec perveniret ad caput: quod cū primū tangeret, ipsum haudquaquam sibi consistere. Interrogantibus autem medicis, quale esset quod ferebatur ad caput, nihil habuit quod responderet puer. Alius tamen compos mentis dicebat, veluti frigidam quandam aurem existere. Vnde ex duobus alterū Pelopii præceptorū placuit: aut quidd qualitas quædam, altera nē per continuationem in partibus, aut spiritalis substantia transmittitur. Nec mirandū esse dicebat, tam validam vim esse humoris, in affecta particula præter naturā genito, vt cum perniciosarum ferarum venenis componi posset. Etiam vbi phalangium mox mordit aliquem, & vix parū existat animal, existimare, tamen debemus, venenū ex ipsius ore, primō quidem in superficie, dein verd in totū corpore deferri. Præterea maris turturis, si veni & terreni scorpionis aculeus,

Veni mediam in cubito positi didam in esse, qui sanguis melancholicus abradens per varicosum corpus habet.

Hypochondriaca ac flauilla melancholica, quæ à ventriculo oritur, signa.

Hypochondriaca melancholica causa.

Epilepsiam aliquando oriri à ventriculo.

Melan: bilis sanguinem deficiat timor, melancholicus cum specio valet.

Atra bile cor timorem incutit.

Hypochondriaci morbus quid dicitur.

Melan: bilis remouet quæ vltis ratio de variis Galeni.

Epilepsia non diffinita.

Ceterum hanc epilepsiam balneis, solis, vultu.

Præceptum Galeni præceptum.

Phalangis mors.

Turtoris maris na aculeus.

scorpionis aculeus.

scorpionis venia ad refrigerare.

illa à venenato in his partibus quomodo sui causa.

epileptici convulsiones quales sunt in distictis per convulsiones.

scorpionis quod dicitur.

convulsiones epileptice causas.

lethargus. apoplexia causa.

apoplexia orta paret, partibus magnitudine ex nervorum respiratorum collata.

Nervi veniunt à cerebro, musculisque principibus nervi mater largiuntur.

in parafos affectus omnes causas in cerebro.

Affectus vertiginosus siue primarij, siue lege consorij accidat (quod solet ob consensum ventriculi ad cerebrum ipsum pertinere). Quo detentur, vel à minima occasione hebetatur, adeo ut interdum cadant, si vel ipsi vnicui duntaxat circum in gyrum agitur, aut quippiam aliud circumrotari viderint. Est autem rationi consonum, huiusmodi affectionem fieri, elato per magnas ilas arterias, quæ plexum reniformem constituunt, vapo calidoq; spiritu, atq; cerebrum ipsum replente. Fieri etiam potest, ut inaequalis intemperies cerebri, huiusmodi spiritum gignat.

Vertigo ad cerebrum pertinet.

Vertiginis causa.

Cephalæa (qui affectus ad cerebrum etiam pertinet) est capitis dolor diuturnus, difficiliterq; solubilis, qui à parva occasione vehementes possidet accessiones, ita vt qui eo torquetur, neq; strepitum, neq; vocē, neq; luminis splendorem, neq; mori perferre possit: sed tranquillitatem, obscurumq; cubiculum quærat, idq; ob doloris vehementiam. Ad hæc, accessiones huiusmodi, veluti in comitiali morbo, intermissiones habet, interceditq; tempus, quo perfectē liberari videtur ægri. Differt autē à cephalalgia, quod in hac non vique adeo imbecille redditur partes affectæ, vt in cephalæa, licet in vtroque affectu caput minimo negotio afficiatur. Sunt tñ nonnulli, quibus caput apertissimum est vt impleatur: atq; vniuersi quoq; corporis habitus ad ipsum implendū idoneus. Alij, omnes capitis partes aptas habent, vt afficiatur. Quibus, vbi vitioso victa vtiuntur, accidit vt cephalæa arripiantur. Quo minus mirandum est, si horum alius membrane cerebrum continentes, dolore afficiantur, alijs pericranij duntaxat. Ar quibus intra caluariam est dispositio, ita ad oculorū vsq; radices, ipse dolor extenditur: quod nimirū à cerebro, & ab vtriusq; membrana, necnō à vasis quæ in ipsis sunt, veluti germina quædam illuc deducitur. Sed & quorūlibet dimidia capitis pars dolore infestatur (vocantur autē hī hemis cranici) alijs extra caluariam, abij in capitis intemis partibus dolore percipiūt. Ar verò dextram capitis partem à sinistra distinguunt futura per longitudinem ipsius exporrecta. Sub quæ, intra capitis ossa, linea mediū cerebrū diuidens manifestē protenditur: ad quam etiam peruenit anteriorum duorum ventriculorū septum. Ea porrò corpora suapte natura idonea sunt vt ipsis caput impleatur, in quibus vaporosus calidusq; spiritus gignitur: aut quibus biliosa extremata cumulantur in ore ventriculi. Arqui spiritus, dolores tenuos pariunt: biliosa extremata, dolore mordaci afficiunt. Dolores à plenitudine inducti, granularis sensum præ se ferunt. Quod si rubor addit & calor, calidos in causa esse humores est signū. Sunt quibus caput à seipso dolet, vbi vel liberalius vinū ingerierint, vel meracius: idq; magis, si suapte natura calidū fuerit. Præterea calidi odores omnes, atq; in vniuersum odorata omnia, capiti dolore conciliant. Nonnullos autē ob sensus exasperantiam dolor infestat: quemadmodū in ore ventriculi accidit.

Cephalæa quid.

Cephalægia et cephalæa disticta.

Caput intra caluariam delimitur, dolor vsq; ad radices acutorum extenditur.

Hemis cranici qui dicuntur.

Caput quib. op. pleatur facili.

Odorata vniuersa conciliant dolores capitis.

Ar verò si aliquido per totū corpus, v neuorū

CAPVT VIII.

GALENI PERGAMENI  
de locis affectis, lib. III.

## CAPVT I.

**A**T verò oculorum interdum quidem sensus, interdum motus, ac nonnunquam vitæ sanctio resoluit: idque nunc in altero, nunc in utroque contingit oculo. Eum cum solus palpebræ vel sensus, vel motus lædatur. Vbi igitur nullo malo apparente in oculo, perierit facultas cernendi, nervus in ipsum descendenti a cerebro, causa tribuenda est, tumidum vel inflammatum, vel induratum, vel quomodo cunctis aliter ob humorum affluxum læso, obstructo, seu secundum proprium foramen. Quæ omnia accedere illi tanquam organicæ parti, necesse est. Nam tanquam pars similis, oculo intemperie vexatur. Præter has causas ex oculi oculorum sensus, est alia, ubi nihil omnino, vel exiguum admodum visus spiritus à principio (quod in cerebro consistere putandum est) ad eos descendit. Si verò utervis oculorum, motus duntaxat amittitur, secundæ copulæ nervum, qui à cerebro oritur, molestant illi necesse, ab aliquo videlicet eorum affectum, quos alteri nervus, qui à prima coniugatione oritur, & cui soli meatus conspiciuntur, nuper accidere diximus. Quia vero musculi oculum ipsum mouentes senario numero constant, ac præter eos alio quoque adiunt, qui descendentes in ipsum amplectuntur optici potius radicem, vel videlicet oculum retrahant & firmant: nec mollis ille nervus, in processu pervertatur aliqua ex parte: accidit sanè internum, hoc ipsi nervo nequaquam læso, musculorum aliquem, aut in propria effectus, aut in nervo ad ipsum descendente, contristari ab aliquo dictorum affectuum. Siquidem singulis eorum musculorum, pars quædam nervi à secunda coniugatione orti, transmittitur. Cum itaque sex inveniuntur mouentes oculum musculi, si is quidem qui ipsum ad superiora trahit afficiatur, totus oculus delapsus videbitur. Si vero is qui ipsum detrahere solet, affectus sit, oculus sursum tractus cernetur. Sic si vinerit minoris anguli musculus, ad maiorem: si vero hic læsus sit, ad illum inclinabit oculus. At si volentius musculorum quispiam sit resolutus, obliqua totius oculi conversio ædetur. Cæterum resoluta musculis circumdantibus mollem nervum, prociadet totus oculus, atque sua sede movebitur. Porro cum oculi à sede sua deturbantur, si ad alterutrum angulum peruersio fiat, innocua permanebit cernendi vis. Si verò aut sursum, aut deorsum, aut in obliquum quoque vertatur, quicquid ipsis obiceris, id omne duplici esse videbitur. Ex musculis (superiorem mouentibus palpebræ (nam inferior immobilis est) si is qui sursum eam retrahit, resolutus sit, laxam efficiet illam, adeo ut oculus aperiiri non possit. Si verò qui eam detrahunt (gemini enim hi sunt) exoluantur, oculi claudi non poterit. Quorum si alter afficiatur duntaxat, ad oppositum musculum palpebræ reflectetur. Hi sunt partium oculi peculiare affectus, qui latentibus locis insident. Ac sunt præterea alii, qui ex alius partibus et per consensum adveniunt, nempe aut ori ventriculi, aut cerebri coniugatione. Cuius generis sunt symptomata fusi

Vitæ quibus modo oculi di tangat.

Oculorum motum vnde per accidat.

Optici nervi sunt qui signa cernunt. Oculo nervi sunt qui motum.

Oculi quatuor sunt qui pervertunt.

Oculi sunt aut dextris peruersio obliqua vnde diphysia. Palpebra quatuor sunt qui pervertunt.

Oculorum effectus per consensum sunt.

actio vitiosa redditur, ipsorum esse affectum principium constat: id quod ex sola dignosci potest a natome. Cum igitur omnes pariter nervi, tum sentiendi, tum mouendi vim amiserint, affectus is apoplexia appellatur. Vbi verò alteri lateri, aut dextro aut sinistro id accidit, cefaluno nominatur, eius scilicet partis, in qua consistit affectus. Quod si in aliquo membrorum idem evenierit, etiusdem resolutio dicitur. Cæterum omnes animantis partes sub ceruice posita, quæ à consilio & voluntatis imperio moveri possunt, nervos habet qui eas movent, procedentes ab spinali medulla. Porro nervi qui mouent thoracem, ab ea spinali parte quæ in ceruice est, exoriantur. Si itaque tota spina transversum dissecta fuerit, omnes quæ sub ipsa sunt corporis partes, sensu motuque privantur: quod per eam nimirum facultas sentiendi & mouendi pro arbitrio, deferatur à cerebro. Quod si transversum ad medium visum secundum longitudinem ipsa spina incidatur, non omnes suppositæ corporis partes, sed ex duntaxat quæ è regione sectionis sunt, resoluntur: dextra quidem, dextre spinæ parte dissecta: sinistra verò, sinistra. Videntur autem huiusmodi resolutionum aliqua, faciem quoque insistere: sed tum resolutum latus ad alteram faciei partem retrahitur. Cum igitur nervi qui in faciei partes dispersi sunt, à cerebro oriuntur, sanè si earum aliqua simul cum toto corpore resoluta sit, scire oportet resolutionis dispositionem in cerebro ipso consistere. Vbi verò illæ per se permanserint, haud dubie spinæ initiū afficitur. Accidit verò nonnullis, ut faciei partes solæ afficiantur, ut lingua, oculus, mandibula, & labrum. Quippe non omnibus ab uno loco principium insit, cum ex diversis cerebri partibus suos nervos recipiant. Igitur apoplexia omnibus actionibus animalibus noxam inferens, cerebrum affectum esse manifeste declarat. Discernitur autem magnitudo affectionis, ex noxæ quam spirationi infert, vehementia. Cum enim naturalem ordinem plurimum egreditur, magnam: cum verò paulum impedimentum est, parvam in cerebro noxam esse, coniciere oportet. Sanè omnium præsumma spiratio putanda est, quæ & intermititur, & magna cum violentia trahitur. Siquidem ob id contingit mori apoplecticos, quod spirare non possunt. At verò ubi pars aliqua convulsa est, nervus ei motioni deputatus, aut musculus, necessarius est affectus. Positum autem dicitur resolutio nervorum, ubi motus deperditus est. Vbi verò partium aliquarum sensus perit, eam partem sensus expertem esse: resolutam autem, non vique adeo dicimus. Quamvis perinde est, ut quisque eam nominare voluerit, modo sedem affectam, simulque illius dispositionem inveniat.

## CAPVT IX.

Vbi olfaciendi vis lædatur, non eorum meatuum qui in naribus sunt, sed vel anteriorum cerebri ventriculorum, cum aliqua intemperie laborant, est noxa: vel eorum in catenatum, qui in ossibus colatoris consistunt, si aliquando obstruuntur. Siquidem odoratorius sensus, in anterioribus perficitur cerebri finibus, clatis ad ipsos, per foramina colatorumque ossis, vaporibus.

Apoplexia quod.

Resolutio quod.

Nervi mouent thoracem, à illa spina exoriantur. Spina læsionibus quæ per se subdantur illi partibus læsionibus resoluuntur.

Apoplexia omnibus actionibus animalibus noxam infert.

Spiratio præsumma quæ sit.

Apoplexia mori, quod privatur respiratione.

Resolutio præcipue dicitur, ubi motus perit.

Odoratorius sensus in anterioribus cerebri perficitur et rebus suis.



forum visis similia. Ceterū visū ob humorum in ventriculo contentorum vinum oborta, vtrig oculo similiter accidunt. Quæ verò per suffusiones apparent, nec incipiunt simul in vtroq, nec similiter. Præterea, si tribus quatuorve mensibus suffusio accidentia apparuerint, pupilla autē pura splendidūq, cernatur, ab ore ventriculi nasci affectum ne dubites. Si verò non ita multum temporis intercesserit, querendum est in primis, num ex quo incipit affectus, singulis diebus perpetuo hæc apparitio perseverant. Nam a se diuitas suffusione portendit: intermissio autem, quod malum à ventriculo prodient, suffusione excitat: idq, magis, si perfectè quis concoquens, nullū sibi visum apparere fatetur: casu mior magis, si cū apparuerint tales imagines, mordicus in ore ventriculi doluit: maxumè verò, si post hæc, vomendo eiecia remordente, mitigata accidentia fuerint. Quinetiam si à ventriculo symptoma id exoritur, medicamine ex alio potur daro, minimo negotio curatur, accedente simul proba coctione. Vbi verò altera pupilla tenebrosior, aut turbidior, aut nō exactè pura conspiciatur, suffusio est innū censendum est. Similia quoque suffusioni accidentia in quibusdā phreniādi speciebus (affecto scilicet cerebro) sepe numero evenire solent. Sunt etenim phreniāci quidā, qui de iis quo oculis offeruntur, relictē (quantū ad sensitiuam notitiam pertinet) iudicant: cogitando verò, à naturali iudicio aberrant. Alij rursus, cogitatione quidem falluntur minimè, sensibus tamen hallucinantur: id quod mihi olim contigisse videtur, cum ardenti febre laborans, & hōccos vellerem, & in vestibus festucas colligerem, idq, animo cōstans. Sunt præterea qui simul sensus & cogitationis vno laborant. Porro vbi in cuiuspiā cerebro biliosus succus ab vnda, accedens febris ardens, ab illo oritur rursus fumus, veluti in lucernis ab oleo: qui, per vasa que ad oculum tendunt, delapsus, carū imaginum in ipsis esse causa censetur.

## CAPVT II.

In lingua etiam, interdum motū ipsius, interdum sensum, interdum vitari quoq, tactum contingit. Non tantū alio gustus, atq, alio tactus neruo vitur. Si quidem nerui à tertia coniugatione orti, qui in linguae pellicula diffusiuntur, nō solum tangendi, sed gustandi etiā vim obtinent. Cerebrus tamen læditur gustandi quā tangendi facultas, cum ad gustum exacto iudicio siropus. Etenim tangendi sensorium, crassissimū: vt cernendi, tenuissimū est. Auditus verò sensoriū, vt in tenuitate à visu, ita sensoriū gustus in crassitudine, ita tactu secundum locū obtinet. Olfacienti verò sensorium, in illorū quatuor medio consistit. Igitur cū posterior cerebri pars tam dextra quā sinistra afficitur, ne apoplexia hominem rapiat, nendum est. Vbi autem altera tantū, in paralytici finiri solet: que interdum alteram solum linguae partem motu destituit, illæso ipsius rum gustu, rum tactu: interdū partes sub capite constitutas, modo lias, modo ilas. Cū autē à parte anteriore cerebri facies suos nervos recipiat: à posteriore verò omnes partes que sub capite sunt: à qua etiam oritur septima coniuga-

tio ueruorū, qui inserti in musculos linguae, voluntarium illius motū perficiunt: non ab re quidem anteriore cerebri parte altera affecta, sola linguae motio vno carebit: reliquæ verò faciei partes omnes, in altera parte, dextra aut sinistra, sensu & voluntario motu destituentur. Quemadmodū si afficiat posterior pars cerebri, reliquarū partū faciei incolumi simul & motu & sensu, solum linguae motus vitabit. Quod si aliquando rota anterior cerebri pars afficiat, supremū ipsius ventri cōsentire necesse est: atq, cogitandi quoq, actiones vitari. Proinde qui ita est affectus, nec sentit, neq, mouet: spirandi tamen faculas haud quā in illo læditur: vocandi hic affectus capros, siue sopor. Qui si vehementer inspirationē opprimat, apoplexia uominatur. At solute apoplexiæ creberrimè solet paralytica succedere. Sopor verò finito, magna ex parte bona valetudo subsequitur. Fir autem sopor, Hippocrate autore, affectus musculus temporū, atq, in acutis morbis. Inter soporē & apoplexiā, morbus comitialis est medius, conuulsionē vniuerso corpori inducens: sed in paralytici non desinit. Quorū trium morborū, frigidus, crassūq, aut omnino viscidus humor est causa. Verum & in sopore, & in morbo comitali, ventres magis, cerebri corpus minus: in apoplexia verò, corpus magis affici solet. Atq, in sopore anterior pars magis, in apoplexiā & morbo comitali vtrāq, afficitur. In catalepsi & vigilanti sopore, posteriora cerebri magis læduntur. Quam autem ossē aliquo terebra perforato, medius ventriculus fuerit attritus, i sopor hominem occupat, sed nec conuulsione, nec difficultate spiratione oborta: hæc enim apoplexiæ, illa morbo comitali est affinis: haud secus q, catalepsi, soporici, feruata secundum naturam spirano. Verum vt in sopore clauduntur palpebre, ita in catalepsi manent aperte. Iam verò vehementes dolores sopor sequi consuevit, cōcidentē videlicet robore animalis spiritus, quod primum animæ instrumentum exiit in ventriculo cerebri: indeq, fluens per nervos desert motum & sensum in vniuersas corporis partes. Igitur affectum linguae, aliq, quidem illi cōmunes sunt, \* ob cōmercium quod habet cum cerebro & nervis: aliq, ipsius duntaxat proprii censentur. Quæ admodum ergo consors legē, per septimā neruorū coniugationē motus ipsius vitiatur: sic sensus impediri potest per tertā, quæ & mollis est, & in pelliculā illius, sicuti septima in musculos, diffeminatur. Quod verò ad proprios illius affectus pertinet, sicuti muscularū eius, vt similariū, intemperanties morum impediunt, ira ambientis ipsam extrinsecus membranz intemperies, & tangendi & gustandi simul sensum vitiat. At instrumentalium affectionū speciem referunt in inflammationes, scirrhi, ædemata, erysipelata, suppuraciones, & alia id genus: de quibus, quia visus & tactu discerni possunt, nihil in hūc cōmentarius dicimus. Vt autem de ipso ad dictū nōnnulli inferamus sermoni, si illæso apparente neruū foramine, sola audiendi facultas læditur, aurium propriū esse affectū, licet existimare. Vbi verò reliquæ faciei partes simul cum functione audiendi lædunt, in cerebro esse dispositionē præter na-

Cerebri Sopor. Apoplexia sola ta sicut paralytici faciliore.

Sopor fit affectu musculus est paralytici.

Cerebri corpus magis afficitur in apoplexiā, quā in morbo comitali. Sopor in hoc autem ventriculus magis.

Catalepsi dicitur de motu animæ aperiens palpebras. Sopor confusio spiritus vehemens rei doloris. Animata spiritus est primum instrumentum animæ.

Læditur a proprii nervi, qui sunt.

Audiendi facultas sola potest lesionem accipere.

Inferius quæ modo differant à superioribus, ad animā à ventriculo esse dicitur.

Pura pupilla in affectu conueniens.

Phreniādi species varis symptomata.

Lingua recipit ab istis nervis notitiam coniugationis, quæ in illo loco diffusiunt, simul gustu & tactum. Facies, quæ quibus sensibus, hinc crassior, aut mollior.

Facies vnde sensus in auribus recipit.

Nervorum ter-  
tia coniugatio  
in quas partes  
distribuantur.

turam, est venisimile: ipso vel vt similitari, vel vt in  
strumentali parte affecto. Menerunt aut vclum,  
temporis maxillanumq; musculis, item labris &  
narum pinnis, sensum & motu: lingue vero, om-  
nibusq; oris partibus, sensum duntaxat, à tertia  
cerebri coniugatione oritur: scduda, oculorū mu-  
sculorū motū, vt à prima, oculis ipsis cernendi sen-  
sum suppeditat. Vbi igitur vniuersæ particulæ,  
quibus à tertia coniugatione inferuntur nervi, oble-  
scit in altera tantū parte videtur, cōmunem nervū  
primariū affectū esse putandū est. Si verō vtrūq;  
simul pars lēdi cōtingit, nō nervi propria, sed  
loci cuiuspiā in cerebro, à quo oerui procedunt,  
est ipse affectus censendus: ac tunc lanē omnes  
vicinæ partes simul affici cōfueverint: prosude &  
quartæ & secundæ coniugationis oerui: vnde se-  
quitur, vt oculorū quoq; partes lēdantur. Quod si  
vnus duntaxat vel musculi, vel nervi, quoquo  
modo siue primariā affectione, siue per consen-  
sum, affectus fuerit, pars ipsa in adversam trahit-  
ur musculū. Nam resolutio musculi qui dextrā  
partem labri mouet, ipsa ad sinistram flectitur. At  
si is qui sinistram mouet resolutus, ipsa trahitur  
ad dextram. Hæc secus & totam mandibulā, &  
narū pinnas, & genas quæ à lato mouentur mu-  
sculo, in adversam partem flecti cōtingit. At lat-  
us musculi nō recipit nervos à tertia coniuga-  
tione: sed nervi à cervicalibus vertebrae prodeūta,  
in illū ferē totū diffeminantur, exiguā ipsius parte,  
sublimioris, excepta, in quod defuerunt nervi à  
quarta coniugatione. C. A. P. XII.

Resoluto alicui  
ius particula  
musculi, pars  
ipsa in contrariū  
trahitur.

Latus musculum  
vnde nervi re-  
cipiunt.

Anginam ab-  
gignendo ob ver-  
tebras lexas  
accidit.

Spinae partes ad  
torem præstan-  
tiores existere.

Septuaginta  
sum solum pos-  
sere locum reser-  
vationem.

Gibbus vnde  
accidit.

Spinae proprio  
si laborat affec-  
to, quid acci-  
dat.

Potest vbi afficiuntur priores vertebrae spinæ, li-  
cet raro, evadere tamen interdum angina potest,  
ideq; in pueris magis q; in adultis, numq; ob ipsas  
vertebras ad interiora lexas: quemadmodum  
Hippocritas, secundo de populari morbis. Cæ-  
terum per huiusmodi anginas guttur ulla pro-  
prio affectu laborat. Cū autē ipse partes, quod  
fuerint aliores, eo sint præstantiores: sanē quod  
affectio fuerit inferior primis duabus vertebrae,  
eo inferit multo minorē noxam. At nervi septi  
transversus, sub quarta & quinta vertebra oritur.  
Ab eo autē solo fit spiratio \* lenis, accedente in-  
tercostali musculorū actioe, vbi vehementiori  
est opus respiratioe: quæ si vehementissima  
requiratur, supremos etiam musculorū cōcurrere  
oportet. Porro vbi vnica duntaxat vertebra, aut  
etiam duæ, aut tres, sese consequentes invicem,  
distrahuntur, ea parte spinā cavari cōtingit. Vbi ve-  
rō inter distretas vertebrae, vel vna, vel plures,  
illæ se manifestant, sic affectus gibbus accidere so-  
let. At si in alterā partē, vel dextram, vel sinis-  
tram, distrahatur vertebra, ibidē in obliquū spi-  
na torquebitur. Cæterū alia sequitur symptoma-  
ta, vbi proprio affectu laborat spinalia medulla:  
& alia, vbi vna vel plures vertebrae afflicte luxan-  
tur. Nam cū proprio affectu spina ipsa affligit-  
ur, circa vertebrae aliquā luxationē, si quidem  
in altera duntaxat parte afficiat, omnium inferiorū  
corporum partium, quæ è regione nocumenti consi-  
stunt, tam sensus q; motus larditur. Si verō vtrāq;  
pars sit affecta, omnes particule tam in dextra,  
quā in sinistra regione, ei quæ affecta est subie-  
ctæ, similiter resoluuntur. At luxata vel ad gibbū,  
vel ad concavū vertebra, fieri potest vt nulla o-

mnino partium inferiorū, vel in sentiendi, vel mu-  
tandi functione, aliquod vitū percipiat. Per an-  
gulosas tamen luxationes spinæ, subiecta om-  
nes particulas lēdi est necesse. Paulatim verō fa-  
cta luxatione, atq; in orbem magis, nihil notari  
dignum patitur partes, quæ cōmune vertebrae  
subiiciunt. Sed in obliquū luxato, lēdi omnino  
eas partes, ad quas nervi ex luxans vertebrae pro-  
cedentes, perveniunt: idque magis in ceruice, in  
thorace minus, sed multo minus in lumbis acce-  
dere solet. Siquidem in ceruice, vertebrae inter se  
cōnexæ, æqualiter vtrāq; foramina conferunt, vnde  
nervi procedentes thoracis atq; superioris ma-  
gis, inferior minus: sed in lumbis, totus nervus  
ex suprema exiit vertebra. Quare io eis trans-  
versā vertebrae luxatio, vna scē trahens & me-  
dullam, & nervū, illarū servat naturalem orrū  
ipsius. In ceruice autē, ex loco medio inter duas  
vertebras procedentes oerui, per obliquas luxa-  
tiones, in ea quidem parte, ad quam spina dese-  
ditur, opprimuntur: in altera verō tenduntur. Rur-  
sus tensiones quidem, vbi iugens quoq; inflama  
no accesserint, cōvulsio comitat. Ad cōpressiones  
verō earū partium, ad quas oppressa nervus de-  
scendit, sequi resolutio. Ignor per eas quas nu-  
per diximus vertebrae luxationes, reliquæ faci-  
ciat partes omnes, neq; in sensū, neq; in motu no-  
xam subeūt. Solæ autē genæ larduntur, vt quæ mo-  
uentur à lato musculō. At vertebrae solent luxa-  
ri, aut ob casum, aut ictum, aut tumore præter na-  
turam, nervosa corpora vertebrae atq; medullæ  
cognata extendent. Vt autē imprecinari ali-  
quid de angina dicamus, Hippocrates affectus  
omnes, qui cū spiratione difficili, guttur aut fau-  
ces inferant, vbi nanchas, hoc est, anginas appel-  
lat. At sunt quidē anginae genera quinque. Primū  
est, vbi inflantur fauces: hoc est, internus oris  
locus, vbi & gula & gutturia partes extremæ  
consunt. Secundū est, vbi nec fauces, nec reliquæ  
oris partes, nec etiā externarū partium vlla inflama-  
ta videtur: laborans tamen suffocationis peri-  
culum in gutture sentit. Tertiū, vbi extrinsecus  
circa fauces inflammatio apparet. Quartū, vbi gut-  
turis partes tam externæ q; internæ, similiter in-  
flammaræ videtur. Quintū deniq; cū ad ante-  
riores partes, colla laxantur vertebrae: id quod si-  
ne cōtingit, vel solis musculis qui cum ipsis com-  
municat, tumore præter naturā affectus: vel nato  
ibi tuberculo, vel gula pariter vitata, nonnāq;  
musculis quoq; qui gulam gutturis iungunt, prop-  
tiusque aliquando gutturis musculis, qui ipsū  
aperiunt, oblecta. Hi igitur affectus omnes diffi-  
cilem respiratiōē efficiunt, minimē tamen in di-  
scrimen suffocationis adducunt. At ægri & diffi-  
culti deglutiunt, & dolēt, tum præcipue, cū ei  
potus per nares resistit. Nullo sūt spiritalium in-  
strumentorū nec primariū nec per cōsensum af-  
fectio, fieri minimē potest vt spiratio lēdatur. Quo  
circa ex sola spiratiōis specie, licet nō nihil & de ase-  
cta sede, & de ipsa dispositione, consicere licet.  
Quippe si videatur laborans, inter spirandū, to-  
tum monere thoracē, vt in parte quidē anterie-  
re, ad iugulum vtrōq; latere, ad ceruicē: in par-  
te posteriorē ad scapulas viget, motus ipsius ascen-  
dat: tres ex huiusmodi spiratione dispositio-

Angulosa luxa-  
tione spina  
sine necesse  
in, quæ in obli-  
atq; paulatim  
fuit.  
Luxationes si-  
ne oblique.

Locum vnde  
brari vnde pos-  
sit accidit.

Angina pueri  
quæ quæ.

acc

nes significant. Vna est Almera in corde & pulmo-  
nes caliditas. Secunda, in altero spiritalium instru-  
mentorum angustia. Tertia, facultatis musculorum  
mouendi debilitas. Quia igitur huiusmodi spiri-  
tiones cōspexeris, in primis arterie pulsationē p-  
pendere oportet: licet enim quātus sit calor, ludi-  
cat. Deinde spirationē ipsam expendere, an multa,  
an frequens, an exsuffillando fiat. Postremo thora-  
cem in pectore tange, quem si præter cætera ar-  
dens invenieris, tam omnes copiosi caloris nota-  
tas te habere ne dubita. Quibus ex abundantia  
accidit facies, oculosimq; rubor, capitis ardor,  
sitis vehemens, lingua arida, salebrosaq; Vbi ve-  
rò incendij signis modis servannibus, thorax di-  
latatur vehementer, angustiam in spiritalibus in-  
strumētis esse portendit. Sola aut imbecillitas  
accidit splux, interdum cerebri vitio, vt potest  
quo & senndi, & mouendi facultatem recipit:  
interdū ipsa duntaxat spina primario affectu la-  
borante, idq; ob peculiare interemperie, vel toti  
spinæ, vel duabus ipsius partibus aduenientem.  
Igitur ob ipsius imbecillitatem spinæ, omnib; tho-  
racis partibus soler aër inspirari, vel nullo arden-  
te calore ægrū ad cogente. Siquidem vbi ani-  
mans quiescit, viresq; valide sunt, liberam respi-  
rationē solum sepius trāversum efficere solet.  
Vbi vero id ob imbecillitatem spiri di munus per-  
ficere nequit, intercostalium musculorū tunc con-  
currat auxilium. Quod si præterea maiori animal  
egeret spirationē, tunc sapienti musculi omnes,  
quorū maximi scapulas secū manifeste mouent,  
ad spirandū actionē desiderant. Cæteri tametsi  
per spiritaliū organorū imbecillitatem totus tho-  
rax mouetur, dilatandūq; pinnae, dilata-  
tio tamen thoracis est minor, q̃ in ardentibus  
febris: in quibus, si vires valeant, totus tho-  
rax plurimū dilatari cōsuevit: minorq; etiā q̃ in  
angustia, & dyspnœa, & perneumonia. Quippe  
hoc morbo affecti, & maxima, & frequentissima  
spiratione vtiunt. At quædam modū ob infirmi-  
tatem omniū organorum respiracionis, sic ob vi-  
nū quorū particula imbecillitatem, omnes tho-  
racis partes dilatari coguntur. In vniuersum au-  
tem, vnica pereunte actione, solum musculū qui  
ipsam efficere solet, aut neruū ipsius, esse affectū,  
putandū est. At vbi plures actiones vitare sunt  
in diuersis locis, accidit interdum omnes muscu-  
los, quibus perficiuntur, ab aliqua cōmuni cau-  
sa esse oblectos. Fieri etiam potest, vt neruus al-  
iquis, qui musculis illis cōmunis est, afficiatur. Ve-  
rim si ex anæmone, ad quā particulam porrigant  
singuli nerui ab spina prodeuntes, didiceris,  
affectas sedes q̃ facillimè inuenies. Sic enim cūm  
ex refrigeratione primariū vertebrae spinæ, &  
quibus quatuor nerui ad caput ascendū, vt per  
cranio sensum largiantur, cuiusdam olim caput  
afficeretur affecta sede explorata, illiq; remediis  
adhibitis, eum subito perianximus.

## CAPVT III.

At verò sanguis ē ventriculo guttaq; vomi-  
tione: ex spiritalibus partibus, natus: ex faucibus  
& gurgulione, creatur: ex ore, simplici expulsi-  
one expelli, apud omnes medicos in confesso est:  
Nos vero sanguinē qui a cerebro affatim descen-  
debat ad fauces, rursūm eo educi sepe numero vi-

dimus: quippe subleu gurguri istius, rursūm mo-  
uere potest. Quare diligenter oportet huiuscō-  
modi affectus distinguere. Cæteri cōtingit plerūq;  
vt vel erosā, vel exesā, vel rupta vena; sanguis  
rursūm, affatim cōstitimq; eliciatur. At si ip-  
simum aliquid simul educū fuerit, efficacissi-  
mum est indicij, ipsum educi a pulmone. Haud  
secus, si bronchi pars quæpiā, aut arterie, aut ve-  
næ tunica, aut etiam pulmonis ipsius caruncula  
relicta. Quippe nihil horū accidit illi, qui ex tho-  
race sanguis effusendo producit. Tam verò nul-  
lus dolor infestat eos, quib; a pulmone sangui-  
s erumpit: vt potest quid nos neruus perq; tenuis a  
sexta neruorū a cerebro ortorū cōiugatione re-  
cipit, extrinsecus per membra ipsū continē-  
tē dispersos: qui intrinsecus hāudquāq; per  
visceris profunditatē extēduntur. Verūm thora-  
ci multi ab internis, multi etiam ab externis par-  
tibus adueniūt nerui, quibus facile dolores per-  
cipi possunt. Præterea thorax quidem est muscu-  
losus & ossulentus: pulmo verò & latus, & tūus  
a cōtusione. Proinde thoracis dolores intensio-  
res sunt, pulmonis remissiores. Cūm igitur dol-  
lente parte quæpiā thoracis, sanguis qui spu-  
do reiecerit, nec multū, nec rubrū, sed nigrican-  
tē grumulosūq; huic thorax primariā affectio-  
nem infestat. At sanguis affecto thorace per pul-  
monē educitur: vt in suppuratis affectibus pui-  
quod inter thoracē & pulmōē deprehēdimus:  
eundemq; modum, quod in pleuritide coloratū  
spūm emitti solet, per pulmōē exerit. Por-  
rò vlcera quæ sanguinis reiectioni solent super-  
venire, in pulmone quidem ægrè curationē ad-  
mittūt. At thorace disrupa vasa, & quibus san-  
guis expulit, magna ex parte cōglutinantur.  
Inuestigandū verò est, num ob adhaerentē  
sanguisugam, vel in ipso natiū meatu, vel in illa  
oris parte, quā ad foramen tendit, sanguis  
aut emungatur, aut screatur. Ex ventriculo etiā  
cror, epota hiantes, exomitur. Qui cror ta-  
men est tenuis, sanciēq; speciem referēs, siue ex  
ventriculo, siue ex naribus, siue ex ore feratur.

## CAPVT V.

Quod nō sit eadem res, vox atq; sermo, nemi-  
nem ignorare existimo. Vox siquidem vocaliū  
instrumētis est munus: loquela verò, eorum  
quæ sermoni sunt deputata: inter quæ linguā  
principatū obtinet: cui nō parum conferūt & na-  
sus, & labra, & dentes. Sic enī vocis instrumēta  
sunt gurgur, & ipsum mouentes musculi, ac ner-  
ui qui a cerebro ipsi mouendi vim deferunt. Igi-  
tur si vel claudentes, vel aperiētes gurgur muscu-  
li, immobiles reddantur, qui sic afficiunt obmu-  
tescent. Vbi verò vel difficulter mouētur, vel palpi-  
tant, vel tremunt, vel aliter afficiuntur, pro affe-  
ctionis ipsius modo vox ipsi lædatur. Quod si  
alius quispam ex mouentibus gurgur musculis,  
quoquo modo lædatur, vitiā binit quidē vox,  
sed exiguum. Quippe sic affectus, neq; obmutet  
omnino, neq; ita parum habebit vocem. Vt  
autem ex musculis gurgur mouētib; præcipui  
habentur ij, qui ipsū & aperiunt & claudunt:  
ita ex vocalibus neruis, ij quos recurrentes vo-  
cant: qui & ipsi, sextæ cōiugationis pars sunt ne-  
uorum, qui a cerebro oriuntur: quædam modū &

II ij

Calore cupi-  
osa.Angustia spi-  
rituum instru-  
mentorum quid  
inducit.  
Spina vnde ac-  
cidit imbecilli-  
tas solent.Sanguis pui-  
dilatari per spi-  
rituales orga-  
nos subiecti  
locum.Sanguis a pul-  
mone rursūm  
educi.Dolor non infest  
statim quibus  
a pulmone san-  
guis erumpit.

Tenuis sanguis

Pulmonis dolo-  
res esse remissi-  
ores sunt, quam  
thoracis.Sanguis, efflu-  
ens thoracem, per pul-  
monē educitur.Pulmonis vlcera  
ægrè curantur  
non recipere.Sermone orga-  
na.  
Vox instrumē-  
talis.Vox quæ ex  
causa perire  
aut vitari pos-  
sit.Sanguis quæ  
per dilatari ex-  
trui.

alii, qui quidem per ipsum dispersi, differunt ab illis, eo quod à nervis sextæ conjugationis, non in ceruice, sed cum ad thoracis regionem pervene-

spiritus angustiam, aut vehementem in corde & pulmone caliditatem. Quamvis interdum duo, ac nonnumquam tres, quosque ex iam dictis causis concurrere possunt. Atqui tribus quidem simul coeuntibus, proximam mortem inire oportet. Vbi verò dux fuerint, difficile est xrum feruare. Sed vna duntaxat in febrile, peculiaris opus est finitione, vtriusque, seruabituræ æger, an ipsi malo succumbet. Ignit vbi vires duntaxat fuerint infirmæ, ad tria mouendū musculorū genera venire, eosque omnes ad motionē excitare solent, vno genere \* vehementer mouere nequeunt. Quippe si septum transuerfum solum, vel vtrum secundum naturā se habet, sufficienter mouere possit, vti que nec intercostalibus, nec superioribus musculis indigeret. Quoniā verò imbecillum est, omnes sensim commouet: fed nec frequentem, nec admodum raram actionem efficit. At plurimū aucto in spiritalibus instrumentis calore, omnibus quidem thoracis musculis agnimal: fed velox, frequens, & vehemens, est eorum actio, si citra virium imbecillitatem ipse calor infuset. Virium autem imbecillitate, vbi uō accesserit flamma caliditas, nec velox, nec frequens omnino committitur motus: proinde omni ira multum omnes thoracis partes potest diffendere. Præterea vbi uō plurimū calor spiritali est difficilis, spiritus quidam calidos, feruidiusq. efflatur. Vbi verò ob solā imbecillitatem, \* nulla facta per eos efflacione, spiritus per nares tantū emittitur.

Narivum pinnat  
um-anisifolium dicit  
ur et auctor respo  
ndendum, rubu  
prostratum in  
dicant.

Let's qui s'ira  
re solenne.

*Parulorum quod  
de fiat ruffa-  
tis.*

Parabola est  
quadrata  
solutio.

Ташкентдан ва  
қўшни вилоят  
қўрақчи қўрақчи  
қўрақчи қўрақчи.

Aeris inspirati  
quantitas in quo  
bus non respi-  
ciat argente-  
dum dilatato-  
nem thoracis, &  
in quibus ne-  
que quiescit.

Lactitium ne-  
 ce refrigerata,  
 nec impediūt.  
 Vex in auctor  
 & magnitudi-  
 nem quādo vi-  
 dentur.

Van vrede eff.  
cister rone.

Angina effren-  
da vocat pueri  
et mulieres

Voci qui affe-  
lta incompre-  
dende

Vacu materia  
est effluens.

Estado quente  
do fôr.

*Althousier indre  
se cò venarùet,  
faut qu'on; car  
ce fustitronè.*

Expiration.  
Effluvia.  
Effluvia Arterii.

Legend:

Diffinitio rati-  
onis, in qua o-  
mnis ibi dicitur  
monetur maxime  
in, quib. consi-  
derari possit, in-  
vestigata.

## CAPVT VL

Vt autē ad causas dyspnœe explorandas rur-  
sus hic sermo redeat, si videris aliquem respiran-  
tem ægrē, ita vt inter respirandum thoracis om-  
nes moueatur muscoli, pectusq; etiam vnā cum  
scapulis attollatur: certē ex tribus vnum conici-  
re oportet, aut virum imbecillitatē, aut virum

60

gustia sine flammæ calore in spiritalibus est, in  
hust, thoracis quidem dilatio fit maxima: id vero  
quod infirmitas, non solum dilatatio non propor-  
tione non assequitur, verum etiam minus, sed secun-  
dum naturam inspirari solet, attrahitur. Ceterum  
inspiratio ea quæ ob vinum imbecillitate fit om-  
nibus agentibus masculis, dicenda est subtilis,  
non magna. Iam vero multus spiritus, & ex lon-  
gis intervallis attractus (quemadmodum inquit  
Hippocrates) debili declaratur. Spiratio exigua si-  
mul & rara, spirituum instrumentorum frigidita-  
tis frequens verò, non solum spiritalium, sed et  
eorum etiam quæ cum ipsis movent, ut hepatis, lie-  
nis, ventriculi, & gulæ, labor em indicat. Est eni-  
am alia dyspnoe species, cum veluti brevis quadam  
quiete intercipitur opus thoracis: idque modò in  
inspiracione, modò in expiratione, siue hoc acci-  
dat ob convulsionem musculorum thoracis, siue ob  
caloris copiam, cogentis egrum continenter vel  
inspirare vel expirare. Est & alius spirationis af-  
fectus, apnœa, hoc est, priuatio spirationis, vo-  
catur: qui tamen contrarie nequit. Nam videtur  
esse impossibile, ut animal omni spiracione ex-  
tè priuatum, in vita seruari possit. Quivis anima-  
lia ea quæ in cavernis delinere consueverunt,  
mouere thoracis videtur minime. Proinde con-  
tere oportet, aut adeo exiguam adesse illis respi-  
rationem, ut effugiat sensum: aut animalia eius-  
modi, tunc non indigere respiratione, sed transpi-  
ratione illis sufficere, quæ fit arteriarum moru per  
vinctum corpus. Fieri autè còtingit apnœam,  
minime quidem affectus respirationis organus,  
sed principio à quo illa reguntur.

## CAPVT VII.

Verumenimvero pulmo nunquid vehementi do-  
lore cruciatur: aut grauitatis sensum, atque aliquan-  
do extensionem, vel adpectus, vel ad spinam quan-  
doquidem inde suspenditur membranæ ipsum  
ambientes percipere potest. Spenumero etiam  
pulmonis affectus, egrum molestat angustia, atque  
ob id crebro celeriterque respirant, & thoracem ve-  
hementer attollunt, sed non ita multum aerem at-  
trahunt. Hæc si citra febrem acciderint, aut tubercu-  
culum, aut plenitudinem crassiorum humorum in  
eo conuultus ostendunt. Ceterum si inter respi-  
randum egrum minime videatur iterare, indicium  
augeatur symptoma, crudi tuberculi ortu suspi-  
cari oportet. Si vero stertendo strepitum fecerint,  
leuiorum crassiorumque humorum pertuacitas im-  
pectorum multitudine, pulmonis bronchia non  
lester est indicium. Quod si id eo angustia sen-  
su quæ difficultat respirat, fluxionem vel à cere-  
bro, vel à vicinis sedibus, irruere in pulmonis,  
bronchia significatur. Porro si vbi vehemens pu-  
trescit pleuritis, remissa iam febris exandescen-  
tia, in uno thoracis eger derelictus grauiorem  
percipiat, ac per varios decubitus, maxime dum  
repente ab uno in alterum latus conuertitur, ali-  
quid transfluere sentiat, putis multitudine ibi  
contineri, coniectura est certissima: præcipue si  
nihil penè expuent labores. Si vero citra febrem  
feruosus aut piruofus humor subito in thoracis  
spaciū delinens, excierant spirandi difficulta-  
tem, eger tunc tenues spiritum, idque ab initio qui-  
dem exiguum, sed cum vehementi tuias: vbi ve-

ro concoctum est, plus atque crassius, & cum mi-  
nori tuias expuere solet. Quippe bilans accide-  
re potest, ut vehementer rufuendo paucas quæ  
expuat: nempè aut ob lentum crassiusque humo-  
rem, aut ob impensè tenuè. Si quidem tenuis hu-  
mor cum subleuatus est, inter rufuendum à spi-  
ritu diuisus refuit: lentus verò, aut omnino cra-  
sius, difficulter effertur, utpote qui non tam facili-  
t à corporibus, quibus impactus est, abierit, neque  
à quouis spiritu, nisi à vehementi & multo, po-  
terit impelli. Igitur spiritus quod nequiquid, neque  
aquoſum admodum fuerit, neque crassum etiam,  
aut lentum, id facili effertur solet, maxime vbi vires  
validæ fuerint. Porro vbi cum spirandi difficul-  
tate, cui & angustia & grauitas coniuncta est, ac-  
cusa quoque febris incidit, is affectus est inflam-  
matio pulmonis. Ar si intolerabile incedit fuen-  
rit, angustia verò, grauitatis sensus minor, ery-  
sipelas ipsum vexare censendum est. Vexatur ve-  
tiam pulmo interdum inæquali, siue vi & æqua-  
li intemperie, citra humorum adfluxum. Igitur in-  
qualis tuias excitat: æqualis verò, si moderata  
sit, spirationis concinnitatem variat. Si autè ve-  
hementis, idque vincente calore, frigidi aeris & po-  
tioris cupiditatem inducit, ac tractu temporis  
in febrem definit. Per frigidam autem intempe-  
riem, contraria euenire solent. Quippe si modum  
seruauerit, calidi aeris, & calidæ desiderii potio-  
nis excitat: si verò modum excedit, replet viscus  
ipsum fluxionibus. Ob raptionem etiam maioris, con-  
tingit sanguinem in pulmones transfluere, atque  
excitare tuias. Attruptiones in eo deprehendes,  
tum ex multi sanguinis effusione, tum ex ma-  
gna, notabilique aliqua causa, quæ subito aduen-  
rit. Sunt autè causæ prægressæ, casus ab alto, col-  
lissio, iracundia, exclamatio, atque alie id genus.  
Contingit quoque interdum vasa disrumpi, vbi non  
præmissa lenitate pulmonis per præcedentes  
exclamaciones, vellemeter abiquis exclamare cõ-  
tendit. Ad hæc, nulla extrinsecus manifesta ad-  
ueniente causa, sanguis ab undantia potest in  
pulmone vas rumpere, si minime extendi possit  
aut ob frigus à vicinis contractum, aut ob innatam  
temperiem. At verò vbi oscula referantur vena-  
rum, calidæ præcedunt semper dispositiones.  
Quæ verò eroso vase abiquo autum accidit san-  
guinis evacuationes, eas præcedere solent exigua  
spuria, ac resque in pulmonem fluxiones à capite. No-  
tinnæ verò & pulmonis aliqua pars, aut crustula  
fimal effertur videtur. Distinguitur autè vlcus pul-  
monis ab vlcere asperæ arterie: Si guttulus, tum  
ob ea quæ cum spiritu excernuntur, tum ob spiritum  
ipsius quantitate. Si quidem per vlcus pulmonis,  
plurimæ spuri reuocant: à paribus autem illis ex-  
cercatis, admodum parum excernitur. Præterea  
pulmonum vlcera non conuulsi dolor: ea verò quæ  
guttur & asperam arteriam infestant, dolorè qui-  
dem inducunt: non tamen minus vehementem.

GALENI PERGAMENI  
de locis affectis, lib. V.

## CAPVT I.

Einceptus autè symptomata quæ cordi pri-  
mario affectu, & per cõsensem accedunt,  
cõsideranda. Corrigitur innati caloris exi-

Panca cum ma-  
gna tuias expu-  
unt duplici-  
ter.

Pulmonis infla-  
matio.  
Pulmonis ery-  
sipelas.

Pulmonis intem-  
perie æqualis  
et inæqualis  
inducta.

Raptio esse va-  
sa in pulmone  
vnde deprehendit-  
demus.

Pulmonis vasa  
à quibus rum-  
pi occurrunt  
posuit.

Pulmonis vlcus  
ab vlcere asperæ  
arterie &  
fuerit, quomodo  
distingua-  
tur.

Cor innati ca-  
loris ergo.

Principia nos gubernantia.

Animal mori non potest, nisi prius cor afficiatur.

Corde temperatum esse necessarium cerebro & hepati: non autem horum, illa. Lactia nec mori, nec senti, nec alii.

Respirationi quae confertur.

Moritur enim quia potest et rationem grauem & voluptatem immittit, atque etiam malitiam. Magnitudo vero ob multum animi perturbationem facit eum vagari.

Syncope dicitur.

Repente mori quod, dicitur. Palpatione cordis.

Corde volens nisi ad rationem respiciat perit animal.

sit fons & origo: quemadmodum sensus & motus, cerebri: ac hepar denique facultatis nutritoria: quibus sanè tribus principibus animal gubernatur. Ceterum animal omnino mori non potest, nisi prius ipsum cor afficiatur: ad cuius intemperantiam immodica mors necessarii sequitur. Si quidem cum fingitur partes peculiari temperie cordis suas actiones perficiant, hac profecto pereunte, actiones quoque ipsarum perire est necessitas: ac proinde cerebri etiam & iecoris. Horum verò tempore deperdit, non oportet cordis simul actionem perire. Nam etiam sensu & motu voluntario sit destitutum animal, nec natus, veluti in laetentibus. event, nihilominus vivere ipsum posse, quod si illud permanserit, haud inficiandum est. At verò si cor respiratione priuatur, hominem illud perire est necesse. Porro ad ipsam respirationem conduci thoracis musculi, in quos nervi à cervicis medulla ori, motionis principii deferunt. Quia quidem facultate motrice, quæ à cerebro insit, musculi si priuatur (ut videre est per vehementes apoplexias) perit opus respirationis. At verò qua ratione homines per omnium spiritum, reliquis musculis omnibus, præter eos qui ad thoracem pertinent, tunc seriantibus, eadem per minorem apoplexiam, atque alios ei vicinos affectus, spirare possunt. Verum per vehementes superni principii lachiones, tota spiratio resoluitur: unde cordis quoque temperie corrumpitur, peritque necessarii animal. Ex iecoris etiam affectu mori aliquando contingit, alia tamen ratione, ætrophia videlicet. Quare in huiusmodi affectibus, vira potest longius produci. Mori etiam contingit nonnullos ob synocam vitio stomachi orti, ac vehementem dolorem, & timorem grauem, ac denique volapratem immensam. Enim quidem virale robur infirmum est, animi vero affectiones, ob imperitiam, fortes, iis facile animi substantia resoluitur. Atque horum aliqui etiam ob mæstiam perierunt: sed non illic. At vir magnanimus, ob nullam animi perturbationem vix succubuit. Proprio autem affectu laborare contingit cor, vel ob simplicem intemperiem, siue inæqualis, siue æqualis ea fuerit: vel ob inflammationem, vel erysipelas, idque dum fieri incipit. Nam illic, antequam augerentur huiusmodi affectus, animal ipsum corripitur. Quos sanè affectus cardiaca sequitur syncope: quemadmodum stomachica eos, qui os ventriculi afficiunt. Hæ tamen etiam consensiente corde accidunt. Igitur exiguae quidem cordis intemperantiae, pulsus arteriarum, pro sua quoque natura, variant: maiores verò, per proprias quidem similitudinem partium intemperies, subita mortem non inducunt: per eas autem quæ ad partes instrumentales pertinent, subito enecare possunt, sed præcedentibus signis quibusdam, quorum vnum ab Hippocrate est dictum: Qui sepe & multum exoluntur sine causa manifesta, huiusmodi moriuntur. Est præterea & alius affectus, palpatione videlicet cordis, aut per se eveniens, aut cum suspitione quadam, quod in humore cor ipsum moueatur. Inflammato autem manifeste corde gladiatores vidimus, haud aliter quæ qui syncope cardiacæ pereunt, obisse. Si ad ventrem cordis, præcipueque sinistram, aliquando penetraverit vul-

nus, proinus cum multo sanguine vitam exhalabit animal. Si verò non ad ventrem vix pertingat, sed in cordis substantia consistat vulnus, ex ira affectus aliqui, non solum es die qua vulnerati fuerunt, sed sequenti quoque nocte poterunt vivere: qui oborta deinde inflammatione fuerunt extincti. Ceterum quando vixerit, mentis compositi in ventri sunt. Vnde evidens testimonium sumere potest ea facta, quæ negat rationalem animam vim, in corde consistere. Palpatione autem visceris huius, plurimis per integram valetudinem accidere est visa: quos omnes detractio sanguinis inuulsi, vna cum extenuante victu & medicinarum ratione. Eorum tamen qui affecti fuerunt, nullus ad senectutem pervenit. Panniculus ambiens cor quomodoque affectus, nulli affert periculum, nisi ipso inflammatione affecto, cor consortii lege afficiatur. Porro supercalfacit cor, spirationem efficit magnam, densam & celerem: calidumque semper spiritum refert. Contra refrigerat, exiguum reddit spirationem, & raram.

#### CAPUT II.

Similiter etiam thorax (proprium ipsius respirationis organum) aut primario, aut per consensum afficitur: à cuius quidem affectibus necessarii respiratio vitatur. Igitur ubi doloris affectus infestatur, exiguum densumque reddit spirationem: id quod etiam vicinis partibus, & his quoque simul mouentur affectis soler accidere. Quippe interdum lachitur respiratio, thorace non laborante proprio aliquo affectu, sed vel nervo aliquo orto à spina, vel spina ipsa affecta. Eorum verò affectuum qui proprio ad thoracem pertinent, quidam in ipsius musculis, quidam in membrana costas succingente consistunt. Igitur intercostales musculi, qui in ima parte consistunt, grauiori quæ externi dolore ob inflammationes cruciantur: facileque membranae subditæ suam affectionem comunicant: quemadmodum ubi ipsa primario aliquando affectu infestatur, intercostalium musculorum partes internæ, similiter ei condolent. Verum exquisita pleuritis sit, ubi succingens costas membrana primario affectu laborat. Proinde dolor, vel ad iugulum, vel ad præcordia potest extendi: ad iugulum quidem, superioribus eius partibus: ad præcordia verò, inferioribus inflamatis. Vehemens quoque febris, huiusmodi inflammatione sequitur: quia frides affecta & parum distat à corde, & cum panniculo involuente ipsum, ac sepro transiit, cognationem habet. Jam verò inflammationi intercostales musculi, minus: cingens verò membrana, magis & tendit, & induratur arteria. At in præipue pneumonia, nulla apparet talis durities. Porro effusa in vacuitatem thoracis sanies, in asperas pulmonis arterias recipit: ac dein per tussim excreta, naturæ humanis qui peperit inflammatione, declarat. Enim si bilis ab vndat, pallidus aut flauus: si atra bilis, nigris: si pituita, spumosa, & candida: si sanguis, rubrum spiritum reiciunt. Quod verò ex thoracis capaciore aliquo expuat, hinc liquet manifestissime: quod si per vulnus thoracis penetrans, aqua multa infundat, moxque tussim deo expuatur, æger vel ex sapore multum esse deprehendit. Præterea in eo ipso spacio, quod inter pulmonem

Rationalis animæ vim consistit in corde.

Palpationem cordis conduci solent vnde, tanquam vultus, et mollescit ratio.

Cor incalescit respirationem, quali dat spiritum.

Thorax proprium respirationis organum. Thorax dicitur cuiusdam ditionis esse respirationem.

Pleuritis equivalet quodammodo pleuritis, quæ ad iugum symmetice.

Spiratorum diffinitione, per vnde etiam huiusmodi præcedentibus.



atq; thoracem est, purulenti & pus continere, & ipsum rursus deo expuere, haud obfcure cernitur. Nec verò defendi potest, sanguinem in ea vena quæ circa spinâ est, contentû, regurgitare ad cor, vnde ad pulmones feratur: quod ex Erasistrati sermone colligitur. Nâ e contrario, vena hæc, à dextra cordis auricula exorta, sanguinè secû defect, qui omnibus thoracis partibus, quæ circa o-  
 cto costas & inferiores cõstituit, alimentû præbeat. Etenim superiores quatuor nò ab ea, sed à vena perreptante ad iugulû, nutrimentû susci-  
 piunt. Pus itaq; in thoracis capacitate contentû, expirantis tempore in pulmonis asperas ar-  
 terias transmittitur. Si quidè respirationis actio ad ipsum thoracem pertinet, pulmone nullam pro-  
 priam habente motionè, quæpe qui per conse-  
 quentia dilatato thorace, pariter ipse attollitur: eo verò cõstricto, spongiam manibus cõpressu-  
 rum exemplo, rursus in se se efficit. Proinde tho-  
 rax vehementer cõstrictus, humore qui in vacui-  
 tate subdita cõtinetur, in asperas eius arterias cõ-  
 primitur. Nisi verò thorax admodum vehementer  
 pulmone omni ex parte compresserit, humor in  
 asperarû arteriarû ora recipi haudquaquâ poterit.

*Per in thoracis  
capacitate con-  
tinentur, respira-  
ntis tempore, in  
pulmonis as-  
peras arterias  
transmittitur.  
Pulmo nullam  
propriam ha-  
bet motionem.*

*Tussis quædam  
animalis voca-  
ta. Tussis natura-  
lis est sympto-  
ma.*

*Pleuritis in se  
parabilis sym-  
ptomata.*

*Involucrum pleuri-  
dis.*

*Pleuritis pleuri-  
tis.*

*Phrenes.  
Septum trans-  
uersum separans  
uniuscuiusq; ani-  
mæ facultatem  
ab appetitiva.*

transuersum id eõmman, vt Aristoteles succin-  
cturâ. Qui sane musculus spirationis instrumē-  
tum cum sit, nò immeritò, ita auctoratur, ipsam le-  
dit spirationè. Antea tamè q; quæ ob affectum se-  
ptum delirer, frequenter atq; exiguum: infestante  
verò delirio, multa varietate inæqualem spiritû  
reddit. Delirare tamen solent nònulli, ob vitium  
cõsistens in ore vetriculi: sicut per febres arden-  
tes, pleuritidè, & peripneumoniam. At quæ ob se-  
ptum transuersum deliria oriuntur, non multû à  
phrenide distant. Etenim per cæterarû partium  
affectus, & per ardentem febrem, mitigari solet de-  
lirium, quoties morbus declinare videtur. Phre-  
nitidis autem propria præcipuè nota est, ne in  
declinazione quidem febri, delirium quiescere,  
cum animû non per consensum sub huiusmodi  
morbo cerebrû, sed primaria affectione laboret.  
Proinde paulatim affectus hic gignitur, nec re-  
pentè subito ve alienetur ægri, vt in aliarû partiû  
affectibus, quineti prius q; invalerecat morbus,  
præcedunt ipsum nò pauca accidentia phreni-  
ca: vt prout immensè vigiliæ, aut somnus imagi-  
nibus variis turbatus, aut deniq; rerum omniû  
quæ faciûr, ægrius quædam obliuio. Interdum  
etiam, qui phrenitici evadûr, maiori cum tumul-  
tu aut temeritate respondent, cum antea tamen  
fuerint mansueti. Atq; q; omnes, potu exiguo vi-  
vantur. Nônunq; occupat dolore infestantur. Cum  
verò ad phrenidem iam proximè accedunt, oc-  
culi evadunt eis vehementer squallidi, aut ex al-  
tero ipsorum acris lachryma effunditur, ac dein  
lippitudo innarat, & venæ intumescunt sangui-  
ne, sanguisq; stillat à naribus: quo tempore ni-  
hil quod exactè ad prudentiâ pertineat, respon-  
dent, & floccos vellunt, & festucas carpunt, atq;  
aridiori febrî, cui non ira magnæ in alteram  
partem mirationis accedunt, torquẽtur. Ad hæc  
lingua quocq; illis aspera est, nònulliq; auditu sal-  
luntur, atq; interdum iacēt cogitabundi. Quin-  
etiam in dispositione dolensica affectû, vel acius  
premente aliquo, eam haudquaquâ sentiunt. Ergo  
hoc modo per cerebrî affectum, paulatim phre-  
nitis gignitur. Ab aliari verò partium nulla, per  
petuam delirium oriri potest, dempro solo septo  
transuerso, cuius vitio excitatû delirium, parum  
à continuo distat: à phrenide tamen distingui-  
tur, & ex sympto matris, & ex sanguinis destilla-  
tione à naribus, ex ipsaq; spirationis specie. Si  
quidè spiratio phrenin cori est magna, & ex lon-  
gis facta intervallis: inæqualis verò, vbi à septo  
delirium oritur. Cæteri præcordia revelli, sepi  
transuersi illic ab iniurio affectû, propriis indicîis  
est: quod affecto cerebro, postius accidir, vi-  
delicet non incipiente affectû, fed vbi formatus  
iam fuerit. Calor quocq; circa caput & faciem, ve  
hemētior est eis, qui ob cerebrî vitium delirant.

*Deliria quibus  
re causâ orian-  
tur.*

*Deliria ex se-  
pto transverso  
ortum, multum  
à phrenide  
distant.*

*Phrenitidis no-  
ta præcipua  
quæ.*

*Phrenitidem  
præcedunt  
symptomata.*

*Phrenitidis illi  
infusum sym-  
ptomata.*

*Delirium natu-  
ram propriam,  
excipit phreni-  
tis, & quod  
oritur à septo  
transverso.*

*Delirium à se-  
pto transverso  
ortum, quando  
de phrenide  
distingua-  
tur.*

*Onychophaga.  
Stomatibus.  
Gula rursus de-  
plex.*

*Gula est tuni-  
ca duplici sine  
data.*

## CAPVT III.

Terminû quo thoracis pars inferior finitur, antiqui phrenas vocarû, fortè quia eo inflama-  
 to mens læditur. At Plato ipsum sepi appellat,  
 quod trasibitum animi fasciat, quæ in corde  
 est, ab appetitiva, cuius sedes est in iecinore, di-  
 stingat, separatq;. Cæteri recentiores septum

Illius partis quæ inter fauces & os vetriculi  
 media est, & quæ cæpi plagus, stomachus, & gu-  
 la dicitur, duplex est vius. Vnus, q; veluti via fit  
 eorû quæ devorantur alter, q; circa vtriusq; pro-  
 gressum, ram devoratorû, q; eorû quæ à vetricu-  
 lo in os reuoluntur, aliquid moliri videatur. Nâ  
 quæ geminæ insunt ei tunice, altera ad cibi potiq;  
 deglutationè virtut: altera ad eam, quæ vomèdo



cul nō pateat exitus, illic concludatur, nō solum grauius, sed rēsonis quoq; sensus sequetur. Meminisse autem oportet, octo numero musculos per abdomen regionem extendi, quatuor comprehensos conligationibus. Quarū prima ex musculis constat rectis, per totū carnes, à pectore ad pubis ossa protensis. At reliquarū trium cōiugationum musculi, vsq; ad rectorū contractum, carne substantia constant: vbi verò primū illos attingerint, in membranas nerueas degenerant. Horum itaq; musculorū cōiugatio vna, quæ qui dem reliquis est exterior, à thorace obliqua deducitur, in anteriores partes descendens. Altera huic opposita, ab infernis exorta partibus, obliqua ad anteriores ascendit. Huic tertia musculo rum cōiugatio o subiciitur, qui transuersum habet positiū, atq; peritonæo innectuntur. Rectorū igitur musculorū tumores præter naturam, oblongi, ac per totū extensi vidētur: quæpropter haud obscura est ipsorum dignotio, si cū & eorū qui obliqui à thorace descendunt. At multo difficilior est nominā musculorum, qui iis sunt subsiecti difficillima verò transuersorū. Cū igitur iecur sub peritonæo à tribus ex illis musculis contegatur, fieri nō potest vt tactus aliquam ipsius notitiam præstet, nisi vel magna in ipso inflammatio ornatur, vel incumbentes ei musculi admodum extentiuentur. Iecur ramen declarant affici, in dextera præcordia rum parte grauias, dolor totq; præcordia retrahens, atq; ipsius ad iugulum vsq; extensio: exigua iussis, linguæ color, in primis quidem ruber, deinde verò niger: ingens cibi fastidium, inexpressibilibs sitis, vomitus rum syncera bilis, rum eius quæ uonrū luteis assimilatur: quæ aliquando xruiginis quoq; colorē refert. Alius quoq; astrigitur, nisi vni cum visceris huius imbecillitate, inflammatio ipsa acciderit. Erysipela ta accidentia his ferè similia sunt. Sed insuper febris quoq; cum vehementissima sin, laborantes cruciat. Etenim iecoris ac ventriculi flammens dispositio nibus, ar dentes febres solent superuenire: quas etiam excitari continget in pulmonis inflammatione participare erysipelatis. quæ admodum etiā per vniuersum corpus, ob putredinem biliosorū humorū immodice effluuiscuntū. Verū quæ aut iecoris aut vtriculi occasione eueniunt, ex febres omnū sunt veliementissims, ac magna ex parte in marasmū degenerat. Quæ in sinis iecoris partibus eueniūt inflammationes, vt magis, q̃ illæ quæ in eius gibbo sūt, fastidii, nau seam, vomitū biliosum, ac sitim ingentem inducunt: sic è cōtrario hæ, maiori q̃ illæ inier spirandum dolore laborantē insistant, magisq; tusum excitant, atq; dolorem vsq; ad dextrū iugulum, adeo vt detrahi videatur, extendunt. Vniq; autē parti, cūm dolor adest, nōnūq; uothæ colicæ cōsentunt. Soli verò iecinori est proprium, vt tumoris cumulum cōprehensum habeat circumscri ptum. Quare durus in ipso circa principium tu mor (quem scirrhum vocant) multo euidentius eo durtiem dignosci potest, quā in inflamma tio. At vbi tractū temporis, q̃ vis magis incre scat scirrhus, nō tamen aquæ facile deprehendi tur, Intercipiente scilicet indicium aqua inter cutem, quæ & illic scirrhum sequi consuevit, & nisi

afficiatur hepar, signi minimè potest. Non tamē semper ob primariam excitatā affectionem il lus, est hoc frequētissimè accidit. Etenim quia hepar facultatis sanguificatricis est instrumen tum: consequens est, vt ipso vniato, actio quoq; eius vniatur. Accidit tamē interdū, vt ob intem periem alicuius partisculæ, earū quæ aurper me sœraicas, aut eam venam, cum illo cōmercium habent, ipsū quoq; refrigeretur. Porro si marū partiū venæ, ab ea quæ in porta est, exortæ, in tenuissimas extremitates finiuntur, ad quem simi liter locū, aliæ quoq; venarū extremitates, à con caua vena in gibbas viscens partes distributur, perueniunt. Cibus igitur vniuerso corpori distri butus, ex omnibus si marū partiū venis exiens, ad gibbas partes per dictas extremitates transfa mirur. In qua quidem venularū conspiratione, nōnulli fieri obstructiōnes existimant. Ergo ob refrigerationē iecinoris, in sanguinem mutari ci bus non potest, refrigeranturq; cum illo tonus corporis venæ. Sæpe numero etiam, nullo tuore apparente in iecinore, æger aqua inter cutem corripitur, vel ob vitium lenis, vel ienni, vel al li cuius intestini tenuioris, aut mesenterij, aut pul monis, aut renū, aut ob immodicū hæmorrhoi dum, aut mensium profusum, aut ob suppresio nem mēstruorū, aut ob alium vteri momenta neum affectum. Ex intempestiua præterea frigi dæ potatione iecur affam refrigeratū, statim a quā inter cutem iuducit. Ac sic afficit, vehemen ti ciborum desiderio tenetur, quod solent om nes quibus os vetriculi fuerit perfrigeratum.

## CAPVT VII.

Porro vtrū semper in morbo regio locus asse ctus sit hepar, an alia præterea dispositio hūc as seclum efficere possit, deinceps considerandum. Siquidem videmus nonnūq; iecinore haud ma le affecto, per morbi iudicationem effundū palli dam bilem per vniuersam cutem. Quinetis citra morbi iudicationē interdū alena quadam cor ruptione, qualis ob ferarum morsum contingit, quondam sanguis in bilem mutatur. Fieri aut potest, vt iecinoris naturali tēperie mutata, humo res huiusmodi vitio afficiantur, & quidem citra obstructiōnē, aut inflammationē, aut scirrū. Ob splenis quoq; vitia, corporis color vitatur, sed multo nigrior fit, q̃ ob affectum hepar. Cū igitur sanguinis generatio hepatis munus existat, nullā sanē aliā causam huiusce generationis di cemus esse, à facultate ipsius visceris propria. Cæterum omniū facultatū essentia, in peculiaribus partum temperaturis consistit. Proinde si hepar ad aliquē octo intemperamentarum aliquādo la babur, accidet facultati ipsius noxa, quæ peculia riter illi intemperantæ debetur. Igitur calide iecinoris intemperantie, cūm cōtēntos in ipso hu mores, rum eos qui suggerūt per mesenterij ve nas, ad vtrū & asanæ frigidæ autē, succos iam in ipso cōtēntos, etasos, ad fluxumq; contumaces efficiunt. Quod verò ad ipsum suggerunt, pluri tumus, crudū & semicōctū reddunt. Rursum aride intemperantie, siciores crassioresq; humi dæ verò tenuiores, aquosioresq; humores effi ciunt. Igitur cum aliu sedumina, aquq; in qua nuper macerata carnes fuerint ablutæ, similia videtis,

Hydrops gignit non potest, nisi afficiatur hep ar.

Hepar est san guificatiōnis prin cipium.

Venerum hepa to explantus tio.

Hydrops cau di dicitur.

Cibi desiderii vehemens in cōstet, quibus os vetriculi fuerit perfrige ratum.

Sæpius quādo in bitem ma iatur.

Calor corporis quæ modis ro tati possit.

Lenis, quā in hepate, vena, agnoscere in lo rem reddunt. Efficitur facul tatem in pro priis partium temperaturis in consistit. Hepar intem perantiarū su gūit quæ effi ciliū testatur.

Lenius afflic to quā excre menta exor iantur.

Abdominis in ch mēstis, quatuor cōpre hensū cōiugatio numbus.

Iecur siue.

Iecur inflama tum quæ cutis vna.

Hepar erysipe lati afflicti ac cidentia.

Iecur arden te à vetriculo te in marasmū sūp de generant. Iecur hepatis inflamatū quæ efficit sympto mata.

Gibbus hepatis inflamatū quæ symptoma ta or iantur.

Hepar febrile inflamatū quæ hydrops co iungit.

Hepaticae he-  
morre quae di-  
cuntur.

Calidas inter-  
peries nunquam  
comitatur cibi  
cupidas,  
facilitatem  
retentis qua-  
vis inesse san-  
guinis inestem-  
poris partibus.

Facilitas san-  
guinis in hepate,  
qua signa indi-  
cant.  
Signa alimnis  
dicitur, quod  
ab eo proficiat  
tor sanguinem  
a causa.

Partes aliquae  
per hepatis  
de per hepatis.

Particula om-  
ni aqua san-  
guinis propterea  
rem tempera-  
mentis.

leat esse affectu exstimalis. Non nominatur autem  
praecipue hepaticae, quae ob imbecillitatem ipsius  
deiciuntur. Vt autem tenuis excrementum & san-  
guinem referent, infirmi iecinoris iungere sangui-  
nem non valentia: ita id quod limulatur facit, su-  
perflans sanguinem hepatis est indicium. At  
verò nonnulli primo quidem saniem, & cruenta  
quedam: dein tractu temporis, crassum ac me-  
lancholicum sanguinem: postremo atram quocumque  
bilem, atque hinc etiam, deiciunt. Cui affectus inter-  
dum ob frigidam intemperiem, citra febrem, in-  
cipit: ac tunc quidem tenuis sanies excernitur:  
dein verò progressu temporis, corrupto in vi-  
scere sanguine, febris solet supervenire. Porro  
nonnulli eorum, qui ob frigidam intemperiem labo-  
rare in corpore, non solum non amittunt cibi cu-  
piditatem, yemumetiam multo magis quam antea ap-  
petunt. At calidas intemperies nunquam comitatur  
cibi cupiditas, sed fastidium graue, sitis vehemens,  
febris insignis, atque praeuorū humorū vomitus.  
Sciendum autem est, singulis nostri corporis parti-  
bus quatuor naturales facultates inesse: quarū  
prima appellatur attractrix, quae peculiares par-  
tes succos, alenda ipsam gratia, & appetere, & at-  
trahere potest. Altera deinde est, quae alteratrix  
dicitur, quae succus attractus, si minus evadit ei quae  
nutritur particulae. Haec aliae duae ministrant: re-  
tentrix nempe, quae suo munere fungitur, quan-  
do pars succū attractum concoquit, donec eum  
in suam ipsius naturam converterit: & expultrix,  
quae post absolutam coctionem, excernit id quod  
inutile est, atque excrementum vocatur. Si igitur  
in iecinore attractrix facultas quomodocumque  
afficiatur, cibum quem coctis ventriculus, atque  
in chylum convertit, relinquit, ut liquida ex-  
cernatur per alium. Atque hoc sanie ipsius facultas  
affecte est signum. Si quidem quicquid ab ali-  
quo proficiat, tanquam causa, id enim esse illius  
signum constat. Vbi autem hepatis integrum valet,  
mactari venis veluti quibusdam manibus, quae  
ex ventriculo ei cibum afferant, vitur. Ceterum  
vbi vel inflammatio vel erysipelas afficit iecinen-  
terium, non solum qualia per iecinoris imbecilli-  
tatem excrementa deici consueverunt, plene excer-  
nuntur, sed apparet etiam veluti ab inflammatione,  
sanies quaedam illis admixta. Vt autem non potente  
ob imbecillitatem hepatis succū a ventriculo attra-  
here, attractrix facultas afficitur: sic vbi retinere  
non valet, retentrix vis infirma putanda est: ob id  
primo quidem cruenta sanies excernitur, dein  
crassior & faeculentior. Similiter aliae quaedam ex-  
cretionis contingunt, non quidem ob imbecilli-  
ritatem, sed ob expultrix facultatis robur, ratio-  
ne plenitudinis, idque interdum per integram va-  
letudinem. Sic plerumque pars aliqua cum affecta  
est, per hepatis purgatur, vnde ipsius iam robu-  
rioribus factis. Quemadmodum autem retentrix fa-  
cultas dum imbecillior est, ac rem quae ipsam gra-  
uat, retinere non potest, vix expultrix id quod in-  
festa evacuat: sic infirma expultrix, retineri quae-  
dam res solit, facultate retentrix non visquae deo  
gravata. Nam in quolibet instrumento solita alia  
facultas vel fortior, vel imbecillior, facta rela-  
tione ad actionem. Etenim omnis particula, se-  
cundum temperamenti quod ei perpetuo inest,

agit, proprietate. Iam verò interdum etiam con-  
tingit, ut ob folliculi felis imbecillitatem, ad se bi-  
leth minime attrahere valentis, impurus vage-  
tus sanguis per vniuersum corpus, aliusque oritur  
morbi acutus spectes praeter illas, quas superius  
exposui. Qui folliculus sic etiam nonnunquam im-  
pletur, quemadmodum vrinæ vesica, aut evacuari  
non possit, aut quia obstructus est, ut quia secre-  
torum ipsius facultas est imbecillior. Veluti etiam  
cuius obstructus aut infirmus vas, quod ab ipso ex-  
tenditur in hepatis, bilis cum humore interdum  
attrahere non potest. Proinde excrementorum pro-  
prietatem in morbo regno consideranda, perquam ne-  
cessarium est. Porro quibus citra febrem morbus  
regius accidit, vrgente in dextra praecordiorum  
parte granitatis quidam sensus: in omnibus a-  
perientibus obstructiones cibi & potus, & medi-  
camentis extenuantibus, deinde medicamentis  
quod bilem ducere possit, exhibens, eorum pluri-  
mos vna die sanantur. Qui verò purgatio-  
ne liberari non possunt, in raris valentior ad  
aperiendum data ponunt, medicamentis quod  
vehementius purgaret, exhibitis, ut sub purga-  
tionis fine, caeculae magis quam flava bile cum ac-  
rimonia fecerentur. Atque in his coniecti felis  
folliculus similiter affici, ut solet vrinæ vesicae,  
vbi magna humoris copia distenditur, quam  
excernere nequit, interdum ob excretoris fa-  
cultatis imbecillitatem, interdum quod ob graue so-  
mnum, vel negotia quae premunt, ultra quam par est, vri-  
nam purgauerunt, dein ab ea prostrantur, mirum  
in modum interit. At folliculus felis, cum aue-  
tur nihil ad excretionem a facillime animalia, vni-  
cū habet imbecillitatis principium, veluti cetera  
quocumque naturalia instrumenta, a partiali intempe-  
rie ortum.

## GAL. DE LOCIS AFFECTIS LIB. VI.

### DE LOCIS AFFECTIS LIB. VI.

#### CAPIT. I.

Ilen autem, cum ex hepate sanguinem melan-  
cholicum trahit, quo ipse postea nutritur, san-  
guis si in eo facultas attractrix facta sit imbe-  
cillior, sanguis ex iecore impurus in vniuersum  
corpus transmittitur, ac prome color nigrior et  
vadit. Quinetiam exemplo hepatis, spiritum ergo  
ex se reicit excrementa quaedam: ita ut per vomitū,  
cui nausea accedit, nonnunquam excernatur melan-  
cholicus sanguis: qui interdum etiam solet per in-  
ferna descendere. At huiusmodi vacuatione sup-  
pressa, nonnulli melancholica trahunt afficiuntur,  
cibisque anidissimè concupiscunt: idque praecipue, si  
valde fuerint acida, quae excrementa ad ventricu-  
lum transferuntur. Si autem alia melancholici ha-  
moris corruptio accidat, subverti, deiciatque ap-  
petentia videbitur. Quod verò induratum ipso, aqua  
inter cutem effundi possit, consentiente iecinore,  
iam antea est dictum. Quinetiam laborante aliquando  
ob vtriusque viscere, regium morbum venire con-  
spicimus, nigrumque pro consuetudine subseque-  
te colore, ita ut videretur flava lilia esse fuliginis  
admista. Quemadmodum autem vniuersa aqua &  
frigida, si conferuntur & intempestive bibatur,  
solet aqua inter cutem inducere (nocet enim hic  
ingesta interioribus partibus, maxime verò illis, na-

Morbi regii  
causa.

Excrementis  
proprietatem  
regio morbi  
ab ipso  
trahente in-  
tra.

Lien sanguis  
alium maiorem  
choleam.

Lien vnde a-  
tu, alii  
tamen vnde  
aqua in iecore  
trahitur.

Regium morbum  
percutit.

Regium morbum  
percutit. Regium morbum  
percutit. Regium morbum  
percutit.

que

quæ tum temporis fuerint imbecilliores) sic ob refrigeratum vñ cum tumore lienem, vitupata si adit scirrhus: vel citra tumorem, vt per iam nuper dicta aquæ potione, aqua inter cutem etiam evnre conuenit. Cæterum nisi ad hepatis vñ ipsa refrigerano pervenerit, aqua inter cutē subsequi poterit munime.

## CAPVT II.

Dysenteria exquisita, intestinorū vicus existit. Qui sanæ affectus, non gignitur astatim, aut subito, vt ille quem vitio hepatis accidere diximus: sed protinus quidem ab ipsius initio, bilis mor-dax excernitur, quæ deinde interaneorum abra-siones sequitur: postea verò paulum cruoris deici simul videtur, quando videlicet ipse affectus tā esse dysenteria censetur. Cum itaq; huiusmodi abrasiones solæ excernuntur, cōsiderandum eū, num pingue quippiam simul cum eis deiciatur: ita enim vicus in crassius intestinis consistere, exi-stimandum est. Vbi verò cruorem quoq; excerni videris, intueri oportet, vtrum in reliquis excre-mentis adeo permixtus sit, vt vniuersus vniuer-sa misceatur, an pars eius aliqua reliquis super-naret. Etenim si admixtus sit, in superiobus: si verò supernaret, in humilioribus intestinis vicus esse portendit. Idem etiam & in abrasis excre-mentis videre est, verum non ita manifeste, vt in cruore. Similiter crustula, quodmā intestinum sit viceratū declarat, tum ex essentie proprietate, tum ex modo, quo vel miceri reliquis excremen-tis, vel vni eorū parti supernatare videntur. Nec verò mediocriter cōducit ad curationē, nosse ia quā intestinorū parte consistat vicus. Nam si in

Sæpenumero vel vtri circuire videtur dolor, mo-dō hanc, modō illam partem infestans. Nephritici verò dolores eodem in loco stabiles, inestāt iugiter. Cum itaq; dolor in loco fuerit alnore re-nibus, manifestum colicæ indicium portendit: si verò circa sedem renum infestet, vrinæ conside-rande sunt. Nam nephritici ab initio diluata pu-ras reddunt vrinæ: dein sequentibus diebus, crassum aliquid in ipsis subsidere videtur: demū arenose minguntur. At in colicæ, si quid ab alio deicitur, id stansum quodammodo est, & sæ-penumero aquæ supernatare consuevit, similem habens bubulo stercorei consistentiam. Queniam cruciatus colici, quæ nephritici, multo magis lenientibus mitigantur dysenteribus. Atq; interdum evenit, vt frigido aliquo humore simul ex-cito, illico quiescant. Quare ipsam prædictā miti-gans, erit etiam curatio atq; prognostici. Nephritici enim dolores, cum vrina exente lapide, simul & solvantur, & locū affectum indicant. Vt autē persecerant dolore vtraq; pars eisdem auxiliis indiget, sic tempore sublequenti ad præ-servationem oportet diuersa præidia adhibere. Cum autem omnia intestina ordine quodam à ventriculo ipso descendant, atq; omnium supre-mum, ieiunum sit: deinde, quod tenax vocatur: postea cæcum, quod vñ ad infernas partes ex-tenditur: deinde colon, quod ad superiores rever-titur partes, ita vt sæpenumero hepatis & lienem attingat, satis mirari non possum, quo pacto ve-hementissimos quoq; dolores, quæcumq; in par-te consistant, ab omnibus colo tribuantur. Igitur ob frigidum crassumq; aut etiam humorē vici-dum, aut ob statulentū spiritū, in corpore crasso densiq; alicuius intestini inferioris genitum, sed egressi nequeunt, excitari dolor consuevit: ve-hemens quidem, ob intemperiem atq; tensionē corporū in quibus hæret impactus: longus ve-rò, quia difficiliter vacuatur. Ad dolor dīe acer-bissimas, quem ileon, voluulum & chordapion vocant, sublimiores intestinorū partes infestāt, adeoq; impellit ad vomitum, vt nonnulli steruas per os redditæ, miserrima tandem morte mori-antur. A quo affectu vix aliquis vniquam eva-dere potuit. Itaq; nō ab re visum est medicis anti- quioribus, vel ab inflammatione, vel ab obstru-ctione arida stercorei, omni huiusmodi tenuis in testinorū affectū. Sunt & alia symptomata, quæ & intestinis & ventriculo simul affectis evenire creduntur: vt quas lenterias colicæ nominant, vbi materis ipse minimè mordaces existit. Ete-nim vt mordaces ob mordendi vim omnia inte-stina ad excitationē excitant, sic nō mordaces, in testinorū imbecillitate sequuntur: quia retinere contenta ne exiguo quidem tempore possunt.

## CAPVT III.

Igitur si nephritis repente incidat, lapide nota ru digno, vel in renū aliquo, vel in vteris etiā impacto, dolorem excitabit haud absimilem co-lico: verum distinguetur ab eo, per illa quæ in ca-pite præcedenti accidere cō affecto diximus. Vbi verò ex iis quæ in vrinis resident, aut ex la-pide excreto, discerni ipsi dolores possunt, quæ-tioni nullus locus relinquitur. Porro vbi dolor alterius renis, cum horrore inordinato & vario,

Nephriticorum  
vrina qualis.

Calicæ excremen-  
ta qualia.

Intestinorum  
ordo.

Dolor colicæ.

Ileum.  
Voluulum.  
Chordapion.

Voluulo labo-  
rans vni ali-  
quam crassissi-  
mam colicæ.

Lenterias en-  
tericæ.

Aquæ inter cu-  
tem potio, ad he-  
par refrigeratio-  
nem pervenire.  
Dysenteria est  
vici intestini  
vici.  
Dysenteria  
crassa.

Humiliorum  
quæ nam ex-  
creta sunt,  
crassiora, an  
tenuia, ab ex-  
crementis dis-  
tinguntur.

Intestinum supre-  
mum ex vici-  
tate apud medi-  
camentis fac-  
torem super  
latum, per  
dysenteria cau-  
sam.  
Hepaticum su-  
perioris & dysen-  
teris quomodo  
distingueret o-  
portet.

Tumores dysen-  
teris.

Calicæ doloris  
nephriticorum;  
vici prævi-  
sionem se-  
re molendi ra-  
tione desiderat.

Calicæ doloris  
à nephriticis  
quomodo di-  
stinguntur.

*Nephriticum de  
lar cũ horrete  
inordinato, ac  
febre cũ inor-  
dinata affligit,  
quando ab his  
signis.*

*Renis cecitas  
in indicia.*

*Caruncula cũ  
vrina cecitas  
efficacissima  
vicerarum  
renum fuit no-  
ta. Pñs similita re-  
crementa, ac  
vritu cor-  
rumpit, in vena  
fuit.*

*Diabetes  
Depressum.*

*Vesica non tra-  
hit à renibus.  
Infectio non  
trahit à ven-  
triculo.  
Diabetes causa  
est imbecillitas  
renum.*

*Appetentia ca-  
nina.*

*Appetentia ci-  
bi esse animalis  
signum.*

necnon inordinata febre affligit, si per primum decubitus argi in alterum latus permuto non, in ipso rene dolente suspensum cuiusdam pōderis sensum æger percipiat, abscissum iam cōcretum esse coniicere oportet. Quo concocto, pua mictum vi laborantem à dolore liberat, sic viceris in rene periculum avertit: quod nisi tūc cicatrice inducatur, æger curationē recipiet. At per seuerantis viceris notæ ex vrina haud obscurè deprehenduntur. Adde quod laboratē creberrimè in affecto rene dolorem sentit: atq; interdum cum vrina exiguum pua velut ab viceris excernitur. Similiter ramentū nonnunq; cum vrina excerni videtur: atq; interim sanguis quoq; qui erosi iam viceris est indicium. Quamq; rupto aut referato aliquo vase, sanguis potest etiam profluere. Verum efficacissima exviceratorū renum est cōiectura, si exiguae quardam carunculae cum vrina excernantur: utpote quas renum essentia partes, easq; ob velimentē viceris erosionē à vallis esse constat. At quæ vni cum lotio excernuntur pñs similia, probabilis mihi visum est, ea in venis, q̃ in renum capacitate, gigni: idiq; ex crassa lentaq; materia, quam calor calcit excoquit: cuius sane affectionis per diuretica sperari curationem fururam, nec vnq; spes me fecerit. Iam vesica, vbi longo tempore acres per ipsam vrinas transseunt, viceribus affligi solet. Est et alius renū affectus, quo tenuis sanies sanguinis mingitur: cuius quidem existit causa, aut ipsorum imbecillitas renū, aut maxima relaxatio eorum meatuū, per quos ex vena caua in renes percolar vrina. Atq; ad renes quoq; pertinere in affectus videtur, quem alij melleæ hydropem, alij profluvium vrinae, alij diabetem, alij dyspnoeam vocant: qui certè transmissi accidit. Quo morbo affecti, inexplēbili sin vexantur. Quare & exuberanter bibunt: & reddunt totum id quod biberūt, minime à sua qualitate mutati. Hic igitur renū vesicæq; affectus, similis est lequirati ventriculi, intestinorumq;. Igitur vt ex ventriculo iecur per mesenterij venas, veluti arbores à terra per radices, alimentum ad sese trahit: sic etiam renes sibi quicquid in venis est aquosum, alliciunt. Ceterū vesica non trahit à renibus: quemadmodū neq; intestina à ventriculo: sed renes quidem per vretas excernendo in vesicam mittunt: ventriculus autē in ieiunū, per intestinū ab Herophilo dictū dodecadactylum. Proinde diabetica causa, renū imbecillitas, nō potentum diutius connere vrinam, censenda est. Verumenimvero obicit aliquis si imbecilli sint renes, qui sicut potest, vt vrinam ad sese tantē celeriter attrahant? Cui quidem respondere licebit: quemadmodum canina appetentia, in ventriculi ore consistens, nō potēte ipso sustinere pondus devoratorū, multa impetuose ingerere, eademq; celeriter excernere cogit: sic in renibus etiam serosi humoris cupiditatem, vni cum virum imbecillitate accideret. Vnde & humiditas affatim trahere, & eam mox in vesicam pellere, ipsi renes coguntur. Quod autē vrinae fluore repente evnere possit, leuitas intestinorum nō possit, veluti nec canina appetentia: ob id sit, quia cupiditas quo cibum appetit venter, animalis officium existit, quo citra sensum nostrū fungi ne-

quaq; potest. Renum verò desiderium est naturale, neq; ab ipso sensu nostri afficiuntur. Proinde cum ad statū pervenit, ne sensum quidem mouet, quemadmodū appetentia canina. Porro laborantes velimentē sint, quatuor accidentiū discernit à potione subire solent. Vni, & quidem primū, vomitus est: alter, velox per alui excretionē, aut fluore, aut laxitate intestinorū: tertium, quod potus diuina quā par est, in ventriculo manet: quartū deniq; est diabetē, siue vrinae profluvium. Occurrit interdum affectus alius diabeti similissimus, & quidem ob ciborum multitudine, qui nec crudi permanent, nec deiciuntur per alium, nec plenitudinem gignunt, nec etiam probe alere possunt, sed discutiuntur, dissipanturq;. Cuius vt crebrior est, quā dyspnoeae, eventus, ita faciliore curationē admittit. Quippe si prius quā ad summū pervenerit, ipsum cognoveris, haud ita difficulter curabitur. Atq; is affectus, à celeri dissipatione ortum ducit, omnibus partibus attrahitur, appetitricemq; facultatē seruantiū. At verò ingentia sint, quæ citra diabetem accidunt, causa est ventriculus, aut calida, aut frigida, aut vtriusq; intemperie laborans: maximè verò os ipsius: proxime ventriculo hepar, sed maximè pars eius sima, simul infamatis mellea viscus venas, & ieiuno, & ventriculo, atq; cum gula, pulmone. Quarum partium incendium marcor vt plurimū comitatur. Diabete itaq; proprius renum affectus existit, qui caninæ in ore ventriculi appetentia proportionē respōdet, accedente præterea retentis facultatē imbecillitate.

## CAPVT IIII

Vesicæ supervenient symptomata, partim cōmutata externa, veluti omnes ipsius præter naturæ tumores, dolores, & quæ hos gignunt dispositiones: partim ipsi propria, vt ichuria, hoc est, vrinae retentio: stranguaria, hoc est, stillicidium vrinae, præterea immoderata vrinae profusio. Quæ quidem evacuationes vesicæ cum meatu vrinarum, ipsa haudquaquā affecta. At verò stillicidium vrinae, si ob vrinae acrimoniā fiat, symptoma vesicæ est, affectus verò minimè. Si verò aut ab vesicæ, aut ab imbecillitate procedat, in vesicæ affectu consistit. Ceterum cum ab intemperie vesicae sit imbecillior, propria ipsius actio laeditur, quæ est vrinae excretio: ad quā animal excitari solet, cum vel à multitudine contentæ in ipsa materie vesica grauetur, vel à mordacitate convellitur. Quin etiam instrumentales affectus interdum imbecillitatem inducere possunt: præterea omnes intemperie nix, præcipueq; illæ, quæ sæpe nōnulla eveniunt, cum frigore corripiuntur. Ad hæc, ichuriae symptoma supervenire solet vesicæ, tanquā meendi instrumenti in terdū quidē, cum circa id quod in ea continetur, contrahi nō potest, vt ipsum exprimat: interdum etiam, obstructo inferiori meatu aut à crassas humoribus, aut à lapide impacto. Atq; accidit nonnunq; vel ab infirmatione, vel ab alio id genus tumore, vt angustior reddatur meatu, vel etiam omnino obstructur. Sciendum autē est, nō vesicæ, sed meendi munus, veluti etiam deicendi, nō intestinorum officium, pendere à volūtatis imperio. Quippe vesicæ officium vnicum est, cōtractio. At musculus qui

*Sicimen vultu  
mentis, quatuor  
accidentia  
tunc defuncti  
à potione subire  
possunt.*

*Sitis ingenti  
causa.*

*Diabetes pro-  
prio renum  
affectu est.*

*Ichuria.  
Stranguaria.*

*Stillicidium vrinae  
quod sit symptoma  
vesicæ, & quando est  
fictum cum proprio  
affectu.*

*Meendi munus  
non esse vesicæ,  
pendere à volūtatis  
imperio. Deicendi munus  
nō intestinorum  
est, sed voluntatis  
imperio.*

vrinae



vrinæ meatum in circuitu ambit, in origine ceruicia vesicæ positus, instrumentum est, cuius opus ab electione excitatur. Simile quoque & actio nem & usum habet musculus, qui restu intestini partem extremam ambit: prout de ipsius resolutione, neque vrinam vesica, neque alium stercora, retinere potest. Præter voluntatem, & vitæ paulatim effluunt. Quare suppressio vrinæ fieri nequit ob affectum spinæ, aut nervorum ab illa in dictos musculos exortorum (quod nonnulli putarant, 10 credentes vesicæ officium à voluntate pendere) sed ipsius involuntaria excretio. Atqui ut nonnulli tum vrinarum, tum excrementorum alui deiectionem totam ab electione procedere existimantes, hallucinant sunt: sic rursus alij, his è diuerso totum hoc opus naturale putantes, ab loco aberrant. Et enim cibi à ventriculo in reituum transmissio, tota nature opus est: voluntas autem, extensio digiti. Alui deiectio, & vrinæ redditio, vitro que instrumento propriis suis 10 facultatibus operante, perficitur. Rectum enim intestinum, atque vesica, naturali facultate vrinæ: musculi verò, ea que animalis & voluntaria vocatur. Quippe musculi qui solent cohibere fluores, ab opere requiescent, abdominis musculis munere suo fungentibus: maxime verò medus. Quum igitur vesicæ corpus ita fuerit affectum, ut quod in ea continetur exprimere nequeat, vrina supprimitur, vocaturque symptoma id ischuria. Accidit etiam interdum, propter ipsius 30 sensum obfusum, ut non reddatur vrina, citra tamen expultricis facultatis lesionem: umirum si proprii vesicæ nervi afficiantur, nervus musculi ceruicem eius contrahentis, munere suo fungentibus. Qui quidem si resoluatur, vrina præter voluntatem excreatur. Ob spinæ etiam luxationem ad interiora, supprimit aliquando vrina confusis: orta videlicet phlegmonem in affecta particula. Quemadmodum vertebis ad externas partes luxatis, in vitro vrinam profluere videmus, ob resolutum neruum musculi vesicam ipsam claudentes. Retenta enim longo tempore vrina, vel ob somnum diurnum, vel ob negotia virginitas, ipsa vesica extenditur, atque vrina supprimitur, contractrice facultate propter tensionem immodicam læsa. Præterea ob sanguinum & pus crassiusculum, interdum retinetur vrina. In pueris etiam, quos lapis in vesica cruciabat, vidimus sæpeumicro ipsam vrinam supprimiti. Eos itaque, resupino figurato corpore, adeo concubimus, ut à meatu lapsi dimoveretur. Ceterum grumos vocatos, non solum eos qui in vesica, sed multo magis illos quoque qui in intestinis, ventriculo, atque thorace nonnulli continentur, animi defectio, & color pallidus se qui solet: pulsus verò parvus, obscurus, & frequens apparet: laboransque ipse, cum auxierit resoluatur. Sunt autem ad intentionem affecte sedis, non solum presentia symptomata, sed præterita etiam investiganda. Nonnulli enim confert quantitatatem puris (si quando excreatur) & misuram eius cum vrina, considerare. Nam si pus cum lotio exacte permistum sit, à supernis alacunde partibus effluit. Si verò sine vrina excreatur, in vesica consistit suppurationem indi-

cat. Sed quod medium inter hæc conditionem seruauerit, id à renibus descendisse, certum indicium est. Similiter expendendum est, si rupta vomica, cum nouis affectibus loci, viceris aliquod quoque signum appareat. Nam & hoc, aut exacte, aut mediocriter, aut omnino nihil cum vrina miscetur. Atque vocatur quidam ramentum, viceris: essentie verò, proprietas, affectus partis proprii in duci est. Quippe partes à vesica a vuluæ, lamina: à renibus, sunt carunculis similes. Similiter vbi ex sublimioribus pars aliqua affecta est, excrementa cum vrinis excreta intuentur, & ea suspèctum partium essentie cõparare oportet. Igitur cum vrina expurgatur gubbi hepatis partes, atque omnes quot quot huius superiores existunt per alium verò pars iecinoris sima, intestina, ventriculus, lien. Præter hæc alie quedam sunt purgationes, sed rarior: ut quæ thoracis & pulmo per alium purgatur: que sub septo transierit sunt portæ: partes, per vrinæ. Vidimus etiam nos pulmonis vomica expurgari similiter per vrinam: reiecto videlicet pure, à pulmone quidem per leuem arteriam, in sinistram cordis ventriculum: à corde autem, per arteriam magnam, ad renes: atque illine tandem per vtreas ad vesicam. Et enim ut à concaua vena, ita ex magna arteria, rami ad renes descendunt.

## CAPUT V.

Vteri affectuum plurimè differentie existunt. Siquidem mulierum que hysterice dispositionis corripuntur, alie quidem sine sensu immobiles iacent, cum ob obscuro paruoque pulsu, vel omnino sint vilo pulsu. Alie autem sentiunt, atque moveri possunt, integræ ratione fruuntur, sed tamen deliquio animi, difficilibus spiratione laborant. Alie denique crura similes & brachia contrahunt. Porro nonnulli ad explorandum, non penitus respiratio perierit, & cœculos tanquam carpes, suspendi coram naribus iubent. Alij poculū aque plenum ori vetriculi imponunt. Quippe immortui omnino seruari humore aiunt, si spiratio tota sit intercepta. Et enim in cõfesso est, & spirationem à vita, & vitā à spiratione separari non posse: adeo ut viuentem non spirare, & spirantem non viuere, sit impossibile. Quod si in animalibus, que in latribus delitescunt, nulla appareat respiratio non ita, neque ob id mirari debemus, quum videlicet ea animalia sint frigida. Quippe maximus usus respirationis est, ut inimus calor & refrigeratione & venilatione seruetur. Quare haud ita difficile fuerit pendere, exiguum illum calorem in eis derelictum, arteriarum cordisq; motu seruari: que actio à quibusdā medicis transpiratio vocatur. Similiter etiam, peruente ob vteri affectum spiratione, quoniam vniuersum corpus refrigeratur, (id quod perspicuum est) fieri potest, ut & nullo attracto per os spiritu, aut reddito, transpiratione, que per arterias fit, perseueret, licet adeo interdum exigua, ut sensum omnino effugiat. Accidit autē vteri fusio cœno magna ex parte viduis mulieribus præteritis, que quum antea probe repurgarentur, parerent, atque virorem congressu fruerentur, his omnibus postea priuantur. Quare verissime est, ob retenta menstrua, vel semen cohibitur, eiusmodi mulieres vteri dispositionibus infestari: idipso fortasse magis ob se-

Ramentum est  
figura viceris.  
essentie pro-  
prietas, affectus  
partis in duci  
est.

Partes à vesica  
amici, La-  
mis, & carunculis  
similes.  
Ventriculus, lien  
per quos res-  
piratione per-  
tinet.

Pulmonis vomica  
aliquid per vrinam  
purgari.  
Arteria magna  
ramos ad re-  
nes.

Vteri affectus  
plurima differe-  
ntia.

Respirationem  
perire: emou-  
eri autem pro  
fugacibus ma-  
dis deprehenditur.

Spiratio à vita  
separari non po-  
test: nec à respi-  
ratione ipsa  
vita.

Respiratio  
viti.

Latentium a-  
nimorum cal-  
or, per cor-  
dis & arteria-  
rum seruat.

Transpiratio  
per arterias.

Vteri affectio  
quibus præ-  
teritis.  
Vteri affectio  
ob retenta men-  
strua vel semen  
cohibetur.

Infusus vesicæ  
atque sedis, ne-  
que secundum  
voluntatem im-  
primi: quibus  
infusus, excre-  
menta vrinæ  
non possunt.

Ischuria quon-  
dam excreta.

Vrina suppres-  
sa confusa.

Grumos in cor-  
pore præteritis  
multum contin-  
ent, quos seque-  
ntur symptoma-  
ta.

Pus si cum vri-  
na permiscetur,  
superius effluit  
esse consideran-  
dum.

*Semen muliebre quale.*

*Semen retentum nonnulli vtruque symptoma ta indicat.*

*Semen retentū quādo mēstrua quibz infertur grauiora symptoma ta.*

*Libidini indolenti multus moles est viros valetudinis grauius.*  
*Diogenes Cynicus.*

*Animalia omnia que patibz continentur ad venere.*

*Phallogi istius.*

*Scorpius istius.*

*Torpida marina, piscatorum maxime reddit torpidum per medium tridentem.*  
*Heraculus sapo.*

*Veneris reitinae istae, quomodo distinguuntur ab aliis qui ob prauos corporis fuccos intereunt.*

men retentum. Nam quum muliebre semen humidius atq; frigidius sit, ipsum excerni oportet, praesertim si copia redvndet. Nec secus etiam in viris. Sunt quippe nonnulli eorum, quos protinus adiuuentur, concubitus imbecilliores reddunt. Alii, nisi assidue coeant, capitis grauitate infestantur, cibos fastidiunt, febribz sunt obnoxii, deterius coquant & appetunt, ac deniq; torpore, pigritia, ac melancholicis accidentibz molestantur. Proinde ex retento semine, quum ex suppressis menstruis, videtur mihi longe maior noxa evenire posse corporibus, eorū praesertim, qui suapte natura vinosis abvndat humoribus, plenibz sunt, & in ocio educati: quiq; quū antea nihil fecissent ad libidinem reliqui, assatim cōtinere coeperunt. In quibus sanē cōcubio, naturalē excernendi ipsū cupiditatē, lēxionis causam existere. Etenim quū tale & tantum ipsum semē evaserit, neminem nō ad sui excretionē vi quadā stimulat. Ob idbz plandē constat, modestos viros, non ob volupratem, sed vi ab impedimento praesertentur, indulgere libidini, perinde ac si nulla sit ei coniugata voluptas. Ita Diogenem Cynicum narrat, virū aliquo mortaliū omnium (quod ad cōtinentiam pertinet) cōstantissimū, libidini tamē nauasse operi, nō ad cōiuncta illi voluptrate velvi bono alioquo, illeclum, sed vi noxi, quē ad retento semine provenire solet, arceret. Eum namq; meretrix adire pollicita, quom diutius cessaret, ipse manu pudendus admota, semen excussit, ac venientem deum mulierculā remisit, inquiens: Manus hyme-naeum celebrandum praevēnit te. Sic etiā arbitror animalia omnia excitari ad coitum, non quod existiment volupratē boni cuiuspiā specē praese ferre, sed vt semen, quod retentum ipsa molestat, excernāt: baud fecus quā deiciendi stercoreis, excernendibz virinz desiderio suapte natura moventur. Fieri autē potest, vt prostrantibus mens-truis, retineatur in viduis semen, grauisimāq; inducat symptomata. Nec sanē cuiuspiā mirum videri debet, si exiguus humor in vna parte cōtēntus, tantorū accidentū sit causa: quā si phalangē ictu affici totū corpus videatur, ex quo veneno per minimū foramen iniectū. Praeterea scorpiōnis ictus breui admodum tempore grauisima symptomata inducit, quāvis in illius aculeo foramen nullū videatur. Rationi tamen est cōsonum, vt vel ad spiritum quodā, vel tenui humiditate iniectā, accidentia illa proficiantur. Sunt qui potest, res quasidā solo tactu per qualitatē vim, ea quae ipsa vicina sūt, alterare posse: idq; planē videri in marina torpedine aiūt, vtpote cui tā vehemēs sit potentia, vt per piscatoris tridentem transmissa ad manū alteratione, totū reddat repentē torpidū. Similis etiā facultas inest Heraculo lapide: fer-rum siquidē, qd retigerit, ei adheret. Deinde si aliud, id quod primū tactum fuerit, tengerit, simili-ter vt primū illi inhaerbit: ac sic deinceps. Por-rō iūdem affectus oriri possunt & ab humoribus in corpore putrescentibus, & ab epoto veneno. 60

git) deinde corpus aut luena, aut nigricans, aut varium apparet, aut diffusū, \* aut grauem reddit odorem putredinis, hūc venenum sumptisse aiunt. Igitur si cuiusmodi affectibus nos infestari fateamur, qui ex nobilissimis accepto sūt origi-nis impera, similes sint us qui epoto veneno eveniūt: nihil mirum fuerit, si etiā vmatū semen, aut menstrū, huiusmodi, quū retinetur, aut putrefcit in corpore, grauiā symptomata inducat, ita praesertim, qui vi afficiantur, sunt apti. Siqui-dem quantū vim habeat afficiendē rei aptitudo, in canibus licet videre. Quum enim reliquorum animalium nullum rabie arripitur, solus canis eo affectu corripitur, tantāq; sit in ipso humorū corruptio, vt vel solū eius spiritus, si humanū corpus cōtingit, rabie excitare sit potens. Quod verō ad gignendos vterī affectus maiorem vim habeat semen quum menstrū retentum, vel ex hoc liquet, quum suppressuntur menses mulie-ribz cōiugatis, et si pluribus accidentibus infestentur, nunquā tamen aut inspiratione prouidit, aut animā dēcliquo laborant: quod solent nonnulli videt, licet aequē vt antea, aut paulo minus, quod pertinet ad menstrua, purgēt. Quae sanē symptomata Plato exponere cupiens, sic in Timaeo edisserit: Ea pars quē in mulieribus & v-terus & vulua nominatur, quum sit animal audi-um generādū, si intempestiue diuī infecundū manerit, admodum indignatur, errantēq; petro-rum corpus, ac meatus spirituum obstruens, res-pirantē non sinens, in extremā anxietatē addu-ct, & alios morbos complures excitat. Hec Plato. Ceterum illius agitationis vterū, quam mulie-res percipiunt, nō est causa ascensus eius viq; ad regionem diaphragmatis, vt nōnulli putarunt. Nam si aliquis ex vtero videatur ascendere, id pe-rixiūm est. Sed vteri ipsius tensiones esse po-tius in causa dixerim, cur tangentibus obstruc-tibus, modō sursum, modō retrahi in latūs videat-ur. Nam simul cum vtero, ceruicē quoq; ipsius retrahi necesse est. Quum igitur ad vterum multa admodum venarum ora perveniant, per quas ex cōcubitu vena sanguinem atrialiter poreit, & sa-nē ob plenitudinem rum earum, tum vicularū quae ex illis dependent, cōngit vterum sursum, aut etiam ad latūs retrahi. Siquidem omnis con-vulsio sit aut ad plenitudinē, aut ad inanitionē. Ple-nitudo quippe, repleta corpora & in latum, & in profundum extendit, sed longit udinē reddit bre-viorem. Quō autem breviora sunt, eo magis ad suam originem retrahuntur. Dum itaq; descen-dens sanguis ad vterum, ingredit ad ipsius inter-nam capacitātē non potest, aut quia crassior est, quā vt vasorum ora permeare possit: aut quia clausa sunt orificia, multiplicatas in venas, eas ex-tēdit, atq; vicina ipsis vincula madefacit: ad quo-rum omnium tensionem, continuō vterum re-trahi est necesse. \* Qui si vndiq; trahatur aequali-ter, recta erit & sine inclinatione ipsius transmu-tatio: finē verō inaequaliter, ad partem vehementi-us trahentem intenditur. Non ergo veluti ani-mal errabundum, aliis ad aliū locum discurrat in mulieribz vterus, sed ab extensione retrahitur. Quod si quispiam dixerit, vteri corpus tunc mi-nimē affectū esse, sed per cūctionē laborare, baud abfur-

*Afficienda rei aptitudo, materiam obtem- perant ad vtru- que affectū. Causa sicut ra- bie corripitur: namq; sicutum rabiem excita- re est potius.*

*Plato.*

*Vterum non ascendens ad- regionem dia- phragmatis per vteri iussu- rum, sed non ipsius, non i- psum vas audi- um, quae rano- ne videtur va- gari.*

*Convulsio om- nis sit aut a ple- nitudine, aut ab inanitate.*

Vteri partem  
fieri ad iuper  
flua fupponit  
menftrua.  
Necne que obf-  
qui vteri par-  
tem mellefita,  
de mellefita fo-  
mam emittit.

Menftrua defec-  
tuosa mellefita,  
ne lac mellefita,  
ne pugnatio-  
nem exfufcit-  
u puerperae.

Menftrua defec-  
tuosa, quae pa-  
la deprehendit,  
non fit  
quale ma-  
lignum.

Colica interflua  
interflua mellefita  
interflua mellefita.

Suppreffio mellefita  
in qua fuppreffio  
ne fuppreffio-  
ta.

Menftrua fup-  
ta mellefita,  
qua fuppreffio  
fuppreffio.

Profusio ma-  
lignae caufa.

Profusio fi ex  
tenetur ma-  
lignae fup-  
ponitur.

Mares conuul-  
tus dectra, fup-  
ma fuppreffio.

Colica vteri vo-  
de deprehendit  
tar.

Excreta a cole  
et vefica, qua-  
modo difcretio  
da.

Generrima  
eff fuppreffio afi-  
dua profusio, et  
interflua, qua fit  
cole haudqua-  
quam excreta.  
Interflua quod.

Excreta ex  
pore duobus mo-  
do videri.

Excreta quom-  
modo fuit.

Retentio ve-  
fuit.

abfurdum dixerit videbitur. Igitur peruerfiones  
vteri, eo quod diuinus modo, ad fuppreffam fequū-  
tur menftrua: eas tamē ob hoc, accidentium quae  
in animalis corpore apparent, caufas efle, nequa-  
quam putandum eft. Quae vero circa peruerfio-  
nem, aut menftruum retentionem, viduas mo-  
leſtant noxae, hae ob retentum ſemen euenire pu-  
rantur. Ceterum pro multitudinis, qualitate  
ratione, tum menftruum, tum ſeminis, aliis  
alix accidentium ſpecies oriri ſolent. Enim no-  
xia caufa vniuerſum corpus refrigerare potente,  
adeo vehementer omnes partes refrigerantur, vt  
& reſpiratio, & arteriarum pulſus, ſenſu depre-  
hendi non poſſint. Quae ſi vel craſſa fuerit, vel ac-  
ris, conuulſiones: ſi vero atra bilis natura refe-  
rat, mactum inducet: quemadmodum animi quo-  
que deliquia, & ad fortes extenſiones, & refrige-  
rationes, & omnis ventriculi affectus, ſubſequi co-  
ſueverunt. Porro ſi mulier nec praegnaſcit, nec  
puerpera, lac poſideat, menſtrua ei deſecerunt.  
At nullo in mammis lacte apparente, menſtrua  
fuppreſſa hiſce notis deprehenduntur. Grauitas  
torum corpus infeſtat, necnon faſtidium, atque  
inæqualis horror. Quod ſi circa horrorem inæ-  
qualitas aliqua fuerit, atque faſtidium, apparet  
mulier quaedam aliena, vt (exempli gratia) ex in-  
ſectis carbones, lube vt obſtetrix vteri ceruicem  
tangat. Nam ſi circa duritiem clauiſa inueniatur,  
eam praegnantem efle coniiciunt. Si vero etiam du-  
rities adſit, affectum aliquem in vtero efle poteſt  
dici. Oportet itaque ſpeculari obſtetricem, ad qua  
parte vel declinet, vel retrahatur vterus: in ea  
parte affecti vteri ſedē efle coniiciunt. Atque in quibus  
ſedē ſeminis, eius pars dolor cum grauitate,  
non nihil poteſt ſignificare: quoniam in coxâ dolor  
interdum tranſit, & crus ipſum, quod e regione eſt,  
per inceſſum claudicat. Quod ſi longiori tempore  
ſupprimatur menſtrua, nullamque medicus mulie-  
ri vacuationē amoueatur, tumor aliquis ſuper na-  
taris, in ſibus interdum oritur, offendens nterum  
ex internis partibus, quampiam efle inſiſſimam.  
Nonnullis panus in extrema illius parte excita-  
tur, veluti viris quoque eodem in loco nonnunquam  
oriri ſolet. \* Qui panus in quadam muliere fuit  
ſuppuratus, adeo vt opus fuerit ſectiōne. \* Iuxta  
hanc ipſam partem vidimus colon inteſtinum &  
ſuppuratum, & ſectum: interdum ignoranti-  
bus medicis imperitis quidam incidere, interdum in-  
telligentibus quoque. \* Ceterum quoties ſuppu-  
rari cōgit cōlum, ſemper facile curationem re-  
cepit: vteri vero ſectiōnes, agrius cōglutinantur.  
Itaque ſymptomata huiusmodi conſueverunt ſe-  
qui ſuppreſſa menſtrua: ac praeterea lumborum, &  
colli, & ſincipitis dolor, quod ad oculorum viſum radi-  
ces extenditur: item febres ardentes, & nigrican-  
tes vrinae, cum rubra quadam ſanie, perinde ac ſi a-  
que, in qua nuper mactatae carnes ablutae fuerūt,  
fuliginem quae miſcuiffet. Quibusdam vrina aut  
diſſulciter reddunt, aut omnino ſupprimuntur.  
Quod ſi per alium quempiam corporis locum ſan-  
guis effluerit, aut inſiſſimatus, aut eryſipelas ex-  
citerit, aut menſtrua purgentur interrogare de-  
bes. Siquidem nihil horum accideſſe ſolet, integre  
reputari. Quum vero immodice vacuatur  
menſis, color ſequitur ſordidus, pedes molli tumo-

re attolluntur, corporis robur proſternitur, vitiatur  
ciborum cum cōcoctio, tum cupiditas. Sed ac-  
cidit interdum ſeminis muliebris vocatū proſtu-  
uium, vel vtero laudquaquam affecto, quū videll  
et vniuerſum corpus per ipſum interdum pur-  
gatur: quemadmodum per renes quoque aliquan-  
do ſolet vacuari. Id vero poſſimū ſit, ſi mulier  
laxis ſit carnis, & pueriſoſa. Atque id quod excer-  
nitur, nonnūquam rubra ſanies eſt, interdum a-  
quofa, & ſupallida. Quod ſi purus fuerit ſan-  
guis, qualis ex diſſecta vena profluat, diligenter  
anima dvertere oportet, num eroſio ſit aliqua in  
vtero. Ea vero magna ex parte in ceruice potius  
quam alibi cōtingere ſolet: diſcernitur per ex-  
creti ſaniet, ſi fuerit profunda: ſi vero circa os cer-  
uicis cōſtituerit, non ſolum per hanc, ſed per actū  
etiā cognofci poteſt. Atque praegnaſcit quoque, quū  
ora venarū in ceruice aperiantur, excreant ſan-  
guinem. Ergo ſi mulieri vtero graui, ſubito exte-  
nuerit mām, abortus ſequitur. Atque geminos  
ferens, ſi altera mām extenuetur, alteram amittit:  
& omnino ſi dextra mām extenuata eſt, mar-  
re: ſi ſiniſtra, ſeminis ædet. Mares ſiquidem dex-  
tris, ſummiſque cōtinetur ſiniſtris vteri parti-  
bus: atque raro aliter accidit. Si mulier promptē  
quidem conceperit, dein ſecundo, aut tertio, aut  
quarto impregnationis menſe factum eiecit, circa  
vteri acetabula humorē pueriſum abundare,  
atque idcirco venarum arteriarumque eius loci  
ad ora vaſorum in vterum deſcendunt, ne-  
xum debiliorem efle, cōſciendum eſt, vt ſecum  
ob grauitatē ferre nequeat, ſed abrūpatur facile.

## CAPVT VI.

At colix vici deprehenditur ex dolore inſe-  
ſtante ipſum: necnon ex iis, quae familiaria vlcera,  
vni cum vrina purgantur. Ceterum hae ab iis  
quae a vefica excreantur, miſcelle modus diſtin-  
guit. Nam quod ex cole deſiuit, in primo ſtatim  
exitu excuſſum, vrina praevēire coſuevit. Quod  
vero a vefica emittitur, vrinae admixtum viderur.  
Quinetiam aſiduū inter mectendū mordicus do-  
lent pudendorū vlcera, praecipue quum vel cru-  
ſtula, vel ſordibus ſolutis, pura remanſerint. Por-  
ro gonorrhoea eſt ſeminis aſidua excreta, & in  
vira, quae fit cole haudquaquam extenſo. Priapi-  
ſmus vero eſt permanēs colix tumor extenſiōe  
in longitudinem atque circulum, nullo ſtimulante  
ad libidinem aut deſiderio, aut acquiſito calore,  
vt quibusdam conſuevit accideſſe, qui ſupini de-  
cumbunt. Igitur quemadmodum omnia corpo-  
ris noſtri excrementa, duobus modis vacuantur  
(interdum enim a cōtinentibus ipſa corporibus  
excreantur, interdum ſpontē profluunt, et quod  
ob imbecillitatem ab ipſis retineri nequeant cor-  
poribus) ita de ſemine quoque dicendum eſt. Nam  
in huiusmodi omnibus, vt excrementis tēpēſtū,  
ita continere, naturae eſt officium. Verum ſecre-  
tio ſit, aperto fluxionis meatu: ac reliquo con-  
tractu ſpario & contracto, & ad apertum iam  
meatum, quicquid intruſ continetur, pellente. Re-  
tentio ſit, quum clauſus maneat meatus, & cōten-  
tum a continente hauquaquam impellitur, ſed  
potius per contractionem comprehenditur, &  
retinetur. Hoc modo cōtenti in cauſis inſtrumen-  
tis humores, per integram valetudinem naturae



quæ in eo quod magis aut minus calor est accensus, consistunt. Quo in genere differentiæ, consueverunt medici magnam ac parvam febrem vocare, improprie quidem per qualem, nomē quanti tribuentes. Quæ verò à caloris materia ducuntur, maximè propriè differentiæ caloris præter naturam sunt. Atque hæc sanè ternario numero ambibunt. Nam aut incalcescit ipsius cordis corpus: aut qui continentur in ventriculis eius humores: aut sola quidem aërea spiritalisq; substantia

sufficiēter incaluit: humores autem & solida corpora incalcescunt quidem adhuc, nōdum autem sunt calefacta. Massa siquidem est in arteriis omnibus spiritibus per infinita foramina, aërea substantia sanguinis, ac nihilo minus in corde ipsa, seu a confluentia & conspirabili cum vniuersis arteriis. Incipit itaque hic præter naturam calor, quem nominamus febrem, aliis ex alio eorum, quæ nuper diximus: spargitur autem, atque vni cum patiente afficit duos reliqua genera. Facillima igitur ab humoribus ad spiritum caliditatis transumptio: in dō æque autem promptè vni cum spiritu, accenduntur humores. Corpus etiam solidum, humoribus atque aëre subitanti facilius impartitur calorem, quam ipsum ab eisdem suscipiat. Omnia siquidē substantia tenuis, promptè alteratur quā crassa. Est autem tenuissima quidem aëris: crassissima verò corporum solidorum: media humorum substantia existit. Ceterum solidas partes, continentia: humores, contenta: spiritus, impellentia appellauit Hippocrates.

## CAPVT II.

Quod igitur ex laboribus, ira, tristitia, solis ardoribus, frigore, vigiliis, cruditate, ebrietate, & crapula, nonnulli febricitare cernantur, omnib. est in confesso: quæ modum etiam, quod pestilens aëris constitutio febres conciliat: quoddam periculosa sit conuersatio cum laborantibus pestilenti morbo, quum nimirum non fecus sit contagiosus, quam scabies aut leprosus. Sed ne queriturum est cum iis qui tabe correpti sunt, cōferant: neq; (vt summum dicā) cum illis q; spiritum putrem reddunt. Iam verò qui consuetæ exercitiæ omiserint, & aliis morborum generibus, & febribus maximè corripiuntur. Plethora estiam, vitio si cibi, medicamenta, ætatisq; circa carnis syderis ortum, atq; alia id genus complura, similiter febres accendunt.

## CAPVT III.

Igitur calidum, frigidum, humidum, atq; siccum, corporum elementa existunt: ex ipsorum temperaturarum primi constitutur morbi: quoniam vnus est febris, vbi in corde quædam præternaturam caliditas generatur. At differentiæ caloris, à triplici differentia materiæ desumebantur. Siquidē vel in ipso corpore cordis, vel in humoribus, vel in spiritu, calor præter naturam accenditur. Præcipuum autem causæ quædam notissimæ, in omni febrim constitutione, quæcūq; dictum est. Sed neque satis erit, si calor aliquis dicatur esse præter naturam, ad hoc vt dici febris mereatur: oportet siquidem prius vt cor illo incalcescat: alioquin calor à sole aut ab igni inductus, febris esse dicendus. Porro iracundia est veluti

feruor quidā, ac motus vehemens potentie irascibilis, in corde a delitescens. Simul autē cum eo feruore calit aliquando spiritus, aliquando substantia sanguinis. Quod si ita contigerit, vt ea corpora quæ in se admiscerunt caliditatem, idē eam tempore retinere sint apta, licet motus cordis sedetur, in hūc tamen permanet calor præter naturam, atque inde hominem febricitare est necesse. Huiusmodi autem febris habet originem à motu atque feruore natiue caliditatis. Quæ autem ex tristitia fit, ex solo motu, non autem ex feruore gignitur. At illius quæ labores sequitur, principium est musculorum, nervorum, copularum, & articulorum motus immoderatus. Ea siquidem primò, calorem quandam concipiunt. Dein verò continuatim calor ascendit ad cor, ac tunc homo necessariò febricitat. Quæ autem ex densitate cunctis accenditur febris, qualis maximè consipat atque astrictis corporibus accidere solet, mordaci effluxu in corpore coaceruato contingit. Semper enim corpora animalium distantur, idū duplici modo: nempe effluuiis ad exteriora vaporous fuliginosiq; superfluitatibus, ac rursus inus attracta refrigerante ac ventitante natium calorem aërea substantia. Quum igitur vehemens aliqua causa citius ipsam condensans, metuas angustiores reddiderit, si prius in plethoricam dispositionem incidit corpus, si & vapidum & opimum, quod effluit, extiterit. At si fuerit mordax & acre, nonnunquid febre corrumpitur: quo tēpore etiam calor maximè augetur, refrigerio extrinsecus adueniente priuatur.

Acri autem ac mordax superfluitas a effluit iis, qui aut natura viscosos habent humores, aut prauis cibis vtuntur, aut sæpius cruditate vexantur, maximè si post eiusmodi cibos aquam vitiosam biberint. Idem his quoque accidit, qui supra modum laborant, aut vigilant, aut cogitant, aut medicamina acuta iugiter sumunt. Eorum igitur qui cruditate patiuntur, quidē qui prauis succis redvndant, ac male distantur, aut in tempestiue laborant, aut balneis superfluis vtuntur, faciliè corripiuntur febribus. Qui verò homines habent, sunt, integre distantur, & quiescunt, refrigerioq; ventriculi & hepatis caliditatem, impositibile est vt febricitent. Nam in nullo relictæ ventriculi & hepatis partibus, quicquid corruptum est, ac paulatim coquitur, reddiditq; opimum: sicut & us qui se moribus vehemennioribus torquent, aut vitio sole, aut balneis calidis dulcium aquarum vtuntur, quicquid vitiatum est, recipitur in corporis habitum. Quibus verò cor ruptis ibi descenderunt in ventrem, eos febres non corripiunt, nisi ob alias causas: veluti si defæcati sint ob crebriorem descendi necessitatem, aut vtutem instamano tentauerint. Porro per obstruções mestuum, & humorum contagiones, ob putredinem solet febris oriri. Promissimè namque putrescunt omnia calida & humida, in calidis locis contenta, nisi diffili ipsa et refrigerari contigerit. Quæritur in altera plenitudine quod ad vires dicunt, succi curad corruptionem deveniunt, quum nec vincantur, nec concoquantur à facultate, vt pote imbecilla existente. Propterea autem quæ unque cibi

Febri ab iracundia quando pignatur.  
Febri ex a tristitia.  
Febri ab exercitio immo dūto

Febri à cunctis densitate.

Diffili animalia corpora duplici modo.

Astrictionem cunctis, quando febris sequatur.

Cruditatē partium, quæ non facit in febre, incidit, quæ agit.

Febris oritur si distat ab astrictione partium.

Partium sunt faciliè calida & humida, si condita in calidis locis nec diffiliant, nec refrigerantur.

Plenitudo ad vires.

glutinosi atq; crassi sunt, & i ratione putredinis magis morbifici existunt: quandoquidem succi ex ipsa geniti, longe promptiores sunt, vt & in meribus harent, & inspunguntur. At acres & attenuantes cibi, quod mali succi sint, febres etiā accendunt. Partes etiā quæ experiuntur inflammationem, ratione putredinis similiter febres inducunt. Impactus siquidem in eis qui influxu humorum, si natura calidus sit, nec difficitur, acutum putrescit. Si igitur fluxionem ipsam exquirit amara bilis pepererit, caliditas erysipelatosā partem occupat: si vero sanguis, phlegmonosā: at si ex vtriusq; miscellaneus humor, vel sit erysipelas inflammationis participes, vel inflammatio erysipelatis: nomen quidem ab humore excellēte suscipiens, cognomen autem ab altero. In huius autem omnibus consortij lege febris ascenditur. Nam proxima pars calefacta particular, simul cum ea calit, donec ad cor dispositio ipsa pervenerit. Et enim in carbunculis id quod continuum existit, similiter cōcalefcit. Fiant autem ex sanguine quidem satis calido, & ad atrā bilis naturam, propter advectionem, converso.

## CAPVT IIII.

Calidiores aëris ambientis status, per inspirationem quidem manifeste cor calfaciunt: corpori autem extrinsecus circumfusi, totum ipsam calidius reddunt: sed præsertim arterias, vt quæ ipsius substantiæ aëris ambientis aliquid ad se alliciat: cum quibus omnibus affici etiam cor est necesse: & quum calidius impedio fuerit, ipsum primum atque præcipue, calorem febrilem suscipere, ac dein vniuerso corpori communicare. Pestilens autem febris, inspiratio aëris vitiati & putridi, maxime esse in causa videtur. Fit aliquando enim ob eos qui sunt in corpore humores ad putredinem paratos, quum cuiquam aliquam occasione ad febrem originem ab aëre ambiente acciperet animal. Aëris autem putredo accidit, vel ob cadaverum multitudinem minime crematorum: vel ob lacuum, vel paludum æquo tempore evaporationem. Ceterum nulla causam hinc patienti aptius hinc agere potest: alioquin ex æquo omnes afficeretur ab eadem causa. Quæ igitur vitiosis succis redvndant corpora, obstricta sunt, atq; inerti victus & excretionem educata fuerūt, ea sanè per pestilenter cōstitutiones ambientis, statim à primā inspiratione in initium putredinis sument, ac plurimum in malo proventur. Quæ verò contrario modo disposita, nonnulla quidem nihil, nonnulla verò deo exigui læsionis percipiūt, vt minimo negotio reverti ad naturalem haberi possint. Iam verò quum aëris temperatura, ad caliditatem atq; humiditatem immo diu hinc conuerſa, pestilentes morbi exoritur: qui ea tantum corripit corpora, quæ vt dicitur, prompta & idonea erunt. Et enim ea corpora quorum dispositiones consentiunt causis morbificis, facillime contaminantur: quorum verò renitiuntur, ac reluctantur, quantum viribus ac magnitudine contrarietas valet, tantum invicta cōtingit permanere ea corpora. Quum enim corporum dispositiones dissimiles ac multiplices existant, quedam facile alterantur, ac patiuntur à causa in ipsa operanteque

dam insuperabiles atq; impossibiles permanent quædam ægrè patiuntur. Est autem ipsius medicus opus, correctio errorum omnium, qui circa humanum corpus contingunt. Quare in his omnibus prima esse debet, atque communis intentio, vt corpus quammagis purum sit, ac periparabile: secunda autem, vt præpotenti cause aduersetur, quæ maxime fieri poterit. Nam quibus horum contraria insunt, corripuntur celeriter, acerrimèq; laborant.

## CAPVT V.

Igitur omnes pestifere febres à putredine originē ducunt. At ephemeræ, minime putredinem humorum sequuntur. Sed qui quidem ex solis incendio febricitat, ab agentis causæ caliditate affici natura est aptus. Qui ex ira, huius fervorem quidem fieri caloris qui in corde consistit, est necessarium: non tamen etiam putredinem. Sic & ei qui supra modum exercitatus est, vehementior calor præter naturam sine humorum putredine in corpore accenditur. Qui autem cutis adstricta est, quum prius acriores perspirasset ac piraret per eam, postea quum sunt retenta coarctaturq; in febrim incidit, nulla interveniente humorum putredine. Porro quæ tumoribus inguinum superveniunt febres, omnes auctore Hippocrate periculosæ sunt, exceptis ephemeris. Sunt siquidem quedam febres & genere ephemerarum, superveniētes tumoribus inguinum: quæ quidem ab eis differunt quæ ex humorum putredine eveniunt, quæq; vel in aliquo viscere, vel in causâ & maximis vasis radacem habet suæ generationis. Quandoquidem quæ inguinum tumoribus ephemeræ superveniunt, concalescunt semper partes vicinas, donec vique ad cor febrilis calor perveniat: quò tamen putrida humilis non pervenit, sed ibidem, in loco inguinis circumscripta remanet, sola alteratione per continuum facta, atque vique ad cor ipsum extensa sola caliditate. In putredine autem quæ aut in visceribus, aut in magnis sit vasibus, quidā veluti fumus, ex putrescentibus fuccis ad ventriculos cordis attollitur. Præterea in tumoribus inguinum omnes simul, collecti humores putrescunt, siue per vnum, siue per duos continuos dies, vt potius in eodem loco compacti: at qui in visceribus sunt, vasique magnus, quum perpetuo fluant, suoque contritus vicinos ad putredinem trahant, spatio temporis putridum calorem accendunt.

## CAPVT VI.

Humorum autem putredo, quæ in vasibus sit, similis est ei quæ in humanionibus, ab abscessibus atque tuberculis accidit, duplex existens secundum genus. Nam aut fit vincente natura: aut omnimodo superata, aut adeo imbecilli reddita, ut nullam amplius in putredine extremam ad optatum moliri possit transmutationem: quod quidem tertium genus putredinis ex duobus primis constat. Per abscessum igitur, integre superata natura, optimum consistitur pus, asperctus album & crassum, & quaqueversum simile: leve autem tangenti, ac minime fecundum. Nam si semiputridum fuerit, tertium in ratione transmutatione genus, quod paulo ante diximus,

Corpus contra pestiferum aërem debet redi perferendum, ac maxime si perferabile, tunc causa præpotenti causa tum.

Pestifera febris omnis a putredine.

Ephemeræ febres per vnum tantum dies durant, & sunt a putredine differunt.

Putredo humorum quæ in vasibus sit, fit in omnibus duplax.

Pus laetibile quod est de bono.

Inflammata particula cor si breve succidant.

Caliditas erysipelatosā a phlegmonosā, quæ in da infestatur.

Carbunculi oriuntur à feruore ex melleo bilis sanguine.

Aër impendit calidior, quod in corpora nostrā, molatur.

Pestilens febris causa est infestatio aëris vitiati cor putredine, necnon vitiosis succis in corpore, ad putredinem habilitat.

Causam nullā potest agere, alioquin per vnum corpus aptum ducit.

Pestilens febris, quæ corpora facili, ex qua diffinitione corripitur.

Aëris transmutatio calida ex humida, pestifera est morbi obnoxia.

Corpora cōstitutione causis morbificis, facili contaminantur: quorum verò renitiuntur, ac reluctantur, quantum viribus ac magnitudine contrarietas valet, tantum invicta cōtingit permanere ea corpora.

Corporum dispositiones dissimiles ac multiplices existant, quedam facile alterantur, ac patiuntur à causa in ipsa operanteque



mus, fit: quodq; secundū magis & minus, varias differentias sortitur. Quotcumque autem in abscissibus putredinis sunt differentie, eodem & in febribus quæ ex putredine succeduntur, sunt eorum quæ in vrinis apparent, formæ varietates. Optima verò vrina quæ ex putrescente humore peditur, qui adhuc concoctionem a continenti vâse suscipiat, est quæ albam, liquam, æqualem, & minimè laciidā habet hypostasim. Pessima autē est, quæ in omnibus maximè cōtrario modo se habet. Quæ verò intermedia existit, quantō ad alterā propius accesserit, tantō aut melior est, aut deterior.

## CAPVT VII.

Porro febrium ephemerarum hoc vnum est præcipuum atq; inseparabile indicium, quod ab aliqua manifesta causâ præincipiente quænam procatartem vocant) onatur. Non est tamen id signum earum proprium. Nam & aliarum quædam, à causâ manifesta gignuntur, quæ nimium præcessit. Inseparabile verò ac proprium ephemerarum est, vrinæ statim prima die concoctio, pullulæ ad magnitudinem & celeritatem effata dignam accedens, ita vt frequentia à proportionē deficiat secundum externam quietem. Est autem & magis inseparabile & proprium, quod nullo modo ad celeritatem ea pars pulsus, quæ dicitur systole, tendit: & si aliquando contingat hoc, minimum ac vis perceptibile existit, parumq; à naturali tenore muratur. Sed & caliditas luaurias, proprium atq; inseparabile est huiusmodi febrium indicium. Inseparabile quoque, æqualis atq; incompressus ascensus, in calore simul & pulsibus: non tamen proprium, quum & alius quibuscumque adfit: sicut enim consistente febre mediocritas. Neq; enim hoc etiam est ephemerarum proprium, quanquam eis maxime inest. Proprium præterea inseparabile ephemerarum indicium est, cum indore, aut rore, aut aliquo obfuso vapore inclinato, quam leuatur interfectio. Atq; hæc quidem est communis ephemerarum febrium dignotio. Earum verò quæ ex aduerso ab ephemeris distinguuntur, quedam in putredine humorū constitunt, quædam solidas animalis particulas occupant. Atque has sanè medici febres heclicas appellarūt, vel quia firmæ atq; fixæ, perinde ac habitus, sunt: vel quia corporis habitum comprehenderunt sic enim partes solidas vocitant. Primum autem & proprium, non tamen inseparabile, putridarum febrium est signum, quod nulla procatartica causâ eas antecedit: id quod venter aliorum generum inest. Quandoquidem ephemeræ omnes oriuntur à procatartibus. Heclicæ autem, quando sine his gignantur, minimè ab initio invadunt. Vbi quis igitur circa manifestam, præincipientemq; causam cepit febrere, scire oportet eas febres causam in humoribus esse. Inter omnes tamen quæ ex procatartibus causantur, rationem febrem accendit ephemeram: hæc enim, autem hæc ex putredine humorū, qui quod afficitur corpus, & impurum, & superflui humoris colluvie redvndas fuerit. Successiones autem ipsius, vna quidem propria inseparabilisq; dignotio habetur, quod febres ephemeræ ad integritatem non

definat. Contingit verò aliquando, vt per vigorem ephemeræ, ac maiore magis per declinationis initium, signum aliquod permutationis cernatur: videlicet si ea tranquillitas abfit, quam a desse oportebat. Initium autē sumere à rigore febrem, vbi nec infolatus, nec præcessit aliqua refrigeratio vehemens, putridarum febrium est proprium signum, non tam inseparabile. Si quidem non inest putridis omnibus rigor: sicut neque horror. Præterea inæqualitas pulsuum atq; calor, siue in principio, siue in augmento contingat, huiusmodi febrium est signum proprium, sed ne ipsium quidem inseparabile. Multo aut minus inseparabile existit, quod accessiones ipsæ habeant plures veluti insulas: id quod superexacerbati vocamus: quemadmodum & pulsuum compressio, quæ putridarum febrium est propria (nisi aliquis symptomatis ratione citra febrem ea accidat) non tamen inseparabilis. Maximum etiam earum febrium quæ à putredine oriuntur indicium est, mordacitas & acrimonia caloris, quæ perinde actumus nares & oculos, sic ipsa erodere tactum videtur. Sed in principio quidem accessionis, vt potè in quibus calor adhuc suffocatur, superfluitatēq; succeduntur intus, non statim ea qualitas, ad mota manu, discernitur. At per moram, prædicta caliditatis species effertur ex penitioribus partibus. Proprium præterea inseparabileq; putridarum febrium est signum, velocitas tympanitæ, quæ manifestus quidem in crescentibus febribus, non obscure autem in incipientibus & consistētib; fit. Comparatur autem has febres, in iniis quidem, pulsus parvus ac velox: quum verò constitunt, velox simul & magnus. Sic & quæ circa externam quietem versatur frequentia, in huiusmodi febribus deprehenditur manifestè. Cuius similis neque in ephemeris, neque in heclicis cernitur. Maximum verò & harum febrium indicium existit vrinæ cruditas: earundemq; est proprium, imbecilla concoctio. Neque enim vnumquodque aut effata dignum concoctionis indicium per huiusmodi febres in primis vrinis apparet, si quidem excipiamus eam, quæ fit ex ephemeris febribus, permutationem. At verò pulsus durus nullius generis febrium, quatenus febres sunt, est aut proprius, aut inseparabilis. Comparatur tamen magna ex parte heclicæ febres: nonnunquam verò etiam duo genera alia, symptomatice aliquo interveniente. Quippe durities accidet articularum tumida, aut ob congelationem, aut tensionem, aut ficationem. Congelationes igitur, vehementes algores efficiunt, tensionem vero, inflammationē, & duri tumores, & nervorum dispositio inflammationibus conspiciunt. At ficationem, ex acutioribus duritiis, & longi temporis fames, & diutina febre ardentes, in vniuersam autem, quæcūq; solidas animalis particulas vehementer excucant, sicut & heclicæ febres, articularum duritiem efficiunt.

## CAPVT VIII.

At verò heclicæ febres magna quidem ex parte ardentibus febribus solent superuenire, vique adeo productis, vt humorem in corpore cor-

Ephemeræ permutantur in putredinem, quibus dignotio inest.

Putridarum febrium calor est mordax & acris.

Putridis febribus adegit vela cum systole.

Putridarum febrium pulsus.

Putridarum vrinæ qualitas.

Febrium nulli, quorum febres, adit pulsus durus.

Duritiæ vnde accidet articularum tumores.

11

Vrina ephemeræ ab humore procatartico, quæ in

Vrina pessima.

Ephemeræ alii oriuntur à procatartice causa

Ephemerarum vrina et pulsus qualis.

Ephemerarum calor est perceptibilis parvus.

Ephemerarum inclinata aut deorsum fluens vel rursus.

Putrida febres. Heclicæ febres occupant solidas corporis partes.

Putridas febres nulla procatartica causa antecedit.

Putrida febri maxime iocundat ephemeræ.

dis contentum absumperint: quanquam fieri etiam potest, ut magna adhuc eius portio seruetur. Ceterum illæ non tantum hæc sunt, sed etiam tabidæ. Quæ verò manente adhuc humiditate gignuntur, ubi cordis occupaverint corpus, hinc maxime succedunt, quemadmodum lucernæ flamma exelychnio. Alio autem modo febres hæcæ oriuntur, ubi statim ab initio invadentes, similes ortum cum epimeriis habent: videlicet aut ex ira, aut tristitia, aut lassitudine insigni, aut ardore solis contractum. Quæ igitur sic gignuntur, non admodum egrediantur. Quæ autem pervenerint ad tabem, iis, ubi iam exquisitè consistunt, & iamdudum inceperunt, ut medeamur est impossibile. Si quidem earum natura calida est & sicca, quum per eas tale quid perpetuetur cor, quale lucernæ elychnium, dum plurimum est exvltum.

**Differt autem tabida febris à tabe, siue marasmo. Marasmus liquidum etiam absque febre in decrepitate ætate solet accidere, extincto nullo calore. id quod nihil aliud existit, quam mors, quæ sere sine sensu doloris, ac secundum naturam, ex siccitate contingit: sicut & iis qui præter naturam tæbescunt, altera species marasmi accidit, quæ à Philippo ex morbo senectus vocatur. Tabida vero febris non tantum sicca, sed etiam calida est passio.**

## CAPVTV IX.

Hæctica igitur quæ in tabem incidit, febris, cognata promptissima atque facillima existit. Nam priusquam pulsum atque calorem perpendas tactu, videbis oculos immodice concauos, ac veluti in foueas quasdam reconditos, exhaustos iam vniuerso ipsorum humore, ita ut osium, quibus palpebræ cohererent, eminentiæ demantur. Sordes præterea in ipsis sicce ostenduntur, & quedam veluti squallida dispositio, qualis maxime inest iis, qui toto die sub solis ardore per puluerem iter longum fecerunt. Quinetiam in eis est coloris siccus vitalis extinctus: frontisq; & faciei cutis rigida, ex siccitate, & squallida. Ad hæc, si affectu frequenter palpebras contrahunt, dormitantium insunt: non tamen affectus eorum est somnus, sed potius vigilandi impotentia. Præ macie etiam sunt illis collapsa & concaua tempora: nihilq; in eorum corporibus cernitur præter cutim atq; ossa. Pulsus autem tenuis, durus, debilis, atque frequens apparet. Caliditas vero, quum primum admouetur manus, languida est: paulatim autem accrescens, atque ex rationem ostendit: ac magis, quum plus rangelat immorabens. Porro marasmus tunc incipit, dum cognatus humor qui in mediis partium humanarum spaciis insuperat, est, & ex quo primum vniuersæ partes nutriuntur, perstruitur circa corpus cordis non amplius adesse. Quandiu enim pars aliqua humoris illius conseruetur, solum febris hæctica existit, nondum etiam tabida. Vbi vero res eo discrimine iam pervenerit, ut nihil ex tali humore superfit, tunc exquisita tabes existit. Est autem hæctica eorum omnium dispositio difficilis, ubi præterit principii tempus: quod non dierum aut horarum numero, sed ipso dispositionis modo determinandum est.

Ceterum quum naturalis temperies cordis primum in verti inceperit, neque naturalis humiditas protinus dissipatur, neque virtus laborat plurimum: sed primo fit veluti quedam effluencia ipsius humiditatis: quo tempore facile est eiusmodi febrem sanare, tanquam nihil adhuc virtute perperisset. Tandem autem virtus laborat, quam nimis siccitas & caliditas in ipso corde invaluerit. Iam verò, quæ febris æqualiter ab utraque distat, ab ea scilicet quæ exquisitè tabida existit, & ab illa in qua nihil est adhuc tale, medium quodammodo sese habet ad curationem, dubio ad partes ambas momento inclinans. Quæ autem tabidæ proximior existit, est vicinior periculo, quum quæ alteri primæ magis adhæret, non parvam salutis spem possit nobis promittere. Fingamus igitur aliquem correptu febre, quam præcesserant conspicuæ & procatartice causæ. Si enim febris ipsa ad sequentem diem extendatur, neque integre desinat, neque exasperetur magis, ariditatem tamen maiorem in corpore repræsentat, talem hæcticam fore tibi suspicandum fuerit. Quod si & in tertio die sine cibo permanere voluerit æger, donec tertianæ accessionis præterit horas suspectas, nihilq; esset dignum priori accesserit febri, aut immutatum fuerit, sed tantummodo quædam exigua reliquæ primæ febris procedant, permanciatq; cum ariditate corporis, & caliditate, quæ primo quidem tactu mitis sentitur, processu vero acris, mordax & sicca: huiusmodi febrem hæcticam esse existimandum est. Maximam verò & indubitam erit eius nature indicium, si cibum homini post suspectas horas obtuleris. Si tamen siquidem vna vel altera hora post cibum exhibitum, quicunque ægrotantem tetigerint, alteram febris accessionem opinabuntur adesse. Omnibus namq; hæcticis febribus hoc proprium inseparabileq; adest indicium, scilicet quod alio cibo accendatur calor, pulsusq; ad magnitudinem & velocitatem augeatur, sicut videatur oborta esse incompressa quædam accessio, hoc est, labora ab omni inæqualitate, qualis comitari alias febres solet. Nam tametsi in aliis nonnullis febribus huiusmodi sinusulsi incompressi cernantur, tamen absque cibo solent accidere. In febribus autem hæcticis nunquam aliqua accessio conspicitur, sed perpetuo cernitur vna febris continua, ut illa quæ synochos appellatur. Ea tamen quandam veluti flammam plurimam admodum enim manum possidet occurrentem: pulsusq; edit celerrimos, frequentissimos, atque maximos. In hæcticis autem febribus, neque multa occurrit caliditas, pulsusq; tantò minores, rariores, atque tardiores sunt iis, qui per synochos fiunt, quæto etiam caliditas ipsa est minor. Communem itaq; omnibus hæcticis febribus est, quod pulsus, & semper à principio vique ad finem æquales existant. Proprium autem est tabidarum, siccitas. Nam sine siccitate sæpius hæctice febres consistunt, quum minime in tabem degenerant. Iam cæteras febres quæ incompressas accessiones sortiuntur, omnino compressio aliqua comitatur, dum cibus ingessus fuerit in accessionis principio. Hæctici autem,

Hæctica febris  
invisibilis.

Hæctica febris  
pulsi semper  
cibum accen-  
dit, ex causa  
æqualis.

Hæctica febris  
bona multo adest  
accessio.  
Synochos febris  
est ita vna fe-  
bris continua.

Hæctica omnes  
passiones æqua-  
les semper à  
principio vique  
ad finem æqua-  
les.

Tabidarum fe-  
brium propri-  
um est siccitas.  
Hæctica sæpe  
absq; siccitate  
consistit.

post

Tabida febris.

Hæctica febris  
interdum ab ini-  
tio invadens, si-  
milis cum epime-  
riis habens  
generatorem.

Hæctica eorum  
accidit quid-  
am ægri coracis  
nam recipere.

Marasmus,  
Tabida febris à  
tabe quomodo  
differt.

Tabida febris  
indicia.

Marasmus quo  
modo incipit.

Tabes exquisi-  
ta quando di-  
statur.

post cibū assumptū, quandam velut incrustrum  
insulam fieri, onerit, qui tamen non est accē-  
tus, sed in remanentia caloris, atq; promōtio pul-  
sūs in magnitudinē atq; velocitatem, quāvis  
cibus aliter post cibū solet accēdere. Quāmobie  
autē ista ipsi tandū perdurabit, doctē distribu-  
tu cibus appoluit, hūmectat, cordis aridit-  
tatem. Postea verō corpus ad pristinum reuertē-  
tur statum, in quo antea quāvis cibus exhiberet,  
cōspicietur. Quod si rursus nutrire velis, vel in  
diversis temporibus, senties semper calorē post  
cibos adactū: pulsus autē (ut dictū est) alteratos:  
vixit quibus idem videtur accēdere, quod calci  
& lapidibus calefactis, quorū nimirum caliditas  
arida, per aqua infusionē, ab humida substantia  
nutritur. Humida enim caliditas, quāvis sicca, vi-  
res habet non parum evidētiōris. At verō sicca  
in hēctica febribus esse caliditatem, quāvis conse-  
quitur tabes, hinc constat, quod nullus eorū qui  
habitu corporis sunt humidiores, statim ab initio  
hūmectamur febri correpti fuerit. Quicūq; autē  
sunt natura sicciore, ac præsertim si temperiem  
etiam calidiore fortiantur, vixitque elegerint in  
laboribus, vigiliis, curis, tenuisq; victus ratione,  
hos statim ab initio solet hēctica febris invade-  
re, sit ira, vel tristitia: ac magis æstare, statimq; tem-  
poris calido & sicco, ac loco præterea consimili.  
Ac terminus talium hēcticarum principij est, si  
eo tempore, quo solent ephemere ad integritatē  
desinere, non solum istis nulli tale accidat, sed sic-  
citas etiā manifestē intendatur. Alter verō cuius-  
dam veluti ipsius augmenti, atq; integræ per-  
fectiōnis terminus, est tertius diei accessio. Nam si  
tunc nec altera accessio supervenerit, neq; aggro-  
tus absq; febre fuerit, adacta insuper siccitate,  
proculdubio hūc hēctica febre laborat: quæ pro-  
gressu temporis citō ad tabidam cōvertetur, nisi  
rectē curetur. Terminus autem permutatiōis i-  
psi us ad tabem est, dum pulsus debilis simul atq;  
durus sentietur: qui quidē necessariō etiā erit par-  
vus & frequens: non tamen propterea febris di-  
citur tabida, sed ob id porius, quod debilis atq;  
durus existit. Debilitas liquidē, vehementer se qui-  
tur febris intemperantia: durities autē, aridita-  
tem. Si igitur hūmectamodi affectus cor occupa-  
verit, hinc febre tabida necesse est animal labo-  
rare. In eandem verō incidunt febrē ex ardenti-  
bus atq; acutis febribus plures, qui rectē curati  
nō sunt: quicūq; quā egerent portione frigida, non  
solum eam nō biberunt, sed nullā etiā aliud re-  
frigeratū medicamē appropinquat thoracē & præ-  
cordia. Quinēnā licet p̄s ac ventriculi inflammā-  
tionibus, nisi rectē curetur, tabes supervenire cō-  
suevit, affectione ipsa cordi cōmunicata. Siqui-  
dem tunc corrumpitur cor, interdum quidem ex se  
ipso, sicut per exandescētiā, vehementerq; atq;  
diuturnas tristitias: nonnunquam verō ex  
ardentibus febribus: aliquando autem ex pul-  
monis ac thoracis affectibus, ac præsertim ex em-  
pyemate & pleuritide, atque adeo ex diuturnis nobis  
parium inflammationibus. Similiter in llen-  
teria & diarrhœa, si vel ab initio statim, vel pro-  
gressu temporis, febris invaserit, tabidē postea fe-  
bris succedunt. In vniuersum autem, quando-  
cūq; prædictatum cordis corpus febriem ca-

lidoratem susceperit, & quæ cum difficultate ex-  
tinguatur, tabida occupatur febre. Quare & quā  
arteris circumstantibus partibus calidiores sen-  
tiuntur, maximum sunt hēcticarum febrium in-  
diciū. Vbi igitur sola per seipsam consistit hē-  
ctica febris, perspicua est, an sit absolutē hēcti-  
ca, an simul & marasmodi. Vbi verō hēctica fe-  
bris vna cū putrida coit, longē difficilis cognō-  
scitur: quāvis ex arteriarum perseverante calo-  
re, morūq; celeritate & frequentia, eam discerne-  
re possumus.

## CAPVT X.

Porro qui ex feruore solus incidit in febriem,  
his cūns magis ad calorem & siccitatem, quāvis  
pulsus ad febriem vergit dispositionem: nam &  
minus subundi sunt us, qui æqualem habeant ca-  
lidoratem: & quamprimum manus admouetur,  
ingens calor percipitur. Contrā res se habet in  
iis, qui ex cute denariā & æstivā laborant: nam  
in eis reaccenditur calor. At qui ex feruore solus  
eggorant, his maxime de vni caput videtur: plūsq;  
ex balneis frigidis vilitatis & delectationis per-  
cipiunt. Oculi quoq; ut eis rubicundiores & ca-  
lidiore cum quadam ariditate videntur, si qui-  
dem sine grauidine ac defeculatione assigantur.  
Est autem minus calida cutis us qui ex frigidita-  
te febriunt, corpūq; eis in maiorem tumorem  
attollitur: ac nullus in frōre squalor, qualis illis  
qui ex insolatione febriunt, sine plenitudine capi-  
tis. Siquidem magna ex parte lūs solet caput re-  
pleri, nisi quis purum, materięq; invictis capere  
corpus possideat. Solus quippe his caput cāstiter  
contingit, sine aliqua plenitudinis notā.

GALENI PERGAMENI  
de differentiis febrium, lib. II.

## CAPVT I.

Superest autem nunc, ut de differentiis febriū  
quæ ex humorum putredine oriuntur, si-  
militer differamus: idq; ubi admonemus  
prius, non fat esse (quemadmodū multi opinan-  
tur) ad omnium febrium generationem, si in cor-  
pore amara bilis redvndet. Alioqui laborantes  
atque morbo, ad vnum omnes maximis cor-  
riperentur febribus: id quod nequaquam con-  
tingit, priusquam bilis quæ in illis copiosissima  
est, cōputrescat. Absurdum etiā est credere, in  
quartanis & quotidianis febribus exquiritis, ac-  
ceruari bilem amarā, quemadmodum in ter-  
nanis, atq; in caustionide, quum in illis nullum ra-  
tis succi vestigium adsit. Etenim febres tertianæ  
magna ex parte in corporibus natura magis bi-  
liosis sunt: in ætate vigenti (quæ omnium bili-  
osissima est) tempore æstivo (in quo dominatur  
in humor: in locis præterea quæ calidam & sic-  
cam temperiē possident, in similibus aëris ambien-  
tis constitutione: ac breuiter in homine qui la-  
boribus, curis, vigiliis, æstu, tenuis victus ratio-  
ne, eademq; calida & sicca, ac deniq; medicami-  
num calfacientium & exiccantium immodico v-  
su, fuerit commaceratus. Quotidianæ verō, natu-  
ris in quibus pituita superfluit, sunt familiares:  
in hyemēq; præcipue, atque in omni locorum &  
temporum statu frigidiori atque humidiori gi-  
guuntur. Ex ætate porro, senilem atq; pueri-

Febri tunc  
aliter pul-  
sum post cibū,  
in magnitudi-  
nem atq; velo-  
citatem.

Hēctica statim  
ab initio, quo  
probantur.

Hēcticam mi-  
seri interdum  
cum putrida.

Febri ex insola-  
tione.

Febri ex cute  
æstivā.

Febri ex frigiditate.

Tabida febre  
tunc laborat  
animal, quā ca-  
lor hēcticus tā-  
quam cor occupa-  
uerit.

Tabes quibus  
plurimū supervē-  
nit.  
Tabes corrumpi-  
tur quibus ex cau-  
sa p̄s.

Tertianæ febres  
quibus natura  
magis sunt bili-  
osæ.

Quotidianæ fe-  
bres quibus na-  
tura magis sunt  
pituitosæ.

lem in febribus magis: præsertim si accedat otiosa vita, quam crapula comitantur: atq; etiã si post pituitosos cibos quispiam balneis vitetur. Neq; etiã si qui quotidianæ febres tenentur, amarum evomunt bilem, nec per ventrem inferiorem aut sudores illam excernunt, quod in febribus contingit tertianis: hæc siquidem flava bile putrescentem signantur. At quotidianæ ex pituita, quemadmodum quartanæ ex atra bile, ducunt originem. Proinde corporum naturæ magis ad atram bilem proclivæ, ex tranbus, præcipue declinans: ex anni verò temporibus, maximè autumnus: ac brevitèr victus vniuersus frigidus atq; siccus, quartanis febribus originem præstat. Quare & rigor quivtriusq; genus febres antecedit, haudquaquã similis est: sed q; in tertianis quidè accidit, repræsentat sensum causæ efficiētis, veluti rei cuiusdã pungētis, sēnsēisq; qui verò in quartanis, rariq; refrigerantis. Porro febres intermittētēs, quæ nimirũ ad integritatē desinũt, totũ habent ab humore qui per oĩa corporis partes suo motu defertur. At in cõtinuũ, humor delinquit atq; cõtinetur in venis.

## CAPVT II.

Intermittentũ igitur tres sunt omnes numero differētiæ, quotidiana, tertiana, et quartana quotidiana quidè, ex pituita: tertiana aut, ex flauæ bilis: quartana deniq; accidit putredine p̃pagara. Continuarum aut quæ ex flava bile, p̃venit, duplex species habetur: vna quidè, earũ quæ appellantur synochi: quarũ vniuersum tēpus vnicæ accessio existit, à principio vsq; ad finē extēsa: altera verò earũ quæ idē cum genere nomen habet, cõtinuè dicitur, atq; in pluribus particulatim, circumbus cõtinetur. Earũ igitur quæ appellantur synochi, tres differētiæ connumerantur. Nam earũ quædã à principio ad finē vsq; perseverat p̃uales: quædã paulatim augēt: aliz decrescūt, atq; minuantur. Vnde nonnulli primas quidem homotonas acmasticas, secundas epacmasticas, tertias paramasticas, hoc est, vniiformes, invalescentes, & decrescētes, nominant. At continuarum duæ sunt differētiæ primæ. Si quidem earum nonnullæ quidem, tertio quoq; die invalescunt exasperantq; referentes naturam tertianæ febri: aliz verò etiã die intermedio exarationem faciunt: neutræ tamē harum ad integritatē desinunt. Earum igitur continuarum quæ die intermedia accessiōē faciunt, nonnullæ quidem formam quotidianarũ seruant, duas invicem accessiones simillimas conficiētes: aliæ verò, quod duas dissimiles faciant, simillimam primæ tertiam efficiunt, atq; secundæ quartam, iustar duarum tertianarũ progredientes. Hæ igitur ex bilioso magis, altera verò quæ singulis diebus similem accessiōē faciunt, ex pituitoso humore consistunt. Est & tertium genus febrũ continuarum, quæ perrarò tamen eveniũt, quarum accessiones quartanarũ figuram progredientes ostendunt, nec desinunt tamen integrè. Quemadmodum autem febris tertiana aliquando sit duplex, & aliquando triplex: sic hæc etiam non duplici modo, sed triplici potest evadere.

## CAPVT III.

Quæ igitur à flava bile per sensibiles corporis partes delata oritur febris, ea cum rigore inva-

dit, atq; ardētis febris similitudinē gerit, & biliosa vomitibus, aut diarrhoeis, aut sudoribus, vel horũ quibũdã, vel omnibus simul, iungitur. Huius febris accessio duodecim ad summum horarum æquinoctialium intervallo finitur. Vocamus autem ipsam exquisitam tertianam, quæ in temperata laborantis biliosa, & a not tempore, & regione, & victus ratione, calidis & sicca existit. At verò copiosior bilis, ea quæ paulatim, longiorem facit accessiōē: tenuis autem, crassa brevior. Sic & vigor, maior quidem, brevior: imbecillior autem longior. Præterea corporis dispositio, rara quidè breviorē, densa verò longiorem. Tempus autem intermissionis in hac febre, nullũ habet humoris putrescentis ex pulsi perceptive indicium, in die aut nocte, quæ consequitur accessiōem. Quam verò parumper succendit, vix agnoscere potest in primis diei aut noctis subinde sequentis partibus: manifestus autem circa fines ipsius diei vel noctis: atq; adhuc manifestus die proxima, quæ videlicet antecedit accessiōis diem vel noctē. In illa verò iam signum evidentius apparet, ac multo etiam magis accessiōe iam incipiente: atq; adhuc plus, invalescente febre. Quĩ verò iam constitit, minus quàm quom augebatur, multoq; minus vbi iam declinaverit.

## CAPVT IIII.

Est & alia exquisitè simpliciteris febris, quæ ex pituita ginosa pituita ortum habet, per sensibiles à natura partes impulsã. Incipit autem à refrigeratione extremorum, & horrore magis quàm rigore. Cum difficultate per eam accenditur calor, ac longum cõsumit tempus dum invalescentia pervenit ad summũ. Quoniam verò is ex quo constituitur humor, frigidus est & humidus, ac præterea lentus & tenax, idcirco ægrè accenditur, ac tardè movetur, fœpiusq; in foraminibus hæret. Opprimat autem atq; aggravat aliquid virtutem: vnde inæquales ac debiles magis, paruosq; efficit pulsus, quĩ primam accessiones invadunt, atq; in primis incrementis partibus. Fiant & in biliosa febre circa accessiōem principia, singuli quos diximus pulsũ affectus: in ea tamē statim desinunt: cetera verò, necnon inæqualitas, plerumq; tali febre invadente non adiunt. At postquam cessauit rigor, non multũ post calor accenditur, veluti ignis effulgens, purissimè, omnis fumosi fuliginis expers. Pruriōsi autem humoris caliditas, ionem humidum ex accessu liquis viridibus reicit. Idcirco & exagge-  
cuationes ab ipso, & accessiōis spaciũ longius produciunt: neq; intermissionis tempus est adeo vti in tertiana syncrem, sed humoris putrefacti feruat indicium. Attamen quom exquisitè suam naturam seruauerit, pleriq; & mihi nõ raro videtur habere puram intermissionem. Hæc febris, naturas cõsequitur corporum, & tempora, & loca, & stans, atq; quæ, & victus rationem, aliq; omnia prorsus alumna pituitæ. Accenditur autem singulis diebus, etsi minus calida sit, quàm biliosa tertiana. Hæc enim, quĩ humorem habeat minimo negotio inflammabilē, faciliè quicquid ex eo efferverit, totũ propter subtilitatē in accessiōe expurgetur, ad puriorē quandam integri-

Tertianæ febris  
simpliciteris.

Tertianæ  
exquisitæ quæ

Arcissima febris  
quæ facit breuiorem,  
longiorq;.

Quotidianæ febris  
diuturnæ.

Tertianæ  
exquisitæ  
simpliciteris  
quæ  
purissimè calens.

Quotidianæ  
exquisitæ  
simpliciteris  
quæ  
in accessiōem  
desinunt  
non expurgantur  
integre, ut  
cotidianæ  
tertianæ.

Tertianæ  
finis  
à flava bile  
pituitosa,  
Quotidianæ  
finis  
à pituita,  
Quartanæ  
febris  
quæ  
cre  
scit  
progre  
ssu,  
Rigor  
quæ  
tertianæ,  
quartanæ.

Intermittentũ  
febrũ  
ad  
continuatũ  
differē  
tiam.

Intermittentũ  
febrũ  
tres  
dif  
ferētiæ.

Continuarum  
febris  
duplex,  
Synochi  
vni  
uersum  
tēpus  
vnicæ  
accessi  
o, et  
Synochi  
tres  
differētiæ.

Homotonæ  
febris,  
Acemasticæ  
febris,  
Epacmasticæ  
febris,  
Paramasticæ  
febris,  
Continuarum  
duæ  
differētiæ.

Continuatũ  
quar  
tana  
reperit  
perrarò.

integritate terminari videtur: atq; exigui quodam vestigiū post paroxysmū, putridę caliditatis relinquere. Quę autē ex pituita febris accenditur, in accessione declinationib; nō expurgatur integre, neq; pari relinquitur eius quod veluti succedi videtur: ac, pōde intermissio eius logē deterior est, accedendę accessionis multo magis festinat insulzus.

## CAPVT V.

Tertiū febriū intermittentiū genus est exquisita quartana, quę ex solo atq; bilis humore gignitur, qui frigida & sicca cōstat tēperatura. Succenditur aut paulatim, veluti lapis aliq; aut corpusa similiter frigidū atq; siccū. Vbi verō aliqua ex eo sūma fuerit accēsa, nihil fumidū, aut semicombustum in accessione relinquitur: itaq; idcirco ex hoc humore, quā ex pituita, plures evacuationes oriuntur, intermissioq; exquisita parā videtur: quod quidē quicquid atre bilis accēsum fuerit, exhauritur atq; discutitur. Quamobrem si affectus talis est rigor, qualis is, q; vehemētē gelu frigidē.

Hanc aut febrē necessariū antecedit, quęcūq; atram bilem accumulāt. Ceterū accessio ipsius, quod quidē ad longitudinem pertinet, similis est tertianę: nonnunquā etiā & longior, quum videlicet exquisita persistit, nēpē ā frigidiore humore producta. Pro multitudine autem & qualitate humoris, vigore & imbecillitate potentia, necnon ipsius egrotantis dispositione, per omnes febres solet longitudo accessionum variari. Si igitur neq; putrescat, neq; vehemēter per parā sensiles deferatur, melancholicus humor, nūquam efficiet exquisitum quartanarum circuitum. Iam verō, regi quidē morbi paliginibus, diuturni melancholici splenis affectus, et colores in toto corpore sordidi, herpetibus verō atq; erysipelatibus, quę ex flaua bile gignuntur, cancri & phagedęn, proportionē quadam respondent. Verū neq; in aliis, neq; in aliis atre bilis affectibus necesse largi febricitari quā oriūtra bilis putrescat. Semper quippe natura sua viribus freta, quicquid optimū reddi possit ex succis, id nutriendis partibus conatur assimilare: excurrere autem, quod ralem correctionem nō recipit. Quod si quando ob o cāhodiem aliquam tā ipsūm nequeat expellere, necessum est, ut diutius delitescens in anima corpore, corrupturatur. Sic igitur iis qui morbo regio, atq; atre bilis passionibus insistantur, quando biliosi humores superabundantes, diutius corpus obfederint, febris supervenire cōsuevit. Sed neq; ob redyndantem pituitā febris vnam quam accenditur, nisi prius cōputruerit. Ob pituitam aut visum est ipsius (quod impossibile ar bitrabantur veteres) oriū abiq; febre rigorem.

## CAPVT VI.

Ex genere quotidianarum est febris quę Hepialam vocant, vbi simul & febriunt, & rigent xgni, atq; eodem tempore in toto corpore vtriusq; sentiriā affectū. Oriū autem hac febris ab humore illo, quē vitreū Praxagoraz vocat, quicquid est species quidam pituitę, sans frigidus atq; tenax existens. Si quidem omnis frigidus atq; humidus succus, ad pituitę appellationem refertur. Cuius tamen plures sunt differētię. Est namque vna species pituitę, visquē adeo frigida, ut quā detinctur alicubi, dolores acerbissimos ex-

citet. Atq; hac sanē vitro fuso est perfimilis. Est & alia pituitę species haudquāquā exactē frigida, quā pleriq; cum scretu expunt, sensibilem habens dulcedinem. Accedit tertiā species pituitę, quę sentitur expuentibus acida: atq; minus frigida, quā quę dicit vitreę: magis verō quā dulcis. Pręter has species, est salda aut ob putredinē, aut ob serosā humiditatis missionē: ex qua quidē febricitantes non rigent, sed tantummodo horrēt. Acida verō ac vitreā pituita, si per partes sensiles deferatur, rigores citra febrē inducit. Quod si modica aliqua in ipsis fiat putrefactio, febrē Hepialam concitant. At si vehemētius putrescant, rigor quidē antecedit, febris verō sequitur, ā multitudine & caloris frigida materia devicta. At putrescentē dulci pituita, rigor minime antecedit febrē.

## CAPVT VII.

Porro si pituita putrescens miscetur amarę bilis, duplex vt causa, si eam disposicio iungatur. Alter siquidem humor afferet quondē accessiōnem, alter verō tertio quog; die. Itaq; alter quidē dies duas accessiones habebit, alter verō vnam duntaxat: nisi accessiōnū tempora sibi mutuo cōhæreant: cohærentibus siquidem fiet vna febris confusa, quę neq; purę tertianę, nec quotidianę formā præ se feret. Quoniam verō vtriusq; febris duplex species est, quatuor ex ipsis fient coniugationes. Vna quē in qua tertiana quotidiana intermittens miscet. Altera, in qua tertiana quotidiana continue iungitur. Tertia, in qua quotidiana intermittens, tertianę cōtinuę miscetur. Quarta deniq; in qua permiscet quotidiana cōtinua tertianę continue. Harū verō nuper dictarū coniugationum omnium, duę sunt differentię quā aliquando quidē in eandē horam accessiones occurrunt: nonnunquam verō diversis temporibus superveniunt. Ceterū ex accessiōnis forma, non ex periodorum simili proportionē, cognoscenda ipsa febris venit. At quę singulis diebus accenditur atq; intermittitur febris, ea amphimerina hoc est, simpliciter quotidiana vocetur. Quę verō intermissionem non habet, continua quotidiana dicatur. Idem etiā & in aliis febribus est faciendum iudicium. Iam verō ex quotidiana continua, & tertiana intermittente, hemitritæ natura constat. Quā igitur tertianę insulzus cum rigore invadat: quotidiana autem continuę, sine rigore: sanē si ambę in vnam horam (quod interdum per hemitritarum cōtingit) cōspirent ex æquo, febris confusa ex vtriusq; horrorem præ se feret, rem quidē rigorem minorem, sed maiorem refrigerationē. Quocirca dimidiam hemitritæ portionem vtriusq; illarum febrium (dico quotidianę cōtinuę, & intermittētis tertianę) occupabit. Est autem hemitriti duplex generatiōnis modus. Nam aut illarum febriū accessiones in vnam eandēq; horam cōsunt, quod altera quidē anticipet, atq; altera prorogetur: vel itaq; ab ipso initio ambę febres miscantur & cōfunduntur. Quę igitur sit, in vnum tempus conspirante vtriusq; accessiōne, vnum duntaxat hemitritæ naturę paroxysmum fortitur: altera autem omnis, ā principio ægritudinis vsq; ad finē: quę febris maxime ab

Hepialam fieri etiam ā pituita acida.

Tertiana fit in quotidiana & intermittente, quā tunc coniugationes.

Amphimerina febris.

Hemitritæ autem constat ex quotidiana continua, & intermittente tertiana.

Hemitritæ autem nascitur ex vna vna horam.

Hemitritæ duplex generatiōnis modus.

omnib. hemitriticos vocatur. Qui aut intermit-  
tentis tertianæ & quotidianæ cōtinuæ formā per  
se cognovit, facile cōplicatas per symptomata, p-  
pria distinguet. Porro quoniam ex eis cōplicatis ci-  
nua sit habitura finem, ex ipsarū specie, accessio-  
nis prolixitate, magnitudinēq. præterea ex mo-  
re, mori, reditu periorum, necnon ex cooco-  
ctōnis & cruditati indicis, consuetudum.

## CAPVT VIII.

Febris igitur quæ ex intermittente tertiana, &  
quotidiana cōtinua, cōposita est (quam hemitri-  
taum vocamus) aut sanam bilē habet exyperan-  
tem: atq. ob id, in ea sunt tertianæ febris acciden-  
tia maiora: aut hæc quidem parior, pituita verò  
abvntantior existit: ob idq. quotidianæ cōtinuæ  
affectus firmiores: aut neuter horū humorū alte-  
rum vincit, sed ambo æquipollere videtur, id qd  
in exquisitis hemitritipis, hoc est, semitritianis, cō-  
tingit. Ergo fit in missione ipsa prævalent febris  
tertiana, horridior fit tota febris, & oonulū sibi  
in invasioe rigoris associat. Confestim verò  
& feruidior est huiusmodi febris, & incendij plus  
habet, magisq. ad summū festinat: & aliquid bilis  
per vomitū, aut per aluū, aut per sudores excerni-  
tur. At si altera ex pituita febris sit præpotentior,  
tā frigida vehementius extremas occupat partes,  
& pauci adfunt horrores, ac pulsus magis, & diu-  
tius cōprimitur: tardiusq. accessio invalescit, ac  
longū post tempus cōsistit: non tamen aut finem,  
aut magnum adfert incendium: nec in ea, vt in  
alia, bilis excernitur. Itaq. in hemitritico enqui-  
sita, quæ ex equali duarum febrium (quando-  
quidem humorū duorum) temperatura est cō-  
posita, velvnt pugna quædam inter varios affe-  
ctus oritur, quumeger nonnisi quā invalescen-  
te febre tertiana, atq. ad cutem humores pellēte,  
incalēscit vehementius, remorante interim re-  
vellentēq. intro ipsius motum febre quæ ex pitui-  
ta ortum habet: \* quum nimirum is humor sit  
tardi ac difficilis motus, frigida & lenta existens  
materia. Dicitur aut hemitriticus febris non ex-  
quisita vbi aut bilem, aut pituitam habet vinen-  
tem. Est & alia secunda copula commissioq. dua-  
rum febrium, tertianæ scilicet & quotidianæ, am-  
barum intermittentium, quæ similem quidem tu-  
per diēte accessionem facit: hoc tamen interie-  
ctio discriminē, quod hæc quidem intermittitur,  
atq. necessariò ad integritatem desinat: quodq.  
diē secunda cum rigore aut horrore, sola quo-  
tidiana febris invadat. Quamobrem huiuscemo-  
di febris non est dicenda hemitritica, si quidem  
ex numero continuarum hemitritica existit. At  
si in vtroque genere hemitritica consistat, non  
hæc tantum, sed multe præterea aliæ febres,  
hemitritici dicuntur. Cæterum minimè ex duabus  
continuis, quarum altera ex bile, altera ex pitui-  
ta oritur, potest hemitritica produci: quando-  
quidem hæc cōmixtio, febrem horridam, & quæ  
multas habeat reduplicaciones, non facit. Nam  
quum omnis febris continua, sui quidem rano-  
nem, si exquisita fuerit, neg horrorem habet: ne-  
que rigore, certe quæ ex ipsa componitur, haud  
quaquam horrida fiet. Necesse igitur est, si hor-  
ridus simul atq. continuus sit hemitriticus furi-  
rus, ex duabus ipsum febribus generari, quarum

altera sit intermittens, altera verò cōtinua. Pro-  
inde tertiana mista quotidianæ continuæ, hemi-  
triticaum producit: quam febrem neque vitæ quæ  
continua, neque vitæq. intermittens efficere po-  
test. Ar vero si quotidiana intermittens, mixta  
sit tertianæ continuæ, oriri poterit cōtinua ma-  
lul atque horrida febris. Hæc tamen contrariò  
modo se habebit quā prior: quoniam conti-  
nuitatem quidem ex bile obtinebit: horrore ve-  
rò, ex pituita: reduplicaciones autem, ex pugna  
mutua, ac tunc præsertim, quum humores æquas  
vires habuerint. Porro quæ de biliosa & pitui-  
tosa febre simul mixtis conscripsimus, ex transie-  
rentes ad æmelancholicā, poterimus ipsius cum  
vtracq. illarum cōmixtioem & confusioem si-  
militer cōnectari. Voco enim complexionem,  
quod invadunt discretibus horis: confusioem  
verò, si eodem tempore inceperint. Tres itaq. si-  
mal febres complecti quispiam & cōfundere po-  
terit, ipse per se, ex illa quæ diximus, contem-  
platione exorsus. Nam horum omnium princi-  
pium, fons, atque elementum est, singularium fe-  
brium formam atq. figuram exquisitè cognosce-  
re: id quod persacile existit, quum tres tantum  
existat numero: omne quæ ex amara bile, & quæ  
ex atra, & quæ ex pituita gignitur. Quare sin-  
gule duas habent differentias, continuæ scilicet  
intermittentisq.: ita vt omnium quæ ex humo-  
rum putredine orrum habent, fiant sex numero  
differentiæ. Quod si quæ alia accesserit particu-  
larim præter has differentias, ea vel ex multitudine  
humoris, vel ex quantitate vel ex qualitate pu-  
trefactionis, ac præterea ex modo motus, & par-  
ticula in qua putredo consistit, habebit originē.  
Iam vero quæ intermittentem habuerant magis  
rem febres, nempe accessione ipsa in longius re-  
pūs producta, et sanè extensæ vocantur: quæ ta-  
men in co quod magis aut minus, varias differenti-  
as recipiunt. Ex accessionis autem & intermit-  
tionis spacio, oportuū est calculandum quib-  
um tempus cognoscitur.

## CAPVT IX.

Quum autem oriri soleant ephemeræ, languine  
nō putrefactio, sed tantummodo calefactio: in-  
vestigandum nobis iam est, si putrescere aliunde  
aliquando contingat, quænam species febrium gi-  
gnatur. Porro ab aliqua caliditate exoriri putre-  
dinem, rectè professus est Aristoteles. Vocat au-  
tem alienam, externam: non familiarem, neq. na-  
tuam. Hæc si quidem coquere nata est, illa verò  
corrumpere, \* quod est putrefacere. \* Incalēscit  
autē externo calore sanguis, & insolari deystio-  
ne, & pestilenti aëris statu, atq. in febribus vniuer-  
sis, quacumq. ex causa nascuntur. Vbi verò in ali-  
qua corporis parte sanguis plurimū a cōgula-  
tus, eiusdem partis vim superat, corrumpi cōle-  
uit: præsertim si in parvis vasib. propter crassiti-  
dinem consistitur, aut ob multitudinem impin-  
gatur: quæ ad modum videre est in vniuersis so-  
lammationibus: in quibus sanè duabus de cau-  
sis ipse sanguis corrumpitur: & quia scilicet non  
dissipatur, & quia à natura non vincitur. Non in-  
quam itaq. sanguis in inflammatione particula su-  
bire potest putredinem, ex qua simpliciores qui-  
dem, quàm ex aliis humoribus febres oriuntur,

similem

Hemitritica  
non acquisita  
quomodo continetur.

Hemitritica  
non acquisita  
quomodo dicitur.

Hemitritica  
est continua.

Citius a febre  
non horrorem,  
nec rigorem  
facit.

Hemitritica  
est.

Febris  
complexio  
q. ut  
fuso quid.

Putredinem  
febris  
venerit  
diffinitio  
simpliciter  
sanæ  
natura  
aut  
bimatur.

Ephemeræ  
intermittentes  
vires  
a  
sanguine  
calore  
sunt.

Putredo ab  
aliis  
non  
producit  
caliditatem.  
Calor  
natura  
coquere,  
alio-  
quin  
corrumpi  
non  
est  
natura.  
Sanguis  
quod  
de  
retro  
calore  
incalēscit.

Sanguis  
in  
in-  
flam-  
matione  
duplex  
de  
causa  
corrumpi-  
tur.

Febris  
a  
putre-  
dine  
sanguinis  
aut  
simpliciter  
esse  
quid  
ab  
aliis  
humoribus.



similem tamen accessionē proportionē seruantes, qualem ternarie febris ostendunt. Sic enim in his quo latenti inflammationes patiuntur, est obseruatum: quo tempore maximè rubidum expuluit. Quod si sanguis supra modum affertur, pars quidem eius subtilior ac pinguior, omnino in huiusmodi bilem conuertitur: crassior autem, in atram: quod in his tumoribus, qui carbonculi appellatur, videre licet. Igitur pro varietate humorum in quos conuertitur sanguis, febres fiunt, sola bonitate vel malitia differentes. Illæ liquidæ quæ sanguinis consequuntur transmutationem, sunt simpliciores, tum in reliquis, tum in caliditate qualitate minori. Nam cum le plurima manifestantur gemit differt, cum tamen omnino minus: licet quæ in balneo corroboratur. Semper enim multitudo febrilis caliditatis, in multitudine effluxus consistit. Quod si vero rariore manus calor molestus sentiatur, id prouenit ex humoris ætate. Si rigetur calor & vapidos, & minus insuauis videtur, a sanguine proficitur. Qui vero molestus, rodentes atque mordaces existunt, consequuntur vitæ bilem. At ubi in primo occurrit, aliquid manus vaporosum si acre, se repræsentat manus, sed per moram paulatim circū moratitas, eam admodum inæqualis, gerinde ac si per cribrum excolari videatur, ex puriore putredine contrahit, cum febre ne dubites. Indaganti autem miti, curio febribus alius calor æqualis occurrit: quæ verò ex pituita ortum habent, talem calorem inæqualitate ostendit: tenacitas & pituita crassitudo, quæ dissoluitur ætate, vitæ esse in causa. Si quidem ex eo humoris, licet ex alius omnibus, ea pars prima omnino expirat, quæ iam attenuata fuerit: vitæ autem attenuatur, quod valde crassum existit. Quod si etiam natura frigidū fuerit, tunc difficultas augetur: ac proinde non torus humor, nec ex omni parte æqualiter, sed ex illa tantū, in qua putredo invaluerit, effluat, atque attenuatum effertur.

## CAPVT X.

Solent autē per circuitus asilidere, quæ admodum febres, alij etiam morbi particulares: vt hipituidines quædam, nonnullique aurium, capitis, necnō articulorum dolores. Vt igitur per hosce affectus videre licet, venas quidem in partibus quæ exacerbantur in tumorē attolli, atque inflammationē augeri, dolorēq; intendi, ac deniq; affluxum materis in vitis ad exteriora fieri. sic etiam in interioribus oportet imaginari ea omnia, quæ cum minimè cadant sub sensum nostrum, eandem tamē cum illis perpetuū analogiam fortuntur. Itaq; in laterum & pulmonis inflammationibus, circa accessionē quidem principia, tumores in crescentibus declinationibus autem, evaporescent, & submittuntur. Porro alibi a oobis est proditū, esse quatuor naturales potentias, a quibus dispensantur tri plantæ, tum animalia. Quarum prima quidem est, similibus attractrix: secunda, eorundem retentrix: tertia post has, altera: quarta deniq; alienorum expultrix. Doplex autem est in omnibus rebus alenum: alterum quidem qualitate, alterū verò quantitate. Accuratur autem hoc, ob eorum potentiam quæ in membris sunt, vel imbecillitate, vel robur. Ege-

nium si quæ valentes ipsæ partes existerint, & meatus qui in vitalem in ateriā deducunt, secundum naturam se habuerint, tunc membra sanata se ferunt. Vbi vero plus assumpta fuerit, quam alterari possit, omne id quod superfluum est, a virtute expultrice trahitur, excernitur. Quod si hæc imbecillitas fuerit, in eodem residet loco: ac si multum sit, grauat, distenditque: in acre, exedit, ac mordet: si cum & quod calidū est, calfacit: quod frigidum, manifeste refrigerat. Solet autem læpe excrementum ab aliis in alias partes transilluere, fortioribus nempe id temper a se pellitur, imbecillioribus autem imbecillioribus. Qui motus non cessat, donec in eas quæ omnia imbecillitas sint, obtrahantur humor incidit. Hinc verò ad fortiores relabi est impossibile. Idcirco per pleniores atque cacochymias, imbecilliores particule interstati solent variis fluxionū affectibus. Nihil igitur mirum, vel cerebrū, vel vniuersum caput, excrementis in se collectum, ad partes imbecilliores expellere, veluti ad aures, oculos, tēpora, labra, dentes, malas, palatū, gingiuas, gurgulionem, paristhiam, aut deniq; ad glandulas illic consistentes. Quod si ex his nihil imbecillitatem patiatur, ad pectus, pulmonem, fauces, gulam, ventriculum, ipsa fluxio delabatur. Sic uti igitur causa talium omnium morborū sepe numero est caput, ita & eas quæ in iecinore ac liene sunt inflammationes, aliquæ partes vicinæ, vel etiam ex remotionibus aliqua vna, vel plures, generant, augent, impitunt, ac per circuitum æspitant. Qui igitur neque non fuerit, primam inflammationis originē, ex fluxione in hepate incidente, suam ortum traxisse: ac quod deinceps exacerbetur, causam in ipsa parte patiente consiliter: vniq; non mirabitur in febribus quæ accenduntur ex hepate, ordinis proportionem. Confluit autem materia in vitis intermedium quidem (quatenus dictum est) impulsa ad inferioriores particulas, interdum ab illis attracta. Etenim calor natura est aptus ad conciliandas ac recipiendas fluxiones. Proinde in corporibus plenis, aut in quibus excrementa redvndant, magna porno ad eas defluit partes, quæ in caluerint vehementius. In his autem quæ operfluitantibus vacant, admodum pauca. Non parum verò & ad partes dolentes humoris soler confluere. Videtur itaq; manifeste, fluxionū causæ quæ ex ipsis partibus laborantibus oriuntur, esse duplices: quarum altera est, in ipse ætate caliditas: altera, excitatus dolor. At verò quod melius sit, aut deterius, quod influat, ex partibus mittentibus pendet: quod plus vel minus, tum ex his quæ mittunt, tum ex eis quæ recipiunt. Hæ igitur sunt differentiæ fluxionū, quæ sine partibus, quæ fluxiones admittunt, imbecillitate consistunt. Aliæ verò, & propter harum imbecillitatem, & propter earum robur, quæ excrementa transmittunt. Ceterum omnes quæ citra vulnus & contusionē, partibus adveniūt inflammationes, ex recentibus quæ a fortioribus membris propulsantur ad infirmiora, gignuntur. Vbi autem cōspiciat excrementa in particula inflammatione putruerint, calor quidam præter naturam accenditur, qui ad infirmatum membro in alia illi

Sanitate quam de fructu membra.

Excrementa semper a fortioribus, ad partes amonui in brallius mas trahi.

Febres ex hepate accensæ.

Fluxio scilicet humoris ad dolentem partem.

Inflammati partem quæ modo se per venat febrem.

*Nephriticus de  
lar cu horore  
inordinato, ac  
febre uti inor-  
dinata affli-  
gitur, quando  
abscessum su-  
gignit.*

*Renis evulsa  
in indicia.*

*Cervicula cu  
vrina cretata  
efficacissima  
viceratorem  
renum fuit me-  
te.  
Pila similes ex-  
creta sunt, que  
in vrinis cer-  
uiculis in vrinis  
sunt.*

*Diabetes  
Dysmen.*

*Vesica monstra-  
bit a renibus.  
Intestina non  
trahunt a ven-  
triculo.  
Diabetes causa  
est imbecillitas  
renum.*

*Appetentia ca-  
nina.*

*Appetentia ci-  
bi est animalis  
spes.*

necnon inordinata febre affligit, si per pronum decubitus atque in alteru latas permutacione, in ipso rene dolente suspensio cuiusdam poderis sensum ingeri percipiat, abscessum iam coactum esse conicere oportet. Quo concocto, pus mictum vel laborantem a dolore liberat, sic viceris in rene periculum affert: quod nisi illico cocatrice inducatur, egregie curatione recipit. At perseverantis viceris nomine ex vrina haud obsecure deprehenduntur. Adde quidd laborans creberrime in affectu rene dolorem sentit atque interdum cum vrina exiguum pus veluti ab vlcere exernitur. Similiter ramentu nonnunquam cum vrina excerni videtur: atque interim sanguis quoque, qui erosi iam vlcis est indicium. Quasi rupto aut referato aliquo vase, sanguis potest etiam profluere. Verum efficacissima exviceratoru renum est coiectura, si exigue quedam caruncula cum vrina excernantur: utpote quas renem essentiae partes, easque ob vehementer vlcis erosionem avulsas esse constat. Atque una cum lotio excernuntur pilis similia, probabilis mihi visum est, ea in venis, quae in renum capacitate, gigni: idque ex crassa lentisq materia, quam calor calcit exiccat: quae cuius la ne affectu non per diuretica sperari curacionem futuram, nec vniq spes me fecerit. Iam vesica, ubi longo tempore actus per ipsam vrinam transiunt, vlcibus affligi solet. Est et alius renu affectus, quo tenuis sanies sanguinis mingitur: cuius quidem exister causa, aut ipsorum imbecillitas renu, aut maxima relaxatio eorum meatu, per quos ex vena causa in renes percolatur vrina. Atque ad renes quoque pertinere is affectus videtur, quem alij a matris hydropem, alij profluuii vrinæ, alij diabete, alij dysia vocant: qui certe transmissibilis accidit. Quo morbo affecti, in explebili siti vexantur. Quare & exuberanter bibunt: & reddunt totum id quod biberunt, minime a sua qualitate mutati. Hic igitur renu vesicæ affectus, similis est leuitati ventriculi, intestinorumque. Igitur vel ex ventriculo secul per mesenterij venas, veluti arbores a terra per radices, alimentum ad sese trahit: sic etiam renes sibi quicquid in venis est aquosum, allicunt. Ceteru vesica non trahit a renibus: quemadmodum neque intestina a ventriculo: sed renes quidem per vtereras excernendo in vesicam mittunt: ventriculus autem in ieiunu, per intestinu ab Hero philo dictu dodecadactylum. Proinde diabets causa, renu imbecillitas, non potentium diutius continere vrinam, censenda est. Verumenimvero obiciat aliquis: si imbecilli sint renes, qui fieri potest, ut vrinam ad sese tam celeriter attrahant? Cui quidem responde- re licebit: quemadmodum canina appetentia, in ventriculo ore consistens, non potente ipso sustine repondu devoratoru, multa impetuose ingerere, eademque celeriter excernere cogit: sic in renibus etiam serosis humoris cupiditatem, una cum virum imbecillitate accidere. Vnde & humidata rem affatum trahere, & eam mox in vesicam pelere, ipsi renes coguntur. Quod aut vrinæ flur repente evenire possit, laxitas intestinorum non possit, veluti nec canina appetentia: ob id sit, quia cupiditas qua cibum appetit venter, animalis officium existit, quo citra sensum nostru fungi ne-

quaque potest. Renum vero desiderium est naturale, neque ab ipso sensu nostri afficiuntur. Proinde cum ad statum pervenit, ne sensum quidem movet, quemadmodum appetentia canina. Porro laborantes vehementer sint, quatuor accidentu discernimen a potione subire solent. Vnu, & quidem primum, vomitus est: alteru, velox per aliu excretio, aut fluore, aut laxitate intestinoru: tertium, quodd potius diutius quam par est, in ventriculo manet: quartu denique est diabete, siue vrinæ profusum. Occurrit interdum affectus alius diabete similis, & quidem ob ciborum multitudinem, qui nec crudi permanent, nec deiciuntur per alium, nec plenitudinem gignunt, nec etiam probe alere possunt, sed discurrunt, dissipantur. Cuius vt crebrior est, quam displaci, eventus, ita faciliorem curatione admittit. Quippe si prius quam ad summu pervenerit, ipsum cognoveris, haud ita difficulter curabitur. Atque is affectus, a celeri dissipatione ortum ducit, omnibus partibus attracticem, appetitricemque facultate servantibus. At vero ingentis sitis, quæ citra diabete accidit, causa est ventriculus, aut calida, aut sicca, aut vtrique intemperie laborans: maxime vero os ipsius: proxime ventriculo hepatis, sed maxime pars eius finis, simul inflammatis melleatibus venis, & ieiuno, & ventriculo, atque cum gula, pulmone. Quarum partium incendium marcor ut plurimu comitatur. Diabetes itaque proprius renum affectus existit, qui canis in ore ventriculi appetentia proportionem responderet, accedente præterea retentici facultate imbecillitate.

#### CAPVT IIII.

Vesicæ superveniunt symptomata, partim eorum tumores, dolores, veluti omnes ipsius præter naturam tumores, dolores, & quæ hos gignunt dispositiones: partim ipsi propria, ut ischuria, hoc est, vrinæ retentio: stranguria, hoc est, stillicidium vrinæ, præterea immoderata vrinæ profusio. Quæ quidem evacuationes vesicæ cum meatu vrinæ, ipsa haudquaquam affecta. At vero stillicidium vrinæ, si ob vrinæ acrimoniam fiat, symptoma vesicæ est, affectus vero minimè. Si vero aut ab vlcere, aut ab imbecillitate procedat, in vesicæ affectu consistit. Ceterum cum ab intemperie vesica sit imbecillior, propria vrinæ actio laeditur, quæ est vrinæ excretio: ad quæ animal excitari solet, cum vel a multitudine contentæ in ipsa materie vesica grauetur, vel a mordacitate convellitur. Quin etiam instrumentales affectus interdum imbecillitate inducere possunt: præterea omnes intemperantia, præcipueque illæ, quæ sæpe nonnullis eveniunt, cum frigore corripuntur. Ad hæc, ischuria symptoma supervenire solet vesicæ, ita quæ meiendi instrumentu interdum quiddam circa id quod in ea continetur, cõtrahi non potest, ut ipsum exprimat: interdum etiam, obstruendo inferiori meatu aut a crassius humoribus, aut a lapide impacto. Atque accidit nonnunquam vel ab inflammatione, vel ab alio id genus tumore, ut angustior reddatur meatus, vel etiam omnino obstruatur. Sciendum autem est, non vesicæ, sed meiendi munus, veluti etiã deiciendi, non intestinorum officium, pendere a voluntatis imperio. Quippe vesicæ officium vnicum est, cõtractio. At musculus qui vrinæ

*Sitientia videri  
maius, quon-  
iam accidit  
a potione subire  
possunt.*

*Sitis ingenti  
causa.*

*Diabetes pro-  
prius renum  
affectus est.*

*Ischuria.  
Stranguria.*

*Stillicidium vrinæ  
a quodâ sym-  
ptoma vesicæ.  
Et quando af-  
fectu non pro-  
prio evulsa.*

*Meiendi munus  
non vesicæ,  
prout a volun-  
tate imperat.  
Ductore de mu-  
nis, non intesti-  
norum, est vo-  
luntatis armum.*

VRINÆ

vrinæ meatum in circuitu ambit, in origine certius vesicæ positus, instrumentum est, cuius opus ab electione excitatur. Simile quoque affectum et visum habet musculus, qui refuâ intestini partem extremam ambit: proinde ipsius resolutione, neque vrinam vesicæ, neque alius stercorea, retinere potest sed præter voluntatem, ut vrinæ paulatim effluunt. Quare suppressio vrinæ fieri nequit ob affectum spinæ, aut ueruorum ab illa in dictos musculos exortorum (quod nonnulli putant, credentes vesicæ officium à voluntate pendere) sed ipsi in voluntaria excretio. Atqui ut nonnulli tum vrinarum, tum excrementorum alui de electionem totam ab electione procedere existimantes, hallucinari sunt: sic rursus alij, his è diuerso totum hoc opus naturæ purantes, ab scopo aberrant. Etenim cibi à ventriculo in intestinum transmissio, tota naturæ opus est: voluntas autem, extensio digiti. At alui defectio, & vrinæ redditio, vitroque instrumentum propriis suis facultatibus operante, perficitur. Rectum enim intestinum, atque vesica, naturali facultate vtuntur: musculus vero, et quæ animalis & voluntaria vocatur. Quippe musculi qui solent concubere fluores, ab opere quiescant, abdominis musculus munere suo fungentibus: maxime verò medicum. Quum igitur vesicæ corpus ita fuerit affectum, ut quod in ea continetur exprimeri nequeat, vrinâ supprimatur, vocaturq; symptoma id ischiuria. Accidit etiam interdum, propter ipsius sensum obfusum, vt nō reddatur vrinâ, citra rati expultricis facultatis lesionem: nimirum si propriæ vesicæ nervi afficiantur, nervus musculi ceruicem eius constringentis, munere suo fungentibus. Qui quidem si relaxantur, vrinâ præter voluntatem excremitur. Ob spinæ etiam laxationem ad interiora, supprimi aliquando vrinâ consuevit: orta videlicet plelegmone in affecta particula. Quemadmodum vertebri ad externas partes luxati, invito vrinam profluere vidimus, ob resolutum nervum musculi vesicam ipsam claudentis. Retenta enī longo tempore vrinâ, vel ob somnum diuturnum, vel ob negotia vrgentia, ipsa vesica extenditur, atque vrinâ supprimitur, contra citius facultate propter tensionem immo dicam lesa. Præterea ob sanguinum & pus crassiusculum, interdum retinetur vrinâ. In pueris etiam, quos lapis in vesica et uciabat, vidimus septennumero ipsam vrinam supprimi. Eos itaque, resupino figurato corpore, adeo concusimus, vt à meatu lapis dimoueretur. Ceterum grunones vocatos, non solum eos qui in vesica, sed multo magis illos quoque qui in intestinis, ventriculo, atque thorace nonnunquam continentur, animi defectuo, & color pallidus se qui solet: pulsus vero parvus, obscurus, & frequens apparet: laboransque ipse, cum anxietate resolutur. Sunt autem ad intentionem affectus sedes, non solum præsentia symptomata, sed præterita etiam investiganda. Nonnihil etiam confert quantitas puris (si quando excretnatur) & misturam eius cum vrinâ, considerare. Nam si pus cum lotio exactè permixtum sit, à supernis aliunde partibus consistit. Si vero sine vrinâ excretnatur, in vesica consistit suppurationem indi-

cat. Sed quod mediam inter hæc conditionem seruauerit, id à reibus descendisse, certum indicium est. Similiter expendendum est, si rupta vomica, cum notis affectu loci, vlcus aliquod quoque signū appareat. Nam & hoc, aut exactè, aut mediocriter, aut omnino nihil cum vrinâ misceatur. Atq; vocatum quiddè ramentū, vlcus: essentia verò, proprietates, affectus partis proprii indecū est. Quippe partes à vesica avulsi, laniati à renibus, verò, sunt carunculae similes. Similiter vbi ex sublimioribus pars aliqua affecta est, excrementa cū vrinâ ciecta inueniunt, & ea suspectarum partium essentia cognoscere oportet. Igitur cum vrinâ expurgatur gibbus hepatis partem, atq; omnes quot quot bis superiores existit per alium verò pars iecinoris sima, intestina, ventriculus, lien. Præter has alie quædam sunt purgationes, sed raræ: vt quæ thorax & pulmo per alium purgatur: quæ sub septo transuerso sunt pollicis partes, per vrinâ. Vidimus enī nos pulmoneis vomica expurgari similiter per vrinâ: reiecto videlicet purē, à pulmone quidem per læuem arteriâ, in sinistram cordis ventriculū: à corde autem, per arteriam magnā, ad renes: aque illic tandem per vtreas ad vesicam. Etenim vt à concava vena, ita ex magna arteria, tam ad renes descendunt.

## CAPVT V.

Vteri affectuum plurimū differtentia existunt. Siquidem mulierum quæ histericis dispositionibus corripiuntur, alie quidem sine sensu immobiles iacent, cum obscuro paruōq; pulsu, vel omnino sine vilo pulsu. Alie autem sentiunt, atque moueri possunt, integræ ratione fruuntur, sed tamen deliquio animi, difficultatē spirationis laborant. Alie denique crura simul & brachia contrahunt. Porro nonnulli ad explorandum, nunquid respiratio perierit, flocculos lang carpes, suspendi corā vtriusq; iubent. Alij poculū aque plenum ori vetriculi imponūt. Quippe immo omnino seruari humores aiunt, si spiratio tota sit intercepta. Etenim in cōfessio est, & spirationem à vita, & vitā à spiratioe separari nō posse: adeo vt viuente non spirare, & spirante non viuere, sit impossibile. Quod si in animalibus, quæ in laetibus delitescūt, nulla appareat respiratio nota, neq; ob id mirari debemus, quum videlicet ea animalia sint frigida. Quippe maximus visus spirationis est, vt intus calor & refrigeratio & ventilatione lenietur. Quare haud ita difficile fuerit pendere, exiguum illum calorem in eis derelictū, arteriarū cordisq; motu seruari: quæ actio à quibusdā medicis transpiratio vocatur. Similiter etiam, perierunt ob vteri affectum spiratione, quoniam vniuersum corpus refrigeratur, (id quod peripneumonia fieri potest, vt nullo attracto per os spirari, aut reddito, transpiratio, quæ per arterias fit, perseueret, licet adeo interdum exigua, vt sensum omnino effugiat. Accidit autē vteri suffocatio magna ex parte viduus mulieribus priuierim, quæ quum antea probè repurgarentur, pariter, atque viroreum congestu fruerentur, his omnibus postea priuierim. Quare verisimile est, ob retenta menstrua, vel semine cohibito, eiusmodi mulieres vteri dispositionibus infestari: idq; fortasse magis ob se

Kk

musculus vesicæ atq; sedes, atq; secundum instrumentum im-

Uterio quodam modo.

Vrinâ suppressa ischiuria.

Grunones in corpore præter naturam contenti, quæ frequenter symptomatica.

Pus cum vrinâ excretnatur, mistum ipsius esse mulierum don.

Ramentum est figuram vlcus, essentia proprietas, affectus partis proprii indecū est.

Partes à vesica avulsi, laniati, à renibus, sunt carunculae similes. Vtrumque significat per quam rem generem partem.

Palmonis vomica est aliquid per vrinam purgari. Vteri magna caruncula multum ad renes.

Vteri affectus plurima differtentia.

Respiratioem perierit, omnino, aut si prius fuerit, quod modo deprehendatur.

Spiratio à vita separari nō potest, uti à respiratioe, ipsa vita.

Respiratioem viti.

Latentium animalium calor, maxime cordis, ex arteria, non finitur.

Transpiratio per arterias.

Vteri suffocatio quibus præterita accidit. Vteri suffocatio ob retenta menstrua vel semine cohibito, accidit.

Semen mulie-  
bre quale.

Semen retentum  
nonnullis viris  
qua symptomata  
inducit.

Semen retentum  
quoniam multum  
quoniam infertur  
grauissima sym-  
ptomata.

Libidini indol-  
gere multum mo-  
destus viri va-  
letudinis gra-  
tis.  
Dioxygenes Cyni-  
cus.

Animalia om-  
nia quo pacto  
excitantur ad  
venenum.

Phalagium illud.

Scorpionis i-  
ctus.

Torpore ma-  
rina, pisciatur  
maxime reddat  
torpidum, per  
medium triden-  
tem.  
Heraclius la-  
pus.

Veneno retin-  
etur, quoniam  
distinguuntur  
ab aliis quo ob  
prauum corporis  
fuerit interit.

men retentum. Nam quum muliebre semen hu-  
midius atq; frigidius sit, ipsum excerni oportet,  
praesertim si copia redvnder. Nec secus enam io  
viris. Sunt quippe nonnulli eorum, quos protin-  
us ad iuuenture, concubitus imbecilliores red-  
dit. Alij, nisi assidue coeant, capitis grauitate infe-  
statur, cibos fastidiunt, febrib. sunt obnoxii, dete-  
rius coquunt & appetunt, ac deniq; torpore, pi-  
gritia, ac melancholici accidunt. molestatur.  
Proinde ex retento semine, quam ex suppressis  
menstruis, videtur multo longemaior noxa eve-  
nire posse corporibus, eorū praesertim, qui suapte  
natura viciosis abvndat humoribus, plenitū sūt,  
& in ocio educati: quicquid autem antea nihil fecissent  
ad libidini reliqui, astatim coēnere caperunt. In  
quibus sanē cōsuetio, naturalē excernendi ipsum  
cupiditatē, actionis causam existere. Etenim quā  
tale & tantum ipsum semē evasit, neminem nō  
ad sui excrationē vi quadā stimulat. Ob idq; pla-  
nē constat, modestos viros, non ob voluptatem, sed  
vi ab impedimento praeserventur, indulgere  
libidini, perinde ac si nulla sit in coniugata volu-  
ptas. Ita Diogenem Cynicum narrat, virū alo-  
qui mortualem omnium (quod ad cōtinentiam  
pertinet) cōstantissimū, libidini tamē nauasie o-  
perī, nō ad cōmūcta illi voluptate veluti bono a-  
liquo, illectum, sed vi noxiā, quae a retento seme-  
ne provenire solet, arceret. Eum namq; meretrix  
adire pollicita, quum ducitus cessaret, ipse manu  
pudendis admota, semen excussit, ac venientem  
dein mulierculā remisit, inquiens: Manus hyme-  
nium celebrando praevēnit te. Sic etiā arbitror  
animalia omnia excitari ad coitum, non quod ex-  
citantur voluptatē boni cuiuspiā speciei prae se  
ferre, sed vi semen, quod retentum ipsa molestat,  
excernit: haud secus quā ducendi iteroris,  
excernendiq; vixit desiderio suapte oatura mo-  
tuetur. Fieri autē potest, vt profluantibus men-  
struis, retineatur in viduis semen, gravissimāq;  
inducat symptomata. Nec sanē cupiū mirum vi-  
deri debet, si exiguus humor in vna parte cōten-  
tus, tantorū accidentiū sit causa: quā ā phalagii  
ictu affici totū corpus videatur, exguo veneno  
per minimū foramen iniecto. Praeterea scorpio-  
nis ictus breui admodum tempore gravissima  
symptomata inducit, quāvis in illius aculeo fora-  
mē nullū videatur. Rationi tamen est cōsonum,  
vt vel ā spiritu quodā, vel tenui humiditate inie-  
cta, accidentia illa proficiantur. Sunt qui putāt,  
res quasdā solo tactu per qualitatē vim, ea quae  
ipsis vicina sūt, alterare posse: idq; planē vident in  
marina torpedine aiūt, vtpote cui tā vehemēs sit  
potentia, vt per piscatoris tridentem transmissa  
ad manū alterationē, totū reddat repente torpi-  
dū. Similis etiā facultas inest Heraclio lapidi: ser-  
rum siquidē, qd tetigerit, et adharet. Deinde si a-  
liud, id quod primū tactum fuerit, tetigerit, simi-  
liter vt primū illi inhaerebit: ac sic deinceps. Por-  
rō iidem affectūs oriri possunt & ab humoribus  
in corpore putrescentibus, & ab epoto veneno. 60  
tū tamē qui venenum hauserunt, ab iis qui aliter  
sunt affecti, discerni possunt. Quū enim homo  
suapte natura probis succis abvndans, ac salu-  
bri secundū omnia vīus victus ratione, repente  
moritur (vt letali assumpto veneno fieri contin-

git) deinde corpus aut luens, aut nigricans, aut  
varium apparet, aut distūctū, aut grauem red-  
dit odorem putredinis, hūc venenum sumpsisse  
aiunt. Igitur si cuiusmodi affectibus nos infestari  
fateamur, qui ex nobismet ipsis accepto sūt ori-  
ginis impetu, similes sint iis qui epoto veneno  
eveniūt: nihil mirum fuerit, si etiā vitiatū semen,  
aut menstrū, huiusmodi, quō retinetur, aut pu-  
trescit iō corpore, grauius symptomata inducat,  
iis praesertim, qui vt afficiuntur, sunt apti. Si qua-  
dem quantū vim habeat efficiendū rei apertū,  
in canibus licet videre. Quum enim reliquorum  
animalium nullum rabie arripiatur, solus canis  
eo affectu corripitur, tantūq; sit in ipso humorū  
corruptio, vt vel solū eius spiritum, si humanū  
corpus cōtingit, rabie excitare sit potens. Quod  
vero ad gignendos vteri affectūs maiorem vim  
habeat semen quā menstrū retentum, vel ex  
hoc loquatur, quum supprimuntur menses mulie-  
ribus cōiugatis, etsi pluribus accidentibus infe-  
stentur, nunquā tamen ad inspirationē priuātur,  
aut animae deliquio laborant: quod solent non-  
nullae viduae, licet ea quae vt aurea, aut paulo mi-  
nus, quod periret ad menstrū, purgetur. Quae  
sanē symptomata Plato exponere cupiens; sic in  
Timaeo edidit: Ea para quae in mulieribus & v-  
terus & vulua nominatur, quum sit animal ali-  
dum generādi, si intempestiue ducit infecundū  
manent, admodum indignatur, etiamq; per totū  
corpus, ac meatus spirituum obstruitur, res-  
piratq; oon finens, in extremā anxietatē addu-  
cit, & alios morbos complures excitat. Hae Plato.  
Ceterum illius agnationis vteri, quam mulie-  
res percipiunt, nō est causa ascensus eius visq;  
ad regionē diaphragmatis, vt nonnulli putantur.  
Nam si aliquod ex vtero videatur ascendere, id p-  
exugum est. Sed vteri ipsius tensiones esse po-  
tius in causa dixerim, cur tangentibus obstrui-  
bus, modō sursum, modō retrahi in latus videat-  
ur. Nam simul cum vtero, ceruicē quoq; ipsius  
retrahi necesse est. Quum igitur ad vterum multa  
admodum venarum ora perveniant, per quas  
ex cōcava vena sanguinem attrahere potest, & fa-  
nē ob plenitudinem venae earum, tum vinculo-  
rum quae ex illis dependent, cōtingit vterum sursum,  
aut etiam ad latus retrahi. Siquidem omnis coo-  
vulso sit aut ā plenitudine, aut ab inanitione. Ple-  
nitudo quippe, repleta corpora & in latum, & io  
profundum extendit, sed longit udimē reddit bre-  
uiorem. Quō autem breuiora sunt, eo magis ad  
suam originem retrahuntur. Dum itaq; descen-  
dens sanguis ad vterum, ingredi ad ipsius inter-  
nam capacitātē non potest, aut quia crafior est,  
quā vt vaforum ora permeare possit: aut quia  
clausa sunt officia, multiplicatus in venis, eas ex-  
tēdit, atq; viciā ipsius vincula madefacit: ad quo-  
rum omnium tensionem, continuō vterum re-  
trahi est necesse. Quī si vndiq; trahatur aequali-  
ter, recta erit & sine inclināone ipsius transmuta-  
tio: nisi vtrū inaequaliter, ad partem vehementi-  
us trahentem inteu dunt. Non ergo veluti ani-  
mal errabundum, aliā ad alium locum discurrat  
in mulierib. vterus, sed ab extensione retrahitur.  
Quod si quispiam dixerit, vteri corpus tunc mi-  
nimū affectū esse, sed per uersionē laborare, haud  
absur-

Afficienda rei  
apertio, ma-  
ximū ab eo  
perinde efficitur.  
Causa sicut ra-  
bie corripitur  
eiusq; spiritum  
raborem excita-  
re est potens.

Plato.

Vterum aut  
ascendens ad  
regionem dia-  
aphragmatis per  
vteri infusca-  
tionē, sed non  
ipsius vasa non  
di, quia ratio-  
ne videtur va-  
sa.

Conuulsio om-  
niū sit aut ā ple-  
nitudine, aut  
ab inanitione.

*Vetri per ver-  
fieri ad super-  
fies sequitur  
vntroa.  
Vna que abf-  
que vteri per-  
uentione mo-  
leſtis, et reuol-  
um oritur.*

*Menſtrua deſe-  
rum mulieris,  
in lac inſeſſi,  
ut pregnan-  
tibus exiſſim-  
a paupertate.*

*Menſtrua deſe-  
cunt, quo p-  
ſe deprehend-  
ant, an ſit  
granda ma-  
lue aut no.*

*Colic inſeſſi-  
mum ſupportari  
nec ſum nec  
la habent.*

*Suppreſſus men-  
ſis que ſequit  
in ſymptoma-  
ta.*

*Menſtrua ſu-  
per ſimulacris,  
qua immo-  
diſſimata.*

abſurda ſi dixiſſe videbitur. Igitur peruerſiones  
vteri, quo quæ diximus modo, ad ſuppreſſa ſequi  
menſtrua: eas tamē ob hoc, accidentium quæ  
in animalis corpore apparent, cauſas eſſe, nequa-  
quam putandum eſt. Quæ verò citra peruerſio-  
nem, aut menſtruum retentionem, viduas mo-  
leſtant noxæ, hæc ob retentum ſemen evenire pu-  
tantur. Exterum pro multitudine, qualitatīve  
ratione, tum menſtruum, tum ſeminis, aliis al-  
teræ accidentium ſpecies oriri ſolent. Etenim uo-  
xia cauſa vniuerſum corpus refrigerare potente,  
adeo vehementer omnes partes refrigerantur, vt  
& reſpiratio, & arteriarum pulſus, ſenſu depre-  
hendi non poſſint. Quæ ſi vel craſſa fuerit, vel æ-  
ris, conuulſiones: ſi verò atræ bilis naturā refe-  
rar, mœſtitiā inducet: quemadmodū animi quo-  
que deliquia, & ad fortes extenſiones, & refrige-  
rationes, & oris ventriculi affectus, ſubſequi cō-  
ſueverunt. Porro ſi mulier nec pregnans, nec  
puerpera, lac poſſideat, menſtrua ei deſecernit.  
At nullo in mammis laſte apparente, menſtrua  
ſuppreſſa hiſce notis deprehenduntur. Grauiſſa  
totum corpus infeſtat, necnon faſtidium, atque  
inequalis horror. Quod ſi citra horrorem ine-  
qualitatis aliqua fuerit, atque faſtidium, appetit  
mulier quædam aliena, vt (exempli gratiā) extrin-  
ſecos carbones, iube vt obſtetrici vteri ceruicem  
tangat. Nam ſi citra duriem clauiſa inueniatur,  
eam pregnanrem eſſe conſicies. Si verò etiam du-  
rities aſſit, affectum aliquem in vtero eſſe poſſe  
dit. Oportet itaq; ſpeculari obſtetricem, ad quā  
partē vel declinet, vel retrahatur vterus: nā in ea  
parte affectū vteri ſedē eſſe cōiicies. Atq; in qui-  
buſdā feminis, eius partes dolor cum grauitate,  
nōnihil poteſt ſignificare: quæ inſit in coxā dolor  
interdum tranſit, & cruſi ſuſum, qd ē regione eſt,  
per inceſſum claudicat. Quod ſi ſillogion tempore  
ſupprimatur menſtrua, nullamq; medicus mulie-  
ri vacuationē, pmoueatur, tumor aliqui pter na-  
turā, in illius interdum oritur, oſtendens nimī-  
um ex internis partib; quāpiā eſſe inſtāmarā.  
Nonnullis panus in extrema ilium parte exci-  
tatur, vel vti viris quoq; eodem in loco nōnunquā  
oriri ſolet. \* Qui panus in quadam muliere fuit  
ſuppuratus, adeo vt opus fuerit ſectiōne. Iuxta  
hāc ipſam partem vidimus colon inteſtinum &  
ſuppuratum, & ſectum: interdum ignorātib; me-  
dicis imperitis quidā incidere, interdum in-  
telligentib; quoq;. \* Cæterum quorū ſuppu-  
rari cōtingit colū, ſemper facile curationem re-  
cepit: vteri verò ſectiōnes, ægrius cōglutinātur.  
Itaq; ſymptomata huiusmodi conſueverunt ſe-  
qui ſuppreſſa menſtrua: ac præterea lumborū, &  
colli, & ſincipitis dolor, qui ad oculorū vſq; radi-  
ces extenditur: item febris ardentes, & nigricā-  
tes vrinæ, cum rubra quadā ſanie, perinde ac ſi æ-  
que, in qua nuper macerata carnes abluty fuerūt,  
fuliginem quid miſcuiffet. Quibuſdā vrina aut  
difficiliter redditur, aut omnino ſupprimitur.  
Quod ſi per alium quēpiā corporis locum ſan-  
guis effluerit, aut inſtāmarā, aut eryſipelas ex-  
citetur, an menſtrua purgantur interrogare de-  
bet. Si quidem nihil horum accidere ſolet, inte-  
grè reſurgat. Quum verò immo dicē vacuū  
menſes, color ſequitur ſædus, pedes molli tumo

re attollit, corporis robur proſternitur, vitia-  
tur ciborū tum cōcoctio, tum cupiditas. Sed ac-  
cidit interdum ſex minis muliebri vocatū proflu-  
uium, vel vtero haudquaquā affecto, quā videll-  
cet vniuerſum corpus per ipſum interdum pur-  
gatur: quemadmodum per renes quoq; aliquan-  
do ſolet vacuari. Id verò poſſiſimū ſit, ſi mulier  
laxia ſit carnis, & pituitioſa. Atq; id quod excer-  
nitur, nōnūquam rubra ſanies eſt, interdum a-  
quoſa, & ſuppallida. Quod ſi purus fuerit ſan-  
guis, qualis ex diſſecta vena profluū, diligenter  
animadvertere oportet, num eroſio ſit aliqua in  
vtero. Ea verò magna ex parte in ceruice po-  
tius quā alibi cōtingere ſolet: diſcerniturq; per ex-  
creta ſaniā, ſi fuerit profunda: ſi verò circa os cet  
uicis cōſtiterit, non ſolū per hanc, ſed per taſtū  
etiā cognofci poteſt. Atq; prægnites quoq;, quā  
ora venarū in ceruice apertuntur, excernunt ſan-  
guinem. Ergo ſi mulier vtero graui, ſubito ex-  
nucnetur mēme, abortus ſequitur. Atq; geminos  
ferens, ſi altera mēma extenuetur, alteram amit-  
tit: & omnino ſi dextra mēma extenuata eſt, ma-  
rē: ſi ſiniſtra, ſceminā ædet. Mares ſiquidem dex-  
tris, ſceminæ magis cōtinentur ſiniſtris vteri par-  
tibus: atq; raro aliter accidit. Si mulier promptē  
quidem conceperit, dein ſecundo, aut tertio, aut  
quarto imprægnationis menſe ſortum eiecerit,  
circa vteri acetabula humorē pituitioſum abyn-  
dare, atq; idcirco venarū arteriarūq; eius lo-  
ci ad ora vaſorum in vterum deſcendentium, ne-  
xum debiliorem eſſe, cōſiciendum eſt, vt ſartum  
ob grauitatē ferre nequeat, ſed abruptur facile.

## CAPVT VI.

At colic viciu deprehenditur ex dolore infe-  
ſtante ipſum: necnon ex iis, quæ familiaria viceri,  
vnā cum vrina purgantur. Cæterum hæc ab iis  
quæ a veſica excernuntur, miſcelſe modus diſtin-  
guir. Nam quod ex cole deſiit, in primo ſtatim  
exitu excuſſum, vrinā præuenire cōſuecit. Quod  
verò a veſica emittitur, vrinæ admixtum videtur.  
Quinetiam aſſiduē inter mēciendū mordicus do-  
lent pudendorū vicera, præcipue quum vel cru-  
ſtula, vel fordibus ſolutis, pura remaneſcunt. Por-  
ro gonorrhœa eſt ſeminis aſſidua excretio, & in  
vira, quæ ſit cole haudquaquam extenſo. Priapi-  
ſmus verò eſt permanēs colic tumor extenſio v-  
le longitudinem a tēg circulum, nullo ſtimulante  
ad libidinem aut deſiderio, aut acquiſito calore,  
vt quibuſdā conſuevit accidere, qui ſupini de-  
cumbunt. Igitur quemadmodum omnia corpo-  
ris noſtri excrementa, duobus modis vacuantur  
(interdum enim a cōninentibus ipſa corporibus  
excernuntur, interdū ſpontē profluunt, eod quod  
ob imbecillitatem ab ipſis retineri nēqueant: ex co-  
poribus) ita de ſemine quoq; dicendum eſt. Nam  
in huiusmodi omnibus, vt excernere tēpēſtiū,  
ita continere, naturæ eſt officium. Verū ſecre-  
tio ſit, aperto fluxionis meatu: ac reliquo conce-  
ptaculi ſpatio & contracto, & ad apertum iam  
meatum, quicquid intus continetur, pellente. Re-  
tentio ſit, quum clauſus manet meatus, & cōten-  
tu a cōnimente haudquaquam impellitur, ſed  
potius per contractionem comprehenditur, &  
retinetur. Hoc modo cōtēnti in cauſis inſtrum-  
tis humores, per integram valetudinem natura-

*Profluuiū ma-  
lueſtu cauſa.*

*Pregnati ſex  
tenentur mē-  
ma abortui ſe-  
quuntur.*

*Mari conſi-  
tur dextru, ſi-  
miſtra ſiniſtru.*

*Calic viciu  
de deprehend-  
tar.*

*Excretio a cole  
ex veſica, quo-  
modo diſtincta  
da.*

*Gonorrhœa  
eſt ſemine abu-  
da profluuiū,  
vira, quæ ſit  
cole haudqua-  
quam extenſo.*

*Priapiſmus  
quid.*

*Excernit cor-  
poris duob; mo-  
do vacuari.*

*Excretio quo-  
modo ſit.*

*Retentio ve-  
ſit.*

liter & excernuntur, & retinentur. In illis autem qui præter naturam se habent, retentione quidem, ob excreticis facultatis imbecillitatem: excretio verò, ob retenticiis infirmitatem evenit: vel ob dispositionem aliquam, quæ haud secus quam naturalis ipsa excretoria vis partes movere possit. Id quod in seminariis vasibus videre licet, ubi quis vel comitiali morbo, vel convulsione violentè fuerit correptus. Ceterum videmus alias quoque partes, ut manus, pedes, aut digitos convelli, modò simul cù totius corporis convulsione, modò ipsi soli affectis. Quare minimè præter naturam fuerit etiam in seminariis vasibus, & quidem interdum solis, eiusmodi excitari dispositionem: quemadmodum & gonorrhœam, quæ vixit, quam quis invitus emittit, proportionè respondet, quum retentricem videlicet facultatem resolvit contingerit. Gonorrhœa igitur in situ mentorum seminis est affectus, non pudendorum, quibus ceu via per quam excernatur, vitur semine. Priapismus verò plane colicis est accidens, quâquam ad arterias eius potest referri: vixit quæ solæ interdum huiusmodi habeant præter naturam dispositionem, quali affici cõsueverunt, quâ naturaliter totus coles intenditur. Atqui à spiritu ipsum in humore atrolli, manifestè patet iis, qui celeritatem eius, & quum iterum retinet, perpendunt. Quippe nullus humor tam subito in alteram partem mutationem efficere possit. Quum igitur pudendi corpus sit vixitque fistulosum, facilè à vaporoso spiritu per arterias affluente, ubi quis libidinis impetu stimulat, aut dum ob supinum decubium calfacti sunt lumbi, extenditur: glande ipsius semper magnitudinem æqualem servante, quod fistulosus in ipsam nervus non ingrediatur. Natura etenim corporis partes fingens, perficiensque, fecit ut ipse citra doctrinam, proprias actiones aggredieretur. Quippe omnium quæ à cõsilio & voluntate pendunt actionum instrumenta, esse per se docta videntur animalia: quæ omnia simulatque genita sunt, & spirant, & vocem edunt. Quare mirum esse non debet, genitales partes, eas actiones, quarum gratia à natura sunt institutæ, protinus ab initio cognoscere. Vterus siquidem, quum semine genitale concepit, donec fuerit perfectus factus, exactè clausus permanet: perfectò verò factu, plurimum aperitur, ac deinde sic apertus excludit. Populares autem hæc, propter creberrimum eventum, continentur: vixitque qui nihil quod revera sit admirabile, sed ea duntaxat, quæ rara videntur, prosequuntur admiratione. Quid autem in rerum natura potest admirabilis contingere, quàm quod novem per penitus mensibus clauditur os vteri adeò exactè, ut ne specilli quidem acumen admittat: perfectò autem factu, vixitque adeo distenditur, ut totum animal per ipsum egredi possit? Ne igitur dubites pudendorum vim per se doctam esse: ut fistulosum hoc, nervosumque corpus, ubi ad coitum insurgit animal, à naturali facultate, quæ ipsum potest atrollere, protinus distendatur. Cuius rei simile, & in corde, & arteria planè videre est: nisi quod horum motus perpetuus existit, quæ necessaria nobis est eorū actio: fistulosus verò nervus nō semper movetur, sed quū v-

fus requirit. Quū ergo sic fuerit extensus, sequitur atque illū replet ex arteriis spiritus: quæadmodum pulmo thoracè, ob eā quam habet ad ipsius motum consequentem. Atque eam actionē statim est ut ad nervū, quàm ad arterias referas: quū præsertim omnes functiones, ex propria partium essentia, non ex earum situ, provenire, rationi cõsonum sit. Arterix itaque nulli aliū in pudendo habet actionis vim, quā in universo corpore: licet cal factis lumbis par sit, ut arterix calidiores reddatur, & magis etiā pateant ipsarum ora. Quamobrem nō exigui tunc spiritus essentiam, in fistulosum nervū effundunt: qui paulatim impletus, collem extendit, ita ut tota ipsius essentia consistere in fistuloso nervo videatur. Ex ductis igitur consistat, vel ob arteriarum ora immo dicè patefacta, vel vaporosum spiritū in fistuloso nervo ortū, priapismus oritur. Ceterum ab vixitque ipsum fieri posse existimo, crebris tamen ob arteriarum orapattena. Porro medicamenta excitandæ tentiginis vim obtemperant, tum epotatū pubi lumbisque admota, calida omniū, ac flatulenta sunt: quemadmodum cõtraria omnia, minimè status excitat, ac potius refrigerant, quàm calfaciant. Sunt præterea alimenta quædam, quæ, quod plurimum gignit seminis, excitare ad libidinem possunt. Iā vero qui quum plurimum semine abvident, à cõcubitu abstinent, ita interdum priapismo vixitari solent, præsertim si veneris imaginibus molestantur, nec studeat ut multa exercitatione sanguinis abundantia dissipent. At cantores & athletæ, qui is inde ab initio nullam vixit partem veneris illecebris contramittunt, nulli admittentes eiusmodi vel cogitationem, vel imaginationem, iis pudenda & exilia, & rugosa fieri, vel vixit senibus, cõsueverunt. Siquidè præter cetera quæ accidere solent iis, qui protinus iuventute prima immo dicè se se permittunt libidini, id etiā evenit, ut horum locorum vasa, à plurius potentia, maiorem ad se sanguinis copiam alliciant, & corundem cupiditas magis increseat. Ignavia siquidem (vixitque Plato) exolvit: propriam autem officij exercitatio, robur augere solet. Sic mamma quoque, in iis quæ non dū impregnata fuerunt, cõtrariæ permanent: in aliis verò à partu infantulos suos lactatibus, vastissimæ evadunt, atque ita magnè permanent, lac fundentes quandiu fortè lactauerint: quo ablato, haud ita multo post à lactis generatione desinunt.

## GALENI PERGAMENI de differentiis febrium, lib. I.

### CAPVT I.



Præcipue ac maxime principales febrium differentie sunt, quæ sumuntur ab ipsa febris substantia, quæ in calore, præter naturam consistit: ut si dicimus, febrium aliarum quædam mordaces, aliarum verò sunt mites. At reliquæ differentie, ab accidente aliquo deducuntur: ut quæ dicimus, febrium aliarum pallidæ, aliarum ruberæ, aliarum liuidæ. Porro differentie caloris præter naturam, & ex eo quod magis & minus, & ex materia in qua calor accenditur, & ex modo motus eiusdem caloris, sumuntur. Sunt autem omnino evidentes, quæ

*Semen externum in vita per convulsiones.*

*Gonorrhœa in seminario seminis est effectus. Priapismus colicis est accidens.*

*Calor à spiritu intenditur.*

*Glandem penis semper magnitudinem eandem servat. Partem omnem utero doctrinam aggrederetur proprias facultates.*

*Populares eas tantum quæ rarè videntur, prosequuntur admiratione.*

*Priapismus est ad nervum potius referendum esse, quàm ad arterias.*

*Lumbi inter alios, sentibus, arteria pennis calidiores redduntur.*

*Pennis spiritus laici in nervo fistuloso consistit. Priapismus vero de oratur.*

*Medicamenta excitanda tentiginis qualia existant.*

*Alimenta venerea. Priapismus qui solent vixitari plurimum.*

*Centenis alii quàm nostro facilius potest esse contramittitur.*

*Pudenda calidiora redduntur calidiora.*

*Ignavia robur exolvit. Exercitatio vixitque augere solet. Mamma.*



quæ in eo quod magis aut minus calor est accen-  
sus, consistunt. Quo in genere differentiæ, cõsue-  
uerunt medici magnam ac parvam febrem voca-  
re, improprie quidem rei quali, nomẽ quanti tri-  
buentes. Quæ verò a caloris materia ducuntur,  
maximè proprie differentiæ caloræ præter na-  
turam sunt. Atq; hæc sanè ternario numero am-  
biuntur. Nam aut incallescit ipse cordis corpus:  
aut qui continentur in ventriculis eius humo-  
res: aut sola quidem aërea subtilitasq; substantia  
sufficiet in caluit: humores autem & solida cor-  
pora incallescunt quidem adhuc, nõdum autem  
sunt calefacta. Mista siquidem est in arteriis om-  
nibus spirantibus per infinita foramina, aëreâ  
substantia sanguinis, ac nihilo minus in corde ip-  
so, ceu « confluxu & conspirabili cum vniuersis  
arteriis. Incipit itaque hic præter naturam calor,  
quem nominamus febrem, aliis eum eorum,  
quem nuper diximus: spargitur autem, atque vni-  
cum pariente afficit duo reliqua genera. Facili-  
ma igitur ab humoribus ad spiritum caliditatis  
transumptio: nõ æquè autem promptè vni cum  
spiritu, accenduntur humores. Corpus etiam so-  
lidum, humoribus atque aëreâ substantiæ faci-  
lius impartitur calorem, quam ipsum ab eisdem  
suscipiat. Omnia siquidẽ substantia tenuis, pro-  
pterea alteratur quæ crassa. Est autem tenuissi-  
ma quidem aëris: crassissima verò corporum so-  
lidorum: media humorum substantia existit. Cæ-  
terum solidas partes, continentia: humores, con-  
tenta: spiritus, impellentia appellauit Hippo-  
crates.

## CAPVT II.

Quod igitur ex laboribus, ira, tristitia, solis ar-  
donibus, frigore, vigiliis, cruditate, ebrietate, &  
crapula, nonnulli febriçatæ cernantur, omnib.  
est in confesso: quemadmodum etiam, quod pe-  
tilens aëris constitutio febres conciliet: quodq;  
periculosa sit conversatio cum laborantibus pe-  
tilent morbo, quum nimirum in non secus sit  
contragiosus, quam scabies aut leproditudo. Sed ne  
que tutum est cum iis qui tunc correpti sunt, cõ-  
uersari: neq; (vt summam dicam) cum illis q; spiri-  
tum putrem reddunt. Iam verò qui consuetæ ex-  
ercitina omiserint, & aliis morborum generibus,  
& febribus maximè corripuntur. Plethora e-  
tiam, vitioli cibi, medicam enra, æstusq; circa ca-  
nitis syderis ortum, atq; alia id genus complura,  
similiter febres accendunt.

## CAPVT III.

Igitur calidum, frigidum, humidum, atq; sic-  
cum, corporum elementa existunt: ex ipsorumq;  
temperaturis primi constituuntur morbi: quoru  
vnius est febris, vbi in corde quædam præter na-  
turam caliditas generatur. At differentiæ calor-  
is, a triplici differentia materiæ desumebantur.  
Siquid vel in ipso corpore cordis, vel in humo-  
ribus, vel in spiritu, calor præter naturam accen-  
ditur. Præcipiunt autem causæ quædam notis-  
simæ, in omni febrium constitutione, quatenus so-  
lidum est. Sed neque far est, si calor aliquis dica-  
tur esse præter naturam, ad hoc vt dixi febris me-  
teatur: oportet siquidem prius vt cor illo inca-  
lescat: alioquin calor a sole aut ab igni inductus,  
febris ellet dicendus. Porro iracundia est veluti

feruor quidã, ac motus vehementer potentie ira-  
scibilis, in corde « delitescens. Simul autẽ cum  
eo feruore calit aliquando spiritus, aliquando  
substantia sanguinis. Quod si ita contingat, vt  
ea corpora que in se admiserunt caliditatem, nõ-  
go eam tempore retineant sint apta, licet motus  
cordis sedetur, in hisce tamen permanet calor  
præter naturam, atque inde hominem febriçatæ  
est necesse. Huiusmodi autem febris habet  
originẽ a motu atque feruore naturæ calidita-  
tis. Quæ autem ex tristitia fit, ex solo motu, non  
autem ex feruore gignitur. At illius quæ labo-  
res sequitur, principium est muscularum, neruo-  
rum, copularum, & articularum motus immo-  
deratus. Ea siquidem primò, calorem quandam  
conciunt. Dein verò continuatim calor ascen-  
dit ad cor, actum homo necessariò febriçatæ.

Quæ autem ex densitate cutis accenditur febris,  
qualis maximè contipatis atque astrictis cor-  
poribus accidere solet, mordaci effluxu in corpo-  
re coaceruato contingit. Semper enim corpora  
animalium diffantur, idq; duplici modo: nempe  
effluat ad exteriora vaporolis subtilioribusq; sup-  
erfluitantibus, ac rursus intus attracta refrigerante  
ac ventiliante natiuum calorem aërea substantia.  
Quum igitur vehemens aliqua causa cum ipsam  
condensans, meatus angustiores reddiderit, se-  
pius in plethoricam dispositionem incidit  
corpus, si & vaporem & optimum, quod effluit, exte-  
rit. At si fuerit mordax & acre, nonnunquẽ fe-  
bre corripitur: quo tempore etiam calor maximè au-  
getur, refrigerio extrinsecus adueniente priua-  
tus, Acris autem ac mordax superfluitas « effluit  
iis, qui aut natura vitioli habent humores, aut  
præuocis vtuntur, aut sæpius cruditate vexan-  
tur, maximè si post eiusmodi cibos aquam vitioli-  
sam hiberint. Idem his quoque accidit, qui supra  
modum laborant, aut vigilant, aut cogitant, aut  
medicamina acuta iugiter sumunt. Eorum igitur  
qui cruditate panantur, in quidam qui præ-  
uocis succis redvidant, ac male dissulant, aut in-  
temperatiue laborant, aut balneis superfluis vtun-  
tur, facile corripuntur febribus. Qui verò boni  
habitus sunt, integre dissolunt, & quietunt, res-  
piciuntq; ventriculi & hepatis caliditatem, impo-  
nuntque vt febriçatæ. Nam in eisdem reidet ven-  
triculi & hepatis partibus, quicquid corruptum  
est, ac panarium coquitur, reddendum optimum:  
sic vt & iis qui se moribus vehementioribus tor-  
quent, aut æstiuo sole, aut balneis calidis du-  
ciunt aquatum vtuntur, quicquid vniatum est,  
recipitur In corporis habitum. Quibus verò cor-  
ruppi sibi deken derant in ventrem, « eos febres  
non corripit, nisi ob alias causas: veluti si defati-  
gati sint, vel ebrietatem deiciendi necessitatem,  
aut vitiolum inflammantia tenuauerint. Porro per  
obstructiones meatuum, & humorum congestio-  
nes, aut putredinem solet febris oriri. Prom-  
ptissime namque putrescent omnia calida & hu-  
mida, in calidis locis contenta, nisi diffiliari ipsa et  
refrigerari conigerit. « Quinetiam in altera  
plenitudine que ad vires dicitur, succi citò ad  
corruptionem deveniunt, quum nec vincantur,  
nec concoquantur a facultate, vt pote imbe-  
cilla existente. Propterea autem quicunque cibi

Febris ab iracu-  
dia quando ge-  
nuitur.  
Febris orta à  
tristitia.  
Febris ab exer-  
cicio animi dico

Febris à cute  
densata,  
Diffiliari ani-  
malium corpora  
duplici modo.

Astrictionem  
cutis, quemodo  
fibræ stringun-  
tur.

Cruditatis par-  
tem, quæ  
nam facile in  
febre incidit,  
et qui agit.

Febris orta fa-  
cile calida  
est ebrietate  
conclata in calidis  
locis nec diffiliari  
potest, nec refrigerari.

Plenitudo ad  
viros, et cetera.

glutinosi atque crassi sunt, & si ratione putredinis magis morbifici existunt: quod et quidem succi ex ipsis geniti, longe promptiores sunt, ut & in mearibus harent, & impingantur. At acres & attenuantes cibi, quod mali succi sint, febres etiam accendunt. Partes etiam quae experiuntur inflammatione, ratione putredinis similiter febres inducunt. Impactus quidem in eis qui influxit humor, si natura calidus sit, nec diffusetur, actumum putrescit. Si autem fluxione ipsam exquisitè amara bilis pepererit, caliditas erysipelatosam partem occupat: si verò sanguis, phlegmonosa: at si ex utroque miscellaneus humor, vel sit erysipelas inflammationis particeps, vel inflammatio erysipelatis: ut omeu quidem ab humore excellente suscipiens, cognomeu autem ab altero. In hisce autem omnibus consorsio lege febris accenditur. Nam proxima pars calefacta particulæ, simul cum ea caluit, donec ad cor & disposino ipsa pervenerit. Etenim in carbu culis id quod conti-

nam insuperabiles atque impassibiles permanenti quædam ægre patiuntur. Est autem ipsius medicus opus, correctivus errorum omnium, qui circa huiusmodi corpus contingunt. Quare in us omnibus prima esse debet, atque communis intentio, ut corpus quammaximè purum sit, ac periprivable: secunda autem, ut præpotenti causæ adversetur, quidam maxime fieri poterit. Nam quibus horum contraria insunt, corripiantur celeriter, acerrimèque laborant.

## CAPVT V.

Igitur omnes pestilentes febres à putredine originè ducunt. At ephemeræ, minime putredinem humorum sequuntur. Sed qui quidem ex sola incendio febricitat, ab agentis causæ caliditate afflicta natura est aptus. Qui ex ira, huic feruorem quidem fieri caloris qui in corde consistit, est necessarium: non tamen etiam putredinem. Sic & ei qui supra modum exercitatus est, vehementior calor præter naturam sine humorum putredine in corpore accenditur. Cui autem cutis adstricta est, quum prius aciores superfluitates expirarent per eam, posteaquam sunt retentæ coarctatæque, in febrem incidit, nulla interveniente humorum putredine. Porro quæ tumoribus inguinum superveniunt febres, omnes auctoribus Hippocrate) perniciosiores sunt, exceptis ephemeris. Sunt siquidem quædam febres & genere ephemerarum, superveniètes tumoribus inguinum: quæ quidem ab eis differunt quæ ex humorum putredine eveniunt, quæque vel in aliquo visceris, vel in causis & maximis vasis radicem habet suæ generatious. Quandoquidem quæ inguinum tumoribus ephemeræ superveniunt, coarctatissimè semper partes vicinas, donec vique ad cor febrilis calor perveniat: quod tamen putrida fuligo non pervenit, sed ibidem, in loco inguinali circumscripta remanet, sola alteratone per continuum facta, atque vique ad cor ipsum extensa sola caliditate. In putredine autem quæ aut in visceribus, aut in magnis sit vasis, quidam veluti fumus, ex putrescentibus succis ad ventriculos cordis amollitur. Præterea in tumoribus inguinum omnes simul, collecti humores putrescunt, siue per vnum, siue per duos continuos dies, utpote in vno eodemque loco compacti: at qui in visceribus sunt, vastique magnis, quum perpetuo fluant, suoque contactu vicinos ad putredinem trahant, spatio temporis putredum calorem accendunt.

## CAPVT IIII.

Calidiores aëris ambientis status, per inspirationem quidem manifestè cor calfaciunt: corpori autem extrinsecus circumfusi, totum ipsum calidius reddunt: sed præsertim arterias, ut quæ ipsius subsistant aëris ambientis aliquid ad se alliciunt: cum quibus omnibus affici etiam cor est necesse: & quum calidus impediō fuerit, ipsum primum atque præcipuè, calorem febrilem suscipere, ac deinde vniuerso corpori communicare. Pestilens autem febris, inspiratio aëris vitia & putridi, maxime esse in causa videtur. Fit aliquando enim ob eos qui sunt in corpore humores ad putredinem paratos, quum exiguum aliquam occasione ad febres originem ab aëre ambiente acciperet animal. Aëris autem putredo accendit, vel ob cadaverum multitudinem multis cre-

matorum: vel ob lacum, vel paludem æstivo tempore evaporationem. Ceterum nulla cauturum sine patientis appetitu agere potest: alioquin ex quo omnes afficerentur ab eadem causa. Quæ igitur vitiosa succis redvndant corpora, obstructi sunt, atque inertes victus & exercitratione educata fuerit, ea sanè per pestilentes constitutiones ambiens, statim à prima inspiratione initium putredinis sument, ac plurimum in malo provehantur. Quæ verò contrario modo disposita, nonnulla quidem nihil, nonnulla verò adeo exigui læsionis percipit, ut minimo negotio reverti ad naturalem habitum possint. Iam verò quum aëris temperatura, ad caliditatem atque humiditatem immodicam fuerit conversa, pestilentes morbi exoritur: qui ea tantum corripit corpora, quæ vitiantur, prompta & idonea erunt. Etenim ea corpora quorum dispositiones consentiunt causis morbis, facillimè contaminantur: quorum verò renititur, ac reluctatur, quantum viribus ac magnitudine contrarietas valet, tantum invicta contingit permanere ea corpora. Quum enim corporum dispositiones dissimiles ac multiplices existant, quædam faciliè alterantur, ac patiuntur à causa in ipsa operante: quæ

Corpus enim pestilens in rem debet reddi peritum, ac maxime in peritum, seu causis præpotenti coarctatum.

Pestilens febris omnis à putredine.

Ephemeræ superveniunt tumoribus inguinum, quædam à putredine differunt.

Putredine humorum quæ in vasis sit, si sit, amittit duplicem.

Pestilens febris quædam est de febre.

Inflammata pericula cor se brevis succidit.

Caliditas erysipelatosæ & phlegmonosæ, quæ in do insistent.

Carbonculi oriuntur à fermento ex malaribus sanguine.

Aër impedit calidus, quod in corpora nostra, malitior.

Pestilens febris causâ est inspirationis aëris vitia & putridi, necnon vitiosis factis in corpore, ad putredinem habile.

Causam nullâ posse agere, ob quam patientis corpus appetat.

Pestilens febris, quæ corpora faciliè, quæque diffinitiones corripit.

Aëris constitutio calida & humidior, pestilens est morbi alomina.

Corpora dissimilia causis morbis, faciliè corripit.

Corporum dispositiones dissimiles & multiplices.

mus, fit: quodq; secundū magis & minus, varias differentias sortitur. Quotcumque autem in abscessibus putredinis sunt differentie, totidem & in febribus quæ ex putredine succeduntur, sunt eorum quæ in urinis apparent, formæ varietates. Optima verò urina quæ ex putrescente humore periclitari, qui adhuc concoctionem à concoctionem vase suscipiat, est quæ albam, liquam, æqualem, & minime sordidā habet hypogastrium. Pelusina autē est, quæ in omnibus maximè contrario modo se habet. Quæ verò intermedia existit, quanto ad alterā propius accesserit, tanto aut melior est, aut deterior.

## CAPVT VII.

Porro febrium ephemerarum hoc vnum est præcipuum atq; inseparabile in diæum, quod ab aliqua manifesta causâ præincipiente quæ (quam procatartica vocant) oritur. Non est tamen id signum earum proprium. Nam & aliarum quedam, à causâ manifesta gignuntur, quæ nimium præcessit. Inseparabile verò ac proprium ephemerarum est, vixisse statim primâ die concoctio pulsiūque ad magnitudinem & celeritatem effatu dignam accedens, ita vt frequentia à proportionē deficiat secundum externam quietem. Est autem & magis inseparabile & proprium, quod nullo modo ad celeritatem ea pars pulsus, quæ dicitur systole, tendit: & si aliquando contingat hoc, minimum ac vix perceptibile existit, parumq; à naturali tenore mutarum. Sed & caliditas luauras, proprium atque inseparabile est huiusmodi febrium indicium. Inseparabile quoque, æqualis atq; incompressus ascensus, in calore simul & pulsibus: non tamen proprium, quum & aliis quibusdam addit. Sicut enim consistente febre mediocritas. Neq; enim hoc etiam est ephemerarum proprium, quamquam eis maxime inest. Proprium præterea inseparabile ephemerarum indicium est, cum sudore, aut rose, aut aliquo optimo vapore inclinato, quam leuiter infertur. Atq; hoc quidem est commune his ephemerarum febrium dignotio. Earum verò quæ ex diverso ab ephemeris distinguuntur, quedam in putredine humorū constituit, quedam solidas animalis particulas occupant. Atque hæc sanè medici febres hecticas appellarūt, vel quia firmæ atq; fixæ, perinde ac labiis, sunt; vel quia corpora habitum comprehenderunt sic enim partes solidas vocant. Primum autem & proprium, non tamen inseparabile, putridarum febrium est signum, quod nulla procatartica causâ eas antecedit: id quod neutri aliorum generum inest. Quandoquidem ephemeræ omnes oriuntur à procatartica. Hæcticæ autem, quando sine his gignuntur, minime ab initio inuadunt. Vbi quæ igitur citra manifestam, præincipientem causam, caput febriæ, citre oportet esse reorū causam in humoribus esse: inter cetera tamen aliqua ex procatartica causâ sui ratione febrem accendit ephemeram: hæc est autē altera ex putredine humorū, qui quod afficitur corpus, & impurum, & superfluum humoris colluie redvndis fuerit, succulentior autem ipsius, vna quidem propria inseparabilitate dignotio habetur, quod febriū ephemeræ ad integritatem non

deficiat. Coningit verò aliquando, vt per vigorem ephemeræ, ac multo magis per declinationis initium, signum aliquod permutacionis certatur: videlicet si ea triquillitas abist, quam adesse oportebat. Initium autē sumere à rigore febrem, vbi nec insolatus, nec præcessit aliqua refrigeratio videntur, putridarum febrium est proprium signum, non tam inseparabile. Siquidem nō in eisdem omnibus rigor: heu! neque horror. Præterea in æqualitas pulsuum atq; calor, siue in principis, siue in augmento contingat, huiusmodi febrium est signum proprium, sed ne ipsū quidem inseparabile. Multo aut minus inseparabile existit, quod accēssiones ipse habeant plures veluti insulæ: id quod superexacerbati vocamus: quemadmodum & pulsuum compressio, quæ putridarum febrium est propria (nisi alia cuius symptomatis ratione citra caloris, siue accēssus) non tamen inseparabilis. Maximum etiam earum febrium quæ à putredine oriuntur indicium est, mordacitas & acrimonia coloris, quæ perinde ac tumus nares & oculos, sic ipsa erodere tactum videtur. Sed in principis quidem accēssionē, vapore in quibus calor adhuc suffocatur, superfluitatēque succeduntur intus, non statim ea qualitas, admoda manu, discernitur. At per moram, prædicta caliditas species effertur ex penitioribus partibus. Proprium præterea inseparabile putridarum febrium est signum, velocitas symptomē, quæ manifestius quidem in crescentibus febribus, non obliuere autem in incipientibus & consistētibz his. Comitatur autem hæc febres, in iniis quidem, pulsus parvus ac leuissimus: quum verò consistunt, velox simul & magnus. Sic & quæ circa externam quietem versatur frequentia, in huiusmodi febribus deprehenditur manifeste. Cuius similis neque in ephemeris, neque in hæcticis cernitur. Maximum verò & harum febrium indicium exultu vixisse cruditas: earundemq; est proprium, imbecilla concoctio. Neque enim vniquam magnū aut citatu dignum concoctionis indicium per huiusmodi febres in primis urinis apparet, si quidem excipiamus eam, quæ sit ex ephemeris febribus, permutacionem. At verò pulsus durus nullius generis febrium, quatenus febres sunt, est aut proprius, aut inseparabilis. Comitatur tamen magna ex parte hæcticæ febres: nonnunquam verò etiam duo genera alia, symptomate aliquo interveniente. Quippe durities accidet arteriarum tunicis, aut ob congelationem, aut tensionem, aut ficitatem. Congelationes igitur, velicemque algorem efficiunt a tensionem verò, inflammationē, & duritiam, & nervorum dispositio inflammationis communis. At ficitatem, ex aciditate duntaxat, & longi temporis tamen, & diuina febre ardentes. In vnteritur autem, quæcūque totolida animalis particulas vehementer excruciant, sicut & hæcticæ febres, arteriarum duritiam efficiunt.

## CAPVT VIII.

At verò hæcticæ febres magna quidem ex parte ardentibus febribus solent superuenire, vixque adeo productis, vt humorem in corpore cor-

Ephemeræ potenter in putredinem, quibus dignotio inducitur.

Putridarum febrium calor atq; mordax & acrimonia.

Putrida febriū adeo vixisse vni signum.

Putridarum febrium pulsus.

Putridarum vna qualitas.

Febrium nulla, quatenus febriū, ad illi pulsus durus.

Durities vnde accidet arteriis tunc tunc.

Hæcticæ ardentes febres jam perueniunt.

dis contentum absumpserint: quanquam fieri etiam potest, ut magna adhuc eius portio seruetur. Cæterum illæ non tantum hæcicæ sunt, sed etiam tabidæ. Quæ verò manente adhuc humiditate gignuntur, ubi cordis occupaverint corpus, hinc maxime succeduntur, quemadmodum lucernæ flamma ex elychnio. Alio autem modo febres hæcicæ oriuntur, ubi statim ab initio invadentes, similem ortum cum ephemeris habent: videlicet aut ex ira, aut tristitia, aut lassitudine insigunt, aut ardore solis contractum. Quæ igitur sic gignuntur, non admodum egrediantur. Quæ autem pervenerunt ad tabem, iis, ubi iam exquisitæ consistunt, & iamdudum inceperunt, ut medeatur est impossibile. Siquidem earum natura calida est & sicca, quum per eas tale quid perpetuat cor, quale lucernæ elychnium, dum plurimum est exvsum. Differt autem tabida febris à tabe, siue marasmo.

Marasmus liquidem etiam absque febre in decrepitate aetate solet accidere, extincto nativo calore: id quod nihil aliud existit, quam mors, quæ sepe sine sensu doloris, ac secundum naturam, ex siccitate contingit: sicuti & iis qui præter naturam tabescent, altera species marasmi accidit, quæ à Philippo ex morbo senectus vocatur. Tabida vero febris non tantum sicca, sed etiam calida est passio.

## CAPV IX.

Hæctica igitur quæ in tabem incidit, febris, cognitu prompissima atque facillima existit. Nam priusquam pulsus atque calorem perpendas tactu, videbis oculos immodicè concauos, ac veluti in foueas quosdam reconditos, exhausto iam vniuerso ipsorum humore, ita ut osium, quibus palpebræ coherent, eminentiæ remaneant. Sordes præterea in ipsis sicce ostenduntur, & quædam veluti squallida dispositio, qualis maxime inest iis, qui toto die sub his ardore per puluerem iter longam fecerunt. Quinetiam in eis est coloris flos vitalis extractus; frontisq; & faciei cutis rigida, ex siccitate, & squallida. Ad hæc, sic affectu frequenter palpebræ cōtrahunt, dormitandum instat: non tamen affectus eorum est somnus, sed potius vigilandi impotentia. Præ macie etiam sunt illis collapsæ & concaua tempora: nihil in eorum corporibus cernitur præter cutim aræ ossa. Pulsus autem tenuis, durus, debilis, atque frequens apparet. Caliditas verò, quum primum admoetur manus, languida est: paulatim autem a credinem, atque ex rationem ostendit: ac magis, quum plus tangens ad immorabens. Porro marasmus tunc incipit, dum cognatus humor, qui in oculo partium similitudinem ipsius insperat est, & ex quo primum vniuersæ partes nutriuntur, periclitatur circa corpus cordis non amplius adesse. Quando eum pars aliqua humoris minus conseruetur, solùm febris hæctica existit, nondum etiam tabida. Vbi verò res eo discrimine iam pervenerit, ut nihil ex tali humore super sit, tunc exquisita rabes existit. Est autem hæcticarum omnium dispositio difficilis, ubi præterit principij tempus: quod non diuturnum aut horarum numero, sed ipso dispositionis modo determinandum est,

Cæterum quum naturalis temperies cordis primum inverti inceperit, neque nativa humiditas profusus dissipatur, neque virtus laborat plurimum: sed primum sit veluti quedam effluencia ipsius humiditatis: quo tempore faciliè est eiusmodi febrem sanare, tanquam nihil adhuc virtute perperit. Tantum autem virtus laborat, quantum siccitas & caliditas in ipso corde invaluerit. Iam verò, quæ febris æqualiter ab utraque distat, ab ea scilicet quæ exquisitè tabida existit, & ab illa in qua nihil est adhuc tale, mediàm quodammodo sese habet ad curationem, dubio ad partes ambas momento inclinans. Quæ autem tabidæ proximior existit, est vicinior periculo, quum quæ alteri primæ magis adhaeret, non parvam salutis spem possit nobis promittere. Fingamus igitur aliquid esse correptæ febre, quam præcesserant conspicuæ & procatartice causæ. Si enim febris ipsa ad sequentem diem extendatur, neque integrè desinat, neque exasperetur magis, ariditatem tamen maiorem in corpore repræsentet, talem hæcticam fore tibi suspicandum fuerit. Quod si & in tertio die sine cibo permanere voluerit æger, donecque tertianæ accessionis præteritis horas suspicatas, nihil effectum dignum priori accesserit febrili, aut immunitum fuerit, sed tantummodo quedam exigua reliqua primæ febris procedant, permancantque cum ariditate corporis, & caliditate, quæ primo quidem tactu mitis sentiantur, processu verò acris, mordax & sicca: huiusmodi febrem hæcticam esse existimandum est. Maximum verò & indubitarum erit eius nature indicium, si cibum ho mini post suspicatas horas obuleris. Si tunc siquidem vna vel altera hora post cibum exhibitum, quicunque ægrotantem tetigerint, alteram febris accessione opinabuntur adesse. Omnibus namque hæctis febribus hoc proprium inseparabilem adest indicium, scilicet quod alio cibo accendatur calor, pulsusq; ad magnitudinem & velocitatem augeatur, sic ut videatur oborta esse incompressa quædam accessio, hoc est, ubi ab omni inæqualitate, qualis comitari alias febres solet. Nam tametsi in aliis nonnullis febribus huiusmodi enisultus incompressi cernantur, si tamen absque cibo solent accidere, in febribus autem hæctis nunquam aliqua accessio conspicitur, sed perpetuò cernitur vna febris continua, ut illa quæ synochos appellatur. Ea tamen quandam veluti flammam plurimam admonenti manum possidet occurstantem: pulsusq; edit celerrimos, frequentissimos, atque maximos. In hæctis autem febribus, neque multa occurrit caliditas, pulsusque tanto minores, rariores, atque tardiores sunt iis, qui per synochos sunt, quæto etiam caliditas ipsa est minor.

Commune itaq; omnibus hæctis febribus est, quod pulsus, & semper à principio vique aliquem æqualem existant. Proprium autem est tabidarum, hæctis. Nam sine siccitate sæpius hæctice febres consistunt, quum minime in tabem degenerant. Iam cæteras febres quæ incompressas accessiones sortiuntur, omnino compressio aliqua comitatur, dum cibus ingestus fuerit in accessiones principio. Hæctis autem, post

Tabida febris.

Hæctica febris interdiu ab initio invadere, si autem in epistomæ habetur generationem.

Hæcticarum generalis quædam facies, aliis ægri curatio nem recipere.

Marasmus, Tabida febris à tabe quomodo diffinit.

Tabida febris indicia.

Marasmus quomodo accipiat.

Tabes exquisita quomodo dicitur.

Hæctica febris inæqualitas.

Hæctica febris post sumptionem cibi inæqualitas, sicuti ex ambiguitate.

Hæctica febris nulla adesse accessio. Synochos febris est tunc vna febris continua.

Hæctica omnis passio est æqualis in semper à principio vique aliquem æqualem existant.

Tabidarum febrium compressio est facies. Hæctica sæpe absque siccitate consistens.

post cibū assumptū, quendam velut incoctum insilium fieri contingit, qui tamen non est accessio, sed incrementum caloris, atq; promotio pulsus in magnitudine atq; velocitate, qualis cū temporales post cibū solet accidere. Quamobrem accessio ipsa tandiu perdurabit, donec distributus ab apothecis, humectatione cordis arietatim. Postea verò corpus ad primum reuertetur statum, in quo antea quāvis exuberet, cōspicebatur. Quod si rursus nutrire velis, vel in diuersa temporibus, senties semper calorem post cibos adactū pulsus autē (ut dictū est) alteratos: vtpote quibus idem videtur accidere, quod calid & lapidibus calefactis, quorū nimirum caliditas arida, per aque affusionē, ab humida substantia nutritur. Humida enim caliditas, quāvis sicca, vires habet non parum evidētiō res. At verò sicca in hectica febribus esse caliditatem, quās consequitur tabes, hinc constat, quod nullus eorū qui habitu corporis sunt humidiores, statim ab initio huiusmodi febre correpti fuerit. Quicūq; autē sunt natura sicciores, ac præsertim si temperiem etiā calidiorē sortiuntur, viramq; elegerint in laboribus, vigiliis, curis, tenuis victus ratione, hoc statim ab initio solet hectica febris invadere, ex ira, vel tristitia: ac magna ætate, statim temporis calido & sicco, ac loco prætereā consimili. Ac terminus talium hecticarum principij est, si eo tempore, quo solent ephemera ad integritatē definere, non solum ista nihil tale accidat, sed sic etiam manifestē intendatur. Alter verò cuiuscūq; veluti ipsius augmenti, atq; integræ perfectionis terminus, est tertie diei accessio. Nam si tunc nec altera accessio superveniat, neq; ægrotus absq; febre fuerit, adacta insuper ficitate, proculdubio hic hectica febre laborat: quæ progressu tem poria citō ad tabidam cōvertetur, nisi rectē curetur. Terminus autem permutationis ipsius ad tabem est, dum pulsus debilis simul atq; durus sentietur: qui quidē necessariō etiā erit potius & frequens: non tamen propterea febris dicitur tabida, sed ob id potius, quod debilis atq; durus existit. Debilitas siquidē, vehementer sequitur febrem intemperantiam: dunties autē, atiditatem. Si igitur huiusmodi affectus cor occupaverit, hinc febre tabida necessum est animal laborare. In eandem verò incidunt febriē ex ardentibus atq; acutis febribus plures, qui rectē curati nō sunt: quicūq; egerint potione frigida, non solum cam nō dixerunt, sed nulli etiam aliud refrigerans medicamentū applicuerit thoraci & precordius. Quinetiā hepatis ac ventriculi inflammationibus, nisi rectē curetur, tabes supervenire cōsuevit, affectione ipsa cor di communicata. Siquidem tabe corripitur cor, interdum quidem ex se ipso, sicut per exanthescitias, vehementiq; atque diuturnas trāsudans: nonnunquam verò ex ardentibus febribus: aliquando autem ex pulmonis ac thoracis affectionibus, ac præsertim ex empyemate & phtisi, atque adeo ex diuturnis nobis

liditatem susceperit, & quæ cum difficultate extinguitur, tabida occupatur febre. Quare & quæ arteriæ circumstantibus partibus calidiores sentiuntur, maximum sunt hecticarum febrium indicium. Vbi igitur sola per seipsam consistit hectica febris, perspicua est, an sit absolutē hectica, an simul & marasmodies. Vbi verò hectica febris vni di putrida coit, longē difficilior cognoscitur: quamvis ex arteriarum perseverante calore, motūq; celeritate & frequentia, eam discernere possumus.

## CAPVT. X.

Porro qui ex feruore solis inciderūt in febrem, hic curia magis ad calorem & siccitatem, quā pulsus ad febriem vergit dispositionem: nam & minus subundi sunt iis, qui æqualem habent caliditatem: & quamprimum manus admoventur, ingens calor percipitur. Contrā res se habet in iis, qui ex cute densa & asinētia laborant: nam in eis reacenditur calor. At qui ex feruore solis egrotant, his maxime de vtriq; caput videtur: plūsq; ex balneis frigidis utilitatis & delectationis percipiunt. Oculi quoq; in eis rubicundiores & calidiores cum quadam ariditate videntur, si quidem sine grauedine ac debilitatione affligantur. Est autem minus calida cutis iis qui ex frigiditate febriuntur, corpūq; eis in maiorem tumorem attollitur: ac nulla in fratre squalor, quāvis illis qui ex insolanti febriuntur, sine plenitudine capiti. Siquidem magna ex parte lūs solet caput repleti, nisi quis purum, materiq; inuidis expertus corpus possideat. Sola quippe lūs caput salubriter contingit, sine aliqua plenitudinis nota.

GALENI PERGAMENI  
de differentiis febrium, lib. II.

## CAPVT. I.

Superest autem nunc, vt de differentiis febriū quæ ex humorum putredine oriuntur, similiter differamus: idq; vbi admonuerimus prius, non sat esse (quemadmodū multi opinantur) ad omnium febrium generatorem, si in corpore amara bilis redvnder. Alioqui laborantes arquo morbo, ad vnum omnes maximis corripentur febribus: id quod nequaquam contingit, priusquam bilis quæ in illa copiosissima est, cōputrescat. Absurdum etiam est credere, in quarantis & quoridanis febribus exquisitis, acerrari bilem amarā, quemadmodum in tertianis, atq; in causionide, quum in illis nullum talis succi vestigium adsit. Etenim febre tertiana magna ex parte in corporibus natura magis biliosis sunt: in ætate vigenti (quæ omnium biliosissima est:) tempore æstiuo (in quo domiatur in humor:) in locis prætereā quæ calidam & siccā tem peratē possident, in similiq; æstiva ambientis constitutione: ac breuiter in homine qui laboribus, curis, vigiliis, æstia, tenuis victus ratione, eadēq; calida & sicca, ac deniq; medicamentum calfacientium & exiccantium immodico usu, fuerit commaceraus. Quotidianæ verò, nātūris in quibus putrida superfluit, sunt familiares: in hyemēq; præcipue, atque in omni locorum & temporum statu frigidiori atque humidiori giuntur. Ex ætatis porro, senilem atq; pueri-

Hectica mi-  
sere interdu-  
cum putreda.

Febri ex insola-  
tione.

Febri, ut ante  
asintia.

Febri ex frigiditate.

Tertiana febris  
quibus nature  
magis sunt fami-  
liaris.

Quotidiana fe-  
bris quibus na-  
tura magis sunt  
familiaris.

Febri cuiusq;  
diuersa pos-  
sunt post cibū,  
in magnitudi-  
nem atq; velo-  
citatem.

Hectica statim  
ab initio, quæ  
prebendatur.

Tabida febris  
tunc laborantis  
animal, quæ ca-  
lebit huiusmodi  
q; lūm cor occu-  
pauerit.

Tabes quibus  
fiant superven-  
tiones,  
Tabes corripit  
ut quib; ex cō-  
si possit.

lem infestant magis: præsertim si accedat otiosa vita, quam crapula comitantur: atque enī si post pituitosos cibos quispiam balneis vratur. Neq̃ etiam si qui quondiana febre tenentur, amaram evomunt bilem, nec per ventrem inferiorem aut sudores illam excernunt, quod in febribus contingit tertianis: hæc siquidem flava bile putrescente gignuntur. At quondianæ ex pituita, quemadmodum quartanæ ex atra bile, ducunt originem. Proinde corporum naturæ magis ad atram bilem proclives, ex statibus, præcipue declinans: ex anni verò temporibus, maxime autūnus: ac breviter victus vniuersus frigidus atq̃ siccus, quartanas febribus originē præstat. Quare & rigor quivisq̃ genus febris antecedit, haudquāq̃ similis est: sed q̃ in tertianis veluti rei cuiusdā pungentis, sentitūq̃: qui verò in quartanis, tanq̃ refrigerantis. Porro febres intermittētes, quæ numrū ad integritatē delinūt, orrū habent ab humore qui per oēs corporis partes suo motu defertur. At in cōtinuis, humor delinēat atq̃ cōnnetur in venis.

## CAPVT II.

Intermittentibz igitur tres sunt omnes numero differēte, quondiana, tertiana, et quartana quondiana quidē, ex pituita: tertiana autē, ex flava bilis: quartana deniq̃, ex atræ putredine p̃pagata.

Continuarum autē quæ ex flava bile p̃ueniūt, duplex species habetur: vna quidē, earū quæ appellantur synochi: quarū vniuersum tēpus vniua accessio exiit, à principio vsq̃ ad finē extēsa: altera verò earū quæ idē cum genere nomen habēt, cōmuniq̃ dicunt, atq̃ in pluribus particularibz circūscribunt cōtinentur. Earū igitur quæ appellantur synochi, tres differēte cōnumerantur. Nam earū quæ dā principio ad finē vsq̃ perseuerēt quales: quæ dā paulatim augētur: aliz decresciūt, atq̃ minuitur. Vnde nonnulli primas quidem homotonas acmasticas, secundas epacmasticas, tertias paracmasticas, hoc est, vniiformes, invalescentes, & decrescētes, nominant. At cōtinuarum duæ sunt differēte primæ. Si quidem earum nonnullæ quidem, tertio quoq̃ die invalescunt exasperantūq̃, referentes naturam tertianæ febris: aliz verò etiam die intermedio exacerbationem faciunt: neutraq̃ tamē harum ad integritatē delinūt. Earum igitur cōtinuarum quæ die intermedia accessiōē faciunt, nonnullæ quidem formam quondianarū seruant, duas invicem accessiones simillimas cōficientes: aliæ verò, quum duas dissimiles faciant, simillimam primæ tertiam efficiunt, atq̃ secundæ quartam, instar duarum tertianarū progredientes. Hæc igitur ex bilioso magis, alterq̃ verò quæ singulis diebus similem accessiōē faciunt, ex pituitoso humore consistunt. Est & tertium genus febriū cōtinuarum, quæ perrarō tamen eveniūt, quarum accessiones quartanarū figuram progredientes ostendunt, nec delinūt tamen integræ. Quæ modum autem febris tertiana aliquando fit duplex, & aliquando triplex: sic hæc etiam non duplex modo, sed triplex potest evadere.

## CAPVT III.

Quæ igitur dā flava bile per sensibiles corporis partes delata oritur febris, ea cum rigore inva-

dit, atq̃ ardentis febris similitudinem gerit, & biliosus vomitus, aut deiectionibus, aut sudoribus, vel horū quibuscūq̃, vel omnibus simul, soluitur. Huius febris accessio duodecim ad summum hōrū tēpū equinoctialium intervallū finitur. Vocamus autem ipsam exquisitam tertianā, quæ in temperatura laborans biliosa, & anni tempore, & regione, & victus ratione, calidis & siccis cōstitit. At verò copiosior bilis, ea quæ p̃stā ea est, longiorem facit accessiōē: tenuis autem, crassa breviorē. Sic & vigor, maior quidem, breviorē: imbecillior autem longiorem. Præterea corporis dispositio, tara quidē breviorē, densa verò longiorem. Tempus autem intermissiōis in hac febre, nullā habet humoris putrescentis ex pullis perceptibz indicium, in die aut nocte, quæ consequitur accessiōnem. Quum verò parumper succenditur, vix agnoscī potest in primis diei aut noctis subinde sequētes partibus: manifestus autem circa fines ipsius diei vel noctis: atq̃ adhuc manifestus die proxima, quæ vi delcet antecedit accessiōis diem vel noctē. In illa verò iam signum evidentius apparet, ac multo etiam magis a cōfessione iam incipit: atq̃ adhuc plus, invalescente febre. Quū verò iam cōstitit, minus quā quum augebatur: multoq̃ minus ubi iam declinauerit.

## CAPVT IIII.

Est & alia exquisitè simplicitatis febris, quæ ex pituitaginosa pituita oritur habet, per sensibiles à natura partes impulsā. Incipit autem à refrigeratione extremorum, & horrore magis quā rigore. Cum difficultate per eam accenditur calor, ac longum cōsumit tempus dum in valescēdo pervenit ad summū. Quoniam verò is ex quo constituitur humor, frigidus est & humidus, ac præterea lentus & tenax, idcirco ægrè accenditur, ac tardè movetur, sepiusq̃ in foraminibus hæret. Opprimat autem atq̃ aggravat aliquādo virtutem: vnde inæquales ac debiles magis, paruosq̃ efficit pulsus, quū primū a cōfessione invadunt, atq̃ in primis incremēt partibus. Fiunt & in biliosa febrī circa accessiōis principia, singuli quos diximus pulsūs affectus: in ea tamē statim desinunt: cætera verò, necnon inæqualitas, plerūq̃ tali febre invadente non adiunt. At postquam cessaverit rigor, non multum post calor accenditur, veluti ignis effulgens, purusq̃, omnis fumosq̃ fuliginis expers. Pituitosi autem humoris caliditas, ignem humidum ex accessu legitur vinctibus retent. Idcirco & exiguæ evacuationes ab ipso, & accessiōis spaciū longus produciunt: neq̃ intermissiōis tempus est adeo vti in tertiana syncerum, sed humoris puritatis servat indicium. Atram quum exquirere suam naturam servaverit, plerūq̃ & mihi nō raro videtur habere puram intermissiōnem. Hæc febris, naturas cōsequitur corporum, & tempora, & loca, & statūs, atq̃que, & victus rationem, aliaq̃ omnia prorsus alumna pituitæ. Accenditur autem singulis diebus, etsi minus calida sit, quā biliosa tertiana. Hæc etiam, quū humorem habeat minimo negotio incommutabile, facillè quicq̃ ex eo efferbuerit, totū proper sublevarē in accessiōe expurgetur, ad puriorē quādam integri-

Tertiana si  
synochialis.

Tertiana ex  
quibus quæ

Acrosina si  
briam quæ  
facit brevem,  
longiorēq̃.

Intermittentia  
febrium et  
cōtinuā dīstīn-  
ctio.

Intermittentia  
febriū tres dīstī-  
ferentia.

Continuarum  
speciēs duplex.  
Synochi vni-  
versum tēpus  
q̃ accessiō  
est.

Synochi tres  
dīstīnctio.

Homotonæ fe-  
bres.  
Acnasticæ fe-  
bres.  
Epacnasticæ fe-  
bres.  
Paracnasticæ  
febres.  
Continuarum  
duæ dīstīnctio.

Continuarum  
tamē repetitū  
perrarō.

Tertiana ex  
quibus dīstī-  
nctio p̃stā  
synochi calore.

Quondiana et  
tertiana singu-  
laris debet, quia  
in accessiōis  
declinandi  
nō expurgatur  
integritas, ut ex  
quibus tertiana.



integritate terminari videtur atque exigui quoddam vestigiū post paroxysmū, putride caliditatis relinquere. Quæ autē ex pituita febris accēditur, in accessione declinationib; quod expurgatur integræ neq; parū relinquitur eius quod velvī succēdit videtur: ac, pōde intermissio eius logē deterior est, accēdendæ accessiones multo magis festinat insultus.

## CAPVT V.

Tertiū febriū intermittentiū genus est ex quāta quartana, quā ex solo atræ bilis humore gignitur, quā frigida & sicca cōstat tēperatura. Succenditur autē paulatim, vel vī lapid aliq; aut corpus similiter frigidū atq; siccū. Vbi verō aliqua ex eo sūma fuerit acētia, nihil humidū, aut semicombustum in accessione relinquitur: atq; idcirco ex hoc humore, quā ex pituita, plures evacuationes oriuntur, intermissioq; ex quālibet parū videtur: quādoquidē quicquid atræ bilis acētiū fuerit, exhaustur atq; discuntur. Quāmobrē in sic affectū talis est rigor, qualis is, q; vehemēti gelu frigidē.

Hanc autē febrem necessariū antecedit, quæcūq; atram bilem accumulit. Ceterū accessio ipsius, quod quidem ad longitudinem pertinet, similis est tertianæ: nonnunquā etiam & longior, quum videlicet exquisitū persistit, neq; a frigidiore humore producta. Pro multitudine autē & qualitate humoris, vigore & imbecillitate potentie, necnon ipsius ægrantis dispositione, per omnes febres solet longior accessio variari. Si igitur neq; putrefcat, neq; vehemēter per pariter sensiles deferatur, melancholicus humor, nūquam efficitur ex quālibet quartana circuitum. Iam verō, regnū quidem morbi passionibus, diuturni melancholicis splenis affectus, et colores in toto corpore sardi: herpetibus verō atq; erysipelatibus, quæ ex flana bile gignuntur, cancri & phagedæne, proportionē quadam respondent. Verū neq; in his, neq; in aliis atræ bilis affectibus necessariū febriq; nūquā atræ bilis putrefcat. Semper quippe nature huius viribus freta, quicquid optimū reddi possit ex succis, id nutriendis partibus conatur alimulare, excutere autē, quod saltem correctionem nō recipit. Quod si quando ocellationem aliquā in ipsū nequeat expellere, necessum est, vt diutius delitescens in anima in corpore, corrumpatur. Sic igitur is qui morbo regio, atq; atræ bilis passionibus insistantur, quando biliosi humores superabundantes, diutius corpus obfederint, febris supervenire cōsuevit. Sed neq; ob redyndantem pituitā febris vnam accenditur, nisi prius obpuraverit. Ob pituitam autē visum est spiritus (quod impossibile arbitrabantur veteres) oriri abiq; febre rigorem.

## CAPVT VI.

Ex genere quotidianarum est febris quæ Hepialam vocant, vbi simul & febriū, & rigent ægri, atq; eodem tempore in toto corpore vitærigi tement affectus. Oritur autē hac febris ab humore illo, quem vitreū Praxagoræ vocat, quig est species quædam pituitæ, sans frigidus atq; tenax existens. Si quidem omnis frigidus atq; humidus succus, ad pituitæ appellationem refertur. Cuius tamen plures sunt differētie. Est namque vna species pituitæ, visquæde frigida, vā quā detinetur alicubi, dolores acerbissimos ex-

ciet. Atq; hæc sanē vitro fuso est perfimilis. Est & alia pituitæ species haudquaquā exactē frigida, quā pleriq; cum screatu expuunt, sensibilem habens dulcedinem. Accedit tertia species pituitæ, quæ sentitur expuētib; acidā: atq; minus frigida, quā quæ dicit vitæa: magis verd quā dulcis. Præter has species, est falsū aut ob putredinē, aut ob serosis humiditatis mitionē: ex qua quidē febricitantes non rigent, sed tantummodo hoerēt. Acidā verō ac vitreā pituita, si per partes sensiles deferatur, rigores citra febrem inducit. Quidd si modica aliqua in ipsis fiat putrefactio, febre Hepialam concitant. At si vchemētius putrefcant, rigor quidd antecedit, febris verō sequitur, a multitudine caloris frigida materia devicta. At putrefcente dulci pituita, rigor minime antecedit febrem.

## CAPVT VII.

Potro si pituita putrescens miscetur amarū bilis, duplex vt causa, sic etiam dispositio iungetur. Alter siquidem humor asseret quondam accessio nem, alter verd tertio quod die. Itaq; alter quidd dies duas accessiones habebit, alter verō vnam duntaxat: nisi accessio in tempora sibi munitur cohareant: coharentibus siquidem fiet vna febris confusa, quæ neq; puræ tertianæ, nec quotidianæ formā pre se feret. Quoniam verō vtriusq; febris duplex species est, quatuor ex ipsis fient coniugationes. Vna qdē in qua tertiana quotidiana continue iungitur. Tertia, in qua quotidiana intermittens, tertianæ cōtinuē miscetur. Quarta deniq; in qua permisceat quotidiana cōtinua tertianæ continuæ. Harū verō nuper dictarū coniugationum omnium, duæ sunt differētie: quum aliquando quidē in eandem horam accessiones occurrant: nonnunquā verō diversis temporibus superveniunt. Ceterū ex accessione aliqua, non ex periodorum simili proportionē, cognoscenda ipsa febris venit. At quæ singulis diebus accenditur atq; intermittitur febris, ex amphimeria hoc est, simpliciter quotidiana vocetur. Quæ verō intermissione non habet, continua quotidiana dicatur. Idem etiam & in aliis febribus est faciendum iudicium. Iam verō ex quotidiana continua, & tertiana intermittente, hemitritici natura constat. Quam igitur tertianæ insultus cum rigore in vadat: quondianæ autē continuæ, sine rigore: sanē si ambæ in vnam horam (quod interdum per hemitriticum contingit) conspirant ex æquo, febris cōdiata ex vtrāq; humorē pre se feret, rem quidē rigore minorem, sed maiorem refrigerationē. Quocirca dimidiam hemitritici portionem vtrāq; illarum febrium (dico quotidianæ cōtinuæ, & intermittens tertianæ) occupabit. Est autē hemitritici duplex generationis modus. Nam aut illarum febriū accessiones in vnam eandēq; horam cōeunt, quod altera quidd anticipet, atq; altera prorogetur: vcl itaq; ab ipso inuicē ambæ febres miscentur & confunduntur. Quæ igitur sit, in vnum tempus conspirantē vtrāq; accessione, vnum duntaxat hemitritici naturæ paroxysmum forsitur: altera autē omnis, a principio ægritudinis vsq; ad finē: quæ febris maxime ab

Hepialam fieri etiam a putredine acida.

Tertiana fit in ex quondiana mīstura, quæ duæ coniugationes.

Amphimeria febris.

Hemitriticum constat ex quotidiana continua, & intermittente tertiana.

Hemitriticum nascitur cum horore.

Hemitritici duplex generatio modus.

Quarta res quæ ex atræ bilis.

Quarta res quæ quæ.

Septima res quæ quæ.

Hepiala est febris quæ quæ.

Praxagoræ vocat.

omnib. hemitriticos vocatur. Qui aut intermit-  
tentis tertianæ & quotidianæ cōtinuæ formæ per  
se cognoscitur, facile cōplicatas per symptomata p-  
pria distinguit. Porro quædam ex ea cōplicatione ci-  
nius sit habitura finem, ex ipsarū specie, accessio-  
nis prolixitate, magnitudinēq. præterea ex mo-  
re, mora, reditu periodorum, necnon ex con-  
coctionis & crudis indiciis, coniecturandum.

## CAPVT VIII.

Febris igitur quæ ex intermittente tertiana, &  
quotidiana cōtinuā, cōposita est (quam hemitriti-  
cū vocamus) aut suauem bilē habet exyptan-  
tem: atq. ob id, in ea sicut tertianæ febris acciden-  
tia maiora: aut hæc quidem parciore, pituita verò  
abundantior existit: ob idq. quotidianæ cōtinuæ  
affectus firmiores: aut neuter horū humorū alte-  
rum vincit, sed ambo æquipollere videtur, id qd  
in exquisitis hemitriticiis, hoc est, hemitritianis, cō-  
tingit. Ergo si in multo tempore ipsa prævaluerit febris  
tertiana, horridior sit tota febris, & nonnulli sibi  
in inuasionē rigoris afficiunt. Confestim verò &  
feruidior est huiusmodi febris, & incendij plus  
habet, magisq. ad summū festinat: & aliquid bilis  
per vomitū, aut per aluū, aut per sudores excerni-  
tur. At si altera ex pituita febris sit præpotentior,  
sic frigus vehemens extremas occupat partes,  
& pauci adsunt horrores, ac pulsus magis, & diu-  
tius cōprimitur: tardiusq. accessio inualefcit, ac  
longi post tempus cōstitit: non tamen aut fitim,  
aut magnam addit incendium: nec in ea, vt in  
alia, bilis excernitur. Itaq. in hemitritico exqui-  
sita, quæ ex æquali duarum febrium (quando-  
quidem humorū duorum) temperatura est cō-  
posita, velvni pugna quædam inter varios affec-  
tus oritur, quum eger nonnunquam inualefcen-  
te febre tertiana, atq. ad cutem humores pellēte,  
incalcescat vehemens, remorante interim re-  
vellente intus ipsius motum febre quæ ex pitui-  
ta ortum habet: \* quum nimirum in humor sit  
tardus ac difficilis motus, frigida & lenta existens  
materia. Dicitur aut hemitriticus febris non ex-  
quisita, vbi aut bilem, aut pituitam habet vinctam.

Est & alia secunda copula commutatioq. dua-  
rum febrium, tertianæ scilicet & quotidianæ, am-  
barum intermittentiū, quæ similem quidem nu-  
per dixit accessionem facit: hoc tamen interie-  
cto discrimine, quod hæc quidem intermitteretur,  
atq. necessariò ad integritatem desinat: quodq.  
die secunda cum rigore aut horrore, sola quoti-  
diana febris invadat. Quamobrem huiusmodi  
febris non est dicenda hemitriticus, si quidem  
ex numero continuarum hemitriticus existit. At  
si in vtroque genere hemitriticus consistat, non  
hæc tantum, sed multæ præterea alie febres, &  
hemitritici dicuntur. Cæterum minimè ex duabus  
continuis, quarum altera ex bile, altera ex pitui-  
ta oriatur, potest hemitriticus produci: quando-  
quidem hæc cōmisit, febrem horridam, & quæ  
multas habeat reduplicaciones, non facit. Nam  
quæ omnis febris continua, sui quidem ratio-  
ne, si exquisita fuerit, neq. horrorem habet, ne-  
que rigorem: certe quæ ex ipsis componitur, haud-  
quaquam horrida fiet. Necesse igitur est, si hor-  
ridus simul atq. continuus sit hemitriticus futu-  
rus, ex duabus ipsius febribus generari, quarum

altera sit intermittens, altera verò cōtinua. Pro-  
inde tertiana mista quondianæ continuæ, hemi-  
triticum producit: quam febrem neque vtrique  
cōtinuā, neque vtrique intermittentē efficere po-  
test. At verò si quotidiana intermittens, misce-  
atur tertianæ continuæ, oriri poterit continuā si-  
mul atque horrida febris. Hæc tamen contrariò  
modo se habebit quàm prior: quoniam conti-  
nuitatem quidem ex bile obtinebit: horrore ve-  
rò, ex pituita: reduplicaciones autem, ex pugna  
mutua, ac tunc pfectim, quum humores æquas  
vires habuerint. Porro quæ de biliosa & pitui-  
tosa febre simul mixtis conscripsimus, ea transfe-  
rentes ad \* melancholicā, poterimus ipsas cum  
vtraque illarum cōmitionem & confusionem si-  
militer cōiecturari. Voco enim complexionem,  
quod inuadum differētib. horis: confusionem  
verò, si eodem tempore incepterint. Tres itaq. si-  
mul febres complecti quispiam & cōfundere po-  
terit, ipse per se, ex iis quæ diximus, contem-  
plationem exoritur. Nam horum omnium prin-  
cipium, fons, atque elementum est, singularem fe-  
brium formam atq. figuram exquisitè cognosce-  
re: id quod perfectè existit, quum tres tantum  
existant nimirum: nempe quæ ex amara bile, & quæ  
ex atra, & quæ ex pituita gignitur. Quare sin-  
gulæ duas habent differēntias, continuæ scilicet  
intermittentiū: ita vt omnium quæ ex humo-  
rum putredine ortum habent, fiant sex numero  
differēntie. Quod si quæ alia accesserint particu-  
latim præter has differēntias, ea vel ex multitu-  
dine humoris, vel ex quantitate vel ex qualitate pu-  
trefactionis, ac præterea ex modo motus, & par-  
ticula in qua putredo consistit, habebit originē.  
Iam verò quæ intermissionem habuerint magis  
rem febres, nempe accessione ipsa in longius re-  
pus producta, et sanè extensæ vocantur: quæ ta-  
men in eo quod magis aut minus, varias differē-  
tiæ recipiunt. Ex accessionis autem & intermit-  
tionis speciei, opportunitate exhibendum et-  
iam tempus cognoscitur.

## CAPVT IX.

Quum autem oriri soleant ephemeræ, sangui-  
ne nō putrefacto, sed tantummodo rursus factio: in-  
vestigandum nobis iam est, si putrefcere alium  
aliquando conngat, quænam species febrium gi-  
gnatur. Porro ab aliena caliditate exoritur putre-  
dinem, rectè professus est Aristoteles. Vocat au-  
tem alienam, externam: non familiarem, neq. in  
tuam. Hæc si quidem coquere nata est, illa verò  
corrumpere, \* quod est putrefacere. Incalcescit  
autē externo calore sanguis, & insolari devotio-  
ne, & pestilēti aëris statu, atq. in febribus vniuer-  
sis, quacumq. ex causa nascuntur. Vbi vero in ali-  
qua corporis parte sanguis plurimus accumula-  
tus, eiusdem partis vim superat, corrumpi cōse-  
quit: præsertim si in paruis vasis propter crassiti-  
dinem consistit, aut ob multitudinem impin-  
gatur: quemadmodum videre est in vniuersis in-  
flammationibus: in quibus sanè duabus de cau-  
sis ipse sanguis corrumpitur: & quia scilicet non  
diffunditur, & quia à natura non vincitur. Nonnun-  
quam itaq. sanguis in inflammans particulis in-  
bire potest putredinem, ex quā simpliciores que-  
dam, quàm ex aliis humoribus febres oriuntur:

similem

Hemitriticus  
exquisita quo-  
modo constituitur.

Hemitritici p-  
tius.

Febris com-  
plexio ex  
mixta quid.

Putredinem fe-  
brium quon-  
da differēntia  
simplici. Iam  
vero necesse est  
habetur.

Hemitriticus  
non exquisita  
quid dicitur.

Hemitriticus  
q. continens.

Critica febris  
non horrorem,  
nec rigorem fa-  
ciunt.

Phenomena in-  
terdum vides à  
sanguine causa  
fieri.

Putredo ab ali-  
na producit  
caliditate.  
Calor naturæ  
conquere, ali-  
tatem corrupere  
est nata.  
Sanguis quæ-  
do rursus calo-  
re rursus cal-  
re inalefcit.

Sanguis in in-  
flammati-  
one caliditate  
conquere, ali-  
tatem corrupere  
est nata.

Febris à putre-  
dine sanguinis  
ortus, simplicior  
esse quàm ab  
aliis humorib.

simile tamen accessione proportionē seruantes, qualem tertianæ febres ostendunt. Sic enim in eis qui lateri inflammationes patiuntur, est obseruatum: quo tempore maximè rubidum expuunt. Quod si sanguis supra modum affertur, pars quidem eius subtilior ac pinguior, omnino in aliam bilem convertitur: crassior autem, in atram, quod in iis tumonibus, qui carbunculæ appellatur, videre licet, igitur pro varietate humorum in quos convertitur sanguis, febres fiunt, solum bonitate vel malitia differentes. Illæ liquidæ quæ sanguinis consequuntur transmutationem, sunt simpliciores, tum in reliquis, tum in caliditate qualitate minori. Nam eis se plurima manuum genti differi, et tamē omnino mitia: nec vi quæ in balneo contrahitur. Semper enim multitudine febrilis caliditas, in multitudine effluuii consistit. Quod vero tan genti manus calor molestus sentitur, ad provent ex humoris accedens. Si igitur calor & vapores & minus insuavis videtur, a sanguine proficiscitur. Qui vero molestus, rodentes atque mordaces existunt, consequuntur vitæ bilem. At ubi in primo occurrit, aliquid magis vaporosum si acre, se representat manus, sed per moram paulatim crecit mordacitas, eripit admodum inæqualis, penitē ac si per cribrum ex colari videtur, ex puriore putredine corporalem febrem ne dubites. Indaganū autē mihi, cur in febribus alius calor æqualis occurrat: quæ verò ex pituita ortum habent, talem caloris inæqualitatem ostendit: tenacitas & pituitæ crassitudo, quæ dissolvitur ære, vitæ esse in causa. Si quidem ex eo humore, sicut ex alio omnibus, ea pars prima omniū expirat, quæ iam attenuata fuerit: vix autem attenuatur, quod valde crassum existit. Quod si etiam iusta frigidi fuerit, tunc difficultas augetur: ac proutē ius totus humor, nec ex omni parte æqualiter, sed ex illa tantū, in qua putredo invaluerit, efflatur, atque attenuatum effertur.

## CAPVT X.

Solent autē per circuitus asiligerē, quæ admodum febres, alij etiam morbi particulares: vt hipitridines quædam, nonnullique aurium, capitis, necnō articuloꝝ dolores. Vt igitur per hosce affectus videre licet, venas quidem in partibus quæ exacerbantur in tumorē attolli, atque inflammationē augeri, dolorēq; intendi, ac deniq; affluxum materię iuvilis ad exteriora fieri. sic etiā in interioribus oportet imaginari ea omnia, quæ cū minimē cadant sub sensum nostrum, eandem tamē cum illis perpetuā analogiam fortuntur. Itaq; in laterum & pulmonis inflammationibus, circa accessione quidem principia, tumores increfcunt, in declinationibus autem, evapōrant, & submittuntur. Porro alibi a vobis est proditū, esse quatuor naturales potentias, a quibus dispensantur res plantæ, tum animalia. Quarum prima quidem est, simulq; attractrix: secunda, eorundem reventrix: tertia post has, alteratrix: quarta deniq; alienorum expultrix. Duplex autem est in omnibus rebus alenum: alterum quidem qualitate, alterū verō quantitate. Accutatur autem hoc, ob earum potentiarum quæ in membris sunt, vel imbecillitatem, vel robur. Ege-

num si æque valentes ipsæ partes extiterint, & meatus quævis item in materiam deducant, secundum naturam se habuerint, tunc membra lauta se iustit. Vbi vero plus assumptū fuerit, quam alterari possit, omne id quod superfluum est, a virtute expultrice trusum, excernitur. Quod si hanc imbecilla fuerit, in eodem residet loco: ac tumultum sit, grauat, distenditque: in acre, exedit, ac mordet: sicut & quod calidū est, calfacit: quod frigidum, manifestè refrigerat. Soler autem sepe excrementum ab aliis in alias partes et amollire, tormionibus nempe id tempore a se pellentes, insipientibus autem imbecillioribus. Qui motus non cessat, donec in eas quæ omnia imbecillitate sunt, oberrant humor incident. Hinc verò ad fortiores relabi est impossibile. Idcirco per plethoras atq; acochymias, imbecilliores partem insistenti solent variis fluxionū affectibus. Nihil igitur mirum, vel cerebrū, vel vniuersum caput, excrementū in se collectum, ad partes imbecilliores expellere, vel in aures, oculos, tempora, labra, dentes, malas, palatū, gingivas, gurgulionem, paristhymia, atq; deniq; ad glandulas illic consistentes. Quod si ex his nihil imbecillitatem patiatur, ad pectus, pulmonem, fauces, gulam, ventriculum, ipsa fluxio delabatur. Sicuti igitur causa talium omniū morborū sepe numero est caput, ita & eas quæ in iecinore ac liene sunt inflammationes, aliquæ partes vicinæ, vel etiam ex remotioribus aliqua vna, vel plures, generant, augent, impingunt, ac per circuitum exasperant. Qui igitur nequus non fuerit, primam inflammationis originē, ex fluxione in hepar incidente, suum ortum traxisse: ac quod deinceps exacerbetur, causam in ipsa parte patiente consistere: vniq; is non mirabitur in febribus quæ accenduntur ex hepate, ordinis proportionem. Consistit autem materia iuvilis interdum quidem (quatenus dictum est) impulsa ad interioribus particulas, interdum ab illis attracta. Etenim calor iustarum est aptus ad conciliandas ac recipiendas fluxiones. Proinde in corporibus plenis, aut in quibus excrementa redvndant, magna portio ad eas delinit partes, quæ in caluerint vehementius. In iis autem quæ superfluitatibus vacant, admodum pauca. Nō parum verò & ad partes dolentes humoris soler confluere. Videntur itaq; manifestè, fluxionū causæ quæ ex ipsis partibus laborantibus oriuntē trahunt, esse duplices: quarum altera est, in ipsis caliditas: altera, ex itatis dolor. At verò quod melius sit, aut deterius, quod insiliit, ex partibus mittentibus pendet: quod plus vel minus, tum ex iis quæ mittunt, tum ex eis quæ recipiunt. Hæ igitur sunt differentie fluxionū, quæ line partiu, quæ fluxiones admittunt, imbecillitate consistunt. Aliæ verò, & propter hanc imbecillitatem, & propter earum robur, quæ excrementa transmittunt. Cæterum omnes quæ circa vulnus & contusione, partibus adveniūt inflammationes, excrementis quæ a tormionibus membris propulsantur ad infirmiora, gignuntur. Vbi autem cōspicua excrementa in particula inflammatione patruerint, calor quidam præter naturam accenditur, qui ab infirmo membro in alia illi

Sanitate quam do fructus membra.

Excrementa seu per a fortioribus, ad partes amorem in vniuersum maius trahi.

Febres ex hepate accenduntur.

Fluxio salis humoris ad dolentes particulas.

Infinita partem quæ modo superuenit febri.

vicina, atq; ab his in alia, successione quadā extenditur, donec ad cor aliquādo ipse calor perveniat. Porro vbi superfluitas quæ ab vna in alteram partem transferitur, adeo copiosa & visiofa est, vt facultatem recipientis particulæ opprimat dissoluaturq; sic vtiā nequeat viuere, quæ antea vivebat: tunc certe necessum est, vt ipse etiam putrefcat sanguis: idq; ratione duplici, & quia humor, qui a proprio calore nō vincitur, nihil amplius superest, nisi vt in putredinē transeat: & quia cum superfluitatibus putrescentibus simul ipse putrefcat. Quod si nec tanta, nec tam visiofa ipsa superfluitas exiit, vt facultatē omnino dissoluatur, atq; feriat compellat, semiputris ac semivivatus in tali statu reddetur sanguis, ob cōmerciū quidem putrescentiū excrementorum, ad putredinē raptus: tantū verō in natura sua perseverans, quantum ab ea, quæ exornat ipsū potētia, vincitur. Vtque verō res habeat, ac in prima putredine accenditur calor, acrior atq; mordacior est eo, qui naturalis existit. Tantum autem augetur, quantum natura superfluitas suppeditat. Hæc siquidem ad eum qui ab ipso calor augetur, ferē similem quandam rationem habent, quā ligna ad ignem. Etenim hæc minime in infinitū viget tempus ad alterationem sufficiunt: sed est quidam transmutationis terminus, cum tandiu possint exuri, quandiu aliquid naturæ caloris habuerint. Qui vbi consumptus ex toto fuerit, tunc ardere iam desinit: & quæ fuerunt reliquæ, cineres appellantur. Eodem igitur modo putrescentium humorū caliditas permanet, donec prius fuerint assati. Parum autē reliquiarū terrestriū restare ex humoribus est verisimile, quoniam in eorū substantia humidum & nō siccum prævalet elementū. Cum itaq; feruentes in putredine humores a calore extenuentur, substantia ipsorū vbi febres cōsistunt atq; declinant, in ambientem ætherē dissolvuntur: superfluitas autē, vel exigua remanet, vel nulla petiuit: ex crassioribus quidē humoribus, pauca: ex ferrioribus verō nulla. Quod si nullam imbecillitatem pars inflammata contraxerit, neq; iterum superfluitates accedant, ægritudo sinietur, nec rursus homo febricitabit. At si illæ mitrantur de novo, aut ne mitrantur quidem, sed addit sola potentia imbecillitas, hominē secundo febrile est necesse. Fingamus enim, primū quidem validā esse particulæ facultatē: interim verō eisdem in partibus, quæ prius transfluxerunt, accruas esse rursus superfluitates, & quantitatē & qualitatem pares, ut quas antea immiserant: certē nemini dubiū est, quin eodem quoq; circū ad eas expellendas, versus imbecilliora membra, movebuntur ipse immittentes partes. Siquidē vis excretoria tunc primū exigitur ad propriū opus, quando aut multitudine superfluitatū grauiatur, aut qualitate pungitur. At verō cum in lippitudine quæ per circuitus accedit, medicū qui se ocularioque vocant, semper oculis negotiū facessant, nos aliquando purgatione, aliquando balneo, interdum meri potione, interdum misione sanguinis, atq; interdum clystere vti sumus. Quia in dūstra nonnunq; statim est subsecuta sanitas, nonnunq; post curationem capiti ad-

hibitam. Nam quandiu humor qui ad caput confluxit similis fuerit, eadēque dispositio capina, tandiu superfluitates æquali tempore, & similes & æquales accruabuntur, similesque oculorum exasperationes oriuntur. Quod igitur contingit in oculis, idem in pulmonis, cerebri, laterū, & aliarum partium inflammationibus accidere potest, si illæ quæ superfluitates transmutant, sint eodem tempore imbecilliores. Mirandum autem non est, si non eisdem statim temporibus eadem excrementa accruantur. Nam cum is qui pro alimento sanguis deservit, nō temper viqueatq; in similes, nec item nutriendarū particularum eadem dispositio: aliud aliud sumat tempus ad colligendam tantam superfluitatem, a qua quidem vbi primum membri natura leditur, cogitur eam tantum alienum onus proferre. Sed neq; ob accessionū imparitatem mirari oportet. Nam si non eadem est nec species, nec multitudo superfluitatū, non oportet eas similiter omnibus aut accendi, aut dissolui. Nam quæ plura & frigidiora, remacioraq; & crassiora excrementa sunt, faciunt accessiones longiores: quæ autē pauciora, calidiora, & subtiliora, breviores. Præterea rarior quidem corporis habitus, breviores sui ratione accessiones reddit: densior autem, longiores. Quoniam potentia robur, minus diuturnas efficit accessiones: imbecillitas autem, in longius tempus producit. Longissima itaq; accessio fiet ob materiam inviolatissimam, crassitudinem, lentorem, facultatis imbecillitatem, ac meatuum angustiam. Breuissima autem, propter materiam involutatissimam, paucitatem, potentem vigorem, ac laxitatem meatuum. Cum igitur prima accessio tempus adeo breue fuerit, vt utraque superfluitas secunda, iam prima quiescit, omne id temporis spacium, quod secunde principii & primæ finem interiacet, sine febre est. Si verō secunda invadere anticipaverit priusquam omnino prima solvatur, nihil intervenit medium. Hoc autem fit, cum facultas membri recipientis superfluitates, sanguinem in se contentū, quemadmodum antea, cōvincit. Quod si quando imbecillior reddatur, non solum materia inviolat, sed sanguis etiam cum ea corrumpetur & putrefiet, ex eoq; accendetur febris: atque hinc oritur aliud principium earum, quæ per circuitum sunt, accessionum. Si igitur caliditas ab excrementis orta, etiamnū perseveret, duplex febris seivicem complectentium species gignetur. At si illa cessaverit, membri verō fluxionem recipientia dispositio remanserit, quæcumq; de parte mittente prius exposuimus, eadem de hac quoq; intelligantur. Nam & ipsa aliqua in se superfluitates gignit: idq; duplici ratione, quemadmodum illa, & quia vitiisum sanguinem continet, & quia facultas eius est imbecilla. Eodem modo si ex aliqua quavis causa membri vis adeo debilitetur, vt is qui adiacet sanguis, illi se potius oneri, quā nutrimento: cōtinget vt corrumpatur, aut si calidior sit, putrefiat. Nam si frigidus fuerit, & prius naturam gerat, non subit, sed tempore ad eandem veniet dispositionē. Porro si eas quæ in ipsa genita fuerint superfluitates,

Sanguis quādo  
necesse est po-  
terius.

Excrementa so-  
ni calori pre-  
ter naturam,  
quoniam modū  
legem.

Potes per circuitu  
mores morbi,  
unde accedit.

Excretoria facili-  
tas quando me-  
morat.

Lippitudinem  
accidentem per  
circuitus quo-  
modo curari  
Galenus.

Accessionum  
imparitas ra-  
di accedit.

Accessionum lon-  
giorum aut bre-  
viorum cau-  
sa accedit.

Accessio longis-  
sima a qua-  
li.

Accessio brevis-  
sima quādo di-  
tugat.

Excrementa  
per vias ad a-  
lium mittit.

tates, nequiverit particula aut coquere, aut ad aliam partem detrudere, tale sibi ipsi febricendi principium constituet, quale ea quæ transmittit alteri, asfert. Nequit autem aliis superfluitates transmittere, aut ob propriam imbecillitatem, aut propter recipientis robur, aut denique ob confipationes meatuum, quæ fieri à lentis & crassis & multis humoribus consueverunt. Quæcumque autem naturales meatus obstruuntur, hæc necessarii putrescunt tempore, atque etiam in causa sunt, ut in ea parte multitudo coaceruetur excrementorum, cuius solitam evacuationem & dissolutionem prohibent. Vnde igitur cum illas putrescunt & alia quæ postremo accendantur, statimque simul omnia in membro febrilem caliditatem accendunt. At vero, ubi cumque accenditur atque augetur caliditas, illuc ab aliis partibus sanguis solet confluere. Quo igitur tempore confluit, illas quidem priuari sanguine est necessarium: quod vero patitur membrum, gravari & dissendi: ipsi quoque confluentem sanguinem alterari, & quoddam alius quæ iam putruerunt superfluitatibus permiscetur, & quod dissari, vix potest impactum, non possit. Proinde fit, ut in illarum liquorum humidiora, quæ super exiguum flammulam præcipiuntur assitam, succedatur. Quod totum est accessionis principium. Vbi autem caliditas iam materiam convicerit, id tempus augmenti vocatur. Vbi vero calore per universum corpus disperso, inflammari humores ad summum feruorem pervenerint, id accessionis tempus, dicitur consistere. Hinc igitur si humores fuerint tenuiores, potentia robusta, corpus rarum, maxima humorum putrescendum pars in sudorem resoluta evacuetur. Sin vero hi crassi fuerint, & vis expultrix infirma, nec non meatus angustius, nihil quidem defluit: scilicet id totum, quod tunc est externum, & vix in subtilioris vaporis naturam transiit. Atque id sane tempus declinationis appellatur, humorum effluviis tum dissatis quidam existens. Externum cum in parte adhuc remaneat affectus, necessarium est in ipsa aliam signi superfluitatem, cum nimirum id quod denique ad ipsam trahitur alimentum, non concipiat exquiritur universum. Quæ quidem superfluitas rursus à putridis excrementis in parte relictis, nec non proprio ex vitro, initium putredinis suscipit: cumque satis caluerit, rursus ad ipsam insiluit, quemadmodum antea, ex reliquis animalis partibus sanguis: ac sic eodem rursus modo, principii, ascensus, status, & declinatio, alterius sit accessionis. Nec hoc per circuitus definit fieri, quando in particula gignente superfluitates perseverant affectu: quæ quidem existit duplex: altera quidem imbecillitas partis, à qua superfluitates gignantur: altera, quæ ex ipsa quotidie genitis ducit originem. Impossibile autem est solui remanentem illam dispositionem, si universum corpus multis ac variis excrementis repletum fuerit: ac multo etiam magis, si illis accedat omnino, per quos excrementa membri excrementantur, astrictio meatuum. Sanitas autem succedet, si & meatus aperti sint, & facultas velocior, & corrigatur affectus partis, universumque corpus nec multis nec viscosis humoribus opprimatur. Nam

serpens fa-  
lida tempore  
dissolvitur.

Declinatio ac-  
cessus febris  
si et humoris  
dissolutum  
dissoluitur.

afflictus partis  
levis.

accidentum  
veniens quia  
le debet, &  
quod per se  
venit.

quandiu hæc perduraverint, tandem accessio circuitum persequere est necesse. Quemadmodum in mulieribus accidit, in quibus quandiu æquales ac similes menstruum causæ perseverant, idem circuitus servatur. Earum igitur febrim, quæ per circuitum accessiones facit, nescio an aliqua fuerit nobis omnia causa: aliarum autem quæ carent ordine, nonnullæ ex translatione humoris, nonnullæ ob victus errorem, ad talem dispositionem deveniunt. Maxime autem transmutatur, atque in alteram transit naturam sanguis, dum putrescit. Nam pars quidam ipsius viua sit hausa bilis: alia, nigra. Quotum vero in ægrotantium corpore humores mutantur, tantum etiam accessio circuitus. Quæcumque autem causa victus rationem errata ab ægrotantibus sunt, ordinem circuituum pervertunt. Expe vero ob complicationem circuituum, quæ à medicis ignoratur, videntur ab his ordine accessiones ægrotantibus fieri. Reliquum est id febrim genus, quæ synochi nominantur, quarum universum tempus unica accessione finitur: quæ vel semper in eodem vigore persistit, vel minuitur, vel augetur, donec finitur. Hæc vero omnes ex tali causa ortum habent, qualem Praxagoras exstigmat, humorum videlicet in causa venæ putrefactionem. Quanquam absolutior & venor hic erit sermo: Quæcumque per circuitus aliquos ægrotantium accessiones sunt, ex membrorum dispositionibus ortum habent, quæ vel mittunt, vel recipiunt, vel generant, vel attrahunt superfluitates. At quæ circuitum non habent, in his nulla est corporis pars, quæ præcipue sit offensæ. Qui autem in venis & arteriis omnibus continentur humores, præcipue qui in maximis & plurimo calore abundantes detestantur, aut ob aliam quamvis causam, quemadmodum in ephemeris, aut ob putrefactionem feruentes, febrem accendunt synocham, quæ à principio vix ad finem nullam habet intermissionem: ac tandem perseverat, hominemque devit, donec humores ipsam gignentes, aut consumantur penitus, aut coquantur, aut utrunque patitur.

Sanguis putrescit, alia natura transit.

Circuitus ordinis quæ pervertunt.

Synochæ vel notum tempus vixit accessio.

Circuitus facit ex morbi, ex membrorum dispositionibus, vixit accessio.

Synocha generatio.

## GAL. DE DIFFERENTIIS FEBRIVM LIB. II. de marasmo sine tabe, liber.

**M**arasmus est viuentis corporis interitus præ siccitate. Cum autem interitus bifariam dicatur, tum de eo qui fit, tum de eo qui iam factus est, sane secundum prius significatum oportet appellationem accipere. Similiter etiam marasmus, hoc est, tabes dupliciter dici poterit, nempe cum iam aliquid tabuit, vel cum adhuc tabescit: de qua quidem significatione et secunda, impresentiarum nobis est sermo. Porro cum generata viuentium sint tria, videlicet animalia, stirpes, & semina, ac propter hæc etiam fructus: tabem quidem esse horum affectum, propriè loquentes dicimus: quamvis per translationem & ceteros etiam interitus, cum ex siccitate proveniunt, communiter tabem appellent. Cum igitur primi & simplices modi quibus omnia viuentia intereunt, sint quatuor, siquidem & elementa substantiarum eorum quaterno etiam nume-

Marasmus est viuentis corporis interitus præ siccitate.

Marasmus est duplex.

Viuentium generata tria.

Tabes quorum est affectus dicitur, interitus modi sunt quatuor. Elementa viuentium sunt quatuor.

ro ambiantur: tabescere sanè ea dicimus, quæ ex siccitate intereunt. Quod si hæc tantum habeant, quod siccitentur, altera verò contrarietas quæ inter calidum & frigidum interduat, mira quos terminos maneant, simplex ea tabes erit. At si vel calor vel frigoris accedat immoderatio, iam modus in interitus, duplex & compositus erit. Simplex itaq; tabes in edus solet supervenire, tam coru qui in ediam ipsonè tolerant, quam eorum qui præ alimentorum penuria, fame con-

siccantur. Illa verò cui frigus accessit, solet scilicet eventire: vel enā illis, qui malo quodam affectu senectuti simili denentur. Ea autem quæ cum calore est, in febribus locum habet, quæ hæcæ nominantur. Nec verò imprecipitè de partibus loquimur, quæ ex aliquo symptomate ardeant: sed potius cum totum corpus hoc se habuerit modo. Quæcirca si tabes affectio est vniuersi corporis, ea fieri nequit, nisi animam

principium etiam affectum sit. Quæcirca fieri non potest, ut alius affectus totum ipsum animal occupet, ab alio verò principium ipsius deperiat. Ac proinde necessum est, ut in tabidis, ipsius cordis corpus ardeat. Quæcirca si invenerimus causas omnes, quibus cor ardesce possit, facile tunc conerimus, an omnes tabidi insanabiles sint, an ex his potius sanari queat. Quamvis autem huius instituti principium erit, si periclitari fuerimus omnes causas senectæ:

quandoquidem ea inter omnes tabes vique adeo vitari infimè potest, ut esse secundum naturam videatur. Siquidem inevitabilia sunt omnia nature opera, vtpote habentia necessarium suæ generationis ordinem. At non eo modo dicimus senescere esse secundum naturam, quo ali, & augeri (sunt enim hæc nature opera: senectus autem non opus, sed affectus quidam necessarii consequens illa) verum hoc nomine, quod nullum vnumquam sit visum animal, quod ortu fuerit, quin idem sit senio obnoxio. Quamquam non desuit nostris his temporibus philo-

sophus quidam, qui librū addidit, quo docebat, quæ quis posset ratione servari penitus senij experti: qui tamē, posteaquam ad octogessimū vix annum produxerit vitam, adeo gracilis & exiccatus effectus erat, ut verè faciem illam exprimeret, quam descripsit in libro prænotionum Hippocrates. Num igitur propter id siccescunt tum animalia, tum plantæ (quod nonnulli affirmant) quia in suis animantibus calor, veluti ignis quidam, ex ea materia in qua accessus est, suum incrementum fortitur? Etenim illi semper affixus est, nec vnumquam inde seiungi potest, unde etiam sua omnia habet. Plantæ igitur, animantiq; omnia, quando recens genita sunt, admodum humida existunt. Quamobrem calor (ut illi aiunt) in ipsis tunc veluti suffocatus obstruq; præ humo-

ris copia, vix se potest exercere: nimirum caliginosus, tardus, ad motum piger cum sit. Postea verò ipsam humiditatem progressu temporis superat, & cuiusq; materię præterit: quo tempore iam purus æthereusq; redditus, suæ omnes expedit functiones edit. Itaq; vix ad ætatem vigoris relucet, augendiq; cuius magnitudo plurimum tunc attollitur. Mox verò inopia

alimenti contingit, ut contabescat paulatim: atque id ipsum exstitit senectus. Sed & paulo post exinguitur penitus, id quod mors est. Hic itaq; sermo omnibus ferè tam philosophis, quam medicis recentioribus placet, licet Verus omni ex parte non sit. Hallucinatur utiq; dum flammæ ignis omnino cum calore animalium cõferunt: idè minime animadvertentes, quod ortus flammæ est ex materiæ interitu, de qua ea est accessio. Animalia verò, non sic sumus, ab eo qui illa efficit, infusum habere calorem: sed potius ut ab eo augerentur regerentur. Nec vllum est tempus, quo minatus sit calor per vniuersam eam materiam nõ diffundatur, vires non modò eas cõmens, quibus animal format, verum & alias græterea partes: quippe & alimentū attrahit, & materiam dispensat, apponit, vniat, assimilât, omniaq; ut in summa dicam, circa sibi congenitam materiam pericit, contra quælibet illamina faciat.

Nam quæ vnumquam flamma, materiæ cui annexa est, adauget: vel quæ etiam materię ponus alimentum assimilât, quam eam sibi. Erque hoc excogitavit modos, ut eam tueretur materiæ, itaq; eum illi sibi eam calorem esse naturam faciantur, non rectè faciant flammæ eum comparantes. Nam quod aut Hippocrates, eum calorem interficere, qui genuit corpora: certè si liber illi reſerti ad Hippocratem debeat, locus in requirit expolitione. Verum siquidem est, corpora

oli in animæ calorem senescere intereunt: modum tamen, quem illi aiunt, verus nõ est. Neque enim ut flamma ligna, ita inuatur animantibus calor, eorum corpora absumit. Quod fortassis exemplum illis congrueret, qui ob febrem caliditatem intereunt. Porro natura, quæ tum animalia, tum plantas procreat, omnino corpora aliquod principij, ad illorum generationem assumit: cum nihil sit, quod vnumquam possit sui ortus initium habere, ab eo, quod penitus esse non

ens. Inde verò exordia, semper in eum scopum ordinatè tendit, quem in ea procreatione statim ab initio sibi proposuerat. Id autè est, perfectum illud reddere, quod ab ea gignitur. Danè perfectū est, quando nulla suarum functionum deest illi. Ipsarum autem functionū complures durioribus instrumentis egent. Unde postea fit, ut multe in animantibus particule dure evadant. At principium generationis ipsarum, contra quam in animali perfecto, necessum est ut sit molle, ut & aptè cõpingat, efformariq; possit, & ad omnia tractabile se suo conditori exhibeat. Ac proinde, quancūq; semen fit durum, mollius tamen planta ædatur, moderato nimirū quodam humore prius macerata, ut pro semine fiat natura. Itaque si opus est, ut generatio animalis à substantia molli sua habeat exordia, quæ ut absoluitur, ita dureſcit: necesse viq; fuit, ut in prima elementorum, unde illa constituitur, temperie, tum humidum, tum siccum præpollat. Cæterum humidum quidem ipsum est aqueum: siccum autè,

naturaliter aut est terreum, aut igneum. Fieri verò minime poterat, ut statim à primis exordiis, plus terre cõmiseretur, cum opus esset principium animalis fore humidum: reliquum igitur solum est igneum, quod in prima animalis generatione

Tabes simplex  
qua dicitur.  
Tabes composi-  
ta qua.  
Tabes simplex  
cordis solet su-  
pervenire.  
Tabes composi-  
ta quæ, super-  
venire consue-  
uerat.

Tabes fieri non  
potest, nisi ani-  
mæ principij  
affectum sit.

Senectus vitari  
non potest.  
Inevitabilia of-  
fe natura ope-  
ra.

Nature opera  
quæ.  
Senectus.

Senio anima-  
lia ortæ esse o-  
mnino obnoxia.

Calor noster  
quomodo an-  
teatur & in-  
ducatur in opo-  
rata.

Senectus quid  
mors.

Flammæ qui  
non esse semp  
randa cum ca-  
lore animalis.  
Calore visus  
et flammæ quæ  
ignis motu disti-  
nguuntur.

Calore opera.

Calorem naturæ  
esse naturam.  
Calor qui po-  
test corpus, pe-  
nitentia aut.  
Senectus ab in-  
nature calorem  
corpore.

Nihil est molle  
in fieri.

Principium ge-  
nerationis par-  
ticulæ, cum se  
efformat, sit in-  
ducendum.



ratione & formatione, obtinet principatum. Si igitur fieri posset, vt natura cum animal, vel plantam, ad consistendi vigorem perduxerit, aliam rursus elementorū dispositionem, proportionem viribusq; equalē, apponeret, sic tantummodo sua illi fabrica posset exars tam sensu, q̄ interius perdurare, si tamen custodire sapientis alicuius viri mox demandata fuisset: alioqui si malam adhibuisset victus rationem, ab interitu immunis non esset. Nunc verò posteaquā prima elemēta generationis tam animalium, quā plantarum, nec transferri, nec transmutari possunt: idcirco necessum est, post consistendi vigorem corpus semper siccescere, quamvis non amplius egeat, vt id ipsum patiarur, cum iam illi v sui nou sit, vt siccescat. Verūm etas inclinatio- nis, quæ siccitatem quidem, quamvis exiguam, habet, multos latet, ac si nondum aliqua tabes sit. Senectus autē, quæ ab ea non generat, sed tantū magnitudine differt, facile deprehendi potest. Hęc igitur causa est, quæ vniuersam animan- bus tractū temporis siccitatem prestat: perspicuū ostendit, senium nec evitari, nec etiam sanari posse. Etenim vniuersa etas, quæ vigori succedit, frigida est & sicca. Manifesti autem si- nes, inter eorū etatem quæ iam declinat, & eorū quæ senescunt, humorum est excremento- rum exuperantia. Vnde quidam decepti, statuerunt senium esse humidum. Ceterū & omnes actiones itam in his fieri imbecilliores, mani- festē videri possunt: atq; etiam vā ad mortem, quæ latebat in inclinātib; iam omnibus est cōspicua. Quamobrem senectutis tabes nequit vltā ratione dissolui, licet ipsam plurimum remo- rari possimus: quod munus ad gerocomicem, hoc est, ad artem senū curatricem, spectat. Quæ quidem hoc sibi proponit, vt quoad eius fieri potest, obstat, & prohibeat, quid minus ipsum cordis corpus eorūque arefcat, vt ab omni ope- re vacet. Siquidem vitæ terminus vacuitas cor- dis est ab actione: cum impossibile sit mori ani- mal, quandiu cor sua actione moueatur. Quare si posuit substantia corporis ipsius cordis humi- ditas fieri, vel per Ioue enī iecinoria, poterit sene- ctuti obstiti. Si verō nemo est, qui quæsecur vel cor humidiora reddere, quā ipsa sint ex se- se, sed potius semper tempore procedente ea ne- cesse est indes sicciora fieri, cum eisdem arterias & venas, senium quidem prohiberi nō potest: tamen detineri, ne citō ingruat, idq; hume- ctante adhibita victus ratione, qua nimirum au- gere possumus illam humiditatem, quæ in cor- de iecinorēque est dispersa. Cum autem cor (cui valentissima est attractrix facultas) sit origo pul- sū & arteriarum, quemadmodum venarum atq; sanguinis hepar: contingit vtiq; vt hec vi- scera nunquam moderatis alimentis destituan- tur, nisi cum valida sanguinis penuria vniuer- sus occupauerit corpus. Vnde vbi corpus ex longo morbo extenuatum fuerit, putandum nō est, cor quoq; atq; iecur leuare, esse pro aliorum proportionē extenuata. Ceterū verā tabes, simi- liter partes omnes occupat, propterea quōd etiam a principia ipsa. Atq; hæc tabes in arta- ribus quidem, est senium: in iis verō qui præter

naturam affecti sunt, febris tabifica, & alia præ- terea affectus, quam senectam ex morbo cōmo- de appellauerimus, idq; longe melius quā Phil- lippus, qui eam etiam tabidam febrem nomi- nat. Nam quæ febris vnquam huiusmodi erit affectus, vbi cor frigidius redditum est, quā ra- tio naturæ posset. Quod autem per eum affec- tum sit talis ipsius cordis temperies, indicio est pulsus rarus & parvus, similiterq; spiratio rara si- mul & parua, necnon qui expiratur aer, minimē calidus. Quæ sanē tabis species sit, febribus ob- intempestuū immoderatamq; refrigerationem in eam transcurrentibus. Est & alia tabis species, quæ dicitur torrida, sicut & tertia, quam synco- palem appellant: quarum illa quidem ortum ha- bet a calore, febribusq; ardentissimis, maxime verō vbi habitus fuerit siccior: hæc autem gigni- tur, quando iis qui correpti fuerint deliquio ani- mi, vbi vehementiam periculi effugerint, aliquid ex eo affectu remanet, ita vt adhuc defectum il- lum animi sapiant. Est autem duplex ipsa extenuatorum affectio: vna quidem, vbi in humor solidorum corporū perit, qui eorum proprium est alimentum, & præterea molliores carnes li- quate sunt: altera verō, dum solidiora etiā cor- pora sunt exaccata, quæ vtiq; & prima, & simila- ria appellantur. Hæc igitur nequit curari, sicuti nec senectus. Altera verō periculo quidem non caret, non tamen eorūq; vt nullo modo curari possit. Igitur humectare oportet tres illas spe- cies tabis iam dictas: & hoc est illis commune, quippe quæ cōmunem siccitatem fortiantur. Sed earum vna eget vt calfiat: ea nimirum, quam com- parauimus senectuti. Altera verō, quam esse tor- ridam diximus, refrigerari postulat. At tertia, quæ habet animi deliquium coniunctum, si nō- dum facta sit, sed etiam nūm fiat, ita vt humidi- tas solidis membrīs innata absumatur, miscella- neam curationem desiderat. Conspicue autem humectare resiceretq; exiccatis videtur balneū, vt facile possumus in iis obseruare, qui ætate sub sole vel iter faciunt, vel alio quopiam modo exercentur, aut exvntur. Hos enim omnes, at- que etiam eos qui siticulosi sunt, humidus red- dit, & siti liberat. Sed & alios omnes quocu- que modo exiccatis, siue ex vigilia, siue ex cas- ris, siue ex venere, siue ex edullis, vel medicamē- tis exccantibus, siue ex ira: hos inquam omnes madefacere foueretq; balneum videretur. Cum au- tem sint tres differentie febrium generalissimæ, in præsentia quidem omitamus diarias: conuer- tiamus verō sermonem ad eas, quæ ab humoris proficiuntur: & ad illas etiam, quæ quōd in habitu sunt, hæc tibi nominantur. Illis igitur quæ ex putrescentibus humoribus accenduntur, si concocti n̄ fuerint, balneum remedio est. Hæc tibi verō quæ solæ consistunt, nec aliud quod- piam genus febria febri habent, balnea quovis tempore cōferunt. Sin autem illæ secum febrem aliam habuerint, ex iis quæ ab humoribus pen- dent, cum q̄ concocti iam fuerint, Eadem etiam tempora putandum est esse cōmoda, ad propi- nandam frigidam: præterquam quod si in hoc aberraueris, id minimē fiet sine magno incōmo- do. At balnearum vias in iam dictis febribus

Tabes, quæ ex morbo iecur ap- pellatur, non est tabida febris. Senectus ex mor- bo quomodo intelligatur.

Tabes torrida intelligitur. Tabes synco- pale quæ dicitur acci- dat.

Extenuatorum affectio est duo- ple.

Tabes incurabi- lis quæ dicitur sit.

Tabes vniuersa quomodo sint curanda.

Exiccatis ma- gis se videtur resurre balneū.

Balneū vtiq;

Febriū tres dif- ferentia genera- lium.

Putrida febri- bus, quibus a- liam non copul- lant, balnea quovis tempore cōferunt.

Putrida febri- bus, quibus a- liam non copul- lant, balnea quovis tempore cōferunt.

Senectus necesse- sario corpus post consistendi vigorem.

Senectus ab in- clinatio etate- nis generat, sed magnitudine differt. Senectus nec evi- tari nec sanari possit. Hęc igitur causa est, quæ vniuersa animan- bus tractū temporis siccitatem prestat: perspicuū ostendit, senium nec evitari, nec etiam sanari posse. Etenim vniuersa etas, quæ vigori succedit, frigida est & sicca. Manifesti autem si- nes, inter eorū etatem quæ iam declinat, & eorū quæ senescunt, humorum est excremento- rum exuperantia. Vnde quidam decepti, statuerunt senium esse humidum. Ceterū & omnes actiones itam in his fieri imbecilliores, mani- festē videri possunt: atq; etiam vā ad mortem, quæ latebat in inclinātib; iam omnibus est cōspicua. Quamobrem senectutis tabes nequit vltā ratione dissolui, licet ipsam plurimum remo- rari possimus: quod munus ad gerocomicem, hoc est, ad artem senū curatricem, spectat. Quæ quidem hoc sibi proponit, vt quoad eius fieri potest, obstat, & prohibeat, quid minus ipsum cordis corpus eorūque arefcat, vt ab omni ope- re vacet. Siquidem vitæ terminus vacuitas cor- dis est ab actione: cum impossibile sit mori ani- mal, quandiu cor sua actione moueatur. Quare si posuit substantia corporis ipsius cordis humi- ditas fieri, vel per Ioue enī iecinoria, poterit sene- ctuti obstiti. Si verō nemo est, qui quæsecur vel cor humidiora reddere, quā ipsa sint ex se- se, sed potius semper tempore procedente ea ne- cesse est indes sicciora fieri, cum eisdem arterias & venas, senium quidem prohiberi nō potest: tamen detineri, ne citō ingruat, idq; hume- ctante adhibita victus ratione, qua nimirum au- gere possumus illam humiditatem, quæ in cor- de iecinorēque est dispersa. Cum autem cor (cui valentissima est attractrix facultas) sit origo pul- sū & arteriarum, quemadmodum venarum atq; sanguinis hepar: contingit vtiq; vt hec vi- scera nunquam moderatis alimentis destituan- tur, nisi cum valida sanguinis penuria vniuer- sus occupauerit corpus. Vnde vbi corpus ex longo morbo extenuatum fuerit, putandum nō est, cor quoq; atq; iecur leuare, esse pro aliorum proportionē extenuata. Ceterū verā tabes, simi- liter partes omnes occupat, propterea quōd etiam a principia ipsa. Atq; hæc tabes in arta- ribus quidem, est senium: in iis verō qui præter

Gerocomicē.

Vitæ terminus vacuitas cor- dis est ab actione. Senectus ex mor- bo quomodo intelligatur.

Senectus ab in- clinatio etate- nis generat, sed magnitudine differt. Senectus nec evi- tari nec sanari possit. Hęc igitur causa est, quæ vniuersa animan- bus tractū temporis siccitatem prestat: perspicuū ostendit, senium nec evitari, nec etiam sanari posse. Etenim vniuersa etas, quæ vigori succedit, frigida est & sicca. Manifesti autem si- nes, inter eorū etatem quæ iam declinat, & eorū quæ senescunt, humorum est excremento- rum exuperantia. Vnde quidam decepti, statuerunt senium esse humidum. Ceterū & omnes actiones itam in his fieri imbecilliores, mani- festē videri possunt: atq; etiam vā ad mortem, quæ latebat in inclinātib; iam omnibus est cōspicua. Quamobrem senectutis tabes nequit vltā ratione dissolui, licet ipsam plurimum remo- rari possimus: quod munus ad gerocomicem, hoc est, ad artem senū curatricem, spectat. Quæ quidem hoc sibi proponit, vt quoad eius fieri potest, obstat, & prohibeat, quid minus ipsum cordis corpus eorūque arefcat, vt ab omni ope- re vacet. Siquidem vitæ terminus vacuitas cor- dis est ab actione: cum impossibile sit mori ani- mal, quandiu cor sua actione moueatur. Quare si posuit substantia corporis ipsius cordis humi- ditas fieri, vel per Ioue enī iecinoria, poterit sene- ctuti obstiti. Si verō nemo est, qui quæsecur vel cor humidiora reddere, quā ipsa sint ex se- se, sed potius semper tempore procedente ea ne- cesse est indes sicciora fieri, cum eisdem arterias & venas, senium quidem prohiberi nō potest: tamen detineri, ne citō ingruat, idq; hume- ctante adhibita victus ratione, qua nimirum au- gere possumus illam humiditatem, quæ in cor- de iecinorēque est dispersa. Cum autem cor (cui valentissima est attractrix facultas) sit origo pul- sū & arteriarum, quemadmodum venarum atq; sanguinis hepar: contingit vtiq; vt hec vi- scera nunquam moderatis alimentis destituan- tur, nisi cum valida sanguinis penuria vniuer- sus occupauerit corpus. Vnde vbi corpus ex longo morbo extenuatum fuerit, putandum nō est, cor quoq; atq; iecur leuare, esse pro aliorum proportionē extenuata. Ceterū verā tabes, simi- liter partes omnes occupat, propterea quōd etiam a principia ipsa. Atq; hæc tabes in arta- ribus quidem, est senium: in iis verō qui præter

Tabes vera necesse- sario corpus post consistendi vigorem.



## GALENI PERGAMENI

contra eos qui de typis sine circuitibus  
scripserunt, liber.

scripserunt, labor.

**V**bi quid specie idem, rursus equali fit  
reperitur: totum ipsum curriculum,  
Græci pernodum, siue circuitum, atq[ue]  
inire eos aduulsi, typum etiam atq[ue]  
ordinem vocat. Cæterum cum natus vltius sit,  
præsertim in febribus, quàm futurarum accessio-  
num principia prænoctasse plurimum ægro prode-  
rent per totum ipsius morbi spacium, quo-  
minum disputatione neglecta, statim à morbi  
initio, artificiali quodam coniectura potenter idip-  
sum affeque. Quod si quis prima statim die per-  
venire ad talem cognitionem non possit, po-  
terit certe secunda, vel tertia, vel quarta. Si qui-  
ve rô sit, qui neq[ue] in hac morbi speciem nouerit, is  
non exiguum artis partem ignorat. Etenim tum  
aliam, tum febrium accessiones, vel quotidie, vel  
tertio, vel quarto quoq[ue] die inuadunt. In quim-  
plurimum siquidem morbis, vbi sanè maxime vti-  
lus sit futura accessiois prænotio, ea vel alter-  
natis diebus sit, vel quotidie, in paucis verò qui-  
busdam per quartum. Qui vero præter has tres  
periodos, & quintanam, & sextanam, & septima-  
nam, alimq[ue] innumeras esse arbitrantur, præter-  
quàm quod inania producant, infinitisq[ue] cogi-  
tari date periodorum complexus, nunq[ue] poterit  
futura accessiois prænotescere. Porro quis fuerit  
huiusce antonine septe autor primus, ignoro:  
dicam tamen, quidò primum illam explicari au-  
duerim. Deceßerat paulò ante de vita Antonini  
quis, quod Adriano in Imperio successerat. Regia  
bar autem Seuerus, qui seipsam nomine muta-  
to, Antoninum appellat: Lucium vero, quem  
Imperij participem fecerat, Seuerum appellat.  
Cæterum præstat illorum absurditatis ne memi-  
nisse quidè, Pythici præcepti memores, Esse præce-  
dendum tempori. Nos verò in præsentia diem,  
tempus id vniuersum dicimus, quod dieni atq[ue]  
noctem complectitur. Quia ratione dicunt anni  
constare diebus trecentis & sexaginta quinque,  
& quarta vnus parte. Horæ itaq[ue] quatuor & vigin-  
ti, diem absolutum uti aucto, octo & quadragi-  
ntra: tres, duo & septuaginta. Typus autem no-  
mina induta sunt, non ex diebus ipsius comple-  
tibus, sed ex accessiois reducti. Tertianā quippe  
appellamus, vbi accessio tertio quoq[ue] die inua-  
dit, duobus interim absolutis: quartanā, in qua  
videlicet quarto, in hac quoq[ue] tribus iam perfe-  
ctis: & in aliis quoc[unq]ue secundum eandem ratione.  
Si igitur pernodum inueniens typi abieciui, qua-  
tuor continentem completos dies, illam quinq[ue]  
ntanā dices. Neq[ue] enim eî idem, accessiois quin-  
to oboriri die, & esse quinq[ue] dierum circuitum.  
Siquidem numerus horarū periodicarū, qui in-  
ter duo initia accessiois est medius, conside-  
randus est, atq[ue] ex illo typus febrium metiendus.  
Sic enim dicimus, quotidianū typum forsan ho-  
ræ viginquaror, tertianū quadraginta octo,  
quartanū septuaginta duas, quintanū nonaginta,  
sextanū sex. Quod si militer pacto ceteri perficiantur  
ex horarū viginquaror, septuaginta, nonaginta, & sexaginta.

GALENI PERGAMENI

de ryon lib. vms.

**T**ypus est ordo intentionis & remissionis: periodus verò est tempus intentionis & remissionis, quod in morbis exiit. \* Pauci autem ex affectibus carent typo: vt atrophica, necrumque refolutio, elephaniasis, & cunctique his proportionem respondent. Plurimi verò affectus typum quidē præ se ferunt, verum rariis. Porro omnium maxime febres typos admittunt, quos continuos ex-ceptis, quæ vel remittunt nunq̃, vel inordinatè exiunt. Typorum itaq̃ alij quidē sunt primi, alij verò secundi, alij permanentes, alij mobiles, alij simplices, alij cōpositi. Primi igitur sunt, qui breuē habent inuasionē, longam autē remissionē: quales tertiani & quartani exiunt. Secundi verò, qui longam habent inuasionē, breuē autē remissionē: vt quotidianus & valde extensus semitertianus. At permanentes sunt, quidē horū perpetuò inuadunt remittuntq̃. Mobiles verò, qui diuersis semper horis accedunt. Ex quibus qui præueniunt, & celerius horas præoccupant, p̃ioleptici quæ verò tardius morantur, hysterici nō mutantur. Simples sunt, qui vnum tantummodo insultum faciunt. Cōpositi, qui ex pluribus inuasionibus & remissionibus consistant. Ceterū cōpositiorum quidē ex homogeneis, id est genere similibus: quidam verò ex heterogeneis, hoc est, dissimilibus constant. Ex genere quidem similibus, cūm quotidianus typus (exempli gratia) simplex, duplici quondam implicatur: aut duplices tertiani, ut tres tertiani exiunt: vel rursum duo & tres quartani. Ex diuersis autē genere, cūm quindianus (exempli causa) tertiano cōnectitur, aut tertianus quartano. Etenim quindianus est, qui quotiē vnā inuasionē longitudine cōmensuratur, vnāq̃ similiter remissionē efficit. Tertianus autē, qui terio quoq̃ die, vnā inuasionē & remissionē similiter cōmensuratur adducit. Quartanus deniq̃, qui quarto quoq̃ diē suam inuasionē & remissionē moritur. At q̃ ad eadē intelliguntur de quintano & septimano, & si quis alius typorum ordo inueniatur. Porro quotidianum consequitur typum, hūmiditas habitus, vomitus purioris, sitis nō admodum intēta, tumor corporis grauior, somnus grauior atq̃ profusior, pulsus magnus, rarus & laxus, facies subfubda, laxa & premollis, & quæ multis præ se ferat materiz tum prauitatē, tum mutationē. In hoc etiani typi splēdē diore vadit. Quod si pror̃ iatur diuinus, tremulus & veteris sopore, lequentur, & thoracis fluxiones, & aquæ inter cutē affusions. Pessimum autē his stomacho malē affecto cōstant. Tertianum verò comitantur sitis intēta, sitis, aeris argi biliofi vomitus, indolē inquit tudinēq̃. Vt plurimum autē rigorē hunc præcedunt, nonnunq̃ verò etiā refrigeratio. At p̃cipuis in his qui tertiano typi vexantur, parues & frequētes subsequuntur. Noctēs, quæ accessiones diēs præcedunt, molestæ admodū sunt. Vbi autē morbus produciat, nō amplius molestæ

Typus acrosthic-  
us quid.  
Pterodactylus acrosthic-  
us quid.

Type calcitrans  
femur.  
Type = diffi-  
cilis.

Typi primus.

*Typi fecerunt.*

图 10-1-10 续

Type model.

9.

Type battery

Type *Simpler*

Түркі әйелдері:

Type ground-  
deaner.

Type of Service—

DEB.

Triplum quatuor  
distans quatuor  
insequantur  
Quadrans  
horatibus  
hor indurata

Quadratus  
typus ventra-  
lis male aff. Al-  
comatus julet  
Terraquon t  
pau qua can

Pericardium.  
 Circumans.  
 Typus.  
 Ordo.  
 Accipiensens su  
 turam cornu  
 fere, in fidi  
 bus est maxi  
 mi velle.

Augustus Imperator.  
 Advixitque Inter  
 Somnos somno-  
 le nomine vo-  
 catus fuit Au-  
 gustus.  
 Lucius fuit ap-  
 pellatus Sene-  
 ca.  
 Tempori effu-  
 pascendum.  
 Dies quod tem-  
 pus sit.  
 Annus ex quo  
 datus conflet.  
 Hic.

Tertiana quæ  
dicatur.  
Quartana quæ  
dicatur.

Types febrius  
unde meteo.  
d. in fit.  
Febrius inter-  
mittens by  
po singulis, quod  
explicatur ho-  
mo.

existunt, sed febrem ipsam compescunt. Qui vero ita febricitant, quandoq; a tertiano in semitertiano transeunt. Hic autem tertianus typus omnium minimè vexat, præsertim si æstare fuerit cō tractus. Quod sanè indicauit Hippocrates, dicens: Tertiana exquisita septem circibus, qd longissimè est, iudicatur. Raro autem diuturna fit, nisi desinente autumno, aduentuq; hyeme gignatur. Vixit sunt fluxe, necnon vigiliæ infestant. Omnia autē quæ comitatur tertianam, eadem & semitertianæ coniungunt, cum eiusdem generis ambz participes sint, tertio quoque die molitēs remissionū & accessionū repetitiones. Propriū autem semitertianorū typorum existit inuasionū extensio, & quod plerumq; cum refrigeratione, & statu nōdum completo, rursus accessiones infestant. Atqui semitertiana periculū semper minatur, eo quod nō solum eo ventriculi & nervosæ partes attingar, & in vniuersum eas adliuc, quæ media cōpositione cōstitunt, verum etiā vetermos inducat sopores, & cum deliriis vigilas annexas: nōnūq; & resolutiones, quas syncope comitantur: lingū etiā valde siccat, atq; animi defectum efficiat, ea quæ sunt in profundo vehementius cōmouens. Vt autē summanī dicā, typus hic ferus est, periculūq; vnde cūq; portendens. Quandoq; autē primo die cōstituitur, quemadmodū ceteri typi: interdum vero & a secundo & tertio incipit. Oritur autem nonnūq; a tertiana producta: nonnūq; etiā solutus, in tertianam degenerat: interdum vero & in duas tertianas & quotidianas, ob longitudinem inuasionis, dirimitur. Plerumq; autem, qd attingit ad iuaturas, virilem corripit: quod ad ætate, florentem maximè: quod vero ad anni tempora, in autumno præsertim, quidē & valde periculosius existit. At nō perpetuō continuus est, sed & intermitteus quandoq; inuenitur. Habet autem & tres, quod ad eius magnitudinē, differentias: alia liquidem semitertiana est exigua, alia media, & alia magna. Exigua igitur est, quæ circa viginti quatuor horas torquet. Media, quæ circa triginta sex. Magna, quæ circa quadraginta octo: quæ & cōtinuæ febrī est propinqua. Porro Agatimus a relatione ad tertianā, semitertianā fieri censet. Etenim tertio quoq; die vitrisq; sunt inuisiones. Quartanū vero typum rigoris quidem valde consequitur, & vomitus pituitosi, & lienis inflammatio, & tumor: nonnūq; & aboli ta appetentia, & saluæ copia. Interdum etiā ex contrariis appetitibus intensus. Quandoq; & ruficula simul adest, si corporis habitus corruptumpat. Idcirco typi quartani difficile solubiles sunt, ceterisq; omnibus diuturniores, ita vt vsq; ad bienniū perdurent. Cum autem inualeſcit quartanus typus, ipse sibi et complicatur, vt duas & tres quartanas efficiat, aut ad aliquam etiā deueniat continuatē. Rursus vero cum moderatior sit, in vnam conuertitur. Interdum autem & ob symptomata quæ complicantur ipsis, ad eo periculosæ huiusmodi febres evadūt, vt ad phthisim tandem, aut ad aquæ inter curem affusiones perducant. Frequentiores autē sunt quā alia temporibus in autumno potissimū, quo etiam tempore soluantur ægrē. Quæ vero æstate sunt,

omniū minimè infestant, & magna ex parte alia præcedentibus morbis superveniūt inordinatæ. Quandoq; etiam, sed raro, ab initio consistunt. Ceterū pulsus eis qui tertiana laborant, nō tantū magnitudine exiguus sit, quantū iis qui vexantur quartana: neq; vsquē adeo in tumore attollitur, quantū illis qui quotidianam occupatur. Namq; in hoc typo, pulsū quidam mediocritas inuenitur. Est autem quandoq; & in accessionū initio rarior eo, qui secundum naturam est. Verū prætér has tres, inveniuntur etiā febres quæ typicos deri motus seruant: sicut & alie typorum prorsus expertes, præter vnam. Quæ igitur seruant typicos deri motus, vel ante horas cōfuetas corripunt, vel retardant. Fiant autē inordinatæ, sed præter motus formam. Quare interdum preoccupant, interdum tardius morantur, at citra ordinē vtriq; præter id tamen quod modō inordinatē moueant, modō sistant, nullquam autē ordinem habeant, vbi etiam a nullo impediuntur: verum manente semper deri figura, quam solę partiales inordinationes comitantur. Quæ vero omnino typorū expertes sunt, & præter omnes modos cōmuerſas, & adhuc citra deri ordinē sunt. Quædam enim inuisiones adducunt, quædam existunt prorsus inordinatæ. At speciei huius differentias plures esse cōtingit. Licet itaq; modo prædicto cuiq; speculati, necnon vt cūq; voluerit, prædictorū typorū proprietates complicare. Porro ex typis duplicantur q; qui primi appellantur: vt quotidianus, tertianus atq; quartanus. Quotidianus itaq; duplex est, qui diebus singulis similiter bis inuadit, & bis remittit. Duo autē tertiani sunt, qui per singulos diēs diuersis accessionibus sibi inuicē succedentibus, tertio quoq; die apprehendunt. Quartani vero, cum die vno salubri succedente, duobus deinceps sequentibus diebus contingat febricitare, in singulis inuasionū horis seruatis figuris, quæ nimirū ex quaternario circuitu sunt æstimandæ. Quotidianus vero tertiano adiungitur, cum primo quidem die bis inuadit, & bis remittit: die autē sequenti, semel: tertio vero, rursus similiter primo. Quartano autem quotidianus miscetur, cum primo quidē die bis inuadit, duobus sequentibus semel: quarto vero die, bis, primo similiter. Porro quotidianus, tertianus atq; quartanus, in vicem cōmiserunt, cum dies quidem prima tres habet inuisiones, & totidem remissiones: secunda vnam: tertia duas: quarta tres: quinta vni: sex duas: septima rursus tres: atque in reliquis diebus idem cum primis ordo seruatur. Tertianus aut quartano iungitur, vbi prima dies duas inuisiones adducit, tondemq; remissiones: secunda vero nullas omnino: tertia vni, & quarta vnam similiter: quinta vnam: sexta nullā prorsus: septima duas: atq; in sequentibus pari modo. Cōmiserunt adhuc tertianus typus, quartanus & quintanus: cum scilicet primo die accessiones contingerint, secundo quæuerint: & tertio tertianus, quarto quartanus, quinto vero tertianus simul & quintanus inuaserint. Sed aliter etiā quodammodo huius typi ordinem cōtingit, in eundem nihil minus typi ordinem incidente, tertiani cum semitertiano cōiugatione.

GALENI

Hemitertius ad  
esse quatuorq;  
comitantur ter  
tiamam,  
Hemitertianū  
typorum pro  
pria,

Hemitertianus  
typus est ferus,  
periculūq; vnde  
cūq; porten  
dens.

Hemitertianus  
quibus magis  
sua familiaris.

Hemitertianus  
aliquando in  
tertianam.

Typum quartanū  
nam quæ cōſi  
quantur.  
Quartani ty  
pi accurate de  
ſcripti.

Quartana re  
re ab omni  
cipiunt.

Typi aduocati  
ei duplicant  
vni qui sunt,  
Quotidianus  
duplex,  
Tertianus do  
plex.

Quotidianus do  
plex.

Quotidianus  
typus tertiano  
involuitur.  
Quotidianus  
typus quartano  
involuitur.  
Quotidianus  
typus tertiano  
& quartano  
involuitur.

Tertianus ty  
pus quarto in  
voluitur.

Tertianus ty  
pus quartano  
& quintano  
involuitur.

## GALENI PERGAMENI

Ars medicinalis.

## CAPUT I.



Res sunt omnes doctrinae quae ordinari inhaerent. Prima quidem ex eo nonne finis, quae per resolutionem fit. Secunda ex compositione consistit eorum quae per resolutionem inventa fuerunt. Tertia ex definitionis dissolutione, cuius incumbimus. Ex quibus sane primam, quae oritur a finis ratione, & ex qua omnes artes via quadam atque ordine constituuntur, nemini ante nos scriptis edidimus. Hic itaque definitivam faciemus doctrinam, quae quantum ab ea quae ex resolutione consistit, & dignitate, & ipso docendi ordine linquitur, tantum & ad totam compendium, & ad singulorum memoriam praestare invenitur. Sufficiens siquidem, ac facillime commendatur memoriae universa, & definitionis dissolutione: quoniam totius artis capita in se optima definitio complectitur, quam quidem substantialem appellat: ex aduerso distinguente eam ab aliis, quae notionales vocantur. Illae siquidem ab us quae accidunt rebus definitis, hae vero ab ipsa essentia constituuntur.

## Quid sit medicina. Cap. II.

Medicina est scientia salubrium, & insalubrium, & neutrorum. Nomen autem scientiae communiter, non proprie, accipere oportet. Porro salubre ipsum insalubre & neutrum, unumquodque tripliciter dicitur: hoc quidem, ut corpus: hoc autem, ut causa: hoc vero, ut signum. Etenim corpus quod natura suscipere sanitatem est sprum, & causam quae tandem efficere aut conservare, & signum quod potest indicare, haec omnia salubria Graeci appellare consueverunt. Eadem ratione & susceptiva morborum corpora, & eosdem efficientes conseruantisq; causas, & signa indicantia, insalubria vocant. Nec aliter corpora neutra, causas, signa ve dixerunt. Ceterum secundum quidem primam rationem, atque praecipuam, causam salubrium est medicina scientia. Propter eas autem, & aliarum: secundum autem loco, insalubrium: & tertio, neutrarum. Et post has eodem modo corporum, primum quidem & hic, salubrium: secundo loco, insalubrium: tertio, neutrorum. Item & de signis dicendum. In actionibus autem prima quidem est corporum cognitio, quae habetur ex signis: post haec, earum quae in ipsis cognoscuntur.

## Quot modis dicatur effectuum, indicantium, &amp; susceptivum. Cap. III.

Sed quoniam & effectuum, & indicantium, & susceptivum, dupliciter unumquodque dicitur, hoc quidem simpliciter, hoc vero ut uicui esse oportet, amborum esse medicinae scientiam. Ipsum vero simpliciter, duobus dicitur modis: & quod semper, & quod ut plurimum: de quorum utroque medicina pertractat. Neutra vero, et causa, & corpus, & signum, & quod simpliciter dicitur, & quod ut nunc, tripliciter unumquodque appellatur: hoc quidem, quia neutrum contrarium est participes: hoc vero, quia utriusque atque hoc denique, quia aliquando huius, aliquando illius. Horum autem

ipsorum secundum, rursus duobus dicitur modis: aut quia utrumque contrarium ex aequo participat: aut quia aliquando plus alterum. Primum igitur de corporibus ipsis dicemus, qualia nam sint, & salubria, & insalubria, & neutra: post haec de signis & causis differemus.

## De corpore salubri. Cap. IIII.

Salubre simpliciter corpus est, quod ab ipso naturae utraque bonam temperatam sortitur in simplicibus ac primis particulis: estque in his quae ex illis constant instrumentis commensuratum. Salubre vero nunc, est corpus, quod in praesenti est sanum. Est vero & hoc, eo tempore quo sanum existit, bonam habens temperatam & commensurationem: non tamen optimam, ut sibi propria. Ipsum vero salubre simpliciter corporis, semper quidem est tale, quod optimae temperatae ac maxime commensurationis existit: ut plurimum autem, quod a constitutione optima, non valde admodum deficit.

## De corpore insalubri. Cap. V.

Insalubre vero simpliciter corpus est, quod ab ipso ortu namque, vel in consimilibus partibus malam temperiem possidet: vel in instrumentis incommensurationem, vel utrumque vitium. Insalubre vero ut nunc, est illud, quod eo tempore, quo tale dicitur, aegrotat: vel in consimilibus praevalentem temperatam, vel in instrumentis incommensurationem, vel utrumque vitium tunc habens. Est vero & semper insalubre, quod ex ipso naturae ortu vel pessimam temperiem possidet in simplicibus & primis particulis omnibus, vel in aliquibus, vel in illis quae obtinent principatum: vel in instrumentis incommensuratum existit, idque vel in omnibus, vel in nonnullis, vel in illis quae principatum obtinent. Ut multum vero insalubre est corpus, quod ab huius quidem vino recedit, non dum tamen medicamentum attingit.

## De corpore neutro. Cap. VI.

Quoniam vero & neutrum corpus dicebatur tripliciter: unum quidem, quod neutrius erat ex utraque dispositionis particeps: aliud, quod utriusque aliud, quod aliquando huius, aliquando illius: iuxta primum significationem, neutrum erit corpus, quod exquisitae mediū est & saluberrimi & insaluberrimi corporis: & huius, hoc quidem simpliciter tale, quod ab ipso naturae ortu, ita est constitutum: hoc autem ut nunc, quod in praesenti tempore, exquisitae mediū existit, & saluberrimi, & insaluberrimi corporis. Ipsum vero simpliciter, semper quidem tale est id, quod in omnibus aetatibus perdurat tale: ut multum autem, quod nonnullas recipit mutationes. At iuxta secundum significationem, neutrum erit corpus, quod ab ipso ortu naturae, contrarium simul est particeps dispositionum, aut scilicet in una parte, aut in duabus differentibus. In vna quidem, si secundum alteram oppositionem effectuum quilibet bonam habuerit temperiem, vel etiam secundum utramque, sed in formatione, vel magnitudine, vel numero partium, vel simi, delinquit: aut contra, in his quidem recte se habeat, vel omnibus, vel quibusdam, peccet autem in ipsa temperie. In differentibus vero partibus, & iuxta omnes oppositiones potest quicquid simul

Salubre simpliciter corpus quod sit.

Salubre ut nunc, quod sit corpus.

Insalubre simpliciter corpus quod sit.

Insalubre ut nunc, quod sit corpus.

Doctrina ordinata sunt tres.

Doctrinae ad finem instructae artium, una est Galeni exposita.  
Doctrina definitiva, una est Galeni in arte medicinali.

Definitio optima, si accipiamus totam artem complectitur. Definitio est de parte, substantia in & naturalem.

Medicina est scientia salubrium, insalubrium, & neutrorum.

Salubre quia dicitur, insalubre quia facit, neutra quia.

Simpliciter dicitur triplex causa.  
Neutra dicitur triplex.

Neutrum corpus quod sit iuxta primum significationem.

Neutrum iuxta secundam significationem quod sit.

esse particeps contrariorum. Et semper quidem est tale, quod per omnes ætates in eodem perseverat statum. Vt mulier verò, quod aliqua ex parte evanescat. Ita etiam & nunc neutrum erit corpus iuxta secundum significati: quia vel parte in vna, hæc quidem sibi salubria sunt, illa vero insalubria: vel in differantibus ita afficitur partibus. Iuxta tertium significatum, neutrum erit corpus, quod aliquando quidem salubre, aliquando vero insalubre existit. In vno autem tempore, quod ita est neutrum, & ex ætate quidem consistit: oequitatis vero si accipitur, potest.

De signis salubribus. Cap. VII.

Sunt autem ex signis, salubria quidem, quæcumque præsentem indicant sanitatem, & futuram prænunciant, & præteritam memoriæ subiciunt. Insalubria verò, quæ & præsentem indicant ægritudinem, & futuram prænunciant, & præteritam memoriæ subiciunt. Eadem ratione neutra dicuntur, quæ neutram dispositionem ostendunt, prænunciant, & memoriæ subiciunt: quæque partim quidem salubrem, partim insalubrem dispositionem indicant: & quæ aliquando quidem salubrem, aliquando vero insalubrem. & hæc quoque secundum tria tempora, veluti salubria & insalubria, appellantur. Dicuntur autem omniumque à veterioribus medicis hæc omnia, signa prænuntiata, quamvis sint præfensum & præteritum indicantia. Porro vñs non parvus ex prænuntiatiis atque indicatiis accedit: minor autem ex his quæ memoriæ subiciunt.

De signis optimæ constitutionis.

Caput VIII.

Salubriū autem corporū dignationes sumen-  
derunt ab his quæ secundum essentiam rationem  
esse insunt, & ab his quæ necessariū sequuntur ip-  
sa functionibus atque symptomatibus, quæ propriè  
accidentia appellantur. Ab essentiā quidem ipsa,  
eorum quæ optimam habent constitutionem,  
cōmensuratione: consimilium quidem, in calidi-  
tate, frigidityte, humiditate, & siccitate: instrumē-  
torum verò, in quantitate ac numero eorum ex  
quibus cōstant: ac præterea formatione, situ par-  
tium singularum, & totius instrumenti. Ex his  
verò quæ necessariō consequuntur consimilia,  
quantū quidem ad tactum attinet, à mediocrita-  
te quæ in mollitie & dritie consistit: quantum  
verò ad aspectum, à colore optimo, & leuitatis  
atque hūpiditatis mediocritate. In functionibus à  
perfectioe, quam ipsarum esse virtutem dici-  
mus. Ab us verò quæ instrumentaria sequuntur  
partes, à cōmensuratione & pulchritudine om-  
nium totius corporis instrumentorū: ac præte-  
rea, ab eā quæ ipsis insunt, virtute operationō.  
Optimæ igitur cōstitutionis corporū signa indi-  
catis sunt hæc. Eorum autem quæ ab ipsa defi-  
ciunt, & adhuc tamen salubria existunt, nōnulla  
quidem in consimilium temperatūra virtutū ali-  
quod parum habent: nonnulla verò in instru-  
mentariorū vel omnium, vel aliquorū cōmensu-  
ratione, & hoc quoque perexiguum. Sunt quæ io  
vñsque virtutū aliquod habent. Vñorum verò  
genera, eadem sunt his quæ virtutem perficiunt:  
temperatūra quidem in consimilibus: numerus  
alī, & formatio, & magnitudo, & situs, in instru-

mentariis: vñsque verò cōmonis vñitas, quā ipso  
continuitate vocamus. In his autem ipsis  
generibus sunt corporū insalubrium vñia, secun-  
dum vñsque salubritatis significati. Terminus  
autem quæ vñsque distinguit, est operationū lesi-  
o sensibilibus. Essentia quæ simpliciter insalubria  
sunt corpora, distinguuntur ob id, quod faciliè à  
causis morbis sic superantur: & quoniam in vñ-  
te operationū deficiunt plurimū. In medio autē  
salubrium & insalubriū collocantur ea, quæ neu-  
tra exquisitè appellantur, & cum latitudine qua-  
dam. Quo fit, vt tota sanitas latitudo in tres  
partes, quarum singule latitudines habent nō  
parum, diuidatur. Exit autem prima quidem sa-  
lubrium corporum, secunda neutrorū, tertia in-  
salubrium. Post hæc deinceps sequitur quæ iam  
ægrorant corpora: quæ sensibilibus operati-  
onum lesionibus distinguuntur. Hæc autem om-  
nia sensu diiudicantur, non ipsa natura rerum.  
Signa itaque sanorum corporum, siue ea salubria,  
siue insalubria, siue neutra existant, quantitate  
distantie differunt, duobus invicem contrariis  
terminis à vñsque cōstantes, optima videlicet cō-  
stitutione corporis, & nuper genito morbo: ac  
deinceps considerantibus, vñsque eorum sint vici-  
niores, quæ ad examen corpora veniunt. Quæ e-  
nim proximiora sunt optimæ constitutioni, salu-  
bria quæ verò ab hac longius distant, atque ad ea  
quæ iam ægrotis, magis accedūt, insalubria: quæ  
autem intermedia, atque æqualiter ab vñsque dista-  
re videntur, neutra existunt. Optimæ igitur cō-  
stitutionis corporis indicia explicauimus. Eorū  
verò quæ ab ipsa deficiunt, tōdem sunt nume-  
ro genera, quæ in magis & minus secari possunt.  
Quot sint differentie partium. Cap. IX.

Partium vñsque differentie sunt quatuor.  
Siquidem earum nonnullæ principia quædam  
existunt: alique ab ipsis originem habent: ali-  
que oeq aliarum gubernationi præstant, neque  
alivnde gubernantur, cum insitas habeant à na-  
tura potentias, à quibus reguntur. Quædam ve-  
rò sunt, quæ insitas simul & alivnde emanantes  
fortuuntur. Principia igitur sunt, cerebrum, cor,  
hepar, atque testiculi. His verò & originem de-  
bent, & famulantur: nervi quidem & spinalis me-  
dulla, cerebro: cordi autem, arteriæ, hepatis, ve-  
or: vt testiculis feminaria vasa. Quæ autem à se-  
ipsis gubernantur, sunt cartilago, os, copula seu  
ligamentum, membrana, adenes, adeps, & caro  
simplex. Reliquæ verò partes, cum vñsque illis  
habeant ex seipsis regimen, arteriis, venis, & ve-  
nis insuper indigunt. Capillorum autem at-  
que vñsque neque regimen vñsque est, sed gene-  
ratio tantummodo.

De signis cerebri. Cap. X.

Cerebri autem naturam, quorū indiciorum  
genera ostendunt. Primum quidem, tonus, capi-  
tis dispositio. Secundum, sensibilibus opera-  
tionum virtus & vitium. Tertium, alicuiusque  
Quartū, earum quæ principatū obtinent. Quin-  
tum denique, naturalium. Est & aliud sextum ge-  
nus præter hæc dicta, alteratio quæ extrinsecus  
advenit. Porro totius capitis dispositio, ex ma-  
gnitudine ipsius atque figura sumitur, nec-  
non ex capillis.

De par-

Memorandum, præter  
tertium significati  
quod.

Salubria signa  
qua sunt.  
Insalubria si-  
gna qua sunt.  
Neutra signa  
qua sunt.

Signa prænu-  
tiantia, indi-  
cantiaque esse  
vñsque in, quæ  
memoria sub-  
iiciunt.

Salubrium cor-  
porum disposi-  
tione vñsque  
sunt.

Insalubria sunt  
propter opera-  
tionis lesi-  
oem sensibilibus  
operati-  
onibus.

Sensitio lat-  
itudo vñsque  
in tres partes  
diuiditur.

Aggritudo cor-  
poris à causis  
sensibilibus  
operati-  
onibus.

Salubria & in-  
salubria cor-  
pora, quoniam de  
sunt.

Partium vñsque  
differentie  
sunt quatuor.

Principia par-  
tes sunt cerebri,  
hepar, cor, testiculi.

Capilli vñsque  
quæ maxime go-  
bernantur, sed  
generatioe dis-  
tincta.

Cerebri natu-  
ram quorū in-  
diciorum gene-  
ra ostendunt.



De paruitate & magnitudine capitis.

Caput x1.

Paruū igitur caput, vitioſe conſtitutionis cerebri propriū indicium eſt: magnū verō nou neceſſariō indicat bonam cerebri compoſitionem: ſed ſi quidem ob iniſte virtutis cobur, quæ multam ac optimam materiam affirmari, eveniat, optimū ſignum eſt. At ſi ob materię tantū multitudinem, haudivquā bonum. Diſtinguenda verō ſunt hæc, & ex figura ipſa, & ex his quæ ab eo habent ortum. Ex figura quidem, ſi ſit cōcinnas ſemper nanq; hoc, bonum ſignum exiſtit. Ex his autem quæ ab eo ortum habent, ſi ceruici valide inſiſcat, aliſq; oſibus optimē conſtet: atq; omnis præterea ſubſtantiæ boni ſi habitus, ac cobur habeat in tenuem. Propria autem capitis figura eſt, veluti ſi excogitares ſphæram exquisitē rotundam ex cæra cōſtructam, paulatimq; vtriq; depreſſam. In hac enim necēſe eſt, vt poſteriores \* priorēſq; partes plus gibbo x ſiant, q̄ ſphæra cōueniat: quæ verō vtriq; conſiſtunt, magis recte. Quid ſi ea quæ ſecundum occupat eminentia aliquatenus minuat, ſimul intueri oportet neruos, atque ceruicem, vñ ac oſibus aliis. Nam ſi ſecundum naturam cōſiſterint, materie defectu, nō virtutis imbecillitate, cōtingit. Illis verō nō recte ſe habentibus, principium eſt debile. Vt planū verō exiſtit optimū ſignum figura concinna parencephalidis, quam nōnulli medici poſterius cerebrum vocant, vt eſt reuera poſterius, diſtinctum labdoide futura. Eſt verō hæc pars principii ſpinalis medullæ, ac proinde neruorum omnium, per totū corpus animalis, actiōnis ſubſeruiens. Ipſa ſiquidem cerebri pars poſterior, per ſciſſam, paucos admodum ſenſiti uos poſidet ueruos, plurimos autem actiuos. Anterior verō contrā, ſenſitiuos quidem plurimos, actiuos autē perpaucos. Quare vbi vtraq; fuerit optimē affecta, robuſtas habebit eas, quæ ab ipſis pēdent, deriuationes. Eadem quoq; diſtinctiones faciendæ ſunt ad partes capitis anteriores, quæ etiā ad poſteriores: earundemq; paruitatem, magnitudinem, & figuram, ne cuon ſenſus ibi collocatos, viſum, guſtum, & odoratum, expendere oportet: ſiquidem ſeſe in vicem indicant attestantq; , & quæ à principis oriuntur, principij virtutem & vitium: & principium, ea quæ ab ipſo naſcuntur.

De operationibus obtinentibus principium. Cap. xii.

Earum autem operationū quæ obtinent principium, virtus ac vitium, ſunt ipſius principij ſecuriū tantūmodo indicia. Voco autem operationes principium obtinentes, quæ à ſolo principio proveniūt. Sagnitas igitur, ſubtilem cerebri ſubſtantiā indicat. Tarditas verō intellectus, craſſam. At diſcendi facilitas, formatū facile ſuſceptiuam. Memoria, ſtabilem atq; firmam. Difficultas diſcendi, formarum nō facile ſuſceptiuam. Oblutio, ſtūdium. Mobilitas in opinionibus, calidam: vt ſtabilitas, frigidam.

Signa bonæ temperaturæ cerebri.

Caput xiii.

Si quidem cerebri fortitur bonam primarū quatuor qualitatū temperiem, omnia quæ di-

ximus, habebit, quāmodō moderata. Excrementa quoq; quæ ab eo expurgantur, moderatē ſe habebunt, atq; ab us quæ extrinſecus alterando occuſant, nequaquam lædunt. Talibus igitur capilli capitis, cum adhuc ſunt infantes, ſubruſi: cū verō pueri, ſubſtiti: cum tam adoleuerint, ſtati ſiunt: medij inter omniūo crīſpos \* & lenes. Nec verō calueſcent facile.

Signa calidi cerebri. Cap. xiiii.

Signa calidi cerebri ſunt, in us quæ circa caput conſiſtunt, rubor & calor maior, & quæ in oculis viſuntur venę, conſpicuę magis. Capilli quoque in his ſtati in lucem æditi \* celeriter generantur: cū plurimum in calore à medio cri temperaturā receſſerint, nigri & cobuſti & crīſpi ſiunt: cū verō uox multū, ſubſtiti quidem ab ſumo ſiunt, deinde nigricant: ac progredientibus ætatibus, caluioſi patiuntur: eoq; magis, quō temperies plus æquo calidior fuerit. Excrementa verō quæ per palatum, & nares, & oculos, & aures purgantur, pauca & concocta ipſis exiſtūt, ſi ſancti ſanitate fruuntur. Si verō eis caput replicatur, plura quidem in ipſis excrementa, ſed uō incocta, gignuntur. Impletur autem aggregatū eorum capita, à calſcipientibus tum cibis, tum potibus: uenō nō odoribus, iſtiſq; omnibus, quæ extrinſecus nobis occuſant: in quorum numero eſt ær circūfluus: ac tunc præcipue, ſi nō ſolum natura calida, ſed etiā humidā, ipſa corpora extrinſecus. Breuib. aut ſomnus huiusmodi temperaturæ cōtente ſunt, nec proſundius admodum.

Signa frigidi cerebri. Cap. xv.

Frigidioris verō quā oportet cerebri indicia ſunt plura in propriis meatibus excrementa: capilli recti, ruſi, ſtabiles, & qui longo poſt natiuitatem tempore naſcuntur tenues, atq; ab initio malē nutriti. Porro quibus tale cerebrum obigit, facile à frigidis cauſis læduntur: quo ſanē lationis tempore deſtillationibus & grauedinibus corripuntur. Sed nec partium quæ iuxta caput ſunt calor magnus aut rubor, nec oculorum venę illis conſpicuę ſiunt. Sunt autē quodammodo ſomnolentiores.

Signa ſicci cerebri. Cap. xvi.

Sicciora autem cerebri indicia ſunt pauca ſuperfluatates effluentes, & ſenſuum perſpicacitas. Sunt autem ad vigilas prompti, & capillos habent robuſtos, crīſpos potius quā reſcios, & qui celerrimē eis genitus innāſcitur. Citō autem calueſcunt.

Humidi cerebri indicia. Cap. xvii.

Humidioris verō cerebri indicia, capilli plani, quōdā minimē calui ſiūt: ſenſus turbulenti, multitudo excrementorū, ſomni multi & proſundi. Atq; hæc quidem ſimplices ſunt intemperies.

Signa calidi ſicci cerebri. Cap. xviii.

Qui calido & ſicco ſunt cerebro, ſuperfluatibus carent, ſenſibus vigent, plurimū vigilāt, atq; citō ſunt calui. Prima autē capillorū generatio illis celerrima eſt, ac plurimo alimento abundans. Capillos verō habet nigros & crīſpos: tan genib.que caput ſentiuntur calide, rubuſcuſq; ſunt, vſq; ad conſiſtentię ætatem.

Signa calidi & humidī cerebri. Cap. xix.

Si verō humiditas caliditati ſūgatur, ſed parū

Cerebri calidi indicia.

Cerebrum calidū à quibus facile impletur.

Calida & humida corpora ſemper breuib. contenta ſi ſunt. Cerebri frigidi indicia.

Cerebri frigidi prædicti faciliē à frigidis cauſis læduntur.

Cerebri frigidi prædicti ſemper intemperies ſunt. Cerebri ſicci indicia.

Cerebri humidioris indicia.

Cerebri calidi & ſicci indicia.

Caput magnū quādo ſit bonū indicium.

Capitis naturalis figura, quādo non eſt ſi debet.

Labdoide futura. Cerebrum eſt principium ipſius medullæ.

Principium eſt ea quæ ab illis oriuntur, ſciliſc. virtus, actio, ſenſus, & motus.

Principium autem operationis eſt ea quæ ab illis oriuntur, ſciliſc. virtus, actio, ſenſus, & motus.

*Cerebri calidi  
ex humido in-  
dura.*

utraq; qualitas mediocritatem superet, ad est color bonus calorig, & quæ in oculis sunt veng, magna. Præterea excrementa plura, & mediocriter cocta, & capilli recti & subiani: nec facile calui fiunt. Impletur verò atq; aggrauantur eorum capita à calidis. At si humectentur, tunc multo magis: & præcipue vbi multitudine excrementorū redvndant. Quod si plurimū caliditas atq; humiditas creuerint, iis caput est morbis obnoxium, excrementisq; abvndans: ac facile à calfacientibus & humectantibus læditur. Proinde Austri semper talibus adversatur: atq; optime in Aquilone se habet. Hæc duo vigilare possunt, & cum se ad somnum converterint, simul gravi somno tentantur & vigilant, & somnia habent imaginationibus plena. Visus est eis turbulentus, nec factus sensibus viget. Pro ratione autē ipsius qualitatis in missione excellentis mediocritatem, solent etiam ipsa signa excellere.

*Cerebri calidi  
ex humido pra-  
ditu, ut adves-  
satur Austri, si-  
cianseri Aquila.*

Signa frigidi & sicci cerebri. Cap. xx.

Frigidæ verò & siccae cerebri intemperantiæ, frigidum & minimè coloratū, sus ratione, caput efficiunt. Qui autem sic sunt affecti, in oculis ual has habent venas conspicuas, facileque à frigidis causis læduntur. Quare & inæquali sanitate fruuntur.

*Cerebri frigidi  
& sicci indur-  
ata.*

De sensibus. Cap. xxii.

Sensus autem eorū, in iuuentute quidem omnes vigent, atq; omni vitio carentes sed progredie te ætate citò marcescunt. Vi autem summam di cam, omnia que ad caput pertinent, celerrimè illis marcescunt: quomobrem citò cani fiunt. Capilli verò ipsi quidem genitis, vix exeunt, & male nutriuntur, & rufi sunt. In progressu autem ætatis, superante magis frigiditate caliditatem, q̄ siccitate humiditatem, non caluescunt. Contra verò, si congerit siccitatem quidem plurimum dominari humiditatem, frigiditatem verò parum calori, calui fiunt illi.

Signa cerebri frigidi & humidis.

Caput xxiii.

Humidæ verò & frigidæ cerebri temperaturre, graues somnos conciliant, sensuum liebetudinem patiunt, vim excrementorum accumulāt, caputq; reddunt frigori & plenitudini obnoxium. Sic affecti, destituti omnibus & grauedinibus facile compunguntur: at minimè calui fiunt.

De oculis.

xxiiii.

Qui oculi tangentes manifestè calidi apparent, & facile ac cerebro motu mouentur, & venas latas habent, non calidi omnes sunt. Frigidi verò, his cōtrarij. Et humidi quidem, molles, multaq; humiditate repleti: sicci verò, duri simul & aridi. A similibus autem suis temperaturæ causis facile offendentur: inuuantur verò à modico contrario rum visu. Sed hoc quidem commune in omni cuiusque partis temperiei diguotione meminisse oportet.

De magnitudine oculorum. xxv.

Magnitudo oculorum quidem, vbi concinnitas adsit, & operanonum virtus, multitudinē bene temperate substantiæ ostendit, ex qua sunt conformant. Quæ si desint, multam quidem substantiam, non tamen bene temperatam indicat.

De prauitate oculorum. Cap. xxv.

Paruitas verò oculorū, adiuncta quidem concinnitate, atq; oderationū virtute, paucam quidem, sed bene temperatam substantiam ostendit, ex qua sunt conformant. Si verò in concinnitas adsit, atq; functionum vitium, paucam simul atq; vitiolam materiam demonstrat.

De colore oculorum. Cap. xxvi.

Glauci oculi, qui pura humiditate ac nō multā præfulgēt, tales fiunt ob splendidi luminis abvndantiā. Cōtrā verò rugi, & quæ intermedia naturā seruāt, causas quoq; intermediis forniuntur.

De glaucedine & nigredine oculorum.

Caput xxvii.

Glaucus igitur oculus fit, vel propter magnitudinem, vel propter splendorem crystallini humoris, vel propter situm prominentem, vel propter tenuis & aquei humoris, qui in pupilla existit, paucitatem & puritatem. Omnibus autē his in vnum cōiunctibus, fit glaucissimus oculus. Si verò aliqua adsint, aliqua desint, tunc maior minorve glaucedo contrahitur. Niger verò oculus fit, aut ob paruitatem crystalloidis, aut propter profundū situm, vel quia splendidi ac fulgidus exquisitè non est, vel quia tenuis humor vel superabvndat, vel impurus existit, vel, ppter vnam ex hisce causis, vel propter omnes fieri cōsuevit. Tenuis igitur humor quō magis ad aquæ naturam accedit, & superabvndat, humidiorē ostendit oculum: quæmadmodum fit crassior ac minor fiat, sicciorē. Crystalloides autem humor, si quidem durior existat, sicciorē efficit oculū: si verò mollior, humidiorē. Sic & si plus modico tenuem humorem excesserit, sicciorē: si relinquatur ab illo, contrarium.

De cordis temperaturre. Cap. xxviii.

Vnamquæq; partem calidiorē aut frigidiorē dicimus, nō alicui rei alteri, sed ad seipsam, eam comparātes. Sic enim vicinij extiterit cor naturæ frigidissimū, multo sanè calidiorē temperiem fornetur calidissimū cerebro.

Signa cordis calidi. Cap. xxix.

Calidiorē igitur cordis, quāvis pro naturali symmetria, indicia quædam sunt inseparabæla, & propria, magnitudo respirationis, pulsus velocitas & frequenna, audacia, & ad actiones natura prompta. Quod si multum in caliditate excesserit, tunc furibunda quædam iracundia, & temeritas adsunt. Est autem his thorax hispidus, & præsertim pectus, & quæcūq; hypochondriis partes proximiores. Magna verò ex parte calidi cordis temperies vniuersum corpus calidū reddit, nisi hepar vehementius obstituerit. Est præterea & latitudo thoracis, caliditatis indicium, nisi & hic quoq; cerebrum plurimū relictetur: cui spinalis medullæ magnitudine proportionē respondet. Tante verò erunt magnitudine vertebrae, quæta spinalis medulla: quare & spina vniuersa. Cōpingitur autē thorax ad eam spine partem, quæ iuxta metapleurum, hoc est, dorsum, cōstitit, tanq̄ ad nauis carinā. Quare necessariū eius longiorū æquabiriū dorso. Latitudo verò erit pro vertebrarū ratione, quando ad proportionem crassitudinis earum fuerit compactus. Cū verò cordis caliditas superans persilauerit ac dilatuerit

*Oculorum par-  
uitas quid si-  
gnificat.*

*Oculi glauci n-  
igri radi si-  
ant.*

*Glauculus  
calidum causa.*

*Nigredini o-  
culi causa.*

*Cor frigidissi-  
mum est calidi-  
ssimū cerebro.*

*Cordis calidi  
indicia.*

*Thoracis latitudo  
quædam sit  
caliditatis in-  
dicium.*

*Cerebri frigidi  
ex humido in-  
dura.*

*Oculorum tem-  
perantes quo-  
modo diguotio-  
tur.*

*Oculi à simili-  
bus tempera-  
ra, seu causis la-  
diuntur facili-  
tatur verò à  
modico con-  
trario rum visu.  
Oculorum ma-  
gnitudo quid  
indicat.*

dilatauerit in primo sui ortu thoracem, erit eiusdem caliditatis proportionem respondens. Quare quæ caput paruum, thorax autem latus exstiterit, maximum hoc tibi fuerit cordis caliditatis indicium. Quum verò magno existeret capite, paruus fuerit, propriissimum hoc tibi sit cordis frigidioris signum & argumentum. Si verò capiti fuerit proportionem respondens, tunc alius signis de corde distinguas, ex ipsius thoracis amplitudine nihil iudicant.

Signa cordis frigidi. Cap. xxx.

In frigidiore verò corde pulsus minores existunt, quàm modo nature conueniat: non tamè necessarîo tardiores, vel rariore. Respiratio autem, si quidem tantò thorax minor existerit, quæ tot cordis frigidus, pulsibus erit proportionalis. Si verò maior fuerit, quàm pro frigiditatis portione, non solum minor, sed etiam tardior & rarior ipsa respiratio erit. Sic affectu, sunt naturaliter timidi, pusillanimi, atque tardi: pectusque glabrum sortiuntur.

Signa cordis siccæ. Cap. xxxi.

Cor autè siccus, pulsus duiores efficit: iramque non promptam excitat, sed ferinam, quæ facile compesci non possit. Magna autè ex parte sic affectus vniuersum corpus siccus exiit, nisi hepar obstitit.

Signa cordis humidæ. Cap. xxxii.

Cordis verò humidioris signa, pulsus molles, & mores ad iram quidè proclives, sed talem, quæ sedari possit: at vniuersum corpus humidius existit, nisi hepar obstitat.

Signa cordis calidi & siccæ. Cap. xxxiii.

Calidi & siccæ cordis pulsus duri sunt, magis, veloces, atque frequentes: similes autem respiraciones magnæ, veloces atque frequentes. Multo autè magis ad velocitatem ac frequentiam vergunt, thod rage cordi non aucto proportionaliter. Sic affectu, præ cunctis, pectus habet maximè hirsutum, & hypochondria. Ad actiones autem sunt prompti, iracundi, & celeres, moremque præ se ferunt tyrannicos. Sunt etenim ad furorem faciles, inextorabiles.

Signa cordis calidi & humidæ.

Cap. xxxiiii.

Si verò caliditas cum humiditate præcellat, minus quidem eis quos antea diximus, hi sunt hirsuti, ad actiones verò nihilò minus prompti: non tamen ferus ipsis est animus, sed ad iram tantum impulsus. Pulsus verò magni ac molles, veloces & frequentes existunt. At respiratio, si thorax quidem cordi fuerit proportionalis, eandem cum pulsibus speciem seruabit. Si verò minor existerit, tantò illis velocior atque frequentior erit, quæ tot & thorax minor existerit. Quod si multa facta fuerit versio in ipsa temperatura, atque in humiditate præcipue, præter ea quæ diximus, conueniunt etiam ex putredine morbi, his, qui in ipsis fuerint, humoribus corruptis ac putrefactis. Expirationes autè maiores fient, ac velociores inspirationibus: necnon artæque contractio velox.

Signa cordis humidæ & frigidi. Cap. xxxv.

Qui humidior & frigidior sunt corde, pulsus molles sortiuntur, minimèque audaces, sed timidi & segnes existunt. Tales etiam possident glabrum pectus: muremque iracundiam conseruant,

ad quam etiam non sunt admodum prompti.

Signa cordis frigidi & siccæ. Cap. xxxvi.

Frigidius verò atque siccus cor pulsus quidem duiores reddit: & paruos: respirationem autem, si quidem thorax paruitatè cordis frigiditatem proportionalem habuerit, moderatam: si verò maior existerit, raram & tardam. Hi verò præ omnibus minimè ad irascendum sunt prompti: quum autem coacti fuerint irasci quibusdam, teneant iram cundiam. Habent autem maxime omnium pectus glabrum. Caterum quæcumque de moribus, siue nunc, siue quouis alio sermone explicata sunt ad temperaturæ cognitionem: sciendum est, ea non de optimis moribus, aut vinosis, qui ex philosophia hominibus adveniunt, sed de infirmis vnicuique, naturalibusque, à nobis exposita fuisse.

Signa calidi hepatis. Cap. xxxvii.

Hepatis calidioris indicia, venarum latitudo, flauitas ab vndantore in cõstitente verò state, etiam atra: calidior ipsius sanguis, atque eadè ratione vniuersum corpus, nisi cor obstitit. Si venæ & hypochondria hirsuta.

Signa hepatis frigidi. Cap. xxxviii.

Frigidioris verò, angustia venarum, pituita abundantior, sanguis frigidior, adeoque tonus corporis habitus, nisi calenat corde. Vter illis glaber est, atque hypochondria.

Signa hepatis siccæ. Cap. xxxix.

Siccioris autem, sanguis quidè crassior, & minimè abundans: venæ duiores, & tonus corporis liabius siccior.

Signa humidæ hepatis. Cap. xl.

Humidioris autè, sanguis quidem copiosior, humidiorque, atque venæ molliores: ita verò & vniuersum corpus, nisi cor relaxetur.

Signa calidi & siccæ hepatis. Cap. xli.

Calidioris verò simul ac siccioris hepatis sunt indicia, hypochondria plurimè hirsuta, sanguis crassior & siccior, flaua bilis plurima: constitent autem ætate, etiam atra: venarum autem latitudo & durities. Sic verò & vniuersum corpus fe habet. Nam quæ ex corde caliditas originem duxit, potest obtundere eam, quæ ab hepate nascitur, frigiditatem: sicut & frigiditatem caliditatem. Sic citatem verò non potest humidior cor ad liabium contrarium perducere. At media inter has quæ dictæ sunt, ea quæ ab hepate humiditas nascitur. Magis enim i cordis siccitate superatur, quàm siccitas ab humiditate: minus autem à caliditate: adhuc verò multò minus à frigiditate. Hec enim inter omnes qualitates quæ eveniunt ab hepate, facillimè superatur. Vbi igitur in vnum conuenerint vtriusque principia temperatura, totum exquisitè secundum illas afficitur corpus.

Signa hepatis calidi & humidæ.

Cap. xlii.

Humidius autem, ac simul calidius hepar, minus quidem quàm calidius & siccus hirsuta hypochondria reddit. Plurimum verò sanguinis, et venas amplas, habiturumque calidiorè, et humidiorè facit, nisi obstitit cor. Si verò amplius in amabus qualitatibus, à naturæ modo recedat, à morbis qui ex putredine ac vitiosis humoribus fiunt, sic affectus minimo negotio corripit, præsertim si plurimè augeat humiditatem: caliditas verò non ita. Sin autè cõtra, minimè humoris vino laborat.

Mm

Cordis frigidi indicia.

Cordis frigidi & siccæ argumenta.

Mores ipsi sunt duplices: nampe timidi & pusillanimi, & naturaliter sunt calidi.

Cordis siccioris indicia.

Hepatis calidi indicia.

Cordis humidioris indicia.

Hepatis frigidi indicia.

Cordis calidi & siccæ indicia.

Hepatis siccioris indicia.

Cordis calidi & humidioris indicia.

Hepatis humidioris indicia.

Cordis frigidi & humidioris indicia.

Hepatis calidi & humidioris indicia.

Hepatis humidi & frigidi indicia.

Signa hepatis humidi & frigidi. Cap. XLIII. Humidius autē atq; frigidus hepar habet hypochondris glabris: sanguinem verò accendit ad pituitæ naturam gignit, cum venarum angustia. Sic & reliquum afficit corpus, nisi à corde ad contrariam transferatur naturam.

Hepatis frigidi & siccis indicia.

Signa hepatis frigidi & siccis. Cap. XLIIII. Frigidus & siccus hepar, parum sanguinis, et exiguas venas exhibet corpori: ipsamq; frigidus reddit, & hypochondria glabra, nisi & luc cor dominetur.

Signa calidæ, frigidæ, humidæ, & siccæ temperaturæ testiculorum. Cap. XLV.

Testiculorum temperaturæ signa siccis.

Temperatura verò testiculorum, calida quidem, proclius ad venerem, masculorumq; productrix, atq; fecunda. Eadem celeritè genitalis partes obsepit pilis. Frigidior verò contrariā efficit. At humida, multo & humido semine abundat. Sic, paucū & modicè crassū generat semē.

Signa calidæ & siccæ temperaturæ testiculorum. Cap. XLVI.

Testiculorum calidiorum & sicciorum indicia.

Calidior verò & siccior, crassissimū semen habet, & facundissima est, ac celeriter ab initio pronus ad cōtū excitat animal. Sed & his gentiles partes citissimè lupidæ fiunt: atque omnes quæ circumstant, suprà quidem, vsq; ad umbilicū: infra verò, vsq; ad media femora. Petulica igitur est, et ad libidinem prone eiusmodi temperatura: rursū verò si rariatur, & sic cogatur, offenditur.

Signa calidæ & humidæ temperaturæ testiculorum. Cap. XLVII.

Testium calidiorum & humidiorum indicia.

Si autem caliditas humiditatem iugatur, luscū quidē tales minus, plus verò semine abundat: non tamen plus ceteris appetunt, sed minori detrimento prout modū veneris indulget. Quod si caliditas & humiditas abundante exsuperaverint, non sine detrimento à veneris abstinent.

Signa humidæ & frigidæ temperaturæ testiculorum. Cap. XLVIII.

Testium frigidiorem & humidiorum indicia.

Si verò frigidiorē & humidiorē temperaturā testiculi habuerint, partes circumpositæ glabræ sunt, & tardè rem exercere venerem incipiunt, nec proni ad actū huiusmodi sunt. A quo sum verò & tenuē ipsi est semē, infuscundūq; & feminarū generatiū, vel omnino nō generās.

Signa frigidæ & siccæ temperaturæ testiculorum. Cap. XLIX.

Testium frigidiorem & sicciorum indicia.

At frigidior et siccior temperatura, similis quidē in reliquis est antedictis: crassius tamē in ipsa semen exultat, atq; paucum omnino.

De totius corporis habitu. Cap. L.

Musculorum substantia ex quibus consistit.

Totius corporis habitus in illis maximè consistere dicitur partib; q̄ primæ oculis subsiciuntur. Sunt verò hæc, musculi, qui omnia ambiunt ossa, existentes quædā carnes compositæ, ex prima & simplici carne, & præterea fibris, quibus innascuntur. Propria liquidè musculari substantia constat ex his duob; Quæ verò ad ipsos vasa pertingunt, veluti riuī quidam sunt, qui non substantiā complent, sed eis subministrāt, vt in vita permaneāt.

Signa moderatæ temperaturæ. Cap. LI.

Temperamentum moderatū indicia.

Moderatæ temperaturæ indicia secundum totum animalis habitum, sunt: color quidem ex rubeo & albo cōmixtus: capilli flui, & vt plurimū mediocriter cnsi: carnositasq; mediocritas in qualitate et quantitate. Medium namq; est ex qui

sit, ac veluti Polydetti regula, huiusmodi corpus, inter omnes excessus, cū ad quod ipsi & dicantur, & cognoscantur.

De corpore calidiorē. Cap. LII.

Quæcunque autem in caliditate à medio recedunt, non tamen in humiditate, vel siccitate, hæc quātum ad carnosum genus attinet, videtur quidem tangentibus calidiora tantū, quāntum & eorū temperatura calidior. Tantō vero magis hirsuta sunt, quātō et calidior, et minus pinguedinis habent. Colorem autem rubrum, & capillos nigros fortiuntur.

Signa frigidæ temperaturæ. Cap. LIII.

Frigidior autem temperatura indicia sunt, pilorum priuatio, pinguedinis, & occurrunt frigiditas. Color autem, vni cum capillis, rufus, & vbi frigiditas excesserit, liuidus quodāmodo existit.

Signa siccæ temperaturæ. Cap. LIIII.

Siccior temperatura tūto gracilior & durior est bona temperaturæ, quāto maior est siccitas.

Signa humidæ temperaturæ. Cap. LV.

Humidior autē temperies, carnosior atq; mollior existit.

Signa calidæ & siccæ temperaturæ. Cap. LVI.

Calidior simul et siccior, magis hirsuta, necnō calida & dura existit: itaque pinguedine caret, tenuisq; est, & capillos nigros foritur. Si verò multum in caliditate excellat, color quoque niger illis dest.

Signa calidæ & humidæ temperaturæ. Cap. LVII.

Calidior autē & humidior temperatura, mollior & calidior & carnosior tanto existit bonæ temperie, quātum & vniq; qualitatibus aucta fuerit. Quod si plurimum augeatur, citō similiter à putredinis corrumpit morbis. Si verò parum quidem humidior sit, multo autem calidior, molliores quidem parum huiusmodi sunt, in quibus bonam habent temperiem, & magis carnosius parum verò hirsutiores, & rangentibus etiā non parum calidiores. Nigri verò eis sunt capilli, & caro pinguedine caret. Si autem pe iulō quidem calidior, multo verò humidior, mollior his caro est, & multa: colorq; miscellaneus, ex albo simul & rubeo: tangentibusq; paulo calidiores apparent. In summa autē, omnibus temperaturæ coniugationibus, semper excellentis qualitatē indicia eminebunt.

Signa frigidæ & humidæ temperaturæ. Cap. LVIII.

Frigidior autem atq; humidior temperatura, si parum quidem vtraq; augeatur, capillis nudis est & alba, mollisq; & crassa, & pinguis. Si verò magis excesserit, reliqua quidem sunt secundum proportionem qualitatū auctarum: color autem, vni cum capillis, rufus. Quæmodum si plurimum vtraq; augeatur, liuidus. Si verò qualitatū augmentum inæquale fuerit, eius quæ superauerit, indicia eminebunt.

Signa frigidæ & siccæ temperaturæ. Cap. LIX.

Si autem frigiditas vni cum siccitate augeatur æqualiter, natura durum ac tenue & glabrum corpus sic affectū fortiuntur, ac tangentibus frigidum: pinguedo tamen ipsi, est, & graciles sint, per carnes dispersa inest. Capilli autē & color, frigiditatis modū, ac proportionē sequuntur. Vbi verò calida & sicca temperatura, per de-

Temperatura calidiorum indicia.

Temperatura frigidiorem indicia.

Temperatura siccorum indicia.

Temperamentum humidiorum indicia.

Temperatura calida & siccis indicia.

Temperatura calida & humidiorum indicia.

Temperatura frigida & humidiorum indicia.

Temperatura frigida & siccis indicia.

crementi tempus, in frigidū & siccū labitur habi-  
tum, graciles hic tunc fiunt, & duri, atq; atra bilis  
in eis dominatur. & ob id nigri simul, hirsutius e-  
vadunt. In vniuersum autem, si membrum facie-  
le frigeat, vel frigidiatur, vel rariatur est signū  
verō non facile, vel caliditatis, vel densitatis. Si  
a deficiantibus offendatur, atq; aridum & siccū, nec  
facile mobile fiat, siccitatis: quemadmodum & si  
ab humectantibus graueretur habeat, humiditatis.  
Porro pauca simul & dura caro, membrū sic-  
cius efficit: multa autē & mollis, humidius. Sic &  
intermedia spacia corporū simulariū, vt plus vel  
minus humidæ substantiæ in se continent, vel cras-  
sius vel tenuius, vel humidius vel siccius, membrū  
offendunt, humidius quidē, vbi subtilior & plu-  
rima est humiditas: siccus verō, vbi crassior si-  
mul & minor. Ipse enim solidæ partes, quæ verē  
solidae sunt ac primum, nullo modo effici humidio-  
res possunt: intercepra autē in ipsa spacia, hac vel  
illa humiditate compleri possibile est. Hoc verō  
est proprium partū simulariū alimentū quod ex  
appositione fit, & non per vasa attrahitur.

Signa siccī ventriculī. Cap. lxx.

Ventriculī indicia sunt, eius quidem qui natura  
ra siccior existit, si celeriter sinbundi fiant, & pau-  
cus eis potus sufficiat: plurimo autē aggrauen-  
tur, fluctuantibusque infestentur, aut superfluitet  
id quod abvndat, cibisq; delectetur siccioribus.

Humidioris ventriculī. Cap. lxxi.

Humidioris autē, si neq; sinbundi fiat, & super  
abvndans humidū facile tolerent, & cibis humi-  
dioribus gaudeant.

Signa calidi ventriculī. Cap. lxxii.

Calidior verō natura ventriculī, melius qui-  
dē cōcoquit quāa apparet: & multo magis quæ-  
scunt sunt dura, & non facile alterationem susci-  
piunt. Nam quæ facile alterantur, in eo corrup-  
tū gaudetq; calidis potibus ac cibis, nec a frigi-  
dis vili percipit noxam, si modicē ipsis vtatur.

Signa ventriculī frigidi. Cap. lxxiii.

Frigidus natura ventriculī, ad appetitū qui-  
dem plurimum viget, ad cōcoquendum autem,  
minimē: tales præsertim cibos, qui & frigidi sunt,  
& non facile alterationem suscipiunt. Cuius itaq;  
in ipso accedunt: ac proinde acidis ructibus talis  
ventriculū abvndat plurimum: gaudetq; frigi-  
dis, sed ab eorum vīu immo deo offenditur. Sic  
& ea quæ extrinsecus frigida occurrant, nequit  
lōgiori tempore tolerare: quemadmodum neq;  
calidis calida. Male verō temperaturæ quæ mor-  
bi ratione ventriculū occupant, hoc differunt ab  
his quæ naturales existūt, quoniam contraria, non  
autem similia, appetit, quemadmodū naturales.

De sinī & corde & pulmone profectio.

Cap. lxxiiii.

Nec verō tantum ventriculus sinbundos, mi-  
nimēq; finentes reddit, & frigidi caliditq; potus  
appetentiores, sed ea quoq; viscera quæ in thora-  
ce sunt, vt cor atq; pulmo. Ceterum qui ob ho-  
rum finitum caliditatis, plus inspirant, & longius  
expirant, atq; æthum in thorace percipiunt: non  
sicut qui ventriculū ratione in hypochondriis ca-  
liditatem patiuntur. Præterea bibentes, non ita  
tūm quiescunt, & frigidus potus magis eorum vi-  
tem restinguit. Refrigerat autem eisdem & frigi-  
di ætris inspiratio: quæ nihil illos iuuat, qui ven-

triculū ratione sunt sinbundi. Sic qui contrario  
modo se habent, sensibilibiter à frigida inspiratione  
laeduntur.

Signa pulmonis frigidi. Cap. lxxv.

Et hoc maximū sit frigidi pulmonis indicium.  
Vt etenim frigidum inspirat, manifeste dolorē  
sentiunt atq; frigiditatem, ita & caliditas est ipsis  
amica. Sed & pituitosa excrementa tum loquen-  
tes, tum tussientes reiciunt.

Signa pulmonis siccī. Cap. lxxvi.

Pulmonis autē siccitates excrementis vacant,  
& pituita vocemq; claram efficiunt: quemadmo-  
dum humiditates obscuram eam reddunt, ac ran-  
eam. Et quum vellemus aut acutus loqui stu-  
duerint, tunc interdicitur excrementa.

De voce. Cap. lxxvii.

Non tamen ipsa vocis magnitudo à caliditate,  
sicut neq; paruitas à frigiditate ontur: sed altera  
quidem alperæ arteriæ latitudinem sequitur, &  
vehementiorem efflatum: paruitas verō, à con-  
trariis procedit causis. Quare nec semper, nec pri-  
mō, sed ex accidenē, & solas naturales tempera-  
ras, nō autem aduentitas, vocis magnitudo aut  
paruitas sequitur. Quia enim talia instrumenta  
temperaturæ ratione sunt facta, ad hanc autē con-  
sequitur huiusmodi vox: ob id mirum con-  
tingit, ex voce de naturali temperie ratiocinari.

De leni & aspera voce. Cap. lxxviii.

Nam lenis vox, arteriæ lenitatem cōsequitur,  
sicut & aspera asperitatē. Lenitas igitur arteriæ,  
moderatā temperiem sequitur, vt asperitas siccita-  
tem. Asperitas quippe fit à duri corporis inæ-  
qualitate. Arteriam verō duram, simularum par-  
tium, ex quibus constat, siccitas efficit: inæqua-  
lem disperse in eisdem humiditatis defectus.

De voce acuta. Cap. lxxix.

Eodem modo neq; acuta naturaliter vox, sine  
angustia faucū, nec grauis, sine latitudine fieri  
potest. Angustia igitur ab insita atq; innata frigi-  
ditate nascitur latitudo autem à caliditate. Por-  
rō cuiusq; facultatis virtus & vitium, à temperie  
ipsa, seu à causā præcedente, exoritur.

De homine pituitoso bilem vomente.

Cap. lxxx.

Vidi equidem hominem, cuius totus habitus  
pituitam præ se ferebat, quotidie tamē biliosum  
e vomebat humorem. Censui itaq; inspicūda al-  
ui excrementa esse, in quibus minimē apparebat  
bilis. Quare coniectura quadam comprehendī  
eum meatur, qui biliosum humorem egurgitat,  
non minimā ipsius partem ad æmum ostiumq;  
ventriculī, quod Græci pylorū vocant, effunde-  
re, vt in quibusdam animalibus cernitur. Pluri-  
mū itaq; ad eorum quæ latent sensui cognitio-  
nē cōducit, ea quæ ex sectionis inspectione habe-  
tur perna, operationūq; atq; vitularū in vēno.

Quomodo eognoscantur ægrotantia  
corpora. Cap. lxxxi.

Vbi igitur iam corpora ægrotāt, ipsorum par-  
tes quæ quidem subiciuntur sensui, sunt digno-  
scende: ex eorum quæ insunt eis secundum natu-  
ram permutatione, in magnitudine, colore, figu-  
ra, numero, situ: & ea quæ est secundum duritiem,  
mollitiem, frigiditatem, & humiditatem, differe-  
ntia. Quæ autem visum effugiat, ex operationum  
lectionibus, aut his quæ excreantur, aut doleti-

Mm ij

Solidas partes  
non posse vili  
modo humiditas  
in effici,  
Solidiorum cer-  
porum alimentū  
tunc quod fit.

Ventriculī sic-  
cioris indicia.

Ventriculī hu-  
midioris indica-  
tia.

Ventriculī ca-  
lidioris indica-  
tia.

Ventriculī fri-  
gidi indicia.

Inter temperies  
morboſa, à na-  
turalibus intem-  
perantiam quo  
differant.

Sicut à visceri-  
bus thoracis  
æra quomodo  
diffundenda  
ab illa quæ  
excreantur ven-  
triculū.

Pulmonis frigi-  
di indicia.

Pulmonis siccis  
in indicia.  
Vacant rancam  
quæ efficiant.

Vocis magni-  
tudo & paruitas  
ad quæ emper-  
quantur.

Vox lenis aspe-  
ra, quod cau-  
significat.

Vox acuta gra-  
uis, quæ requi-  
rantur.

Virtus vitiiq;  
emulsi, sicut fa-  
cultas à tem-  
perie ipsa exor-  
itur.

Bilem compoſui  
invisibilem, sicut  
visibilem, sicut  
visibilem, sicut

Ægrotantes per  
invisibilem de-  
finitionem rati-  
onem.

bus, aut tumoribus præter naturam, auctorum quibusdam, vel omnibus.

De signis patientis cerebri. Cap. lxxii.

*Cerebri morbi quo modo digni sentiantur.*  
Igitur cerebri ægras dispositiones, aut ex desipientiæ speciebus, aut sensuum, aut imaginationum læsionibus, aut actuum qui secundum electionem fiunt, aut ex eis quæ excernuntur per palatum, vel nares, vel aures, aut ex doloribus, qui ei eveniunt, differentiis, cognoscere oportet.

Signa cordis patientis. Cap. lxxxi.

*Cordis morbi unde ascedant.*  
Quæ verò in corde fiunt, ex difficultate anhelitus speciebus, & tremulis motibus, qui ipsi continentur, & pulsibus quoque eius & artenarum, & extraxcandefcētis celeritate vel tarditate, & ex febris, & refrigerationibus, & in colore differentiis, eis, quibus consuevit, doloribus.

Signa patientis hepatis. Cap. lxxxi.

*Hepatis affe-ctum unde sint cognoscendi.*  
Quæ in hepate fiunt, ex defectu humorum atque abundantia, & ad id, quod præter naturam est, eversione, & colore malo. Sed et ex gravitatis, & tumoribus, & doloribus, non modo his qui in eo ortum habent, verum & ex illis, qui coniorij lege proveniunt: ut per aliquam difficultatem respirantibus, aut etiam tussis speciem.

Signa patientis ventriculi. Cap. lxxv.

*Ventriculi affe-ctum quo pacto deprehendat.*  
Sic & ventriculi affectus agnoscantur, ubi in coctione, & appetitu humidi vel siccissimi alimen- ti, vel superfluitatū excretionē, delinquantur. Nec secus ex singulis, ex fluctationibus, nausea, vomiti- bus, & ipsis eorum quæ vomuntur, speciebus.

Signa patientis thoracis. Cap. lxxvi.

*Thoracis affe-ctum unde sint deprehendendi.*  
Thoracis dignoscantur affectus ex spiribus diffi- cultatibus, tussibus, & doloribus, qui in ipso fiunt, & ex eorum quæ cum tussi expuuntur, differentiis. Sic & asperæ arteriæ ægritudines, spirationes difficiles, & tussis, & dolor in loco, & quæ expul- tur, & vocis offensiones ostenduntur. In viderant autem, ex tumore, dolore, operationū læsione, & excrementorum differentiis, omnium partium affectus noscuntur. Tumores igitur præter natu- ram, in inflammationibus, febribus, atque his quæ vocantur ædemata, explorandi sunt. Dolor au- tem, quemcumque obfiderit locum, aut solutam continuitatem, aut subitam alterationem, indi- cat. Soluitur autem continuitas incisione, excisionē, fractione, & tensione. Alteratur verò subita- na à caliditate, frigiditate, humiditate, & siccita- te. Tripliciter autem læditur operatio: aut quia de- biliter, aut quia visiorē, aut quia nullo fit modo.

At verò quæ ægræ excernuntur, nonnulla qui- dem sunt veluti partes locorum patientium, non nulla verò cetera excrementa. Etenim quæ in ipsis naturaliter continentur, singula propriam facient indicationem.

Signa futuræ ægritudinis. Cap. lxxvii.

*Solui vinitas quot modo pos- sit.*  
*Operatio triplici- ter læditur.*  
*Excrementa desu- pta.*  
Eorum autem indicia, quibus ægritudinis pe- riculum imminet, mediā formam habent inter ea quæ sanis & ægrotantibus accidunt. Siquidē sanis omnia secundum naturam insunt: præter na- turam verò ægrotantibus, quatenus ægrotant. In consensio autem horum, indicia nervorum cōsi- stunt. Quocirca dispositiones corporum, quæ ca- sura in morbum videntur, sunt ex nervorum ge- nere, simulque etiam quæ ipsa indicant signa. Pri- mo siquidem hæc sanitatem ostendunt, secundo autem ægritudinem. Ac proinde eadem signa se-

cundum habitudinem, quæ ad aliquid est, neu- tra & insalubria dicuntur: quæ quidem præsen- tem dispositionem ostendunt, neutra: quæ verò futuram præmonstrant, insalubria. Eadem verò ratione, & quæcumque ægrotantibus signa salu- ria apparent, dicuntur quidem salubria, quia futu- ram insanitatē ostendunt: ægra autem, quatenus præsentem indicant ægritudinem. Nec in ambiguo est, quod quæ sunt utrorumque indicia, neutra dicuntur, sed cum vnum quoddam neu- trum vocabuli significatum. Quum igitur eorū signorum quæ futuram ægritudinem indicant, duplex sit differentia, prius ea pertractemus, quæ quantitatibus, vel qualitatibus, vel temporibus, non autem propriis speciebus, ab eo quod secū- dum naturam, evariant: veluti ciborum appetē- tia intentata, vel dissoluta, vel quæ non feruat con- suetum tempus, aut quæ ad edulā nō vitata fer- tur. Ad hoc etiam genus pertinent excretiones ci- bi superfluitatum, quæ aut pauciores, aut plures, aut lumbidiores, aut durescunt. Sic humi- dorum excrementorum vel defectus, vel præter consuetudinē abundantia, aut in colore, aut in cō- sistētia variantur: aut in excretionis tempore. Præ- terea vigilie plures, somnigii: aut nō cōsueti tem- pore obiti. Eodem modo potus plures aut pau- ciores, calidi aut frigidi insolens appetitus, vene- reorūque immo dicta aut intempestiva consump- scētia. Ad hæc plures aut pauciores sudores his qui sunt opportuni, & ad motus torporis: vel si moveri tētauerint, tardiores, exoluntōve insignis. Huc pertinet mensurorū superfluitas, vel immo- dica, aut diminuta evacuatio. Similiter de fluxu hæmorrhoidū est designandū. Quod si nō eadē quæ prius ex cibo potuque voluptas capiat, est futuræ ægritudinis signum: quemadmodum hebetudo mentis sensuum minime naturalis aut obliuio insolita, somnive turbati imaginibus. In summa verò, quæcumque secundū naturam inerit, hæc quidē supra modū antea, hæc verò minime ea, hæc tēporibus quibusdā, aut qualitatibus, aut quantitatibus immutata, futuros morbos præ- nūnciant. Porro morbus ventris, vel in ore ventricu- li, vel in aliquo intestinorū, aut quem alius sub- ducitur, aut quem vomitus excitatur, aut quem mingitur, siue alius aliquis dolor mediocri, ex genere quidem existit eorū quæ præter naturā non tamē qui sic se habent, ægrotare dicuntur: sic uti nec qui capite graui antur, aut dolent, aut vi- gilant: quum nondum solite ipsorum impedun- tur operationes. Hic siquidē in huiusmodi o- perationibus terminus est. Atque idcirco in eo quod ad aliquid, eandem dispositionem ægram atque neutram dicemus. Nam pro vigore poten- tiæ, quæ vel facile sustinet, vel vincitur, vnaque- que ex his quas antea diximus, vel morbus est, vel dispositio neutra. Sic & quæcumque in sensu- bus, non in eo quod magis aut minus invicem differunt, sed toto genere sunt præter naturā, si- gna morborum existunt, quando modica fue- rint, ac nondum sufficiunt hominem à consu- etis operibus amovere. Ea autem contingunt, ubi sensus ipsi circa sensibilia propria palam ita- liciantur.

Signa corporū ægrotantiū. Cap. lxxviii.

At quæ tā in ægrotantibus signa videntur, non- nulla

Ægrotantibus  
torem indicia  
tamen signum  
natura duplex.

Morbi futurum  
prædictis quæ  
a natura ordo  
non recedunt.

Morbi futurū  
signa indicant  
ex naturæ ge-  
nere ostendunt.



signa salubria.  
signa perniciosa.

Excrementa  
quod indicent.

Decretoria acci-  
dentia.

Salubria cau-  
saru differre  
na duplex.

Conseruatrices  
causae qualitat.

Corpus necessa-  
rio alteratur  
quod sit, et  
quod amaret.

Air aut uas  
afficiat.

Motus  
Quies.

Excrementa.

nulla quidem salutem, nonnulla mortem portendant. Ac prima sane salubria: secunda vero genere quidem agra, secundum speciem autem, perniciosa dicuntur. Sumuntur autem, ut dicamus vniuersaliter, ex operationum virtute ac vitio: secundum partem vero, ex particularium operationibus: quarum genera prius diximus. Porro excrementa, quando quidem coctionis & cruditatis signa continent, fieri non potest quin omnino significent, aut naturam materiei, aut materiam naturae, aut neutrum alteri dominari. Salubria igitur signa dicuntur, superante natura: insalubria vero, de victa. Neutra autem, quae pugnas habet aequales. Ceterum quae manifestam coctionem indicant, ex salubribus sunt: sicuti quae cruditatem, agra. Quae vero neque coctionem nec cruditatem, ex neutrorum natura existunt. Sunt vero & neutra, quae cumque nunc quidem hoc, nunc vero contrarium significant: veluti denigrati digitus. Ac talia sunt decretoria accidentia.

De causis salubribus, insalubribus, atque neutris. Cap. IXXIX.

Quoniam vero causaru harum quidem salubres, hae autem insalubres, hae denique neutrae: primum de salubribus differemus. Ceterum quandoquidem nonnullae earum conseruatrices, nonnullae effectorices existunt: suntque & tempore & dignitate priores conseruatrices, ab illis nobis est auspicandum. Quum igitur non vnum tantum fit sanum corpus, sed plura, in eorum singulis propria erit causa conseruatricis. Siquidem omnis causa, in eo quod ad aliquid, est. Hic igitur de uero sume dum initium ab optima corporis constitutione: & quae illi salubria sint, considerandum. Eorum autem in uentionem ipsius rei natura indicat.

Quorū modis alteretur corpus.

Cap. IXXX.

Secundum quod igitur corpus nostrum alteratur modis, tot causarum conseruatricium genera habebit: quas liquet etiam correctrices existeret. Alteratur autem corpus, a nonnullis quidem necessariis, a quibusdam vero non necessariis. Necesse enim alterant, quae nulla ratione evitari possunt non necessario autem reliqua. Nam aerem quidem ambientem semper attingere, comedere, bibere, vigilare, & dormire, est necesse: enisibus autem, & exitialibus feris occurrere, non item. Quare iuxta primum causarum genus versatur pars corporis conseruatricis, circa secundam autem minimè. Quot igitur sint ea quae ex necessitate corpus alterant, distinguenda, proprium in singulis eorum causarum salubrium genus inueniemus. Inest igitur vnum ex ambientis aeris adhaesivum. Alterum, ex motu & quiete totius corporis, & singularum particularum. Tertium, ex somno & vigilia. Quartum, ex his quae assumuntur. Quintum, ex iis quae excernuntur & retinentur. Sextum, ex animi affectibus. Ex his itaque necesse est aliquo modo affici corpus. Ab aere quidem ambiente, quia vel calsit, vel frigidit, vel exsiccat, vel humectatur, vel secundum horu patitur coniugationem, aut in tota alteratur substantia. Ex motu vero & quiete, quum vtrique modum excesserint, aut calfactum, aut frigidatum, aut humectatum, vel exsiccatum, vel aliquid secundum horum patiens coniugationem. Sic & ex somno &

vigilia ipsum pati est necesse, iuxta eandem rationem. Praeterea & ex animi affectibus, & ex iis quae assumuntur, aut excernuntur, aut retinentur. Hae siquidem omnia, partim quidem evidentiter, partim vero per alias causas medias, alterant corpus, & sanitatem corrumpunt. Omnia igitur nunc dicta genera, materiae quaedam sunt salubriu causarum. At vtu oportuno adhibito, sanse fiunt conseruatrices, atque salubres: si vero à modo aberrauerint, redduntur insalubres. Quo circa singulorum earum rerum, quandoque salubres, quandoque insalubres sunt, quid ad aliquid referantur. Quippe ubi motum corpus desiderat, exercitatio quidem salubris, otium vero insalubre existit. Quum vero eget quiete, otium salubre est, insalubris natem exercitatio. Eodem modo de cibis & potibus, ac de aliis omnibus statuendum. Horum namque singula, quando vti necessitas corporis exigit, cum mensura, & opportuna qualitate adhibentur, salubria fiunt. At quum citra omnem necessitatem, ac praeter modum afferuntur, insalubria. Atque haec duae sunt circa salubre & insalubre intentiones: rei scilicet, quae adhibetur, qualitas, & quantitas. Non est autem ratione consonum, etiam temporis occasione, quae in us quae dicta sunt, continetur, veluti tertium aliquod ad eisdem duarum, in introducere. Nam si tanta & talis allata egeat corpus, nemini dubium est quin etiam in tempore oportuno afferatur. Siquidem inde temporis occasio est nata, quod fluxile & transmutabile mortale corpus quum sit pro modo transmutationis, alia alio tempore auxilia posulet. Optime igitur corporis constitutioni, quid circumfusum aer optime temperatus fuerit, omnium earum rerum, de quibus nuper sermone fecimus, quantitas moderata convenit. Quum vero aer à temperie recesserit, tantum illas à mediocritate evitari oportet, quantum fuerit aëris ab optima temperatura recessus. Hi vero mediocritatis termini existunt: in aere quidem ambiente, ut neque lioretat propter frigus, nec fudet propter aestum. In exercitiis autem, quum primum lassari coeperit corpus, confestim quiescere. At in cibis, coctionis perfectio, & excrementorum modus, in quibus & quali convenient. Aequalis vero in his quodammodo est coctione appetitus. Optima quippe natura, quantum appetit, tantum enis coequat. Sic & somno modum ipsa natura praestitit, qui optimam corporis constitutionem fontuntur: nam hunc à somno excitantur, quum corpus amplioris quiete non eget. Quumque talem victus rationem adhibuerint, nullum est in eorum excrementis delictum, quod vel per ventrem, vel vrinam meatum, vel per totum corpus vacuetur. Liqueat igitur ipsos cauere debere ab immodicis animi affectibus, ab iracundia videlicet, tristitia, furore, timore, & invidia. Haec quidem alterant, atque à naturali statu corpus immutant.

De venereis. Cap. IXXXI.

Venereorum vero iuxta Epicuri sententiam, nullus est usus salubris. Re vera autem confert, si tantum intervalli sit eorum visu adhibeatur, ut nec resolutio aliqua percipiat, & ipse seipso homo quodammodo leuior factus, ac melius spirare videatur. Tempus autem ad vendum oportet rationem, quum in omnium rerum circumstantiam

Vigilia.  
Animi affectus.

Salubrium causarum materia quae sit.

Intentiones circa salubre insalubre, sunt qualitas exigitur et quantitas.

Occasio temporis.

Mediocritatis terminus in re quibus vis corporis debet.

Natura optima appetit ad hunc quantum circumquirit.

Veneris quatuor sunt salubria.

Veneris vix optima quod sit.

exquisita mediocritate corpus fuerit constitutum, ubi scilicet nec supra modum plenum, nec vacuū extiterit: aut in calore, aut frigore, aut siccitate, aut humiditate excessit. Quod si aberrare coningerit, parvus sit error. Melius autem illi calefacto magis quam frige factio, & pleno quam vacuo, & humecto potius corpore, quam exiccato, vii veneris. Horum autem singulorum quæ dicta sunt qualitas, in a optima corporis constitutione est eligenda: exercitij quidem, in quo totus corporis partes æqua proportionem mouentur, ita vt non aliq̃ quidem vltra modum fatigentur, aliæ verò citra. Cibi autem & potus optimam habent temperiem. Eadem in reliquis etiā est ratio habenda. At si ab optima constitutione aliq̃ quod defecerit corpus, non autem vehementer, & hæc quæ ipsius sanitatem conseruant causæ, ad proportionem mutabuntur. Sed quum multa sint humiliora corpora, p̃t singula genera eū ferorū dicendū. Quod igitur in partium similitudinem temperis evariar, instrumentarum autem partium seruatiōem rationem, duplicem habet salubrium causarum formam: alteram quidē earum quæ ipsius conseruant temperiem, alterā verò earum quæ ad optimam transferunt. Quæ itaq̃ ipsius temperaturam conseruant, tantū in causis optimæ temperate naturæ distabant, quā tum & totius corporis tēperatura ab illa evariabit. Caldiora siquidē corpora, calidiorem vltius rationem postulant, frigidiora autem frigidiorē, sicciora sicciorē, & humidiora humidiorē. At secundum coniugationem, calidiora & sicciora, calidiorem simul atq̃ sicciorē: eadē in reliquis quoque coniugationibus proportionē seruati. Rectē siquidē causarum viretur materia, quā naturales earum potētiās agnoverit: videlicet quod morus, alimenū penuria, vi gilæ, excretiō, & omnes animi affectus, corpus exicant: at quæ hæc contraria exsunt, humectant. Ita verò & calfaciētia, & refrigerantia vitæ instaura, & ciborum, ac potuum, vtrū simpliciter dicam, omnium quæ corpori asseruntur, materias quæ noscunt atque potentias, salubribus videri causis, similia similibus adhibendo, si quidē eandē in qua acceperit, seruare corporis temperiem sit animus. Quod si permutare, atq̃ ad melius eam traducere studeat, aliterum est hic salubrium causarum genus, his quidem quas nuper diximus, contrarium: æqualiter verò declinās ad alterā partē a bene tēperatis & mediis, quæ optimis naturis cōueniūt. Caldior siquidē & siccior temperatura, a calidioris ac siccioris vltius ratione, ad exactissimū bonæ temperaturæ habitum non transferunt. At talium erit vltius necessarius, quæ tantum cis quæ probē temperata exsunt, frigidiora atq̃ humidiora sint, quantum & natura naturam, in caliditate & siccitate superabat. Nam ratē causarum genus insitit coariguit temperantias: alterum verò de quo sup̃ diximus, tēperaturam conseruat. Eū autem vtriusque vicissim apud medicos vltius necessarius. Nam quum plurimum suppet ocn, corrigere oportet, ac sensum ad meliora transferre. Neque enim natura patitur repentinas alterationes. Hominem autem occupantibus necessariis distictum, in eodem præstat haberi conseruare. Por-

ro quæ similem habent in omnibus corporis partibus intemperiem, eadem egent procuracione: dissimili, quæ dissimilem.

De causis salubribus partium instrumentarum. Cap. lxxxii.

Instrumentarum autem partium causæ salubres, quatenus & hæc ab optima constitutione de linquunt, ita & invicē distabunt. Aliq̃nā sunt salubres erroribus qui in formatione constituant: aliæ iis qui in magnitudine, vel numero, vel positione. In formatione igitur plures conuagunt errores: nā & figura partium, & si qua in ea cauitas est secundum naturam, vel meatus, vel orificium, vel asperitas, vel lenitas, si quidem parum a naturali symmetria recesserint, salubrium corporum retinent appellationem: si verò amplius, infalubria. Quod si tantus fuerit recessus, vt operationi asserat detrimentum, iam egrotare dicuntur. Secundum quantitatem autem, excessus atq̃ defectus ad eandē ducit differentias. In numero verò, siue vna, siue plures, quæcūq̃ ex similibus partibus fuerint, aut deficiat, aut superabundet. Ex hoc genere etiam sunt, quæcūq̃ in nobis substantiæ præter naturam consistunt. Reliquum est aliud genus, quod ad finem cuiuslibet simplicis attinet partem, in quo et ipso quatuor sunt omnes differentie. Prima quidem, quæ optima existit. Secunda, quæ parum evariar, ob idq̃ salubre adhuc efficit corpus. Tertia, quæ infalubre, quidē amplius a modo recesserit. Quarta, quæ iam egrum recessu plurimo reddit. Quæcūq̃ igitur partes in figura delinquant, vel vnaque blæx, varæ, & oblique appellantur, hæc quum fortis nuper natus atq̃ tenellus est, formatione & ligatura, ad naturalem habitum traducuntur. At si iam aucto infante, ad duritiem peruenierint, corrigi non possunt. Si errores quidem qui ad cauitatem attinent, quum adhuc augeri periculerent, correctionem admittant. Quum autem iam ad vltimum peruenierint, nullus est remedij locus. Cauitates igitur quæ atq̃ alligantur paræ redduntur: magnæ verò, partium operatione, & retentione spiritus. Sic & quæcūq̃ foramina, oratq̃. Et quidē quæ naturalem magnitudinē partes exuperat, quæ, ac cōmoda ligatione, minor redduntur: augent autē & naturali moru, & frictione moderata, & quibuscūq̃ alias plus sanguinis cōtiliare valēbunt. Deficientes autē partes, quæcūq̃ ex sanguine duxerūt originem, corrigi quidē nō est impossibile. Quæ verò ex semine, apemodum impossibile existit. Licet tamē aliquādo loco earum alias facere, quæ vltimū haud dissimilem præstent. Earum verò omnium natura opifex est, medicus autē minister. Porro quæ numero excedit, iis ablano, causa salubris existit. Inspicere verò oportet, in quibus id fieri possit. Nam si impossibile appareat, transponere tentandū est. Eadem est & eorum, quæ in situ vitia sunt, emendatio. Nec verò in ambiguo est, quod duo spiritus aut tria vitia, eandē possunt partē cōprehēdere. Reliqui est id morbi genus, q̃ similibus & instrumentalis partibus existit cōmune, vitiatia diuortium.

De causis salubribus ceu ad eos, qui morbo tenentur. Cap. lxxxiii.

Salubrium causarum, aliæ quidem occurrunt

Errone in fin.  
matrice, quæ  
impleretur an-  
te hunc partem.

Optimi consti-  
tuta natura o-  
mnino requirit  
mediocritā.

Exicantia cor-  
pus quæ sint.

Similia simi-  
libus esse adhi-  
benda, dum ser-  
uare corporis  
temperamentū  
est animus.

Intemperantia  
quando ad me-  
liora sine trans-  
cenda, & quæ  
de sic conser-  
uanda.

Partes re san-  
guine crudi  
posse corrigi si  
de fuerint, ex  
finitate autem  
ortas, vt iustas  
reuerit, esse fieri  
impossibile.  
Naturā esse op-  
ifex generati-  
onis particu-  
larum.  
Medici natura  
minister.

\*interperi iam genitrix illi que in generatio-  
ne cōstitit: alie illi, que futura est. Igitur harū que  
sunt posttemp, hec quide in præservationis artis par-  
te cōtinentur, hec verō in salubri. Præmā aut illa  
inter oēs, in curatiua tantōmodo at ille quas in-  
ter vtrāsq; collocauimus, in præservationis final  
& curatiua. Si quidē factū iam ægritudine curare  
oportet: eam verō que nondā adeēt, sed futura  
est, phibere ne fiat, ab ea que est in corpore dispo-  
sitione. Eius aut que adhuc sit, qd quidē factū est,  
curare expedit: qd verō futurū, prohibere ne fiat.  
Prohibebit aut, sublaia ea dispositione in qua sit  
morbus natura est aptus. Talis etē dīpositio;  
causa antecedē dicitur. At facta iam ægritudine cu-  
rabitur, soluta ea dispositione, si qua grūm lex-  
ditur naturalis functio. Quā sanē ipsam dispo-  
sitionem, morbi causam vocamus.

De communissima intentione curatiua.

Cap. lxxxviii.

Curatio verō vniū præcipui cōmunissimūq; 10  
habet scopū, nēpe tollē dīpositionē contrariā.  
Ex hoc si quidē genere sunt causæ illæ oēs, que sa-  
nitatē efficiūt: particulatim verō, ex vnicuiq; dis-  
positioni cōtraria. Calido igitur affectu, causa  
frigida cōtraria existit, frigido aut calida: eadēq;  
in ceteris pportione. Etenim si omne immoderatū  
præter naturā est, moderatū verō secundū natu-  
ram: necesse est omnino, vt immoderatū ab im-  
moderato cōtrario, ad modicitatem trahatur.  
Ceterū secundum potentiam, non secundum 30  
imaginariōnem, calidatē refrigerāsq;, & alia  
id genus, sunt accipiēda. Fingamus itaq; in hu-  
moribus putrescentibus febrem accēdi. Indica-  
tio in huiuscemodi affectu, est euacuatio simul et  
alteratio: hæc quidē, que putredinem finiat, ma-  
nente adhuc substantia: euacuatio verō, que to-  
tam ex corpore putrescentiam putrem educat. Sed  
dicta quidem alteratio nō species, concoctio exi-  
stit. Euacuaciones autem sunt, & per sangui-  
nis emissionem, & clysteris vsum, & per vtriusq;  
vias, atq; eam que per cūm fit transpirationem:  
ac præterea per eam que fit ad partes oppositas  
attractionē, atq; ad alias propinquas deminatio-  
nem. Nam & ad hoc ipsum genus pertinet citare  
menstrua, hæmorrhoidesq; aperire, ac deniq; ex-  
purgare per palatum & nares. In vniuersum autē,  
si vnamquamq; prius effectricem causam re-  
funderimus, dein verō ad illam quæ ab eadē cau-  
sa facta est, egrediētinem accesserimus, causarum  
salubrium inuentionē habebimus. At secundum 50  
compositas intemperies, ex simplicibus compo-  
sitis commodatib; salubria præcepta. Etenim si  
decem quidē gradibus ad caliditatem maiore  
ea que nature cōueniat, labatur corpus, septem  
verō ad siccitatem maiorem, tunc salubrem cau-  
sam in huiuscemodi affectibus esse oportebit, de  
cem quidē gradibus frigidiorē, septem verō  
humidiorē. Quod si particula affecta in pen-  
sationibus locis sit sita, machinari oportet insuper  
latius remedium salubre: cuius vis nequaquā in iti-  
nere antea exsoluatur. Si itaq; calidus esse opor-  
teat eo quod est moderatū, non solum tantam  
habear caliditatem, quantam exigit morbus, sed  
vltra eandē mensurā tantūm adiciatur, quātm  
ex situ, vt pertingere possit ad locum patientem,

sit necessariū. Si verō frigidus, nō simpliciter tan-  
tūm frigiditatem oportet augere, sed & materia  
quod prius auiam dēvertebat est. Si enī crassa sit,  
non admodū potest penetrare ad profunda: sed  
potius contrariū præstabit effectū, ipsiusq; do su-  
perficiem, atq; dēscendo. At si tenuioribus parti-  
bus cōstet, potest sanē pluriūm subire, pfun-  
dum. Idem in humectantibus atq; exiccantibus  
& situ simul, quādo effluxus sensibiles, atq; ad a-  
liam locū foraminib; patentes habuerint, aut his  
omnino caruerint. Quos enim effluxus ad prin-  
cipales efficiunt partes cognouerimus, avertimus,  
atq; ad illas impellemus, que minime principia  
obtinēt. Poterō causarum que intemperata sunt  
efficiūt, curatio fit per euacuatiōnem. Nam ipse  
intemperata, sola alteratione in naturā.

Curatio solutonis continui in parte car-  
nosā. Cap. lxxxv.

Cōtinuitatis aut solutonis curatio, intentio-  
nem quidē habet vniū, que in partibus quidē  
infirmis raris impossibilia est, in similibus ve-  
rō non semper possibilia. Quādoq; opus sit, sicuti  
in carnosiss, sanitas cōglutatio ne perficitur. Ipsi-  
sam verō antecedit, si vulnus maius extiterit, par-  
tiū applicatiō dilauiū, que ex formationis ge-  
nere existit. Vt aut hęc ipsa firma & stabili fiat, al-  
ligatio cogens in vnum, & filulæ & futuræ vti-  
les sunt. Coalescere autem facit ea que distant  
in vicem, ac pristinam reitruunt vniōnem, ipsa natu-  
ra. Nostrium verō opus est, primō quidem appli-  
care extrema distantū partium: secundo autem,  
que in vniū coacta sunt, sic cōseruare. At tenēdū  
cauere ne quid labris intercidat vlcera. Quarto  
deniq; ipsam partem substantiam cōseruare salu-  
brem, id quod per medio critet exiccātia fiet. Hęc  
igitur est solutis cōtinuitatis curatio, quoniam ipsa  
loa seorsum in carnosa parte cōsistit.

De solutione cōtinuitatis in osse.

Cap. lxxxvi.

At fractio est in osse cōtinuitatis diuorsio: qd  
quidem quantū ad intentionē primā, insana bi-  
le est: quod verō ad secundā, quodāmodo recipit  
eutanoniē. Prima igit intentio est coalectus partium,  
qui ob osis durtiē fieri non potest. Secūda, alli-  
gatio, que fit callo superna partes fractas cir-  
cumligat. Callo aut generatio, quidē ex ma-  
teria & a natura sit, est & ad alia cōmunis. Qua-  
tenus verō formā osi vicinā habet, ex eiusdē sit  
alimentū. Molle verō & puerile os coalescere po-  
test, sed pettarō sit talis affectus, qn affocietur al-  
teri. Magna enim ex parte adiacētes musculi, vni-  
cum corporibus aliis, per fracturā osiū patiuntur.  
Quocirca & curatiōnis intentio oriū duplex:  
quarū altera quidem circa osi, altera verō circa  
corpora adiacētia versatur. Quam igitur fracturā  
et sanitas, callo adueniente fiat, ad huius autē ge-  
nerationem, propriū osis alimenti supereminēt  
naturæ suggerere oporteat, que quidē superdū-  
tas in qualitate & quantitate debet modū serua-  
re, talis certē viciū ratio adhibēda est, quæ insu-  
xurū osibus sanguinē tantū ac talem præparet,  
qualis & quātm generādo callo sit opportunus,

Mm iij

Avertēdo efflu-  
xū osi a parti-  
bus principia-  
bus, ad igno-  
bilitatem.

Vniū in parti-  
bus infra mon-  
tem solutū est  
impossibile.

Vniū carnis  
solue, qua præ-  
cedat.

Vniūem præ-  
stat natura.

Soluta partē  
salubritatē con-  
seruare medi-  
camentis conu-  
lit.

Fractura quod  
pertinet ad in-  
tentionem pri-  
mam, est inco-  
rabilis.

Callo generatio

Osse puerile  
coalescere possit.  
Fractio est si-  
mul osis non  
soluta.

Fractura san-  
ta si callo ad-  
veniente.

Fractura qua-  
nta viciū ratio  
conueniat.

Curatiua fin-  
is.

Immoderatū  
morbi est præter  
naturam.

Idem puerile  
medicatio dō-  
piz.

Alimentū pueri  
est humore cō-  
stitū est.  
Evacuatiōnis  
species.

\*Solutū in alio  
sit, rebem-  
tationem medica-  
mentis non re-  
quirit, quā ex  
sua ipsa materia  
pulsione.

De punctura nerui &amp; tendonis.

Cap. lxxvii.

Nerui verò & tendonis pūctura, ppter sensus vehementiū, & quoniā hæc pars principio contrahitur, p̄p̄ta est ad excitandā cōvulsionem neruorū: ac tum p̄fectū, quū nil extorūm expirat, obsecro curis vultere. Aperiendū est igitur, atq; exiccandum sub stētia tenui, quæ vsq; ad ima nerui oblecti possit descendere. In simplicib; igitur huiusmodi affectibus, salubriū causariū forma talis existit. In cōpositis verò cōplicat vicenbus, prima quidem cautus: quæ nō differētia vlcēis, sed est alterius ægritudinis genus, in quo facta est sub stētiā iactura. Curatio aut̄ in morbo duplici, duplici exigit intētiōē. Nam cōtinuitatis solutio, vnitatē sub stētiæ aut iacturæ, generatione indiget. Quod aut̄ primò quidē hunc affectū oportet sanare, ac dein vnitatē restituere tentare, ipsa natura terū non docet. Vbi verò repletum vlcus iam fuerit, ad æqualitatēq; perductū, cūte inducendum est: id quod si fieri nō possit, saltem carne quæ cūti vicina sit, cōmuniendum. Est aut̄ huiusmodi, quæ & sicca, & calli similitudinem p̄ se fert. Ad cicatricē igitur inducendam, necesse saria exiccantia erunt, ac sine mordacitate astringētia medicamēta. Sic etiā sordities aliqua fuerit adnata, intentio abstergerdi erit. Præterea si inflāmatiō aliqua vel ærmo, vel scirrhū, vel tum mollis & laxus, vel intemperies vni cum vlcere adsint, prius quidē eorum curationi insistentiū est, ac dein ipsū vicus curandum.

De speciebus morborum qui iuxta formationem contingunt. Cap. lxxviii.

Quod verò ad figuræ permutatiōem pertinet, in iis sanē qui adhuc crescit, possibile est plurimarum partium peruersiōnem corrigere: in eis aut̄ qui iam sunt aucti, minimē. Scopus igitur istius quæ curationē recipiūt, est, in contrariū peruersiōnis adducere. Si verò fractiōne aliqua nō rectē conformata, alicuius membri figura vitiosa fuerit, cui sub stētia callosa innasci præuenit, si quidem hæc adhuc recens exiterit, perfringere oī compactū oportet, ac rursus rectē afformare, deinde callum superinducere.

De obstruptione. Cap. lxxxix.

Est verò & obstruptione ex eodem morborum genere, sitq; ex crasis & lentis humoribus, vni & ipsa scopum habens morbum contrarium, videlicet apertionem. Causæ autem salubres sunt, abstergentia & incidentia medicamenta. Quæ verò sit ab stercore duro, intersepiente intestinū, obstruptione, primū quidem habebit dūritie remediū, ex humidis pinguib; dysenteribus: postea demum ab acerbis evacuationem exposcet.

Quæ autem à lapide fit in vesica, subito quidem illius transpositiōnem requirit: integræ verò famiratis grana, incisionem & extracōtionem. At huiusmodi quæ præter naturam continetur sanatio, in exacta tonis evacuatione consistit: quæ ad modum etiā in suppuratis. Immodica autem cōpletio, ex humida evacuatione curatur. Quæcūq; igitur in pulmone vel pectore cōtinentur, & educuntur qui dem per tūsum, sed à medicaminibus extenuantibus. Quæcūq; verò in hepate, vel vepis, vel artētiis, vel renibus: aut per vrinā,

aut per \*inferiorem ventrem. Sed per vrinā quidem, ab iis quæ vehementer extenuant: per ventrem verò, ab eis quæ attrahendū aut apertū orā vim habent. Quæcūq; in superiori ventre comprehenduntur, per vomitum: sicut quæ in inferiori, per subductionē. At quæcūq; sub cute, per sectionē, vel ignem, vel aduentū medicamētū. Si aliquando etiam, quæcūq; in aliqua natura locatur, vt in thorace. Vt autem summam dicam, quicquid præter naturam in aliquibus partibus conuenerit, eius sanationis intētiō, est ablatio: vel si fieri hæc non possit, trāspositio. Quæ verò non sunt ex genere p̄ter naturam, at quæ tantæ damnantur, in his scopus detractio existit. At inuenio eorum, quæ ad ipsū nam sanationem perducunt, partim quidem ex affectu plurimum, verò ex ipsis affectis particulis sumitur.

De asperitate &amp; leuitate. Cap. xc.

Quæcūq; verò partes, quod exasperate sint, naturalem amissionē habent, iis leuitas naturalis restituenda est: oīa quidem leuigando, asperitatem verò artētiis vel lingua leniendo, humidis quæ nihil mordent, atq; lentorem habent. At quibuscūq; leuitas in eis non naturalis, cognata asperitas reuocanda est medicaminib; quæ sufficienter abstergūt, attingunt parum. Quæcūq; verò vel obstruptione, vel angustia meatū, alios morbos sequuntur, corū curatio prius est perficienda. Quod si nonnulla est proximè dictis inuicem complentur, varias habebunt cūctationes. Si igitur in particulam aliquam ita sanguinis copia confluxerit, vt vniuersæ ipsius venæ intumescant, & distendantur, nonnulli quæ in spacia vacua & intermedia trāsfundant, huius quidem affectus sanatio scopum habebit evacuationem: aut, vt apertiori vtriusq; vocabulo, detractiōnem: quandoquidē morbus est immodica partis repletio. Itaq; necessarium est vt superfluas vacuetur, aut retrocedens, aut per ipsam patientem particulam. Retrocedat autē, vel impulsu, vel attracta, vel transmissa, vel vno aliquo horum modorum, vel omnibus. Per locum verò patientem vacuabitur, partim quidem manifestē, sensibilib; itēq; partim verò resoluta in vapores. Si igitur vniuersum corpus plus squo plenū fuerit, per patientem locum minimē vacuare expedit. Nam si scarificatiōnibus, aut sectionibus, sensibilib; aliquid euacuemus, plus ratiōne excitat doloris atralemus in partem. Si verò calfacientibus conemur discutere, maior caloris vi ad partem trahetur, quā dispargatur. Quod si hac in re laboremus, vt retrocedat id quod influxit, corpus quum pleniū sit, non admittit. Vt igitur fieri hæc ambo possint, in primis euacuare vniuersum corpus oportet, dein autē id quod in partem influxit, ad contraria loca retrahere. Quod quidē vbi fecerimus, prius repellemus à parte, quā aggrediamur discutere. At quō minorā præsidia fuerint, eo crit longē apertior vacuatio. A panēte verò loco repellemus, attingendo, atq; refrigerando. Quinetiam loca inanita attrahunt ad seipsa quæcūq; repercutiuntur. Vasa præterea, vi medicaminum astringentium corroborata, si se ad alia remittit. Si igitur superfluum omne læe via retrocesserit, bene

Diuertit quod  
esse debet.Causa in  
quibus vna  
medicamentis.Aspera quibus  
sunt leuiganda.Lentia quibus  
exasperanda.Vacuationem  
per partem lo-  
cum nō esse  
menda, vniuerso  
corpore pleno  
existente.Inflammatiō per  
tu curatio, vbi  
vniuersum cor-  
pus sit plenum.Repercutiōne  
fieri per attri-  
tionem & re-  
frigerationem.

seres habet. Si verò aliquid fuerit retentū in parte, id lentum & crassum esse, ob idq. egre solubile, conuicere oportet. Potest enim, vel si iussuens humor non sit eiusmodi, effusus tamē esse ad intermedia spacia, quo tempore evacuationis est per ipsum locum affectum: imponētibz nobis particulis superiacentibus ea, quæ repellendi humoris vim habeant. Maxime verò evacuationis quod in spaciis vis delatetur, et scāficatio notum auxilium, & medicamentum quæ discutiendi vim habeant. At quia discutientia omnia vires calidas habē, effectus autem huius temperaturæ est modere, vbi caliditatis modum exceſſerint: cauēda ex eis sunt vehementissimè calida, ac tum præsertim, quum parrens locus in superficie obstitit. Neq. enim parvus excitabitur dolor, si præter propriū affectum, insuper mordeatur. Taceo etiam dolorem omnem irritare fluxiones. Quod igitur medicorū caliditate obnitet, in hūc dolorem sedatur, ea multo magis si humidū fuerit. Et quidem quicquid per summa laxet, potens est id medicamentū digerere, & etiam si valides non forſitauer parſes omni oxa caruerint, id verò quod evacuari oportet in penioribus partibus hæreat, intendendus atq. augendus discutientis medicamenti est calor: quum dubitandum sit, ne prius quā profundas partes arriget, interim vires amittat. Nec tamē ex eo superiores partes aliquem dolorem sentient, quum omnes vacent affectu. Quare duo hæc simul inuitant ad calidorū pariter atque acrim medicamentum vsum, & summæ partes quæ tolerat, & profundæ quæ egent. Hanc igitur indicationē si sitis partis desinebamus. Porro affectum parium, in quibus retinetur superfluitas fluxionis, ootimulū quidem rare laxare, & molles natura existunt: nonnullæ autem densæ, pressæ, ac duræ. Priores igitur evacuantur facile: reliquæ autem medicamenta acrim vacuantibus, ac præter ea tenuiores partibus habētibz, egent: atq. eo magis, quod profundior situm habuerint. Hæc igitur tibi rursus sit indicatio, vna quidē à particulari patientis substantia, altera verò à formatione & situ. Fingamus enim in hepate esse proximè dictum affectum, in angustis vasorum sinibus, impactis humoribus, qui vel lēti & tenaces, vel craſsi existant, vel superabvndent: nōntē in promptu est, primū quidem crassitatem vna cum lentore & tenacitate, cibis ac potibus excreuantibus, ad subtiliorū partū substantiam transferri oportere: Secundo autē, non per angustos tantum iostribileſq. meatus, sed per latiores etiam, quæquid inibi inficū est, evacuationis esse: Sunt enim in hepate venæ, oon minus amplitudine quā numero, insignes. Terminantur autem, hæ quidem in gibbis, ad venam cauat hæ verò in cauis, ad portam. Vnde baud difficile nbi futurum est, vbi cuiq. pressis eo nō spariq. humoribus fuerint, eisdem expedire evacuari: trahēdo quidem ad ventrem, cum lūis quæ attrahendi vim habent medicamentibus, quicunq. ex ipsis, in venis ad caus hepatis pertinetibz, acervati sunt ad vna verò meatus promouendū, per causam venā, quicunq. in venis ad eam pertinentibus hæret. Est & alia indicatio ab hepate sumpta, veluti

à venarū principio. Nam quum non tantum seipsum regere natura sit aptū, sed largiatur etiam virtutē venis: verendū est, ne si eius vigor fomenis & cataplasmati relaxātibz exolutus fuerit, & ipsum primum ad proprium opus, & omnes subinde venæ, ratione illius, imbecilles reddantur. Quare in curationibus, eius aliqua ex astringētibz medicamentis semp. mittere oportet. Sed quoniā in profundo admodum loco situm est, dubitandum erit, ne astringentis medicamentis vis debilitetur, nisi ab aliqua altera subtiliū partium substantia, qualis aromatū est, tradatur. Melius verò fuerit, si & ipsum medicamentum astringens, etiam aromaticum fuerit. Nam si duas habuerit natura insitas qualitates ac potestates, valetius operabitur, ita ut evacuet quidem quod præter naturam in ipsum membrū confluxit, seruet autem humorū modum cōuenientē naturæ. Explorandū itaq. est, num quid ab humoris confluētis qualitate, temperies eiusdem membri sit alterata: vñ hanc ipsam curantes intemperiem, sanitate parti restituamus. Curabimus autē, edentia ex aduerso asserites qualitatē: quoniam vñ quodq. calidius aut frigidius redditū est, tantum refrigeratē, aut calfacientē. Quare & hic rursus agnoscēda est ipsius secundū naturā temperies.

De morbo secundum numerum. Cap. xci.

Quibus autem aliqua particula deficit, in iis quidem scopus est efficere alteram, subministrando naturæ, eo quo diximus modo. Quibus autem redvndat, hanc rescicere oportet aut scalpello, aut igne, aut caustico medicamine. Hæc igitur omnia sanare, & ferme possibile est: at generari nō omnia possunt. Quædam verò sunt, quæ est generari nequeant, pro ipsis tamen licet alterum substituere: quemadmodū offe ex toto sublato, carnofum quædam callum inducimus, qui processu temporis duriorē naturam contrahit, quā ab imo carnis intraretur substantiam. Vbi verò parte quacunq. sublata, neq. eandem secundum speciem substantiam, neq. similem efficere possumus, tertius nobis scopus est, invenire decorem quendam quemadmodum in mutilationibus.

De morbo secundum magnitudinem.

Cap. xcii.

Communicat autem hoc genus totum cum eo quod ad magnitudinē pertinet. Nam quodcunq. ex eo est secundum naturam, illi propinquū existit. Id verò tantum seicunctum est, quod inter minimè naturalia cōsummeratur. In quo quidem prima intentio est ablatio. Secunda verò, si illa sit impossibilis, transpositio: quemadmodū in suffusionibus. Quæcunq. autē nōo integris partibus, sed carū tantum particulis, aut deficient, aut excedant naturæ modum, reſectio quidem, vel generatio, in nōne deficient: ablatio verò & abolitio, in his quo superabvndant, scopus est. Quare neq. in ipsis altera intentio, neq. medicamentū forma est diversā.

De morbo secundum situm. Cap. xciii.

Sed iam veniendum est ad reliquam substantiam causarum genus, quod ea corpora emendat, quæ in situ sunt vitiosa: veluti luxationes, & in scroto intestinum. Quæ sanè vitia conungūt, partium ex violenta tensione atq. impulsu, partium

Hepatic morbo  
lemētū aliq. ex  
astringentibus  
admisce  
da offe, q. qua  
aromatū ven  
obducant.

Intemperies offe  
per citratia co  
randa.

Redvndantes  
partes rescicere  
scalpello possi

Medicā mem  
bris arte trahi  
bāndū offe des  
certum.

Discutientium  
qua velent  
sum calida  
fuit, in quibus  
sit ofus cauē  
dur.  
Dolor omni  
fuit vinctus.

Discutientium  
calorem intem  
danda offe, q.  
bi humor va  
cillat in pos  
sionibus parti  
bus hant.

Parti quā  
vacuatur facti  
li. q. qua dicit  
ta medicamē  
ta debent.

Hepati vñ  
li curant.

Hepati caus  
O gibba. q. qua  
peris vacua  
da sunt.

Hepati venarū  
propinquum.

ex dilataro continente, vel rupto. Quare modus etiā curationis est duplex: alter quidē ad oppositam partem ei \* ad quā facta est permutatio, in-  
tendendo, & pellendo: alter verō, id quod continet, firmius solidiusq; reddendo.

De causis præseruatium. Cap. xciii.

Porro corā quæ præseruatiua dicitur, triplex secundū genus differētia existit. Prima quidē, hominib; qui integra fruatur sanitate. Secunda verō, eius qui non integrē valet. Tertia deniq; eius qui iam ægrotat. Primi igitur genus ad salubrē artē spectat, in duāq; partes diuiditur. Secundū verō ad præseruatricem pertinet. Tertiū ad curatiuā. Hoc autē vniuersum genus præcipue circa humores versatur, quos neq; lentos oportet esse, neq; crassos, neq; aquosos, neq; plurimos, neq; velle-  
menter calidos aut frigidos, neq; mordaces, neq; putredini obnoxios, neq; venenis naturæ affines. Nam vbi autē fuerint, generāt morbos. Augentur verō nonnunq; eadē ex causa, quæ ab initio eos generauit. Illud autē plerūq; accidit, vt sua alteratione inficiāt illos, q; sunt in corpore humores. Scopus verō & horū curationis duplex existit: alteratio scilicet, & euacuatio. Alteritū igit, vbi cōcocti a corpore, vel ab aliquibus facultatibus aliis, quæ vim medicamentosā fortiūtur. E' quorū numero existūt ea, quæ aduersant i exitu illa ferarū venenis: quæq; etiā pharmacā virulētra transmutant. Euacuitur autem satis calidis medicamentis, purgationibus, clystis, sudoribus, & vomitibus. Hæ igitur sunt ipsorum cōmunes euacuationes. Proprix autem, ex locis in quibus coaceruantur, sumuntur. At verō proprius euacuatur per ventrem, quæcūq; continentur in primis venis superfluitates. Quæ autē in iis quæ in hepate sunt, per vrinā mcat. At quæ in toto corpore, per sudores: sicut quæ in capite, per palatum, vel nares, vel per vtrūq;. Cæterum quæ in spatii prætoris laxioribus continentur, per guttur simul cum laxis: quæ in renibus sunt, vel vasa, per vrinā. Cōmunis autem in his indicatio est, \* reuulsio quædam ab omnibus partibus, ad quāmaximē distantia loca: denuano verō, ad vici-  
na. Quæcūq; itaq; huiusmodi curatē dispositiōes, causas salubres vocamus: sicut in salubres eas, quæ adaugent: & neutras, quæ neq; obfunt, neq; iuuāt. Pars igitur artis præseruatiua talis est.

De illa artis parte, quæ conualecentes reficit, & senibus congruit. Cap. xciv.

Quæ autem reficit atq; restaurat, in conualecentibus atq; senibus locū habet. Cæterum quæ nam horum fit dispositio, & a quibus præcipue causis ad naturalem habitū reducatur, in metho do medēdi explicauimus. Dispositio igitur talis est. Optimus quidē, sed exiguus est sanguis: atq; vni cum ipso spiritus animalis, vitalisq;. Ipse verō solide partes ficiore: atq; ob id, carum vires imbecilliores: proindeq; vniuersum corpus, frigidius. Causæ verō salubres quæ hanc emendant dispositionem, vt vno eas comprehendam capite, sunt quæcūq; præsentaneum tutiusq; exhibent alimentum. Particularim autem, in morbis moderatis, & cibis, potib;q;, ac somnis consistunt. Sunt porro materiæ motus, vehicula, ambulatio nes, frictioes, & balneæ. Vbi igitur non parum

se ex his profecisse senserint, paulatim se ad consueta opera transferant. Cubos autem assument, in principio quidem, humidos, concoctiq; faciles, neq; frigidos: in processu, verō, eos qui plurimū alimētū iappedit. At potus eis opportunus est, vinū, etate quidē moderatē p̄uectū, substantiā aut purū, pellucidūq;: quod scilicet vel substatum, vel album existat, atq; suauiter olēs: gustui verō neq; æquum omnino, neq; aliquam qualitatem insignem aut dulcedinem, aut acritudinem, aut amarorem, aut deniq; astringentem referens.

## GALENI PERGAMENI de medendi methodo, lib. I.



Nter alias causas quæ ad cōdenda medēdi methodo me hactenus dehortantur sunt, charisime Hiero, hæc fuit vna & præcipua: q; scilicet me scripturum nmerē, quum nemo propēdixerim hac nostra frate, veritatis inquisitionis sit deditus: sed pecuniam, & ciuilem potentiam, & in explebiles voluptatum delicias, omnes cōvlg inspicant, vt si quis sapiētiæ quodvis studium sectetur, pro infano hunc habeant: quippe qui primam ipsam, & verē sapientiam, quæ diuinam humanarūq; rerum est scientia, ne esse qui dem omnino existimēt: ac proinde inter eos cen seatur optimus, non qui plurimis instrumentis musicis, aut etiam sermone vti philosophico norit, sed qui multos, eosq; maximos calices exicari. Eodē sit, vt quum ægrotare si cōperint, medicos ad vocent lo complerentque, non quidem optimos, sed eos qui adulter ipsi: quiq; & frigidam dabant, si hanc poposcerint: & lauant, quum iusserint: & niuem, vinūq; porrigent: ac breuiter, quicquid iubebitur, mancipiorū ritu facient: cōtrā quā veteres illi medici ab Aesculapio oriundi, qui velui duces militibus, & reges subditis, imperare semper egis voluerūt: nequaquam vērō emptinorum Gerarum more, parere & obsecundare: id quod facere Romæ erat solus impudentissimus Thersalus, eo enī temeritatis p̄gressus, vt sex tantum mensium curriculo, traditum se totam artem medicæ profiteretur, citra vllam aliarū disciplinarum institutionē. Quamobrem ipsius facilitate allecēti, siutores, textores, fabrig, ferulibus opificus relictis, cæternatum hodie sese sub eo p̄ceptor et ad professionem sacratissimam conferunt, in perniciem humani generis. At verō minimē licere alicui curare cōmodē morbos, nisi prius naturā corporis vniuersi p̄spexerit, apud omnes sapienter professores est in confesso. Totius autem naturæ constitutionem, accuratissimē exposuit nobis Hippocrates. Quē quidem Peripatetici atq; Stoici sequuti, vniūq; facit hoc illius dogma recipiūt, nempe, vniuersum corpus conspirabile & confluxile existere, omnesq; animales particulas a se inuicem afficiēdis dent tamen in eo, quod Aristoteles quidem, qualitates tantū ita se mutuo transire, atq; omnino misceri: Stoici verō, non has modō, sed etiā substantias ipsas existunt. Cæterum medicinæ fuerit ab vndē, si cōcedatur ea quæ ab vtrūq; sunt demonstrata: necnon quodd qualitates virtutūq; in mistis, totæ sunt totis permixtæ. Hac autem ha-

Tōpōis su-  
per Galenū de-  
plorat.

Sapientia q̄ ē  
vniuersū huma-  
narūq; rerū  
scientia.

Medici veteres  
imperabant a-  
tri velui do-  
ces militibus.

Thersalus p̄b-  
cebat vtrūq; du-  
tam q; arti  
modum curac-  
le mistum fex.

Curatio mor-  
bis necessaria  
est corpori na-  
tura congrua.

Corpus vniuersum  
conspirabile & confluxile.

Mistum quan-  
titate et facul-  
tate, sunt tota  
per tota mista.

mani

Præseruatiua  
sensuū differt  
ita triplex.

Alteratio humo-  
rū a quib; fiat.

Euacuatiō  
modis multi-  
plex.

Reuulsio fit ad  
quāmaximē di-  
stantia loca.  
Denuatio fit  
ad vicina.

Conualecenti-  
um finisq; di-  
ffinitio qualis.

Conualecenti-  
um finisq; di-  
ffinitio ratio.



*Theſſalus con-  
ſiderat doct-  
tationem ſimplicem  
et morbum no-  
n uniuersum.*

*Differentia ſpe-  
cialis  
animalis differ-  
entia propria.*

*Don animal  
rationale immo-  
rtales deſcribitur  
quibus.*

*Efficiens cuius-  
que rei eſſe  
principium  
a quo oritur  
eſt ad eandem  
cauſam in qua  
uolunt.*

*Inſtrumenta in  
rationem duco-  
runtur ex  
ratione et ex  
cauſa.*

*Methodo in qua  
res, quæ ſit.*

*Experimenta a-  
nimalium, vni-  
uerſa forma de-  
tata ſanctorum  
deſcribat.*

mani corporis cōtemplatione poſſibilia, nulla-  
que vſus demōſtratione, ille ſapientiſſimus Theſſa-  
lus, duos tantum eſſe morbos ſimplices tradit  
in vniuerſum, nēpe fluxū & clauſum: ex quibus ſi  
mal coeuntibus, gignit tertium vni cōpoſitum: nō  
intelligēſe ſe differentiā quā dū morborū, nō nu-  
merū, in mediū adſerre. Atqui minimē conuenit,  
quū de animalū numero quaeritur, vni differēti-  
arū oppoſitionē proſtere: alioquin duo ſic vni  
uerſa animalia erūt: vt, gratia exēpli, rationale &  
irrationalē. Proinde ad ſpecies quæ in ſubſtantiā,  
nō quæ in differētiā verſantur, reſpicere oportet  
eum, qui numerū morborū ſit traditurus. Porro  
nō omnis differētiā generi addita, ad ſpeciei con-  
ſtitutionē cōducit aliquid: ſed quæ ex generis, p-  
pria diuiſione naſcitur. Hæ ſiquidem differētiæ  
ſunt, quæ ſpecies cōſtituunt reliquæ oēs, alienæ.  
Etenim, p-rius animalis differētiæ exiſtūt, mortale  
& immortalē, rationale & irrationalē, manſuetū  
& ferū: aliæ quæ ſunt in genere. Molle verō ac durū, graue  
& leue, rarū & denſum, magnū & parū, anima-  
lis differētiæ nō ſunt, ſed ſubſtantiæ. Itaque etiā ſi cū  
animali vel molle vel durū cōponas, ad ſpeciem  
cōſtituendam nihil ſanē cōtulerit. Sin vel ratio-  
nale & immortalē, vel rationale & mortale, ani-  
mali adieceris, efficiatur iam illic Deus, hic homo.  
Ita verō & ſi rationali animali duas illas differēti-  
as peculiares ad idens, quæ ſunt, greſſile & bi-  
pes, ſic quæ hominis ſpeciem effecerit. Vnde ſic  
nō poteſt, vt vilius rei ſpecificas differētiās in-  
veniat quis, niſi prius ſubſtantiā illius aut de-  
ſcribat, aut oratione circumſcribat accuratē.  
Si quis igitur tradere de morborum numero in-  
ſtituat, is nō debet ſtatim in prima differētiā ſub-  
ſiſtere, ſed diuiſa illa procedere, donec ad aliquā  
inſimam ſpeciem, & quæ in aliam diſtahi am-  
plius non poſſit, perveniat: id quod facere illi i-  
dem eſt promptum, qui in diuidēdi arte magno-  
perit fuerit exercitatus. Peccatur etiam vel grauiſ-  
ſimē Theſſalus, quid nē principium quidem in-  
demōſtrabile, ac per ſe notum attigerit, illius rei  
quam petraſtictam ſuſcepit. Principium autem  
intelligo, quæſitū vniuſcuſque rei propriū eſſen-  
tiam: a qua neceſſario eſt ordiendum, quū ad in-  
ventionem ſpecierum & differētiarum, tum vel  
maximē (vt ait Plato) ad diuiſionem, atque ad om-  
nem cauſam rei abſolutam inqueſitionem. Sed  
nec ratione, nec experientia, ad ſulcendam ſua do-  
gmata vſus vnquam eſt Theſſalus: quæ quidem  
duo inſtrumenta, ſis quæ optimē in venia huerint, ſo-  
apud homines ſolent ſemper patrocinari. Ceterū  
in his cōmentariis animus nobis eſt agere,  
nō de experientia quæ ratione nō vtiuntur, ſed de iis  
praſidiis, quæ methodo & ratione inveniuntur.  
Etenim methodo quippiā inquirere, invenireque,  
ex adverſo opponitur ei, quod eſt fortuito & tē-  
rē. Eſt ſiquidem illud, cum via quadam & ordi-  
ne, quippiam inveſtigare. Experientia autē ame-  
rithodos, non artem, aut ordinem certum, ſed ran-  
dum fortunę vniuſi fauorem, ad rei inventionem  
deſiderat. Qua quidem proſas neglecta, nos de  
monſtrationibus inſtituimus, quæ a principiis inde-  
monſtrabilibus, & per ſe notis, intellectuque obſe-  
ctus, nunquam non proficiuntur. Nam quod in-  
tellectus ſe vno occuſu nō exhibet, id protinus

controverſum exiſtit, demōſtrationemque deſi-  
derat: nec artem illam a tali principio inceſſibile con-  
venit. Quādoquidem igitur morbi curationem  
invenire eſt propoſitum, haud dubiū neceſſe eſt,  
prius morborum numerū ſciri. At quoniam ſci-  
ri nequit, vt aut differētiās generis vilius mor-  
bi, aut ſpecies in venias, ipſo quod dū dicitur non  
planē explorato: oportet proſectō nunc, etiam  
quid morbus ſit, enarrare, quō ſic diuiſionem  
cuſurrit adeamus. Id verō fiet cōmodo, nobis  
cōmuni notionē auſpicatis, ſine qua invenire p-  
poſitæ rei ſubſtantiā non licet. Vt igitur vbi ci-  
tra offenſam omniū partiū actiones obcunt, ho-  
mines valere ſe dicunt: ſic dum naturalium cor-  
poris actionū ſenſerint quāmpiam vel malē ge-  
ri, vel proſus non geri, & ægrotare ſe illa corpo-  
ris parte exiſtunt, cuius actionem obſcūram vi-  
dent, & medicum de remedio conſulunt. At ra-  
tles ſunt vniuerſis hominibus notionēs & ſanita-  
tis, & morbi. Ergo accepto illo, quod omnes cō-  
ſtituntur, principio, nēpe id in medendi metho-  
do propoſitū eſſe, vt ægra corpora in ſanitate re-  
ſtituantur, hoc eſt, naturalēs partiū actiones, ſi  
quæ obſcūre ſint, emendemus: claritatis grata oc-  
culum proponamus, huius nimirum particulæ  
opus eſſe vt videat, inter omnes homines conve-  
nit. Nec verō reſert, partēne, an particulā, quā-  
piam oculum dicat. Siquidē quicquid totū com-  
plet, atque integrat, id, corporis totius, quod com-  
plet, particula ſua pars nominat. Eſt namque pars  
ex iis quæ dicuntur ad aliquid. Quippe pars to-  
tius integritate pars dicitur: æque proſectō vt to-  
tum integrimus, per relationem ad partes & par-  
ticulas ſuas nominatur. Ceterū ad ætū, nō nō  
minum differētiā, in omni cōmentatione prin-  
cipium ſumendum eſt. Eſt itaque viſio, oculorum  
actio: quemadmodum locutio, linguae inceſſus aut  
tem, curū. Ipſa rursus actio, motus eſt actus.  
At motus eſt prioris habitus immutatio. Qui  
quidem actus dicitur, quum ſe ex iur: paſſivus  
verō, quum ab alio poſito extrinſecus, excitatur.  
At verō immutatio prioris habitus dupliciter ſi-  
nēpe aut in qualitate, aut in loco. Ceterum quæ  
circa locum verſatur, latius dicitur: alteratio au-  
tem, quæ in qualitate conſiſtit. Porro inſtrumen-  
tum appello eam animalis partem, quæ perfectē  
ædere actionem poteſt. Quæ ſignificatione ocu-  
lus pars animalis, & particula, & inſtrumentum  
vocabitur. Cornea verō tunica, particula qui-  
dem & pars: at inſtrumentum nō item. Simili mo-  
do & quæ rhagoides, & quæ arachnoides, & quæ  
amphiblethroides dicuntur: quarum nimirum  
ſingulæ, primum quidem ac maximē, oculi parti-  
culæ ſunt: & quæ ſi etiam faciæ pars eſt, indē-  
m & illæ faciæ ſunt partes, ſed ſecundaria ratione.  
At verō ſimilarem partem appellant, quæ vnde  
que in particulas ſimiles diuidi poteſt: veluti vi-  
treus humor, & cryſtallinus, & tunicarum p-  
pria cuiusque ſubſtantiā. Eſt itaque inſtrumentum  
oculus, actio verō viſio: vna ex eius particulis ſi-  
milantibus, ac primum inſtrumentum viſionis,  
cryſtallinus humor. Id nāq; eſt, quod alterari de-  
bet ab aliquo extrinſecus occurrentiū colorum,  
vt animal videat. Alterari verō nō potuit, niſi pu-  
rum omnino, perſpicuumque eſſet. At purum ita,

*Notia cōmuniſ.  
Valere ex æro-  
tate quādo ſi  
dicitur homines.*

*Pars quid dicitur  
totū.*

*Viſio eſt oculorū  
actio, actio quid.*

*Notia duplex.  
Immutatio do-  
plex.*

*Latius.  
Alteratio.  
Inſtrumentum  
quid.*

*Oculi tunica.*

*Similari parti  
tota quæ dicitur.*

*Cryſtallinus ha-  
mor primum in-  
ſtrumentum vi-  
ſionis.*

pellucidumque esse non posset, sine eo quod nunc  
obinet reperimento. Quippe ostensum est, vni-  
quantum rem talem esse, qualis est propter calidi,  
frigidi, humiditatis & sicca temperaturam. Ideo si qd  
horum magnopere immutari sit, aut plane non vi-  
debit, aut male videbit animal. Vbi igitur neutrum  
videtur oculum certum, qui tamen probe ante  
cecebat, subito nos accingimus ad ipsius la-  
sionis causam in vestigandam, quomodo sine causa ni-  
hil in natura rerum contingat. Causa inven-  
cessario fatendum est, aut morbum ipsum eam esse:  
aut, si morbus laesionis existat, affectum qui  
huic officit, morbi causam existere. Dubitauerit  
tamen aliquis, ipsumne oculi affectum, a quo cer-  
nendi actio vitiat, dicere morbum debeamus:  
an ipsam actionis vitium. Quodcumque tamen ele-  
geris, necessarium est ut de sanitate morbus, & qui-  
dem multo ante, contraria: nepe eam esse vel in-  
collem oculi actione: vel affectum, qui visio-  
nem absoluit. Sanitas quippe & morbus, maxi-  
me contraria quae sunt, sub eo dem genere continen-  
tur. Contraria siquidem sunt, quae in eodem gene-  
re possint, plurimum inter se disident: veluti album  
& nigrum, quorum vnum est genus, color. Ergo si  
sanitas actio est, quae secundum naturam se habet:  
omnino morbus, actio praeter naturam erit. Sin  
autem affectu quaequam, aut constitutio naturaliter  
se habet, existerit sanitas: & morbus affectio, con-  
stitutiove praeter naturam, necessario fuerit. Verum  
quum duo rerum genera sint, nusquam inter se si-  
milium, sed tota differentium natura: quorum al-  
terum quidem, corpus, certo modo affectum, vo-  
catur: alterum vero, functio: fatendum proculdubio  
est, affectum ipsum corporis causam esse: functio-  
nem vero, id quod ab affectu ipso proficiscitur.  
Comitatur quippe necessario affectui naturaliter  
se habent, naturalis actio. Contra, si a natura re-  
cesserit, actio statim praeter naturam se habebit. Atque  
hoc ipsum est veluti elementum primum totius  
medendi methodi, quomodo nihil aliud sit qd curatur a  
medicis, quam ipsius affectus corporis. Contin-  
get tamen non ex nominibus, sed rerum recta opinio-  
ne, recta morborum curatio. Ut autem omnia me-  
thodo compendiosa explicemus, quatuor in vni-  
uerfum res sunt, quae in praesentem contemplationem  
proxime inter se colligunt. Ac videtur sane ex his  
esse vnum genus ipsorum corporum: alterum vero,  
actionum ac corporum quidem genus praecedere  
actiones, easque gignere has vero sequi: idque, cor-  
pora se naturaliter habent, in culpabiles, natura-  
lesque: sin praeter naturam sint affecta, aut nullas  
prae, aut omnino certe impeditas. Tertium praeter  
haec genus est causarum, quae hos affectus creant. Na  
quis ratione habet affectus ad actionem, hanc alte-  
rum quippiam ad ipsum affectum omnino habere  
oportet. Illud dixat exarisi, quod affectus vni a  
actione constituitur nec potest visum aut per actionem  
esse, sine corporis naturalis affectu: aut vitio, ni-  
si quomodo corpus sit vitio affectu. Ipsi autem affectus,  
quod actionem impedit, causas possunt & adesse, & ab-  
esse. Ab hoc quatuor aliud genus est eorum, quod quum  
corporibus & naturaliter se praeter naturam se habent  
infirmis, actioni nec commodant, neque incommo-  
dant: vt, exempli gratia, color niger, ob diuturnum  
in sole moram contractus. Affectum igitur corpo-

ris praeter naturam se habentis, qui actionem ali-  
quam vitiat, morbum (si placet) vocemus. Ipsum  
vero functionis vitium, in signum quoddam mor-  
bi symptoma. Quae alia ratione accidunt, cum co-  
lores, ea symptomata erant, sed familiaria, propria  
posuit quilibet vocare. At quum ab his genus  
sit insalubrium siue morbificarum causarum. Qua-  
rum eas quidem, quae in ipso corpore animalis con-  
sistunt, internas siue antecessores: quae vero extrin-  
secus accidunt, externas aut procatarticas appella-  
bimus. Ut autem haec exemplo clarescant, plene  
gignem esse pedis morbum constitutum: ipsum  
autem ingressum, esse insigne ipsius morbi sym-  
ptoma. At rubor, tensio, renixus, & tumor praeter  
naturam, diuersa quaedam symptomata nomen-  
tur. Porro sanguinis reductum, phlegmonis  
causa interna dicitur. Si veti externa, quae praeces-  
sit ab undantia ciborum. Ceterum nullus affectus  
dici morbus meretur, nisi alicuius partis actionem  
vitet. Quod autem postulat curatio, aliud plane  
non est, quam affectus qui vitiat actionem. Etenim  
quod primum, maximeque omnium desideramus, id  
naturalis est actio. Vt igitur totum particulam actio-  
nis tantum gratia requimus, eodem (arbitror)  
modo & ipsius partis naturalis constitutione, et-  
iam actionis grana desideramus. Porro quod con-  
stitutionem ipsam vnde actio nascitur, necessarium  
sequuntur, sane quidem nobis, accidentia: aggra-  
tibus, symptomata non cupiunt. Atque haec qua-  
tuor genera sunt omnium, quae in nostro corpo-  
re habentur, siue secundum naturam nos, siue praeter  
naturam habeamus: actiones, constitutiones, quae  
has praecedunt, quaeque etiam sequuntur.

## GALENI PERGAMENI de medendi methodo, lib. II.

ERGO affectus qui actionem vitiat, morbus  
vocetur. Hunc, si quis sequatur, symptoma.  
Quod illud excitat, causa. Haec ita diuinitus,  
inspicienda diligenter est nominum diuersitas, quae  
aggritudinis imposuerunt ipsorum primum au-  
res. Partim namque a laesa particula fuerunt indita,  
vt pleuritis, id est, punctio lateris. Peripneumonia,  
id est, pulmonis phlegmone. Ischia, id est, co-  
xendicum morbus. Podagra, id est, pedum vitium.  
Nephritis, id est, renum affectus. Arthritis, id est,  
articularum viuum. Ophthalmia, id est, oculorum  
phlegmone. Cephalalgia, id est, capitis dolor.  
Dysenteria, id est, intestinorum tormina. Subinde  
ab ipso symptomate, vt ilcos, hoc est, voluulus.  
Tineus, id est, desiderium assiduum cupiditas. Spa-  
smos, id est, convulsio. Palpos, id est, palpitatio.  
Tromos, id est, tremor. Paralyticus, id est, resolutio  
neruorum. Apepsia, id est, cruditas. Dyspnœa, id  
est, difficultas respiratio, vel inordinata respiratio.  
Apnœa, id est, spirandi defectus. Agrypnia, id est,  
vigilia. Paraphrosis, id est, delirium. Coma, id est,  
sopor. Sæpe ab ambobus simul, vt, Cephalalgia,  
hoc est, capitis dolor. Otagia, hoc est, dolor au-  
rium. Cardialgia, id est, oris ventriculi: quod veteres  
appellabat cor) dolor. Odontalgia, id est, dentium  
dolor. Hystralgia, id est, vteri dolor. Spemumero-  
a a causa putata, vt Melancholia. Nonnunquam a simi-  
litudine ad aliqd extra posita, vt Elephas, Gæcer,  
Polypus, Sraphyle, id est, yua. Leuce, id est, vitio-  
so alba.

Morbus est, si  
quod praeter na-  
turam, siue  
vitiatur, siue  
symptoma di-  
plicet.

Causa morbi  
ca, Constatum des-  
ferma.

Accidit et  
symptoma  
quomodo d. for-  
rant, Rarum quae in  
nostro corpore  
habentur quae-  
tuor.

Morbus  
Symptoma  
Causa.

Morborum no-  
mina indita a  
laesa particula.

Morborum no-  
mina sumpta  
ab ipso sympto-  
mate.

Morborum no-  
mina tralla a  
partis affectu  
et symptomate.  
Morborum no-  
mina sumpta a  
causa putata,  
vel ab aliquo  
simili.

Nihil sine cau-  
sa contingit.

Sanitatem &  
morbum sub eo-  
dem genere con-  
tineri, Contraria quae  
dicuntur.

Affectus corpo-  
ris esset fun-  
ctio causa.

go alba. Myrmecia, id est, formica. Atheroma, id est, tuber, cui puliculae quid simile inest. Staphylo-  
ma, id est, oculi morbus, cum in summa tunica  
quoddam acino simile eminet. Meliceris, hoc est,  
capitis vlcera, sanie instar mellis fundentia. An-  
thrax, id est, carbo. Alopecia, id est, arex in capi-  
te. Ophiasia, id est, vitium serpentis formam re-  
presentans. Sycolis, id est, ficus. Saryrasmi &  
priapismi, pendens erectiones prae naturam.  
Ipsorum verò morborum, qui neque locum affec-  
tum nominere praesentant, nec causam quae eos  
efficit, per pauca sunt nomina, phlegmone, gan-  
græna, scirrhus, erysipelas, apostema, oedema,  
emphyema, vlcus, exanthema, catagma, spasma,  
rhegma. Coloboma, id est, mutilatio. Dothium,  
id est, furunculus. Ionthos, id est, varus. Phyma,  
laxum partium phlegmone. Quamquam horum  
quorum nonnulla, partium locum corporis, siue  
particulam afflictam, subindicare videntur,  
partium à prægrauante symptomate nominari.  
Porro vlcera (quod vnitatis solutio est in carno-  
sa parte) differuntur particulares partium ab us  
qui primum eas sanauerunt, dicuntur: partium ab  
ipsis qui iidem affecti sunt, ut telephium. Can-  
cer autem, à similitudine ad animantem. Phage-  
dæna herpès, à symptomate. Verum phagedæna  
quidem, vlcus depascens est. Herpes autem non  
semper existit vlcus. At quonescumque cum exul-  
ceratione invadit, ritu serpentis bestiae, ad vici-  
nas partes progreditur, easque depascit & popula-  
tur. Cauum verò vlcus, & fordidum, & cruentum,  
& purum, & æquale, & carne extrescens, hæc ma-  
gis proprias appellationes sortiuntur, non tam-  
en similiter omnes. Nam quæquale, cauum, &  
supercrescens, à propria differentia: at cruentum  
& purum, & fordidum, non à propriis differen-  
tiis, sed ab externis symptomatis appellantur.  
Tres igitur esse in corpore affectus præter natu-  
ram, ostensum iam est: causas videlicet, morbos  
atque symptomata. Causas, vel uti edvidentiam  
& corruptelam. Morbos, ut phlegmonem, vlcus.  
Symptomata, ut prauum colorem atque gracilitatem.  
Diversa ab his sunt quæ immodicè exacer-  
nantur à corpore, aut retinentur præter naturam,  
& functionum vitia: omnia scilicet cõmuni nomi-  
ne appellata symptomata, ceterum notum vni gene-  
ri subdita. Quippe affectus quidam corporis est  
vitiatus color. Quod externum autem, aut retine-  
tur, affectus non est, sed à affectum sequitur. Si-  
militer actio vel læsa, vel integra, affectus sanè  
non est: particula autem unde editur, necessitati  
comitatur affectum. Ac ordema quidem & phleg-  
mone, ex his sunt, quæ absolute dicuntur esse.  
Eodem modo & redvndantia, si ea sit sangui-  
nis, & corporis pallor. Actio verò ex eorum nu-  
mero non est, quæ esse absolute dicuntur, aut cer-  
te non similiter sicut iam comprehensa. Siquidem  
nullo temporis spacio eius partes manent, sicut  
nec sermone, nec vilius motus: sed horum qui-  
libet in generatione consistit. Cilm verò duplex  
sit ipsius morionis genus, vnum in loco, aliud in  
qualitate: prius lato, secundum alteratio dicitur.  
Ac omnis quidem actio, motus est actusque: om-  
nis alteratio, eius quod alteratur, motus est pas-

sinus: patitur namque quod alteratur. Ergo affectus  
dum alterantur, moventur: vbi verò à motu cessa-  
uerint, iam alterati sunt, non autem amplius alte-  
rantur. Quicquid enim quocumque modo se habet,  
aliquo omnino affectu est præditum. Quod autem  
in constanti, ægrègè solubilis affectu est, id habet  
iam quoddam affectum est. Sanè alteratur is qui  
nigrescit: alteratur est, qui obnigrat. Itaque altera-  
tio, generatio est qualitas. Nam quæ absolute  
dicitur generatio, ad substantiam ipsam quædam est  
& progressus. Aliqua igitur in generatione, alte-  
ratione, & ut semel dicam, motu, suam essentiam  
obtinere aliqua permanentè habent substantiam.  
At sanitas quidem & morbus, & quæcumque  
symptomatum causarumque affectus vel habitus  
sunt, ex permanentium numero existunt. Actio-  
nes autem omnes alterationis, circa rem quam-  
libet in generatione propriam essentiam sortiuntur.  
Porro corpus ipsum, secundum quodcumque  
moventur, secundum idem patitur: motusque eius  
pathos, siue passio, est. Etenim prisci, motus om-  
nes, etiam si naturales existant, nisi actus sint, pa-  
thos, hoc est, passiones nominant: sicuti actus  
motus, actiones. Nos autem contrarium sanitati  
affectum, à quo lædi functionem diximus, tantum  
morbum vocamus, siue diutius hie sit, siue bre-  
uis, siue momento dnet. Ex reliquis à affectibus  
partium naturæ, eos qui hunc præcedunt, causasque  
ratione obtineat, causas tantum dicimus, non pa-  
thos. Qui illum sequitur, si actioni offensæ sint,  
& symptomata, & pathos. Eodem modo, & im-  
modicas vel inanitiones vel retentiones. Qui ve-  
rò affectus sunt, vel uti vitiosus color, supra af-  
fectionis & symptomatis appellationem, etiam  
affectus, vel affectiones vocamus: ita nimirum  
sunt. Omnium igitur horum cõmune id est, quod  
præter naturam sunt. Proprii autem morbi quidem  
est, quod actioni incommodat: symptomata, quæ  
morlum sequuntur: causa denique, quod præcedat.  
At verò medicorum proprium est munus, ut mor-  
bos adstant: quibus sanè sublatis, non modo à-  
ctionis vitium evanescit statim, sed reliqua etiam  
omnia symptomata. Quisquis igitur ex his quæ  
particulares naturaliter insunt, tum eas quæ alter  
accidunt, tum proprias functionis causas distin-  
guere nescit, qui obsecro fieri potest, ut in dispo-  
sitionem inveniatur, à qua primum læditur functio?  
Etenim quæ fortuito corporibus accidunt, etiam  
si similes sint alterata, nocere actioni non pos-  
sunt, quandiu à quibus fiebat, omnia naturæ sua  
servauerint. Horum verò si vel vnum quodvis al-  
teratum fuerit, actione quod ipsam statim in tan-  
tum lædi est necesse, in quantum ab eo est, cum se-  
cundum naturam se haberet, adiuta. Fieri autem  
non potest, ut omnium morborum numerum me-  
thodo is comprehendat, qui numerum omnium  
actionis causarum, corpore secundum naturam  
se habente, non norit. Qui autem omnem mor-  
borum numerum methodo non inveniatur, hic  
maximè laborat oportet in ipsis medendi auspi-  
ciis: cum cõstitit tot esse medendi rationes, quot  
morborum idæ existunt. Verum enim vero pri-  
mus omnium ille affectus in vestigandus est, qui  
dicitur functionis effectrix causa. Functionis cau-  
sas nos diximus esse calidi, frigidi, humidæ & sa-

Habitu quid  
afflictum docet.  
Alteratio quid.  
Generatio est ad  
substantiam  
progressum.

Pathos.

Causa sympto-  
mata.

Medici munus.

Medici tot esse  
rationes, quot  
morborum idæ  
existunt. Functio cau-  
sa.

Nn

Vlcus quid.

Vitium vari-  
natum.  
Phagedæna  
quid.  
Herpes duplex.

Affectus præter  
naturam sunt  
tri: morbos,  
causa ex sym-  
ptomata.

Affectus qui non  
docet esse ab-  
solutum.

Motus duplex.

Affectus quid.  
Alteratio quid.



*Doctrinam em-  
pericā logicā  
non esse con-  
tra doctrinā  
sed jux-  
ta doctrinā  
Solentem  
autem  
speciat.*

nec sola ratio. Verū cōfūfam militāntem tradendā  
esse doctrinā nō censuimus: sed seorsum empiri-  
cam, & seorsum logicā: quod facile appareat, quā  
vtriusque eārum vim habeat. Igitur vnitatis solutio  
(quæ in ossē quidē fractura, in carnosa autē par-  
te vlcus dicitur) vniōnē postulat: quemadmodū  
dum & vlnus, & rupitio, & convulsio. E quibus  
vlnus quidē, solutio quidā ex vulnerando in  
carnosa parte relicta est: rupitio autē atq; convul-  
sio, citra vulneratiōē accidit: ac prior quidem, 10  
carnosæ partis diuisio existit: secunda autem, ner-  
uosa. Hæc itaq; omnibus vnitio molienda indica-  
tur: quæ an præstari vbiq; possit, an in multis nō  
possit, hoc vtriusq; internoscere, p̄nūm iam artificis  
est. Siquidem hoc ipsūm primū ars est opus, vt  
intelligas, sperarene id quod tendis debeas, an fecus.  
Eius rei duplex cognitio est, nec potest addi  
terna. Altera per experientiam, cui longo vsu est  
opus: altera per ipsius rei naturam. Hæc siquidē,  
tum cuiusque substantiam particulæ, tum actio- 20  
nem, tum vsum, firmiter agnoscit. A quibus pro-  
cedens, non solum quod sanari non potest, præ-  
videbit, sed etiam quod recipere sanitatem po-  
test, de inveniēdis ei remediis deliberabit. Con-  
stat autē quod si simplicissimis multiplicabitur. Por-  
ro nihil est simplicius vlcere, quod in summa car-  
nosa parte consistit. Huius ergo, si quidem vlcus  
tantum sit, vnius curationis scopus, vniō est. Si  
autem cum cauitate adsit, et duplex affec-  
tus: nempe vlcus, quod est vnitatis solutio: &  
cauitas, quæ ex amissa aliqua animalis propria  
substantia contrahita est. Ac, p̄inde duplex etiā pro-  
ponitur eius curationis scopus: nempe vt indu-  
catur cicatrix, & impleatur cauitas. Horum ta-  
men alterum sc̄pe fieri non potest: vtputa, cum  
non modo carnem, sed etiam illi subiectum os,  
pene cōtingit. Quippe impleri ad vnguem hu-  
iusmodi minime potest: cicatrice induci, facile  
potest. Invenitionis autem, vt aliarum rerum, sic  
remediorū omnium duo nobis sunt instrumen-  
ta: videlicet experientia & ratio. Ceterū qui lo-  
cia experientia vtrunq; cū videant, cui anisolo-  
chia vlcus carne nō impleuit, huic tunc conse-  
cre: cui autem tū nō contulit, ei rim admotam  
esse vniem audiunt nō omnes ab omnibus me-  
dicamentis similiter affici, ac prouide quamplu-  
rima eiusdem speciei medicamenta sarconia in  
vniū confundunt, quod nulli corporis naturæ de-  
sit, qd sit ex viu. Atq; huius quidem quā turpissimē  
hallucinantur. Primō quidem, nam solius com-  
positionis quæ ex simplicibus specie medicamen-  
tis constat, noui eius quæ ex contrariis inuitur,  
instituant methodum. Dein autem, quia in eius  
miscellæ multitudine, vniū fortasse medicamen-  
tum laboranti prodesse poterit: fortasse neque  
vnum quidem: contra vtrū septem aut octo ob-  
esse: ita vt pluribus numeris eiusmodi medica-  
men ob sit, quā proficiat. Ac proinde, quod qui-  
dem ad hanc rem pertinet, n̄ plura mihi ignora-  
re, quā vobis videntur. Etenim oleum cauo  
vlcen infusum, aduersissimum omnium medica-  
mentū est, ipsūmq; & sordidum, & fœtidum red-  
dit. Quod si tempus quoq; anni calidus sit, ac vi-  
tio mali fucci homo labore, ac sit natura obno-  
xius fluxionibus, aut in victus ratione delin-

quat, timendum est ne pars illi ea computrescat  
ex vsu olei, quæ fuerit exvicerata. Penculosius est  
etiam, & cera siue solus, siue in oleo soluta, vs-  
us. Hæc itaq; putrescere vlcus faciunt. At si æru-  
ginem, ad leuiorem tūsam, inspergas, ea quidem  
nullo modo putrefaciet, dolore tamen & mor-  
sum nō parum inferet: præterea excedet, ac phle-  
gmonem excitabit. Quod si largius vtare, etiam  
convulsionem accerter. Quoniam igitur neq; o-  
leum, neq; ærugo, neq; cera, cauum vlcus per se  
implere carni potest: cōstat quod ex his quæ expe-  
rientiā prouidentur, nemo vquam miscebit illa: id  
quod faciet rationalis iustrepide, videlicet haud  
ignarus, ex duobus temperamentis immo dicis,  
cōtrariisq; cōfici vnum modicū posse. Non est  
ergo difficile, ex oleo, cera, & æruginē, medica-  
mentū sarconicū, & moderatē siccum conficere:  
quale vlceri cauo est aptissimum, ceu qd medio-  
criter exsiccat postulat. Omnia igitur quæ præter  
naturā est cauitas, repleti possunt: quare & quæ  
in carnosa accidit parte. Ipsa verō repletio, inue-  
niendōrū remediōrū finis, quod tenditur, est. Ce-  
terū vt illa quæ impleri inuenias, & multa ra-  
tione est opus, & multiplici particulatim indica-  
tione, & methodo rationali exacta. Quæ quidē  
destrutum vulgus medicorū cū sit, etiam oculi  
lorum doloribus illa medicamenta adhibet, quæ  
ex opio, mandragora, & hyoscyamo parantur,  
maximam planē oculorū perniciem: vtputa quæ  
nulla re alia sublati ad præsens speciem doloris  
præstant, quā quod ipsūm sensum extinguunt.  
Nos verō, dolores oculorū grauissimos, aut bal-  
neo, aut vini ponone, aut somenitis, aut missio-  
ne sanguinis, aut demp purgatione sanauimus.  
Vt igitur ad caui vlcis curationē reuertar, in eo  
sanè proponitur nobis, vt quæ perit caro restitu-  
atur. Scire autem oportet, generandæ carnis  
materiam, sanguinem bonum existere: opificem  
verō atq; autorem, naturam illius, videlicet cor-  
pons, cui caro superinducenda debet. Porro natura  
cuiusque corporis, calidi, frigidi, humidī & siccī  
temperatura cōstat. Quare perspicuū est, iustum  
horum temperamentum in subiectis particulis,  
quibus deficient carnem suam restituatur, opi-  
ficis habere rationem. Ac primū quidem in omni  
cauo vlcere hæc duo consideranda veniunt:  
iustitiam sit temperie id quod subiectum est: nem-  
pe an secundum naturam se habeat (similium nam  
quippe corporum sanitas, iusta est quatuor qua-  
litarum temperies) & an sanguis qui inluit, bo-  
nus ac medicus existat. Nam si horum alteru-  
trum sit vitiosum, multi affectus præter naturam  
constiterint. Verū si & sana sit pars, & sangui-  
nis cōfluxus citra omne vitium: nihil obest quo-  
minus prima carnis generatio cōtingat prosperē,  
idq; nullus externi medicamenti ope. Ceterū  
quia in ipsa primæ carnis generatione duplex  
excrementū oritur, alterū quidem tenuius  
(quod in vlcere sanies dicitur) alterū verō cras-  
sius, quod nuncupatur sordes: atq; ex tenui quide-  
m, vlcus humidum redditur: ex crasso au-  
tem sordidum: duplicib; sanè medicamenta est  
opere: vtique vt humidum vlcus est, siccantibus:  
vt sordidum, quæ ipsūm expurgent. Ergo cū  
nullo vquam tempore natura cesset, certē nec

*Cera vsu cauo  
vlcen exstingit  
penculosius,  
ærruginem vit.*

*Temperamen-  
tum vni medi-  
cine confici ex  
immodico atq;  
cōtrariis possit.  
Sarconicū medi-  
camentū vlc-  
eri aptissimū  
cōfici ex oleo, ce-  
ra & æruginē.*

*Oculi pernici-  
sissima effugit  
medicamenta ex  
opio, mandrago-  
ra, & hyoscy-  
amo constanti.*

*Oculorum dolo-  
res quæz me-  
dendi ratione  
Galienus sanauit.  
Carnis generā-  
tio materia est  
primū sanguis:  
opifices ipsa na-  
tura.  
Natura cuiusque  
corpus primarum  
qualitatu scem  
per se constituit.*

*Sanitas simila-  
rium partiu est  
quatuor quali-  
tatu iusta tem-  
peries.*

*Instrumētū in-  
venitionis vtrius-  
q; esse duo,  
experientia & ra-  
tio rationem.*

*Empirici cetero  
doctriā in vni  
medicamentis cō-  
traria misce-  
re.*

*Oleum cauo vl-  
cere aduersissi-  
mū medicamen-  
tum est.*

tempus viliū erit, in quo nō ambo hæc in cauo  
vicerē colligantur. Quare nec tempus viliū erit,  
in quo nō vtrūque medicamentū genus, & siccia  
& expurgans, deſideretur. Sed nō ſat eſt in veniſ-  
ſe genus medicamenti, niſi etiā ſpeciem eius diſ-  
quiras. Cuius quidem inventio petenda eſt ex  
cōmentariis medicamentorū ſimplicium, vbi ni-  
mirum omnū medicaminū temperaturæ, gra-  
dus, & differentiæ tradidimus. Debet autē me-  
dicamentum producendæ carni cōueniens, ex uſe

*Sarcenicum me-  
dicamentum primo  
gradu debet de-  
tergere, & ſicca-  
re.*

*Sarcenica medi-  
camenta qua  
ſunt.*

*Thuris ſaculati-  
ta.*

*Naturaliter ſi  
habentia corpo-  
ra, ſibi ſimilia  
poſtulant: præ-  
ter naturā au-  
tem, contraria.*

*Vlcus propriæ  
eratio vnde  
proſciſciatur.*

*Genitura corru-  
ptæque quatuor  
ſunt cauſæ.*

*Vlcus ſimplex  
ſolum aggluti-  
nationem deſi-  
derat.*

ſiderat. Quippe ſi commiſſa ſimal ſint cuius oræ,  
nulla intercedet cuius diuerſi generis: quemad-  
modū in eo repleto, planūque reddito, in quo ſoli-  
cet oræ viceris ſe non conungunt, ſed totius vl-  
ceratæ partis cuticula amiſſa eſt: quæ vniq; prius  
reſtituere, ſi oræ iungantur, oportet. Quoniā igitur  
in ſimplici viceris ſola diuiſio, pponitur, ducta  
labra coniungi, coniunctūq; manere oportet. At  
verō ex ductis corporibus, alia quidem per ſe,  
alia aliorum ope coniuſcēta manent. Per ſe qui-  
dem, quæcūq; ſecum cōcreſcunt, coaleſcuntq;  
vt caro, & quæ ex carne conſtant. Alorū autem  
ope, tum quæ colligantur, tum quæ vinculo ali-  
quo cōtinentur: vt offa, & quæcūq; ſunt dura. Eſt  
autē, ſi vti in cauſis viceribus, vt, pducatur caro,  
ita in ſimplici vicerē, vt oræ ipſæ mutuō coale-  
ſcant, natura opifex cauſa: ita, vt ſi quæ deſident,  
in idem adamuſum componas, citra omniū reli-  
quarū extrinſecus molitionē coaleſcant. Quæ di-  
ducta ſunt, in idem adduces, aut vinculo ex duo-  
bus initis circumdactis, aut ſutura, aut fibulis im-  
poſitis: aut liorū quibuſdam, aut omnibus. Ex-  
pedit autē, quod circumciſit, nec molle nimium  
ſit, quō videlicet tuto cōtineat nec ruruſus ita du-  
rum, vt premendo offendat. Circūductio etiam  
ipſa, nec ita laxa ſit, vt nihil efficiat: nec ita vellemē-  
tis, vt dolorē premendo excitet. Hæc itaq; me-  
dendi ratio, quale diximus vlcus ſimplex coi-  
bit. At ſi quæ magnitudinē eius, vel ob interceden-  
tem ſaniem, vel ob dolorē, aut inſignem imbe-  
cillitatem particula, vel denique ob incluſum æ-  
rem, diſiunctæ partes exacte ad imū vſq; coniu-  
gi nequeſt, cuiuſmodi ſanē vlcus ex ſola partium  
commiſſione agglutinari omnino non poſſet.  
Quare medendū prius eſt illis impedimentis, ali-  
quo medicamento ſiccante: quod quidem ſi qua  
ſanies iam ſubſit, abſtinet eam: & ſi qua in va-  
cua loca inſluxura eſt, hæc prohibeat. Etenim  
medicamen glutinatoriū, aut omnino carnis ge-  
neratione nō eget, aut planē exigua: ac proinde  
plus ſiccet oportet, ſi quod carnē producit. Præ-  
terea, cum carnis productū medicamentū ſa-  
cultate extergendi opus habeat, quæ non modō  
redvndantiam humoris ſiccet, ſed etiam expur-  
get ſordes: glutinatorium certē nec deterget, nec  
expurgat, ſed contrā proriū ſubſtantiam omni-  
nem in idem cogit: cuiuſmodi ſacultatem habet  
medicamenta ea, quæ auſtera, & aſtringentia vo-  
cantur. Quocirca, vbi carnem gignendū ſtudemus,  
maximē cauendum eſt à medicamento aſtringē-  
te: vt pote quod ſordes viceribus arctius aſti-  
gat, quā vt facili poſſint elai. Vinū igitur omni-  
nis viceris, quatenus vlcus eſt, optimū medica-  
mentū exiſtit. Porro ipſa medendi methodus, præ-  
cedet nobis beſiſſimè, ſi de ſingulis ſimplicibus  
ſeorſum aliquid præceperimus: poſt verō, de cō-  
poſitis omnibus alteram aliquam methodū ex-  
plicariemus. Quam quidem ſi ingrediamur viſ-  
um, omne vlcus tum ſiccari, tum debere aſtringi in-  
veniemus, non tamen detergeri. Contrā, cau-  
ritatem in carne, ſiccari quidem poſtulare & ab-  
ſtergeri, miſuſmē autē aſtringi. Cæterū quæſtō cor-  
poris natura eſt humidior, tantō medicamentū  
minus ſiccantibus eget. Quæſtō autē ſiccior, tan-  
tō rariū quæ vellemētius ſiccet, magisq; aſtrin-  
gant,

*Diſtilla partes  
in vā quibus  
modo poſuit  
adduc.*

*Obſtinatorium  
medicamentum  
plur ſiccet, por-  
te ſpici quod  
carni producit.*

*Aſtringentia  
medicamenta  
cuſ ſuſpēſa, vbi  
carni produ-  
cere eſt auerſum.  
Vinū omne vlcus  
oportet me-  
dicamentū eſſe.*

*Vlcus corru-  
ptum ſuſ-  
pēſum aſtringi  
debet.  
Carni vbi eſt  
ſiccandum &  
abſtergendum.*



Vlcus in humi-  
diori natura  
minus fican-  
dam esse, in sic-  
ciori autem ut  
humidius.

Vlcus tum ca-  
nem tum ple-  
nem, quid po-  
ssit.

Cutem similem  
in qua parit, re-  
ficam non possit.

Cutis nigrescenda  
tamen.

Cicatricis indu-  
ctum medicam-  
entum quale  
ad esse debeat.

Cicatricis indu-  
ctum medicam-  
entum quod sit.

Excrefcentia  
carum in vlcere  
a vehementer  
ficcantibus me-  
dicamentis ex-  
datur.  
Naturæ opera  
quæ.  
Caru minus  
in medicamen-  
to.

Caru rursus  
in medicamen-  
to reddi minus  
acris si combu-  
ritur, minusq;  
aduræ, si ablu-  
ta fuerit.  
Naturæ opus  
in primis esse co-  
siderandum.

gant, desiderat. Iam verò vlceri medio criter ca-  
no, statim quicquid volumus applicamus; siue  
siccam id, siue humidum medicamen existat. At  
in valentibus quorum maior profunditas est, id  
nō licet. Etenim & cerussa & lithargyros ficcant,  
astringantq; modicè: ad vlcis tamen fundum  
vis eorum nō pervenit, nisi humori cuiuspiam mi-  
scatur. Porro quemadmodū cauum vlcus ut  
repleatur, carnis generationē (cuius materia san-  
guis est) postulat: sic plenū, ut perducatur ad ci-  
catricem, generationem cutis, quæ ex carne est,  
nō vñonem tantum, desiderat. Verum caro eadē  
specie cum ea quæ perit, gignit in cauo vice  
re potest. Cutis talis omnino, qualis erat quæ pe-  
nit, prorsus restitui non potest: sed simile quod-  
dam cuti, & quod eius officium suppleat, potest.  
Etenim cum cutis carne ipsa tum ficcior, tum  
densior sit, certè si resuscitamus & astringimus  
carnem, persimilem illam cui reddemus. Ceterū  
cum multo ficcius quod cicatricē inducat, quā  
quod agglutinet, esse oportet medicamentum.  
Quando quidem glutinatur, solum id propo-  
situm est, ut eius quod secū dum naturam est, red-  
dyndantiam consumat: qui autē cicatricem iodu-  
cat, nō hoc modō, verum etiā ut ei quod secun-  
dum naturā se habet, aliquid deradat. Galla igitur  
immatura hoc loco, & malicorium, & Argē-  
pizæ spinæ fructus, modicè ficcantia pharmaca  
sunt. Chalcitis, & az vitum, & zris squama, & mi-  
sy, multo his valentiora existunt: misy quidē &  
chalcitis, præcipue mitior autē zris squama: atq;  
est hoc mixtus res vitum, præsertim si ablatū fue-  
rit. Sed hoc quidē ad speculationē de cōponen-  
dis medicamentis pertinet, quæ medendi sequi  
methodum, quem admodū ipsam præcedit, sim-  
plicium pharmacorū notitia. Deinceps autē aga-  
mus de excrefcentia carnis in vlcere, quæ mor-  
bus in magnitudine existens, primō omnī sui  
ablationē indicat. At hæc, sola vehemētē fican-  
tium medicamentorū ope perficitur, liaud item  
naturæ opera: contrā ū in carne restituenda, aut  
glutinatione res habuit: hæc enim ipsius natu-  
ræ sunt opera, nec aliud medicamēta moliantur,  
quā submouere illa, quæ actioni eius obstant.  
Porro medicamenta carnē minuētia, proxima  
tum his sunt quæ valenter detergūt, tum iis quæ  
cicatricem inducunt. Ceterū misy & chalcitis, si  
humidæ naturæ applicētur, postea carnē exedēt,  
quā cicatricē inducant: nisi fortē in pollinem  
admodū tenuem redactis, parcissimè illis cuius-  
piam vitum. Nam sic impolita, partibus quic-  
quid cōsiliant. Quod si minuire quæ supercre-  
vere studemus, liberalius sunt imponēda. Aerugo  
autē, magis adhuc ū hæc, minuire carnē potest,  
ita ut genus eorū quæ cicatricē inducunt, prorsus  
egressa videat. Iam verò si exvras hæc omnia,  
ut minus acris, sic etiā ad cicatricē inducendam  
ipsa reddes aptiora. Si verò etiā laues, adhuc eva-  
dent minora. Hoc autē semper curantis animo  
hæreat, nō omni naturam eadē remedia requi-  
re: sed infirmiores, molliorēq; mitiora: vali-  
diores ficiorēq; valētoria. Quare natura ægri  
in primis veni consideranda. Cū autē cuiusq;  
naturæ proprietas ineffabilis sit, nec exactissima  
sacuna cōprehensibilis, ac præterea cuiusq; ho-

minis propria curatio habeat, is erit optimus cu-  
iusq; particularis ægritudinis medicus, qui iam  
eam methodum cōparavit, ex qua & dignoscere  
naturas possit, & cōsuetura cōsequi, quæ sunt cu-  
iusq; propria remedia. Verū legitimi vlceraorū  
partū temperamenta, quoties eas vel carne im-  
plere, vel glutinare, vel cicatricē inducere studes,  
maior tibi sollicitudo erit. Nam si ipsa exvlerata  
caro calidior sit, aut frigidior æquo, utiq; mede-  
lam exigit, quæ nō modō moderatē ficeat, sed e-  
tiam in tantū calasciat, refrigerare, in quantum  
subiecta caro à naturali suo recessit habitū: cū  
fieri nō possit, ut in vlcere vel carnis productio,  
vel sinus impletio, vel agglutinatio, vel cicatri-  
cis inductio, rectè vñquā cedat, nisi subiecta ca-  
ro pro naturali modo se habeat. Ut igitur simile  
gmone vñ cum vlcere vigeret, priusquā hæc ef-  
ficer discussa, nemo id vel carne implere, vel glutina-  
re, vel inducere cicatricē tentaret: ad eundem  
(arbitror) modū, et si sine phlegmone sola in-  
temperies subit, nullū horū fore prius sperabi-  
mus, ū illa fuerit sanata. Cauenda tamen sunt in-  
temerim medicorū cum calascientia, tum etiā refri-  
gerantia. Ergo hyocyamū, mandragorā & cicu-  
tam, seu supra modū refrigerantes herbas vita-  
bis: tamen siccat ex quoq; quantum sit vlcis ex  
vsa. Resina verò & pix, & alphasura, quāq;  
modicè ficcant, immodicè tamen sunt calida: ideoq;  
eis solus vter nemo, nec alter, nisi admittis cū  
leniter refrigerantibus, vñ ex omnibus medica-  
men fecerit, qd sit temperatū. Inspecunda quoq;  
est & acris nos circūdantis temperies. Siquidem  
velut medicamentū quoddam is etiā corporib;  
nostris foris secus incidens, vbi immodicus ca-  
lore, vel frigore est, sanationē morat. Danda igitur  
opera est, ut medicamēta eius excessui occurrant.  
Ideoq; Hippocrates in calidiorib; aneu tem-  
poribus, iis quibus frigidior facultas sit, medica-  
mentis vitur, calidioribus per frigidiora. Iam ve-  
rō quem admodū humidior natura, humidiora,  
ficior ficiora medicamenta exigebat: ita nūc,  
calidior calidiora, frigidior frigidiora requirit:  
contrariā scilicet semper iis, quæ præter naturā,  
& quæ secundū naturā sunt, indicationē præstan-  
tibus. Quippe quæ secundū naturā sunt, similiū  
sibi indicantur sunt: quæ præter naturā, cōtrario-  
rum: si modō illa seruari, hæc submoueri est ne-  
cesse. Quod verò ad cōtrarias indicationes per-  
tinet, si quantum ægri temperamentū iusto est hu-  
midius, tantō particula iusto sit ficcior, tale adhi-  
bendū est pharmacū, quale si vlcus in mediq;  
temperamenti particula, corporis medio criter tem-  
perati cōsisteret, adhiberemus. Sin autē particu-  
la fuerit ficior iusto, q; corporis temperamentū  
sit æquo humidius: vñq; in tantū intendi ficitatem  
medicamēti cōveniet, quantum particule tem-  
peramenti, totius temperamentū excedit. Velut  
si exvlerata pars, quānor numeris sit ficcior  
medio temperamēto: ægri autē natura gradibus  
tribus humidior: manifestū est, particulam quæ  
nunc exvlerata est, ficcius vno gradu desideratu-  
ram medicamentū, q; quæ sit temperata particu-  
la. Simili modo & de aliis excessibus licet tibi  
ratiocinari. Porro ficiores particule sunt, quæ  
minus carnosæ existunt: cuius generis sunt, quæ

Medicus cuiusq;  
quæ morbo opti-  
mor, quæ sit di-  
cendum.

Vlcus rectè cu-  
rari non possit,  
nisi subiecta ca-  
ro pro naturali  
modo se ha-  
beat.

Vlcus curatio-  
nem carni ex-  
hibet ab extremi  
calascientia  
atq; refrigeran-  
tibus.

Acris tempera-  
tura ad vlcus  
tam curatiōem  
esse expeditā.

Naturaliter si  
habentia corpo-  
ra, similia sibi:  
præter naturā  
autem, contraria  
possident.

circa digitos articulosis habetur: præterea, quæ circa aures, nasum, oculos, & dentes constitunt: atque ut semel dicam, ubi crebræ cartilaginee, & membranulæ, & ligamēta, & ossa, & nervi adfunt: adeoquæ verò & caro, vel omnino nulla est, vel per exigua. Ordo autē curandi viceris foridæ & caui, à sorde expurgata oriatur, cum nec glutinari quicquid, nec carne impleri possit, priusquā purum fuerit. Secundo locū exigit cauitas sanatio. Tertium, cicatrix obducit. Quod si vni cum illis vel phlegmone, vel erysipelas, vel gangrena, vel interperies aliqua simplex cōposita sit, partem infestet, nisi quis prius eam sanarit, viceris imple- re carne nō poterit. Carnis siquidē generatio, ex subiecta, quæ sana est, ortū ducit. Ex ea verò quæ premit phlegmone, quæque interperata est & ex- grota, gigni caro noua non potest. Etenim iusta subiectæ carnis temperies, causæ rationē habet: ut quæ cōcrescere fecit, quod viceratū est, faciat, & cauitatē impleat. Puntas viceris, rationē eiua sine quo nō, atque hanc sordes interpellant, cura- tionem morant. Habet autē & vlcus ad cauitatē, rationē eiua sine quo nō: quandoquidē si vlcus cicatrice fuerit obductū, nō amplius caritas imple- ri carne poterit. Ergo si phlegmone, & caui- tas, & vlcus, & sordes, in eadē particula simul ad- sint, primò phlegmonē, secundo loco sordem, tertio cauitatē, & quarto vlcus sanare oportet. Cæ- terum affectus vnde primū maximeg imminet periculum homini, hic debet primus curari, atque

eiā solua interdū: vel nō si puncto capite muscu- li, cōvulsio, quæ cōgruē nō omnium medicamen- torum vim respuit, accidat, præciso per transver- sum toto musculo, conuulsione quidem sanaueris, aliqūē tamen ex particulae monibus vinaue- ris. Ad eundē modū, cum ex vena, arteriæve san- guis immodicē profluit, si totū vasa per transver- sum præcidere, vlcus quidem eiua postea sanare nō poteris: periculū tamen qd ex profusio sanguinis impendebat, subleuatur. Iam neruum pun- ctum sepe cogimur transuersim præcidere, quon- tius vel conuulsione, vel deliria, vel ambo, ma- gna ex grægē sanabilia, superuenire vulnerationi certimus. Similiter ubi luxatio cum vlcere in ali- quo maiori articulorū incidit, vlcus sanamus, luxationē autē insanatam relinquimus. Nam si hanc quom sanare conemur, cōvulsiones haud- dubiē sequentur. Primus igitur medendi in hisce est scopus, ille qui veluti à causis sumitur, eiua qd est futurū: alter, qui ceurationē obtrinet, eiua sine quo nō. Tertius denique de quo nuper dixi- mus, qui ad id quod vrget dirigitur. Porro quod cōsideretur scorum & per se potest, id nullius vnq̄ alterius differētia fuerit: sed quod alteri accidit, nec scorum per se consistit. Quamobrem vlcus, phlegmone, gangrenā, & putredē, cum scorum & per se consistere possint, affectus quidam præ- ter naturam potius dicenda sunt, q̄ viceris differē- tiar. At magnitudo, paruitas, æquabilitas, in- æquabilitas, tempus & figura, ex eorū numero sunt quæ aliis accidunt: ac proinde ab iis sumatur propriæ simplicitatis viceris differētiæ. Indicatio autē curationis à differētia fit, sed non omnib. Nam nec recta, nec verua vlcus per se indicat ali- quid. Siquidē quod vlcus tantū est, omnib. ali-

affectu liberū, siue recena, siue antiquum sit, eandē semper curationē desiderat: nihil planē pro- prium in dicante discrimine eo, quod à tempore sumitur. At si cauitatē aliē recondit sub cute ha- beat, considerate oportet, vtrum ea in superiore parte sit sita, ut fauies ex ea, pna effluat: an in in- feriore, sic ut illic fistatur. Eius igitur cui effluxus patet, eadem quæ aliorū curatio est. Cui non est, huic ipsi mollium effluxum quandam oportet.

Eius duplex ratio est: alius rota cauitate desecta, aliis in fundo tantū aperta. Quando verò harū alterutra sit incunda, docebit tum locum ipsa na- tura, tum verò viceris magnitudo. Si namq̄ & lo- ca ipsa periculosam sectionē faciunt, & vlcus ma- gnū fuerit, in fundo aperire magis expedit. Sin- contra se habeant, perscindere præstat. Deliga- tio verò eius incipit quidē superne, sed finiat in- fra, ubi scilicet patet effluxus. Iam verò transuersa vlcera, quod eorū labra magis disideat, à se sepe abstin, diligentiā cōiung possunt: idēque tum futura, tum fibulis, in eia est vtendum. Quæ ve- rō per longitudinē musculorū sunt facta, hæc si duplici inno deliges, nec futuris egebis, nec fi- bulis. Sin aliter deligare placebit, vel fibulis, vel futura vitare. Sufficient autē paucissimæ omnino futura. Et magna quidem vlcera, his quæ valen- tibus siccant medicamina curabia. Parua verò, vel quæ moderate siccet, abvnde sanauerint. Cæ- terum profunda vlcera, eadem enī sunt magna, volūntq̄ tum à duobus intus deligari, tum ve- rō nec labra vasa præpropere glutinari. At quæ profunda multū, longiorū sunt, per duplici rano- ne sunt magna, sic duplicem quoque præstant indi- cationem. Itaq̄ & quæ valenter siccant possunt, & ne immature labra coniungant: & vt à duobus initiis deliges, & vt alius futura cōsuat.

### GALENI PERGAMENI de medendi methodo, lib. III.

Et itaq̄ vnum morborū genia, diuorsim con- tinui vocatū: quod quidem in carno- sa parte, vlcus: in ossē, fractura: in neruo, cōvulsio appellatur. Eiusdem generis sunt avul- sio, ruptio & contusio: illa quidem in ligamēto, lre in vasis musculisq̄, ex violento ictu, vel gra- ui casu, vel alio quopiam valente motu excita- ta: Ecchymosis verò vt plurimū vnā cum con- tusione & ruptione incidit. Fit autem aliquando & ex oria vasorum apertione, quæ anastomosis dicitur, & ex ea quam diapedesin vocant, & si- piam existentem solum continuitati aliam spe- ciem. Iam verò & ex erosione etiam soluitur in- tectum in animalis partibus cōnuectas. Verū is iam mistus affectus est. Porro cōvulsio, si intrin- secus ab ipso animali proveniat, vitiosi succi est so- boles: sin extrinsecus, aut à valenibus medica- mentis fit, aut ab igni. In vniuersum autem, sim- plices affectus à compositis distinguere oportet, cum simplici morbo simplex curatio adhiben- da sit, composito verò non simplex. Igitur omne vlcus, aut solum atque per se, nullo nec cum eo simul invadente, nec ipsum præcedente, aut sequente alio affectu, partem infestat: aut cum alio quopiam vno, pluribusve coniunctum: quorum alin, non modo statim ab initio excitantur vlcus, sed nunc

Effluxus nobi- di ratio in re- videri quæ apte expungit non possit.

Deligando vlc- ra rati. Transuersa vlc- era deligant quibus velle in- genda est.

Vlcus foridū  
creans caridē  
methodus.

Carnis genera- tionem ex sub- iecta carne, si sana sit fieri.

Puncto capite  
musculi si con- vulsio oritur  
ammodicabit,  
siccandū esse  
tūc trāsvēsim  
musculum.  
Sanguis fluen- tem immodicē,  
supprimi, si per  
transversum so- lum vas præci- dere: vlcus sa- men cum postea sanari nō possit.  
Nervus quādo transuersim se- cāndus.  
Luxatio cū vlc- ere quādo de- beat insanata reliqua.

Differētia nul- lā potest, quod per se consistere possit.

Vlcus simpli- ca differētia propria vnde sanatur.

Vnicuique plu- ria.  
Vlcus.  
Fractura.  
Conuulsio.  
Avulsio.  
Ruptio.  
Contusio.  
Ecchymosis.

Anastomosis.  
Diapedesin.

Erosio causa

etiam malus efficiunt: alij, eius sine quo non, ut ad curandi opus, rationem obtinent. Ceterum qui vlcus maius efficiunt, submouendi e corpore sunt, aut perveniendi id, quod inducitur, in eodem. Hoc autem, si affectus exiguus sit, fieri liberebit facile: si vero magnus, duci ad cicatricem vlcus non poterit, priusquam illi affectus subventum fuerit. Ergo omne vlcus subiecti sibi carne præditam naturali dispositione, oportet: & ne quid alienum inter oras cõglutinandas interfit, quod

Vlcus curando  
quod requiritur  
est.

10 ita necesse est ad vlcera tum glutinosa, tum carne implenda, temperatam esse subiectam carnem. Nec sat hoc ipsum videtur esse, nisi etiam quod a filut sanguis & probus sit, & quantitate mediocriter. Quippe ægræ sanabilitum, rebelliumque vlcera, alia ob intemperie carnis exulcerata, alia ob affluent humore sunt talia. Caro autem ipsa interdum solis qualitatibus naturæ modò egreditur, interdum accedente tumore præter naturam. Iam humore confluens, alij qualitate aut quantitate, à naturæ modo discedit. Interdum vero miscetur dictorum affectuum, aut aliqui aut etiam pariter omnes. Ac carnis quidem intemperie, si equaliter siccat, videtur, aqua temperata fouent humectantque, donec rubefcat, attollantur in tumorem, corrigens. Si vero vlcra per se densa, id quod attraxisti evocabis: ac proinde nihil profectus. Quinque medicamenta humidiora, quæ sanæ carni, adhibeantur. Si vero humidior quæ pro naturali habitu caro fuerit, contraria ratio inenda est: ac medicamentum purius ad siccius transferenda: aqua vero nullatenus admonenda: sed si lauium vlcus videtur, vinum,

Carnis siccat in  
temperie, quomodo  
corrigenda.

Carnis humida  
intemperie, quomodo  
corrigenda.

Carnis intem-  
perie, quomodo  
degeneranda.

Vlcus labra  
quando recedenda  
sint.

Vlcus in parti-  
culari cõfusione  
exulceratum,  
quando an-  
ticipandum sit  
et quid faciat.

50 auriposca, aut decoctum austeræ cuiuspiam herbe, præparandum. Eodem modo & calidior quæ pæ est, carnis habitum refrigerabis, & frigidior cal facies. Agnosces verò horum utrunque, partim colore, partim tactu, partim laborantis sensu. Quippe alia visumem se sentire fatentur, alia manifestum in particula frigus: gaudentque vel frigida medicamentis, vel calidis. Et alius quidem rubore levis insidet, alius color magis albus. Partium porò quæ cum aliquo præter naturam tumore exulcerate sunt, earum prius sanandus est tumor.

Vbi labra tantum vlcens decolorata durare plusculum fuerint, excidenda ea sunt ad sanam usque carnem. Cuiusmodi vero alius id malum sepius, deliberatione est opus, excidendumne omne sit, quod præter naturam cernitur, an temporis ipsa curandum: quia in re certè consulendus etiam est æger. Iam verò si prauus humor in particulas cõfluens exulcerat, nec vberior sit iusto, nec multum excellat malignitate, averti hunc, atque repelli cõuenit: antequam sollicit, refrigeratisque partibus, quæ ante exulceratæ consistunt. Inchoanda etiam deligatio est à laborante particula, deducendaque versus sanæ. Quæ autem vlcibus ipsis admouetur pharmaca, siccant valentius oportet,

quoniam quæ simplici applicantur vlcere. Quod si subiecti, cõpescitque medicamentum influxus nequeat, causa eius inuestiganda est, atque hæc prius admodum. Ac si quidem ob partem, quæ fluxum recipit, imbecillitate aliquam id contingat, leuius nimirum medendum est. Imbecillitas autem partis, omnino ob intemperie nascitur: non tamen ab omni, sed ab excellentiori, quæ sane per contrariam est abigenda. Vbi igitur intemperie ipsam sanaueris, te ad curandū vlcus cõvertere: non aliter piane nunc curata intemperie, quæ si incidisset cura vlcus. Si vero ab alia quavis particula, vel etiam à toto corpore, vlcus aliquis humor influxerit exulceratis particulis, medendum ut prius est ipsius fluxionis radice. Ita igitur & varices, quæ sæpe supra exulceratis locum sunt, prius sanabimus, vi deinde mox vlcus sanemus. Aduertendum autem est interim, nullam primitiuarum causarum, quas pro catartecis vocant, nisi etiam tumorem producant, esse curationis indicatorem: sed huius indicationem, ab ipso affectu minimum habere. Si quidem à nullo eorū, quæ adhuc non permanent, indicatio sumi eius quod ex vlcis futurum sit, poterit. Est tamen vitilis causarū præcatartecarū cognitio, ad noscendos affectus eos, qui tum ratione, tum sensum latent. Est itaque rei quidem prædictæ curatio: futuræ autem, provisoria. Quod vero nec nunc ledit, nec futurum timetur, id ab vltroque artis munere, tum eo quod curat, tum eo quod providet, excelsit. Quare nec indicatio ab hoc ad curationem vlla, nec providentia ratio sumitur. Si igitur à præcatarteca causa indicatio curationis non sumitur, vltroque manifestum evadit, quod ab ea quæ prædicta est, sumitur. Ceterum prospectrix pars artis, est duplex: altera, quæ morborum affectum iam præsentem submouet: altera, quæ illum qui nondum vtget, prohibet. Porro cõtingit vlcera non sanescere, interdum quidem ob labra ipsa pessime affecta, interdum ob intemperiem particulæ, abijci vltro tumore præter naturam: nonnunquam ob intemperantiam quidem, sed quæ cum tumore aliquo sit cõiuncta, non tamē qui omnino sibi labra excidi possint. Fieri etiam potest, ut superiacēs varix, vel auctior lien, vel aliqd vinū sic moris, vel imbecillitas exulcerate particulæ: quæ ipsa quoque intensior quædam est intemperies, vel totius corporis cacochymia, vel plethoria, vt vlcera minus sanescant, prohibeat. Quare causa ipsa, quæ cõtingit illa sit, circuncidenda venit. Iam verò vlcus omne cacochymie, hoc est, malignantis naturæ, continud & cauum sit est necesse, cum ex erosione nascatur. Nunquid autem id genus vlcera, si vni nequeat illa vlla, calido acrimie medicamentis caulescere, prorsusquam vniuersum corpus à recrementis liberari: quemadmodum faciebat imperitissimus Thesias.

Indicatio vlcis  
in malis sumitur  
a causa non  
permanente.  
Præcatarteca  
tum partem ducit  
vltro.

Indicatio cura-  
tionis à causa  
prædicta sumitur.  
Prospectrix  
ars tum partem ducit  
vltro.

Vlcera sananda  
re quæ prohibentur.

Vlcus in malis  
sananda non esse  
prius quam corpus  
pau vniuersum  
sit liberum.

Quæ sit omnia  
Nunc

quandam vniuersalem viam, quæ sit omnium



primus omnium Hippocrates: secundū cuius quidem sententiam, omni recens factū vulneri, nisi in ventre consistat, expedit ex ipso statim sanguinem plus minusve effluere. Quippe phlegmone si mious tentabitur tum vlcus ipsum, tum quæ circumposita ei loca sunt. Idem etiam cōfirmat, debere scilicet imitatorē esse medicum, nō tantum naturæ, sed eorū etiā, quæ cum sua sponte eveniant, conferunt: nec non conducere, si ab inveteratis vlcibus eorūq; circūiacentibus partibus, crebrō sanguis fluere cogatur. Porro quæ acuti sensus pars est, eam q̄maximē servare citra dolorem tentandum. Quæ verō parum acuti sensu est prædita, hæc, si affectus ita suadet, valentiora prædicia admittit. Rursus principis quidem membri robur servari oportet. Quod tale nō est, licet huic adhibere relaxantē medendi rationem. Quod verō ad possum pertinet, si ventriculus fuerit exulceratus, medicamenta bibenda sunt. Si gula (quæ transitus comestorū bibitorūq; est) nō semel, nec tota simul sumenda, sed paulatim, assidueq; lingenda: & sanē tum crassiora, tum magis lenta esse debent. Nam ex transitu contractūq; vlcibus quæ illic habetur, emolumenta accedunt: nō ex cōtinendo, & diutius adhibendo: sicut vis quæ in ventriculo sunt. Quæ verō vlcera in crasis sunt intestinis, si quæ perfectum iniiciūtur remediis magis egent: quippe cui magis spiritus propinquat. Quæ in tenuibus habentur, quoniam & looquiora sunt, & medio situta positaambo requirūt, & quæ superna sumuntur, & quæ infunduntur per sedem. Cōmuni autem omnium internarum partium est indicatio, ut ea eligatur, quæ animalis naturæ maximē sint familiaria, siue cibi sint, siue medicamenta: fugiantur respuantūq; his cōtraria. Quāq; in iis quæ foris sunt vlcibus, innoxius etiam talium medicamentorū sit visus, ut ignis, visus, visus, æris squama, admixta, pompliolygis, lithargyri, atq; cerassæ. Hæc igitur & similia, interioribus exhiberi nō debent. Eligenda verō alimenta sunt, si quidem ad cicatricem perducere, aut vlcus glutinare studemus, rū austera, tum glutinosa, & quæ minimē rodant. Si emundare, quæ modicē abstergeant: quod minus mel non coctum, præter cætera præstat. Ac voco sanē austerū, id quod astringens dicitur: ut acerbum, quod impense est austerrum. Ergo internis vlcibus opuluntur, hypocistis, balaustrum, puniceorum cynni, galla, malicorū, terra Samia, Lemniū sigillum, thois, rosarum succus, acacia, aliāq; id genus, quæ citra tūcōmodum viscerum, præsidium internis visceribus afferunt. Danda verō hæc sunt, ex aliquo astringennū decocto, vel mālī coronei, vel lenicēi, vel claviculorū rubi, vitifvæ, vel myrtorum, vel deniq; ex vino aliquo austro. Cavendum tamē a vino est, ubi phlegmones suspicio adest. Sunt autē & præparanda id genus medicamenta, cum eisq; miscenda etiā, tum tragacantha, tum gummi: præsertim si ob gulæ vlcera exhibeantur. Sed & gargarizare quoq; iuben dus est, quod aut fauces & paritissima his vietur. Ad vlcus autem quod in aspera sit arteria, ut supinus q̄diutissime in ore teneat, ac omnes qui illic sunt musculos laxet, remittatq; præcipiendum: insinuat

que sic sensim & paulatim in medicamento aliquid sensibiler & mansile in ipsam arteriam. Nam & cum naturaliter seie habet, scire licet positionis nōnnulli illuc percolari. Semper autē auctum est, ut largius quicq; & per mediam spiritus viam, insinuetur: alioquin excitabit tussim. Iam verō medicamentis omnibus, quæ thoracis & p̄simo vis vlcibus sunt destinata, mel admiscendum est: quod quidē digestionis eorū in corpore accelerat, sed etiam velliculū erit, cū eo, quod nō que nocebit vlcere. Ad eundem modum, quæ nonnes in vesica & renibus consistit vitium, nō solum mel ipsum, sed etiam diureticorū aliquod vlcere medicamentis miscere oportet. Cæterum partes exulceratæ, tum ex earum substantia, tum functione, tum vilitate, tum positu, tum figura, facile discernuntur. Itaq; non modō illa quæ diximus, sed etiam complura alia, ex figura partium, positūq; indicantur. Etenim cætherere omnino probe vti nequeas, nisi & posuit, et figuram tonus vesicæ planē perfectam habeas. Ergo in hisce omnibus nō parum ad totam curationem locus affectus in dicit. Porro valentiora medicamenta requirunt, affectus in alto desitescens corpore, quā qui in summa superficie consistunt. Echymosis omnis, vacationem pro curationis remedio indicat. Quare calfacientibus huic, & modicē siccantibus medicamentis est opus. Quod si echymosis alius descendat, non fuerit visus curbiturū in vltis: quod quidem instrumentum fuit a medicis, ad violentam attractionem excoctatam. Ergo si evocatum celestiter echymoma sit, facile coalescet rupta ipsa caro. Si longiore spacio, fordes multa subnascæ, medium inter vlcis labra spaciū occupata vtiā corpe ruptio non possit, sed tantum ipsa labra posuit admoueat.

#### GALENI PERGAMENI de medendi methodo, lib. V.

Monstratum igitur est, omne vlcus siccantia medicamenta requirere. Cæterum quod finem habet, ut minus sanē quim reliqua, sic ea quæ præterquā quod modicē siccant, etiam abstergeri facultatem possideant, desiderare. Quod verō coniungi sibi labra postulat (cuiusmodi sunt cruenta) huic tum quæ magis etiam siccant, tum quæ citra abstergionem leuiter astringant, esse opus. Iam quæ vlcera perducit ad cicatricem postulant, hæc non solum magis adhuc siccantibus, sed etiā strenuē astringentibus remediis egere. Quod si caro eorum præter naturæ modum intumuit, acna, & demolenda desiderare. Si quod verō aliud symptomata vlcere adiunctum erat, ab eius natura curationis indicatio sumebatur: atque ex hac rursus petebatur remedium facultas. Si namq; fordes inhaeseretur, quæ hanc tolleret opus esse: eaque omnia abstergeri vim habere, multo sanē maiorem, q̄ ea quæ carne implerent. Ac si agglutinarum medicamentū esset, siccans, astringensq; id esse debere. Si carne impletum, siccans & abstergens: atq; in singulis reliquorum, vti ductum est. Si verō intemperata subiecta caro esset, primum per cōtraria succurrendū esse illius intem-

Potius auctori  
beli semper  
aspirant delati  
in arteriam.  
Mal peruenit  
dem esse medi  
camen in  
qua thoracis  
primūq; vlc  
eribans inuen  
tur.  
Diureticorum  
aliquid meli  
ussum misce  
ndum esse medi  
camen quæ  
ad vesicæ &  
rene faciat  
curari.

Afflicti in alto  
fuit, valentiora  
medicamenta  
requirere,  
quā qui in  
superficie  
consistunt.  
Echymosis eū  
tatio.  
Curbiturū  
viti.

Vlcus carni  
discernantia  
nec non discre  
giva postulat.  
Glomētia me  
dicamenta quæ  
hæ nam esse  
debeat.  
Cicatrix endo  
cicatrix medic  
amenta quæ  
esset oportet.  
Echymosi caro  
qualis requi  
ret medicamē  
ta.

Vlcus recens  
expedit ut ex  
ipso statim san  
guis.

Gula revicere  
te medicamen  
ta esse paula  
tim assidueq;  
lingenda.

Inguis en  
viceratū quæ  
modis succurrit  
dant.

Vitæ quæ præ  
paranda non  
sunt.

Mal cradum.  
Austerū quid.  
Austerrum quid.  
Vlcibus inter  
natū parum  
quæ profus me  
dicamentis.

Vinum fugien  
dum esse, ubi  
phlegmones su  
spicio adest.

Aspera arteria  
vlcibus quæ  
ratione medic  
dant sit.

*Sanguis super  
promissa est  
emplastica sunt  
aperta crusta  
fusa.*

*Sanguis super  
promissa est  
emplastica sunt  
aperta crusta  
fusa.*

*Quia omnia  
maxime in  
spem profusum  
excitat, in ple  
guinis auge  
manna thuris.*

*Thuris*

*Mastiche  
Excitat, sam  
brum in quib  
incipit vici.*

*Adhuc a f  
mol et astring  
ta, qua sunt.*

*Ex ressa a cau  
fusa astringen  
tib excitat, haere durum  
vici.*

thica, quod inducunt crustas: quidam quidem in his  
est verendum, ne ubi crusta deciderit, rursus san-  
guinis profusio ab ipso vase exciteretur, cum vas  
magis nudatum carne, quam pro ipsius naturali habi-  
tu, detiniquat. Siquidem generatio crustae, ex sub-  
iectis fit, circumpositisque corporibus semivivis.  
Optimum igitur omnium quae novum medicamentum  
quo etiam ad cerebri membranas, necnon  
sphagnum venarum hemorrhagias tumescere  
vitemur, est quod subiciamus. Nam, thuris partem j. 10  
Aloes partem s. miscetur ita cum ovi candido,  
ut perveniant ad crassitudinem mellis. Postea vero  
leporis mollissimis pilis excepta, tum vasi-  
rum uniuerso viceri, liberaliter admoveatur. Al-  
ligandum autem id fornicis fascia est ex tenui lin-  
teo: cuius fasciae primi quatuor quinqueve am-  
plexus, ipsi profusum vasi iniunguntur, ducturque  
mox versus eius radicem: nisi in quibus partibus  
id non licet, ut in cerebri involucri. His fasciis, vi-  
bi tertio die solueris, si tunc adhuc medicamen- 10  
tuleri adhaerere, aliud rursus superimpones, deli-  
gabisque ut antea, similiter. Quod si prius lina-  
mentum deciderit, impones alterum: ac sic, quoad  
carne munietur, curandum ipsum vas est: necnon  
a principio ad finem usque, vulnerata particula, me-  
dicamentis supina seruanda. Vitandum autem est ne  
dolor incidat, ac rursus profusum excitet, cum  
nilil sit quod profusum magis quam dolor prote-  
get, et phlegmonas augeat. Iam manna thuris ma-  
gis quam thuris astringit: est autem minus emplastica. 30  
Constat vero in duris corporibus plus aloes im-  
miscendum esse praedicto medicamento: in mol-  
libus autem, plus thuris. Ceterum ubi medicamen-  
tum id facere magis emplasticum optas, deligere  
thuris resinosis oportet, quod quidem et mollius  
est, et candidius, mansumque non committitur, sed  
partes suas sibi coherentes tuetur, ut mastiche.  
Maxima autem necessitas est ut crustificis me-  
dicamentis, vel ignitis secretamentis vitendi animad-  
verti, ubi ex erosione putrescentis alicuius, pro-  
fusum sanguinis excitatur: ut in pudendis et sedes:  
quae partes, et propter naturalem humiditatem, et  
quod excrementorum canales sint, ex leui occasio-  
ne putrescunt. Vbi igitur totum quod iam compu-  
truit sublatum fuerit, tunc in huius opus est radicem  
ipsam excutere, idque aut ferro candente, aut medi-  
camentis excitantibus crustam, sed quae etiam facili-  
tatem astringendi possideant, qualis in chalcitide  
& myrris, et arameto sutorio videtur. Porro quae  
ex calore non extincta cohaerent, ea vix valentio-  
ra his sunt: ceterum calx vim astringendi non ha-  
bet. Excidunt igitur citius quae ab his sunt crustae:  
haerent autem diutius, quae ab astringentibus:  
quod vix longum est vitium. Quare nec seminare  
quidem debemus ad amolendas crustas, ubi haem-  
orrhagias periculum adest, nisi in illis tantum asse-  
ctibus depalcantibus, in quibus propter putre-  
dinem, candens ferrum admoveat corpori suum co-  
actum. Porro qui ex vasis profusum sanguis, aut pro-  
pterea quod amplius non cohsuet, insitetur: aut quae  
occlusio diutius erit, aut etiam ob vitram causam,  
id quod tutissimum fuerit. At cohsuere prohibe-  
bitur, et propter deliquitum animi, et cum ad con-  
traria revelitur, et cum deiciatur ad proxima: et  
per refrigerationem, tum corporis totius, tum pro-

cipue partis affectu. Hac etiam ratione, frigida  
tum porta, tum parti foris affusa, saepe haemorrha-  
gias suppresit. Idem etiam molitur, et posca, et  
vinum acerbum, aliisque omnia quae vim astringendi,  
vel simpliciter refrigerandi vim habent. Claudu-  
ritur ipsa diuisio, si vel contrahatur cohaerere id  
quod diuisum est, vel obstruatur. Sane contrahitur  
tum astringentione, tum refrigeratione, tum de-  
ligatura, tum vinculo exceptu. Obstruitur vel in  
transsecus, vel extrinsecus. Et intrinsecus quidem  
ad coactum sanguinem extrinsecus vero, tum ab hoc  
ipso, tum a linamento, et spongis, et crustis, et  
medicamentis usque, quae lentius crassumque sua, me-  
tus obstant: ad haec, corporibus usque, quae circum-  
iacet, propius admotis. Atque haec tenus de proflu-  
um sanguinis, quae a partibus expositis sensui or-  
iuntur. Nam quae de profluio sanguinis proflu-  
uia erumpunt, ea nec vinculo nec deligatura sana-  
ueris, vel non neg candentem ferro: sed per revulsio-  
nem, aut ad vicina loca detractionem: necnon per  
cibum atque potionem, quae et emplasticam vim  
fortiantur refrigerantem: necnon per medicamen-  
ta astringentia. Pro differentia autem et proprie-  
tate partium quae profusum patiuntur, variis  
vitum instrumentis. Siquidem per clysterem, in  
intestina: per metenchytas in vterum: in vesica-  
m denique per catheteras, idoneorum aliquod  
medicamentorum immittimus. Equidem quater-  
nis diebus videtur sanguinem esse vulva profluere,  
nec potuisse villo remedio sisti, quoad quattuor die  
plantaginis succo ventibus nobis, profusus com-  
sistit. Est quippe hoc medicamen- 40  
tum, et ad ea quae  
ex erosione excitantur profusum sanguinis vi-  
lissimum. Cui etiam valentius aliquod hoc casu  
medicamentum, aliis aliud miscere soleo, vixque ad  
totum respiciens affectum, id quod perpetuo est  
faciendum. Et enim in his ipsis quae ex vulva, vesica,  
et intestinis profusum oriuntur, testatur de  
bebit ipsius profusionis quantitas: ut videlicet  
hanc ipsam, vel ut primam, vel ut secundam indica-  
tionem curationis habeamus, nec tamen negli-  
gentes affectum. Nam si peritum vas aliquod  
magnum est, aut vehementer reclusum liat, vixque  
astringentibus medicamentis est opus, vel vix  
laetho, hypocistide, rhoce, omphacio, acacia, gal-  
lis immaturis et malicorio. Sin vel exiguum vas  
est, quod peritum est, vel modice reclusum,  
sic ut non multus sit ex eo sanguis profusus, etiam  
aloe et manna, et pini cortex, et lemnium sigillu,  
et spinx Aegyptiacae fructus, et crocus, et lapis ha-  
manter, aliaque id genus, ex vino nigro austero,  
vtilia medicamenta sunt. Quod si nec genus id  
vini addit, nec plantago, nec solanum (quippe haec  
quod sunt idonca rubi, et cynosban, et myrris,  
& lentisci, et hederis, et cotoneorum, et melpalo-  
rum, breuiterque, astringentium omnium deco-  
ctum ex vasa est. At si ex erosione profusum ali-  
quod incidit, erit vixque id exiguum, atque paulu-  
tim effluens. Quare Pasionis, vel Andronis, vel  
Polydix pastillis vendendum est: aut etiam nostrum  
quod ex charta constat. Sin profusior haemorrha-  
gia sit, ita quae vehementissime astringant ven-  
dum medicamentis, quoad vehementius eius fragra-  
rur impetus. Mox deinde admiscendi illis pastilli  
sunt: postea ad ipsos solos veniendum, cum aliquo ex

*Refrigeratio in  
vase corporis  
partiale efflu-  
ta, sicuti san-  
guinis super-  
fusa.*

*Sanguinis pro-  
fusum ex pro-  
funda erosione  
vici, quae rati-  
one astringen-  
dam sit.*

*Plantaginis suc-  
co remedium in  
partem affusa  
vici, quae effluens  
vici.*

*Astringentia  
medicamenta.*

*Pastilli diuersi  
vici profusum  
sanguinis, ex o-  
riferis oborti.*



*Astringentium  
finitur ex reser-  
pientum & reser-  
pientum, quod ad  
suppressionem  
fanguinis ap-  
plicatur, non  
reserpiens, non  
reserpiens, non  
reserpiens, non  
reserpiens.*

*Astringentium  
quod ad reser-  
pientum, non  
reserpiens, non  
reserpiens, non  
reserpiens.*

*Cucurbitam  
finitur ex reser-  
pientum, non  
reserpiens, non  
reserpiens, non  
reserpiens.*

*Dura omnia  
agri confilide  
finitur.*

*Vetus tempore  
fanguinis non  
reserpiens, non  
reserpiens, non  
reserpiens.*

*Vicia per chy-  
stos Galenus  
videtur.*

*Lemnia terra.  
Remedia vici-  
um omnia  
finitur.*

antē dictis succis aut decoctis. At verō quæ ex-  
trinfecus profuēnt particulę admoventur, tum  
astringentia, tum citra astringentem frigidā, hæc  
ipse nō vbiq; probō: sed mihi contrā omnino q̃  
fieri res postulat, ipsum sanguinē in trō compē-  
lere, ac venas quæ in alto sunt implere videntur.  
Vidimus enim quoddam eorum, q̃ sanguinē ā  
pulmone reicerent, ex thoracis refrigeratōe ma-  
nifestē laxos: æquē vt qui sanguinē vomuerunt  
nonnullos, quod venter efflet toris refrigerans. 10  
Eodem modo & eorum quibus ex naribus san-  
guis p̃fluxit, aliqui ex capitis refrigeratione de-  
terius habuerūt. Quare nec omnino, nec sine di-  
scrimine, nec omni tempore loca quæ circa par-  
ticulam vnde sanguis profuit, sunt sita, refrige-  
randa suaserim, sed postea q̃ in alia diuēteris: vt  
exempli gratia, in naso, vbi sanguinis missiōe  
vīsus fuerit, vel artuum frictiōe, de vinctiōe q̃,  
vel ad præcordia cucurbitis defixis. Quin ne sic  
quidem ad frontem capitis refrigerantibus vidē-  
dum est illud, sed reuellendū prius ad contrariā:  
vbiq; affixa in sanguine ceruicē cucurbita. Quippe  
duplex est in sanguinis ē naribus profusione a-  
versio: & quæ est ad totius corporis inferna, &  
quæ ad capitis posteriorē: propterea videlicet  
q̃ ipse nares & in superiori & in anteriore parte  
sunt sitæ. Iam verō sanguinis effusio diapedis  
dicta, refrigerantibus & astringentibus est curā-  
da: necnon viciū acriorī, si ob tenuitatem san-  
guinis accidat. Porro quod venæ insedit vlcus, si  
ad manum est, eandem curationem cum iis desi-  
derat, quæ in carne consistunt. Enim verō quem-  
admodum dura omnia ægrē consolidescunt (car-  
tilago enim cum cartilagine per coitionem haud  
coalescit, sicut nec os cum ossē, sed per callum rē  
tum coniungitur) sic etiam solutæ arteriæ cum  
difficultate ob substantiæ duritiem coalescunt,  
et si eas aliquando conglutinari viderimus: idq̃  
in mulierib; atq; pueris, tum circa frontem, tum  
circa malleolum carpiūq; ac medium extremæ  
manus. Simile quiddam aliquando & aggreit̃ cō-  
rigit iuueni, dum sanguinem sibi mittendum ver-  
tio curatet tempore, quod nostratibus est maxi-  
mē in vīsu. Illi siquidem pro vena fuit scēta arte-  
ria in cubito, quam postea nō ipsi conglutinaui-  
mus. Est autem sanatu difficilior arteria incisa q̃  
vena, tantōq; fictioribus medicamentis eget,  
quāto ipsa est suapte natura q̃ illa, fictioris tem-  
peramentū. Cætera verō, eiū scē species ambæ me-  
dicamenta desiderant. Porro ad ea quæ in recto 50  
intestino sunt vlcera, per vesicē, cui sit fistula re-  
cta ad finē annexa, inicere liquariū medicamen-  
atq; tepidū licet. Cæteriū sicca medicamenta ma-  
gis sunt idonea, q̃ quæ liquabilia vo cantur: quo-  
niam faciliē vel plantaginē, vel alterius eius ge-  
neris succo miscuntur. Eiusmodi medicamenta  
sunt, & crocum, & pompholyx, & aloē, & quæ di-  
cuntur cephalica. In ipso autē primo producen-  
diæ carnis tempore, quod suppressionem sangui-  
nis continenter excipit, etiam Lemnia terra salu-  
rare est præsidium. At quæ pulmonis adhaerent  
vlcera (cuiusmodi sæpe in vrbe Roma videntur,  
loco protectō maxime obnoxio fluxionibus)  
difficiliora curatu existunt, ob asiduum ipsius  
visceris agitationē. Quod quidem laxū & spon-

giosum cū sit, minimē etiam mirari conuenit,  
si sanguis aut pus in thorace contentū, aliquan-  
do per membranam illius transmittatur ad arte-  
riam asperam: quandoquidem per aliam longē  
duriorē in ossiū fracturis effunditur sanguis cras-  
sus ad calli generationem. Vbi igitur vel ex casu,  
vel prævalida acutāq; voce vna aliquid in pul-  
mone rumpitur, citraq; dolorē cōfestim sanguis  
seruens, floridus, multūq; cum tufus expulsiū, si-  
re licet in viscere vultus consistere. Itaq; laboran-  
ti iniungendum est, vt nec respiret velementer,  
ac semper silentiū agat. Præterea vena a cubiti in-  
terna protinus incidenda, ā qua bis tēq; postea  
sanguis est detrahendus, vtiq; avertendū grana,  
tum artus omnes fricandi vincientiū. His per-  
actis, primū posca tum diluta, tum tepida, potui  
offrenda est, quō si quis in viscere cruor concre-  
tus latet, solutus expulsiū. Atq; hoc nihil verat  
bis tēre, ternis horis facere. Ab his verō etiā ali-  
quod eorū quæ tum emolliaciū vim habet, tum  
astringunt, medicamentū est exhibendum: idq̃  
aut ex posca diluta primū, aut ex malorū myrro-  
dine decoctū. Rursusq; vesperi medicamen-  
hoc similiter dandum, circumsiso (si valentiōr sit  
æger) omni nutrimentō. Sin alter, forbitiōis q̃d  
satis est exhibendū. Maximē verō ad rem perti-  
nebit, si etiam postero die (modō æger robustus  
sit) parū sanguinis rursus ab incisā iam vena de-  
trahas. Victu autē, medicamentisq; eodem mo-  
do in quartū vigi diem vtran: pectore interim,  
si itas sit, vndiq; melino & rosaceo, madefacto:  
sin hyems, nardino vnguento. Iuuerit etiam vel  
maximē nō modō ad vultus pulmonis, sed ad  
alia omnia, illud medicamen emolliaciū, q̃d ex  
bitumine acetiq; & alus quæ illi miseri solent,  
constatur. Quod si mulieri puerōve, aut corpori  
quod molliū sit carnis, medeas, quod ex dialci-  
tide fit, satis habile medicamentū fuerit. Cæteriū  
si rupturæ vasis successerit inflammatiū, exigua  
40 spes est cōglutnandi ipsius: quādoquidē in tam  
manovis solutæ pus, expurgari sine rufi nō po-  
test, quæ maxime rupturæ aduersatur in lōgis  
tamē tempus produci ipse afflictiū potest. At se-  
pi transuerſi vlcera, quæ foras nō perveniūt,  
in carnosū quidē paribus subinde visa sunt coa-  
lescere, eius motu minimē obstante. Quæ in ner-  
uosis eius hærent, insanabilia sunt. Sanē diffi-  
cilis grauiorū curatio est etiam eorū quæ in carno-  
sis sunt paribus, si has iam plegmo ex obse-  
dit, idq̃ non in diaphragmate solū, verum etiā in  
omnibus quæ intra peritonæi ambūtur: quod  
in ea scilicet sanies defluit. Danda tamen ope-  
ra est, vti illa quacumq; ratione sicemus, tum per  
ea præsidia quæ extrinfecus imponuntur, tum  
per ea quæ ex aqua, vinōve tenui bibuntur. Ho-  
rum maxime idonea sunt, quæ diapharmaron vo-  
cant, & quod ex calia componitur. Immutatur  
autem plurimū ipsa curatio vlcera, per singu-  
las animalis partes. Indicatifissimum, vel vni-  
us ipsum, vt curetur, sibi applicandum esse cō-  
trarium: sic parūcula quæq; quod sibi sit q̃simili-  
limum. Quāobrem autū vlcera, cū ex par-  
tes longē sicatissimæ sint, glaucio ex aceto curan-  
tes: necnon (si valentiōr sit opus) medicaminē  
Andronio, scoriatq; ferri in puluim tenuissimū  
lauigata,

*Primum ex-  
cerat iudicio.*

*Hemoptica  
morbo curata.*

*Posca diffusio  
grauis.*

*Sanguinem ex  
pauca vena re-  
pentiā q̃d vni-  
fuit sanguis.*

*Pulmonis vasis  
rupturæ, si  
solutum suc-  
cesserit, cur ef-  
ficacis aequal  
consolidatur.*

*Vlcus curatio  
non immutari  
plurimū per si-  
gula animalis  
partes.*

*Autum vlc-  
era quibus me-  
dicamenta co-  
trahunt.*

Tetrapharma-  
ci inquit phle-  
gmonis argenti  
efficitur partu  
paradoxa.

Oculi vlcera  
quæ modica  
mâ postulat.  
Nâ vlcera  
quæ modicam  
ta postulat.  
Oculi vlcera  
quæ modicam  
ta postulant.

Diamorem, vti  
vltimus con-  
mendum.

Medicamentis ge-  
nera à subtili-  
tate partu affe-  
ctis, et ab affe-  
ctu illi iun-  
dum.

Vltima modus à  
figura et à  
sua iun-  
dum.

Vltima modus à  
figura et à  
sua iun-  
dum.

Vltima modus à  
figura et à  
sua iun-  
dum.

Ventriculi ex-  
vltima modus à  
figura et à  
sua iun-  
dum.

Ventriculi ex-  
vltima modus à  
figura et à  
sua iun-  
dum.

Ventriculi ex-  
vltima modus à  
figura et à  
sua iun-  
dum.

leuigata, & cum acerrimo aceto, quovisq; ad lu-  
brici mellis cõsistentiam deveniat, coacta. Porro  
quod tetrapharmacum dicitur, ficare vlcera id  
genus prorsus nõ potest: ar mai arare phlegmo-  
nem potest, augerẽq; affectũ partis putredinẽ. Ira-  
que audiendi locus, quoniam ficiissimus est, idcir-  
co medicamentis eget q̃ vehementissimẽ siccant.  
At oculo exvicerato, collyrium fortasse quod ex  
thure cõficitur, expedit: nam, verò, quod multo  
sanẽ magis siccũ, quàm vt conveniat oculis, et 10  
nũs autem quàm vt auri quadret. Vlcera verò  
quæ in ore accidunt, quæcumq; admodũ lrumi-  
da existunt, præsertim si proximẽ adherent osib-  
us, ea medicamentis egent quæ vehementer sic-  
cẽt: veluti diaphryge, tum ipso per se, tũ ex melle,  
& vino, & mulso: præterea & ea quæ iris dicitur,  
& quæ anthera: huiusq; vel ficiis, vel ex melle, vel  
mulso, vel vino. Vtile verò ad talia est & Musci  
medicamentũ, præterea rhois succus, & ompha-  
cium, aliq; strenuẽ siccantia. At quæ simpliciora 20  
oris vlcera sunt, hæc sanare commode possunt et-  
riũ medicamẽta quæ modicẽ siccẽt: veluti quod  
ex moris conficitur, & quod ex rubi fructu, & qd  
ex succo corticis iuglẽdiũ viridis, argenti huius  
magis, quod ex mĩstro & cupressi spherulũ cõ-  
stat. In vniuersum autẽ, genus quidẽ medicamen-  
ti, ab ipsa curandã partium subtilitã & affectu  
est sumendũ: vtendi verò modus, à figura & situ.  
Siquidẽ quæ in ventriculo, pectore, & pulmone  
vlcera consistere, per ea quæ eduntur, bibuntur, 30  
quæ curanda sunt. Quæ verò in intestinis, bifi-  
da est. Nam quæ vicina ventriculo sunt, his per  
comestã bibitaq; succurrunt. Quæ verò inferius  
sunt sita, per ea quæ iniiciuntur: quippe neq; ad ea  
quæ vicina ventriculo sunt, subire potest quod  
per seclẽ infunditur: nec integris virib; ad inferio-  
ra perringere, quod per os sit ingessũ. Quamob-  
rẽ thoracis atq; pulmonis vlcera, nõ diffidius his  
quæ in ventriculo sunt, sanantur, vt quorũ situs  
longius abest, atq; idcirco medicamentorũ vlti- 40  
mitatur: tũ propter hoc ipsum multo valentio-  
ra ea quæ devorantur præstidia requirunt, quàm  
si ipsi statim vlcibus admouerentur. Quod si  
igitur pulmonis atq; thoracis vlcera expurgatẽ  
per tussim, ventriculi autẽ per vomitũ & deie-  
ctionem, id ob ipsarũ partũ contingit formẽ.  
Cæterũ quiẽ ventriculo cluere pus volunt, nõ  
sine periculo vomitũ prouocant: sciri si aliter in-  
fixũ illi pituitũ per oxymeli & radicũ deerge-  
rẽt. Tutius itaq; est deiectione vti, quĩ vomenti  
periculum sit, ne & quod exviceratum est dilate-  
ret, & succũ quempiã in vltĩ ex vicinis attrahat.  
Porro si in pulmone rursũ pus sit, sic licet, nisi  
protinus, anteq; exaltet phlegmone, glutine-  
tur, id postea insanabile fore. At vlcera interioris  
thoracis asperæ atq; atrox, & præcipue laryngis, cura-  
tionem sanẽ recipiunt per medicamẽta humida  
quidẽ, sed faciliare exsiccantia: quæ retineant o-  
re, paulatimq; per faucẽs deuant, idq; vtroq; la-  
cente supino. Lac etiã, ad talia vlcera vnice com-  
mendatur, sed præcipue qd Tablis habetur, quĩ  
nimĩ illud locũ sit his aditus, & ac circumda-  
tus siccus, & pascuum pecoribus salubre. Lixebit  
autẽ tibi simulẽ locũ etiã arte parare, inferẽq; 60  
in eo agrostim, lorum, polygonum, melisso phyl

lum, lentiscum, arbutũ, rubũ, leedẽ, cytisum, &  
alia id genus. Iam verò lac bubulũ, crassum natu-  
ra est: alinum, tenue: capillum deniq; medullã  
consistenti fortur. Verum muliebres lac tabidas  
auxilatur eximie, quũ uaturæ humanæ sit admo-  
dum familiare. Hoc tamen de lactis vĩa, sit ma-  
ximum & cõmune præceptũ, vt quibus eo est o-  
pus, omnino id affante animali statim multũ  
ebibant: etiam melle insecto, si cui cogi in ventri-  
culo soler, necnon sale, si ipsum cinis ad alium  
descendere cupis. Quod verò ad sanguinis reie-  
ctionẽ ex catharro ortam pertinet, quom olim  
acerrimũ fuisse ad splendidã quandã matro-  
nã Romanam, tali affectu prelescent, incidere il-  
li venam non placuit: quandoquidẽ id quãtri-  
dũ sine cibo egerat propter catarrhũ: sed iusi-  
si vt acci vteretur clystere, tum crura manũq; cal-  
facienti pharmacũ plurimũ perficeret, vinciret-  
que: mox caput raderet: cui deinde medicamen-  
tum ex palumbium stercore cõstat, impositũ: in  
terpositũq; horis tribus, in balneum duxi, ac la-  
ui, nullo caput contingens pinguĩ. Dein caput i-  
doneo pilo contexi, & pro eo qui tum erat tẽpo-  
ris statu, nutriti sola forbitione: postquam, sta-  
tum fructũ aliq; autumnaliũ autumẽ dedi.  
Quom autẽ dormitura esset, theriacem propina-  
ui, cititer quatuor menses antẽ consecũ. Habet  
enim id ætate adhuc prævalentẽ papaueris suc-  
cum, qui in antiquitatis signa redditor: ideo-  
que & somniferũ est, & fluxiones tum siccã, tum  
leuiter crassã. Secundo autẽ die iusi omnes eius  
partes fricari, vno capite excepto: ad vespẽrã ve-  
ro portexi rursũ theriacem ceu fabæ nostræ ma-  
gnũ amplũ. Erat enim quod pridie acceptar, hoc  
lõgẽ diuise. Postea verò qd hac quoq; nocte, p-  
be dormisset, tertio die manẽ mel coctũ copiose  
exhibui, & in quiete seruauĩ. Procedente die to-  
tum corpus similiter fricui, ac pisanæ cremoreẽ  
cũ pane euiguo, pro cibo sumere iusi. Mox quar-  
to die mane de dũ theriacem cõsistentẽ in ætati vi-  
gore, idq; cũ melle copioso. Capiti verò mulieris  
eodem pharmaco, quod vehementer tum siccã,  
tum calfactũ, imposito, ac dein ipsa lota, nutritã-  
que modicẽ, valentius iã pulmonem expurgare  
sum in quinto conatus. Ac de hunc rursũ, rur-  
sumq; ex intervallo, ad caput quidẽ cõsuetũ cẽra-  
to, quod thapsiã recipit, sum viciũ. Totũ verò cor-  
poris cursũ, in gestatione, frictione, ambulatione,  
lauandũq; abstinencia, ac victũ nõ moderatũ,  
tũ boni succi, ad reficiendũ dexti. Qua in dũstia  
rectẽ se habet mulier, minime lactis opem requi-  
rens. Alteri verò adolescenti, cui ex refrigerantis  
spiritus instrumentis orta tussis fuerat, quũ san-  
guinẽ ipse eiecisset ad dimidiã hemina m, statim  
venĩ inodi, ac bin eo dẽ die ex detractũ sangui-  
nẽ: deinde rursũ posttridie bis sed artũ frictio-  
ne & vincula priore die viciũ, ad vespẽram dedi  
pharmacũ nostrũ, quod diaspermato dicitur.  
Secundo die post alterã detractionẽ impositũ  
topi pectori ceratũ quod ex thapsiã cõficitur: mox  
vespẽrẽ, ne supra modũ calfaceret, id auferẽ. Ter-  
tio die rursũ ad treis horas imposito, hominem  
laui. Cibauĩ autẽ similiter tribus his diebus: prio-  
ribus quidẽ duobus, forbitum culis: tertio ve-  
rò, pisanæ primum cremore: dein, pise statim 80

Iac bubulum  
affluam.  
Capillum.  
Lac muliebres  
tabidas esse ma-  
ximè congrui.  
Lac afficit an-  
imali statim  
multum, bu-  
bendum esse.  
Lac quando  
sal et mel iun-  
ciendum.  
Sanguinem reie-  
ctum à catarr-  
ho prodru-  
at curatio.

Theriacem qua-  
drimestris iun-  
ctura.

Sanguinem hũ-  
cadem die ex  
eo cadem ve-  
na detractũ  
Galeam p-  
dicatũ sangui-  
nem ob refriger-  
tata spiritus  
instrumenta.  
Diaspermato  
medicamentum.  
Ceratũ ad  
thapsiã.

aliquo, qui facili concoctus esset, adiecto. Dedi quoque medicamentū diaspermatō & secundo & tertio die similiter circa vesperā: quippe & somnū cōciliat, & sensum doloris leuat, & succidit vim huius. Vbi autē & spiritus delegatę partes in naturalis essent tempore, & totū corpus vacuatur, & nulla phlegmonis suspicio iuxta ruptum vas faceret, tunc expurgare in cepimus. Mox propinata theriaca vigentes ætatis, illum ad Tabias dimisi. Ex his verō qui vlcus in pulmone habent, quidē insanabiles mihi esse videntur, qui ex succi vinirosi erosionē id possident. Oportet autē in principio nullius rei æque esse sollicitū, quā ut neque rufiant, neque ex capite aliquid in pulmōē defluat. Cauetur id triplici præsidio: purgatione primū: secundū, medicaminē qđ diaspermatō dicitur: tertio, ipsi capiti providendo. Quod purget, diuersas facultates habet oportet: cuius generis nostrę sunt pilule, quę ex Aloē, Scammonio, Colocynthis, Agarico, Bellido, & Gummi Arabico cōficiuntur, ad plures videlicet purgandas species excrementorum. Capiti providebitur etiam vsu quod ex thapsia cōstat. Atq; hæc quidē sunt peragenda in principio. Post verō reficiendus est pger salubriter, cibis boni succi, frictione, inambulatione, & balneo, ac præterea lacte fouendus. Quicunq; parū habere sanguinis videbuntur, his ad quendā succū probiorē reductis, detrahere sanguinē poterit: tum rursus reficere: eosdē etiā rursus purgare, ac rursus reficere: de-  
 nuoq; si res suadeat, sanguinē mutare, postissimū quibus veluti limus quidā vitiosus & crassus, totus est sanguis. Ac qui sanguine abvndat, ita ut iis a principio minuetus est. Itaq; per hæc tria, q; planē deplorati non sunt, oēs servatur: neq; per detractiōnē sanguinis, & purgatiōnē, & ea quę caput roborat. Quare minime a parvis incipientium auxilium est, in quo morbis maximū impendet periculū. At in leuioribus, licet quidē leuiora experiri remedia. Sciendū autē est interim, si nō possit ut glutinetur vlcus, si phlegmone pulmōnem invaserit omninoq; si iuvaverit, febricitarum hominē esse, ac purulentū deinde, quū solvetur phlegmone, expuratur rursus. Porro vlcera quę citra phlegmonē in pene, sed & cōstitunt, nullū cataplasma desiderat, sed medicaminē qđ cicatrice inducat: nō tamen eius naturę, quę vlcera, quę in carne sunt, inducere cicatrice possit: imō quę tanto magis valeat scicare, quanto hæ partes carnes sciores existunt. At talia sanē medicamenta sunt, qđ ex charta cōbuita cōstat: anethumq; vitū atq; respersum, ac deniq; colocynthis combusta. Verū ipsorum, quę in pene iūnt, vlcus, magis scicari postulat quę in toto corpore hæserunt, & quę solum glandulam occupat: minus verō quę in præputio sunt: atq; etiam his minus, quę cumque in reliqua sunt cute, quę totum corpore vestit. Recentibus & sine madore tum sedis, tum pudendorū vlcibus, sola aloē redacta in tenuissimū pollinē, inpersa, salutare medicamen existit. Si milim huius vim habet cadmia vino elota, & scica. Ab hac nō longe abest lithargyros. Deinceps verō molybdæna sequitur. Ceterū omnib; tum minus in inferis doloris, tum nullo minus efficacē pōliolys est. Sin humidiora sint vlcera, ipse per

se pini cortex, neq; lapsus humantes, idoneus est. Quid si profunditas quæpiam adit, vbi excorata fuerint, dictorū alicui tantū manne admiscendum est, quantum sit ad carnem gignendam satis.

## GALENI PERGAMENI de medendi methodo, liber VI.

Solutio continuū, in carne quidem, vlcus: in ossē, fractura: in nervosis fibris, spasma: in muscularibus deniq; vlcus atq; ruptio vocatur. Singuli verō horū affectuū, quatenus quidā affectus sunt, sui per contraria sublationem inducunt: quatenus autem solutiones continuū, vniuntur. Igitur si cutis tantum acui (exempli gratia) alicui sit puncta, faciliq; in eo sanescant vlcera, etiam si citra medicamentum, quodque membro, ipsum ad consueta dimittas opera, nihil sentiat mali: sin verō egrē in illo spūentur, primū quidem dolebit, post etiam tum pulsu particula insectabitur, tū phlegmone. Quare minime imponemus medicamen qđ glunnet, sed molle, & blandū, & quod dolorē mitiget. Siquidē vbi magna diuisio est, ibi studium impendi debet, ut magis scicribus remediis labra vlcis & vniantur, & coalescant: vbi autē acui styloē & facta diuisio fuerit, id dū taxat curādū est, ne phlegmone teneatur particula. Porro vbi aliquis nervus est punctus, cutim ipsam apertā servare oportet: aut qđ tunis est) latius incidere, ut per eā ex nervo vulnerato effluat sanies: dein verō admoūda quę simul dolorē mitigent, & exitum saniei patefaciant. Si virtus vegeta sit, sanguinis misio est expedita, purgatioq; vniuerū corporis, si viciosa succi reddiderit. Aqua verō calida, quanq; reliquas phlegmonas valde mitigat, vulneratis tamen nervis inimicissima est, quum præsertim eorū subtilitas ex refrigerata cōcretāq; humidiora materia sit cōstituta. Omnis quippe eiusmodi constitutio, per ea quę simul calfaciunt humectant, resoluunt, atq; purificat. Quare præstat oleū teuium partium, & veteri, & calido, nervos punctos fouere. Hoc si quidē, si frigidum applicetur, tenues meatus obstruit: sin calidum, digerit. Et tenem medicamen quod nervi puncturę auxiliantur, debent esse facillate tenuia, modicęq; calfacientia, & quę sicca re citra dolorē possint quādoquidē sola hæc trahere ex profundo saniem, nec demorsā, nec cōtracta particula, valent. Ego itaq; vni vltis primūm resina terebinthina, tū per se, in iis qui molli crās carnetum cum euphorbio, in iis qui dura. Non secus enā & propoli, nō per se modō, verum etiā cum euphorbio ipsam molliens: q; si durior esset, cum aliquo tenuis oleo. Quin & sagapeno, opopanacēq; sum in duris corporibus vltis, vtiq; cū oleo & terebinthina id miscēs. Sed emplastrū ex lachryma Cyrenica nō in vtile ad id fore mihi videt. Nec secus sulphur viuum, ac minime lapidosū, tenui oleo permistū, donec fordū crassius rudinē cōtrahat. Calx etiā lota, oleoq; cōmista, si militer auxiliat, præcipueq; si in ætu caniculi bis tervē aqua marina abluit. Ego verō ad nervos punctos hoc vti confuevi emplastrū: Cere parē vni resine terebinthinę, aut (loco eius) lumidę plinę, aut colophonę, aut abietinę, vnius partis dimidiū: picis rāundē. Si itaq; humidā resina miscēbia

Diaspermatō  
medicamentum  
980.

Pulmonis vlcera  
contracta  
ex vitiis succi  
erosione esse  
propterea insana-  
bilia.

Pulmonis er-  
roris curatio.

Cataplasma de-  
scripta a Galen-  
o.

Pulmonis vlcera  
in iis quę de-  
plorati non  
sunt, curari per  
detractionem  
sanguinis, pur-  
gationem, &  
ea quę caput  
roborant.  
Extremo mor-  
bu extrema re-  
media adhiben-  
da esse.  
Pudendorū vlcera  
quales vlcera  
dicuntur a po-  
liolis.

Aloem in persan-  
gine soluta  
in medicamentum  
sola ita p-  
parandum re-  
cordebo.  
Medicamina  
vlcibus sicut  
et pododem  
non apta.

Solutio vni-  
us continuū.

Punctus cutis  
est.

Punctus nervi  
vniū est de-  
latandus.  
Punctus nervi  
in vlcera.

Aqua calidior  
est vulneratis  
nervis & vici-  
osissima.

Nervus punctus  
oleo calido fo-  
uendus est.

Punctus nervi  
spasma molli-  
bus resina positi-  
one.

Terebinthina  
auxilium po-  
test.

Punctus nervi  
emplastrū opo-  
rtet.

miscetur, tuncsum tribuatūq; euphorbiū reliqua immittebis liquata. Esto verō pōdus eius, pars cere duodecima. Sin sicci, sicvni quæ colophonin dicatur, vtriq; olei parvū desiderabit euphorbiū. Itaq; vulnera neri curatio medicamentū postulat, quæ & tepidū calorē excutit, & valeret siccat: tū quæ ex subititice suæ natura & arrahēdi vim habeat, & tenuiū sint parvū. At si nervus nō punctus, sed per directū sit cōsus, nudūq; divisi cutē ostēdatur, vim euphorbi nō feret, ita vt quāvis terposita cuna est, ferre potest. Quare tūc opimē calce elota, & in plurimo oleo soluta vitē. Salutate etiā est medicamentū, qd ex pōpholyge medicamentū sit, si in largo siccō oleo soluta. Quod vtiq; melius fuerit, si tū rosacēū ipsum, tum oleū, salis sit expers. Porro quæ ex metallis cōstant medicamentā, ea elota oīa esse debēt, si citra morium sint siccatūra. Salubre verō medicamentū est, qd ex melle soluto in oleo infuso cōstat. Cera præterea, terebinthinaq; si his miscantur, elui prius debet. Quippe medicamentā omnib; quæ laueris, acia mordēsq; sanies eluitur, abstergeturq;. Si vero robustus sit q; vulnus acceptū, & cui corpora sitā supervacuū humorib; mundū, in hoc fas est valenioribus remediā nōnulla vti: cuiusmodi sunt linamēta imbuita pastillis Polydyq; sapa solutā, & super aqua calida reposita. Nā eorū quæ vulnera neriū contingūt, nihil esse frigidū debet: quādoquidem ea pars maximē sensilis est, & principū parvū primari cōtinua, et tēperamento suo frigida. Quorū omnīū occasione faciliā frigido ostēditur, & suam offensam impertit cerebro. Quod si ex eis fuerit qui pervenit ad musculos (sunt. n. hi in trumēta voluntariā motionis) est cōvulsio nō faciliā accersit. Idē fore & in tendonibus expectabilia, si sēd de causis. Sanē oleo p-fundere tale vicus nō cōvenit: nam oleum virib; nullius pastilli est adversū, vicūq; sordidum reddit. Nec efi parū interēst, nudōne nervus, an per interpositū cutem admoveas. Abluenda igitur ā vulnere est sinicia per latam mollē specillo circūvolatū, ac in principio quidē sapa madefactum, exprēssimq; postea verū vinū dulcē, sed omni mordēte qualitate carente. Nam quæcumq; dulcia pariter & fulva sunt, vt Falernum, ad id invilia existunt. Quippe acia sunt omnia talia, & supra modū calida. Vicere verō iam ad cicatricem veniente, quæ alba planē sunt, & tenetia, nec multam aquā tolerant, nec odora sunt, ea dulcibus prestant. Aquæ verū vīam ad nervū vulneratū perpetuū fugies, sicvti & cataplasma relaxat. Ad iam dictū pastilli vīum proximē illud medicamentū accedit, quod diachalcitico vocant. Liquari autem id debet, restate rosaceo, hyēne Sabino oleo: Quod si Polydy pastillus nō inperat, Andromis vel Passonis, loco eius sumendus est: vel noīster, qui etiam omnibus eis est valentior. Vbi verō neri alicui transversum est vulneratū, denāre hū larguā sanguinem expectat: ac tenui magis, quā in illis, vi vīctus ratio nō: tum in quiete omnino alectuā molli hominem continere: tum oleo calēri vberit in axillis, collo, tendonibus, ligamentis, & capite vti. Quod si vulneratus neriū ex his sit qui in crure habētur, sicvti quā in manu est, alia, ita in his bu-

bones largo oleo imbendendi: nī per totū spinā ad collum & caput ascendendū. At cōtusi neri, vbi cum etia est similit & ipsa curis cōtusa, cataplasmate ex oxymelite et fabace farina curtur. Qui verō absq; cuna a simili affectu, cōtusi sunt, in oleum calēna, arg tenuiū parum, auxilio est. At si dolor vīā cum cōtusione curis & neri infestet, etiā picem liquidā immiscere illi cataplasmati, ac bene coquere, tum calēna medicamentū imponere oportet. Vbi verō magis siccatā efficere volēs, erui farinā iniicies. Quod si vt amplius quocūq; siccatē desideras, irim immitte Myricā. At si totus præcisus neriū sit, merus præterea nullus instat, debilis sit remanebit particula. Curatio verō eius cōmunis est cum ea, quæ aliorū est vicerum. Ligamenta autē, quā similitū habēt specē tendonibus, valentissimorū remediōrū vim tolerant: neq; ad cerebrum pertingant, & sensus sint expertia. Nā neri omnes, alij ex ipso statim cerebro habent ortū, alij spināli interveniēte medulla. Tendones quoq; quoniam ex nervo & ligamēto cōstant, quatenus neriū pariticipes sunt, ea tenus ex cerebro oriuntur, minus tñ q̄ ipsi neriū cōvulsionem accerant. Ligamenta verō, quā ex osse ortū habēt, quæcumq; rotunda sunt, ea neriā sunt cōsimila: duritie tamen plurimum distendunt. Verū in eo quodd alba sunt, & exangua et cauitate carētia, & in fibrā diuiditur, similitudo illis cum neriis & tendomb; cōstat. Ligamentū igitur vulneratū, si id est quod ab osse ad os p-meatur, & maximē sine periculo est, & si id sicces q; sublibet medicamentis, nihil hominē offendenda. Sin id qd se in musculum insert, quātō est nervo & tendone minus opportunū periculo, tantō vtiq; meli rectē curatur, reliqua ligamenta magis terrere debet. Sed iā opere prædū est, vt de abdominia vulnere aliquid etiā dicamus. In abdomine extrinsecū cutis omnibus atēstatur: quæ in membranā finitur. Post cutem, medio circiter loco, nerua tenuitā musculorum gemina rēditur, membranarū ritu. Post has deinceps habētur duo musculi recti, et carnosī, qui a pectore ad ipsā pubis ossa perveniunt. Arg hęc quidem omnia sibi murū cohærent, abdomenq; cōstituunt. Quod verō deinceps hoc excipit, peritonæū vocatur, estq; ex corporibus duobus exanguib; & nervosis constitutum. Verū alterū eorum nervosa tenuitas eorum musculorū est, qui per trāversum se agunt: alterum, membranā pectenus, velvni aranea, quæ vtriq; varē est peritonæum. Ac tale quidem in medio sui est abdomen. Partes verō eius, quæ vtriq; ad latus ad quatuor quasi digitos recedunt, hęc ita in autē obliquos musculi loā habent: priores quidem, qui a pectore demittuntur: secundos, qui ab ilibus ascēdunt: dein post hos, transuerfos vtriq; musculū, sub quo est peritonæam. Ergo & minus periculi in hoc loco convulsero est, quā in medio: quoniam tenuem oponeurosim nullam habear, & futura in medio difficulter administreretur: quoniam nimirum & hac parte maximē proximant intestina, & vgrē inibi cōtineri queant. Si igitur maiora sit abdomen vulnus, tum plura necesse est intestinū excidere, tum difficilior denud immiti: quāquam & parva vulnere tractatu etiam sunt difficilia. Nā

Centasi neriū caratu.

Ligamenta sunt quædam membra, quæ cum cōtinuis vicerib;.

Neriū oriuntur a cerebro. Tendones cōstant ex ligamento & nervo.

Ligamenta oriuntur ab ossib;.

Abdominis descriptio.

Peritonæum.

Abdominis pars, quæ antea est vulnere, quæ argenteo curato in qua cuncta sunt ad latus.

Punctus neriū quāvis desiderat medicamentū.

Metallia medicamentā debet elota esse, si citra morium sunt faciatūra.

Nervi vulnerati nihil debent admoveri frigida.

Metallia sunt interfectoria vulneraria moriosa. Oleum rosaceum vulnere sordidum reddit.

Nervus vulneratus necque ea quæ sunt relaxantia cataplasma admoveantur.

Nervus transversus si vulneratus curatur, nervus vulneratus in brachio acvitur, in crure, bubones largo oleo foveantur.

Abdomine vul-  
nerato, ut me-  
diocriter forami-  
ne salutarum  
angustia.  
Inferius exi-  
dentibus per  
abdominis  
vulnus quid  
agendum.

nisi q. procidit, illic in suum reponatur locū in-  
flatur, surgit in tumore: quoniam sit, ut per angustū  
foramē immitti nequeat. Quare minus graue p  
huiusmodi vulnera, mediocriter foramē est. Prin-  
cipid itaq. id agendū est, ut intestina quæ excide-  
runt, in suum recedantur locū. Secundū, ut vicus  
suatur. Tertio, ut medicamē imponas. Quarto,  
ut ne qua præstatio pars simul afficiatur, prospici-  
as. Si ergo adeo parū sit vulnus, ut inflatū in-  
testinum ex frigore ambientis aeris remitti ne-  
queat, discutiemus statim spongia molli, & ex  
calente aqua madenti, mixq. expressa, intestinū  
ipsū calfacientes. Prepararetur verō interea vi-  
num austerū calidum: quippe id magis calfacit q  
aqua, robōq. intestinū addit. Quid si huic quo  
que præsidio, intestini inflatio nō cesserit, incidē-  
dum peritonē tantulum syringa rotomis est, quā-  
tūm ē qd excidit, repōndū sit sanis. Scalpelli ve-  
ri quib. acies vtrinq. habetur, aut quibus cuspis  
acuta est, sunt omnino fugiendi. Si autē labrū  
sit talis, ut quæ vulnerata pars est, sublimiorē  
semper locum nō habeat. Cauendumq. magnopere  
est, ne id quod exciderit, degrauietur quicquid  
ab intestinis aliis. Qui igitur intestina per mag-  
num vulnus præcipia, reponere in propriū vult  
sedem, is vbi totum vulnus manibus suis extrin-  
secus apprehenderit, debet intus reprimere, tam  
cōstruere, ac exiguum semper fuerit prænu-  
dare: quoniam id ipsum quod assutū est, modicē  
cōprimere, quoad intum perisutur. Quoniam igitur  
coire conalescereq. oportet cū peritonæo ab-  
domen, incipiendum quidē a cute est, atq. ab ex-  
terno introrsus acus incipienda. Vbi verō tum cu-  
tim, tum rectum musculum totum transeuerit, præ-  
terito quod ei subest peritonē, per reliquum pe-  
ritonæum eam ab interno extrorsus inuicias, atq.  
inde per reliquū ab domen ab interno extrā trā-  
smittes. Vbi hoc penitus penetraverit, rursus ab  
externo introrsus idē abdomen est perforandū.  
Max vbi peritonæum quid illi quæ subhæret  
præterieris, atq. ad contrarium veniens, hoc quo  
que ab interno extrorsus est perpungendum, vnaq.  
cum eo totum ipsi coniunctum abdomen.  
Deinde ab hoc incipiendum rursus, atq. id cum  
contrarin peritonæo consueudum: ac rursus vi-  
cina quoq. cute transmissa, iterum ab ea parte a-  
cus introrsus est trahenda, cōsuendumq. abdo-  
men id cum peritonæo contrario, etiam insibi vi-  
cina cute transmissa. Atq. hæc iterū iterūq. faciē-  
da, quoad totum vulnus similiter consueuerimus.  
Quod verō ad intervallū punctū nū, earundēq.  
altitudinem pertinet, medicritas eligēda est. Fi-  
lum etiam, inter durum & molle medium quod-  
dam nō tinear. At verō medicamenta, quibus in-  
lis vtetur, eiusdē materię sint, cū vulnera gluti-  
nabuntur. Sunt qui aliter vulneratū abdomen cō-  
suant, ad hunc modum: Oportet a vicino nōbis  
abdominis incipere, atq. ab externo introrsus p  
id tantum acum transmittere. Prist. præteritis v-  
trinq. peritonæi labris, ex aduersa parte ab exter-  
no introrsus per vtrūq. eius labrum acum revo-  
care: dein rursus hæc reuocare, atq. ab interno ex-  
trorsum per aduersum abdomen trahere. Atq. ita  
totū peritonæū sibi mutuo coalescere, prorsus  
intra abdomen absconditur. Deligatio verō extra

Abdomen vul-  
neratum con-  
suendo ratio.

secus, vel præcipue in his necessaria est. Ad hæc qd  
inter bubones & axillas est, id totū molli lana ex  
oleo mediocriter calido imbata circūdare oportet.  
Sanius itē fuerit, & si per dysterē intestinis a-  
liud simile infundas. Quid si qd ipsū intestino-  
rū sit vulneratū, qd extrinsecus fieri debet, omnia  
similiter vt diximus, sunt peragenda. Ceterum qd  
in iunctis, vinū nigrū austerū, & tepēs erit. Ac cras-  
sa qd intestina, sanata facilia sunt: cōtrario dis-  
ficilia, qd tenuia existit. Ieiunū autē est omnino in-  
curabile, tum, ppter magnitudinē multitudinēq.  
vasorū, tū q. tunica eius neruosa, prætenusq. sit.  
Adde q. tum bilē synceram hinc intestinū recipit  
vniuersam, tum q. omniū maximē est vicinū ieci-  
noni. Vetrūculi autē q. carnosq. partes inferne sunt,  
curare cū fiducia tētabis: q. verō in ore eius sunt,  
et sensus acutē quo minus sanentur, nōbescit: atq.  
hinc etiam q. medicamenta illic diu lurrere nōn  
possint. At verō nōnnulli per vulnus excidentē  
(præstat enim hæc pars animālī vsum nō vique-  
adent magnam: cōstatq. ex membrana tenui, ar-  
terias atq. venis cōtexas) si qd ex eo nigricans sit,  
excipiemus id vinculo, ac sic, qd post vinculum  
est, amputabimus: atq. vt in imo suo ēā prædictę  
suture abdominis, pendēt ipsius vinculi extre-  
ma, curabimus, quō nimirum ea, quæ ex vulne  
re suppurat eueniant, faciliē recipiamus. Sed  
id ad fracturę curandū veniendum est: cuius qd-  
dem scopus vniū existit. Ceterum coalescere ne-  
queunt nra iuuenum, adulescentum, cōstitutiū  
ætate, necnō senum, nō eorum maximē siccitatē  
duritiēq.: tametsi interveniente alia quapiam  
substantia crassiuscula (quæ ex propini eodemq.  
crasso ipsorum infusum alimento redvnda) cum  
crefcentēq. in labris fracturę, possint ceu quodā  
glutini separare nris partes connecti invicem,  
atque cōglutinari. At verū qd abvnde sunt mol-  
lia, qualia in puerulis cōspiciuntur, ea sola vni-  
tūnem recipiunt. Ergo si nō aliquid per trāsver-  
sum frangatur, sic disident a se eius partes, vt ē  
directo nō saccant: quare primō curandū est,  
vt in directum & contrarium agantur, iuxta inte-  
grę exemplum: a qua nimirum certissimā trās-  
positiōnis fracturæ osium indicatio sumenda  
est. Quæcumq. igitur retrorsum (exempli gratia)  
magis sunt acta, ea prorsus magis impelli cōve-  
niet, nec minus alteram quoque fractū osis par-  
tem modicē ad contraria retrudi. Contrā, quæ  
prorsus sunt emta, hæc rursus ipsa quidem re-  
trorsum, reliquā verō partem sensim duci pro-  
sum: nec secus de ceteris differentiis. Cauendum  
tamen est interim, ne iū adducendis cōtrario mo-  
tu partibus, extrinsecus fracturæ osium frangan-  
tur. Quibus sanē cōfractis, nōn poterunt ad a-  
mutuū inter se coaptari fracti nris fines. Ob id  
quæ disidentia nra, ē directo admoda esse o-  
portet: qd cōmōdē fieri nequit, nisi retracta sint, idē  
aut manibus, aut vinculis, aut instrumentis. Pos-  
tea verō quā abvnde revulsa fuerint, nec vilius  
superfiteris, nese in adducendo tangantur in  
directū opponere, vinculis remittere, ac mu-  
sculis ipsis ductorū in idem cōmissio nōn  
permittit expediri: interim verō te ipsum quib.  
manib. subferre: & sicubi aliquod paulū sub-  
sulset, corrigere atq. formare. Ab his secundum,  
quod

Inferius ali-  
quo vulnerato  
quod apertum,  
sanctius trās-  
sa esse sanam  
facilia. Diffi-  
cilia autem qua  
tenuia existit.  
Ieiunū san-  
ctius vulnus, ac  
sacratissimū.

Omnino exci-  
de per vulnus,  
quid agendum.

Fractura su-  
perioris vici-  
nis. Offa vbi moli-  
sima sunt, vici-  
na sunt.  
Culmī gluti-  
nanda osium  
natis et ali-  
is conuolunt.

Offa puerili  
sola possunt  
vni cōglutari.

Fractura cura-  
tio.

Abdomen vul-  
neratum con-  
suendo facili-  
tas molli.

quod dirigitur, fuerit, ut immotū prorsus membrū cōsistat, ne quid eorū quæ effluxerit, moueatur. Ne verò per motiones ipsas disingatur ossa cōmissa, tura deligatura cōplecti fracturam oportet. Quam sanè deligaturam nec adeo debemus arctare, ut eam cōprimat: nec remittere ita, ut sit laxa. Ac pectus quidem latissima fascia cōgruit: artubus autē & iugulo, angusta, sed quæ tantum ex versum numero securitatis addiciat, quantum ex angustia deficit. Ad hanc deligaturæ principii debet super ipsam fracturam iungi, ac circumduci bis tēve: hinc verò ad membrum reliquum dispensari. Siquidē qui sic deligat, & ab integris ad laborē partem sanguinis cōfluxum arceat, & quod iam collectum in ea est, exprimit: prohibet quæ circa fracturam excitari tum phlegmonem, tum sphecacelum, quæ ossium carnes & corruptela existit. Ceterum quum duæ partes sint, quæ recipere aliquid à laborante particula, & transmittere ad eā possint: utiq; quæ superiacent, tum propter multitudinem, tum magnitudinē, ad ambas magis sunt habiles. Extremæ verò, propter casus cōtrarias, exiguum quidem aliquid vel recipere, vel transmittere possunt: at multum nec regis subministrare, nec ab ipsis recipere. Sed nec iola deligatura fasciari est satis ad cōmissuram ossium tutelā, nisi etiā & splenia vna cum fasciis exteriorib; adhibeantur, quæ huc quoq; ipsa stibant. Ne autem phlegmone oriatur, cerato est humido vrendum. Iam verò repositionis figura eligenda est, quæ à dolore maxime sit immunis, quod nec phlegmone particula cōtrahat, & reger persistere in vna ea diuissimè immotus possit. Ac talis sanè est quāmaximè naturalis membrum, ut brachio quidē, angulosa: cruri verò, quæ paul minus porrecta est. Verum ad dolorē vitandū, non modo naturalis habitus cuius instrumento est utilis, sed etiam confectus quoq; cōducere nonnulli videtur. In vniuersum autem tum excedere, tum effingere, tum deligare, tum reponere, vna ea figura, quæ doloris minimum habeat, est studēdum. Soluere autē deligaturā tertio die debet, ne in membro præter solitum cooperto, dolor aut pruritus creetur: nec eius, quod id fracturæ est infixū, perspirare prohibeatur. Cuius occasione nō modo noxius pruritus quibuscūq; accidit, sed etiā cutim ob acrimoniam saniei erosam exciderari. In fundendū igitur tantū temperatæ aque est, quantum ad evocandū eiusmodi saniem sit satis. Quod si rursus quoq; simili modo facies, sit septimo id à primo die facere debet. Apparuerint verò iam omnia phlegmone libera, & q̄ pro naturali habitu magis aliquandū gracilia. Tunc igitur licebit & ferulas circumponere, & soluere ex maiore intervallo. Nā antea quum phlegmone periculū esset, nō erat tutum ferulas premere. Quod si ex longiori intervallo eas soluas, callus multo felicius cōcreset. At vbi adeo excorata sunt ossa, ut callus produci nequeat, tertio vel quarto die modicè aquam calidam infundemus, donec carnes in rubrum tumore atollantur, deinde usq; prius q̄ subdere incipiant. Vbi verò aliquid digere volumus, nō prius est desistendū, q̄ quod ex perfusione innumit, substat. In quibus autē, quo minus callus in fractura

perueniat, humiditas ab vndāior obstat, ibi hanc ficcare cōuenienti deligatura, & plussione aque, quæ vel minima omnino sit, vel plurima, conabimur. Minima quippe, humores qui in superficie sunt per spiritū digerit: & qui in alto laxe, modicè liquat. Plurima verò, digerit plus q̄ attrahit. Cōstat autē, in ea qdem deligatura quæ exprimit, minus esse arctandū fasciarum fines: in ea verò quæ ad renutiendum est comparata, nec minus hos esse arctandos, & vniuersos circumductus laxiores faciendos. Quo tempore callus gignitur, nutriendum corpus est cibis optimi succi, & qui multum nutriat: ex quibus peruenit succus consuevit, nō solum bonus, sed etiā tenax, qualis desideratur ad calli generationē. Magnitudo autē calli ea sit, quæ & ossibus tuto vinculo exstat, nec musculos tū cōprimat. Quare danda opera est, ut si minor iusto perueniat, augeatur: vel inhibeatur, si immodicè crescat. Sunt verò quib; hæc efficies, ipsius perfusionis quantitas, qualitasq; præterea ciborum quantitas, & medicaminū quæ illi imponuntur extrinsecus, facultates. Etenim quæcūq; emplastica substatnā habent, ac modicè calfaciunt, ea callos tum promouent, tum verò augent. Quæ verò digerendi vim obtinent, ea magnos tū callos diminuunt. Cōseruant in proprio statu, medicamenta quæ cruentis adhibentur vuluerib; Atq; hæcenus de transferis fracturis. Longe autē, similiter sunt curandæ, ceterum cōprimendæ magis in ipso fracturæ loco: tū quod recessit, retrudēdū intorsum est. Quæ verò multifariā cōtracta sunt, iis splenia circumdantur fasciæ ritu incurvas, ut monet Hippocrates. Medica menta etiā omnia ex siccanis sunt numero, atq; ex iis quæ enema vocant. Capitis autē fracturæ simplices, quæ ad secundā vigiā laminā caluarie perueniūt, scalpellis angustis indigent. Expedit autē hos, ut numero multos, sic effe magnitudine impares. Atq; vhi os viniatum nudatū fuerit, primo quidem vitandū lanore est: secundo loco, eo qui fitillo angustior: mox ita deinceps reliquis, vigi ad angustissimū omnium: quo sanè est in ipsa secunda lamina, quæ diploë appellat, vrendum. Post hæc tum protinus, tum ad finem vigiæ sic effe medicamentis medicandum, quæ ob id cephalica vocantur. Ea cōponuntur ex iri Illyrica, & erui farina, & māna, & aristolochia, & panacis radicis cortice, & in summa, omnibus quæ extergere citra morsum possunt. Ipsa namq; generatio carnis, naturæ opus est. Itaq; ægro ad eam rem nihil est opus arte medica. Ut autem quæ peruenit caro coalescat, circumherere q̄ omni ossis parti, id inde maxime eveniet, si ne cioris super eo sit, nec oleosa quæpiam pinguitudo. Id igitur est, quod ægri medici ad carnis produciōnem præstant, ut tonus locus ficcus sit, tum quælibet ossis vitari pars planè pars. Ex fracturis verò quæ ad cerebri vigi membranas perueniunt, si simplex tantum fractura sit, angustis scalpellis vrendum. Sin cum confusione aliqua, quod contusum est, excidi debet: idq; vel terebellis prius in circulo foratam, ac mox scalpelli admotā, vel pronus ab initio cyclicus. At quæ per terebellam quidem raro fungitur, parum tuta est: propterea quod dum audacius eam tractant, duram

Callos parando qualis videri conueniat.

Callos promouent emplastica, quæ modicè calfaciunt. Callos minuant.

Callos in statu proprio seruati.

Capitis fracturæ curantur.

Cephalica medicamenta.

Carnis productio, naturæ opus est.

Fracti simul et contusi capitis ossis curatio. Terebella vsum in fractura capitis, seu parietum, Galeni demonstrat.

Fracta ossa deligandi ratio.

Sphecaceli est osium carnes & corruptela.

Splenia fracturæ cōfirmantur requiruntur.

Ceratum humidum.

Ingerere autem q̄ fracto aliquidam esse, quæ minimè dissimulat fracturam.

Perula quando vrendum ad fracta ossa ferenda.



membranam, quæ osi subternitur, non raro violant. Quod vero per cycliscos opus administratur, ne id quidem omnino vitio caret, quum quænarimmodice caput, quod potius quietem postulat. Cæterum si magna sit fractura, & ossa quæ fracta sunt vehementer mota, mihi cyclischorum visus peris cet. Quippe paucis excisionibus facies lenticularis excisorum locum. Sin firma plurimum ossa sint, foranda sunt trebellia. Trebellia autem ipsa, vt mergi non possunt, parum supra

## GALENI PERGAMENI de medendi methodo, liber VII.

**M**edendi Methodum, Eugeniane charissime, quam olim in Hieronis gratiam scribendam susceperam, postquam illum functum vita intellexi, ipsi quoque persequi desistimus. Tunique mihi cõficius es, neque hoc me opus, neque aliud vilius, popularis aures studio fuisse aggreffum: sed quæ vel amicis gratificaret, vel meipsum simul vtilissima ratione ad rem propostâ exerceret, simul ad obliuionem senij (vt Plato inquit) cõmentarios malui reponere. Quippe multitudinis laus, cõmodus & usus vtilissimus instrumentum viuentibus aliquid est: mortuis certe nihil prodest, siuvt neque viuentium quibuid. Nã qui viuere in tranquillo optarunt, & fructum ex philosophia ceperunt, suavitatis quæ corpori curando sufficit contenti, eis vtiq; impedimentum non paruo est apud vulgum fama, vt quæ ipsos à rebus pulcherrimis plus iusto transuersos auerarat. Ego verò (laudat hoc quæ ratione) ab ipsa vtiq; adolecentia iurifice siue inspiratus, siue furore percitus, & vulgi famæ cõtempli, & veritatis scientiæ studio flagraui, nulli esse hominib; neque honestiorem, nec diuiniorem possessionem ratui: ob idq; nulli meorum librorum meum nomen præscripsi. Quandoquidem igitur in præcedentibus cõmentariis, quemadmodum similitudinum instrumentaliū partium cõmunem morbum, nempe solutione cõtinui, curari cõueniat, scripsi: deinceps quod reliquum est, in tui & aliorum amicorum id flagrantius grata addidici, reuertarq; ad eum morbum, qui omnium est primus, nempe qui in similibus nascitur, quibus scilicet primis animantis functiones referantur acceptæ. Est enim hoc morbi genus cognitum maxime necessarium: nec ratione curari potest, primis elementis corporis ignoratis. Ergo quoniam vnaqueque animalis particula propriam actionem prædit, quæ tantum ab aliarum actionibus differt, quæ in ipsa particula ab aliis, quæ illas adunt, diuersa est, temperamenti ratione: sanè qui tuæ partium actionem vult, huc temperiem earum custodiat oportet. Custodiendam autem, si id quod ad calidius conuersum est refrigerabit: qd ad frigidius inclinatur, ex calidiet: ac de cæteris interperantius, tam simplicibus quam compositis, eadẽ ratione. Quæ enim octo earum sint differentiæ, octo nimirum erunt & medendi rationes, quibus particula, per contrariarum quæ exuperat, ad naturalem symmetriam reducitur. Erit itaque curatio vna meta communis, quod dinguatur consilia medendis, ipsius similitudinis corporis alteratio: quandoquidem etiã morbus, ex naturalis temperamenti alteratione est ortus. Medicatio autem particularis, ex materiarum copia, & huius congruente visu cõficietur. Sed horum iam proponamus exemplum, auspiciis à ventriculo. Ac facillime quidem cursu eius alterationes sunt, quæ ex calido & frigido oriuntur, propterea quod maxime affectus qualitatibus corriguntur. Aegrius verò curantur, quæ in humido siccoq; habentur, & qualitatibus imbecillis, curatio earum perficiatur. Ac tempus quidem caloris, frigorisq; reparandi, par quo dammodo est: sc-

*Laudat per  
larem uerum  
nobis prodigi  
fines ut ual  
num quib;  
dem.*

*Galenus in  
ma.*

*Galenus in  
librum juris  
proprum no  
me præscripsi.*

*Similitudo  
partium pro  
mum amma  
in functione  
referantur et  
apta.*

*Incomposita  
rum esse dif  
ferentia uita  
indiget medi  
de rationis.*

*Medicatio par  
ticularis ex ma  
teria copia &  
huius conue  
niente visu con  
ficietur.*

*Ventriculi alte  
ratione quæ  
ex calido et fr  
gido oritur,  
esse curato fa  
cilissimè.*

*Cyclischorum  
visum in me  
gan fractura  
capit quando  
probat Gale  
nus.*

*Lenticularia  
scalpro.*

*Caluarie for  
da ratio.*

*Ostrea ruse.*

*Dimidium fa  
cti quod bene cu  
pi habet.  
Fractura cran  
ij admodum  
expansæ cran  
ij non esse  
periculis ad  
finem ruse.*

*Cranio forato,  
valentissimu  
q; sicu huius  
medicamentu  
gaudet dura  
membrana co  
stri.*

10 sed ex ea maxime parte, quæ fractura est gravisima. Nam præter alia, eni membrana ipsa ab ossibus quæ sunt vehementer afflicta, recedit celerimè. Si verò vnam semel partem nudaueris, atq; scalprum in cuspide, habes præfixam obtusam & lauem lenticulæ speciem, aciem verò per longitudinem erectam, submissam, vbi latam partem lenticulæ statuens super membranam, series in alio leolo, ac sic caluaris quamuisimè diuides. Neque enim qui minus cum periculo, neque celestius perficiatur, forandi modum alium inuenias. Iam verò instrumento, quod ostagram vocant, nonnulla ossium vehementer cõminutorum vel exaltantes, vel cõuertentes, per cam potissimum partem lenticulato scalprio præparabimus aditū. Quod quidem vbi densissimum fuerit, dicere possis illud pro verbum celebre: Dimidium facti qui bene cepit habet. Igitur quod vehementer contrafractum est, id totum est auferendum. Si verò ab eo fragmenta quædã longius excurrant, hæc persequi ad finem non expedit: vitillud persualium habentes, minime sumamus ex eo noxa sequatur vlla, modò reliqua ritè sint nobis peracta. Atque indicatio agendorum hic quoque ex natura ipsarum partium affectarum subministratur. Necessum itaq; in capite nobis (quarenus dictum est) primo fracturæ aliquid denuare, quod videlicet detergere & ablucere à membrana sanem possumus. Post verò, quum phlegmones tempus præterit, omniatq; ad vnguem sunt sicca, carnem producere, ac cicatrice locum includere. Porro quum vnus atq; alter homo occurrisset mihi, habens sin cipitis atq; temporis os contrafractum, equidem in peritus, hoc est sin cipitis, os exemi: à temporali autem abstinui, cui callum inducendum curauit. Nec infelicitate cessat nobis negotium. Quod verò s; medicamenta post foratum os infundenda pertinet, quandoquidem auditoris mentus (qui non solum vtiq; ad cerebri duram membranam penetrat, sed etiam neruum contingit, qui in ipsum descendit à cerebro) vehementissima medicamenta tolerat: nihil miri sit, si crassa membrana cerebri, antequam notabiliter occupetur phlegmone, valentissimis post forationes etiam medicamentis gaudeat, ceu naturaliter siccam substantiam possidens,

10

10

40

50

60

est securitas tñ impar. Nisi. n. cunctis q̄ ei qd curat  
circūdate sunt partibus, validæ planè sint, verū  
dum est, ne ab eis q̄ refrigerēt, noxā contrahat nō  
leuē. In reliquis duabus qualitatib. est securitas  
similis. Tēpus tamē curationis in sicca intēperie  
multo amplius est. Quippe qd senium in sanis, id  
in egris sicca intēperies existit. Itaq̄ etiā insanabi  
lis est, si prius sit cōsummata: vēpe vbi solida par  
tis similisū substantia reddita fuerit siccor. Nam  
est & altera siccatas, vtiq̄ quā ea, quorū substantia  
ex humore cōcreto conitat, sicuti caro & adeps,  
sunt liquata. Etia tertia, quum ppria humiditas,  
vnde partes nutriūtur, & quē in illis habet, veluti  
ros quidā sparsus, omnino est absumpta. Diuersa  
ab ista siccatas est, quē in ppriis cuiusq̄ particula  
exhib. arteriis atq̄ venis cōstitit. Provenit autē &  
hæc ex penuria sanguinis. Omnib. igit̄ ista sicca  
tibus maxime cōterarius est austerorū vīus: q̄pe  
quē si qd in iis super est naturalis humoris, id ab  
sumit, partim ebibētia, partim in sinū vētris per  
exiguos meatus exprimit, partim ad cōnētes  
partes trudentia. Curabis ergo ipsas, si meatus q̄  
cōtra hūc sūt, dilataueris, ac qd in vicinis particu  
las est impulsū, reuelas: præterea singulas simi  
larum partium propria humiditate, humectan  
tis nutrimenti ope, repleas. Cui negotio lac asini  
um ex ipso animali suctum, vel maxime ex vīu  
est. Quod si asina m sugere eger ipse grauetur, ex  
pediat ut quamminimo tempore lac in ambiente  
aëre moretur, p̄pterea q̄ ederrimē mutari est ap  
tum, genitalis lenitūs ritu, quod nec ipsum ala  
quandū in extra propria vasa morari panitur. Opti  
mum autē, vt p̄te cōgnatum, existit muliebre lac:  
quod quidē sugendū us suadet Proculus, qui ra  
be absumitur. Sed quoniam id exhiberi sibi cœ  
pueris pleriq̄ recusant, vtiq̄ cœ asina, asinum  
ip̄is dari conuenit. Id siquidem reliquis omni  
bus ad propoliū affectum vīlius est, quū &  
tenacissimū sit, coagulaturq̄ minimē, & quoquo  
versus ocyssimē digeratur in corpus. Est itaq̄ lac  
ipsum iis tum per se dandū, tum pauxillū ei repi  
d mellis miscendū. Ceterū quod mel fluat est  
colore, odore suauis, tum purū adeo, vt rosū pel  
luceat, ac gustantū parum acre iucundissimūq̄  
præterea tam sibi herens, vt si arrolatur digito,  
cōtinuum sibi, nec inter cūm, ad humū deducat,  
id omnium optimū iudicatur. Si verō abruptū  
rur, nec demissū ad terram vīq̄ cōtinuitatem  
rueat, id aut crassius iusto est, aut tenuius, aut dissi  
milium partium. Debet autē nullam penitus al  
terius cuiuspiam rei eminentem in se continere  
qualitatē optimū mel. Quare quod thyrium  
planē redolēt, minimē probō. Ad eundem mo  
dum & lac nullam externā qualitatem odore gu  
stūve præ se ferat: sed esto quamdulcissimū, & si  
bip̄is continuū, & p̄r lacū cōuenit, splendens,  
super omnia, quoad eius fieri poterit, similes par  
tes habero. Quōd verō tale lac fiat, & idoneis  
nutrimētis alendū animal est, & exercitatioib. me  
diocribus exercendū, & pullus, si quem laciat,  
aufundens. Quod autem retatis quoq̄ florentis  
esse vel maxime debeat, id neminē laret. Curan  
dum quoq̄, vt quamoptime consoquat: cōtem  
pta videlicet iis, qui si asinus quoq̄ præscribemus  
victas rationē, ridebūt. Fingamus igitur ægrum

aliquē tum lotum esse, tum lac haussisse: hunc ad  
secundam vīq̄ lauationē quiescere p̄mittemus,  
tum modicē fricabimus, & pinguet, vtiq̄ si lac  
quod sumpsit, iam ad vnguem confectū: quod  
tum extructū, tum ventriculi mole, nobis licebit  
coniciere. Modicum verō temporis inter primā  
& secundam lauationē intervallū erit, si quatuor  
aut quinque quincies salū horarum intervallum  
interit, sicut si tertio ad lac laurare parat: sin a  
liiter, plurū. Sanē tertio lauable, si multis lauo  
nibus fuit affluens. Quinetis post quāq̄ lauo  
nem hominē vngemus oleo priusq̄ se vestiat: ne  
videlicet plus digeratur ex quo, sed obstruat ex  
gua cutis spiramentū. Quippe conducit ad reu  
tricanonē id quoq̄, sicuti & fructū. Iam verō si  
ue cuiuslibet parti corporis tempore ram infundat  
calidam aquam, siue frices, siue laues, siue aliter  
quomodo cūq̄ calfacias, primum quidē attol  
litur, mox efficitur gracilis: adeoq̄ vbi carne im  
plere quodlibet corpus studemus, id eatenus cal  
faciendum nobis est, dum intumescat: vbi verō  
primū intumuerit, tunc superflendum est. At si  
digerere & evacuare contendimus, eatenus con  
tinuandum est, dum qd prius intumuit subsidat.  
Si æger igit̄ deleteretur lacte, post secundā quoq̄  
lautionē id exhibebis. Sin aliter, prius dū dige  
ter coctum, aut aliam præparat ritū præparatur.  
Hinc vbi rursus quieuerit, ad tertīā redueidus  
est lauationem, aut illico ad cenam. Sit autē præ  
paratus illi panis purus, probē coctus in furno,  
quiq̄ tum fermenti, tum salis, quod satis est, lia  
buerit. Opsonium quoq̄ sit ex saxanibus pisci  
bus, aut ex albo iure aselus: necnon alæ testēs  
gallinæ, qui lacte sit alius. Quorū si copia non  
est, aliis vtendum. Ad eundem modum & perdi  
cibus, & montanis auiculis, quē mollem carnem  
fortiuntur, vescendum. Vitanda autē & quæ palu  
stra sunt, & q̄ carne sunt dura. In summa verō,  
alimentū sit coctū facile & nutritius, minimūq̄  
glutinosum aut excrementitū. Porro omnū ci  
borū, quos nouimus, maxime nutriti suilla caro  
est, verū nō æquē ac prædicta, cōcocta facili:  
præterea glutinosum succum crassūq̄ generat.  
Quare hac vi ad propoliū affectum non cōue  
nit. At vino vt videntur omnes, quibus refici cor  
pus est opus, cōsūlo, modō nō febricitet. Esto ta  
mē id & aquosum & astringēt leniter. Aquosum  
natura appello vinum, quod tenue est, & purū,  
minimūq̄ aq̄ze mitionē ferens. Cauendum autē  
id vino est, q̄ feriat vires imbecilliores. Rursus  
nouellū vinū tum aquosius, tū imbecillius quo  
dāmodo est, q̄ vt vino cōueniat. Adde etiā q̄ egri  
us cōcoquitur, ac magis excrementosum est. An  
tiquius verō, vt vinosius est, ita vehementius exi  
sit, q̄ vt ppositū sit ex vīu. Porro aquæ vitia pen  
dent ex eius frigidityte oīa: seu culpa & mora  
tur in præcordiis dissimulē, & fluctuationes ex  
citāt, & in statū veniunt, & corrūpitur, adeoq̄ ve  
trici robur resolut, vt deterius proinde conco  
quat. Sed nec digerēdo per corpus alimento ma  
gnopere videt aqua cōducere. Quib. dūque  
vitis, quale nuper diximus vinū cōterarias viti  
tes obtnet. Porionis itaq̄ in erit modus, vt neq̄  
in vētriculo imare, nec fluctuationis vīlissimū  
invehat: oborū verō, vt vel nō grauet, vel grauā

Vellunt ex o  
lim distare, quo  
minus digerant  
tur ac resoluant  
tur seorsim.

Caru augenda  
da minuitur, quā  
visu perfusio ve defi  
deretur.

Tyfer gallina  
ca.

Suilla caro est  
maxime nutriti  
mentis, æquē la  
tius concoquitur.

Vino videntur  
omnes quib. res  
bus corpus expe  
dit, domando  
nō se resistent.  
Vinū aquosius  
Vinū vinosius  
Vinū nouellū.

Vinum anti  
quius.

Aqua vitia  
provenit ex re  
bus singulatis.

Aqua distribu  
endo alimentū  
per corpus non  
videtur vīlissimū  
ad hoc cōducere.

re iūctissimè definant. Ab hoc tensio inhiatioque præcordiorū vitandæ iuss fuit. Ergo si ob affectū ventriculī totū corpus mactaret, exaliquior vitæ ratio desideraretur, propter cōditionis imbecillitatē. Vbi verò æger sanior est redditus, ad refectionē est restituendus. Id fieri, si pluribus & fritionibus, & gestationibus; si antea, vtemur: ac cibis uti quæritur, tum quænitur mirabilibus, in se valere; & volensque prius etiam cibum

Refectoria vi-  
duntur ratio, quae-  
modo adminis-  
trantur.

Flesterunt quidem  
 pecunia mercatum  
 parvulum facili-  
 tatem in eo quo.  
 Vespere exhibe-  
 dum est alimen-  
 tum valentius.  
 Matrimonium  
 sunt cubiles par-  
 te sed crebro.

*Cibi cur tras-  
ferret in cura  
danda.  
Subendam. U-  
bi i cura que-  
bus non sit.*

pie, media est  
inter eam qua  
factu, & eam  
qua agri debe-  
tur.  
Confestim cibus  
utendum.

Vigilia quibus  
fuit adverte-  
nda.

Quā vērō ad sanitatis statū, p̄ primū ventū iam sit, cibandus volatilibus est: illig iam offerre car- nes suas licet, primum quidem, porcelli pedes in pitana elixos, dein pernas: ab hac enī reliquas partes. Quē porcellū si hyems sit, potest fuisse iu- gulari oportet: nam hesternus, si recte necatus, facilius cōcoquitur. At estate sit fuerit, si porcel- lus manū immolatus fuerit, ac iuxta occasum solis edatur. Quippe semper alimentū valentius ad vesp̄rā exhibendū est. Quā igitur qui macilentū- simi sunt, plurimō nutritimē indigēt, nequeant autē vel q̄d mediocriter est concouere: paulatim eos, sed sp̄sus cibare erit mollius. Atq; hac fanē de- causa, ipse eos ter cibare sunt solitus. Verū quā- do iam manifestē meliores sunt facti, enī bis na- trituissē sit fatis. Quare tantū exhiberi primū cibā- tionē et rationabile, quāta prius quā fecūda sumatur, tota prius erit cōcocta: id q̄d valēntiori cōtingere alimēto nō potest. Idcirco primo loco leue sumendū eis est, secundū aut crassius: quan- doquidē & quies, & somnus, & longius tēpus, hu- jus naturalē administratiōē excipit. Id vērō bi- bendū illic pot̄ censū nō est, anteq̄ cibos fuerit cōcoctus. Siquidē innarrā cibū si bibāt, ira vt eos vētriculī corpus, p̄ter humorē interpositi, non cōtingat. Ceterim si magna sit torquesit, non tūc illē p̄ppinandū, q̄d & molestum soletur, & sit- imi lenet. Vbi vērō nutritimē cōcoxerint, ab- inde bibere sunt sinendi. Manē autem post som- num, quum deicerint, & paulū inambulaue- rint, modicū sunt frigidū, videlicet donec corpus incalcat: mox gestationibus videtur. Deinde rī- laudū sunt, nam fricandū, idq; intra vel citra me- ridiē. Quum igitur cōvalēscentem vicius rati- o media quēdam sit inter eam quē saniorū pro- pria est, & quē ægrotum: difficile minimē fuerit, ex illis quē de vtriq; sunt prodicia, vt per se ipsum quis modicū inueniat. Domus in quā cōvalēscent nutritur, sit temperata: laboridm̄q; vt ad eos ci- bos reducatur quisq; quibus insuevit: naturarū interim proprietate obseruata, necnon regionis & temporis. Sciendum autē est, vniuersū corpo- ris habitum excitari à vigiliis: ac proinde eas in- festissimas esse illis qui ex siccitate laborāt. Quod vērō ad nutritiū modum spectat, si corpus mo- dicū siccum sit, vberius nutriti id licet: propterea quōd vires eius, quę vtriq; alimentū conficiunt, p̄nitius nō conciderunt. Si vērō immodicū, par- cius, contraria ratione. Porro intertemperes fices, vbi solida corpora cōtingerant, si quidem in vna quāpiam parte consistant, veluti nunc in ventri- culo propositum est, nunquam integrē sanabun- tur: neque in eum statum qui ante morbum fuit, reuertentur: sed in reliquam vitam particula affe- cta laborabit imbecillitate. Quōd si intertemperes fices etā solidas cordis partes occupent, celeritēs

1. General  
 2. Particular  
 3. Conclusion

Tactibus Re-  
 cipi quidem.

Siccatati corpo-  
rum soluturum  
si paratum fu-  
erit necesse est  
fieri singulatim.

Ventriculo sic  
co. modum  
frigerato. qu  
modum tunc  
dubium.

Venerabile  
et fructu  
re reditio, qu  
venerabili

Parapara Type

There are *four*

Mai come l'as-  
sistente vuole  
che facc, non  
potrebbe reggere  
fatto.  
Vanno an-  
che le ventose  
le refrigerate  
tracce.

10

Vina amara  
emolliendi sunt.  
Pecunia in  
quibus vitiis

Pecunia admo-  
tus ventris, si  
calorem est  
habet.

Humana calidi-  
tas quibus no-  
cua sunt.

Ventriculo ad-  
mulla sicca, ex  
modis ut alo-  
piti propter na-  
turam qualem  
est ratio sit in  
vitiis.

Ventriculus in  
temperie labora-  
re calidus, cum  
humiditate mo-  
do, facit si-  
gna potione co-  
rari.

Ventriculus in  
temperie labora-  
re calidus, cum  
humiditate mo-  
do, facit si-  
gna potione co-  
rari.

Ventriculus in  
temperie labora-  
re calidus, cum  
humiditate mo-  
do, facit si-  
gna potione co-  
rari.

Ventriculus in  
temperie labora-  
re calidus, cum  
humiditate mo-  
do, facit si-  
gna potione co-  
rari.

Ventriculus in  
temperie labora-  
re calidus, cum  
humiditate mo-  
do, facit si-  
gna potione co-  
rari.

Ventriculus in  
temperie labora-  
re calidus, cum  
humiditate mo-  
do, facit si-  
gna potione co-  
rari.

Ventriculus in  
temperie labora-  
re calidus, cum  
humiditate mo-  
do, facit si-  
gna potione co-  
rari.

Ventriculus in  
temperie labora-  
re calidus, cum  
humiditate mo-  
do, facit si-  
gna potione co-  
rari.

tus, vt iam amaricet. Siquidē vina amara, immodice siccant. Sanē optimū medicamentū talib. omnibus sit, quo picatores frigidē vtrū. Ergo illini re eorum ventrē, si vbi & alias oēs particulas, quē alimentorū vīu nō pmouentur, cōueniet, ac post aveli, priusq̃ refrigeret. Quod quidē si bis vno die feceris, abvnde fuerit. Naturalē vtrūculi calore tueretur & fouet admotus puellus qui boni habitus sit, & minimē cute humecta. Sunt qui callos pingues in hūc habent vīu: qui etiā ex vīu sunt iis, qui ppter siccitatē solī habēt imbecillum vtrūculū. Nocēt autē intēperantiis eiusmodi, fomēta calida: quē quidē siccā sunt, eō q̃ rore similariū depalcit corpore: quē verō humida, q̃ hūc digerit, potissimū vbi largius lūa vīu: prāterea q̃ nimis rarū, frigorig opporū corpus efficiat. At si multū siccitatē sit calor nō admodum multus adūctus, abstinentiū a melle est, vīuq̃ minimē antiquū bibendū. Iam cibos offere remus tepētes: sed si iestas sit, qualitate referentes aquā fontanā. Vtrūculū autem vngemus oleo tam crudo, tum melino. Mō salū fāre magis, si plūcula caliditas sit, ipsū vinum tum aquosius exhibebimus, tum sub eo frigore, quod fontis aqua per medium ver exhibet. illud nobis persuadentes, cuiusmodi affectū febri proportionē correspondere. Nam quod illa in toto animali, vel in corde est, id propositus nunc affectus est in vtrūculo. Ceterū vbi valide in ambabus qualitatibus immutata quēvis particula est, omnis eius affecto perit, atq̃ labefactatur: nec facili quod licet affectū, ad suam naturam reuerti potest. Vbi verō altera tantum qualitas plūcula immutata est (velvū nunc siccitatē finimus) reliqua autem aliqua se habet mediocriter: vīu qui ita est affectus, sanari potest. Si vtrūculus intēperie affligatur calida, cui mediocris humiditas iuncta sit, facili affectus is frigidē potione curatur: quum minimē ea excedant partes vicinē, vt potē se habētes mediocriter. Nam in siccis vtrūculi affectibus, necesse est oēs ea modō quē proxima sunt, sed etiā totum corpus gracilius reddi: ac proinde tunc potus frigidē maiori cum periculo administratur. Si vbi verō adeo vehemens caloris intēperies vtrūculum occupet, vt vīu ad cor ipsū pueniat, febricitare hominē est necesse. At intēperies humida vt cūq̃ accadat, facillimē omnium curatur. Cuius quidem, si sola consistat, remedia sunt cibi citra valentem calefactionem, refrigerationēve siccantes: prāterea confusio potionis parcat. Eius autem quē cum caliditate coniuncta est astringētum tum ciborum, tum potiorum minimē calfacientium vīu, necnō potus frigidē, quemadmodum illius quē frigori est iuncta, optima p̃fida sunt: acia omnia: quibus admisceri debent quē acerbā sint, minimē tamen euidēter refrigerantia: prāterea potio exigua, eāq̃ vīu insigniter calidi, veterisq̃. In vīuierum autem, calida intēperies vtrūculi refrigeranda est, frigida calfacienda, humida siccanda, sicca mēdacienda. Ad eundem modum quē ex duabus qualitatibus intēperantiis consistant, reliquis eō contrariis sunt reuendendā. Pessimā autem omnium est intēperies, inter simplices quidem, sicca: inter compositas verō, sicca si-

mul & frigida. Atq̃ haec tenus de vtrūculi intēperantiis, citra humoris affluxum. Vbi verō aliquis humor aut in ipso sinu vtrūculi delitescit, aut imbibitur in illius tunicis, aut intēperantiis extēteris, expurgandus ille est. Quod si ab aliis partibus trāsmittatur (id quod ex toto corpore habina, ac tum singularū partium exploratio, necnō ex vacationibus solitis retentiis, necnō cōsuetā victus ratione cognoscēs) primū illis est succurrēdum: dein verō roborisq̃ vīu, quod eorū quē ad se se confluunt, minus promptē quicq̃ admittat. Verūm si quidē ex minus momē tancis facia transiano sit, quod superflū est, tur sus ad ea reuelles. Sin ex iis quē maioris momēti sunt, ambobus simul consulēs, sic semper affectū submouēs, qui fluxione extēter. Fiet id, si omnes corporis partes ad bonam reduxeris habitudinē: omneq̃ expulsiōne naturā, fluxiles semper reddideris. Quod si ob equaliū in toto corpore redvantiis humorū, vtrūculus fluxione tētetur, totum corpus est evacuandū. Si ppter malū succi abvndantiā, ea purgāda est: atq̃ huic ad vtrūculum cōvertenda curatio. Quē igitur in sinu eius cōtinentur, cōmodē expurgantur per vomitum. Verūm si quod plures dies prauis humor decubuerit in ipsum, vter aliquid sibi vīu cōtra xerit, haud intēpeliuē, qui sic laborat, abstinentiā potione vtetur. Per cōtraria autē corrigi inducta intēperies debet. Si vitiosus succus in vtrūculi tunicis sit receptus, curari is affectū debet par macia quē modicē purgēt. Ceterū quē ex aloē componuntur, omnī sunt longē apūissima: nec secus ipsa sola aloē. Quē quidem si illora sit, valētius vacuat: elota autē purgat quidem minus, fed roborat vtrūculum magis. Expediit ergo paratam habere hierā, tum ex aloē illora, tum ex elota coofectā. Admiscetur autē huius drachmis cōtenis, citinamomi, xylobalsami, asari, spicē nardi, croci, & Clizē masticēs, singulorū sex drachmāz. P̃fissimū hōc medicamē est cōtra vitiosos succos, qui in tunicis vtrūculi habentur: vīuūq̃ fuerit eo siccō ex aqua vīu dūm paruorum cocleariū mensura, vbi mediocriter illo vīu fūdēmus. Siquidem maximus eius modus, est magnior dūm cochlearium pono, in aquē temperatē cyathis tribus: vt minimus, vniū parui. Vtendum verō hōc tempore & p̃fianē cremore est, qui primus a balneo fumet. Nam medicamē ipsum solito purgātū medicamentorū tempore dabitur. Post id verō, vbi modicē inambulauerit, de reliqua victus ratione nihil est immutandū. Sunt q̃ reponunt medicamentum, excipientes id despumato melle: & sic q̃ sic durabiles, ceterūmō perinde ad propositos hōc loco affectus vīu, quum & minus vtrūculum roborēt, & magis alium subducant. Verūm quib. lenta pītuita est infixa vtrūculo, iis prius sunt exhibenda, quēscūq̃ ea differant: post deinde purgandū. Quod si ad vomendū sint apti, nō invīu fuerit radicali ex oxymelle vomere. Sin verō nec lenius humor sit, nec crassius, vīuq̃ abvnde fuerit a p̃fianē solius cremore vomuisse: item a mulla. Quo casu sumendum vtriusvis plūs est, q̃ vel nutrimenti, vel etiā deiectionis causa fumeret. Idoneū verō est, etiā mulla, in q̃ coctū alusynthiū sit,

Ventriculi intēperantia quibus copulata est humor, quā ratione curatio contrariis.

Abstinētia potio quibus sit calor, fluxione p̃fissimū.

Aloē purgare humores in tunicis vtrūculi imbibentes. Aloē elota facit calidū.

Hiera pura da p̃fianē.

Hiera pura est p̃fianē.

Hiera sicca nō sum ex aqua vīu.

Galenus cōmendat, curatio vīuūq̃ sit cōtra vtrūculi.

Hiera cum melle coofecta minus vtrūculi roborat, sed magis alium subducit.

Asyntheses est prius crassius fuerit, quā reuocandū.

Vomitum quibus & per quē p̃fianē.

Vomitum quibus & per quē p̃fianē.

Vomitum quibus & per quē p̃fianē.

Vomitum quibus & per quē p̃fianē.

Vomitum quibus & per quē p̃fianē.

Vomitum quibus & per quē p̃fianē.

Vomitum quibus & per quē p̃fianē.

Vomitum quibus & per quē p̃fianē.

Vomitum quibus & per quē p̃fianē.

Vomitum quibus & per quē p̃fianē.

Vomitum quibus & per quē p̃fianē.

Vomitum quibus & per quē p̃fianē.

*Affectus omnis  
maxime vixit  
in curatio  
curatio consilio  
non debet.*

*Affectus magni  
tudo est triplex*

*Ventriculi gra-  
uissimam labora-  
tionem ob defici-  
entiam a capite  
decedentem,  
curatio.*

*Affectus nonnulli  
perfecti sanari  
posse, manens  
adversus ipsa, va-  
de utrumque  
sa.*

*Indicatio vixit  
daturum a natu-  
ra parte labo-  
rans deinde  
pta, est multi-  
plex.*

*Recessus a  
naturalis tempo-  
ris angustia, cu-  
jus mutatio  
esse oportet ut  
regulatur  
ma vixit, man-  
ens.*

bibat. At verò si plures affectus in vñu coeant, ad eum qui magis vrget, dirigi primò curantis consiliu debet. Vbi aliud efficiens est, aliud quod ab eo efficitur, ipsa causa spectanda. Sin autè curari hoc ante illud non licet, ad id quod ordo dicitur, esse respiciendum. Atq; in eo quidem curatio nis consilio, quod ab vrgente initur, affectus magnitudo perpendenda est: quæ sanè triplex existit. Alia namq; ex lætæ actionis præstia spectatur, alia ex propria affectus essentia. Tertia præter hæc, ex facultate quæ læsum corpus gubernat. In eo verò consilio qd ex causæ ratione initur, animadvertendum est, quidnā eorū quæ inter se sunt cōmēta, augere aut gignere reliqua possint: quæ rursum vel gignatur, vel incrementū ab alio accipiant. ar in eo qd ordo præscribit, qd ante qd, vel quid cū quo, vel quid post qd, sanari possit. Fingamus igitur in ventriculo defluere ex cerebro superflui quendā humorē frigidū: atq; eius occa sione intemperie quandā in ventriculo contractā iam esse: vel ponius malū iam succū per totū eius corpus media oīa similariū particularū spacia oc cupasse: ab eodē, si placet, etiā mordicationis sen sūm, ac, pēne tum deliquitū animi, tum sudores, cū fynopes quādā dissolutione excitari. Manife stū vñq; est, in primis esse occurrentiū ei, qd vires resolut. Vbi aut vires firmatæ erunt, nec plurimū visiofi succi in ventriculo aderit, tūc nimirū ad fluxionis causam nos cōvertentur: illud, p cōperto habentes, nō posse ad perfectiōnē vllū affectū sa nari, manēte adhuc ipsa, vnde natus est, causa. Er go si sic pñanimus cerebrū, vt sensibile amplius redvndantiā non creet, vel vñ fontē fluxionis in ventriculū evertemus. Cæteriū si neq; copia nota bilis excrementorū in ventriculo sit, nec eorū quæ in capacitate ipsius cōtinentur, nec eorū quæ in tunica, sed nec mordicatio quæ officiat viribus, tū o mniū primū sanandū ipsum cerebrū est. Ab hoc, sinus ipse ventriculū vacuandus, extergendūq; est: postea expurgidæ tunica. Postremo intempe riei medendū. Ac reliquarū etiā partiū intēperan tiæ, similiter iis quas in ventriculo, pposuimus, sa nabuntur, adhibēntibus semper nobis remediū af fectui cōtariū, illig remediōrū indicatiōnē, quæ laboratiōis mēbri natura sumitur, adicientibus. Ea autē indicatio est multiplex. Vna quidē ac pri ma indicatio a laboratiōis loci tēpe sumit, quæ mensurā introducit: sed quæ qualitatē præscribit. Secū da ex eo sumit, q actio eius omnib. animalis par tibus sit cōmunis, aut q cōmunē virtutē submi nistret. Tertia, ab ipsa partiū figura. Quarta, ab ipsius positura: cuius portio est ad vicinas partes societas. Tum præter hæc omnia, ipsa sensū dī vel acrimonia, vel hebetudo. Porro quæcūq; calidior natura partes ex frigore laborat, hq & libera lius, & diutius cūsseri postulant. Si verò calido morbo egrotēt, exiguū breuivē tēporis refrige rationē desiderat. Siquidē parvus hic est in id qd præter naturam, lapsus: quare & in id quod secun dum naturā, reditus. Earens namq; redeat ad na turā suā vñ quod qd est necesse, quatenus a natu ra recessit: ac veluti quādā viā retrō ferat, quæ in duerum agat, eaq; facta in ipso est, transmuta non. Minus itaq; periclitantur, quicūq; cognato naturæ suo morbo laborant. Quemadmodū au-

tem reducendū esse ad mediocritatē diximus calidam & frigidam intemperiem, sic reducētur & cæteri, siue ex simplices sint, siue cōiugata. Porro in iis temperaturis quæ sunt ex humoribus ortæ, si particula sibi soli inferuatur, aucta est evacua tiō, prout affectus suadebit, sed tamē etiā virtuti attentus. Sin necessariū opus eius sit omnib. ani malis partibus, vel vñ ventriculū & iecinoris, nō levis habēda sollicitudo de robore virtutis est, ne hęc, magna semel vacuatione vñs, dissoluas. Est autē commune opus & venarū, & artenarum, & cordis, & thoracis, & renū, & vñsq; vesicæ. Cerebri verò opus, quū sanū sumus, ad voluntarias actiones est necessarium, iis scilicet instrumētis, quibus eiusmodi actiones obimus. Quum ægri sumus, necessariū non est, nisi in tantum, quæ ad respiratū sūm depurata. Reliquorū verò organo rum actio certē non est: ministerium tamē est ad vitam necessarium, vel vñ pulmonis, & asperæ ar teriæ, & gutturis. Ergo ex eiusmodi particulis quamprimū vacuare redvndantiā licet, prove volumus. Ex ventriculo verò & iecinore vñcūq; vacuare non licet, sed cū cautione, vt ne quid vir tuti officias. Habenda præterea est & dignitati sctionum ratio. Maxima autem est cordis officij dignitas, ægrotantibūq; omnib. maximē neces saria. Cerebri verò ad vitam par est momentum: nō tamen par robur eius in ægrotis requirimus, quum necesse omnibus non sit nervorum ac mu sculorum opera vñ. At iecinoris opus omnibus particulis pernecessarium est: non tamē adeo sal tem perperuam necessitatem habet, sicut vñs cordis. Ad portionem autem iecinoris, etiā ven triculū opus se habet. Itaq; ex partium functioni bus facile intelliget, quatenus cuiusq; robur cu stodiri expediat. Ad eundem modū, & quæcūq; partes aliis sunt facultatū auctoribus, harum quo que robur seruare decet, pro facultatis earum vñs portione. Etenim cerebrum nervis ac muscu lis, cor arteriis, iecur venis facultatem suppeditat. A figura verò, indicatio ipsius modi vacuan di excrementi, ad hunc modum suggeritur. Ven triculū vomitu, deiectionēq; inanitat. Intesti na deiectione tantū: sicut vñ iecinoris gibba. Re nes verò, & vesicæ, & iecinoris gibba, si multo vi tioso succo redvndent, per deiectiones & phar maca deiectionia expurgitū: sin mediocri, per v rinarios meatus. Cerebrum, per palatam, & au res, & nares. Pectus & pulmones, per asperam ar teriam, & fauces. A situ indicatio dabitur; tū ad solidarum intemperiem, tum ad succorum vñū, non levis. Nam quæ per summā corporis intem perie laborant, iis medicamēta quæ intemperies requirit, applicabimus. Quibus autem in sum mo corpore intemperies est, in iis rationē inter valli imbibimus. Si enim medicamentis iis vñre, quæ intemperies postulat, vñq; multo imbecilliora, quā per vñs suo, ad affectum loci pervenient. Iam ad vacuationes quocq; situs nōmihī indicat, dum societas laborantis particulæ cum aliis do cet. Non spernēda verò indicatio est, & ea quam sensus parium acuitas, hebetudisq; suppeditant. Quandoquidē omne medicamentum contemnent, quæ tardū sunt sensus, etiam si non leuiter mor deat. At quæ acuti sunt sensus, earū vires dolore solvunt.

*Partis affectu  
quando auct  
est, qd quid  
trepidat vacua  
n debet.*

*Partis effectus  
quandū sui co  
cessus vñs  
que debet  
vñs.*

*Cerebrum.  
Cor.  
Hepar.  
Vacuatione  
inducit quon  
da figura par  
tu affectu sa  
natur.*

*Situs partis af  
fectu quæ indi  
cationes auct  
bas.*

*Sensus partis  
affectu quæ  
præbet indica  
tionem.*

soluitur. Expedi igitur his, nec cōferimus, nec semel, valentibus auxilium mederi tentes, sed rito potius in tempore. At ubi tardus est sensus, in his etiam celeriter obire quod iustum est, licet, semel vñs remedio quod sitisdoneum.

### GALENI PERGAMENTI de methodo medendi, lib. V. l. l.

**Q**uod igitur ex calido, frigido, humido, & sicco, similariū particulariū natura cōtinet, quodq; ipse simplices atq; primę particulae secundū tales temperaturas inter se diuidēat, aliis à nobis est traditū: quemadmodū etiā duo esse morborū genera, quę simplicibus ipis particularibus accedūt: alterū, qđ cōpositis ē et etiā cōmune, & dici vñtans solutio: alterū peculiare ipsarum, qđ in calidi, frigidi, humidū, & sicci tempore cōsistit. Quarū sanē interperannariū, quatuor diximus esse simplices, quatuor verō cōpositas. Simples quidē, quę secundū vñā qualitātē à naturę ordine aberrāt: cōpositas verō, in quib. secundū oppositiōnē vñrang ipsa natura variatur. Febris autē, vñus morborū est, qđ interpeties gignit: vñq; quā adēo immodicē est auctus calor, vt & offendat hominē, & eius functiones laedat. Porro primariū differentiarū febriū, vñā illa est, in qua causa adhuc adēst febrim creā: aut febris excitata, illi desit. Altera verō, quā a grę solubiles, à soluta faclibiles febribus distinguūt: illas hęcicas, has Gręci schinicas vocāt. At verō prima indicatio omnis febris, velvñ à morbo est, ablatione eius præfinit. Secunda autē, velvñ à tali est morbo, quę certā quāvis sublationē indicat: nēpe interpetiē febriū, quā si caloris excessus, p̄ occursum refrigerantiā tollendū esse. Omnis quippe excessus per contrarium excessum sanat. Ergo si febris ipsa sit genita, causa autē quę eam excitauit, illi desit, huc tantū sanāde eius dirigitur consiliū, vt refrigeretur. Si verō in genera none ad huc febris est, causā qđ accēdit illi, est submouenda. Sin pars eius iam genita est, pars etiā nū gignitur, consilendū vñq; fuerit: primum quidē, submouendo quę eā accēdit causam, dein excitando, quę ab hac accessa est, febre. Excitare autem vel maxime febre solet consipano meatuum, in his corporibus, quibus quod transpirat, halituosum nō est, sed mordax, ac, & fuligini simile. His igitur corporibus saluberrima est ex aqua dulci tempore catag lauatio, tum frictio quę rarefaciat, & excretiones mediocres, & victus quē dulces efficiat succos. Adversissima verō sunt lauatio frigida, & aluminosa, & lauationis abstinētia, & exercitio too acuta, & frictio vel planē nulla, vel dura, & vicius mli succi, & vigilie, & ira, & tristitia, & curatio, vñq; in sole, & fatigatio. Grauiusmē autē pec care mihi vidētur, à carnificibz nū nihil differere, qui medici hominibz natura biliofis, tenuissimam per morbos rationē victus iniungūt, cōstictus inedia cōficiunt: quum nimirū tales naturę, ex longiori abstinētia cibi, acerrimus acutissimilq; febribz corripantur, à quibus promptus ē in hęcicas transitus, atq; ab his rursus in marasimū torridum, aut (si os ventriculi est iniuriis obnoxium) in eum qui syncopen infert. Etiam in quorum temperie siccum prevalet humido, &

calidū frigidus: his corporibus halitus gracilis, infusus, & nignor titas, reliquis tribus in cūq; vñrang, quę hac minus calide sunt, tacta ab alior aduertunt. Plurima qđ in his sunt, vñrang ac detectio bili sanā, & pulvis magni, & somnileues & pauci, & animi impetus vñleuiens. Quare lus tum refrigeratiōnē, tum aque ponendū, atque adē requē & cibum largiorē congruere p̄notat tū Hippocrates. Quum autē refrigeratio ipsa cōclinetur corporibz, tum exilus quibundā, tum nō minime ex cibone exhibitiōne: cōd emia vñq; vñrang corpus calidius siccūq; solito est redactum, trigidum humidūq; iuuat. tum et exheredes qđ nec medicamentosiā villam tenit perceptibilis faculter obtineat: nec ipsum quod nutrit, plurimum: quemadmodum neq; minus quam ē ex vñs. Cōmo dīsinus itaq; tali corpori est p̄notat cremor ad vñgū cōctus, in quo nullum ē cōdimentum superfluum: vñpote qui ē refrigerare, & humectare, ac line itē seruare hominē poterit, cum eo qđ nec halituosum, nec humilum, nec siccum detinet excrementum: quum nec vñrangū, nec obstruēdū, aliqđ vim fortiat. Ac quod nō astringat quidem, vel gustus ipse docet, cuius vñnus ad iudicare est p̄prium. Quod verō nec obstruat maras, hinc licet etiā conuēre, quid nō secus ij aphronitrum, sordes cuius extergeat, vñmināq; à ventriculo in medio crean p̄ritum eliciat, nihil infelsius quā in istis: quę sane nec sitim restingūt, vt p̄sana, & nū naturis biliofis bilefeli facili. At verō si multa, & vellem enter glaucinosa, & crassa p̄ritū ventriculo adhiereat, hanc radcula ex oxymelite, nō multa, aut p̄sana detergere est libali. Optimum itaq; biliofis tēperamentis nutrimentum est p̄sana. Proximum hinc, alia, cum paululum acen ad faciliē distributiōnē adiectum fuerit. Tertium, quō sine aceto liquida exiūt. Inieciē verō huc, dum coquitur, aliqđ porri, satius est. Nam quod tum auriat, tum talis aliqđ necessariū habet, neminē laet. Quinctiam panis in furno cōctus, est vñis cibis: licet vñt omnes pisces faxatiles: nec ipsi minus afeblis. Proxime afeblis sunt, soles, orpedo, lupus, mulisq; post, mugil & pelago. Vis autē piscis detior est, qđ prope lacum qui mari ingruit, aut magni fluminis ostium, p̄sūt. Ex volatilibz optimi sunt perdices, ac montanę p̄s ducalę. Ab his, gallinacę, & phasianę, & columbe raciones, sed nec hę tamen in ius claudendę, quoniam excrementosa sint omnia, quę exercitio ne cūpē. Excrementosa verō non minus sunt, tum lacuaria, tum palustria omnia. Quo sit, vt ex ipis etiā subtilibus carnibus, optima sit montana. Ab his denique sunt hardi. In omnibus autem fugiēda tum vetula, tum recens p̄dita sunt: illa namq; diuoria, concōctiq; difficiliora sunt: hæc immodicē humida, & excrementosa. Igitur, quibus acce aliqđ quondē transpirat (revertantur enim rursus ad institutum) qđ, si cū eis est conspētur, faciliē corripuntur febri. Stipant verō ipsam, tum quę astringunt omnia: tum quę lenitia, crassitudine vñe sua, in exiguis trahent maribus. Aliqđo etiā ipsius (oris immoderatiōne) siccitas, exiguis meatibus dēsar. Qui ergo ex stiparēte febri laborant, qđ inclūte prima accēsiōne, ducendi om-

Calida & fere  
ap̄p̄ria a  
dura.

Calida & fere  
ap̄p̄ria a  
dura.

P̄sana crean  
p̄ritum.

Quidā quid  
p̄p̄rium.

P̄sana crean  
p̄ritum.

Ma, a in nate  
m iustis hēle  
feli facile.

Alia biliofis  
naturę cūpē  
sit.

P̄sna biliofis  
naturę cūpē  
sit.

P̄sna biliofis  
naturę cūpē  
sit.

P̄sna biliofis  
naturę cūpē  
sit.

P̄sna biliofis  
naturę cūpē  
sit.

P̄sna biliofis  
naturę cūpē  
sit.

P̄sna biliofis  
naturę cūpē  
sit.

P̄sna biliofis  
naturę cūpē  
sit.

P̄sna biliofis  
naturę cūpē  
sit.

P̄sna biliofis  
naturę cūpē  
sit.

P̄sna biliofis  
naturę cūpē  
sit.



nes ad balneū sunt: tum pinguius, mollitēq; fricandi, si quidē ex aliquo, qd̄ astrinxit cutem, laboret. Nam si ex siccatē, fricādi quidē & ipsi, sed parcius: laudādi autē verius. Respicendū verō ad virtutis modū semper est, in huiusmodi auxiliis.

*Febri ab animi afflictione.*

*Febri ab afflictione indolentia, curatio.*

*Rafacum refrigerandi modus.*

*Capitio refrigerandi ratio.*

*Febri a frigore curatio.*

*Febri a frigore curatio.*

*Febri a frigore curatio.*

*Febri a frigore curatio.*

*Febri a frigore curatio.*

*Febri a frigore curatio.*

*Febri a frigore curatio.*

*Febri a frigore curatio.*

*Febri a frigore curatio.*

*Febri a frigore curatio.*

*Febri a frigore curatio.*

*Febri a frigore curatio.*

*Febri a frigore curatio.*

*Febri a frigore curatio.*

*Febri a frigore curatio.*

*Febri a frigore curatio.*

*Febri a frigore curatio.*

*Febri a frigore curatio.*

*Febri a frigore curatio.*

turis, ea quæ ex putredine humorum accedunt succeder. Nam in aliis saltem temperamētis, quæ in sequētibus exponam, excitari ex tali causa potest, circa humorum putredinem, aliqua cōtinentis febri species. Itaq; nisi vitiosus succus trāspiret p̄cutis, necesse est vt putredine: vt transpiret autem, validō auxilio eī opus. Ac si quidem vel puer, vel senex sit, sanguinem detrahre nō licet. Inter has ætates, vbi robur ægro non deest, secūda vena est, vel si plenitudinis signa non adfint.

Præstat enim vitiosi succi maiorē parte emissā, ad detergēdas obstructions accedere: quā alioquin vtrendum sit, ne si obstructionibus liberandis, prius q̄ vacuaueris, studeas, ipsas multo magis impigas. At si solunt quidem obstructions, quæ deteriorum obremēt facultatem, seu foris admota cuti, seu intrō in corpus acceptæ. Periculum verō etiā eī, ne quæ foras trahunt, vni cum iis quæ obstruunt, etiā aliud quippiam attrahāt: & quæ ab internō fursum feruntur, aliquid secū ex iis quæ in vasis continetur, rapiāt. Quod ipsū si tenax & crassum sit, obstructionem planē geminabit: sin alter, multitudine certē sua, nō parum omnino nocet. Neigitur hæc contingant, vtilissimum est inanis corpus. Discernitur autē magnitudō obstructionis ex ipsa magnitudine febris, vt quæ ex maiore obstructione, maior ex minori, minore incidit. Vbi verō modicē iam vacuaueris, hæud multo post aut nū trimentum aliquod, aut pharmacum ex iis quæ detergest, exhibebis. Atq; in alimenorum quidem ratione sunt pr̄stana & mulsæ in pharmacorum, oxymeli, & quæcūq; in coquere in mulsâ licet, ceu calamintham, hyssopum, organum, serpyllum, irim, & apium. Verim hæc omnia iusto tempore calidiora, ideōq; febres accendunt, aquæ vt vinum. Oxymeli verō solum nec febres accēdit, & strequē deterget, sic vt ea quæ glutinosa crassāq; sunt, dissoluat, & meatus obstructionis liberet. Inter mulsam & oxymeli medium locum habet quod apomeli dicitur. Nec immeritō arbitro & saccharum inter hæc numerandū. Ex hoc victu obseruabis, quantum de febris calore minuitur. Et enim si tertio die manē videris minimum esse quod de febris relinquatur, ac nec putredinis humorum in pulsu nota subit, neq; in vrina cruditatē, suspecta verō hora, qua primo die febris occupauit, extra meridiem sit: zōdaster hominem quamocūq; laudabis, longē ante sextā horam.

Abvnde ramē sit, si intra tertiam horam lautionem compleueris. Ad eundem modum & si ceteram horam suspēcti habueris, vsq; ad septimā laues licet: quā tres equinoctiales horas quatuorve, inter balneū accessioisq; tempus interponi abvnde sit satis. Debet autem in balneo corpus prius victum ac moderatissime frictū, mox detergeri extrinsecus, abluq;. Moderatissime deterget tum erui, tum hordei, tum fabarum farina. Præterea mulsā quæ sit aquosa. Magis verō quā hæc, iris, & panacis radix, & aristolochia, & mulsā quæ mediocri est mulsura: veluti etiā hæc magis quæ meracissima est. Possunt autē vel hæc magis detergere, tum spumā niri, tum nitrum ipsum, tum aphronitū. Sapo enim ex iis est, quæ maxime detergere valent. Egreſsus balneū, præ-

terea, ea quæ ex putredine humorum accedunt succeder. Nam in aliis saltem temperamētis, quæ in sequētibus exponam, excitari ex tali causa potest, circa humorum putredinem, aliqua cōtinentis febri species. Itaq; nisi vitiosus succus trāspiret p̄cutis, necesse est vt putredine: vt transpiret autem, validō auxilio eī opus. Ac si quidem vel puer, vel senex sit, sanguinem detrahre nō licet. Inter has ætates, vbi robur ægro non deest, secūda vena est, vel si plenitudinis signa non adfint.

Præstat enim vitiosi succi maiorē parte emissā, ad detergēdas obstructions accedere: quā alioquin vtrendum sit, ne si obstructionibus liberandis, prius q̄ vacuaueris, studeas, ipsas multo magis impigas. At si solunt quidem obstructions, quæ deteriorum obremēt facultatem, seu foris admota cuti, seu intrō in corpus acceptæ. Periculum verō etiā eī, ne quæ foras trahunt, vni cum iis quæ obstruunt, etiā aliud quippiam attrahāt: & quæ ab internō fursum feruntur, aliquid secū ex iis quæ in vasis continetur, rapiāt. Quod ipsū si tenax & crassum sit, obstructionem planē geminabit: sin alter, multitudine certē sua, nō parum omnino nocet. Neigitur hæc contingant, vtilissimum est inanis corpus. Discernitur autē magnitudō obstructionis ex ipsa magnitudine febris, vt quæ ex maiore obstructione, maior ex minori, minore incidit. Vbi verō modicē iam vacuaueris, hæud multo post aut nū trimentum aliquod, aut pharmacum ex iis quæ detergest, exhibebis. Atq; in alimenorum quidem ratione sunt pr̄stana & mulsæ in pharmacorum, oxymeli, & quæcūq; in coquere in mulsâ licet, ceu calamintham, hyssopum, organum, serpyllum, irim, & apium. Verim hæc omnia iusto tempore calidiora, ideōq; febres accendunt, aquæ vt vinum. Oxymeli verō solum nec febres accēdit, & strequē deterget, sic vt ea quæ glutinosa crassāq; sunt, dissoluat, & meatus obstructionis liberet. Inter mulsam & oxymeli medium locum habet quod apomeli dicitur. Nec immeritō arbitro & saccharum inter hæc numerandū. Ex hoc victu obseruabis, quantum de febris calore minuitur. Et enim si tertio die manē videris minimum esse quod de febris relinquatur, ac nec putredinis humorum in pulsu nota subit, neq; in vrina cruditatē, suspecta verō hora, qua primo die febris occupauit, extra meridiem sit: zōdaster hominem quamocūq; laudabis, longē ante sextā horam.

Abvnde ramē sit, si intra tertiam horam lautionem compleueris. Ad eundem modum & si ceteram horam suspēcti habueris, vsq; ad septimā laues licet: quā tres equinoctiales horas quatuorve, inter balneū accessioisq; tempus interponi abvnde sit satis. Debet autem in balneo corpus prius victum ac moderatissime frictū, mox detergeri extrinsecus, abluq;. Moderatissime deterget tum erui, tum hordei, tum fabarum farina. Præterea mulsā quæ sit aquosa. Magis verō quā hæc, iris, & panacis radix, & aristolochia, & mulsā quæ mediocri est mulsura: veluti etiā hæc magis quæ meracissima est. Possunt autē vel hæc magis detergere, tum spumā niri, tum nitrum ipsum, tum aphronitū. Sapo enim ex iis est, quæ maxime detergere valent. Egreſsus balneū, præ-

Coniunctio febri sp̄ssum ab quæm excitari possit abq; humorum putredine.

Sanguis aut puer, nec fuit detrahendus esse.

Sanguinem detrahendum interdū esse, abq; quæ p̄cutis non nota.

Cōtinentia febri, quæ detrahenda sunt, quæ detrahenda sunt, quæ detrahenda sunt.

Coniunctio febri sp̄ssum ab quæm excitari possit abq; humorum putredine.

Sanguis aut puer, nec fuit detrahendus esse.

Sanguinem detrahendum interdū esse, abq; quæ p̄cutis non nota.

Cōtinentia febri, quæ detrahenda sunt, quæ detrahenda sunt, quæ detrahenda sunt.

Coniunctio febri sp̄ssum ab quæm excitari possit abq; humorum putredine.

Sanguis aut puer, nec fuit detrahendus esse.

Sanguinem detrahendum interdū esse, abq; quæ p̄cutis non nota.

Cōtinentia febri, quæ detrahenda sunt, quæ detrahenda sunt, quæ detrahenda sunt.

Coniunctio febri sp̄ssum ab quæm excitari possit abq; humorum putredine.

Sanguis aut puer, nec fuit detrahendus esse.

Sanguinem detrahendum interdū esse, abq; quæ p̄cutis non nota.

Cōtinentia febri, quæ detrahenda sunt, quæ detrahenda sunt, quæ detrahenda sunt.

Coniunctio febri sp̄ssum ab quæm excitari possit abq; humorum putredine.

Sanguis aut puer, nec fuit detrahendus esse.

Sanguinem detrahendum interdū esse, abq; quæ p̄cutis non nota.

Cōtinentia febri, quæ detrahenda sunt, quæ detrahenda sunt, quæ detrahenda sunt.

Coniunctio febri sp̄ssum ab quæm excitari possit abq; humorum putredine.

Sanguis aut puer, nec fuit detrahendus esse.

Sanguinem detrahendum interdū esse, abq; quæ p̄cutis non nota.

Cōtinentia febri, quæ detrahenda sunt, quæ detrahenda sunt, quæ detrahenda sunt.

Coniunctio febri sp̄ssum ab quæm excitari possit abq; humorum putredine.

Sanguis aut puer, nec fuit detrahendus esse.

Sanguinem detrahendum interdū esse, abq; quæ p̄cutis non nota.

Cōtinentia febri, quæ detrahenda sunt, quæ detrahenda sunt, quæ detrahenda sunt.

Coniunctio febri sp̄ssum ab quæm excitari possit abq; humorum putredine.

Sanguis aut puer, nec fuit detrahendus esse.

Sanguinem detrahendum interdū esse, abq; quæ p̄cutis non nota.

Cōtinentia febri, quæ detrahenda sunt, quæ detrahenda sunt, quæ detrahenda sunt.

Coniunctio febri sp̄ssum ab quæm excitari possit abq; humorum putredine.

Sanguis aut puer, nec fuit detrahendus esse.

Sanguinem detrahendum interdū esse, abq; quæ p̄cutis non nota.

Cōtinentia febri, quæ detrahenda sunt, quæ detrahenda sunt, quæ detrahenda sunt.

ter aqua quæ parû apî incoctû in fe habuerit, nihil est offerendû. Iam verò diariz febris (de quib. tantum in presenti cômmentario agere est animus) in .ppositis corporis tēperamentis spēnuero etiâ cruditanibus solēt superuenire. Eit aut pēssima in eiusmodi tēperamentis cruditas illa, cinisimēq. febrem accēdit, in qua cibus in nidorulenti & fumosam qualitatē corrumpitur: quidō ea quæ in acida m veni, vt raro talibus naturis cōtingit, ita m nam nocet. Nidorosa tū cruditas, si alius lubrica sit, minus est noxia: sin astringit, grauis exsistit. Febricitat etiâ nōnulli & ex iis, q̄s diarrhœa ex cruditate malè habet. Quib. vtiq. nō minimè p̄ritat febris ex defurgēdi frequentia. Est aut eorū quibus clausa aluus est, & quib. iussus, non eadē sanatio. Igitur ea tantum quæ corrupta fuerit, per diarrhœam vacuata esse vidētur, tam laudandū, tum nutriendum in remissione febris est: sed us quæ circa ventriculi vtriusq. prius cōsultio. Sin ita multa inanino aut prius facta sit, aut nunc etiâ in homine dūret, vt virtus iam sit defessa, sanus est omīssa lauatio-  
 10 nibus cibare, sed cōsultio prius iis q̄ circa ventrē sunt. Cōsuletur ita laborātib. si modō vacuatio amplius non p̄serueret, fomento ex oleo & absynthio. Quidd si quis morbus, aut doloris sensus in ventriculo adhuc supersit, amoni periculo post fomentum debet, qui vel calidus sit, & siccus: vel ex oleo in quo absynthium incoctum fuit, vel ex vnguento nardino madens, ac plurimum expressus. Iam multo etiā sanus sit, si purpura marina in fuerit: atq. etiā longè optimum, si optima sit Tyria. Quidd si os ventriculi imbecillius sit, tanta portione Chir mastiches in nardino trunsa, vnde fororū crassitudo exsistat, madefactū ex eo purpurā imponemus. Esto autem ab vndē calens talem quodq. quum primū admoct. Nam quæ tepida sunt, dissolunt ventriculi firmitudinem. Vnguentū autem ipsa calfacere in duplici vase fo-

leo: quandoquidem aliter calfacit, vinar eorū facilius. Ceterum adhuc adhuc alio, vilius est optimū recentēq. melino, simili modo quo nardi no, vn. Vtile autem ad omnia talia est & mastichinum: nec in postremis conferunt spicata & foliata vnguenta, quæ Romanorum luxus inuenit. Mirē etiā ventriculum roborat hoc ceratū quod subdam. Ceræ Tyrihenicæ, vnguentū nardini, singulorum drachmas ij. Fiat ceratum. Si verō intus vratur ventriculus, ita vt affectus quidam p̄ilegmonæ similis consistere in ipso videatur, vilius est ceratum quod ex melino conficitur. Porro cibandi sunt, fluente quidem etiā nunc aluo, polenta & pane, qui pauxillum aceti receperit. Quidd si plus æquo aluus excernat, inspergere oportet polentam succo coroneorum malorum, vel si agro magis aridatēq. p̄iorum, aut malorum, aut myrtorum decoctio. Sui venter non amplius excernit, sufficerit tum alia, similiter p̄ntanæ preparata, licet est, aceti habet pauxillum: tum ex ea sine aceto forbinio: tum galinaceorum testiculi: & saxatiles ex albo iure pisces: præterea fructuum aliquos ex iis qui astringunt, vel solius, vel cum pane. Quidd si appetentia decreta sit, ex medicamen-  
 20 to quod ex succo, vel ex carne cotoneorum conficitur, vnum aut duo coctilearia exlubebis. Atq.

ita sanè in prima remissione iis qui ex cruditate febricitant, ventre excernente, mederi conuenit. At si omnino venter astringitur, si quidd in superioribus intestinis, vel etiā in ipso ventriculo cibus crudus consistat, aliquid diatrion p̄pereon propina, eius videlicet quod in opere De tuēda sanitate laudauimus, ceu & simplicissimum, & ap̄tissimū iis qui cruditate laborat. Pōt deinde præcordia, omnēq. venter p̄fundare. Hoc vero, etiā m si inferius descēderint quæ vitiosa sunt, facies, pluris minorisq. ratione id varians. Siquidē plus & temporis & perfusionis exigit ad præparationē eorū quæ deinceps sunt agenda, quib. in superioribus vtriusq. corruptū nutrimentū adhuc manet. Sūt morbi id notabiliter ad inferiora sit, adiuuandū aut glande subdita, aut leui per inferna infusione est. Vtiq. si morbus simul adsit, hūc miriganibus nobis. Sin flatus, hunc comprimētib. Sin neuram fuerit, ex melle, aqua, & paululo olei fenum clymū faciētib. Vbi verō morius vehēmentior vrget, Sabinum oleum, in quo aliquid seui aseruit, vel gallinacæ, vel capilli liquatū sit, est vilius. Quorum copia si desit, incipiendum oleo parum ceræ est eloræ. Flatus verō sanandi sunt oleo in quo ruta, & semina quæ flatus discuntur, incocta fuerit: cuiusmodi sunt, apn, cumini, marathri, sinonis, aliāq. id genus. Vacuata aluo, nutriendū prout in ceteris quidem iis quos memorauimus similiter est, astringētib. tamen amona. Huiusigitur prima & secunda die obitis, si secunda die febris desit, hominem lauari permit-  
 30 tes: ac vbi sequenti nocte citra offensam dormire, sanum iam hominem prorsus existimabis. Si verō qui cruditas successit dies cum sequente nocte febris aruerit, vel vni in secundo die, ita tunc & accurandus, & nutriendus homo est. Quidd si nox tertie die febris quiddam paulullū aserit, ite sic quidem est formidandum, sed hos quoque posttridie laubabis, nutrieg, ac reliqua omnia in illis, vt ante desinunt est, ad portionem exequeris. Acida autem cruditas non contingit in biliosis temperamentis, nisi admodum raro, idq. ex cibus qui promptè accescunt: nec accendere febrem diatriam solet, æque vt nec concoctionis tarditas: quandoquidem sicubi ob talem cruditatem febricitant, quibus amara bile abvndat in temperamento, obstructionis & humorum putredinis est suspicio. Ad hac, fumidus vapor ex tarditate concoctionis, aut cruditate, in qua ructus sentiuntur acidi, nunquam excitarur. Quippe frigida halitus abs talibus succis ascendunt, lique omnino paucissimi: minimè autem vapores multi, humidiq. ac fuliginosi, quum neq. in illis quæ sunt extra, aliter aut fumum edi, aut fuliginem videas, quā fumum ex materiis semivitis, fuliginem ex immodice ascis, vtrique. Est namq. fuligo vapor terrestris. Fumus mistio quardam ex terrestri, aquęq. substantia. Absoluta iam in illis naturis, quibus amara bilis redvndat, diatriam febrium disputatione, ad aliud corporum temperamentum transsumus, in quo vt calidum frigidum, sic siccum humidum prevalet. Est enim hæc intemperies omnium maximè obnoxia putredinis morbis, propterea quod per ipsam finitur ad putredinem proximè accedit: id quod tum ex sudori-

Diatriam p̄pereon esse medicamentum crudis cibibus ventriculo aptissimum.

Intestinum maris lenientia.

Flatus distanti quafiat.

Andem cruditatem non contingere in temperatis biliosis: quæq. admodum raro atq. acida die, febrem ducit.

Fumidum halitum non excitari ab acido ut dicitur.

Fumus ex materia semivitis nascitur.

Fuligo ex immodice vitiis materiam generatur. Insuper calidum atq. humidum, esse maxime obnoxium morbi putredinis.

Diatriam p̄pereon esse medicamentum crudis cibibus ventriculo aptissimum.

Diatriam p̄pereon esse medicamentum crudis cibibus ventriculo aptissimum.

Diatriam p̄pereon esse medicamentum crudis cibibus ventriculo aptissimum.

Diatriam p̄pereon esse medicamentum crudis cibibus ventriculo aptissimum.

Diatriam p̄pereon esse medicamentum crudis cibibus ventriculo aptissimum.

Diatriam p̄pereon esse medicamentum crudis cibibus ventriculo aptissimum.

Diatriam p̄pereon esse medicamentum crudis cibibus ventriculo aptissimum.

Diatriam p̄pereon esse medicamentum crudis cibibus ventriculo aptissimum.

Diatriam p̄pereon esse medicamentum crudis cibibus ventriculo aptissimum.

bus concidere est, qui grauior his olent: tum vero ex vitiis, deiectione, atque ad eo ipsa etiam expiratione. Etenim qualis est hircorum, talis est harum naturarum temperies. Ideoq; prompta est ex qualibet occasione, tum aliis moribus, tum vero febribus corripi. Si quidem quum eorum cutis est stipata, effugere seque non possunt. Sed nec qui valentem crudelitatem contraxerunt, aut peruici fuerunt, aut tale quippiam aliud perpessi. Tam vero à crudelitatis indorosis olutrachonibusq; natura calida & humida, & sicca, promptius cadentur. Itaq; omnes diarix febres accenduntur promississime in istiusmodi temperaments, idq; ex qua libet eorum causarum, quas in liosis naturis retuli: curationemq; persimile illis habet, ac in paucis omnino disidentem. Nam quum lix nature humidores sunt, magis quam alix sanem & sicim perferunt. Est igitur illis ex via balneis, quod cutim laxet, non aut quod corpus lumentet. Quæcumque vero de eiusmodi natura sunt dicta, eadem & 10 de acquisito habitu dicta esse censendum. Quum autem octo intemperies exsistant in vniuersum, opportunitissima ad febres est calida & sicca: ac nisi quis illam (vt dicta est) cibet, ocyssime in ea diarix febris ut acutius mutatur. Propinqua huic est quæcunq; ad febrem spectat, quamvis sit ad alia deterior, intemperies calida & humida. Tertia ab his intemperies est, ea simplex intemperatix, in qua tantum exuperat calidum. Huius proxima est simplex altera, in qua siccum humidum preualet. 20 Ab hac denique media omnium est, scilicet quæ mediocritate in utraq; oppositio ne tuetur. Quatuor quæ reliquæ sunt intemperies, neq; facili febribus, occasione iam dictarum causarum, patient: neq; diaria tentare, si mediam tolerent, in plurim diurnum febres transeunt: imò aliquæ saltem earum, vix citra corruptelam contraxerunt redyuantia luumorum, vniuerse ex inedia sentiunt: ac potissimum quæ frigida est & humida. Ab hac quæ humida est. Tercio loco quæ frigida. 40 Quatto, quæ simul frigida & sicca. In eiusmodi ergo omnibus reueratur, temperamenti quidem ratione, victus ratio varianda est. Nam ex eo quòd eadem febri febricitant, non diuerfam, sed omnino eandem fortientur indicationem. Si quidem quod secundum naturam est, semper similia postulat. Quod autem præter naturam, contraria: quum vniuersum quod se naturaliter habet, custodire: quod præter naturam est, tollere expedit. Porro febri omnis præter naturam est: id eoq; victus rationem frigidam & humidam exigit. Temperamenta vero ipsa, aliis similia, aliis contraria postulant. Quæ enim vitio carent, similia perpetuo: quippe quæ seruare expedit. Quæ vitium habent, aliis similia, aliis contraria. Similia quidē, tum in aliis de quibus mox dicemus, tum in viciis omnibus. Contraria autem eo victu qui per sanitatem adhibetur, tum corrigere eorum intemperantiam est animus: necnon ubi eiusmodi vitio naturæ à longo tempore contra- 60 rix victus rationi assueuerunt: gaudent enim nature cōsuetum ferre. Duplex ita quæ nobis in iis qui sani sunt, finis proponitur. Nempe vel corpus sanū in pristina eius temperie reui: vel hanc meliorem elicere. In ea tamen natura quæ haud du-

biē in medio temperamento cōsistit, ab ipsa febri contrariorum indicatione accepta, eatenus humidum frigidumq; adhibebimus victum, quatenus siccius calidiusq; quum antea tam reddidit corpus apparet. Humidus igitur victus (vt testatur etiam Hippocrates) felsitentibus omnibus conuenit: maxime vero pueris, & aliis qui sic cibari assueuerunt. Etenim febricitantibus, quatenus februnt, ex ipsa contrariorum indicatione humidus victus conducit: pueris ex simili. Nam quū ætas ex iis sit quæ natura nobis insunt, similem sibi victum postulat. Quæ vero à consuetudine indicatio sumitur, sic sumpta est, si uix & quæ ab ætate. Quippe se uixit quæ quæ hanc iubet Hippocrates, perinde ac proprium quatenus temperamentum. Sed à regione etiam & anni tempore interdū indicationes sumuntur. Ceterum à consuetudine quidem semper est indicatio fundi, quoad si licet ægrotant homines. At ab ætate, natura, regione, anni tempore, & statu celi, vix temperata licet sunt, similia semper præsidiorum est indicatio, siue valeant homines, siue etiam ægrotent. Contra ab intemperatix, anni tempore, itatu celi, & regione, contrariorum est indicatio. Verum ab ætate & natura non absolute, sed cum consuetudine. Porro in illis in contrariis indicationibus tam conuenit expendi, quā magis iudicium eorum quæ ad indicationem conferunt: quæ quidem duplex existit: altera, quæ ex eorum dignitatibus spectatur, altera quæ ex ipsorum propriis substantiis. Quas sane ex collatione vni mediocrit, & quod secundum naturam est, esse accipiendas liquet. Omnibus igitur conspiciantibus in vni indicationibus, vnam prorsus victus rationem constituimus. Disidentibus vero inter se, quæ valentiores & plures fuerint, eas preferemus, ita vt victus species, quam he præscribit, anteponamus: minime tamen negligamus contrariam. Porro quæ à febri sumitur indicatio, ea reliquis, quando omnes contrarium esse faciendum dicant, numero quidem inferior est: magnitudine tamen quæ ex dignitate spectatur, vix superior existit, potissimum si longe à natura recessit. Quippe duplex tunc ei magnitudo accedit: & quæ ex febri genere provenit, quæ omnibus est cōmunis: & quæ propria ipsius existit. Sin vero parua sit febris, fas est reliquis omnes conuenientias indicationes vni cum ipsa conferri. Ac si quidem pares videantur, media victus ratio eligenda est. Sin altera indicatio exuperet, tantum recessisse à temperato et medio victu par est, quantum ea quæ pollet, sua contraria superant. Ac diariarum quidem febriū indicationes ex his capiuntur generibus, raroq; à laborantis virium modo. At febrium, quæ pluribus diebus assignant, indicationes, tum virium respectum necessariò adhibent, tum causarū quæ ipas excitant: exceptis tamen heclicis, vt potè quas nulla accendit causa: quemadmodum neq; corpus id quod iam libatū calorem ignis in se recepit, siue id lapidis sit, siue lignum. Illud namq; commune cum diaris habent, quòd videlicet non amplius fiant differunt autem in eo, quòd diarix in leui affectu calorem habent, heclicæ in habitu qui ægrè soluantur.

Humidus victus febribus, acutis huiusmodi, maxime in pueris.

Ceterum vni indicationes sumuntur, si uix & quæ ab ætate.

Indicatio ab ætate, natura, regione, anni tempore, & statu celi, vix temperata licet sunt, similia semper præsidiorum est indicatio.

Indicationes sumuntur, si uix & quæ ab ætate, natura, regione, anni tempore, & statu celi, vix temperata licet sunt, similia semper præsidiorum est indicatio.

Indicationes sumuntur, si uix & quæ ab ætate, natura, regione, anni tempore, & statu celi, vix temperata licet sunt, similia semper præsidiorum est indicatio.

Indicationes sumuntur, si uix & quæ ab ætate, natura, regione, anni tempore, & statu celi, vix temperata licet sunt, similia semper præsidiorum est indicatio.

Indicationes sumuntur, si uix & quæ ab ætate, natura, regione, anni tempore, & statu celi, vix temperata licet sunt, similia semper præsidiorum est indicatio.

Natura calida & humida, magis quam calida & sicca, promptius cadentur.

Intemperies calida & sicca est ad excipiendum febri opportunitissima.

Intemperies frigida & humida est quando ab inedia mouetur.

Naturalium sanctorum ordinis, semper similia postulant: vt cōtraria, quæ à natura ordine aberrant, febri requirit victus rationem frigidam atq; humidam.

Temperamenta intemperata sunt similia postulant.

Temperamenta vitiosa, quæ requirit similia, & quando contraria.

Natura quædam semper dissident.

## GALENI PERGAMENI

de methodo medendi, lib. I X.

**D**iarnum igitur curationem precedenti libro exposuimus. Quarum sane febrium vna accessio est, vnaque plurimum die, ex ipsarum salutem naturam, circumscribitur. Ceterum nisi quae eas commode tractet, in reliqua duo genera febrium, nempe in putridas & heclicas, transiunt. Putridas n. appellat, quae ex humorum putredine: heclicas vero, quae ex immodica solidarum partium nascuntur calfactione. At vero in illo transiit ad diarias in reliqua illa duo febrium genera, alterum quoddam febrium genus medium licet imaginari, quod neutri extremitatum sit idem. Ceterum medium illud, quod incidit, nec nosse, nec possit, nec reprimere, quae extremitatum, quarum existit medium, specie ignorat. Ergo ex advectione, cruditate, lassitudine, vigilia, perturbatione animi, vel bubone ab eadem causa aliqua oborto, nunquam ad tertium visum diem progreditur febris accessio, nisi quod delictum circumscribitur laborantem fuerit. At quibus, si putrida febris occurrat, eis illa vltra hos porrigi accessio potest. Etenim si putrida sit, vel obstructis exilib. meatibus, propter glutinosos, vel crassos, vel copiosos succos: aut conueniens, hoc ea quae corpus licantur: vel deinde improbe codensatis, hoc occursum causarum refrigerantur. Quas igitur febres vel conuenientia meatuum, vel reces corporum densatio excitat, haec & post primam accessionem desinit, si quae recedat ipsas tractet: & vere diarias sunt, tum dicuntur. At quae ex ob-

structione creantur, si haec quod pusilla sit, solus quod ipse similiter vel alia diaria possunt, si quae eas legitime fatiet. Sin autem adeo vehementer sint humores impati, ut valentius aliquid eorum eximat, postulat, id genus febres porrigi vltra vnum diem necesse est, ac, pende diarium genus videri egressas. Verum si neque humor putredine subit, neque ipsum corpus febri calore fuscipit tanquam habitum, visum genus illud febri, ab aliis duobus diuersum erit. Quare huiusmodi febri natura quidem eadem est cum diariis, nomen vero non idem. Si quidem quae febres ab initio ad finem visum vnicam accessionem fortissimum, in multos dies porrectae, ex synocha, hoc est, continentes vocantur. Quarum natura est duplex. Quaedam namque earum manifesta habent putredinis notam: quaedam proorsus non habent: quas nimirum ex diariarum esse genere cōstat. Quam enim accessiois remissio ex feruentium humorum transpiratione contingere solet, non transpirent autem proorsus in siutatione vehementi: necesse haud dubie est, multorum dierum fieri

accessionem. Igitur ubi in tali febre nulla subest occasio, quae alterius accessionis principium excitet, non modo multorum dierum evadit febris, sed absque invasione vllius accessionis, ab initio ad finem vna febris persistit, nec quotidianam, nec tertianam, nec quartanam referens. Quoniam igitur ex duobus his foveri febris potest, & quod totus vapor non transpiret, & quod illud visum ea quae contingit exaltatione: necesse est tunc esse synochorum differentias in vniuersum. nempe vel pari permanente magnitudine ea, quam in primae accessionis vigore habuit: vel aduciente semper exiguum aliquod, minuenve: atque haec vel aequaliter faciente, vel inaequaliter. Ac si quidem quod accenditur, ei quod transpirat par fuerit, nec au-

geri nec minui febrilis calor cerneretur. Verum si eorum alterum vicerit, visum quod vacuatur, nec cessaturum est febrim minui: sin quod aducitur, omnino increscere. Haec itaque est continentium febrium species vna, quae eandem naturam cum diariis sortita, absque humorum putredine in plures dies extenditur. Altera vero contingit, ubi in omnibus vasis, ac potissimum maximis, aequaliter succi putrescent. Quarum sane febrium illi gracili & frigido corpore neutra folet consistere, sed plurimum in iis qui sanguine abundanti, & corpulentis: quod nec obstruendo citra putredinem excrescere febri valeat, nisi id quod transpirat, & copiosum, & calidum sit: nec humorum putredine in omnes quae inter inguina & alas interfluit venas, aequaliter ac cito porrigi in frigido haberi potest. Debent enim quae putrescent, tum calida & humida esse, tum difficile habere transpirationem. Eodem fit, ut neque in frigida aetate, neque in frigido corporis temperamento, continens excitetur febris: quae modum neque in gracilibus, vel qui raro sint corpora habita: sed proorsus in temperamento, corporibus atque naturis contrariis. Proinde fit, ut qui ita febricitant, iis & pulsus maximus sit, & aequalis, & vehementis, arteriarum consistentia inter molle & durum mediocriter. At celeritas atque frequentia pulsus, pro ipsius magnitudine febris. Haec itaque sunt ambarum febrium communia. Alteri tamen priusam insunt notae putredinis, non modo in lono, sed in pulsu etiam, calidiorque qualitate iniucunda. Quarum sane febrium dignotionem & curationem ipsi tum ratione, tum experientia didicimus, qui statim ab adolescentia philosophiae studio capti, primum nos

ad eam contulimus: mox patris evidentis infomnio moniti, ad medicinam studium excolendam accessimus. Est porro continentium febrium praedictum maximum, si modo vires valentes sint, sanguinis diminutio, vel visum ad deliquium animi. Primum namque in contrarium statum agitur corpus, celeritatem ex animi defectu refrigeratur. Hoc vero nihil inveniri possit neque ipsis aegris, nec naturae quae animantes gubernat, incundus vellet. Postmodum in corporibus ipsis necessario supervenit alui deiectione, nonnunquam & vomitus bilis. Quas res statim a toto corpore maiores sudores excipiunt. Etenim vel sola sanguinis detractione sic obita, resituit olim ipse quendam adolescentem ardentissimam laborantem synocha. Cui sane post duas a sanguinis missione horas paulum nutrimenti exhibui, permisi quae vellet. Iam vero eorum quos ex sola obstructione febricitantes mihi videre contigit, nemo in putredine febrem incidit, qui sanguinem prius detrauxisset. Quem quidem, ubi valida virtus subest, & aetas permittit, visum ad animi defectum (ut diximus) mittere expedit. Vbi horum alterum haud satis respondet, tunus est, quantum visum visum fuerit, tantum principio detrahatur: quod desuit, iteratione supplere. Quo quidem praesidio omissio, in summi aegri discrimen veniunt: nisi eos vel viri roboret, vel lar gum profluum sanguinis, vel sudor copiosus, ex manifesta pernice eripiat. Agimus itaque impetum febribus, quae ex siuatione per obstructionem matibus oriuntur. Quas, si sine putredine

Putredini quae requiritur. Ceterum febrium in quibus non possit agni corpus perire.

Calorem patris infomnio a domini Medici non autem oportet. Continentium febrium praedictum maximum est, minus sanguinis vel ad animi deliquium visum.

Sanguine detractione in ardentissimam febrem, interpositis, hoc est, duabus, esse modice alendum agnum permittendum, qui quies sit.

Sanguine missio quando sit videbrandum, ut diximus, ad animi defectum non.

quidem consistant, ex diuturnum esse genere dixi. Sin in putredo aliqua superveniat, ubi in omnibus venis ac præcipue magna ea consistit, synochas, siue continentes excitant febres: ubi in vnicâ animalis parte, exacerbationes quæ certo ambire petant. Quibusigit corpus ex succorû abundantia inhabile ad transpirationem iam redditur, tantû caloris cõgestit, vt inde iam febrat, iis tantû sanguinis detrahendû est, quantum vires tolerat. Alioqui certe verendû est, ne aut suffocent, aut corpius in syncope: nisi eos vel vinû robur, vel plurimus sudor, vel largû sanguinis pluvius à morte liberet. Nec verò exultimes de plenitudine illa, quæ cõparatur ad vires: hæc à nobis sermonè fieri (quippe quæ nec sic obstruit venarû orâ, vt refrigerationè phibear, nec tunica earû distendat, nec ruborè, nec tumorè invehit) verum de ea quæ contineri in vasis vitâ nō valet, quæq; ob id ipsiûm solet prædicta symptomata inducere. Si quidē copia liæ, dum bonitatē suâ seruat, vt pariter augeat cum vium robore est nataura si quidō lias grauat, nec de cætero augebitur, & bonitatē naturæ amittit: quare tunc fieri nequit vt nō putrefcat. Ergo festinare ad sanguinē detrahendû oportet, quod vasorum natura, ex transpiradō ventilandūq; naturalem temperē seruât, humoribus, eo quo inter iuitia modo, domineci: quando si ad intemperē verâ laborabit, metuendû est ne hi putrefcat. Excitat aut interperies in ea, ex febris calore. Optimû itaq; est in cuiuscumq; febribus, statim nō numero diebus, sed vni vinû robori attentû esse. Quocirca nō solum sexto septimoq; sed etiâ sequentibus diebus, sanguis mittendus est. Quod si aut alij medici, aut æger, aut ppinus ipsius, nō pmitat vt leues venæ, ad frigidâ exhibendâ accedat, sed diligenter antè discernēs, quantum nocuentû ex ea cõtingere possit. Quippe intēpestiuū immodicèq; exhibitâ, lentos & crassos humores attenuari, digeriq; prohibet: imbecillas particulas corporis cõducit. Nā nullus illic spirandi difficultatē, conuulsionem, atq; tremorē concitat. Tum verò quibuscumq; in particula principe tumor aliquis & phlegmones, cedematos, aut scirrli genere consistit, is frigidâ offerre nō licet. Sed neq; iis quibus obstructio, putridûve humor non concoctus incōmodat. At si per continentes febres concoctionis humorû notas videns, absq; impedimēns expositis, audacter ægris frigidâ quantum appetit, dabis: præcipue si ita li potioni assueuerint. Porro erysipelas verû, consistens in aliquo viscere, non aliter quàm frigidâ potu sanabis. Sin verò mistû cum phlegmone sit, in loc cõcoctionis expectandâ sunt noræ. Ceterum minus ruti, is qui paxillum sanguinis carnisq; obtinent, frigidæ potio est: celeriter nanque ad solidas animalis peruenit partes, nulli quod eius vim frangat, occurrunt. Quia ratione enā hec febres nec prorsus frigidâ, nec multâ aqûa desiderat. At cõtinuû febriû maxima remedia hæc duo sunt: detractio sanguinis, & potio frigidâ. Verum illa nullo non tempore, modo vires li stineat: hæc, quum & in pulsa & vrinis, cõcoctionis evidentes cernuntur noræ, febris autem est maxima. Est etiam habendâ ratio in missione sanguinis, tam eorum quæ præcesserit, quàm quæ consequentur ipsam. Nam si præcedat ciborum crudi-

tas, tanto tempore differre vent sectionē iubebis, quantum sufficere tum ad eorum concoctionem, tum vt excrementa descendat, videbitur. Sin fequetur necessariū vacuatio quæpiâ (vt, exēpli gratia, muliebre profluuiû) tantum illi relinquendû est, ex eo quod superflui existit, quantum est per eam vacuandum. Sed nec negligendâ interim naturæ eius qui venit vacuandus: si vni negat, nec cœli status, sub quo & regio, & anni tēpus comprehenditur. Sunt, nōnulli ad extrahendos digerēdōq; succos, natura propensio: nempe qui humidi & calidi existit, quig; raro sunt corporis textu. Ad hæc, quib; os vctus aut amara bile redvdatur, aut imbecillit est, aut supra modum sensile. Pueri certè propter ætatē perpetuū. Cœli verò status vires calidus nimis & siccus est, corpus in ambientē resoluat. Atq; hi quidē scopi sunt, qui à sanguinis detractiōe dehortantur. Eam aut postulat, vñ cum affectu, cuius causâ primû requireretur, habitus durus densûsq; quique digeritur ægrè: tum ambiens humidus frigidûsq;. Quum autem in vniuersalibus methodis, in particularibus exercitiis consistat, fieri non potest, vt sine multiplici in ægris singularium exercitatione, quod ex vii sit, facias: nec sine vniuersali cognitione, probè exercitatio procedat. Non licet siquidem vilius artis scientiam nancisci, nisi & methodum quandam habueris per vniuersalia theorematâ, & in particularibus te exemplis exerceas. Vigetur reuertat ad methodum: quidem virtutis considerandam ad curationem morborum sæpe maxime nec cessant arbitror, sic vt quæ circa ægrum administrantur, omnia fermè eius vnius causâ fiant: aliquando medio ceteri necessarium, sic vt aliquid ex hac quoque, ad ea quæ faciendâ sunt, consiliū petatur, non tamen præcipua faciendorum ratio huic omnis dirigatur. Possim rursus ostendere, virtutem adeo exiguum ad inveniendâ remediâ cõferre, vt propter exilitatem etiam lateat: aliâ verò prætermitti, ac silentio præteriri, quasi prorsus ex vnliter considerandis nō sit: vt in diutinis febribus, in quibus vires nullam providentiam requirunt, vt pote validæ. Verum quod in virtute accidit, id in reliquis omnibus quæ aliquid faciendum indicant, vñ venit. Horum autem omnium adiutum Hippocrates nobis ostendit, incultum tamen, quem methodo postea nos explanauimus: perinde vt Traianus fecit, qui omnes Italiæ vias asperitate difficilis tescit, instaurauit. Vt verò accuratius de ipsiis vrbibus differam, operæ precium est scire, tribus diuersi generis facultatibus siue animis vniuersum animal gubernari. Quarum sanè prima, quæ stirpibus est communis, quàmq; vocant naturalem, atq; etiam appetitivam, iecur pro fonte habet, per venâq; illinc sparsam in vniuersum corpus, id alit. Secunda autem est, quæ non modo vt stirpibus, aut vitæ prædixi, sed etiam vt animalibus anima, est insita. Hæc in corde, fonte caloris insini, residens, ab ipso per artenas ac eodem ortas in totum corpus diffeminatur: dicēdūq; tum vitalis facultas, tum irascibilis anima. Terna deniq; est anima ratiocinatrix, q̄ in cerebro domiciliū habet, voluntariis æctionibus præsidet, per neruûq; ceu canales, toti corpori sensum & motû largitur. Has igitur facultates

Synochi quando struatur.

Accriscens febris vnde erigetur deuant sanguine quibus detrahendum sit.

Plenitudo febrium vires.

Plenitudo febrium vires.

Sanguinem esse quo vñ de mittendum, etiâ si putredine, id autem atque vñ fiant.

Frigida potio veniendi, si æger nō paratur si, si iecur vñ, frigida intemperies atque immodicè vñ quæ accretas mala.

Frigida quibus nō offerenda, ac quib; addenda danda.

Erysipelas verû cõspicui in aliquo viscere, nō aliter quàm frigidâ potu sanatur.

Frigida potio cur maculosis cutisq; atq; ob id bellicis laeas.

Concoctionum febrium detractio sanguinis atq; potio frigidâ, si sum ma remediâ at quo illa quidam vñ tēpus, si vñ talitè: hæc autem, ap. p. ratiocinatio est.

Concoctionum febrium detractio sanguinis atq; potio frigidâ, si sum ma remediâ at quo illa quidam vñ tēpus, si vñ talitè: hæc autem, ap. p. ratiocinatio est.

Sanguinem detractio quæ fieri consideranda.

Sanguinem detractio quæ fieri consideranda.

Sanguinem detractio quæ fieri consideranda.

Sanguinem detractio quæ fieri consideranda.

Sanguinem detractio quæ fieri consideranda.

Sanguinem detractio quæ fieri consideranda.

Sanguinem detractio quæ fieri consideranda.

Sanguinem detractio quæ fieri consideranda.

Sanguinem detractio quæ fieri consideranda.

Sanguinem detractio quæ fieri consideranda.

Sanguinem detractio quæ fieri consideranda.

Sanguinem detractio quæ fieri consideranda.

Sanguinem detractio quæ fieri consideranda.

Sanguinem detractio quæ fieri consideranda.

Sanguinem detractio quæ fieri consideranda.

Sanguinem detractio quæ fieri consideranda.

Sanguinem detractio quæ fieri consideranda.

Sanguinem detractio quæ fieri consideranda.

Sanguinem detractio quæ fieri consideranda.

Sanguinem detractio quæ fieri consideranda.

cultarea seruare, nihil planè est aliud, quam vitam seruare. Siquidem qualibet earum amissa, necessum est reliquas simul perire. Ac proinde in opere De sanitare tuenda, huc omne cõsiliũ direxi-  
mus. In hoc verò, primò proposuĩ est, morbi sub-  
lano. Nã cuiusmodi in illo est sanitatis tuio, eius  
modi in hoc est morbi sublano. Quorũ vtriusq; cõ-  
muni est ipsa vite custodia. Hoc tamẽ inter est, q  
que secundæ valetudinis tuendæ gratia gerũtur,  
eadẽ itam vitam tuentur: quæ verò affectiões  
preter naturam in morbis discutiũt, ea nõ omni-  
no vitæ custodiant. Quippe aliqua eiusmodi præ-  
dita sunt facultate, vt si immoderatè aut intempe-  
stiuè vitare, vitæ adimãt qd solent vacuationes im-  
modicæ. Ergo quæ virtus tantopere necessaria sit,  
cum aũt laxata oĩa vitæ remedia, si q; ipsi pa-  
rum moderatè vitatur: vtrq; ad versè inter se facien-  
dorum indicationes in talibus componi. sunt, in  
quib. affectus, quò expunget, notabilè vacuatio-  
nem desiderat: virtus aut hanc ferre nõ valet. Cæ-  
terũ quæmodomodò nihil quod sanitatẽ tuẽ in  
vitalibus vires corrumpit: sic in ægrotis aliquĩ-  
do virtus succedit ita, quæ vel in perniciẽ eius  
administratur: vt si evacuemus in plenitudine q̃  
est supra vires, aliquĩdo ab ipsa dissoluitur. Ere-  
nim in synochis febribus, ex meatuum stipatione  
ortis, quoniã valida plerũq; virtus est, contra peri-  
culum vacuatiõis adhibetur. In aliis verò quæ ex  
corruptela humorum gignuntur, existit maxime  
periculosa. Siquidẽ qd corruptũ est, alienũ à natu-  
ra quũ sit, id se auferendũ dicitur, vel venã incisa,  
vel purgatione. Horum autem præfidiõũ neutri  
feret imbecilla facultas, si quando cum corrupte-  
la coiuerit. Oportet igitur, vbi indicationes ita sibi  
adversantur, paulatim quod vniuosum est, vacu-  
are: paulatimq; quod salubre est, in eis locum  
reponere: quam curationem vitiosi succi, Medici  
epicrasi nominant. Quum igitur sectio venæ,  
sanguinis fir vacuatio: sanguis aut ipse vitæ, pos-  
selsio naturæ existit: sic vtrique oportet venæ sec-  
tionem fieri, vt quod in vitæ ex sanguine ipsi na-  
ture est, emittatur. Fir porro sanguis bisariam na-  
ture in vitæ: vel quum propriam qualitatem ad  
vnguem non ferat, nec amplius nutrire, sicut  
prius, potest: vel dum ita multitudine creuit vt  
premat vires, aut distendat vasa, vel rumpat ea,  
vel obstruat. Atq; in his quidem misio sanguinis  
vitæ est, cœ vacuantem præfidiõrum vnum: in  
aliis autem, cœ quod humorum vehemẽtorem  
imperum ad partem diuersam reuocat, vel ad late-  
ra deriuat. Postulat autem semper valentes vires,  
quæ modo vacuationis eius respondeant. Quo-  
ties igitur virtuti notabilis ex vacuatiõib. auxilia  
noxia incider, toties ipsa vitæ aliquid indicabit,  
verò quæque, vt quum manifestè iuuabitur. Vbi  
verò ex ita quæ affectum submouent, nec com-  
modum illi accedere viliũ, neque in commodum,  
ibi veluti in vitæ prætermittitur. Porro quic-  
quid aliquam præstat indicationem, si natura id  
simplex sit, etiam quod id indicatur, vtrique simplex  
erit. At si illud compositum fir, & hoc erit quo-  
que compositum. At si nẽ quædam custodiam sui,  
quædam amorionem indicant. Virtus itaq; sem-  
per vnam rem indicabit, vtriusq; vite custodiam. Cu-  
stodietur autem, primò quidem, si quod ex sub-

stantia ipsius vel inanimatum, vel alteratum est, cor-  
rexerimus. Secundo verò, si quæ ipsius substanti-  
am vacuare, alterareq; possunt, prohibuerimus. Aestimari autem debet intentum, quod magnitu-  
dine, dignitate antecellit. Maxima igitur digni-  
tas vitum ipsarum est, quando vitæ ipsam nobis  
ex harum custodia consistit: vtpote quum vi-  
tam, aut ipsas esse vires, aut earum actiões, ne-  
cessè sit. Virtus ergo omnium prima custodiendi  
hominibus est. A vitæ indicatiõne proxima exis-  
tit, quæ ab affectibus, quos curare conamur, sub-  
ministratur: postea deinceps reliquæ. Quicquid  
igitur indicationi, quam vires præbent, ad versa-  
tur, id secundi est loci. Quæ verò cum in usq; con-  
ducunt viribus, in idem competunt, hæc vtriusq;  
calculum referunt, & eorum quæ prima vitæ no-  
te, & eorum quæ secundæ. Quare contra contro-  
versiam faciendã. Quæ verò ad versantur, aliquan-  
do administranda prorsus non sunt, aliquando  
paulatim. Prima igitur indicatiõ omnium est, quæ  
a virtute sumitur: non tamen sic prima, vt cura-  
tionem nos doceat, quum ex numero curatrici  
indicationum non sit, sed vitalium. Nam neque  
vt valeamus, neque vt à morbis liberemur, ab ea  
quicquam primũ desumimus, sed vt viuamus:  
quamvis ex accidenti interdum virtutis roborati-  
o ad affectus curationem conducatur. At verò me-  
dicatrices indicationes à morbo ipso sumuntur,  
& à temperie corporis, & ab ambiente nos aère,  
quæ causæ sine quâ non, rationem obtinent: quum  
sine ipso nec tolli morbus, nec teneri sanitas pos-  
sit. In omni itaque curatione agendorum, indica-  
tiones in his tribus ad summum consistunt. Re-  
liquæ autem omnes ab his in partes diductis, ori-  
untur. Cæterũ affectus ipse hanc quæquam in  
causâ diduci est aptus, quæmodum vtrum tempe-  
ries atque ambiens aër, sed tantummodo in disse-  
rentiis. Nam aut in similibus consistit parti-  
bus, aut in instrumentariis. Ac in similibus quid-  
em, vel simplex est intemperies, vel composita.  
In instrumentariis, circa simplicium partium vel  
posituram, vel formam, vel numerum, vel magni-  
tudinem, tum quæ horum sigillatim traditæ sunt  
differentiæ, consistit. Porro affectuum qui simpli-  
ces partes occupant vnus, est intemperies calida.  
Quæ si in totum corpus diffusa sit, appellatur fe-  
bris. Idemq; omnis febris, quæ febris est, humecta  
nõ refrigeratõis remedia sunt. Ac si sola quidem  
sit febris, ad refrigerandum humectandũq; , vel  
vtrũ ad finem, dirigetur omne medentis cõsiliũ.  
Quare materia inventa, opportunum tempus ex  
quatuor febribus tempusbus sumes: quantitatẽ  
verò, ex conferendo cum naturali libitu mor-  
bum. Quippe quannim is recessit à naturali li-  
bitu, tantum opus est ægri refrigeres & humec-  
tes. Ambiens autem aër (causa fugere commeteri-  
um non licet) si contrariam morbo temperiem  
habeat, & præfidiõrum numero est vnum: si simi-  
lem, vna est morbificatiõ causarum. Idcirco tunc  
inhibenda eius noxa est, scilicet reliquorum au-  
xiliorum humiditatem ac frigore intensis, adau-  
ctisq;. Ipse autem arte reddendus est talis, qualis  
ad profigendam febrem, aut aliam quampiam di-  
spõsitionem, desideratur. Siquid morbus si cœcus  
& calidus fir, humidiores frigidioreq; domos

Vitam quæ me-  
do seruata sit.

Indicatio dis-  
tincta esse a-  
sumenda  
Vitam esse aut  
vires ipsas, aut  
ipsarum actiões

Indicatio vni-  
us primæ est  
quæ a virtute  
sumitur, non sic  
tamẽ vt cura-  
tionem nos do-  
ceat.

Indicationes  
medicatricis  
vnde suman-  
tur.

Morbi differe-  
ntia.

Febris quid,  
febris remedia  
humectatiua re-  
frigeratiuaq; vi  
sibi.

Atq; commeteri-  
um non fugere  
hanc quæquam  
possi.

Gratia parti-  
um, qd ea  
quæ sanitatem  
tuent, quæ in  
non veniant,  
& dissuant.

Vacuatio rem-  
diõis omnia vt  
vires custodiat.

Epicrasi quid

Sanguis probat  
est possessio ma-  
iore,  
Sanguis dupla-  
tus in vitæ  
notetur.

Sanguis in vitæ  
fir interdum est  
vitæ vt præ-  
fidiõrum vacuati-  
onem ad partem  
diuersam vt re-  
uocat, aut deri-  
uat.

Vires quando  
prestant indica-  
tiones vires,  
qd quando in-  
ueniunt.

Vitam semper  
custodiat, aut in-  
dicat.





verramus, repetita tñ mentione diatarum: quā & ipse, insensu medicorum, in plurium dierum febres aliquando degenerent: idq; vel earum effectrice causa abeunte, vel etiamnū persistente. Porro abut effectrix causa, quoties ab ira, dolore, vigilia, cura, æstivo sole, fangatione, & bubone qui iam desinit, citra stipationē febris est excitata. Manet, quoties vel ab externa causa, vel ab ipsa febre, stipatio aliqua est orta. Nā & frigiditas, & stringentium vias, per mediā stipationem semper febrem excitat. Vltio præterea nōnunquam cōstitat corporis habitum. Iā ipsum febris principiu, vbi cum horrore invasit, stipationem subinde fecit. Quinetiā glutinosi, & crassi, aut etiam copiosi succi, vbi medio-riter obstruxerunt, diariū aliquādo febrem accendunt. Dicuntur autem id genus febres omnes diariæ, quia solui vno die sunt apte computata cum hoc vñ & nocte. Ceterū non est idem diatarum omnium affectus: sed ab aliquibus inseparabilis stipatio est: ab aliquibus minime inseparabilis, sed vel vt plerūq; simul adest, vel ambigua forte, vel rarō. Inseparabilis stipatio est is, qui ex aluminosa aqua, vel chalcantide, vel tali quapiam alia, aut ex frigore, aut leui obstrucone febricitant. Plurimum verō is adest, qui ex vitione febricitant. Ambigua forte, is, qui ex fangatione. Quicūq; verō ex ira, vel tristitia, vel vigilis, vel pernicii studio, vel cruditate, vel bubone febricitant, is rarō adiunctū stipatio est. Atq; harū omnium febriu nulla (quā vtiq; ex ipsa sit) a se cundā vīp accessione per durat, sed intra quatuor & viginā horas omnino desinit: idq; cum sudore, vel madore, vel transpiratu quodā halituoso. Aut si quando earum aliqua (quod tñ rarius contingit) longius trahunt, duæ is accedūt cause quæ ipsas solui verant. Earū vna frigus est, quod vel ex ambiente aere, vel ex vñctione quapiam extrinsecus admota, pveniat. Altera egregia illa diarctica, est si qui videlicet hāc transire, medicorū insensu cinguntur. Multæ igitur apparent diatarum esse febrium differentie particulares. Vna, quando iam prius recessit ipsarum effectrix causa: vel vñ vñtio. Altera, quādo hæc etiam adest: sicuti stipatio. Cuius duæ sunt differentie: nempe exiguarū meatuum & densitas, & obstrucone. Sanē densitudo ipsa, aliās ex siccitate pvenit, aliās ex frigore, eōq; vel simplici, vel cum astrictione vi. Ii verō obstrucone ipsarum, alia est quæ abvndāna, alia quæ ex qualitate succorū, sicuti qui aut leni, aut crassi sunt, incidit. Præferret autē inter remedia, in ea quā copia facit, sanguinis missio: in ea quæ ex humonum qualitate cōstitit, attenuamentū vius. Cōsiliū verō sumptū a viribus, vt in diariis sanē est exiguum, ita in is qui pluribus diebus vrgent, sanis magni est momētū, eōq; maioris, quō hic sunt longiores. Enimvero vbi naturaliter vires se habēt, ne minimū quidem in diutaris febribus vacationum vñm morantur: vbi autem sunt infirmiores, pro magnitudine imbecillitatis, impeditur vñs auxiliorum vacuantiū. Rarius autem accidit, vt proximus in primo, secundōq; die, vires imbecillæ cernantur: id quod tamen interdū accidit, vel propter ægotantis malum corporis habitum, vel propter senium. Nōnullis etiā fangatio. vbi tristitia, vigilatq; præcesserūt, & inedia per to

tum secuta est diē, dein febris prius quā homo cibaretur, circa vesperā occupavit, & uñ infomnis est acta, vires impensē reioluit. Porro quibus temperies corporis ad siccū calidūq; conuersa, febrem accendit, q; interdū vel in prima invasionē accessioneis nutritiū sunt, nedum autē illā. Eis autem soleo ipse sorbitionē ex alica exhibere, insectus in eam mali punici granis: qui cibis bulio so flomatio lo est opimus. Nam & roborat hunc malum punici: & alica, quā diutissime in eo citra corruptionē maneat, scilicet cōcoquitur, idq; nec acefcescit, nec etiā ionatū. Igitur inordēs halius, succosiq; vbi per sensibilia corpora fertur, horrores & inxquales totius corporis cōcusationes facit, in is, quibus cute stipata, quæ prius transpirabat, iam sunt detenta. Quæ quidem, si fuliginosa sint, febres accēdit. Eiusmodi autem halius, succosiq; tum multa & veliciens dimotio, tum vigilat, & ira, & dolor, & cura, augent: tum proxime ab istis, vñ illud per se interdū augere eos sufficit, vtiq; si cibū quis nō iumpserit. Eiusmodi namq; corporis halius in is natus, quæ facili amaram bilem gignit, ex longa inedia biliosus. Cōcusio itaq; siue rigor succedat, propter eorū quæ feruntur extremos, tum multitudine, tum acrimoniā, tum imperis celeritatē, tum laborantis virium imbecillitatem. Horro verō fiet, vbi & qualitas eorum, & imperis velocitas est remissa: tum copia minor, ac ponsimū quā vires tristi obstruunt. Quod si longius remittatur iam dicta, ne horro quidem cōtingit: sed vel quidam cū vñcrosus sensus, vel tantum inxqualitas. Porro quibus cūq; virtute exstite imbecilla, squalidūq; ipsius corporis habitus, incipientes adhuc accessioneis vñ di adesse symptomata, is omnibus panem ex vino diluto & calente, maturē exhibebis, horrorem statim inhibebis. Quāto verō hos citius cibaveris, tantō solcit magis febrem proliuieris. Sin duæ horæ ab initio inxqualitatis inie possint: sunt nutres tunc quoq; modō adhuc daret horro: prædicens tanē, quōd hi febricitabunt, ceterum innoxia febre, & cui cūta maior succedet: quo facto, tum lauare, tum nutrire debebis. Quod si horro præterit, ac iam planē febricitant, id tēporis non sunt cibandi sed decrescere iam accessione, atq; interdū in summo vigore, nutritiū sunt, solutionis integritate nō expectata. In nullo namq; squalido affectu cōmōde finitur accessio, priusq; illi vel ex lauo, vel humido victu, humectatio accessit. Calidus itaq; & siccus natus, siue & primo ortu sint tales, siue sint etiā acquirunt maxime inedia aduersat, febri paratissima causa. Inter alia autē, calidus in summo, siccūq; cæci itatus, q; dicta temperaturā efficit. Hæc autē itatus aō anni tempore, q; estate, planē incidere nequit: sicuti nec humidiflatus pariter frigidissimūq; que, in alio q; hyeme. Corpora igitur calida & siccā, ex inedia facile in febres ardentes inoditū quibus, nisi prius mors occupet, in hecicas trāseunt: atq; ab his, in marasmū: vel pronus ab initio, ardentibus præteritis abest in hecicas. Maxime autem siccā, calidāq; dispositio corporum, a principio febrens hecica corripit: id quod olim cuidam iuueni configit, qui ex ira febricitauit. Cui quidem, quoties nutritus est, fonzanz planē gelidæ dedimus

Nutriti etiam  
no prima inedia  
sunt accessio-  
nes que sint.

Ponimus in a  
liam, viresque  
iam roborat.

Succos actus  
que pveniat.

Rigor vnde  
accidit.

Horro vnde  
pveniat.

Vitæstus fra-  
sus qui dicitur.  
Horro vnde  
dantem in pro-  
prio accipit, in  
istis panis  
ex vino diluto  
& calente ex-  
hibebis.

Nutriti labe-  
ris dum hor-  
ro qui pvenit.

Inedia aduersat  
febrem calidam  
siccā naturā.

Heccica febris  
a principio  
corripit calidam  
& siccā dispositio-  
nem.

Diarias febres  
dum vespere  
trahunt, diu  
ternantur fieri.  
Diarias causa  
quæ quando rursus  
dant, & quæ de  
possibile in  
corpore.

Stipatio quæ  
faciat.

Diaria febris  
non dicitur.  
Diarias affec-  
tus multiplex.

Ephemera fe-  
bris ea quibus  
accidit, modis  
faciat.

Diarias proinde  
vnde acci-  
dat.

Diatrias.

Diarias mal-  
tipies differen-  
tia.

Impatio da-  
prie.

Diatrias mal-  
tipies differen-  
tia.

In diebus et vi-  
ribus sumptis,  
in diariis quo-  
dam tempore, in  
pluribus autē  
diariis febribus,  
maximè fieri  
esse morantur.

Vires primā  
aut secundā  
die ab initio  
morbo, vnde re-  
solvit accidit.

interim binos cyathos, inter im ternos: quoddā fri-  
gidam simul multam sibi dari, qui ita sunt affecti,  
citra noxam non ferunt. Quocirca vtilissimū fue-  
rit, vbi febris ideā perspexeris, in prima statim oc-  
cassione, minori cū percipio, copiosiori frigida vi-  
ti, corporibus ad validam siccitatē nondum per-  
ditiis. Iam verō quemadmodū in quibus febris  
accenditur propter mordentem acrimoniam ex-  
cassati attenuatiq; a Sole, inedia & laboribus, suc-  
ti, maximum eius remedium est humidum nutri-  
mentū: sic ē diuerso, vbi ob copiam, vel obstructio-  
nem, vel phlegmonem, vel humoris alicuius pu-  
tredinem, febris est orta, maximo malo est cibus.  
Quare hos quidem, nec in febris inclinatione, ci-  
tra noxā i nuias, nedum ipsa accessione invaden-  
te: illos verō, omni certē tempore, sed potissimum  
per inclinationem. In summa verō, illa duo ā pri-  
mo statim dic, sunt tibi in omni xgro spectanda:  
morbi summus vigor, & xgrotrans vires, ā quib-  
cibandi consilia petas. Postea si transferi summum  
incremētū sine omni cibo poteris, in cibi abstine-  
tia hominem ipsum seruabis. Sin exiguum admi-  
niculum requirat, abundē erit sola multa. Quod si  
mirus desiderat quim sit multa, pisanæ cremo-  
ris fons erit. At si fas non est summū morbi incre-  
mentum aut tenui vultu, aut inedia transmitti, id  
agendum, vt homo statim in primā accessio-  
nis inclinatione nutriatur. Alioquin verō ipsum, &  
quum inualuit adhuc est, & quū incipit, cibandi.  
Sint porro hi siccō temperamēto & calido, oportet,  
tum viribus necessariū imbecillis: quū fieri ne-  
queat, vt abvnde siccū calidūq; corpus, si febricit-  
et, viribus sit valētibus. Si autē cum eiusmodi fe-  
bri & corpore, momentanē cū membri phlegmone  
sit coniuncta, omnino xger morietur, magisq; id  
certum est, si vel peripneumonia, vel pleuritis, vel  
angina, vel ventriculi, vel iecinoris phlegmone in-  
ferat. In quibus sanē affectibus vna salus est, vi-  
rium robur. Nam quod ad phlegmonem quæ in  
iis est partibus attinet, minimē planē est cibandi.  
Quod ad virium infirmitatem, vtique sepe.  
Ac proinde necessum est, aut resoluantur vires,  
aut phlegmone augeatur. Quoties igitur vel ex  
lassitudine, vel ira, vel pluribus curis, vel vigiliis,  
vel tristitia, vel longa inedia, vel vniuersū vna co-  
cunibus, siccātū corpus est, ac febris invasit, quæ  
& aridam reddit cutem, & signum calorem refert:  
vix hunc talem timor est hæc febris correptū  
iri, potissimū in æstate, ac cæli statu siccō calidoq;.  
Oportet autem quamprimum pisanæ cremore,  
& foritione ex alica nutritum, panēq; post obla-  
to, aquæ frigidæ potionē hominem cures. Quippe  
propterea extinguitur, ac cessat omnino febris,  
modō nec phlegmone aliqua ei sit adiuncta, nec pu-  
tridus humor. Quamquā ego etiam vel si hæc ad-  
derant, xgrotrorum non paucis aquam frigidam  
dedi, tutius esse ratus, phlegmonas in præsens au-  
gere, quā finire hominem in hecticam febrem  
prolabi. Cæterum si magnū fore in cōmodum, vel  
humori putri, vel phlegmone sit suspicio, ā frigi-  
da quidem danda abstinebis: refrigerantibus autē  
remediis, quæ foris applicantur, uteris: modō ea  
super os ventriculi, aut tota præcordia, modō su-  
per pectus imponens, vbi scilicet plurimum sub-  
esse caloris, maximē iudicabis. Balnea etiam iis

qui siccato plurimum corpore sunt, & citra humo-  
rum putredinem febriunt, non incommoda exi-  
stunt. At phlegmonas subsequuntur febres pro-  
pter putredinem humorum, quæ in ipsis impacti  
habentur. Possunt tamen vel citra phlegmonem,  
in ipsis vasis aliqui humores putrescere: idq; aut  
in vna animalis particula, in sinibus ipsorum im-  
pacti: aut etiam in totis eorum capacitatibus, quæ  
inter bubones & alas sunt, comprehensæ. Vbi igitur  
citra putredinem quæleni corpori febricitra-  
te contingerit, caput totius curationis in iis reme-  
diis quæ refrigerent humectantq; statuere opor-  
ret. Porro duplex genere est huiusmodi prima  
materia. Vna, eorum quæ foris incidunt: altera,  
quæ intus in corpus sumuntur. Extrinsecus cor-  
pori incidunt, tum aer ipse qui nos ambit: tum  
pharmaca, quæ cum humectandi refrigerandiq;  
vim obtinent: & tertium præter hæc, dulcis aque  
balneum. Intro in corpus sumuntur, quæ edun-  
tur, ac bibuntur, & inspiratus aer. Ab his generi-  
bus tentandum est propositis hoc loco febribus,  
tum humiditatem, tum refrigerationem compa-  
rare. Verum refrigerario, quoniam per efficacissi-  
mam qualitatē inducitur, & parui temporis est,  
& periculosa. Contra siccitatem, per ea quæ humec-  
tēt, curano, vt longi temporis est opus, ita mi-  
nus est, quā refrigeratio, periculo expōita. Si  
igitur tēperatus sit aer, qualem se exhibet, tali eo  
est utendū, nihil amplius de eo nobis sollicitis. Sin  
verō admodū calidus, vel admodum frigidus sit,  
pro calido inducendus arte contrarius est, sub-  
taneis inuentis de omnibus, quæ & frigidissimæ  
maximē persisterat: & ad septentrionā conuer-  
se: tum auris quibuscum suauibus opera nostra  
paratis, aliæ ex curpis, in quos multi se aquarum  
fontes præcipitent: aliæ aqua frigida ex vasis  
in vasa transfusa, id quod erit conciliat somnū:  
præterea domo assidue aqua, quæ prorsus frigida sit,  
asperfa: ac rosis plurimum humi fulis, aut vitium  
capreolis, aut ruborum clauiculis, aut lenissis ra-  
mis, aut deniq; reliquarum, quæ refrigerent, stir-  
pium aliquibus: turba quoq; hominum ingredi  
prohibita, vt quæ domū similiter calfaciat. Ac sic  
quidem calidissimum aerem, quæ scilicet in æsta-  
te calida & siccā accidit, refrigerare est tentandū.  
Qui sanē si modicē frigidus sit, hoc esse con-  
tentos oportet, nihil de eius temperie alterātes. Qui  
verō frigidissimus est, vniq; quatenus respirando  
attrahitur, admittendus est, vt qui admodum ca-  
lorem cordis refrigeret: non tamen quatenus ex-  
trinsecus ægrum contingit. Quippe densat co-  
gitum, putridi gignit fororūq; humorum efflu-  
xum, atq; transpirationem colibet. Si quidem per  
pulmonē, quod rarum est viscus, difficile non est,  
vt tum qualitas ipsius, tum etiam substantia, faci-  
lē ad cor perveniat: per cutem verō, vt opte den-  
satam, fieri id non potest. Cæterum ex frigida inspi-  
ratione maius sequitur cōmodum, quā in com-  
modum ex cure densanda, præsertim cūm ope-  
rimentis hanc nobis calfacere liceat. Porro uten-  
dum maximē eiusmodi aere est in iis hecticis, in  
quibus primū quod afficitur, ipsum est cor: quæ  
vt si ventriculus primū affingeretur, ipsi per come-  
stā & bibita succurrendū esset. At iecinori ex in-  
spirato aere nulla certē accedit vnlrā: ā comestis  
verō

Nutriendi qui  
non pot, ut in  
ipsa quidem ac-  
cessione decli-  
natione,  
Nutriendi con-  
silia sumen-  
dam esse ā ius-  
mo regere mor-  
bi, & viribus  
ægrotrans.

Hæc febris  
quando sit co-  
peranda.

Balnea quibus  
conueniant.

Phlegmonas  
cur siccis re-  
quantur.  
Vnde balnea  
tunc quæ p-  
cipue adhibet

Remedium  
refrigerationis  
humectationis  
quæ duplex est  
materia.

Refrigeratio  
febribus cur  
brevis sit tota  
perit, atque pe-  
riculosa.

Aeris febribus  
qualis esse  
debet.

Somnum concili-  
are ab aqua  
transfusa.

Turba hominū  
incallescere au-  
tem non  
est, sed caliditas  
quædam  
refrigeranda.

Aeris frigidi  
fuit.

Inueniunt in in-  
spirato aere  
nulla accedit  
vnlrā.

verò & bibitis, minor planè quàm ventriculo, ali-  
quid tamen liuid obfcurè advenit. Còmunis au-  
tem omnium fanatio est, per ea quæ extrinsecus ap-  
plicata refrigerant, & humectant. Atq; ob hæc quid-  
dam viscera, magna ex parte heclicas marafino-  
desq; febres acciderè còtemplari sumus. Superve-  
niant tamen aliquando & pulmonis in temperantæ  
calidæ & siccæ. Incidunt præterea & pectori, & me-  
senterio, & ieiuno, & colo: internum verò, & vtero,  
& renibus. In sepro autè transverso marafinò nò vi-  
di, febrem heclicà vidi. Eiusmodi autè affectum, &

spirandi difficultas, & delirium excipere solet. Ex  
quibus magna ex parte prius monuntur, q̃ heclica  
sit prorsus perfecta. Est autem eorū agnitio fa-  
cillima, tum ex pulsus durnitia, tum ex eo q̃ præcor-  
dia plurimum trahuntur sursum, tum ex difficultate  
respirationis, quæ illis est inæqualis, & variā in-  
terdum ad modum rara magnāq; vniq; quod deli-  
riū malum præcipue dominatur. Frigidus utraque  
aër tunc vel maximè còfert, quum quod primum  
afficitur ipsū est cor: quamvis confert & in reli-  
quis febribus non parum: quandoquidem in his  
quoq; necesse est cor similem temperiem reci-  
piat. Pulmones etiam vbi ita sunt qui primum pa-  
nuntur, plus cæteris omnibus aërem refrigeran-  
tem postulant. Porro ex medicamentis, quæ ad-  
mota extrinsecus in eiusmodi affectibus, refrige-  
randa humectandi q̃ vim possident, deligenda ea  
sunt, quæ non modò circa attractionem refrige-  
rent, sed etiam corporis substantia sint tenui. Ac

quæ quidem absolutissimè tenuium partium sit,  
substantiā exactè frigidā invenisse fortasse nò est.  
Dixi exactè, propter acetum: quod quum omnium  
(quæ nouimus) potestate refrigerantium, planè te-  
nuissimum sit partium, admistam sibi aliquam  
habet caliditatem. Præterea corpora quæ contin-  
git, siccata: quamvis ad imaginatōem sit humidū.  
Quo sit, ut ad eos affectus, quos humectari & re-  
frigerari expedit, siccato eo non vtatur, sed tanto a-  
que frigidæ admixto, ut possit bibi. Hoc autè me-  
dicamentum quod subdam, humectantium & refrige-  
rantium omnium simplicissimum est, optimūq;  
ad erysipelata, & pudentum phlegmonau inter-  
iuitia, prius quam depascens aliqua subindictetur  
putredo. Olei rosacei ex omphacino oleo circa fa-  
lem confecti, vncias iij. vli iij. Cera alba, & elotē  
vnciam vnam. Liqueantur simul in vase duplici, ac  
fiat ceratum humidum: cui abvnde refrigerato,  
misceant paulatim in mortario tantum frigidissi-  
mæ aquæ, quāntum in se, dum cum ea mollitur, ac-  
cipere possit. Quod si acetum quoq; ad modum te-  
nuiss & clari paululum addicere velis, vniq; magis  
adhuc tum refrigerans, tum humectans medica-  
mentum efficitur. Non debet autem medicamē-  
tum hoc eorūq; fupper egrum corpus manere, dum  
manifestè in calcat, sed afusdus subinde mutari. A-  
liud: Oxalidos, aut oxylapathi succus, cū exigua  
polenta mistus, excipiat duplicato & detrimo pe-  
niculo, aut linteo, assanibq; frigidū totum id ad-  
moueat. Quinieriam portulacæ, & sempervivul,  
& vix immaturæ succus similiter polenta miscē-  
tur. Ad hæc lenis palustris, & vindi tribula, & po-  
lygona, & lactuca, & iutrybi succus, aliq; refrige-  
rantia, cum tenui polenta miscuntur. Licet etiam  
absq; polenta in integris herbis tuis. Iam verò

quod epithema ex pinguibus conficitur palmu-  
lis, salutare medicamentum est. Porro coquere o-  
porteret harum carnem, omni membratōio exem-  
ptā, aliis ex solo claro aceto, aliis aqua ipsi permi-  
sta: atq; hac, vbi tenera sans reddita est, tunia vii.  
Est verò salutare medicamē ad italia, etiam succus  
rosarum frigidus: vni cum polenta. Salutares si-  
militer sunt & ipsæ rosæ contusæ. Præterea stirpib;  
quæ moderatè astringant, germina trita. Ad quum  
modum vt aliquando licet herbis medicocriter a-  
stringentibus, vt folio. Huiusmodi tamen refrige-  
rantia omnia, illi tantum ad mouenda sunt par-  
ti, quæ primariò est affecta: non aliis quæ refrige-  
rari nō possunt. Ego namq; hominem scio, qui  
impolito præcordiis refrigerante medicamēto,  
laborant statim dyspnoea: sicvii alterum, qui tus-  
sient protinus. Verum ex remediis ipsis, nonnulla  
quidem per se, neq; intercedente alio, refrigerare  
sunt nata: vt, grana exempli, frigidæ po no, nercdō  
succus vix immaturæ. Alia autem ex accidenti: vt  
sanguinis missio, quæ calidam aliquando in tem-  
periem sanat. Ad eundē modum & dythere, & pur-  
gano, & fomentum, & cataplasma: q̃ videlicet di-  
gerant, concoquantve. Vtrinq; verò facultatem  
tu se comprehensam habet dulcis aquæ balneum  
temperatum: vt pote ex partibus varia facultate  
prædiis constans. Siquidem quum primum in id  
egri ingreduntur, in aëre versantur calido: pos-  
tea in calidam aquam descendunt. Mox ab hac  
egressi, in frigidam. Postremo sudorem detergēt.  
Poteit autem prima eius pars materias per totum  
corpus tum calfacere, tum liquare: præterea quæ  
inæqualia sunt, æquare: & cutim laxare: & mul-  
ta, quæ sub hac ante detinebātur, vacuare. Secun-  
da eius pars, vbi quis in sicco corporis affectu ea  
vinitur, poteit madore vtilem solidis partibus im-  
mittere. Terna balnei pars poteit, vbi quis frigida  
vinitur, & totum corpus refrigerare, & cutim den-  
sare, & vires firmare. Quarta verò, corpus per su-  
dore, circa arfrigerantios noxam, vacuare. At  
vbi quis intemperatè lauat, in horrore, cutis-  
que densitudinem incidit. Est autem continens li-  
pissus horrore causa, mordentium excremento-  
rum, aut etiam crudorum humorū, consensum a-  
ctorum, citior motus. Proinde quibus horum  
est abvndantia, caro verò ac cutis densa, siue bal-  
neum sint ingressi, siue steterint in solē, siue quo-  
quo modo vel gestati, vel perfricti, vel exercitati,  
vehementius dum on fuerint, vniq; us horror inci-  
dit. Contrā, quibus hæc pauca sunt, & corpora  
liabitus vt remittatur laxeturque & balui calore,  
promptus, nō non modò non horrent, sed etiā me-  
liores reddunt, vt pote excrementis per id vacua-  
ns. Quo rationabilius, neq; in primo inuasionis  
inifio, nec in incremento, quiquam ægrotantē la-  
uit. Quippe densata est hoc corpore, coarctatq; &  
cutis ipsa, & quæ sub hac habetur carnea substantia.  
At in febris inclinane ne vel incipiente, vel proce-  
dente, vel amplius progressa, sæpenuero non  
ægrotos lauant, non parū eis cōsultum. Si quis  
igitur balneum ingrederis, minimè inhorruit, sed  
laxata illi, necnon rarefacta est cutis, huic succer-  
dent planè excrementorum vacuatio, æqualis per  
vniuersum corpus calor, exiguum mearum ra-  
refactio, tenforum laxatio, densatorū fusio. Ac va

Refrigerantia  
ex palmulis.

Refrigerantia  
ex rosarum suc-  
co.

Refrigerantia  
temperatum de  
his quidem pot-  
est, alia ex ac-  
cidenti refrigeran-  
te.

Balnei dulcis  
aque, tempera-  
te, facit.

Balnei partes  
duas.

Balnei intus  
potius horro-  
re, aut q̃ den-  
situdinem gra-  
uat.

Horroris causa

Lauesdū nec  
accidit horro-  
re, nec in i-  
psum incremen-  
tum, sicut in  
alio.

Balnei tem-  
peratum.

Marafinò de fe-  
bre quæ qua vi-  
cet partē solēt  
accidere.

Hecliam ex se-  
pro transverso  
orā dyspnoea  
q̃ delirium  
compar.

Hecliam ex se-  
pro transverso  
q̃ delirium  
compar.

Refrigerantia  
temperata, in  
fortibus qua-  
lia esse debet.  
Aut facilius.

Aut quomodo  
de viderem.

Refrigerantia  
humectantem  
orato defertur.

Frigido Galeni  
cerato, quomodo  
de viderem sit.

Refrigerantia  
profunda ta-  
no.

Calor omni fe-  
bris causatus  
est.

Phlegmona  
quando augetur.

Balnei singula  
partes quae  
visu praesent.

Balnei frigi-  
di quaevis in  
tempore, et quae  
visu canci debet  
ad administran-  
da.

Balnea calida  
ad febris frigidam  
visum corpora  
preparant.

curatio quae excrementorum, omni febris est utilis-  
sima. Pari modo & rarefactio, & relaxatio. Fusio tamen,  
& calor, non item: sed calor omni febris inimicus est.  
At fundi & qualiter, id solidi quidem animalis par-  
tibus non est alienum: succi certe non perpetuo est vel  
le: sed quoties in animali vel phlegmone, vel affectu  
phlegmonae similis consistit, vel vitravis pleni-  
tudo, omnium inimicissimum. Nam phlegmonae quidem,  
quae calfacti & liquari succi ad ipsas cohaerunt, au-  
genter. Tunc vero vaforum, impares plenitudi-  
ni, quae si ex liquatione est repleta spiritu, disten-  
duntur, ac vires hoc nomine male habent. Ergo  
calidis illis siccis affectibus, effusio mordentium  
est salubris, liquatione eorum contingit citra pericu-  
lum. Calfactio tamen noxa non caret. Atque haec quidem  
ex prima balnei parte optime administrata sumuntur.  
In secunda autem (quae lauacrum erat) ut febrilia  
corpora ex humectatione iuuantur, sic ex calore  
nihil illis commodum accedit. At in tertia refrigeran-  
tur innoxie quae fuerint excalfacta, & vires firmantur.  
Si qua vero & laxata, & iusto plus sunt remissa,  
ea in naturalem reducantur mediocritatem: id quod  
quarta balnei pars, quae deterio est, indicat. Quippe  
quibus rite sunt omnia adhibita, si post frigida  
visum adhuc sudat, & omnia ipsis excrementa vacu-  
antur. A balneis igitur (ut vnam omnium vel tri-  
summam colligat) vacuatur quicquid in corpore vel  
fuerit, vel fuliginosum praefert. Reducitur ad  
naturalem symmetriam, tum caro ipsa, tum cutis: cor-  
rigitur solidorum parum ariditas: & calor non modo  
is qui ex lauacro accessit, sed qui etiam praefert,  
ex frigida visu exstinguitur. Maximo huius rei docu-  
mentum est praesidium, quod ferunt homines ex  
huiusmodi balneo, ubi si feruenti sole exccant,  
lauantur. Quippe quum accedat ad id, ritu stipula-  
re aridi, egressi frigidam, illico in naturalem habi-  
tum reducunt. Si itaque certam febricitantium natu-  
rae haberemus notitiam, non dubitarem eorum a-  
liquos assidue in aquis frigidis citra balneum lauare.  
Quia vero exacta nobis dispositionum non est  
notitia, ac maxima ex errore impendit noxa, ut  
que eiusmodi recusamus praesidium, potissimum in fe-  
bribus haeticis: quando per has & pauci sanguinis,  
& nudis carne, & expertis adipibus, corpus est red-  
ditum. Etenim iuuenis corpulentus, aetatis tempore,  
ac in febris summo vigore, modo nulla viscerum  
phlegmone subest, sudabit, si in frigida se coniecit.  
Quod si sit frigida lauationi assuetus, securus re-  
medio uteretur. Qui autem ex calida & sicca intemperie  
febricitat haetica, ac potissimum qui iam maras-  
mose sunt, iis ubi tale praesidium petunt, tutum  
non est in totam conici: neque ut nec gracilibus &  
imbecillis, qui aetate calida & sicca, longa via per-  
acta, refrigeratione indigent. Nam neque his tutus  
est frigidi solus usus, nisi prius fuerint in balneo  
equaliter excalfacti. Siquidem simile quiddam nobis  
videtur accidere, quum in frigidum solum post  
balneum ingredimur, et quod ferro accidit, quum  
tingitur. Etenim tum refrigeramur, tum roboramur:  
quemadmodum & illud, ubi candens iam red-  
ditum frigidum mergitur. Atque huius rei causa ad im-  
becilla corpora inuenta sunt balnea, quae ea praecal-  
faciant, atque ad frigidum solum preparant. Nam  
difficile quiddam faciunt, & qui sine balneo frigi-  
da utantur, quum scilicet se ab exercitatione in

eam saltu demittunt. Siquidem quod nobis balneum,  
id praestat illis exercitatio: ut quae non calfaciat tantum,  
sed etiam insit caloris motum ad profundum  
corpore extorrum concitet, sic ut & frigida im-  
petui occurrat, & quo minus viscerum aliquod fe-  
riat, aduersetur atque prohibeat. Neque enim ipsam  
frigida substantiam, neque eius qualiter  
omnino integram, usque ad viscera pertingere est  
salubre. Imo sanus & tutus fuerit, solum qualiter  
erant, eamque refutam calidum occurrit, descen-  
dere. Iam vero qui haetica febricitantes ad bal-  
neum accedunt, nisi in frigidam sint demissi, nihil  
iuuantur, contra quam aliis correpti febribus.  
Nam quum vis solidarum partium affectus candentis  
ferro sit similis, calcescit duntaxat eos humectatque  
haudquaquam videtur satis (sic enim alimen-  
tum incrementumque praebuerimus febri) sed  
opus est, ut mergi in frigidam, extinguiamus calo-  
rem. Quod si ex violento ipso subitque frigida  
visum male fuerint affecti, utpote in contrariam  
qualitatem mutati, hoc sicut in toto quod sequitur tem-  
pore calfaciendo sanare: quum neque per pericu-  
lum sit in frigidum affectu, nec in remediis quae illi  
adhibentur. Quum autem insanabilis solidarum  
partium summa siccitas sit, ad quam per haeticas  
febres via expeditissima patet, melius est hominem  
in frigidam intemperiem transferre, ac cu-  
rationem adhibeamus habere, quam tenden-  
tem recta ad interitum finire, desperamus illi salu-  
tatem facere. Ergo eos qui haetica februnt, illico  
omni ratione refrigeremus, antequam progressi  
in marasum perveniant. Nam quem iam occupa-  
vit marasmus, hunc necquaquam sanare tenta ueris.  
Ipsam tamen in alterum transferre marasum,  
quem appellant ex morbo senium, licebit: ac sic  
superfuitem, non tantum plures dies, sed etiam  
mensures, sequare. In ceteris autem febribus, quas  
vel phlegmone, vel putrescentes succi accende-  
runt, nihil offendens, etiam si in frigidam egrum  
ipsum non mereris. At in haeticis, id quod  
remedium avertit, calidum solum non est, sed frigi-  
dum. Quicunque igitur haetica febre laborant,  
atque ex iis praecipue, qui iam marasmodi tenen-  
tur, modo his nulla alia febris, vel ex solo putre-  
scente humore, vel cum phlegmone sit adiuncta,  
eos omnes audacter lauabis: sed prorsus citra om-  
nem laborem, ne resoluantur vires. Sint ergo  
tres domus balnei: in quarum primam, quae sana  
esse calida debet, in lectulo cubans ducatur, ini-  
bi que nudetur. Illinc autem valida sindone in se-  
cundam portari debet: quae non tantum situ sit  
media, sed etiam temperie: tantum scilicet prima  
lidior, quantum est tertia frigidior. In ea itaque oleo  
tepidum super sindone perfundatur. Hoc factum,  
ad tertiam ducatur domum, ubi nimirum situ sit  
media, in cuius quidem morientur aqua mediocriter: idem  
sustentus sindone, nullam infusione aquae, cuius-  
modi in aliis videri solemus, adhibere: imo nec capi-  
talis eius quicquam infundi velim, quum sit satis  
id quoque, bis tunc vni cum toto corpore in aqua  
mergi, demissa mediocriter deorsum sindone,  
ac rursum per quatuor iuvenes, qui eum por-  
tant, leuata. Mox hinceductus, in frigidam semel  
totus tingatur, ne vel breuissimo quidem spa-  
cio illic moratur. Protinus vero alter paratam ha-  
bens

Exercitatio  
preparat cor-  
pus ad balneum  
frigidum.  
Exercitatio  
visum.

Et licet, dum  
ad balneum acc-  
dunt, nihil in  
corpo, nisi in fe-  
brilem iam de-  
missum.

Siccitatem sum-  
mam solidae  
partes videtur  
si infundatur.

Haeticum sta-  
tum esse, omni  
ratione refrige-  
randum.  
Marasmodi  
se infundatur,  
seruus in ex mor-  
bo.

Balnei partem  
descripsit.  
Haeticum quomodo  
de fimo per quae  
inueniuntur  
balnei partem  
descripsit.

bens calentem sindonē, ipsū iniiciat. Deinde æger suo in lectulo collocatus, primū spōgijs detergetur: dein molibus linteis, quoad fieri potest, blandiatur. Postea verō vinctus, amictiui vestibus, rursus super lectulo reducatur in aliquā aliam domū vicinā, ubi cibari consuevit, inibiq; nutritur. Porro humidum esse ac frigidū, qd̄ lēcticus febribus sit cōducendum, nemo nescit. Eiusmodi verō sunt tum cremor ptisanæ, quō frigidus sumitur: tū alica, similiter ptisanæ cremori condita: id verō est ex aqua, & exiguo porti, & anetho, rum sale, oleo, & aceto. Cōmodus præterea iis qui sic laborant, est & exiguus in aqua frigida panis. Ceterū nullus horū pura frigiditas esse debet, sicuti posuimus. Quippe hæc maturē tum incalēscit, tū per corpus digeritur. Illa, quā pluscūlū temporis in vetriculo morentur, ipsum fortassis refrigerāti, si fuerint in modicē frigida. Vbi autē febris iam traxerit, dandum quoq; alinum lac est: sed diligenter observato, ne in ventre concresecat. Cavebitur autē id, si mel illi admisceatur salis, quo vescimur, exiguum. Abstinendum tamen in lēctis, quoad fieri poterit, à melle est: quia idcirco etiam à muliere quippe protinus in bilem cōuertitur, & siciores, à morosis calorē febres reddit. Dandus itaq; principio à sinini lactis est non plus cyathus: sed iudicatis in ipsum cubiculum assua, quō nullum rēpus interponatur: æger autē id protinus bibat. At verō si corruptū in vētre lac fuerit, pulvis paruos atque inaequales invenes, quales accidunt in compressione ventriculi. Sin autē nō sit corruptū, & maiores & valentiores eos, q̄ pro consuetudine, invenes. Quia ratione obsequatur, licebit tū lactis, tum aliorum ciborum omnium modū sensim augere. Qui igitur iam marasmus vexatur, eos, sicuti dictum est, lauabis. Quos verō hēctica premit, nondum tamen marasmo tentantur, eos licet etiam laues sine subiecta sindone, vt pote viribus adliuc valentes. At qui ex his minus sunt valētes, eos nō tutum est pmittere in frigida narationē descendere, sed fors ipsos potius persuadere, primū tepida, secundō frigida, qualis fontana est. Ac si quidē omnia curiosē administrantur, vtq; sanandi iam eius quem marasmus consumit, spes est. Sin error vē in vno cōmittatur, is reliqua vbi vberit omnia. Quippe quum exitialis horum affectus sit, ne leuissimū quidem errorē toleras. Ac si quis talium est seruatus, huic carnosum tantum portionē marasmus ita occupauerat. Ipsū verō solidis refectatis, fieri nequit vt homo prius sauetur. Etenim primū eiusmodi febri pro priā partium humiditate, ex qua nutriuntur, depascit: hinc transiit ad genus carnosum: deinde solidas populatim particulas. Vocatur autē carū tantū ea quæ in musculo est. Nā quæ in viceribus cōspiciuntur, non carnes, sed parencymata nominantur. Porro singulā rū particularum substantiæ moles, ex tali maxime cōpleta est natura, q̄ & perire, & regni possit. At verō nec fibrosa, nec nervosa, membratiosa natura eandem generationē labere cernitur: nec fas est eiusmodi singularū parū fibras, à febrib. malignis liquari, perinde vt carnes: quando animal ipsum, prius q̄ hæc prorsus sint excutiat, interemerit. Sanē sunt & quos marasmodi febres vocat, vniuersæ ex earū genere quæ colluantur, sed in eo

differant, q̄ in his, quæ portio carnis colligatur, ea semper vaporis vice digeratur: in illis delectur in ventrem. Nam quemadmodū quo magis animal vel adipē, vel carne abvndat, eo, qd̄ ab ipsius carnibus, dū in craticulis torrētur, destitit, copiosius cernitur. ad eundē modū in calidissimis, febribus, si carnes humidæ ac molles cum adipis copia fuerint, eas sensu liquari deprehendat. Sin abiq; adipē & sicce sint, insensibiliter absumuntur, & in febres marasmodi trahunt. Hæc præmissas, colligantur febriū illdem methodo: curam ages, tum ad frigida exhibendā, quamprimū properas, tum us quæ refrigerent & humectent, nutriendas. Nullam verō inuacissimam illis esse cōsebitur.

### GALENI PERGAMENI de methodo medendi, lib. XI.

**M**Odum igitur curandarū epitemerarum, in octauo huius operis cōmentario: continendum, in nono: hēcticarum deniq; in decimo, satis accurate exposuimus. Nunc verō, quemadmodū quæ ex putredinibus humoribus excitantur, methodo sint sanandæ, aggredi est animus. Duo autē sunt scopi curationis in vniuersum: affectus nempe ipse, atq; ægrotantis temperies. Affectus quippe, ex us quæ tibi contraria sunt, adhibenda esse remedia indicat. Laborantis verō temperies, simul cum ipso morbo, mensuram contrariarū definit. Potest enī ambiens nos aer (qui ex cœli statu, anni tempore, ac regionis natura suas mutationes fortitur) vnam efficere indicationem, ac vel ægrotantis causis, vel sanitatis, anumerari. Porro auxilium, quo ad morbos tollendos vtilius, prima & vltima dicitur sanitas causa, diuersæ tamen rationibus. Dicitur quippe vltima tempore: quandoquidē & natura, & ars, & fortuna, priores, secundō tempus, eo sanitas existunt causæ. Prima verō est, quatenus id primō lae horum corpus tangit, alteratq; eius effectus. At si quidem artētiq; & fortuna, nō per se proximū, sed per auxilia morbos prodigant, materiæq; intervēntu operantur: quemadmodum per seipsam natura. Quæ nimirum ex tum spiritus, tum solidarū particularum (quæ ex semine genitali oriuntur) tum carnosarum substantiarū, consistat. Quarum trium substantiarum singulæ propriam pro natura suam qualitatem, tum quantitatem habent. Ac qualitas quidē earum, ex congrua temperie humidæ, sicce, calidæ, & frigidæ efficitur. Quantitas verō solidarum partium par semper manet: sed ita qui adhuc in augmentum, numero duntaxat: qui verō absoluti iam sunt, etiam magnitudine. Carnose verō substantiæ magnitudo variatur, etiam si iam nō angeatur animas. Pari modo & substantia spiritus \* propemodum quolibet momento tum maior, tum minor conspicitur. Ergo ad duos illos scopos prius traditos, cui vniūcuique addetur, luxta earum trium substantiarū enumerationem: aut temperies per se distinguetur, quæ & ipsa rursus bifariā scinditur, nempe & in originalem naturam, & in acquisitam dispositionem: sic nimirū, vt ex istis, & aliis quæ prius dicta sunt, propria quædam consuegeremodi rō indicano. Ex ætate etiam, vitæ studiis, consuecudinēq; remediorum indicationes sumuntur. Proponatur igitur

Colligantur febriū carnes.

Curatio sit per se duo: affectus & ægrotantis temperies. Temperies laborantis quid indicat. Aer unde sunt mutationes sit uatur.

Auxilia corporis ma & vltima sanitas causa dicitur.

Fortuna per auxilia morbos prodigat. Natura ex qui bus consistit. Solida partes ex semine generantur.

Vitætem esse vnam ex indicationibus signis. Temperies est duplex.

Indicationes remediis vnde sumantur.

Hæctica requirit humidum et frigida nutriendum.

Hæctica requirit humidum et frigida nutriendum.

Lac asinum cum melle sum piam non cogitur. Id est melleum.

Lactis in ventre corrupti est.

Hæctica febri ne iussimam quidem tolera narum.

Carnosa dicitur.

Marasmodi dicitur.



Intemperiam  
per ciborum  
aliam sanan-  
dam agi.

Custodiam fo-  
re per similia.  
Sublatio morbi  
fit per contra-  
ria.  
Partium singu-  
la per quæ co-  
arctanda sunt.

Temperies opti-  
ma, semper ser-  
uanda.  
Intemperies vi-  
tiosa quædã se-  
randa, quan-  
do fit altera da.

Indicantia ser-  
vorum dignitas  
est exponenda.

Synochus febris  
quæ dicitur.  
Synochorum  
curatio.

Putrescent cal-  
da et humida,  
quæ in similibus  
locis conclusa,  
perfricta aut pos-  
sunt.

nobis intemperies quædam curanda: ea vtiq; per contrariam intemperiem sanabitur. At quoniam vniuersi febrium generis intemperies est calor, vtiq; per frigiditatem curabitur. Quemadmodum autem ab affectu ad materias præsidiorum pervenimus, eodem etiã modo à singulis reliquorum generum primorum, et eas est descendendum: vel vni à virtute, quæ morbo seu adversatrix opponitur, & cui omni ratione opirulani & subvenire est cõsiliu. Quare virtus quidem ipsa erit vnius ac primus scopus: alter aut atq; secundus, qd ab ea significatur, nempe custodia ipsius. Pari etiã ratione, morbus qdem dicitur esse primus scopus: secundus autẽ, iubilatio ipsius. At verò custodia, similitudine indicabit exhibitione: sublatio, contrariis. Quoniam verò vinum sublatia tum ex spiritu, tum ex carnosa specie, tũ solidis ipsa cõpletur: ex his quæ similia sunt, moliri cuius suam custodiã oportet. Spiritus, ex respiratione, transpiratione, & vapore qui ex sanguine artollitur. Solidorum verò generis, ex solido nutrimento. Carnoso generi, per eam naturam, quæ in medio humorum ac solidorum corporum est. Porro cuiusq; liorum modum ex conferuandæ substantiæ modo invenies: qualitatẽ verò, ex ipsius temperie. Quum autẽ horum cuiusq; temperies, vel optima sit, vel aliqua tenus vitiosa: quæ qdem optima est, semper servari debet. Quæ verò omnino vicio nõ caret, hæc in sanis qdem vel servanda est, vel alteranda: in ægris verò servanda. Quum autẽ diversitas non parva sit in partium animalis temperamẽto, propriis cuiusq; mensuris, eorũ quæ ipsi similia sunt, oportet accommodare. Nempe ei q̃ terra est magis, eorũ q̃ magis sint terra: & ei quæ humidior est, eorum quæ sunt humidiora: ac sic de ceteris cõstitutionibus. Hinc verò iã materię particulares ois in cibis, potionibus, aëre, & omnibus peragi solitis, inveniedæ sunt. Quod si mutuo inter se pugnant aliquæ indicationes, ppendenda \* indicantia scoporum tũ magnitudo, tum dignitas est, esticiendũq; id, qd maioris, tum dignioris scopi admonent. Quo rum dignitas qdem iudicanda est, vel vitæ, vel sanitatis respectu. Magnitudo autẽ est duplex: vel pro priæ substantiæ ratione, vel de inclinationis à natura li habitu. Hic igitur præmissis methodis, iã in febrium genere exercitemur, qd ex putredine nascitur. Ac primum ab illa febris exordiamur, quæ ex putredine humorũ in maximis vasib; vel in omni bus simul, cõputrescentiũ oritur: quĩq; necessum est synochon, hoc est, continentem existere. Fieri autem nequit, vt talis febris sanetur, nisi inlubita prius ipsa putredo sit: quæ si inluberi, causa manente nõ potest. Quare submouedã ipsius causa est, si modo putredo ipsa prior, mox post ipsam, febris sanari debeat. Oñsensum autẽ est, illa tantum putrefcere corpora, quæ quam calida humiditatis natura sint, neq; perfracta, neq; ventilata, in calido humiditatis loco includuntur. Quod si in motu sint, ventilenturq; ac persillent, posse ea nõ putria, integritateq; servari: potissimũ quæcumq; corpora sua ipsorum natura reguntur, vt animalis, stirpũq;. Ea namq; ab inino cõgenitos secũ moras habent, quib; suffusa excreant. Nec minus etiã est demõstratum, quanta sit tum respirationis, tum pulsationis utilitas, ad persillarum, ventilationemq; corporis, atq; eius natium calorem tuendum. Itaq; si

quid in eo manifeste putrefcere debeat, dictas transpirationes esse impediendas oportet. Fieri autẽ non potest, vt illis per totũ sistantur animal, nisi vel finibus vasorum stiparis, vel tota cute. Porro accidere in finibus vasorum stipatio potest, vel ex vehementi extrinsecus refrigeratione, vel ex succorũ, qui extorsum in ipsos conferim ruerint, crassitudine, multitudine, vel lentitia. Accidit hoc illis & ex his exercitationib; quæ in palæstra, vel aliis obcurat, & itinere laborioso: vel ab inveniis statũ, quĩ ex rigore in actum mutatus est subito. Nonnulli v erò servantes ex ira succi, ac foras simul impetu ruentes, effecerunt dictas transpirationes. Quisquis igitur propoliã sanaturus est febrem, hic simul causam eius oportet adimat: simul calorem qui in animalis excitatus ab ea est, refrigeret. Ac quemadmodum qui dem ille refrigerandus sit, prius est dictũ. Causam verò adimere oportebit, propria cuiusq; nature inventa contrarietate. Vtiq; si ex frigida causa stipatum, densumq; redditũ corpus est, relaxato eo, omnib; ratione rarefacto. Sim ex obstructione ita est affectum, hac reclusa. Quod verò recludet, hic quoq; ad contrarietatis indicationẽ attentum invenies. Vbi namq; abvndantia humorum est, hos vacuabis. Vbi crassi, glutinosiq; sunt, eos tenues & fluxiles reddes. Si plures causæ aliquando coibũt, omnibus per contraria occures. In eiusmodi autẽ dictarum causarum cõplexu, capillæ à sanguinis missione conveniet: ac abvndantia vacuata, tum ad extenuandos humores venire. Ab hoc ad remittenda quæ sunt cõstricta, & rarefacienda quæ sunt densata. Atq; hæc quidem à morbi affectu indicationẽ sumenda sunt. Quũ autem ciborum atq; potionũ, necnon spirituum decernis quantitas quæ sit virtutem ipsam custodiandam: ac modus quidem quantitatis ipsorum à virtutis substantia inveniar, qualitas verò à temperie: nimirũ estimari debet, quemadmodum vires quæ corpora regunt, se habent. Quæ quidem si sint valentes, aut dactæ vacuantibus præsidia vtens. Sin infirmiores sint reddite, vacuanda remedia cauus à demonstrabis. Sed & nutrimenti modus hinc nobis desumendus est. Quippe quum vires legitimum robur suum habent, & morbi summus vigor breui expectatur futurus, tenuissimo cibo vt licet. Vbi verò infirmiores fuerint, non licet sine graui noxia sed adducere ad nutrimenta tantũ oportet, quãtũ est de robore virium detractum. At nutrimenti qualitas, ex morbi affectu, vni cum solidorum corporum temperamento præsens, sumenda est. Tempus autem nutriendi, quod quidem ad reliquas febres pertinet quæ ex putredine oriuntur, in progressu sermonis dicitur. Quæ verò vnicam tantũ à principio ad finem vsq; accessiõem habent, synochiq; dicuntur (de quibus impræsentiarum est sermo) in tunc offerendus est cibus, diu egri melius se habent: eoque potissimũ dicti tempore, quo in sanitate prius cibari erant fueri. Est autem frigida quoque si propinanda, quam succi & iam concoquantur, & crassitudo eorum est extenuata. Ceterum iam operæ precium est explicare, quot sint febrium, quas putredo accendit, in vniuersum differentie. Dein, quanam sit ipsius generis earum communis vñum auxilium ratione indicatio. Mox, quæ sit singularum cuiusq; propria. Quod igitur ad differentias pertinet,

Transpirationes  
aut vnde proba-  
ri viderentur.  
Stipatio in finibus  
vasorum  
de contrarietate.

Stipatum  
vacuata.

Nutrimenti  
quantitas à  
virtute, qualitas  
autem à temperie  
sumenda est.

Tenuissimo  
cibo quædã  
seruanda.

Nutrimento  
quæ sit ab affectu  
& temperie  
sumenda.

Nutrimento  
tunc  
quæ sit  
synochus optima.

Propolis  
quæ sit  
de contrarietate  
sumenda.

pendarum se-  
cundum diffinitio-

tertia est mu-  
tatio corporis  
ad corruptelam  
calidam exter-  
na, scilicet.  
Calor natura-  
lis augere atque  
mutare am-  
plius, vna  
longior.  
Calor natura-  
lis quomodo co-  
rumpat in cor-  
poris.

quomodo  
si sit in aetate.

quomodo sit  
vacuandum.

Vacuandum  
quomodo sit  
vacuandum.

Corruptelam  
quomodo sit  
vacuandum.

Vino aquosum  
quomodo sit  
vacuandum.

Concedere fe-  
bri deinde, nec  
balneo, nec vi-  
no, nec vacua-  
tione rarefa-  
ctionis esse  
vacuandum.

net, prima sanè ex eo est, quod causæ ipsius putredinis vel adiunt, vel non adiunt. Secunda ex eo, quod per totum animal, aut eius partem aliquam, diffusa putredo sit. Tertia, quatenus cum phlegmone, aut citra hanc. Ergo ordiamur ab humorum putredine, quæ primò indicia in diuisione sunt. Cuius quidem natura, ad curationem erit inventionis principium. Porro natura putredinis est mutatio totius putrescentis corporis ad corruptelam, à calido externo. Non enim profectò à proprio calore corrumpitur quicquid animò prius cōtrā, quicquid in rebus subsistit, id augeret, roboratur, sanum est, ac vivit, dum proprio calore regitur: veluti nimirum ipsa animalium corpora, quandoque feruati propius coram calore, in cordis quidem corpore, per respirationem: in reliquis omnibus partibus, tum per cōmunitatem quam habent cum corde, tum per aliam quidam respirationis speciem, quæ per totam agitur cutem, & transpirationem, per spirationem dicuntur. His verò laxis, vna etiā calor natiuius leditur. Alter verò quidā alienus, ac præter naturam in corporibus excitatus, primū quidem ipsos succos propter humiditatem putrefacit corruptique. Spacio verò, tum adipem invadit, tum etiam carnem. Putredinē in corporibus ortam sanabimus, id quod iam corruptum est, omni ratione vacuantes: quod reliquum est, moderatis mutibus, & refrigeratē per spiratū ad exactam symmetriam reducentes. Ac vacuum quidem illius per vrinam, deiectiones, sudores, vomitum, quomodo leuior, si putridus humor ad os ventriculi aliquando sua sponte impetum faciat. Post hanc dimotiones mediocres, vna cum ambientis bona temperie adhibebimus. Causam verò putredinis, si adhuc perseveret in corpore, per cōtrariam tollemus. Itaque quoniam transpirationis prohibito fuit occasio putredinis, hanc submovere oportet. Quia verò ea (quemadmodum exposuimus) à variis causis est orta, ipsarū singulis cōtraria medendi ratione occurrerunt. Sciendū est, non easdem omnes partes vacuationes, medicamentatæ requirere: cum & temperamenta, & positura, & forma, & omni denique cōstitutione, naturarū inter se distendant. Cū autem maior pars medicamentorum vacuitium, febrem ipsam adaugeat, vitæ periculosa calida & sicca: deligenda medico sunt, quæ citra calfactionem siccationemque valentem, ipsam vacuationes moliantur: cuiusmodi sunt, cremor prunæ, aqua mulsa, oxymeli, apomeli, & apii radix, in aqua, quæ potui datur, iuncta. Hæc autē ipsa ventri sunt quæque idoneæ: qui si nihil reddat, iniicienda per clysterem mulsa cum oleo est. Sanè totum corpus, prorsus id vacuari, rarefaciendum non est. Vbi vacuatū sit, vni quæbebit medicamento aliquo, cui calor tepidus inest, rarefaciæ: cuiusmodi est quod ex claximelo conficitur. Hoc tempore si vinū quoque aquosum bibatur, id omnes vacuationes promouet. Idem faciet & temperatū dulcis aquæ lauacrum. Cæterū ubi magnitudo febris obstat, sicut in cōtinentibus, nec vinū est vitandum, nec laquor, nec ius, quæ haberi rarefaciunt, viūtionibus. Iam verò id genus ardentissimæ febribus, potius frigida conferant, nisi subsint putrescentes humores, per alium, vrinam, vel sudores

vacuandi. In vniuersum autē, dum plura simul coeunt symptomata, id quod maximū omnium est, aggredi oportet, atque id vel soli, vel magis quæ ceteris, subvenire. Porro ad corrigendos putrescentes humores, non tantū requirimus vires ipsius pulsus firmas: sicut nec eius facultatis quæ voluuntur morū largitur, sed multū magis ipsius cōcoëctricis. Ergo si & vires cōtræ valentes sint, & ardentissima febris, & cōcoëctio nis notæ plene evident, frigida intrepide propinabis. Quod si etiā exger bona corporis habitudine sit, tū auctus celsi calidus ac siccus, etiam si in frigidam naturam hunc dimittas, haudquaquæ ledetur. At si mediocritas est febris, & vires non validae, sed cum notis cōcoëctionis, iis qui ita se habent, balneum prodest, & vini potio: tum verò ex vñctionibus eæ quæ rarefaciunt: idem multo magis, cū ambiens est frigidus. Neg enim aut frigidam in balneo lotionē, aut frigidam potione in eiusmodi calidi statu ferre expetunt, vitæ inspirationibus assidue refrigerat: cum si quando in frigido ambiente vehementer vni agrotū cōtingat, exigua salutis eius habenda spes est. Si verò nec cōcoëctio nis habeat signa, nec vires validæ, seruari se plane non potest. Quo minus autem deinde lauandus in balneo est, aut medicamentis iis quæ rarefaciunt, vnguentis, aut vinū illi dandum, frigidæ offerenda. In quo enim desperata omnino est salus, imprudētis consilii fuerit apud vulgum infamare præsidia, quæ multis fuisse salutis. Febri igitur, pro vt febris est, aqua frigida est perpetuū remedium. Quod verò ad alia pertinet, non perpetuū. Veluti cū ex obstructione glutinosi & crassi humoris putredo nascitur. Ponatur autem cum hoc, & redundantiam in toto esse corpore, tum virtutē non imbecillam. In eiusmodi etenim cōplexionibus, cum multa præter naturam in corpore sint, quædam eorū præcedentes causæ erunt: veluti redundantia cum glutinosis & crassis humoribus. Horū namque vniō obstructio est orta: quæ morbus instrumentalis est, eorū quæ obstructa sunt corporū. Hanc symptomata sequenti est, ipsa transpirationis cohibitio: quæ rursum putredine humorū exceptit, antecedens quædam ipsius febri causa. Ergo qui febrē curare vult, necesse est inhibeat putredinem. Ac sic duæ indicationes se exhibent, altera à febre, altera à putredine. Atque à febre rursum dux: scilicet vt portio febris, quæ iam accensa est, percutatur: quæ verò etiam nū gignitur, inhibeatur. Aliæ autem dux rursum à putredine erunt indicationes: vt & quod putredinis iam factum est, sanes: & quod in generatione adhuc est, sistas. Porro quod in generatione est, id per spiratū impedita facit. Itaque ab hac rursum alia dux indicationis nascitur: tum vt quod recrementum est, vacnetur: tum quod retinendum est, prohibeatur. Prohibebitur sanè, si obstructioni medeamur. Cuius quoque ipsius, quod iam occupauit, sanandū est, per ea quæ obstructa liberant: quod futurū est, propulandum, per ea nimirum, quæ assufluxum obstructuentium succorum compescunt. Ergo quod vinū in ipsa methodo resolutius est inventum, id primū omnium in curatione tibi est peragendum. Etenim si iis auxilia, quæ obstructiōnes eximant, vti, non vacuata

Frigida quædam  
si propinanda  
intrepide febris  
symptoma affe-  
cto.

Frigida natura-  
tis quando  
possumus vti in  
cōcoëctio nis  
febribus.

Vinum quædam  
reliquis potius  
per cōtinentes  
febres.

Letalis signa  
in febre.

Infamanda sa-  
lubria medica-  
menta non esse  
vbi salus est de-  
plorata.  
Febris, vt fe-  
bre, aqua frigida  
est perpetuū  
remedium.

Obstructio  
quid.

Putredo est ante-  
cedens ipsius  
febris causa.

*Obstructio non  
esse aperta de  
pneumonia plu  
munda vacua  
tur.*  
*Obstructionem  
curat.*

prius abundantia, velimus, non modo nihil proficiemus, sed maiorem etiam reddemus affectum. At si vacuata prius multitudine ad curandam obstructionem accedamus, medicamentis us vtemur, quæ citra calorem obstructionem expedire sint apta. Vbi autem quæ obstruunt deterfa, dissecata sunt, per alium, vinas, atque sudorem, ea vacuare tentandus, idque medicamentis, quoad licet, minimè calfaciendū. Hoc verò tempore etiam vires roborare, quo & putredinè superet, & succos concoquant, studerimus. Quod autè febris ipsius iam accensum est, refrigerabimus. Itaque in auxiliorum inveniendorum ordine, vltima est quæ ab hac sumitur indicatio: quævis alia ratione sit prima, cum à febre videlicet carperit inveniendorum præsidiorum methodus. Ac si nullum quidem interim velleme symptomata inciderit, prohibere quo minus auxilia ab initio morbi ad finem ita procedant, celerrimè febris finiet. Sin tale quippiam incidat, quod tori ad fe curationem revoce

*Nalis familia  
tas.*

*Oxymelitis no  
ta.*

*Contraria remedia co  
mpta.*

*Remedia præter  
naturam differe  
ntia duplex.*

*Chloria quo  
ri dicantur ef  
fi.*  
*Chloria quo.*

*Oppositio quo.*

et, pducetur & curationis finis. Expendere aut oportet medicamentorum tum usum, tum noxam. Quippe aqua multa, quatenus crassos succos extenuat, glutinosos detegit, atque excretionē, promouet, optimū in his synochis medicamē fuerit, quos habitus coarctator, & putredo excitat. Quatenus verò calorè febris adaugeat, est noxia. Quare si luc immodicus sit, parcendū multū est, vitandūque tremore præstare. Quod si difficiles & cōturbantes iudicaueris esse obstructiones, etiam oxymelate. Ad hoc ipsum rursus, si immodicè vitare, & intestina radit, & rursus excitat, & nervosa lædit. Perpetuū autem dogma illud existit verum, Contrariorum contraria esse remedia. Quandoquidē fieri nō potest, vt eorū quæ præter naturā sint, quicquid per aliam vllam remediorum specie curetur. Non tamē ex vfu est, semper omnibus quæ præter naturā sint, medendi cum sola per se subsistūt. Nam si cū aliis vnā incidunt, aliis sæpe est ante illa medendum: sicuti in causis vltimis, vbi ea simul cum phlegmate sunt cōiuncta. Siquidē verū in his quoque manet, quod per ea quæ carne implent, curantur. Cæterū lūi vti nō licet prius quæ curaueris phlegmonē. Quæ itaque præter naturā sunt, omnia ab his quoque ipsi sunt contraria, curantur. Cū autem eorū quæ præter naturam sunt, duplex prima sit differentia, aliis per se subsistentibus, vtpura affectibus: aliis in generatione suam essentiā habentibus, ac vmbre ritu affectus concomitantibus, nempe symptomatis: vtiq; sanatio quidem, affectuū sublatio est. Hanc verò symptomati amono sequitur. Quare affectuū ipsorum, qui verè & prima rior curantur, potissimū dicuntur esse contraria remedia symptomati autem, ex accidenti. At verò contraria dicuntur, quæ sub vno eodēque genere, plurimū inter se dissident. Si autē in illo genere quod medio re est, hoc est, mediū inter duo extrema intellexeris, infinitè quandā contraria rerū multitudinē, quæ maioris minorisq; ratione inter se dissident, ex eo inuenies. Non enim in corpori modo qualitate, verū etiā in quantitate, eiusmodi contrarietatem inuenias: quam vtiq; Aristoteles nō contrarietatem, sed oppositionem nominat. Verū Hippocrati, omnia id

genus contrariorū habent appellationem: sicuti etiam Platoni, qui ex contrariis esse dicit generationes. Contemnere tamen nomina oportet, minime autem scientiam rerum. Cuius nō ignarus Hippocrates, ait: Medicina appositio est, et detractio: deficientium quidem appositio, redundantium autem detractio. Porro deficienti, redundantē omnē nulla quidem in quantitate, quædam autē in qualitate. In quantitate, cum sanguis immodicè est accitū, aut rursus minor redditus. In qualitate, cum vel calidus, vel frigidus, vel crassus, vel tenuis, plus iusto, minūve, est effectus. Verū ad medendi indicationes propositū nobis febriū generis revertamur. Genera causarū quæ in nobis præter naturam oriuntur, sunt, multitudine, crassitudo, & lentor humoris. Causa simul atque symptoma est, transpirabilis excrementi retentio. Simili modo causa pariter & affectus est ipsa putredo. Morbus verò tum obstructio, tum febris ipsa. Symptoma est, transpirabilis excrementi retentio. Ergo indicabit præcedenti causarum quilibet propriū aliquid, poscens nimirū ablationem sui per opposita. Nempe multitudo ipsa, quæ ex eorum est numero, quæ sunt ad aliquid, in prædicamento quantitate, vacuatio est. Lentitia verò & crassitudo, quæ sunt in qualitate affectu, incisionē & ablationē. Obstructio autē, qui morbus instrumentalis est, reclusionē. At transpirabilis retentio, excretionē eorundē. Sicuti & humorū putredo, excretionē, refrigerationem, ventilationē, & concoctionē, semper duriorum: quæ omnia illi ex aduerso respondent. Ipsi verò febris, refrigeratio oppositio est. Sanguis itaque res semper vni indicationē exhibent. Quæ itaque præter naturā ipsū indicant sit, semper in dicabit contrariū: sicuti nō contrariū, sed simile, si secundum naturā se habeat. Igitur si vires eius quæ ex putredine humorū febriat, valētēs sint, mittēdus statim morbo inopiente est sanguis, si cruditas ventris nō adsit. Sin vires infirmæ sint, aut artas delinoret, incidenda vena nō est. Eiusmodi tamen febris in virtutē imbecillam nō incidit. Quippe synochos, bene habet corporis, & caliditas ætatis est propria. At si in puerū incidat, qui quartūdecimū annū hactenus nō attigerit, mitti illi sanguis nō debet: propterea quod tantillis, cum præteritum calidi & humidū sint, plurimum corporis subsistat quod dēstruat, ac digeratur. Ita quid ex incidenda vena molindū nobis fuerat, id vltiō nobis ex curandū corporis natura præstat. Quod si corpus quartūdecimū excesserit annū, æstimandū est, qualis eius natura sit, num gracilis, & ipsa, & dura, & copiosi sanguinis, aut contrā. Atque ita in priori misionē sanguinis adhibebis: in secunda, nequāq; Quineti modus vacuandi sanguinis ex iudicē sumetur indicationibus. Si enī cum sanguis mittitur, triginta annos sit natus: sed laxus, & mollis, & pinguis, & albus, & gracilibus venis huc aut planè sanguinē nō mittes, aut parū detrahes. Et omnino quidē nō mittes istius tēpore, regione istius, & cæli statu calido & sicco. Parū detrahes in reliquis tum aoni tēporibus, tum regione, tum cæli statu. Iam verò si neq; obstructio, nec putredo subesset, sed sola redundans succorū, prout

*Medicina ad  
apposita et de  
tracta.*

*Conferre  
pneumonia  
torem.*

*Conferre  
pneumonia  
pneumonia  
pneumonia  
pneumonia*

*Sanguis in pri  
cipio illam  
mittendum est,  
si pueri febre  
labore de valde  
virescentis sit, nec  
cruditas subsit.  
Synochi non  
incidit in im  
becillitate viti.  
Pueri ante qua  
tuordecim annos  
non sanguis m  
ittendus, vel si la  
boris synochi.*

*Pueri post  
quatuordecim  
annos  
quandā mitti  
dus sit sanguis  
et quando m  
ittitur.*

nus à missione sanguinis, pro naturæ suæ ratione homo habere. Verum quoniam nec obstru-  
ctio, nec putredo per se solam curari missionē san-  
guinis potest, reponi sanguinis aliquid ad spa-  
cium curationis debet, quo minus intempti-  
uē nutrire necessitate vlla cogatur. Quantum  
namq; ad huiusmodi pertinet febrē, prorsus nu-  
trientum nō est. Siquidē ostensum prius est, so-  
lam virtutis respectū esse, qui nutrimento præ-  
beat indicationē. At verò evacuatio nis ratione,  
nutrire oportet. Ita necessum est duorū alterum,  
aut febrē, si nutris, augere: aut vires, si non nu-  
tris, deicere. Sanius itaque fuerit aliquid sangui-  
nis, quod propriū partibus animæ aliis nutrimen-  
tum sit, relinquas, ac ipse paucissimas forbino-  
nes, potionēq; exhibere cōtentus sis: quibus vi-  
tiis ceu medicamentis, potius q̃ nutrimentis ege-  
mus. Porro cum ars ipsa tota sit magna nō levis-  
sima eius pars est, scientia ordinis victus: quæ  
vix ex his maximē remediis constituitur, cibo, 10  
potione, perfusione, cataplasmatis & clysterib.  
Ceterum calfacere pectoris cataplasmatis aut  
perfusionibus, nō est perpetuū tutum: sed in us  
sanctū ægris, quibus in toto corpore nullum er-  
rat superfluum. Ceteris omnibus extrema est per-  
niciēs. Nam siue redundantiā vitæ sit, vel ad  
vasa, vel intra vires: siue etiā in vna parte plu-  
ribusve vitioꝝ excrementa habeantur, omnia ad  
partem exaltatā trahuntur, in hisq; spe ple-  
gmonas excitant. Quare in eiusmodi morbis di-  
uites ponis q̃ pauperes perperam solēt curari.  
Nempe & quod raro illis mittitur sanguis, vel si  
maximē talis egeat auxilio: & quod medici, vt  
agere aliquid semper videantur, de perfunden-  
dis pectoris maximē sint solliciti. Itaq; accidit,  
vt illo ipso tempore phlegmonē incipiant diuiti-  
bus, quo iam pauperibus morbus propemodū  
perductus ad finem. Saluberrimū igitur est in fe-  
bribus venam incidere, non synochis modō, ve-  
rum etiam aliis omnibus, quæ putrescens hu-  
mor concitat: vbi præsertim neq; ætas, nec vires  
prohibent. Leuata enim quæ corpus nostrum re-  
git natura, exoneratq; eo quo veluti sarcina  
premitur, huiusmodi quod reliquū est, vincet: &  
coquens quod cōcoqui est habile, & excernens  
quod potest excerni. Porro vbi humor ad locū  
affectum confluat, remittere repellereq; hunc  
epedit, nō ad ipsum trahere. At repellentia reme-  
dia, quæ certē astringendi vim obtinent, in prin-  
cipis idonea sunt duplici ratione: & quod ro-  
bus affectus particula inserit (vnde minus prop-  
ter affluxū excrementorū in se recipiūt) & quod  
eorū quæ in eis iam recepta sunt, tenuissimū ex-  
teriorū exprimit. Quod si tum fluxio humorū  
per ea remedia cōpescitur, tum densitas quæ in  
affecta particula relictā est, crassiora detinet,  
iam tempestiua relaxatio est, quā ea quæ retenta  
sunt, vacues. Præcipue autē astringentib. est ven-  
dum, vbi in iecur aut ventriculū, supervacuū ali-  
quid profusus: quando & ē primoribus admodū  
lax partibus: & vt munus vbi obeant, vel in ip-  
sis morbis est necessariū, cum alimentū corpori  
vniuerso cōficiat. Quare ciborū cōcoctio, siue  
ea in iecinore, siue in ventriculo sit in prospera,  
febres interit, ac succi vitiū exacerbat. Quo ma-

gis in omni febrī, ciborū cōcoctio rei prospicere  
magnopere oportet. Atq; eius rei grata, robo-  
ris quoq; instrumentorū quib. pericitur, non le-  
uis habēda est cura. Si ergo vel minima sit suspi-  
cio iecur aut ventriculū laborare, abstinētiū pro-  
tinus oleo incoquamus, ac eas particulas per-  
fundemus. Cum autē duplex in omni abstinēti-  
o facultas sit, vtiq; in pomice astringendi facultas  
nō parua est. In reliquis omnibus amara quidē  
qualitas est vellementissima: astringētiō verō, aut  
planē obscura, aut prorsus nulla sentitur. Proinde  
ponitū ad iecinoris & ventris phlegmonas  
eligi præstat. Est autē id tum folio, tum flore lon-  
gē q̃ cætera abstinētiā minore. Odor quoq; huic  
nō modō nō infusus, verum etiā quid aromati-  
cum referēs. Reliquis omnibus planē est sordus.  
Quare hæc fugere oportet, vti autē semper pon-  
ico. Enīā reliquorū medicamentorū, in quibus  
mixta cum amaritudine astringendi vis est, ali-  
quid in oleū cōcurre, atq; ad eundem modū vti  
licet. Amara siquidē qualitas præit, vtiq; astring-  
entiā facit. Ac si quidē intendere astringētiōē stu-  
deas, oleū ipsum etiā astringendi vim habere: cu-  
iusmodi est qd Hyspanū vocant, & quæcūq; cum  
oleo frōdib. præparantur. Sin leuiore vti astringē-  
ti ne placet, aliud olei genus præparabis, præcipue  
quod tenuiū sit partū: quod genus Sabinū est.  
Optimū tamen vbi astringere vehementius expe-  
dit, est hystricū oleū. In penuria verō abstinētiū,  
teritiniū vel melinū, vel masticinū, vel leniscu-  
num satis fecerit. Quod si exigua febris sit, etiam  
vnguētū nardinū: quod vti valentius sit om-  
nibus calfacit. Quare si aliorū copia nō est, in va-  
lescente febre rosaceū illi admiscebis. Sanē myr-  
tini astringētiō idonea nō est: cum crassior sit par-  
tiū, q̃ vt altē descendere possit. Ad eundē verō  
modū & cataplasmata cōpositam vim obtineat, ex  
ea quæ tenuiū sit partū, ac relaxet: tum etiā ex a-  
mara, astringētēq;. Superet autē in his, vbi scilicet  
tum reprimere, tum robur addere studemus,  
quod astringat. Vbi renuare ac digerere, amarū:  
vbi evocare, quæ ex relaxatib. tenuiū maximē  
sint partū. Siquidem quæ crasse substantiæ sunt,  
ea pus mouentib. sunt accommodata. Cataplasmate  
aut quod sequitur fuimus nos feliciter vti, cōtra  
iecinoris phlegmonē. n. olei in quo abstinētiū  
decoctū fuerit, & cydoniorū decoctū, sing. vnc.  
ij. myrobalanorū & rad. ireos, puluerisatorum,  
sing. drach. ij. cere quod sit sana. Fiar emplastrū  
iuxta artis præcepta. Coquitur & in vino austero  
cydoniū, ex ipsiusq; carne aliquid eiusmodi cat-  
aplasmatum indurū: vbi videlicet et quod cōstituit  
copiosum est, & particula ipsa infirmior: tunc  
siquidem astringentē vim inaugeamus. At verō  
nec colo laborante, nec reliquorū intestinorū  
quouis, nec musculis qui in pectoris huiusmodi  
aut ipso peritonæo, miscenda astringentia sunt.  
Sed nec cum vesica malē habet, vt vniuersæ modō  
nihil vitā ad locum fluat, nec sanguinis redun-  
dantia, nec excrementorū copia, in toto sit cor-  
pore. Porro renes & pectus in media prædicto-  
rum cōditione cōsistunt: quantum scilicet à ventri-  
culi iecinorisq; sollicitudine absumt, tantum reli-  
quis antecellentiā. Siquidē in ventriculo iecinore  
reij resoluti robur permicio siquidē, minime in

Concoctio in  
horum magnopere  
prospicere  
dum esse in san-  
guine febrili,  
abstinētiā be-  
ne potest esse  
abstinētiā dū-  
plex faciat.

Abstinētiā  
potestatem esse  
eligendam ad  
iucura & ven-  
tris phlegmo-  
nas.

Amara quali-  
tas vtiq; astring-  
entiā facit  
Oleo species di-  
uersa.

Myrtinum oleū  
esse crassum  
partū, quā  
vt altē descen-  
dere possit.

Phlegmonē be-  
ne cōmodis-  
sime cataplas-  
ma.

Astringentia  
in quouis  
partibus esse  
libus non sit  
utendum.

illis periculofum. In his vero est quidem periculofum, non tamen perinde ac in illis: nisi pus educere expectetur aut pulmone, aliquid sit opus. At in liene curatio, si vel xger ex his sit, qui atræ bilis excrementum naturaliter congerant, vel enā eo tempore succus in eo redvidet, necesse est reliquis astringentia permisceri, quò vicerus robur custodias: ita enim & excrementa ad se trahet, & cū corpus expurgat, ipse rursus per ventriculū excernet. Sin atræ bilis sit omnino excrementum nullum, aut prorsus astringendum nō est, aut parcissime. Ad hæc, si in quavis phlegmone obiecta particula, calor tumorē superet, agendum vt sensim per ea quæ tepentē calorem obtinent, digeratur: quod genus est tuni lini semen, rum chamæmelū. Quibus aduci vel hordet, vel fabarū farina debet: quippe quorū neutra excal facit. Sæpe verò & artometide ad eusmodi phlegmonas vitur: cui aquæ aliquid admiscemus.

Artometis.

Phlegmonas quorū calor in mori superat, quibus carere medicamentis debemus.

Phlegmonas quorū tumor calori superat, quæ ratione curanda sunt. Acetum quòdā miscenda phlegmonarum medicamenta.

Lini affusio quæ medicamentis non vocatur. Porro si febris dixeretur, nec laetandis, nec relaxandis esse, æquidam corpus variatum foret.

Heparis cataplasma esse miscida astringentia.

Pectore affusio parum miscida esse cataplasma facias astringentia.

Pulmonis infusio, adstringendum ab astringentibus.

Pulmonis infusio, adstringendum ab astringentibus. Pulmonis infusio, adstringendum ab astringentibus.

Pulmonis infusio, adstringendum ab astringentibus. Pulmonis infusio, adstringendum ab astringentibus.

Pulmonis infusio, adstringendum ab astringentibus. Pulmonis infusio, adstringendum ab astringentibus.

Pulmonis infusio, adstringendum ab astringentibus. Pulmonis infusio, adstringendum ab astringentibus.

nulum partū est, sed etiā nō mediocriter reprimendi vim obinet. Quo profectō rationabilis in principis affectuum ipso vitur, rosaceo admiscentes. Procedente vero tempore, etiā spodyli & serpylli aliquid miscet: quo scilicet tempore transire ad ea quæ cōcoquant, ac digerant, cōuenit. Sane ad eum modū & castoreo vitur: cū tamen ipso in aliis phlegmonis minime vitur, & vitur etiā in summa inclinatione consistant. Est namque calidus id, q̄ vt phlegmonis sit idoneum. Soleo autē ipse singulari partikulæ meatui, qui us ad excrementorū emissionē sunt destinati, fluxu læ reddere. Intestino, vētriculo, meienterio, et ictericorū cōcū, intestinū rectū. Rembus, velicæ, ictericorū gibbis, venæ cæzæ, arteriæ magnæ, & omnibus quæ in lumbis habent, eum qui veficæ inseritur. Pulmonibus & pectori, arteriæ asperæ, atq̄ fauces. Cerebro & eius involucri, eum qui per palatū & nares descendit. Paratur fluxibilitas

Castoreum esse calidum quoniam re coarctat phlegmonas. Castoreum vitur in mori esse videri debet.

Fluxibilitas metui quibus medicamentis paratur. Multa quibus non sit vitur.

Balneum quod de conductis.

Balneum quomodo eductis strandum.

Balneum quod de pleura.

his quidem quæ per sedem eterni debent, multa, & cibus his qui ventrem liquant, & pharmace quæ modice pronitare possunt. Ad ventriculū verò, securū & lenē, si quid phlegmone sunt vexata, nec multa ipsa est utilis: quoniam ilico in bilem transit, ac vicerū phlegmonas auget. Excrementa autē, vt cum vrina excernitur, diuiteris promouebis: quemadmodū quæ in pectore & pulmone laxet, usque rursus excitant, evacuas.

Porro balneum in remissione febriis administratū, corpore iam mediocriter transpirante, nō exigū cōmodo adfert, omnia ex eo tum fulgida nola excrementa, tum humida educens. Curatio tamē est primò, vt citra horrorem administretur. Secūdo, vt nullam pñæ noxæ viscus fit imbecillū. Tertio deniq̄, ne multitudo crudi humoris in primis venis cōtineatur. Horror siquidem & auget, & gignit febrē. Partes verò imbecillæ, per balneū liquatos humores multo facilius alliciunt: & quod fusca liquantur, & q̄ vix dilatarat. At crudiorū humorū copia in totū corpus digeri. Horū si nihil obstat, ex balneo dū hæc xgro cōpendia accedēt: & quod redundante humorū vacuabitur aliquid, & quod multū transpirabit caloris febrilis. At verò cū particula, quæ obstruēt, aut putredo, aut phlegmone obiecta, febris ipsius veluti focus sit: ei propter calorem suū sponte trahē, alia quæpiā occasio extrinsecus, ex his quæ potestate excalcaciēt, accesserit, necesse est affectū intendi. Si quis aut prius toto vacato corpore, laxatibus curet, vbi scilicet maxima febris nō adeēt, vñq̄ profectū se aliquid potest. Quo tempore etiā lauare citra noxā licet. Cauendū tamē si frigido solio lies: quādo & crudi & putrescentes succi, minus apri sic ad exalandum redduntur. Itaq̄ in progressu morbi, vbi & assumpta iam supervacua sunt, & tum cruda, tum putrescentia cōcocta, & cataplasmatas relaxantibus, & balneis sine periculo vitur.

Porro apertissimū in febribus quæ intermittūt & repetunt, tempus est, cū exhalare febrilis calor iam corpore. Stant siquidem corpus ad nutrimentum præparant: huius quoq̄ opportuno tempore ex duplici cōiecto respectu, nēpe summò præcedētis accessiōis in vigore, & futurū principio. Ad hæc nanque spectantes, operam dabitur,

Balneum spiritibus in febribus interuenientibus in quodammodo sit. Nutriendi tempus vnde sit vitur.

mus, vt longissimè ab vtroq; nutriamus. Verù si febris ipsa sit còtinens, còritat tam brevis finem dam. Si igitur vltra septimū neutiq; progressura videt, prius còtinendus à cibo æger est, si virtutem nò defuturū cònuiciamus. Sin ad nonū, aut vndeimū, aut quartumdecimū vsq; progressura videatur, aut etiam finienda sepius, ceterū æger vires infirmiores habere, quàm vt in tantum tempus sufficiat, necessum erit nutrire, ac deligere id, quod minus sit noxiū. Etenim vbi vel secat, vel ventriculū phlegmone prehendit, perniciosissimū est ante accessiōem cibare. Vbi laxa abest, quibus infirma est virtus, vtilissimū. Porro summū vigorem febrilis accessiōnis expendes, an circa magnitudinē febrilis caloris sit siccus, squalensq;, an cura siccitatē vrēs. Priorem nanq; lumentane victū q̄primum masefacere oportet. In secundo, dum plurimum se fe calor remittat, manere. In principij verò accessiōnis more æstimabis, an corporis extrema refrigeret, & magnam sanguinis reuocatiōē ad interna corporis faciat: an omnino corpus non premat. Quippe secundum hoc, ceu facile mansuetum, contemnes. In priore distinguas oportet. Nam si absq; visceris phlegmone, aut succorum redvndantia morus ad interiora in accessiōibus pollet, nihil offendes paulo ante cibans. Sin vel phlegmone, vel redvndantia sublit, cauenda est ante accessiōem cibano, ceu res maxime noxia.

### GAL. DE METHODO MEDENDI LIB. XII.

QV cum symptomatis consistunt febres, non sunt ad febrium genus viliū, aut spe cies, aut differētiās distincta. Porro grauiorū symptomatum, & quæ rarit̄ febrilentibus incurrunt, primæ differētiæ sunt tres. Aut enim in latione actionū còsistunt, aut in rectorum vacuatorūve immo dicio excedit, aut in corporum ipsorū affectū. Ex quibus duæ quidem differētiæ priores, si còsistent, ad se totā cutatiōē edvertunt, affectūq; deferere cogūt. Tertia verò, alterius quidem quæ curare oportet, affectus est signum: nullam tamen seorsum curatiōē exigit, vrpote cum affectū, vnde nascitur, vnū cessant. Nullū autē symptoma, quod symptoma est, nec curatiōis ratiōē mdat, nec primū immutat: licet ex accidētī intridū id faciat, vbi scilicet causæ locū sortitur. Porro eorū omniū, vbi veluti causa curatiōē immutant, vnū caput est, ipsa læsio, sine virtutis sit, siue dispositiōis. Larduit autē vires, vigilis, dolor, atq; vacatio immo di ca. Affectū verò eadem, nō vniq; semper, ceterū magna ex parte, noctē: ac pōissimū cū fuerint immo di ca. Qua de causā, quandoque cogimur prius submouere symptoma, q̄ morbū, mutato videlicet infituro. Ergo si labant vires, nō tamē vehementer sint resoluē, sed adhuc resiliunt, ad symptoma tantū sumus attenti, atq; id q̄primū tollere maturamus. Sin iam resolute vehementer sint vires, non modo symptoma se dare, sed illas etiam firmatē còstendimus. Vbi verò vitium rationis fiducia est, adeo nunq; cōtra symptoma pugnabis, vt (quod prius contrariū est) per ea

nonnunq; præsidia, quæ dolorē auertūt, morbos ipsos curemus: veluti profectō dyliciter ipsi, mordentibus maxime medicamentis tum potissimū medemur, cū vniq; est grauissima. Est autē duplex medicis contra dolorē inuadens ratio. Altera, qua delicias cubanū subscriptunt; altera, ex artis ratione. Quippe si licet ægrū dolorib; obno tētē valentib; remedijs vno die persuari, q̄ tota curatiōe neglecta dolori tantū intentus est, nō ex artis ratione, sed in grāā ægotantis ita cit. At si ex dolore vires soluantur, atq; ex eo im pender periculū, mingant dolor, & robotari vi res debebunt, quo & morbo resistere, & curatio nis spacio sufficere valeat. Eāo igitur terminus in ægotantibus, quem nō transibit is, qui ex arte generosē contra morbū pugnat, vt rutō medi eetur. Ei verò qui dolorē mingat, vt vires custo diat. Porro dolorē mingit, quæ ex papaueris succo, vel alteri semine, vel radice mandragora, vel deniq; styrace còstant. Ceterū si fas sit, remedijs quæ morbum sanent, vendo, quod opta mus efficiere, cauendum ab id genus soporiferis medicamentis est. Sin verò ex vigilis & viribus resoluēdis, æger ad mortis discrimē tendat, tum profectō ipsi tempestiue vtare: nō ignarus scilicet corporis habitum nonnullū ex eis (exedum, eligendum tamen potius lationē ipsam, q̄ mortē. Hac rumori persuasiōe ipse quoq;, tamētū omniū maxime ab vīu grauior soporinum abhorrens (quod rebellem valentemq; in corpore frigiditatē relinquāt) aliquando tamen ea & colicis exhibeo, & us qui vel oculorū, vel aurium, vel aliarū partium vehemētissimo dolore eruciantur. Interim verò, & cū æger ex tenui destillatione, vigilis, & vehemētī tūis vtatur, pauxillum eiusmodi medicamento offero: facillē noxiā eius, si quis semel sit vīus, spacio emendatum iri ratus. Omnia tamen id genus magis salubria sunt, si post annū còpōsitiōe sumant: veluti quod ad Phlonē refertur, quod ad dolores stupefaciendo sedandos, nullo minus est celebre. Id verò etiam si duorū, triūve aut quatuor annorū sit, multo sanē fuerit præstitū: sed neq; inuēte tamē sequentiū annis, ad decimū vsq;. Ergo siuevi cautēdus est, quoad heri potest, eiusmodi medicamentorum vīuētia si necessitas vt gear, nec admodū recentia tum offerenda: quod frigida quæ in his tum, prævalentes vires adhuc liabent: nec ita antiqua, vt spem nostrā frustrentur: sed tandū dimittēda sunt, quoad violentia refrigerantū, ab eorū quæ calfaciunt vi mingit. Et talī quidem medicamentorū vīus, eorū qui aduersus symptoma pugnat, est proprius, pōissimū vbi ex frigida causa dolor est excitatus. Ob sunt enim talia præstū non affectū, curatiōisq; contumacia eum reddunt. In sanguinis misio, quæ scilicet vires nō deicit, symptoma spectāus medici opus nō est, sed eius qui totū affectū adimere studet. Ad eundē modū & balneū, & purga no, & fomēta calida, & vīu potio. Quæ omnia, dum affectus sanant, vni cum ipsi etiā dolores sedant. Eodem modo & nutrimentū exalibitū, vbi sicco & squalente morbo eo ventriculū afficitur, dum affectū ipsū sanat, hominem prehēdi syncopē prohibet. Porro quæ ex copia cru-

Dysenterias  
grauissimū co  
rari maxime  
mordētibus me  
dicamentis.  
Dolore expa  
nsiōis ratiō de  
pice.

Medendum tu  
to est.

Vires esse seruā  
das.  
Dolorem qua  
mitigat.

Soporiferū si se  
ri possit, rutō  
da.  
Soporiferū quā  
do vīuēdum.

Stupefacienti  
bus medicamē  
tis Galenus vī  
batur interdū  
in delirio a  
ratiōis sumū, q̄  
in transiōe de  
stinationibus.

Stupefacientia  
medicamentis  
tota effi. q̄ post  
annū cōpōsi  
tione sumā  
tur.

Stupefacientia  
medicamentis,  
cur nec recentia  
sunt, nec vīu  
ra inopiniā co  
hibenda sint.

Canis, ut si  
bre detinetur,  
quandū ab ip  
so seruati de  
beat.

Phlegmone af  
fectus ventricu  
li, nō potest vt per  
modicūm q̄  
si ante accessi  
onē cibare.

Symptomatum  
grauiorum tres  
differētiæ.

Symptomata  
et si sunt cura  
tionis ratiōē  
inducit, nec pri  
mū immutat.

Vires à quibus  
lardantur.

Symptomata  
submouere quā  
do neglecta  
morbo cogi  
mur.



Vacuatio per  
frictionem solū,  
quā debet ad  
ministrari, &  
quā modo.

dorum humorū, vñā cum oris ventriculi offen-  
sione febricitat, neq̃ minusq̃ sanguinis, neq̃  
purgationē tolerat, cūm tamen vacuatiōē desi-  
derent. Quare eis vacuatio per frictionē solā ad-  
ministratur. Ergo lentea medicorū asperis ita-  
tum in ipsius auspiciis morbi fricandi sunt, ā cruri-  
bus supēne deorsum. Debet enim radi ab his cu-  
tis, cūm simul & callieri per eam, & digeri cor-  
pus potuler. Deiu tota brachia, simili modo ab  
humeris supēne deorsum. Vbi verō artus om-  
nes abvnde calore iam videbūtur, & metus fuerit  
ne q̃ ex multitudine frictionis, contusa iam car-  
ne, superveniat laesitudo sensus, oleo relaxare  
vtrū: q̃d genus est Sabinū. Ab astringente verō  
abstinēbis, cuiusmodi Hispanū exaltatissimū ve-  
rō si fuerit, nihil deterius sit, si ad digerendum  
aliquid transferis, quale Stecyoniū est, aut enam  
clausum melinū. Vbi igitur oleo membra ipsa ab-  
vnde fricueris, oleum est detergendum, atq̃ ad  
spinam dorsi transeundū: quam totā panter fri-  
care, primū quidē siccā frictione, post oleo, expe-  
dit. Ab hac rursus ad crura te contera, & ab his  
ad brachia, denuoq̃ dein ad spinā: sic totū diem  
agens, in domo & lucida, & tepērata. Sanē mul-  
ta, in qua coctū hyssopus fuerit, his est aptissi-  
ma: qua sola primis tribus diebus vtrū. Ipse ve-  
rō co tantū tempore dūcā intermittere frictionē,  
quo somnus hominē occupaverit. Ad quē enī  
alliciendū, & frictio vberior facit. Ceterū som-  
nus vberior his minimē est salutaris: cūm nec  
crudos succos digeri sinat, & viscera reddat gra-  
uiora. Sed si quis alius affectus est, qui somnū &  
vigilias modicas postuler, hic profectō in his  
est. Quippe somnus cōcoquit, vigilas digerunt.  
Quorum vtrūq̃ est opus in qui ex multitudine  
crudos succos p̃gorat. Ac si pulsus his parvus  
admodū infirmūq̃ sit, aut enī supra hęc vehē-  
menter inæqualis, extremū periculū indicat: nec  
quicq̃, præter iam dicta, molindū est. Sin verō  
mediocriter sit robustus, nihilq̃ in tercisus videa-  
tur, si sua quidē spōte alius cōmodo nō deiciat,  
soluenda est, multa iniecta. Quod si maior tūto  
superfluorū impetus ad alius citetur, principiū q̃  
dem percoquere multam amplius oportet. Ea  
namq̃ si vtrūq̃ minus alium subducit, ita magis ni-  
trin. Post hęc, si supervacua largius descendant,  
ne sic quidem sistenda: sed exhibēdos pro aqua  
multa prisanē cremor est. Si verō fluere pergāt,  
alice forbitione ægrū nutries. Si pulsus interm-  
dit imbecillitate, vel inæqualitate, vel parvitate  
mutetur, panē imbutū diluto vino porrigere cō-  
venit: vtrūq̃ si nec ventriculus, nec iecur laborem  
phlegmonē: quando si hac insectentur, corpore  
crudis succis referto, salus deplorata est, pulsū  
sic immutat. Minimē autē vtrūq̃ cataplasma-  
ris aut perfusionibus est, priusq̃ supervacua ma-  
gna ex parte partim vacuata sint, partim conco-  
cta. Interimq̃ sola vacua, in qua coctum hyssopū  
sit, vsq̃ ad septimum diem vtiuntur: Si qui-  
dem longissimū sic affectū cibi abstinentiam se-  
runt, corpore scilicet ex crudis ipsis, quos conti-  
ner, succis cōcoquendis alto. Verū si alius im-  
pensē fluat, vel æger multam fastidiat, ad prisa-  
næ cremorem est transeundum. Sin hinc quoq̃  
avertetur, alca ad eundem quo prisaña modū ei

præparabitur. Neq̃. n. eis qui sic sint affecti, acētū  
in cōmodum est. Inōdūcibi fructus asanum suc-  
cos esse animaduertens, oxymeli assidue pro  
multa dabis: si quidem ætas sit, & æger frigide  
assuerit, frigidum: siu lytem aut, omnibus cal-  
dum. Maximē verō pulvis parvus, tardus & va-  
rus, frigidus subtile succos ostēdit. Sanē propo-  
situs ad verissimū sunt tam balneū, tum aer am-  
bleus, quoties vel nimīū calidus est vel frigidus.  
Itaq̃ vtrūq̃ iudicandi hi nō sunt, sic & reclinati in do-  
mo sunt: ætas te videm, quē frigeat: hyeme, quē  
caleat. Læduntur namq̃ uō parū ab vtrōq̃ exces-  
su. Atq̃ hæc quidē agenda sunt nbi, vbi ā primo  
die curationē suscepēris. Si autē ad eos quos iam  
premit syncope acutus fueris, si ea que retuli lo-  
ca phlegmonē vacat, panē exhibebis nō multū,  
eumq̃ ex vino aliquo, quod celere in corpus di-  
gestionē adiuuet: statimq̃ ad frictionē veteres,  
quas vtrūq̃ diximus administrabis. Ac si quidē celsi  
status sit vehēmenter calidus, cum frigida vinum  
dabis: cum calida autē medicocriter, si tepērat.  
Quæ tamē secūdo & tertio dabisur pono, om-  
nino calidam exhibendū curabis, vtrūq̃ succo-  
rum ei odorū concoctionē adiuuet. At quib. ex  
stata bili, quos vtrūq̃ infestet, syncope inci-  
dit, iis frigida exhibenda ponio est. Vinū tamen  
quod & calidum natura sit, per deductionē in cor-  
pus promoueat, omnib. quos syncope male ha-  
bet, offerre cōvenit. Constat autē ex vinis ea de-  
ligenda esse, quæ & flauo colore sint, & substa-  
ntia tenui, & ætate vetera. Talia namq̃ & boni  
odoris cōtinuū fuerint. Quinē si paululū vbi  
mista sunt, gustēs, senties calorē per totū corpus  
transmisi. Ceterū amara prius vetustate vina ne  
sunt, præsertim quæ iis exhibebis, quibus & sto-  
machus flaua bile vgetur. Cōmodissima igitur  
his vina sunt, quæ cum naturaliter sint austera,  
sensilem iam astringendū vinū, propter vetustatē  
nō amplius exhibent: calorē tamē admodū eui-  
dentē habent. Huius igitur generis vinorū opti-  
ma sunt, Suretitanū, Signinū, Sabinum, Tiburnū,  
& Marsum, omnia quidē Italica, astringen-  
tiāq̃. Quibus tamen ex crudis humorib. synco-  
pes periculum imminet, sanē & alernū tantū iam  
memoratis præstat: quanto tū melioris est succi,  
tam etiā calidus: vtrōq̃ q̃d & velo cuius illis di-  
geretur per corpus, & crudas succos cōcoquēdis  
auxilio erit. In summa verō, quibus ex abundan-  
tia crudoū humorū syncope incidit, iis crassa vi-  
na, ceu noxæ: aquosa, ceu parū efficacia, fugienda  
sunt. Deigenda autē eorū sunt media, quæq̃ flaua  
exsistat & calida. Neq̃ enim inuenias ex albo  
vinorū genere calidū vllum: quidē etiā austera,  
& mediocriter alba, cum inveterauerint, quod ā  
modo fulsiore redditur. Quotquot autē in ipsis  
calidissima sunt, omnia profectō sunt flaua. Re-  
liquorū vini generū, austera que mediocriter al-  
ba, crassaq̃ sunt, certe nullā ad digestionē in cor-  
pus est idoneum. Si tamē ab vnde inveterarint,  
nec aliorū copia sit, vtrūq̃ illis licebit, quod & sto-  
machum roborent. Ceterū vina quæ calfaciunt in  
modicē, us offerendā nō sunt, quib. caput est im-  
becillū, faciliq̃ ab id genus vinis repletur. Por-  
rō vina quæ odora vltūq̃ sunt, quantū est ipso-  
rum est natura, omnia caput grauit. Eorū tū Fa-  
lernum,

Oxymeli em-  
probre illa qui  
crudo succo m-  
dūcunt.

Frigidū solū  
fuerit quo pri-  
us datus.

Syncope cō-  
stat autē curam.

Syncope labo-  
raturus omni-  
bus quæ vtrūq̃  
est exhibenda.

Vinum ægrū  
vtrūq̃.

Vinum ægrū  
quod calidū in-  
reperitur.

Vina impensē  
calidiora offerri  
de nō vtrūq̃.  
hæc caput est  
imbecillum.

Præter vberior  
alium somnū,  
Somnia dicitur  
vtrūq̃ erodit suc-  
cos digerere probu-  
bit, & viscera  
reddere grauiora.  
Somnia erodit  
quæ.

Multa exhiben-  
da.

Cataplasma  
vtrūq̃ non ef-  
ficacius quā su-  
per vacua para-  
tum sit: vtrūq̃  
ita, partim con-  
cocta.  
Tandē longissi-  
mū fuerit, quib.  
corpus crudis  
succis redvnde-  
dat.

*Vina austeriora  
gastricis ro-  
borant, capitiq;  
maximè tenent:  
Syncope tamē  
prebensū nō ei  
ferunt.*

lerum, tum Tmolites, tum Lesbii, infirmo capi-  
tis noxia sunt. At vina austeriora ventriculum ro-  
borant, capitiq; inter omnia vina maxime tenent:  
digestione tamen in corpus nō promouēt:  
quō magis fugienda tibi in syncope preliensia  
sunt, nō secus quam aqua. In penuria verō vint  
quod accōdmodū vntiq; syncope sit, ei in qua quē  
ex multitudine crudi succi oritur, & ei quē ex bi-  
le incidit, coactus vnt vino, vtrius aquosius, ma-  
gisq; si antiqua fuerint. Talia namq; tamet si nō  
valenter exalfaciunt, facile tamē deducūt in  
corpus: quō nomine vinas præter cetera om-  
nia promouent. A quibus secundum locū obti-  
nent, quēcūq; saluorū maxime sunt tenesia: quæ  
etiā ad syncopas præcipue sunt deligenda. Est  
autē syncope, præcepto virium lapsus. Cū autē  
essentia vini, quibus regitur corpus, tum in spi-  
ritu, tum in solidorū corporū temperamēto con-  
sistat, hæc nobis, & vbi integra sunt, seruari: &  
vbi corrupta sunt, ad integrū reuocari omnino  
debet. At verō substantia spiritus, ipsiq; solida  
corpora, sic nobis sunt custodienda in morbis,  
vt tum qualitate, tum quantitate, quoad fieri li-  
cet, se naturaliter habeat. Curandum itaq; est, vt  
quę substantię p̄mo ab eis deuiit, hæc per ap-  
positionem sarcinam: quod in ipsis verō alte-  
rascit, in debita temperiem per cōtinentiam alte-  
rationē restituamus. Si igitur tum vacuatio, rū  
alteratio sensum paulatimq; fiant, etiā correctio  
vntiq; sensim administrabitur: quod munus  
ad artem sanitatis tuende pertinet. Sin cōstēnt  
& semel, ac magna aliquando vacuatio, vel etiā  
adfectio incidat, sic sanē & efficitur morbus, &  
medendi methodum ad eorū sanationē deside-  
rabimus. Porro animalis spiritus, à cerebro, ve-  
luti à fonte, nascitur. Qui partim ex inspirato,  
partim ex eo quod reticularis plexus suppedi-  
tat, irrigatur alitūq;. At vitalis spiritus continet  
in corde, & arteriis: nutriturq; tum ex aëre inspi-  
rato, tum ex sanguine habituoso. Quōd si natu-  
ralis quoq; aliquis spiritus sit, vntq; cōtinebitur  
in seciore, & venis. Virū igitur lapsus, qui quidē  
solidorū corporū substantię resoluē succē-  
dit, in longuissimis morbis subitō incidit, an-  
nante ex frequentī atropia extenuato: præte-  
rea in colligantibus febribus. Qui verō ex sub-  
stantie temperie mutata provenit, is, vel vbi im-  
modicē ipsa fuerint calfacta, frigidacta, madefa-  
cta, vel exccata, vel horū aliquib; copulatis aife-  
cta, provenit. At alteratio spiritus, tum ex vino-  
sis oritur succis, tum ex ambientis aëria malitia:  
præterea venenatis facultatibus, aut animalū  
quę virus eieciunt, venenis. Ipsius verō essentię  
spiritus corruptio: quæ tum ob animi affectus,  
cuiusmodi sunt timor subitus vehementiq;, nec-  
nō in cor, ira, curæ, atq; summa voluptas, tum  
ob ingentem dolorē: præterea ob plures motio-  
nes vigilatq;, obip̄ immediatam ipsius tenuita-  
tem, & cōtinentiā eum vasorum raritudinem,  
atq; eadeo ante hæc omnia, ob respiratū prohibi-  
tū, & nutrimentū defectū incidit: diligenter  
corrigi postulat. Scōdum autē est, in omnibus  
perturbationibus, ipsam per se ipsam moueri a-  
nimam: quæ nimirū in alia actūs functionib;  
mouet etiā & ipsa corpus. Ob idiq; resoluē etus

robur, vtroq; motū suorū genere, si modum ex-  
cedant. Ergo nec rarefaciendū immōdicē: ex-  
tēnsa est corpus, si spiritū retinet: in ipso stude-  
sed nec quæ ui eo sunt, per comesta & bibita va-  
lenter extenuanda. Est etiā ad virū robur tuen-  
dum, ciborū atq; pononū habenda ratio, vt sint  
tum quantitate modici, tum qualitate exquisiti.  
Aër præterea quē inspiramus, debet esse vt op̄i-  
mē temperatus, sic ab omni corruptela & iniqui-  
tamento alienissimus. Curandū similiter est, vt  
ipsa corpora solida, in quibus vel maxime cōstī-  
tere vitium substantia videtur, sint sano tempe-  
ramento. Quippe ad cōstētum virtutis ro-  
bur, & syncopalem accessiōem prohibendam,  
singulare prædium est temperamētū custodia:  
ante omnia quidē, trium principiorū: mox ve-  
rō reliquarū partium, quęcūq; in confortum  
affectus, principia secū ex facili trahunt. Cuius-  
modi est os vetricali, quod propter exquisitum  
sensum, accersit syncopas. At verō si humores  
crudi vires sua copia premant, ac propter mul-  
titudinē simul & crassitudinē exiguos animalis  
meratus obstruat, in affectus multos nominibus  
exaltas est, ac syncope opportunos reddat.  
Quippe succi crudi nutrire prius quam sint con-  
cocti, nequeunt. Quōd si nec obstruant, nec one-  
rent, syncope nō cerre nō inferunt, sed deliquia  
animi. Siquidē resoluunt egrotantes humiliorū  
di, nisi frequentius nutritur. Sunt autē nutrien-  
di li extenuantibus calfacientibusq; idiq; nō co-  
pious, nec semel. Medicamenta similiter sint exte-  
nuantia calfacientia, sed moderatē. His & aquo-  
sum vinum idoneū ab initio est, nisi tamē vehē-  
menter febricitent. Etenim qui laborant ex hu-  
iuscemodi succis, hos quotidie accessiones exer-  
cent, præcipueq; ad vesp̄rā, noctūq;. Qui verō  
ex tenuissimis succis vrgenti syncope, diversi à  
sani dictis ratione curandi sunt. Illos namq; paula-  
tim et assidue vacuamus. At qui sic se habēt, hos  
paulatim & assidue nutriemus. Quōd si viribus  
imbecillis, aliquid huius viscis p̄ilegione obfē-  
sum sit, eorū salus est deplorata: quando nec ip-  
sos licet assidue nutrire, sed tantū in tenuissimis  
bus: & seruari nō possunt, si nō nutritur. Nō so-  
lum aut extenuatis ad eum modū spiritū & san-  
guine solent sepe vires resoluī, sed etiā facultate  
expultrice per vniuersam corporis molē immo-  
deratius concitata: id quod accidere maxime so-  
let, ob retentis imbecillitatem. Ergo nutrire,  
quicquid horum incidit, est necesse: sicuti etiā  
corporis summa densare, non secus q; priorā re-  
faceret. Frigidū itaq; in aërem astrigentemq;  
comparabimus. Vnguenti præterea sunt astric-  
tiū vnguentia. Tum cibi eis dandē, qui nō admo-  
dum promptē dissoluant: cuiusmodi sunt, panis,  
sorbino ex alica, fructus austeri, & qui nō facile  
corruptantur, quorū vitellī (quandoquidem  
album exgre cōequeatur) gallinæ, eorū, qui la-  
ctē alitūnt, testiculū, ac deniq; suillum cerebrum  
diligenter assūm, vel in albo iure legitimē elatū,  
porro & anetho inieciis. In summa, omni ratio-  
ne agendum, vt & succorum materiam crassio-  
rem reddat, & cum densis, & exhalationē inhi-  
beas. Vinum verō ipsū aquosius, necessariū  
inter iniecta est, sumptum post cibos. Quōd si ex

*Vitium robur  
expultrile qua  
reguntur.*

*Syncope ab a-  
re vetricali et  
laetitia.*

*Vires resoluī o-  
rtem ob exor-  
tem vim in-  
modicē concita-  
tant.*

*Vires imbeci-  
lites reddita  
ob excrementi  
materia inmodi-  
citate, quando  
resoluitur.*

*Albumen ma-  
gis aptū concō-  
qui.*

*Syncope est gra-  
vis verum la-  
pis  
Efficitur verū  
in quibus consi-  
stat.*

*Spiritus anima-  
lis à cerebro na-  
scitur.  
Spiritus vitalis  
in corde et arte-  
riis consistit.  
Spiritus elatilis  
qui spiritus sit,  
in seciore et venis  
habet.  
Lapsus vitium  
quibus succedo  
resoluit.*

*Spiritus à qui-  
bus alteratio re-  
sultat.*

*Spiritus quæ cor-  
rumpunt.*

*Anima per sui-  
p̄m moueri in  
perturbationibus.*

sententia nobis omnia responderint, etiam carne us aliquid nutrimentum post alia dabimus, porriusmū post quartū diem, succis qui febrem exci-  
tauerunt, iam ad concoctionem venientibus. In omnibus autē eiusmodi curanonibus, si is ad-  
sit syncope, omnis sollicitudo medentis ad sym-  
ptoma vertetur. Sin expectetur, vtriusq; curam  
habebit, & vt symptoma non incidat, & vt pau-  
larim discutiatur morbus: quē celerius discute-  
remus, si nullus symptomatis subesset metus.  
Quippe qui malitudine crudi succi grauat, hūc  
si modō iustam semel vacationem ferre possit,  
nec metus aliquis syncopes impenderet, semel,  
arbitror, vacuati explicaremus a morbo. Eum  
verō cuius spiritus & succi facile exhalant, si an-  
te accessionē cibare nō cogermur, longiore  
illū morbum certē non redderemus. Sunt & alie

quing; occasionēs quibus succedunt syncopæ:  
nempe dolor vehemens, vigilie, immodica ven-  
tris inanitio, motus in delirantibus, ac denique  
principiorum intemperantia, vel nuda, vel cum  
humorum affluxu. Si igitur causam ipsam vnde  
excitatur dolor, adimere possus, ita vniq; contra  
symp-  
toma non pugnaueris, sed curaueris agri-  
tudinem. At si qua occasione prohibitus, affec-  
tū submouendo intencum esse non licet, vehe-  
mentiam mitigabis doloris. Dolent porro tan-  
tūm particulz sensibiles, idq; vel ob contraria-  
ritas diuortii, vel ob aliquam altera nonē, nō sen-  
sim, sed confertim & violenter factam. Quippe  
videntur corpora, nō solum cum in non natura-  
lem habitum confertim aguntur, tristēm muta-  
tione sentire, sed etiam in ipso ad naturalem sta-  
tum suū reditu, nisi in sensim fiat, torqueri. Ac  
ex alterantibus quidem dolore afficiunt, omnia  
vehementer calfacientia, atq; refrigerantia. Ipsam  
autem solutionē continui, necesse est vel ruptio-  
nem, vel cōsuetudinem, vel erosionem existere. At  
ruptio ex distentione quadam, cōtussio ex gra-  
uante aliquo, erosio ex mordente provenit qua-  
litate. Ergo cum nihil extrinsecus sit, quod vel  
discedat, vel grauet, vel erodat, sed ex seipso li-  
rum aliquod corpus fennat, neminem laute po-  
test, distentionem ab aliqua intrinsecus substan-  
tia, quæ multitudine sua corpus se continens di-  
stendat, aut immodica sit citate, provenire: con-  
tusionem, ex eo quod aliquod corpus occurra-  
rit extrinsecus, quod vel durum, vel magnū, vel  
grauē, vel simul ambo extitit: erosionē verō, ex  
succo aliquo, cui mordens natura insit. Qui qui-  
dem si sit in tunica intestinorū imbibitus, com-  
modisimè hiera picra expurgatur. Quod si ali-  
quam exvicerationē pepererit, nutrimentū cer-  
te exger est calente alica, fed iniectis mālū punici  
gramis. Potus autē illi offerendus est, mālū punici  
cremor. Porro si sanguinis abundantia sit qd di-  
stendit, propterea sanguis mittendus est, modō vires  
agri non sint infirmæ. Sed si in vel sanguinis  
missionē timeat, vel vinibus sit imbecillis, tum  
reuellendus in duertum est sanguis, tum per pro-  
pinqua deruandus. Quod si his peractis dolor  
etiā persistat, pater profecto in agitante particu-  
la impactū esse quod cōterit. Patet verō nō mi-  
nus, & quidd curatio ipsa per digerentia medica-  
mēta molienda sit. Similiter enī curantē dolores

à flatulento spiritu orti: magis tamē q̄ extenuan-  
tia remedia desiderant. Si moles aliqua graua-  
do, contendendōve dolorē exciret, molī ipsi ef-  
medendum. Sin mordens humor, ad versisima  
huic sunt, quæ extenuant & calfaciunt. Postulat  
namq; huius generis affectus, vt ea quæ cōtristat  
vacuetur, aut alterent, aut medicamentis torporē  
inferentibus retundantur. Ea quippe minus hos  
affectus ledūt, q̄ alios, qui à crassius glutinosiety  
humoribus p̄ficiuntur. Huiusmodi tamen fuce-  
cos, dolor vehemens nō comitatur, nisi aliquis  
eis halituosus spiritus copuletur, qui ex his cor-  
poribus quibus cōtinentur, erūpere prorsus non  
possit. Nam sic, grauissimi solent excitari dolo-  
res. Etenim cum tunica intestinorum sine dupli-  
ces, si in medio ipsarum spacio frigidus ac vici-  
dus humor collectus sit, a calore liquatus in fla-  
tulentū mutatur spiritum: qui crassius frigidusq;  
cum sit, acerbissimos dolores inducit. Ac ad rē-  
pus quidē, post bibitiū medicamen stupesciens,  
prorsus indolentes red dūtur agri, ceterum affec-  
tus in variis modis sit maior. Nam & ineren-  
torū tunice medicamentorū frigiditate densio-  
res, mandisq; status transmissiorē habiles reddu-  
tur: & humor ipse tum crassior, tum ad motum  
inerior evadat. Quare id genus dolores om-  
nes, per ea quæ incidant & concoquant, prater  
ea status discutiunt, desiccantque citra valentem  
calfaciōnem, curandi sunt. A nullo autem in e-  
iusmodi succis tam est metuendum, quā in a ca-  
lore qui & eos liquet, & in statum vertat, fed  
nō valeat discutere. Porro agrestis quidam, alio co-  
mestio, vinōq; ad vesp̄rī meraciori bibito, à do-  
lore colico fuit liberatus: neq; id iuuiua: alium  
siquidem statum discuit, ac munimē sitim infert.  
Quamobrem ipse altum theiacem agrestium  
appello: estq; cōmodissimū in omnibus, qui  
regionem frigidam incolunt. Quos igitur ex su-  
pra dicta causa vehementis intestinorum dolor ci-  
tra febrem exercet, iis & alium esse licet, & the-  
riacem bibere. At si cum febrī vbi talis dolor ali-  
quando incidat, principio quidem, si id ferunt,  
fomentum siccum ex milio adhibendum est. Si  
ab hoc non quiescant, semen aliquod, quod fla-  
tum dissipet, in oleo quod tenuium sit parium,  
coquere, mox per lintē, quod purum sit, oleum  
colare, dein anferis, aur gallinaceum serum, nec  
salum, nec admodum vetus, in ipso oleo liqua-  
re, & per sedem infundere oportet. At si neq;  
ex hoc remittatur dolor, secundō rursus inueni-  
endum est idem, adiecta en amnum castorei & pa-  
paueris succi, vtriusq; fabre non amplius magni-  
tudine. Olei vero hemina modus esto. Excipitur  
& lanula ex hoc medicamento aliquod: quæ ap-  
pensā forti filo, quam penitissimē in rectum in-  
testinū inferi debet, quod vtiq; cum liber, id fa-  
cile recipiatur, & evidentē vilitatē cōferat. Simi-  
liter & oculorū, & aurium dolores, qui ab infide  
causis in sebtī exciētur, sedare conuenit fōmē-  
to ex milio. Sed infundimus etiam auribus me-  
dicamentū id qd ex castoreo & papaueris succo  
conficit, sapia liquatū. Quod samē auri instillatū,  
oculorū etiam ac dentū dolores lenit. Jam verō  
si cataplasma imponi aliquid res ipsa suadet,  
papaueris capitibus in aqua coctis, ac fœtigerci,  
vel

Dolens à flatu  
lenius spiritus or-  
ti curatio.

Dolens à mor-  
dente humore  
ortū curatio.

Intestina  
tunica esse du-  
plex.

Stupescientia  
me in amentia,  
obvoluta que  
dum dolens esse  
flum tamē na-  
turam reddat

Dolens vnde  
aurum à cras-  
siori productū  
que fiat rano-  
ne curatio.

Altum auribus  
turi dolens in-  
ter.

Altū statū di-  
scuit.  
Alium dem  
theriacem rebus  
tuo.

Theriac quib-  
vitiā.  
Colico dolore  
qui sit mālū fa-  
bre curatio.

Possari cōtra-  
na: modus ad  
leniendū dolores  
colicos.

Dolens vbi  
tuo & auris  
que rano-  
ne curatio.

Auribus in-  
stilla mōdo  
mit ex castoreo  
succo papaueris  
et sapia coctis,  
oculorū etq; di-  
turi dolores le-  
nit.

Dolens mōdo  
de cataplasma  
apricum.

Syncope quibus  
succedat casus.

Dolens causa.

Solutio distensi-  
onis quæ  
ruptio.  
Contra-  
stia.

Distensio spen-  
tanea vnde ac-  
cider.  
Contra-  
stia.  
Vnde vnde  
fuit.

Eltera picra ex  
puris hūmori-  
bus acrit tunica  
intestinarū im-  
bibitur.

Dysenteria qua  
lu vitiā con-  
viciat.

Distentionis à  
sanguine cepta  
curatio.

Reuulsio est  
in citratiū in-  
limdem.

Deriuatio sit  
per propinquā.

vel hordei, vel lini feminis farina aquae immixta, carapalpa conficiat. Porro collyria ex opio co-  
clecta, vehemensimodis oculorum dolores laxant:  
utendūq; his uti, cum maxima necessitas vir-  
get. Nam tamen in oculis dolores ex frigidityte in  
reliquis vitium ipfas reddant particulas, occurr-  
unt tamen praesenti discrimini: ac postea frigid-  
tatem ab opio relicta, licet nobis corrigere, tum  
oleis calidis, tum enam collyriis. Nempe aurib.  
oleum id quod folium calitorem recipit, in illa  
mischung quae veris cinnamonomoli collyrii. Qui a-

## GALENI PERGAMENI

de methodo medendi, lib. XIII.

**I**N hoc tertio decimo cōmentario agitur de tu-  
moribus præter naturam, primò quidem tra-  
ctetur de phlegmone, quod hæc & frequen-  
tius incidit, & febris inferat, grauissimæ indu-  
cat symptomata. Gignitur autem omnis phleg-  
mone ob consuetum sanguinis, copiosioris si-  
licet, quàm pars postulat: quo rumore obfeda  
particula ætione, quàm pro naturali habita, ca-  
lidior & rubicundior, redditur: tenditurque, ac  
rangenr cernitur, cum dolore ac pulsatione sen-  
sibili. De phlegmone tamen generatione, var-  
vario modo opinantur, licet ipsa curandis rati-  
omnibus cōmuni existat: nempe vacuatio san-  
guinis, in particula inflammata contenti. Cate-  
rum phlegmone quo etiam gignitur, est du-

plex curationis scopus : quippe quod ex ea generatum iam est, id profligare oportet, praefido illius medicinae partem, quae morbos curat, quod vero superest generandū, inhibendum est prorsus, beneficio alterius, quam praecautio vocamus. Porro sanguis copiosior infuit, alia quodam, aliisve particulis aliquando cum mittentibus, ac ea quae phlegmone labore incipit, recipiente aliquando particula quae affigitur, ipsum ad se trahente. Sane quae mittunt partes, aliis vicia supervacuū, vel qualitate molestim : aliis viroque nomine et succum propellunt. Quae attrahunt, ea morulo colore trahunt. In dolobus, incipit quidem quia ab eo quod affigitur : sed quicquid est phlegmone, id superpositae partes effundit. Ar vero tumorū omniū, qui praeter naturam sunt, varietas, ex eius quod infuit, naturam accipit. Vbi enim flauentia materia vberior accessit, flauiores magis tumores fiunt. Phlegmoni magis similes, vbi sanguis : sicuti erysipelas, vbi flava bilis : & credens, vbi pituita. Similiter scirrhos, vbi vel crassus, vel vehementer lentus humor particula fuerit infixus. Ceterum crassius humor quodammodo iam in melancholicis est. Lentus autem, ex glutinoso provenit obis. Vbi igitur particula aliqua, phlegmone virgeri coepit, videndum est, an propter calorem aliquem, qui in illa praeter naturam fieri ortus, an propter doli

Tamquam pro-  
pter maiora re-  
fector, pro diffi-  
ciliores fluctu-  
bus maris qu-  
dam.

*Phlegmonē* cō-  
ratur quā frū-  
cūditur et d. a.

Impervacuum  
expelle impet  
à fortiorib. ad  
subordinatis

Glandulae cito  
sint in avari ob  
noxia fluctuant  
bus.

*Syringia quod.*

Barbieri, Carlo  
1904.

Opium recipi-  
t. calycis, ve-  
lentes, 1/2 mas-  
culis, disten-  
dit, tamet  
subciliis et  
fipiditate a-  
p. val. equan-  
t. et. et.

Cucurbitula  
adusta, dolari  
a flara curata  
nam soluit.

Rutaceae ali  
ambary in  
que d'olor cali  
on - fr. nle su  
marum, la feni  
riat.  
De. stu. à. rnu  
loquere e. nle  
si. curano.

Con tal nome  
 presentando  
 questo orro-  
 ribile peccato  
 di sacrilegio  
 questo parti-  
 colare, che  
 non era al-  
 l'altare.

Pharmaceuticals  
and  
Nutrition.

Phlegmon p.  
not in cutis

cogimurq; aliis sanguinē mittere, idq; aut vena incisa, aut membris eis, quæ læsa nō sunt, scarificatis. Manu etenim laborante, scarificabis cura. Altero tunc malē habite, reliquā. Has namq; variationes indicat ipsa copia: sicuti etiam succorum vitum, redvndantis succi purgationē. Sed quæ etiam græcè dicuntur phymata, glandulis, sicuti fluxio in eas procubuit, citra vlcera occasione accidunt. Vbi ergo distente velementer glādule sunt, aut alia quævis particula, quā premit phlegmone, cogimur, toto corpore prius vacuato, ipsam scarificare. Sanē vacuum torū corpus, etiam cū mediocriter sit succorū continet, si in orbi magnitudo id suadeat. Siquidem dolor, & membri inflammatio calor, etiam si purum ab excrementis sit totum corpus, fluxionis causæ sunt. Tunc tamen parcius vacuare tempta: idq; habita ratione ætatis, nature, anni temporis, regionis, ac denique consuetudinis ipsius ægrorantis. At vbi iam phlegmones ipse veluti feruor subsedit, mitigatoria emplastra dimissis, ad ea quæ digerunt, paulatim est transendum.

Ac primū cum mingitoris ipsis paulū mellis miscendum. Mox triticea farina in totum est auferenda, contentis hordeacea cum melle vberiore. Deinde ad aliq; eusmodi digerentium medicamentorū veniendum, quæ vel humida consistētia sint, vel crati specie. A duris autem est abstinendum: nam & phlegmonarum reliquias contrahunt, & rursus phlegmouem in ægra particula excitāt. Quod si pus aliq; notabile in suppurante particula sit contentū, non expedit incidere protinus, sed digestionem moliri medicamentis ad id valentibus. Cū autem quod ex phlegmone ipsa relinquatur, scirrhiolum effectum videtur, fidenter iam valentibus medicamentis vtēris. Si quādo ergo ægram partem medicamenti acrimonia irritatam videris, mingabis eam interea fomento, quod per spongiam administrabis. Id autem aliq;do ex aqua dulci esto: aliq;do etiam sal habente, vbi scilicet scirrhioliores sunt phlegmones. Sin aliquando puris copia medicamentis superet, nec ea videantur tibi totum digerere posse, quod sic absciescat secare, eo potissimū loco oportet, quo est edissimulatum: obseruata interim effluxus indicatione: quippe tenuissimam illū cutem intus inuenies. Post sectionem verō, medicamentum aliq; quod, eorum quæ sine morfu siccant, impone.

Quod si cōpuleris portio aliqua suppurantis partis videbit, excidi eam est necesse. Sectio igitur qua vtemur in suppurante particula, myrti iminetur folium, sicuti planē nō magna: quali nos semper cōtenti fuimus. Ceterū cū in tali incisione longitudo maior q; latitudo sit, esto in inguine longitudo per transversum ducta, nō autem per rectitudinem membri. Quippe ita dum membrū inflectimus, naturaliter cutis sibi applicatur. Post excisam cutim, medicamentum, quod manu vocant, affectam partē implebimus. Est enim ea purgamentū thuris, leui astrictione prædita: quo nomine etiam thure ipso ad nonnulla vtilior. Thus siquidem puris tantū mouendi facultatem obinet, vt potē nullam astrin gēdi vim habens. Magisq; id facit, quod pinguis ex eo

est, & magis albicans. Sicuti quod magis est flauum, potentius siccatur. Manne verō, etiam corticis thuris paululum est admissum, vnde astrictionem vim habet. Ipse autē cortex thuris, tum astringit, tum siccatur insigniter. Itaque eo solo vitemur ad sanguinis perfusiones. Quinētā minge prius incisam partē oportet, fomentis primū, dein cataplasmate, mox humectate aliq; medicamine, aut nō siccante, singulis scilicet extrinsecus impolis. Nam in ipso vlcere tum mannam, tum pus mouentia, deus quæ expurgant, sunt imponenda. Post quæ, si caustas etiam nō ad sis, quæ impleant adhibenda sunt. Sin minus, ea quæ cicatricē inducant: veluti quod ex cadmia conficitur. Vtendū verō medicamentis id genus est prius, q; vlcus ad equalitē prius impletū fuerit, ne ipsa forte cicatrix circūposita sit cute eminentior. Porro vbi æqualiter inter se succi omnes sunt aucti, plethiora, siue plenitudo in affectus vocatur. Vbi verō vel flaua bile, vel nigra, vel pituita, vel serosis humoribus repletum corpus iam fuerit, eum liabūt cacochymia vocamus. Ergo plethiora tum sanguinis missione curatur, tum balneo frequenti, tum exercitatione, tum frictione: præterea digerentibus medicamentis, atq; etiam inedia. Ad succorū vitum, purgatione, quæ redvndanti succo sit accommodata, corrigitur. Ceterū si iam æger febricitet, nec exercitatione vacuare licet experantiam, nec vñctione quæ calefaciat, sed nec multa frictione, nec balneo: imō sanguinis missione, vñ cum inedia, vel purgatione aliqua. At si non febricitat, omnibus iam dictis vtare, optimum quodque ad id quod instat, diligens. Venim cui crura laborāt phlegmone, ambulatione vel cursu exercitandas non est: sed nec stare iubendus.

Satiū quippe est, vt sedens fricetur plurimum, moxq; manuum motu exerceatur. At si quæ ex superius partibus vixit videatur phlegmone, huic motus ex inambulatione aut cursu est admodum salutaris. Similiter & frictio ea tunc potior est quæ cruribus adhibetur, illas quæ in superius partibus administrantur. Siquidem in omnibus talibus reuulsio debet fieri in contrarium. Neq; igitur cum vel circa secūm, vel aliquā huic partem vicinam, initium phlegmones incidit, alium deicies. Neq; cū in vesica, vel cole, vel renibus coepta est, pharmaca quæ vrinam pro vocent, bibenda dabis. Nec si mulier in vtero, vel padeudo infedit, menses huic provocabis, sed ad partes quæ maximē longinquæ sint, semper reuulsionē molieris, æstimata tum phlegmonis magnitudine, tum corporis totius itatu. Nam si plurima succorū abvndantia sit, nec exercitatio nō, nec balneo sine periculo vtare. Sin exigua sit, licet & per hæc vacues. Iam verō, si phlegmone oborta sit ab affectu partis quam vexat, primū quidem affectus ille sanandus est: mox quicquid ex phlegmone est genitum. Quæ ambo interim iūdem præsidio tollūtur. Ceterū ad incipientes phlegmonas, frigidis astrigentib; magis vtendum est, quā illis quæ digerant: atq; etiamnum magis, vbi crassum quod conluit non est. Sed si sanguis in inflammatione particula vehemētē impactus fuerit, nō est amplius vtendū repercutientibus:

Thuris vire  
astringit & sic  
cat.

Incisa parte  
esse aliq; si  
mita ora in  
cicatricem leuā  
das.

Vlcere in par  
te sella mē  
curata.

Cicatricē inde  
crassius medi  
camentis vñ  
dum aliq; vñ  
quā rati vñ  
tam prius in  
plethia fuerit.  
Plethiora quā  
Cacochymia  
quod. Plethiora cura  
tur. Cacochymia  
correlia.

Crura phlegm  
ne obita quā  
modo sunt cu  
randa.

Phlegmones in  
superius part  
ibus quādo  
sunt curanda.

Reuulsio debet  
fieri in contra  
riū eorum par  
tem, quæ phle  
gmones vñ  
tur.

Phlegmones in  
apertis, in  
gēda & alijs  
genitū magis  
vtendum est  
genitū magis  
vtendum est  
genitū magis  
vtendum est  
genitū magis  
vtendum est.

Manu laboran  
te scarificanda  
esse cura.  
Cure aliter af  
fectu, reliquā  
scarificandum  
esse.

Phymata.  
Phlegmones af  
fectu partium  
quādo scarifi  
care cogimur.

Vacuare quā  
do solamur cor  
pus etiam si me  
diocriter sit suc  
corū continet.  
Fluxionis cau  
sa sunt dolor et  
membris calor.

Phlegmones  
quādo sit dige  
renda.

Phlegmones cu  
rati sunt ad ve  
sari cura medi  
camentis.

Phlegmones  
suppurantē ai  
esse incidendi  
protinus, sed di  
gestionē medi  
camentis ad id  
valentibus.

Abscissus quā  
do incidendus sit.  
Et quā in par  
te.

Sectio in forma  
qualis esse de  
beat in suppu  
rante particula.  
Inguine suppu  
rati scirrhiolum  
per trāuersum  
esse incidendam.

Manu thuris  
babui folio in  
superficiam esse  
Tum pars me  
nuallā adve  
nientem astrin  
gendi vim ha  
bet.

tuentibus: sed tunc digerere est tempestivum. Quod si ex animalis punctu moriſue dolor incidit, à quo exorta fit phlegmone, duplex sanan- di doloris ratio est, vel virus ipsum vatuſdo, vel quod dolor exorta, alterando. Ac vacuabis san- eid, eorum medicaminu ope, quæ velerement attrahunt alterabis iis quæ sunt contraria. Vacuante itaq; tum calientia omnia, tum quæ ad- ſe circa caſſationeſ alluſi: vt cucurbitulæ, & cor- nua quæ dñ. Sunt quæ & ore ſuo virus extrahant. Huc pertinet & cautium, & medicamina quæ cautieriſ ſimiliter eſſecharum efficiunt. Alteru auxiliorū genus eſt eorum, quæ qualiſat per con- traria alterant. Variantur autem medicationeſ, pro laborantium particularum diuerſitate. Vna quippe indicatio ex ſimilaribus ſumitur parti- bus, altera ex inſtrumentariis. At ea quæ ex ſimi- laribus ſumitur, modum caſſandi, refrigeran- di, ſiccandi & humeſtandi determinat. Quæ verò ex inſtrumentariis, tum locū ipſum, per quem vacuare oportet, tum vacationis ratione, tum verò in ſimilis ſpeciei medicamentorum uſu ipſum pluriſ minoruſq; modum. Porro vacuatio- nis indicatio in phlegmone, refrigerationis indi- cationem vincit, contra ſi in eryſipelate. In hoc nanq; refrigerationis indicatio magis vrget, q̃ vacationis: eſt vbi refrigeratur eryſipelas eſt, ad ea quæ digerit medicamenta cōvertuntur. At in phlegmone tranſiſper refrigerandi eſt, quare- nus & ad incrementum eius ſiſtendum, inluben- dumq; eſt cōmodum. Quippe refrigeratio reper- cutit quod aſſuit, & ex eo quod in laſſorante cōtinetur particula, aliquid in proximis partes repellit. Simili modo & quæ modicè excaſſant, vtraq; interdum ratione proſunt: quod & dolo- rem ſedant, & cōtenta in parte ægra digerit. Si- quidem mitigando dolorē, augeri phlegmonas veratidigerendo, quod earū iam conceptū eſt, ſanant. Si iecur inflammationē cōtrahere ceperit, ac totū corpus egeat iuſtaitione, vtriſq; va- ſida ſit, atq; vterq; pubertate attigerit (puer enim, quæ per diſſectam venam ſit vacationem non feret) pariter tum reuellendum, tum educendum, qui ad ipſum ſuit, ſanguis eſt, interna in dextro cubito inſecta vena: propterea quod & eſt dire- ctio, & ampla via, cum vena quæ cauſa dicitur, ſo- cietatem habet. Hac nō apparente, media ſecan- da eſt. Quod ſi nec illa ſe oſtenderit, reliqua & ter- tia incidenda venit. Ac modum quendam vacua- tionis, ex reducantur modo, etate, natura, an- ni tempore, regione, conſuetudinēq; atq; ante- laxe, ipſa laborantis virtute, inuenies. Venæ au- tem ſecandæ electio à parte laborante indicatur. In vniuerſum aut, quā longiſſimè à tētera ſu- ſione parte quod redundat reuellere, nequaſ ad eam trahere, conuenit. Hac ratione, nec ſi hep- at, aut ventriculus, aut inteſtina phlegmone occupare iam ceperit, medicamine quod alui- deniciat, vti conuenit. Eandem cum his indica- tionem & veteris ſortitur, ſicuti cum vrinæ vaſis pūdenda. At vomitu vti pūdubundis laboranti- bus, in diuerſa reuellere auxilium eſt. Eadem ra- tione in omnibus quæ circa caput accidunt, alui ſubductio in contrariū avertit. Si qua verò cir- ca fauces, & palatum, aut linguam, aut denique

in ore phlegmone laborare ceperint, in his om- nibus cauenda ſunt, quæ pruriant per os evo- cant, Græci apophlegmatismoſ appellat. Sanus nanq; tūc fuerit deriuare ad nareſ, incidereq; lu- meralē in manu venā: vel, ſi ea nō cernitur, me- diam. Vbi iecur, peſtus, pulmo, aut cor ſic aſſi- cutur, interna. In angua primas in manibus; ſecundas eas quæ ſub lingua habent. At iis quæ in occipite ſunt aſſiſtiſ, etiā eam quæ in cubito eſt, necnō eam quæ habetur in fronte. Remiſus verò, & veſica, & pudendo, & vtero ſic habenti- bus, eas quæ in cruribus ſunt fixæ, ac poſſamū quæ ſunt circa poplitē. Sin minus, eas quæ ſunt iuxta malleolum. Ac perpetuū quidem in omni- bus, eam quæ eſt directio eſt. Vbi iecur phlegmo- ne invadit, quæ in dextra ſunt manu: vbi lienē, eſt. Itaq; itanu prima vacationis diuerſitas pro particularum diuerſitate variatur: conſiſcit communē, quod ſit vacuandum, indicatio, nō magis eſſe vtilitatis quā noxæ cauſam. Por- rō vbi peſtus, aut ventriculus, aut partes circa collum capuē laborant phlegmone, etiā exco- giratū eſt artus vincire. Quippe ipſum quod in- feſtaur phlegmone, haudquaſ vinciendū eſt. Sed ſi in manibus ſit phlegmone oborta, crura. Sin in cruribus, manus. Iam verò nec refrigera- re inter initia, aut aſtringere, citra laboratis par- ticulæ indicationē, vtilitatis magis quā noxæ ſunt cauſæ. Nam particulæ quæ quæ iuxta ar- tus ſunt fixæ, tūc miniſtrare poſſis frigidam ali- quam fomenationē. Iecinori verò, ſi phlegmo- ne inſeſtaur ceperit, non licet imponere actū fri- gidum, aut tomentum, aut cataplaſma. Ruſus aſtringens oleum, nec oculis, nec oris partibus admoueſis, ſicuti hęc tentari phlegmone cepe- rint. Aut verò, etiam ſi actum cum roſaceo in- fundas, nihil offeſſes. Vicius etiam pro parti- ratione variatur. Quippe iis quibus glandulæ, aut aliquid circa artus tentat phlegmone, tot & talia exhibenda ſunt, quor & qualia faciliſe cō- coquent. At ſi iecur viciuſiſe inſeſtaur phleg- mone (cum munus eorū ſit toti animali cōmu- ne) viciuſe acquiſitiſſimo eſt opus, quī videlicet meatuſ aperiat detegendū circa roſione, ac bre- uiter omnis tenacitatis ſit expere: qualis vique in cibus eſt priſana, & in pharmacis oxymeli, a- qua diſtemperat. Carterum dulcibus omnibus tum iecur, tum lien intumefcit. Iam verò aſtrin- gentia omnia, mala iccinoris phlegmonis ſunt in cōmoda, præſertim iis quæ in cauo eius conſi- ſtunt. Similiter ea quæ mordent, phlegmonas quæ in cauo ſunt viſceris, quā quæ in gibbo cō- ſiſtunt, magis irritant. Iis quippe quæ in gibbis ſunt, mētra iam veniſit quæ aſſumpta fuerit: et quod prius concoſta ſint, & quod ſanguini, qui in iccinore prius erat, admiſta. Cauo aut iecinoriſ phlegmone obſeſſo, protnuſ etiā venas quæ in mēſenterio ſunt, vñ phlegmone laborare eſt nec eſſe, cum ex vena porte exoriatur: protnuſq; etiā, quæ cunq; ex oculis earum incidunt, vim ſuam oſtendere. Porro vbi iecur phlegmone ob- ſeſſum eſt, mediocriter aſtringi per cataplaſma- tiſta materæ debet, quod altricis ſaculatiſ principii animalibus ſit, et venoſum ab hoc exo- riatuſ genus. Vt autē iccinoris cauum per alui

Apophlegmatif-  
mos ſignificat  
eſt, vbi partes or-  
tis ſunt in ſu-  
mota.

Phlegmonas ac-  
cipere aut por-  
tiones, dicitur  
dū dū mētra ſi-  
ſt, ſecundūq;  
lunatralum in  
manu venam,  
Vena ſecunda  
ratio in ſecur,  
pudendoſ gelio-  
ſ, corde, ſan-  
guineſ, occipite,  
remiſſeſ, pa-  
dendi, & vteri  
aſſiſtiſ.

Vicula non eſt  
ſi inuiculaſ, in-  
flammataſ par-  
ticulaſ, ſiſt illi  
quæ oppoſita  
eſt.

Iecinori, ſi phle-  
gmonaſ inſeſtaur  
ceperit, nihil  
aſſeſt frigidū ſi-  
ſt applicandū.

Aut in inflamma-  
te nihil nocet,  
vñ ſi aſſeſt  
cum roſaceo in-  
fundat.

Viciuſe pro par-  
tiſ ratione va-  
riatur.  
Viciuſe inuicūſ  
viciuſe inſeſtaur  
mētra totum.

Dulcibus in ſu-  
motaſ ſi ſecur  
tam ſua.

Cauo hepatis  
phlegmonaſ ob-  
ſeſſeſ, vñ mē-  
traſ ſimiliter  
inſeſtaur.

Vterq; phlegmo-  
neſ inſeſtaur  
mediocriter a-  
ſtringendū ſit,  
per cataplaſma  
miſta materæ.

Phlegmonaſ à  
pūto moriſue  
animalis  
circuſaſ.

Vena à hepate  
reſtaſ, quæ  
reſtaſ vacua-  
tionis.

Medicationeſ  
variſeſ pro la-  
borantium par-  
ticulæ diuerſi-  
tate.

Eryſipelatiſ co-  
loraſ.

Refrigerationis  
viciuſe in phleg-  
mone.

Caſſationeſ  
mētraſ, doloriſ  
ſedant, et cōtra  
in parte in-  
flammataſ dolo-  
rem.  
Hepatiſ caſſati-  
onem caſſatiſ.  
Tum ſecundū  
viciuſe ſeruit.

Sanguinem va-  
tūſeſ vt viciuſe  
ſiſt ab hepate, ſe-  
ſtaſ internaſ de-  
viciuſe viciuſe.

Vena internaſ  
non apparenteſ,  
mediaſ aut in-  
mētraſ ſecan-  
dam oſſeſ.

Reuellendiſ oſſeſ  
mētraſ ſuſ  
quā longiſſimū  
a tētera ſu-  
ſioneſ parti-  
culæ.



Hepati parte  
per quam vna  
ex quibus por-  
gula rumenit.

purgatur, sic gliba eius, per ea quæ modicè vti-  
tis mouent. Cuius generis apum exsistit. Proce-  
deat autem tempore, vbi phlegmone iam con-  
coquitur, etiam valentioribus vti licet: vt asaro,  
Celitica uardo, plu, petroselino, smyrno, & meo:  
sic vti etiam per ventrem vacuare, si cauum affici-  
tur, cum cibis admissis, & vena, & mercatali,  
& epitymio, & filicula: omnibus præterea quæ  
modicè aluum decitiunt. Magis in remissione  
tum his ipsis aduacius quam ante vtendum:  
tum verò quæ us sunt valentiora, partim in pti-  
sana incoctis, partim tuis, ac in mollissimum  
pulucrem redactis. Exhibenda verò & hæc sunt  
vel ex pitana, vel ex aqua. Ego namq; etiam fili-  
culæ aliquid in pitana aliquando in coxi, & ni-  
gri vertari cornem. Sed clystere etiam ipsos vacu-  
are expediet: inter iniuria quidem, vel sale, vel  
nitro, vñ aphronitro cum multa distemperata  
contentis: in remissione verò, potissimum quæ si  
quid scorbutico relictum è phlegmone est, etiã  
valentiora medicamenta miscemus nobis.

Hepati obesse  
phlegmone quæ  
est clystere con-  
ueniant.

Scirrhus effi op  
portuissimum  
lugar hepatis.  
Locus subhepa-  
tici quæ in lo-  
patis, effi rati-  
onem  
Locus crasso nu-  
tritur sanguine  
Renes facile for-  
tius contrahit.

Quippe hyssopum eo casu aquæ incoquimus, &  
origanum, & colocynthida, & minus centaureum.  
Opportuissima namq; ad scirrhum sunt iecur,  
licium, si quis, parum habita de his ratione, glutin-  
osis cibis vratur. Etenim substantia lenis, tam-  
et si rarior quàm iecinis sit (est enim illis sub-  
stantia luteola) crebrius tamè scorbutico viris af-  
figitur, propter nutrimentum, quo alatur, speciem.  
Siquidem crasso nutritur sanguine, qui vel ni-  
lium purioris est, facillimè nigra bilis efficitur.  
Renes etiam facile scirrhum deprehendi, atq; id-  
circo neplritidas alias omnino solui non posse,  
alias ægrè solubiles esse, ratio docet: cum & cras-  
sa substantia sint, & non careant excrementorū vi-  
tio. Quo fit, vt qui crassi succi cibis vescitur, calcu-  
lus vitio vexetur. Mediocina igitur horū af-  
fectuum ea esse constat, quæ dissoluit, dissoluât  
& frangit: quæ vniq; ex eorum sunt genere, quæ  
obstructiones emunguntq; dererunt: cæteri viri-  
bus valentiora. Curatione autem vna conuol-  
cant, virtus, natura, ætas, anni tempus, regio de-  
nunt, cōsuetudoq; iecinis etiam laborante phleg-  
mone, quæ extrinsecus applicant, ea multè esse  
facultatis esse debent: idque non in generatione  
phlegmones modò, sed etiã cum nec adsit amplius  
quicq; nec repelli quod in laborante particu-  
la cōtinetur, potest. Quo quidem tempore et ap-  
plex nobis indicatio suggeritur: altera quidem à  
phlegmone, sui evaporatione poscente, numerū  
digerentia: altera verò ab aestiva parte, quæ per  
astringentia robur eius seruari iubet. Quare cō-  
uulsiuili vna contrariis indicationibus, compo-  
situm quoq; esse medicamentū oportet: nempe  
astringens simul atq; relaxans. Verū tuendi ro-  
boris indicatio, in us tantum partibus est cōmu-  
nis, quarum munus ex visu est vniuerso corpori.  
Igitur nec lienem tantū relaxantiis curare o-  
portet, cum huc quoq; ex iecine quicquid limo-  
sum & melancholicū est expurget, propterea sci-  
licet, quod ex eo humore nutritur. Idcirco quo-  
ties obstructio aut phlegmone, sed præcipue scir-  
rhosa, in eum incidit, tum ea quæ obstructiones  
eximant, tum quæ disscent, vehementiora exi-  
git. Nam quale medicamentum iecini ab syn-

thium est, tale est lienis capparitis cortex. Quale  
rursus iecini est eupatoriū, tale scolopendriū  
lien. Siquidem similia genere medicamēta, quæ-  
admodum & nummenta, ambo viscera postu-  
lant: cæteri tantò valentiora & aciora lien,  
quantò crassiore vitralimento. Iam verò cum  
gibba iecinis expurgari per renes oporteat, si-  
cuti caua per inferiore ventrem: lien sanè per re-  
nes nulla admittit potest vacuatio, sed tan-  
tummodo per intestina. Proinde vbi phlegmo-  
ne premis, deiectionis ipsum medicamentum  
detergemus, tum lacepsimus, quod demittat de-  
ponitq; superfluum. Est autè duplex ratio eiusmo-  
di medicamentorum vsus. Nempe, vbi partes supe-  
rius sit laborant, per ea quæ edunt biluntiq;  
cum inferiores, per id quod sit per clystere in-  
fusum. Quandoquidem quæ eduntur ac bibun-  
tur, eorum vis, anteq; ad inferiores partes perue-  
niat, resolutur. Quæ infusa sunt, ea omnino ad  
ieunū vsq; ascendere nequeunt. Porro gula (quæ  
stomacha propriè vocatur) affecta, cataplasmata  
super dorū spinam imponimus: non autè in an-  
teriori parte: quod facimus, vbi phlegmone os  
ventriculi vrgetur. Siquidem spinæ gula super-  
iacet, per collum & pectus deorsum vsq; ad ven-  
triculum exporrecta. Iam quemadmodum lien &  
iecinis caua, per intestina: gibba illius & renes  
per vrinæ purgatur: sic pectus, vbi interna eius  
tentantur phlegmone, per succingentem mem-  
branam, aliquid in mediū sui pulmonumq; spaci-  
um transmittit. Id autè expurgari per eandem  
quæ pulmo viam debet. Propinqua igitur us qui  
sic affligitur, sunt, quandiu quidè ipsa invalescit  
phlegmone, medicamēta quæ medio criter vias  
aperiant, & crassos humores disscent: vt pitana  
& mulla: in exquisita autè declinatione phleg-  
mones, dum educi iam excrementa possunt,  
quæ id valentius moliantur: vt vrticæ semen, &  
mulla, in quam fur cōiectum paululum actium  
herbarum: quales sunt, origanum, hyssopum, cala-  
mæ inthe, pulegium, & Illyricæ ireos radix. Oxy-  
meli etiam quod ex marubio conficitur, crassiora  
pectoris pulmonisq; excrementa incidere po-  
test. In vniuersum autè quæ in altro corpore assi-  
guntur phlegmone, ex parte paulò aciora, si  
pro phlegmones natura, medicamenta deside-  
rant. Resoluantur siquidem eorum vires, dum  
altè descendunt. Hæc ratione & cucurbitula (stre-  
nuum planè auxilium) est in ventra, tum vt foras  
euectur quæ sunt in altro, tum vt eximantur &  
eruantur, quæ iam in scirrhum abeunt. Verū  
vtendum cucurbitula in ipsa parte quæ phlegmo-  
ne vrgetur, inter initia non est, sed posteaq; vni-  
uersum corpus vacaueris, \* atq; ex visu iam esse  
videatur, eorum quæ in inflammata particula cō-  
tinentur, aliquid aut vacuare, aut versus extero-  
ra reueller. Proinde vbi affectus \* etiamnum in  
generatione consistunt, minimè ipsa membris  
quæ laborare incipiunt, sed us quæ continua his  
sunt, cucurbitula imponi debet, vt ellendi in con-  
trarium causa. Sic namq; ad mamillas cucurbitas  
imponimus, cum sanguis ex vtero profuit, defixio  
maximè in ipsis cōmuniis pectoris & vteri  
vasis, eius ore. Sic si è naribus sanguis profundus-  
tur, præcordias maximas cucurbitas affigimus.

Lien hepatis si  
mulla natura  
est in medicamē-  
ta requirunt,  
Lien crassior  
vitæ alimen-  
ta quæ bibunt  
Hepes per quæ  
proprie vacua-  
tur.  
Lien per intesti-  
na vacuatur.

Clystere pol-  
le vsq; ad ieu-  
na ascendere.  
Gula affecta,  
cataplasma of-  
fi applicandum  
super spinam  
dorsali.

Pectus per quæ  
succingentem por-  
tur.

Pectus phleg-  
mone obesse  
quæ medicamē-  
ta contrahunt.

Calculus quæ  
leant pignus  
Cuius quæ  
medicamenta  
exercent.

Hepati infla-  
mati curatio.

Lien autem  
ex melancholica  
sanguine, quæ  
expurgat ab he-  
pati.  
Lien obstructi-  
one in inflam-  
matione, quæ  
medicamē-  
ta possunt.

Inflammationi  
alium fuit, ut  
paulo antea  
mentis curatio  
possit, quæ  
propter partem  
trahit.

Cucurbitula  
quæ sunt in ven-  
tra.

Cucurbitula  
quæ sunt in ven-  
tra.

Cucurbitula  
quæ sunt ad  
mamillas affi-  
guntur.

Sic &

*Cucurbitula sanguis à per se reuoluit, atque ad ipsam si fuerit opus, attrahere.*  
*Cucurbitula pube affixa, in la cucurbitula non autem fluxum reuoluit occupat admodum.*  
*Cucurbitula ut effe videretur prout quidam viderunt corpore vocatur.*

*Alia miferanda non effe medicamentum quia gratia phlegmatis propter, nisi alium voluerit ducere.*  
*Alia rursus emolumenta.*

*Lethargus est affectus contra rursus phrenitidem. Aliam rationem esse existere in capite.*

*Principio animae facultatem singulae simplices materiae vnde praesentantur, et quae rationem hanc curanda.*

*Oxyrhodinum quibus cum venas affluunt.*

*Affluunt qui cum periculis et doloribus infestant, curantur.*  
*Affluunt qui cum sopore in vadunt curantur.*

Sic & omne aliud sanguinis profluuium, ad contrarium per communes venas avertimus: quæ admodum rursus & sanguinè (si ita est opus) attrahimus. Siquidem quæ menses evocare in animo est, pube & inguini cucurbitis affigimus. Ad hæc, in occipite cucurbita defixa, efficaciter remediū ad oculos fluxiones. Vacuari tamē prius totū corpus expedit. Nam si referū sanguine corpus sit, in quacumque parte capitis cucurbitis defixeris, totum ipsum implebis. Adverte autē, vbi dicimus, 10  
 affringere incipientē phlegmonē esse opus, non quod libere affringēs in iis qd̄ devorāda sunt, exhibendū esse, sed ea tantum, quib. nulla corruptrix admitti vis inest. Nā chalcidibus inter præcipua affringit: sicviti etiā misy, & fori, & chalcis, & diaphryges, & æs vñū, & squama eius, & flos. Verū hæc medicamēta, noxia devorata sunt: quocirca stomachici ea miscere rursū non est. Desistit namq̄ inter dū ex his aliquid ad ventriculū. Sed nec aloē, pbe miscueris iis medicamētis, q̄ phlegma 20  
 nec alicuius causa, quæ intus cōstitit, devoranda sunt: quādo huic quoq̄ purgidi vis quædam inest. Ceterū vbi phlegmonē prius inclinaueris, si quis paululū aloē admisceat, deiciēdi ventris grātia, qui prius nō deiecit, nihil lædet. Quāq̄ sanus fuerit mercuriali, vt vertica, aut eni 30  
 com, alius sic laborantū subducere. Admodū itaq̄ necessaria est indicatio quæ à partibus sumitur. Quæ nec ipsa sit est ad curandos morbos, nisi enā methodos de medicamētis didiceris. Vt autē 40  
 ad affectus capitis iam nostra revocetur oratio, oxyrhodini quo caput phreniticorū perfundimus, sanē vniuersos redarguit, quicūq̄ principē animæ partē in corde statuit. Siquidē per id genus affectus, nō capiti, sed pectori præidia admōdū essent. Atqui non in phrenitide modō, sed in lethargo etiā (qd̄ vñū illi contrariū quodammodo secundum speciem existit) vniuersi applicant ipsa remedia capiti, in quo scilicet principē animi pars residet. Ergo cum humor qui 40  
 in capite redvndat frigidus est, insensibilis iam mobilisq̄ hominem opprimunt: quū verō calidus est, pperius potius morus, vñā cum rationis noxa. Accidit em̄ segnitia ex frigore: ex calore, immodicus motus: ex humoris verō vitio, de mētia. Igitur in eiusmodi affectibus, si virtus valida sit, ac nihil aliud prohibeat, vt crudi humoris copia, vel ætas puerilis, vel anni tempus, vel regio in qua sit extremus calor, vel frigus, statim ab initio vena tendenda est. Atq̄ loc quidē 50  
 cōmune vñq̄ vitio, & ei quod cum sopore, & ei qd̄ cum vigiliis incidit. Commune præterea vtriusq̄ est, vt oxyrhodinum in principio admoneas. Nam repellendū à capite humor est, quif quæ sit fuerit. Quæ sequitur, cōtraria sunt. Nam quæ qd̄ vigiliis cōiuncta sunt, ea lenire expedit: quæ cū immobilitate, excitare. Iure ergo quif in summo incremento sunt, iis virtus quæ pervigilio & delirio infestant, perfusiones ex papaver capitis. applicabimus. Odorē quoq̄ naribus obiectimus: ac naribus intus, vel frontē ex similibus medicamētis illinemus. Quippe sopire, ac stupescere principē facultatem oportet, cerebrū scilicet, quod supra modū in caluit, refrigerat: do in cōtrariis autem vitis excitare: ac noxū hu 60

moris, q̄ citra putredinē, & citra febrem, alios fopores invehit, crassitudinem incidere, exalface rēq̄. Tales nimirū alios fopores, Græci apoplexias, caros, & catochas appellant. Quod si quādo humor putrefcat, vñq̄ cum febre incidunt ea genera, vocatūq̄ morbus græcē lethargus. Incoquentes igitur in aceto rhyndū, & pulegiū, & organū, aliāq̄ id genus, naribus sic affectoribus admoueimus, quō vapor sublati ad cerebrū, humoris crassitudinē diffecet. Mox etiā palatū valennē. & acribus medicamētis vngemus. Ab his verō etiā sternutamētis vtetur: tū capiti similes prædiorū facultates imponemus, adauēta semper eorū, est ad ipsum vñq̄ sinapi, vehemētia, si vitū duo p̄fecerit. Quinētiā cucurbitas ad vtrūq̄ vitū, si diuinū sit, vtetur: itēq̄ ca storco, appē qd̄ ipsum pbe cōcoquit, debite ad ministratum. Quonē alit medicamēti alicuius vim exacte ad cerebrū descēdere volēs, ad coronalē vocatē siturā (cuius plurima ducit in hominibus est) id applicabis. Nam præter reliqua, tenuissimū, & rarissimū eo in loco est cranū. Cōmōdus etiā fuerit, si & cū infusione id facias, aut tonēs capillis, aut enā planē abrasis. Quod si humidū sit qd̄ applicandū est, si id ex alto erundat, ac velyn fons riru illidas: quippe penitus intrō ab ictu magis impellit. Sicviti autē hic vehemētiōr humoris casus cōducit, ita in oculis adverterat. In capite namq̄ insensile os est qd̄ ferū in oculis mēbrana quædā & imbecilla, maximēq̄ fenestra corpora. Et in capite qd̄, aliud est qd̄ ictū excipit, aliud qd̄ curat: qd̄q̄ vt ictū nō sentit, ita facultate, quæ ex incussu ad ipsum pvenit, fruit. Atin oculo, qd̄ est curandū, idem valenter feritur. Quare infundere huic sensim medicamēta, liquara humoribus mississimē facultatis, oportet, atrolentes palpebræ superiorem blandissimē. Merito autem cōmendantur ad phlegmonem oculorū, ex oui humore, id quod tum giuriosum est, tum minimē mordēs. Ceterū quæ terra corpora ocularis medicamētis miscēda sunt, ea benignari exactissimē debēt. Dō 70  
 lēt porro vehemēter oculi, aut ex vehemēti acris cōfluēntis humoris morū, aut quod eorū timinē plenitudine distenduntur, aut propter crassorum humorum, statuosive spiritus extētionem, At morum quidem, tum purgantibus medicamētis, deorū nēpe revelendo, & vacuando, curare convenit: tum ipsi particulæ oui lumore infuso, quō per eum acris fluxio sine offensa eluatur. Vbi autem concocta iam ipsa phlegmone fuerit, & simul corpus vacuātū, tum vñq̄ lauatiōes in balneo his sunt aptissimæ, Nā & dolorem statim sedant, & fluxionem quæ ad oculos fertur, sistūt, maxima quidem eius parte inter laudandum per totum corpus excreta, reliquo verō contemperato. At diffētionem quæ ex repletionē pvenit partis, missione sanguinis, & alui desēctione, & infernarum partium fricōne, curare convenit. Quod si necessitas aliquando vrgeat, etiā ligandis artibus: mox fomentis ex aqua dulci modicē calida, laboranti particulæ adhibitis. Ad humorem, vel statuosū spiritus extētionē curabimus, vacuato prius in his quoq̄ toto corpore: sed & humorum momen 80

*Lethargus quid.*

*Coronali situra esse applicanda medicamenta, quorū vñq̄ oculis ad cerebrum descendere voluerimus.*

*Capiti infusio ha fons riru illidas da ab alio.*

*Oculorum phlegmones omnes alioquin non.*

*Oculorū dolor vnde erunt cur.*

*Oculorum mori curatio.*

*Oculorū infusio materiam quendam & cur habet necesse est.*

*Oculorū diffētionem à plenitudine curatio.*

*Oculorum à statuositate subp̄tina eretico, inferno curatio.*

to averso deorsum. Mox localib. remedijs vten-  
dum: nō tamē medicamētis iis quæ repercutiūt,  
ac reprimant, sed potius iis quæ discutit. Igitur  
fœno græci decoctū us infundendū est: quod o-  
mniū maximē sine offēsa digeratur. Verūm rē  
reliquos morbos, tū phlegmonas, sicubi curas,  
nullo evaporatē auxilio prius fidenter vteris, q̄  
totū corpus, aut pars quæ excrementū transmi-  
nit, vacuetur, aut cōtrariis alitē alteretur, si  
aliquā intemperantiā sortiat, quæ ipsius flu-  
xionis existat causa. Sic. n. diurnas oculorū fla-  
xiones curamus, oculis ipsa dimittis, atq; ad ca-  
pitā custodiā cōverti. Plurimum aut vel frigida  
intemperies caput vniat, vel humidā: nec dubiū  
est, quin etiam amb. congregiantur. Rariores  
sunt, quæ propter calorem, acrem oculis fluxionē  
immittunt. In quibus oleo crudo, & Hisp. ano, &  
rosaceo, vti expedit. tum frequē ex aqua dulci  
in balneo lauante. Quod si arteriz, venæz  
quæ iuxta oculos sunt, imbecilliores sint reddi-  
tæ, adeo vt aliorū vasorū supervacua recipiant,  
aliqua earū parte excisa, aut etiā totē abvnde al-  
te præcisit, dura cicatrice quod intēter interpi-  
ciemus. Ceterū in reconditis vasīs hoc fieri ne-  
quit, ac proinde corū vitia xgrē curantē re-  
cipiunt. Vasa verō cōspicua, vel absq; chirurgia li-  
cet corroborare, illius medicamētis quæ robor  
infert. Est & quiddā calidus sanguis, ac vasorū  
plenus, ad caput ascendat, ac maximē in arte-  
riis redundat. Cui vitio saluberrimum est reme-  
diū, vt ex inciditur arteriz, quæ circa caput & ca-  
lidiore apparent, & maiorē exhibent pulsū.

Quæcūq; verō & paræ, & prope cutem resi-  
dent, harum vel si partem aliquā excideris, vel si  
facere in varicibus crurū solemus, aptius erit.  
Quod si inter nudandū appareat tibi vas ma-  
gnū, aut magnū exlubere pulsum, tunus fuerit  
vinculo id prius excipere, mox qd in medio est,  
præcidere. Sūto aut eiusmodi vascula ex mate-  
ria aliqua minimē putrescibili, potissimū si iux-  
ta arteriz sint excipienda. Etenim quæ caro in abscis-  
s vasorū parib. coalescit, ex. p. opereculo est, atq; i-  
psorū oscula cludit. Quod quidē vbi factū iam  
cerimus, decidere tunc tutō vincula possunt.  
Ac sic etiam varices curamus, quæ dilatate sunt  
venæ, potissimū circa crura & testiculos.

## GALENI PERGAMENTI

de methodo medendi, lib. XIII.

**H**AUD lōgē verō abest à phlegmone alius  
morbus erysipelas dictus: qui quidem  
ex succo bilioso ortus, tumore calorem-  
que cū illa sortitur cōmunē. Dissident inter se  
tamē affectus n. primū maximē colore. Quā-  
doquidē si is ruber sit, vitū vocat phlegmone.  
Sin pallidus, fluxivus, vel ex pallido flauoq; co-  
lore mistus, erysipelas. Præterea pulsatio est ma-  
gis phlegmonis propriū symptomā: quippe  
qui copioso sanguine in aliquā particulā prosū-  
bente, oīta, alitē magis in corpus dimittitur: ini-  
brig dolore pulsatiū, cum tensione & renū ex-  
citat. Erysipelas verō in cute potius consistit, ob  
tenuitatē ipsius pallide bilis. Ac corpore quidē  
p. naturæ modo se habente, amaræ bilis succus  
exhalat insensibiliter. Vbi verō is vel longē co-

piofior, vel crassior, q̄ pro modo naturæ, reddi-  
tus, vniuersus ad cutem cōpulsus fuerit, eam tū  
perurit, tum in tumore anollit, aliquid etiā tub-  
iectæ partis occupans. Hic itaq; affectus erysi-  
pelas nuncupatur. Qui quidē interdū cum exvle-  
ratione iuxta cūculū accidit, vbi sollicit bi-  
lis ipsa crassior simul atq; acior existit, interidū  
aut sine hac incidit. Vbi verō nec planē biliosa,  
nec sanguinea fluxio est, sed ex ambab. cōflata:  
vitiq; ad eo qd in miscella experat, nomē tumo-  
ri indatur, dicatūq; de eo id qd præpollit, sic vt  
vel phlegmonē erysipelatosam affectum ipsū  
vocemus, vel erysipelas phlegmonosum. Ceterū  
vbi neutriū vincit, ibi vitū phlegmonis e-  
rysipelatosq; mediū vocetur. Ergo omniū, q̄  
præter naturā cōsistunt tumoribus, cōmunis in-  
dicatio vacuatio est: quæ nimirū admiñistrā du-  
pliciter: vna repellentiū ad alias partes, altera p.  
halitū digerentiū. At quonid erysipelas nō quan-  
titate modo affligit, sed etiā ob vehementē inflā-  
mationē qualitate ipsa cruciat, sequit a mpleo-  
rem refrigerationē q̄ phlegmone. Cauendū ta-  
mē est interim, ne in principē aliquid membrū  
ipsam bilē repellas. Ac p. inde, quemadmodum  
in phlegmonis curatione, post totū scorporis  
vacuatiōnem auxilij repellentib. vniur, sic fa-  
cies in erysipelate sed. p. sanguinis nūsiq; me-  
dicamento qd bilē trahat purgā, ipsam verō af-  
fligat partē refrigeras. Cuius sanē refrigeratio

ius terminus est, ipsa coloris mutatio. Etenim  
qd purum erysipelas est, illam cum hoc cōque-  
scit. Quod nō purū, sed quodāmodo phlegmo-  
nodes, si pusculum refrigeras, huiusdā cutem præ-  
fert: nignitq; magis. Quā ob rem sanus fue-  
rit, vbi laboris particulā alteratū colorē vide-  
at, t refrigerant. Astringentib; qd cōtraria  
rāsire, prius q̄ vel liuida vel nigra prorsus fiat.  
Refrigerat porro, solanū: sempvivū, portulaca,  
ymblicus, veneris, psyllium, altercum, lactuca,  
intybum, palustris lenticula, cerata ex aqua ad-  
modum frigida, & alia id genus. Vbi verō inflā-  
tio xgrorans membri iam desit, cataplasma illi  
li. prius quā liceat, ex hordei farina imponen-  
dū. Quod si liuor iam occupat, id incisā prius  
cute imponatur, perfundendūq; locus pluriū  
quidē ex aqua calida. Sed & marina aqua, & mu-  
ria cōducit interim. Quonē ip̄ cataplasmati  
etiā modi aqua, vel aceti, vel oxalae miscetur.  
Nullum autem valenter calfacientium est mede-  
la erysipelana, prius qd quod mutatur, desinat  
esse quod antea fuerat, atq; alterū iam, illiq; con-  
trariū eualerit. Interdū etiā erysipelas miscetur  
cedemati, dicitūq; erysipelas cedematosum: quē  
admodum vbi ex amiaz refrigeratione darū ne-  
getely solubile est redditū, erysipelas scirrhusosum  
vocabitur. Quod igitur ad curatiōē pertinet,  
potissimū contra exuperans est pugnandum,  
non neglectā intem. alius indicatione. Sic  
vbi autē ex biliosa fluxione erysipelas, ita ex pi-  
tuita constat cedemata, existens laxus quidam tu-  
mor & indolens. Qui quidē in aq; inter cūm  
dispositionibus, nec non in phluso, solet etiā pe-  
des affligere. In illis tamen affectibus, quum ta-  
lis tumor symptomata sit, nullam seorsum p. p. p.  
curationem requirit. Nam sanus erit tunc perfici-  
care

Vasograti deca-  
tham oculorum  
in oculis dicitur.  
Dignitibus ut  
dicitur priusq;  
vniuerso corpo-  
ri, aut parti  
qua excrementum  
transmisit,  
vniuerso fuit  
ut.

Oculi vasa ad  
sanguinem præci-  
dida tunc effu-  
di vniuerso cor-  
pori, aut parti  
qua excrementum  
transmisit, vni-  
uerso fuit ut.

Vasa emittenda  
nata.

Varici quæ ra-  
tione curantur.

Erysipelas va-  
de p. p. p.  
Erysipelas p. p.  
modo à phleg-  
mone differat.

Phlegmonis ge-  
neratio ex sym-  
ptomata.

Erysipelas p. p.

Phlegmonis ery-  
sipelatosi  
Erysipelas phle-  
gmonosum.

Erysipelas in  
tumoribus præ-  
ter naturā, du-  
plex.

Erysipelas in-  
crassus.

Erysipelas in-  
frigerandi reme-  
dia sunt ipsa sola  
ut vniuerso.

Erysipelas in-  
frigerandi reme-  
dia sunt ipsa sola  
ut vniuerso.

Erysipelas ede-  
matosum vnde  
accidit.

Ordemā dī ho-  
mor lacerat et in-  
dolens, ortus à  
pituita.  
Ordemā dī co-  
rario.

care crura, aliis oxyrhodino, aliis oleo cū sale, aut etiam oxyrhodino sal habente. At si ex pituitu humore in particulam insinuat edema cōstitit, abvnde aliquid sanefacti spongia recēs, porabili oxytrato madidata. Deligare verō ipsam debes, ab inferiore parte incipies, ac supradefinies. Si recentis copia non sit, antiquam detergebis, expurgabisq. nitro, aphronitro, et aqua lixiva. Quod si sic edema non subsidat, ubi rursus deligabis, pusillū aliqd aluminis cōiicies, ac novam spongiā admovebis: aut etiā ellychnion molle, madēsq. ex posca, qut aluminis nōnihil receperit. Si aut arctatio mediocrit, veluti in ossis fractura. Ac primum quidē fasciō iniectiones, q̄ sollicit infernē incipit, magis arctanda: q̄ deinceps sunt, sensim remittēdē. Idonēū etiā medicamentū ad hæc est glauciū ipsū, liquidum in posca: nostrūq. medicamē, qd ex eo cōficitur: qdip nō edematā modō, verū multo etiā magis tū erysipelata, tū phlegmonas incipientes sanat, ac potissimū calidas. Porro scirrhusis affectibus (q̄ a glunno sis, aut crasis, aut vtriusq. rationis particulis humorib. trahūt ortū) nullū vehementer exalefactis, siccativē medicamentum est aptū. Nam qut evasimodi sunt, digerūt quidē subritū: quod verō reliquū est, multo magis impingūt. Quæ ratione et etiā calculi gignuntur in renibus, asio scilicet in his crasso glutinosoq. succo.

Quare ea tantū sunt admovenda tumorib. induratis, q̄ mollitudo digerere possunt: cuiusmodi sunt, iā curata medulla, rum vitulina, tū seuū hircinū, taurinū, & leoninū. Ad hæc, ammoniacum thymia, & bdellū vtrumq. sicuti etiā styraz. Sed ex his, humētiora sunt preferēda. His igitur amētus indicant omnib. etiā cōplicatis affectibus sanare poteris. Ceterū si tendones & ligamenta indurata fuerint, aliqd incidentiū emollientib. admiscere oportet: cuiusmodi vel in primis acētū est. Equidem pyritē lapidē, aut molarē, sed candentē, in aceto quamacerrimo extinguerē folio: deū scirrhosum ligamentū, vel tendonem exponere, vt calētē vaporem excipiat, in eōq. dimoveatur. Postea verō medicamen qd emolliat impono, oleoq. aliquo tenui, a principio curationis, particulā laborantē p. fundo. Itaque curatio q̄ per acētū administratur, vniū est vino iam a dulso: & quū præparata iam sub mollioribus pars fuerit. Ad ligamenta utrem & tendones, nec sepe, nec inter initia, nec longo tēpore, medicamētū quæ ex aceto componuntur v. tendum est: quamvis in liene & carnosus musculi partibus tūta eius sit visus. Ac ammoniacum quidem thymia, huiusmodi quæ aceto, ad lūi scilicet crassitudinem, complures lēni imponant: idq. solum in curandi sepe fuit asiat. Induratis etiam musculis, ubi emolliti per alia medicamēta iam fuerint, ammoniacum aceto liquidum maximū vsum præstat. Sufficit autē aceto vno altero die vfos, rursus ad emolliētia reverti. Ego verō medio tēpore cataplasma ex althea flos vsum. Cuius ratio dū sēno anserino, aut gallinaceo, aut suillo liquata, salutare ad emolliēdos scirrhos medicamē existit. Sylvestris quoq. malus, q̄ passim nascitur, folia, cum supradictorū aliquo rursus proficiunt. Meliora tū crudis sunt, quæ modicē ante

sunt cocta. Variatur itaq. curationis motus pro differentia particularū. Quippe laborantib. p. cordis edematē, nemo ex posca frigidam applicuerit spongiā: nec absynthiū oleo incoquēs, genu quisquam perfudit. Atriocnori agrotanti & lieni, cum maximā vitalitate adhibetur. Vocaligitur scirrhus impresentiarū tumor durus & indolens, nō tū omnino absq. sensu. Talis. n. nō est fabulis. Reliqui qd, sicuti gignis sensum ipsam partē affectam reddūt, ita oīno insensibilē nō est scilicet: vtiq. si sensus sit natura. Ligamēta nūq. scimus insensilia esse. Sed iā ad inflammationes nos cōvertamus, q̄ qd ex flammoso spiritu in aliqua cauitate collecto oriūtur. Dissert aut inflatio ab edemate, q̄ ille tumor sit laxus & dignus cedēs, vtpote a putra exortus: inflatio aut maxime teuratur tangēt, sonitusq. veluti tympanū reddat. Scopus autem omnium inflationū communis est, vt quod præter naturam est, vacuetur, ita

10 quocunq. id cōtineatur: prius verō, vt tenuissimis & calidis potestate medicamentis. Atque in ventriculo quidem, instatq. visceribus, oleum quod tenuum sit partium, quodq. rursū habeat incoctū, aut semen cumini, aut apī, aut petroselinū, id præstat. Aliquid verō & cucurbita magna b. rēve sine incisione medio ventri affixa. At in artubus & musculari, qui sub cute, aut etiā membranis quæ ossa vestiunt, sunt, inflationē orta, si citra dolorem sit, lixivium noua spongia exceptum, abvnde fuerit. Sin dolor quoque vigeat, vnguenta pars est oleo, quod relaxandi remittendiq. vim habeat. Muskuli verō simul & inflati & dolentes ob contrusionem, satius est, vt in principio sapa cū vino & aceti paulillo, medio crig. olei portione, omnibus vni modicē calfactis, at plena succida exceptis, foueātur. Quod si succida facultas nō sit, ipsius cōtūpnū iniiciēdus

supradictū muscelle est. Ceratū etiam qd ex sypo cōponitur, ad idē non idoneū fuerit. Debent enim contrū musculi leniri medicamento, cui mista facultas sit, quæ simul cohaereat, digerat, & modicē asstringat. Quin quodē si nihil astrictionis sortitur, auget aliquid phlegmonas, præcipuē in his corporibus, q̄ sunt plethorici. Igit si dolor vehemēs vigeat, mitigatiua magis medēdi ratione vtiēis. Sin vero ille abūt, maiori vi cōtra inflationē instabis, p. valētiōra medicamenta: cuiusmodi sunt lixiviū, acētū, & post hæc, vinū. Quærit ergo de mitigādo non laboras, illorū plus in misuram cōiicies. Rursus ubi repellere stiles, vini nigri, iustissiq. plus quam ipsorū, immites. Ad si digerere malis, lixiua plio indes. Acenem verō si his miscebis, ad ambo erit vniū: propterea quod mistar habet facultates. Quod si muscularis, prius sine dolore sit, licet in lixiū penuria, pro illo aphrotitūrah immittere, idq. minime lapidosum, sed sponsum magis. Inflationes aut inueteratas, primū quidē aliquo ex his q̄ ex lixiū consistant, fouebis. Secundo verō strigēsque gymnasiōrum seruefactis, & molaris, pollemē calis viue inpergiro, vsq. ad vrasitudinem hui, ac tandem cataplasma id affe

ctū sed admoveo. Salutare etiā his medicamen est, qd ex sycōmoro conficitur. Ea & aliæ inflationis affectus, priapismus dicitur: quo detritis,

40 cui mista facultas sit, quæ simul cohaereat, digerat, & modicē asstringat. Quin quodē si nihil astrictionis sortitur, auget aliquid phlegmonas, præcipuē in his corporibus, q̄ sunt plethorici. Igit si dolor vehemēs vigeat, mitigatiua magis medēdi ratione vtiēis. Sin vero ille abūt, maiori vi cōtra inflationē instabis, p. valētiōra medicamenta: cuiusmodi sunt lixiviū, acētū, & post hæc, vinū. Quærit ergo de mitigādo non laboras, illorū plus in misuram cōiicies. Rursus ubi repellere stiles, vini nigri, iustissiq. plus quam ipsorū, immites. Ad si digerere malis, lixiua plio indes. Acenem verō si his miscebis, ad ambo erit vniū: propterea quod mistar habet facultates. Quod si muscularis, prius sine dolore sit, licet in lixiū penuria, pro illo aphrotitūrah immittere, idq. minime lapidosum, sed sponsum magis. Inflationes aut inueteratas, primū quidē aliquo ex his q̄ ex lixiū consistant, fouebis. Secundo verō strigēsque gymnasiōrum seruefactis, & molaris, pollemē calis viue inpergiro, vsq. ad vrasitudinem hui, ac tandem cataplasma id affe

ctū sed admoveo. Salutare etiā his medicamen est, qd ex sycōmoro conficitur. Ea & aliæ inflationis affectus, priapismus dicitur: quo detritis,

50 cui mista facultas sit, quæ simul cohaereat, digerat, & modicē asstringat. Quin quodē si nihil astrictionis sortitur, auget aliquid phlegmonas, præcipuē in his corporibus, q̄ sunt plethorici. Igit si dolor vehemēs vigeat, mitigatiua magis medēdi ratione vtiēis. Sin vero ille abūt, maiori vi cōtra inflationē instabis, p. valētiōra medicamenta: cuiusmodi sunt lixiviū, acētū, & post hæc, vinū. Quærit ergo de mitigādo non laboras, illorū plus in misuram cōiicies. Rursus ubi repellere stiles, vini nigri, iustissiq. plus quam ipsorū, immites. Ad si digerere malis, lixiua plio indes. Acenem verō si his miscebis, ad ambo erit vniū: propterea quod mistar habet facultates. Quod si muscularis, prius sine dolore sit, licet in lixiū penuria, pro illo aphrotitūrah immittere, idq. minime lapidosum, sed sponsum magis. Inflationes aut inueteratas, primū quidē aliquo ex his q̄ ex lixiū consistant, fouebis. Secundo verō strigēsque gymnasiōrum seruefactis, & molaris, pollemē calis viue inpergiro, vsq. ad vrasitudinem hui, ac tandem cataplasma id affe

ctū sed admoveo. Salutare etiā his medicamen est, qd ex sycōmoro conficitur. Ea & aliæ inflationis affectus, priapismus dicitur: quo detritis,

Ceratū mo  
dum variat  
per differentiam  
particularum.

Scirrhus quid.

Ligamenta esse  
insensilia.

Inflatio ab ede  
mate quomodo  
differt.

Inflationē san  
ari quomodo  
differt.

Inflatio ut vi  
ferit quomodo  
differt.

Cucurbitula  
flatus dicitur  
de illi dāna.

Lixivium est  
spongia applici  
tū, extremarū  
partium flatus  
dissipat.

Infusum quæ  
sunt quæ ab  
ferant.

Oxyphy.

Cicuta musci  
li medicamen  
tū quæ nam  
esse debent.

Acetum molle  
facilitat sort  
tū.

Inflationes in  
ueteratas quæ  
ratione curāda  
sunt.

Priapismus  
quid.

Ammoniacum  
ad  
dilatandum.

Glaucium &  
dilatandum,  
admodum orbi  
plata, & pble  
gmonas sanat.  
Scirrhus non cū  
vulnere nardo  
cancria rebo  
nuer calfa  
cuma et sicat  
na.

Calculi quomo  
do generantur.

Scirrhus fuit  
admodum,  
quæ mollioribus  
digerere pos  
sunt.

Induratus tra  
duntur quæ ra  
tione oportet  
curare.

Acetū vsū quō  
do indurata cū  
fuerit.

Ammoniacum  
aceti liquatū  
liens indurata  
obdura: ut a  
liis induratis  
mollis.

Althea radice  
flos anserino lū  
quæ salutare  
ad emolliēdos  
scirrhos medica  
mentū existit.

vel inuitis, pudendum arripitur. Etenim quum  
neruus propriis colis substantiis confusus, na-  
tura cauerosus exiit, vbi halitusosus spiritus im-  
plet, eiusmodi affectu excitat. At halitusosus spi-  
ritus in animalis corpore gignitur, ex succis sen-  
sim exalfactus. In primis ergo ea vacuante vi-  
nuerum vacuandus est corpus, q̄ maxime vide-  
bitur ex visu fore agrotant. Deinde verò imponen-  
dū ipsi laboratū particulæ medicamentū est, si ea  
calidior sit effecta, q̄ ad portione caloris abv-  
dantis refrigeret. Sin aliter, inter initia quidē, o-  
mnino q̄d modicē refrigeret: postea verò id ne-  
cessum nō est. Pari modo & q̄ circa lumbos sunt  
particulæ omnes, eiusdē facultatis medicamēto  
cōprehendendæ sunt. Et reliquos vicius exhi-  
bendus, qui & flatus aduersetur, & succi. Equi-  
dem quēdam adolecentem sic affectum curauit,  
primum quidem sanguine misso: dein cerato, ita-  
cto ex insacco simplici, imbutūq̄ aqua frigida,  
puddēdo ac lūbis imposito. Simili modo & aliū,  
qui post multum sanguinem, humido medicamē-  
to, quod ex chamæmelo conficitur, est usus. Por-  
rō itis etiam nymphæ aliqui potandum exhi-  
bit, saltem in principio. Mox vitis semen: ac si  
traxerit adhuc vitum, rursū semen copiosē come-  
dendum. Est enim illud cōmune præceptū om-  
niū ferme, quoniam vitiosus succus creat, marbo-  
rum, quod in fine calfacientibus & siccābus sit  
vitendum: quippe huc, quod reliquum humoris  
est, prorsus absumunt. At verò maxime tumefa-  
ctam cuiusdam linguæ curauimus, carapoti ex  
alo, scāmonia, & colocynthide, vesperi datā, il-  
lum purgantes: lactuce autem succo ipsam lin-  
guam colluentes. Quod autem in priapismo vo-  
mutoris medicamentis potius quam subducen-  
tibus sit vitendum, in lingue vitin contrā, id ex  
partum situ indicari perspicuum est. Nam aye-  
rionis in contrarium, non a substantia, sed a cu-  
randi membri potius, in vicio præstat. Porro  
ex humorib. rubens quidē, lubeus humorē san-  
guineum indicat: si vti flauus & pallidus, per-  
nisiū ipsū bilem. Subalbidus verò & laxus, pitui-  
tam. Sunt & alij tumores fusi, luidive, tactui  
admodū remittentes. Quod si membrū fortitur  
evidētiore venas, exaltatas eas iuxta hosce tu-  
mores a crasso & nigro re, quod immodō sangui-  
ne, videre licet. Qui humor, vbi incaluit impē-  
sius, aut propter putredinem, aut febrem phleg-  
monodē, negram efficit bilem, quam ne mites  
quidem ipsi gustauerint. Terra quoniam ea radi-  
tur: ac partes que raduntur, omnes attolluntur  
in altum: vocaturiq̄ is affectus tum feruor, tum  
fermetatio. Est namque in humor talis, quale esse  
acerum docuimus: in vomitibusq̄ nō ra-  
rō percipitur acidus: vt amarus, qui pallida dicitur  
bilis. Que igitur verē dicitur atra bilis, atrā  
certē est, atque terram fermetatā, omnīq̄ ani-  
manti inuicunda. Que verò vit talis sit est apta,  
ea dicitur melancholicus humor, vel nigra etia  
bilis: ita tamen vt distinguatur ab altera que ex  
assatione nntur. De nominibus tamen anxia di-  
scertatione neglecta, nonnulli præter naturā tu-  
mores ex eiusmodi nature succo proventiū, cu-  
lumiandi est: fex in vino, & amarus in oleo. Qui  
quidē spatio temporis putrescere humore, pro-

pterea q̄ sit impactus in vase, exlicent. Atq̄ hu-  
iusmodi sūe affectū cōmuniter omnes cancrū  
appellant. Quod vinum, petinde vt reliqua om-  
nia, plurimū habet in maiors minorisq̄ ratio-  
ne e differētiā. Igitur cōmunis cancrū curatio, est  
melancholicū succū vacuare. Mox, phibito, ne  
de cetero talis humor colligatur in venis: parti-  
culæq̄, ne amplius redundantē succū recipiat,  
corroboratio. Soluimus autē melancholicū suc-  
cum, dracumis quaternis epithymi, in sero la-  
cto, aut mulla exhibitū: aut propinare medica-  
mēto nostro, q̄d ex duob. & triginta simplicibus  
cōstat. Post purgationē, dictū iam de omnib. e-  
iusmodi affectib. est, q̄ vel repellere humorē q̄  
in membrū ꝑcubuit oportet, vel ipsū digere:  
re: præterea q̄ in principio quidem iam in ipsū  
purgationis tempore, q̄ ante id, repellere: vbi  
iam totum corpus ex aquis purgationis, digere-  
re. Vbi tamē mediocri tantum purgatio præces-  
sit, misū esse q̄ applicabitur pharmaci, ex rep-  
pellente digerentiq̄ facultate cōuenit. Cæterū  
ad discutendos cancores, mediocriū vinū medi-  
camentis est opus, quæ nec ꝑpter imbecillitatē  
vincitur, nec ꝑpter effectus vehementiā, ipsū  
sanguinē crassent. Quia verò ipsius vini ma-  
gnitas, ab his que mordēt irritatur, & efficitur:  
ob id vitū nō modō mediocriā vitibus, sed etiā  
minimē qualitate mordēna, eiusmodi affectib.  
sunt idonea: materia quorū, ex vltis elingit me-  
tallū desumetur. Quippe quæ medicamēta ex  
his cōponunt, ad sanandos incipientes cancores,  
magnū vim obtinent. Maiores verò si fuerint, si  
his prohibetur augeri. Cæterū si quidē can-  
cerum per chirurgiū curare audebis, capille quē-  
dam ab evacuandō purgationē melancholicū  
humore oportebit. Vbi verò q̄d viciatū est, totū  
prorsus exoderis, sic vt nulla super sit radix, si-  
nes effluere sanguinē: nec ꝑpter eum inhierebi-  
tū: imo premo potius que circū sunt, venas,  
exprimis ex his crassiorē sanguinē: mox alius vi-  
cerib. similiter curabis. Est aliud vitū, carbonu-  
lū appellatur, q̄d ex humore crasso feruentēq̄  
apertū: incipit hoc plerūq̄ a pustula: aliquando  
verō & sine hac. Cæterū inter imina, quib. hoc  
instat, scabēt omnino particuli. Mox omne pu-  
stula quēdā, modō cineris colorē referet, modō  
etiam nigrior: que rupta, vicus cū crasse gigni-  
tur. Omnis præterea his circūposita caro, in  
summā pervenit inflammationē: colore, magis  
q̄ phlegmone, nigricat. Necessariū autē sic esse  
est: febriat: quare ab incisa vena incipienda  
ratio est, detrahendūq̄ sanguinē ad animā vitē de-  
liquū. nū aliud aliq̄d obstat. Imponi verò si-  
bi ægra particula, quod ad humorū inflamma-  
tionem spectat, refrigerantia desiderat: ꝑpter  
crassitudinē tamē humoris, atq̄ etiā maliniā,  
nec fluxionē avertere vaquū poteris: & si quan-  
do id feceris, aliud quippē, q̄d in alio sit corpo-  
re, offendes. Atqui nec assidue est permittendus  
est. Quin potius inquirēda remedia sunt, quæ cū  
modicē reprimendo: etiā digerere possint. Tale  
plectū est tum cataplasma quod ex planagine  
conficitur, tum quod ex cocta lente: scilicet mi-  
scētibus nobis his tenerā micam panis, & mi-  
scellāci, & in clubano coctū. Etenim panis omni-  
no

Halitusosus spi-  
ritus gignitur  
ex succis insim  
exalfactis.  
Præcipuus cura  
tis.

Nymphæ.  
Vitis semen.  
Ratis semen.

Lingua maiori  
mā tumefacta  
que ratiq̄ co-  
rari Galien.

Ayersio est me-  
lancholia in vici-  
tatem.  
Color tumore  
humorem a quo  
est atris dicta-  
tal.

Atra bilis gne-  
rat, et feruor  
est.

Permettatio  
quid.

Melancholicus  
succus.

Cancer genus  
est.

Cancer curatio

Melancholicū  
succum purgan-  
tia.

Melancholia medi-  
camentis san-  
da incipientibus  
canceris idonea.  
Cancer per chi-  
rurgū curari.

Carbonu-  
lū de  
serpente.

Carbonu-  
lū est febris  
reperi-  
tur.  
Carbonu-  
lū est  
talis.

Carbonu-  
lū est  
cataplasma  
de  
serpente.

*Pars puri sub-  
stantia in cutis  
membra. hæret.*

no puri substantia in cutis membris hæret: est a-  
pra. Furfuraceæ autem, crassiorum est partium.  
Super ipsum verò vicius valēs aliquid imponē-  
dum est medicamētum: cuiusmodi est Andronis, Pa-  
nionis, vel Polyidri: quæquid cum vino aliquo  
dulci ad fordium crassitudinem dēbet. Quæ au-  
tem pharmaca reliquis adhiberi viceribus solēt,  
nempe quæ cōcoquant & pus moueant, ea nūc  
adhibenda nō sunt, quando ita particulæ putre-  
dine auriens. Scandicare etiam eiusmodi tu-  
mores post sanguinis misionē alienum non est.  
Sunt autē incisiones altiores mediocribus, pro-  
pter instantis humoris crassitudinem. Inflam-  
matione cessante, vicius ad cicatrice similiter re-  
liquis, est perducendum. Atq; hæc tenus de car-  
bunculis. Nunc verò de strumis disseram, quas  
choceradas Græci vocant: quæq; sunt, glandulis  
in scirruiosum affectum mutatis. Est autem du-  
plex ipsa glandularum natura. Quippe nonnul-  
læ earum in quorundam vasorum medio, didu-  
ctorum in varios ramos, ad tuendum eorum ro-  
bur, sunt constitutæ: quarum haud magnus usus  
animantibus est. Aliæ verò ad excipiendam sali-  
uam, vel lac, vel semen, vel aliquem humorē a-  
lium gignendum, sunt fabricatæ. Atq; harum  
sane maior est usus: nec aliter sanandæ sunt, si cō-  
traxerint scirrbum, quā cæteræ omnes corpo-  
ris partes. At quæ medium vasorum spaciū im-  
plent, in his alia curationis indicatio præstat, qua  
simul cum vino etiam pars ipsa tollitur: idq; du-  
pliciter, vel excisione, vel medicamēto quod pu-  
trefaciat. Sed tempestivum mihi iam est, ut nōni-  
hil de abscessu etiam dicam: cuius duplex est ge-  
nus. Vnum, quem phlegmone in pus versa, pus  
ipsum tanquam in aliquo est situ collectū. Alter-  
rum, quod nulla præcedente phlegmone, humor  
aliquis acris, siq; aliis specie aliis, statim ab in-  
itio in aliqua parte colligitur, circūposita corpo-  
ra excorians. Frequentissimæ vero huius morbi  
sunt tria genera: nempe atheroma, sitaroma, &  
meliceria: a similitudine contentarum in tumo-  
ribus substantiarum, sic appellata. Est etiam aliud  
eorum veluti seuum, aliud veluti mel, aliud pul-  
ticulæ, quam atheram vocant, simile. Curationis  
ipsorum indicationes sunt communes: nem-  
pe id quod continetur, vel digerere, vel totū pu-  
tre reddere, vel excidere. Aliqui igitur eiusmodi  
tumorum triplicem curationis rationem admittunt,  
quoque or scilicet ex tenuiore humore con-  
stant, vel meliceris. Aliqui duplicem tantum, ve-  
lut atheroma: quippe quod tum excidere, tum  
putrefacere licet. Sitaroma verò, sola manu o-  
pera curatur, quem nec putrefieri possit, nec di-  
geri. In his porro abscessibus, qui in alio corpo-  
re distent, ac potissimum in visceribus, me-  
dicamenta quæ ex aromatis componuntur, ma-  
ximè sunt ex usu: vt potè quorum vis collectum  
humorem tum in halitū resoluat, tum digerat.  
Theriace etiam, Arthanasia, Ambrosia, medica-  
mētaque nostrum, ex Græcia calamintia conse-  
ctum, vniç commendantur. Quicunq; igitur  
ex tumoribus toto genere existunt præter natu-  
ram, si sui ablatione indignant: vt, exempli gra-  
tia, myrmecia, acrochordon, calculus in vetrica,  
hypochyma, & mola in vtero, hoc est, caro que-

dam informis. Siquidē omnia eiusmodi summo  
uere in totum cōtendimus. Quorū verò enā lo-  
cus ipse affectus vna quæpiam naturalis est par-  
tium, prima indicatio est, vt affectus sanetur. Se-  
cunda ab hac, si is insanabilis sit, vt vna cum vi-  
tæ pars quoq; ipsa excidatur: sicut in cancro, et  
viceribus omnibus, quæ curationē resistunt. E cō-  
trario verò in suffusione, qd hypochyma vocat,  
victi in prima indicatione, ad alium eam locū,  
q; minores sit momenti, trāsferimus. Non desunt  
tamē, qui hanc quoq; evacuare cōtētur. Iam ve-  
rò humor q; in hydrocele vultur, alienus à cor-  
poris substantia, tota natura est: sicut enim quæ  
in ascitis hydrosp. cōtinetur aqua. Quarā cer-  
tè vacuacionē vel medicamētis quæ digerēt, mo-  
limur, vel chirurgiā: in hydrocele quidē, immis-  
sio siphone: in ascite verò, punctiōne adhibita.  
Quem admodum autē in his quæ antè cōprehēn-  
sa sunt, cum affectu ipsi exciditur etiam affecta  
pars, sic & in herniosis aliqui peritonæci. Par-  
modo & columella aliquando vna cum vitio am-  
putatur: undem in crurib. & in testiculis vni cum  
varicibus ipsi veng. Ad hæc tunc in naso cum  
polypo, & foratus dens cum foramine. Verū  
ex his nullum est, qd ad naturālē habitum redu-  
ci possit. In collumella verò id omnino est cōn-  
dum: nec propterandū ad eam excidendam, sed  
quando ad lori videtur tenuitatē redacta, tunc  
auferenda est. Similiter & excrescentias carnis  
reducere ad medicinam oportet. Danda autē  
in hiscē semper opera est, vt tum breui tempore,  
tum citra dolorē, tum quam tutissimè cures. Ve-  
rū vt toto cures, tribus sis intentus oportet.  
Vnum primū est, vt omnino abolitiōne ope-  
ris cōsequaris. Alterum, vt si vbi hanc nō conse-  
quaris, saltem faciant non lædas. Tertium, vt  
vitium nō subito revertatur. Ex horū autem cum  
sideratione facili cognitu est, quando ipsius cli-  
rurgis, & quando medicamentosa cura pugnan-  
dum sit. At chirurgiæ quidem studium, in his præ-  
sertim quæ nunc sunt propolita, ad interemptio-  
nem eorum festinat. Quod verò ex medicamen-  
tis petitur, primū hac tendit, vt quod præter na-  
turā est, tum vacuet, tum digeratur: aut si per mem-  
bra naturam, aut rebellione vitū non licet, vt id  
tum in pus vertatur, tum putrefaciatur. Similem  
curationē desiderant iis quæ cōpedita sunt, etiā  
ea quæ iis numero & magnitudine conueniēte  
naturæ modum excedunt, quæ iis in ambobus  
deficiūt. In quibus amputare quidem cōueniet  
quod magnitudine redundat vel numero: resi-  
cere autem & fingere, quod deest, vbi videlicet  
fieri id licet. Quantum namq; digritum non licet  
medico gignere, sed vnius naturæ opus sunt om-  
nia talia. Vt autem a prodigiōse corpulentie cu-  
ratione auspicemur, si quis adeo obesus existat,  
vt nec incedere, nec respirare possit, ei calidior  
ficciorq; temperies (quidquidē hęc corpus exi-  
le reddit) est procuranda: adhibitis nimirū acutis  
exercitationibus, tenuitate victus, & id genus me-  
dicamentis, ac deniq; cogitationib. animi. Porro  
quæ ad articularia vna medicamēta adhibent,  
quæ scilicet valentē incidendi facultatē habent,  
iis tu quoq; valēt nimirū obestatem curabis, viti-  
tor. Sunt autē talia, rutæ sylvestris semen, aristo-

*Hypochyma  
transpositum.*

*Hydrocele cu-  
ratio.  
Alycia curatio.*

*Partes, quæ vna  
cū affectu am-  
putantur.*

*Columella quæ  
distendit.*

*Medici danda  
operam esse vt  
 cito cura do-  
loris ex qua-  
ntissimè curat.*

*Chirurgia sto-  
dium.*

*Natura opera  
qua.  
Obestati cura  
ha.*

*Extrinsici cor-  
poribus, vti lig-  
articulari ali-  
moda medica-  
mēta quæ sui.*



Sal Theriacum  
est cunctis corpo-  
ra.

Obesum iuvare  
qua vicia ex  
medicina ratio-  
ne extenuari  
Galenus.

Vina extenuan-  
da corpori apta  
qua sunt.  
Extenuata cor-  
pora reficiendi  
ratio.

Picatio macie-  
tu combuit.

Profluvium ter-  
minandum, cum  
reficere est an-  
nus, sit tunc  
parva.

Cappari ex ery-  
sipelate ceteris ab-  
strahit, tunc  
medicina ratio-  
ne.

Thapsia sangui-  
ni attrahit ad  
partem quibus  
est applicata.  
Propagatio refici-  
di ratio.

chia rotunda, minus cenaurii, gentiana, & po-  
lium. Præterea ex vitiis cunctibus, ea quæ pollen-  
tes habent vires, ut petroselinū. Sed & sal quod  
ex cōbussis sit viperis, potenter etiam extenuat.  
Ego verò iuvenē quēdā quadragenariū, oppri-  
do quod obesum percuravi, vius tum antidoto, quæ  
adversus articulares vitia est cōposita: tum sale  
rhetico, ipsiusque fluorice, ac reliquo extenuante  
victu, & per exercitationem, cursu veloci. Præpara-  
vi tamē hominē ad cursum, perfricādo primum  
lintheis asperis, quoad cutis ruberet: dein statim  
cū oleo, quod in se digerēs aliquod medicamentū  
habebat: qualia sunt sylvestris cucurbitæ radix,  
althea, gentiana, aristolochia, panacis radix, po-  
lium, atque cenauriū. Per hyemē aut etiam a bal-  
neo revivisse hominē iam dicto oleo profue-  
rit. Verū cibum exhibere non statim a balneo,  
sed interposito somno, expedit. Quod si velit  
refici etiam ante cibū lauari, permittes. Magis  
etiā ad rem pertinēbit, si aquæ ipsi digerēdi facul-  
tas, aut infusa, aut etiā acquisita inhiat. Verissimi-  
le aut est, aliquod ex multis simul obito moris,  
febri hominē corripit: quæ tamē ad rem, oppositā  
necutiū erit aliena, vitiū si medicus recte omnia  
pегent. Sanē fugere in obesum curādis cōveniet  
vina quæ multum nutriūt, cuius generis crassa  
sunt: vti verò, vel aquosius, id est, colore albis, &  
satisfactis tenuissimæ, vel quibus aqua marina sit mi-  
sta. At vbi eos qui extenuari sunt, reficere in ani-  
mo est, his vinū exhibebimus crassum, cibū verò  
quod succū efficiat crassum, exercitationes paucas,  
frictionē mediocrē, ac brevitē omnia iam com-  
prehensibilia cōtraria moliemur. His verò etiā pica-  
ri est cōmodum, id est, trib. aut quatuor diebus.  
Hoc quippe ad carnis generationē optimum est  
præsidium, quum humectet & calfaciat, sanguinis  
multitudine accret. Ergo nec assidue picari cor-  
pus ægrotantis oportet, nec quā oportet, sepe illi-  
nere: verū in hieme bis, in æstate semel id fecit  
se est satis. Itaque quibusque particulis bonā ha-  
bitudinē reddere cupimus, ias & fricare, & per-  
fundere, & percutere, & picare oportebit, tantis-  
per dum intumescit. Hoc vbi factum est, pinus  
desistere cōvenit, prius quod digeri ceperint, Ete-  
nim quæ calfaciūt omnia, sicuti attrahere, sic sunt et-  
iam digerere apta. Iam verò quibus totum cor-  
pus est extenuatū, iis lauari quoque post cibū est  
cōgruum: quanquam timendum sic est, ne iecur  
eis obstruatur, potissimū propter ciborum spe-  
ciem: quum nimirum aliter quoque obstruere so-  
leant, quæ succū crassum gignūt, si quis his libe-  
ralius utatur. Incidit etiam ex tali victu diutius  
exhibito, calculi in renib. generatio. Quod si is  
qui dicto modo cibatur, grautatis sensum in de-  
xtris præcordiis aut circa lumbos percipiat, protinus  
cappari ex oxymelite in principio cibationis  
donec cōsistat grautatis, dabit. At mēbra verò  
quæ ægrè reficiēbant, ac plussculū iam refrigerata  
erāt, vtiū aliquotid & thapsia sum, aliis ea ex  
melle membrū illinēs, aliis etiam ex cerā. Si-  
quidē attrahit ea quoque partibus quibus super-  
posita fuerit, sanguinis copiam. Quibus autem e-  
xiguam aliquid pudenti præpuro de naturali  
deest quasitate, iis nō raro sola reitione debi-  
tum modum restitui, membranulā mollem, fir-

māg\* ex charta, cuti gummi illitæ extrinsecus  
circūvoluens. Ex interna tamen parte præputio  
ipsi rotundū aliquid ac medicosæ, aut ex plūbo,  
aut ex charta, velvni fulcrū, supponi prius oport-  
ebit: quod videlicet, postquod agglutnata membra-  
nula fuerit, facillē eximas. Porro immunitio præ-  
putij, duplici chirurgie rationi subiacet: interim  
superina pudenti parte circulo incisa cure, quod vi-  
delicet eius vniatē soluta, eareus deorsum tra-  
hatur, quoad glandē cooperiat: interim vero scilicet  
pro ex interna parte, qua glandis iniuriū est, exco-  
riata, mox deorsum tracta, ac dein de molli vin-  
culo deligata. Similiter quod in labiis, aut nariū alas,  
aut aure deficiūt (Græci colobomata vocant) cu-  
ritur: primum quidē ex coriaria vitiūque cure: de-  
in adductis, coniunctis inter se cunū oris, quod  
vitiūque, quod callosum est, detracto: mox quæ  
reliqua sunt, assutis agglutinari. Eiusdem ge-  
neris sunt, & quas in maiori oculi angulo rheu-  
das Græci vocat: vniū vel impēius minuto, vel  
prius perduto infan angulo. At prius quidē per-  
duto eo, omnino insanabile relinquit vitiū. Mi-  
nuto verò, iis quæ modicè astringunt curat, si ra-  
men totū corpus primum ante purgaueris, dein  
caput. Sunt mediocriter astringētia medicamen-  
ta, quæ ex galieno cōponuntur, & croco, & quæ  
nardina vocant: in primis etque ex vino sunt  
cōfecta. In summa verò, quibus aliquid perit sub-  
stantiæ, maxime quidē curandū est, ut ei quā-  
simillima substituat. Si id fieri nequeat, salte al-  
iquid quod cunctis præter vitiū machinabimur, ut  
exempli gratia, producēs callum pro ossē. Por-  
ro venas sensibiles generatas aliquando vidi-  
mus: verum has, non tam similes iis quæ antea  
perierant, quæ eadē renasci dixeris, velvni in caus  
viceribus carnē. Cicatrix verò quæ in hac, calli  
modo durata, gignit, est tunc quidē est quod simili-  
ma, cutis ramē non est. Nun autē ad alia tran-  
eamus morborum genera. Serpens vlcus, quod her-  
pes dicit, eiusdē est generis cū exulcerato erysipe-  
late. Rame verò (quod sarcocele vocat) cū scir-  
rhis. Eteim herpetas biliosus præcat succus, sub  
cute hærens. Quo sit, ut eareus affectus is, eius-  
dem sit cū erysipelate generis: atque huius quoque  
magis etiā cum eo quod exulceratū est. Dissert aut  
ab erysipellate, humoris tenuitate. Est etiā admo-  
dum tenuis quod herpetē excitat. Ex eo aut quod alter  
humor altero sit tenuior, crassiorve, vicerā dis-  
ferēte, quæ ex profunditate spectantur, provē-  
niunt. Huius certē generis est, & quæ phagedæ-  
na græcè dicitur, & exulcerati cicri. Quorū om-  
nium communis curatio est, ut inhibeatur pri-  
mum humoris cōfluxus, post sanetur vlcus. Pro-  
pria verò cuiusque tum ex membri invenitur na-  
tura, tum ex humoris non solum specie, sed etiā  
quantitate. At tenuissimus quidem in eiusmodi  
humoribus est is, qui ex vicerato herpetem ex-  
citat: crassissimus, qui cancrum. Proximum ab  
his locum occupat, quod ad crassitudinem atti-  
net, qui phagedænas producit. Harum species  
quædam sunt, quæ Chironia, & Telephā di-  
cuntur. Si quis igitur, toto prius purgato corpo-  
re, mox quæ influentem humorem reprimant,  
regerantque, medicamenta utatur, iam curaverit  
herpetem. Sin neutrum horum fecerit, sed ran-

Præputi viciū  
tando depre-  
ssum chirurgi-  
ca.

Colobomata

Angulorum in  
oculis quæ mo-  
do sunt curanda

Venas sensibi-  
les generatas  
videt Galenus.  
Cicatrix ab ali-  
a vitiūque dicitur

Herpes multi-  
tis quæ cum  
erysipellate  
comparatur

Herpes ab ery-  
sipellate quomodo  
differt

Phagedæna  
Cancer ex vlcus  
est

Chironia vbi.  
Telephæna  
herpes curatio

nim ea quæ cicatrice inducunt, adhibuerit, vitæ exulceratam cuticulam sic sanant: proximè ramentum illi, quo minus exulceretur, non cōsuluerit. Postmodò verò illa quæ cicatrice inclusa, quæ ipsi continua est, exulceratur: id y longo spacio, ceu malo ipso serpente, sit, donec humor, unde oritur, sit inanitus. Vacuadus itaq; est per eiusmodi affectus semper in quodam humor, aliquod medicamentò quòd ita ut purget bilis: sepe eo quòd nigrè: modò eo quòd melle sit facultatis, quodq; simul bilem & pituita educat: veluti in milian herpete, qui nō protinus vlcus facit, quemadmodò alter: sed admodū exiguas pustulas ad speciem melle, quæ ipsa interposito spacio in vlcus etiā degerant. Ad eo non absq; ratione quibuscūq; est visum, in eiusmodi vitio bili esse aliqd pituitæ cōmixtum. Ceterum ad generationē vlcis, in his quæ extrinsecus admouentur, exasperare debent, quæ repellēds facultatē habent. Vbi verò non amplius cōsistit in agerantē particula vlnosus humor, quòd digerūt. Si quidē exigua vitiosi humoris etiā si quis ad viscera reprimat, leue damnum cōmittit. At si eius quantitas sit momentanea, in princeps aliquod membrū aliquodā p̄cumbit. Ac repellat quidē, non solum ea quæ astringūt, sed etiā quæ sine astrictione refrigerat: digerunt verò quæ calfaciunt. Porro itaq; quidē bilis vacuata est facili: pituitæ verò & nigre bilis, difficilior, quo magis purgētis medicamenti ope indigent. In herpete aut, quoniam tenuis est humor quòd ipsum creat, abvnde est etiā alia soluisse: vel vrinæ, per ea quòd modicè efficiūt, citasse. Quod verò ad acrochordonas & myrmecias curandas pertinet, nō deest Romæ quæ eas apprehensas primoribus dentib; exterat. Sed & scalprio ad myrtacel folij specie formatò, & serratō quòd scopolomachistion dicit, eas facillè quispā excidere possit. Acque verò & valere aliqua pinna circulo myrmecia impolita, ipsam eductum. Debet tū pinne fistula esse myrmecia crassitudine par, ut eam vndiq; pressus cōstringat. Quæ postea circūacta, ac si mul deorsum impulsā, celeritē ita myrmeciam rotā etiā cum ipsa radice educet. Iam verò, quæ vellemēt attrahentib; sursum myrmecia vellet, & putrefaciuntib; enecabit, ratione ab aliquo in vltimū est. Quum igitur interdum quædam partes deficient, quæ adesse debuerūt: quæ verò reddunt, quorum non erat opus: admittere quidē quòd supervacuum est, sanè haud difficile fuerit: aliud verò producere, quòd simile ei sit, quod desit, id in quibusdā quidē est facile, in quibusdā difficile, in aliis planè fieri nō potest. Si nāq; circulosam sit quòd desit, haud magno negotio id reficiat. Sin op sit, ipsum quidē restaurare nō licet, ceterum aliqd pro eo durum efficere. Diximus autē vidisse nos venas alias sensibilib; generatas. At si dignus desit, is restitui nō potest. Ceterum que in nato, vel aure, vel labio sunt curta, ea quidem vt refecisse non licet, sic decorare aliquē lris adiciere licet, si quis dulsam vtrinque cutim, mox eo in vnum conductam queat agglutinare. Porro quemadmodū in sinuosis vlcibus generatio carnis, sic in capite & palpebris productio pilorum, opus nature existit. Etenim ex succis qui per cutim transpirat, quod limosum est, id pilos

tum à principio gignit, tum de cetero veluti succrescentio nōget. Hoc igitur, quoties vel protinus perit, vel reddidit est vinosum, toties pilos corripit est necesse. Corripunt namq; & serpēs ipse duplici de causa: aliis nutritie succo defuit, aliis nō idoneo vlcē. Ac protinus quidem perdit eo qui pilos alar succo, caluitie oritur. Eodē vlnario, opthias & alopecie pveniant. In quibus & inlubere quod inhiat, & absumere & digere: quod iam occupavit languentem locum, conuenit. Ergo ceu in vlcibus illis purgationem nocēns succi primū adhibuiti, eodem modo in pilis ipsis ab hac primū exordiendi curatio est: scilicet vltimato prius cutis colore, cuius ceruus corruptos pilos. Nam si is albidior quim, p nature habitu sit, pituitosi humoris purgatione molieris: sin pallidior, eiusmodi bilis purgationem: non secus quā si nigror conspicitur, quæ nigram detrahunt bilem oseres. Quā autē iam planè purū est purgatione corpus astimas, cum qui in cute cōnnetur humorē digerentibus medicamentis discuties: sic tamen vt in his caueas, ne adeo calida, acutiū admoueat, vt cutis exulceretur. Quin et si quæ valenter siccant, cauere conuenit ne videlicet quòd vlnato humore, vnlē etiam absumas. Ego verò itis medicamentis quæ alopeciam sanant, exiguum thapsiū admiscui. Ceterum vbi vel tumefactum piluicū, vel excoriatum ex ipsius vlu, pericranium conspexi, ille quidem die à medicamento abstinere: ille autem paritē quidē, vel gulli, vel anseris liquato feuo: deinde postero die, si nihil tale apparuerat, rursus eodem medicamento sum vlu. Iam eo quibus pterire calorum pilis, similibus genere medicamentis sanabis: nequiquam tamē cōmittere, vt medicamentū intra calorem tunica cōstiat. Quare sicca longē tuiora existant. Porro pterygium, tamē si à sanitatis habitu sit alienum, non tamen substantie ratione, quemadmodū aliteroma & meliceris, à natura alienum existit. Eius verò sanatio, si quidem parum & molle sit, per ea medicamenta quæ detergent, perficitur. Vbi magnū duntaxat evasit, chirurgiam postulat. Simili ratione & aqualurum quæ magnæ sunt, chirurgia curabis. Quæ parvæ existant, siccantibus medicamentis curantur. At chalazion, quòd toto genere sit à natura alienum, auferri postulat. Ad eundem modum & oculorū pus. Verū id plenius medicamentis digeritur. Hypochymia verò iam incipiens digeritur: vbi diu consistit, nō potest. Iustus medicus fratre nostra consultatione capitis multos hypopios sanauit. Mansit enim borā pus deorsum, propter grauiorem substantiam. Hypochymia autem leuius quoniam sit, nebulæ similis quòd pus, ita ita desiccat potest. Ceterum quod seriosius nature est, id punctione ad præsens discutitur: interposito tamen haud longo spacio, ceu vini fex quæda reuertitur. At quando pus oculorum digerere est animus, collyrie quæ myrtum habent, maxime vtemur. Quæ verò vehementer siccant, ad præsens ceterē valenter vacuant, sed quod reliquū est, ita cogan, vt agere resoluā possit. Multum autem puris vacuabimus, dulsia tunica ceratoide, paulo supra coronam. Sunt præterea ex genere eorum

Pilorum generatio vlnis.  
Pilum corruptum unde accedit.  
Serpēs dapsilis de causa cōnneti.  
Caluitie.  
Opthias.  
Alopecia.

Pilorum vitio quomodo sanetur iam.

Thapsia vbi ad præsens ad alopeciam curandam.

Pterygi curatio.

Aqualurum curatio.  
Chalazij curatio.  
Oculorum pus.

Hypopion sanatio in oculis capiti in conuulsione.

Hypochymia si modò discussum pus sit, reuertitur.  
Oculorum pus colligere ex myrti oleo cōuenit.  
Pus oculorum vacuare dant, ita tunica ceratoide, paulo supra coronam.

*Affari-  
Halmacher.*

*Vermis permi-  
tut ab amara  
undecamentu.*

quæ tota substantia præter naturam dicuntur, & ascarides, & helminthes, siue eæ rotundæ sint, siue latæ. Quocirca expelli prius eas è corpore expedit. Expelli autem, si prius necaueris. Ene cabis amaris medicamentis. Ac teretes quæ ablinthiū perimere poterit. Latæ vehementiora medica-  
mēta desiderat, siue n̄ & q̄ ascaris græcè vocatur.

## GALENI PERGAMENI de arte curatus ad Glauconem, lib. I.

### CAP. I.



*Naturā cuiusq̄  
proprietatē mēdi  
cum agno-  
scere oportet.*

On cōmunē tantū omnīū homi-  
nū naturā medicū cognoscere o-  
portet, sed etiā vniuscuiusq̄ propriā.  
Non tñ propriis singulorū naturā,  
æque atq̄ cōmunē, possibile est scri-  
bere. Quā igitur ad rectē medendū plurimū con-  
ferre temporis occasio, & quātras auxiliorū vi-  
deatur, hæc autē propriā in vnoquoq̄ agro. se con-  
templanda obiciat, nec quicq̄ propriū possit ser-  
monē explicare: ob id nimirū qd cōmune est, scri-  
bere cogimur, q̄ vis id sit vñ secundū. Etenī quā-  
tūm cuiq̄ à naturali recessu habitu, ad tantam  
morbū magnitudinē pvenit. Distantā verō re-  
cessus, facile deprehenditis, qui naturālē vni-  
cuiusq̄ egri statū exquisitē cognovit. Quod qui-  
dem quā nobis non liceat, confugimus ad com-  
munes notiones, in quib. artifex plus aliquid, q̄  
inertes, assequit. Porro qui omnino quæ secundū  
naturam & præter naturam sunt, diuisione artifi-  
ciosæ complexus fuerit, atq̄ ab iis omnibus, quæ  
sufficiens diuisa erūt, indicationes sumperit,  
solus is, quantū humanis pmititur viribus, mi-  
nimē errabit medendo. Atq̄ illos quidem quo-  
rum habebit notitiā, melius curabit, quā cæte-  
ros. Ignotos verō, proximē illis, quoad fieri pote-  
rit, ad sanitatem perducet. Si quis enim primū  
distinguerit differentiam ætatum: postea cum quæ  
secundū temperaturas, potentias, colores, calores,  
habitudines, pulsuum motus, assuetudines, in-  
dustrias, animiq̄ mores habet: atq̄ his quoq̄  
adiunxerit maris feminæq̄ discrimen, expendet  
ritq̄ regionū, temporū, atque adeo ambietis ad-  
ris tēperies, hic ad propriam laborantis naturam  
agnoscendā proximē accedet. Nunc verō de his  
solum ægrotis dicere proposuimus, quorū natu-  
ra, antequā morbū contraherent, nobis erat ex-  
quisitē perspecta. Cum quibus tamen reliqui o-  
mnes intelliguntur, qui nobis erant ignoti.

De febribus ephemeris. Cap. II.

*Ephemerarum  
causa.*

Primū igit de ephemeris febribus, vipote sim-  
plicissimis differamus: quæ nimirū ob læsitudi-  
nem, ebrietatē, iram, excandescentiā, metum, et  
atq̄ alias vehementes animi sollicitudines exci-  
tantur. Ex quarū genere sunt, quæ ab inguinum  
inflammationibus trahunt ortum, præterquam si  
absq̄ vlcere fiant manifeste: tunc siquidem & su-  
spectæ sunt, minimēq̄ mites apparent. Vigiliæ  
plerūq̄ inducuntur simplicem febrem: siue frige-  
factio, & exvitiū quandoq̄. Atq̄ hæc omnes fe-  
bres soluantur facillimē, in hunc modum. Opor-  
tet enim ipsos cōfestim ducere ad balnea, deinceps  
ad consuētū vñ rationē. Nam qui triuānū  
terminū absq̄ cibo expectat, sepius aciores fe-  
bres efficiunt. Quā igitur ad ægrum accedes, pri-

*Sibris cum ha-  
bere, si absque  
vlcere manifeste  
sunt suspectæ.  
Ephemerarum  
causæ.  
Tandem triuānū  
na ex epheme-  
ra rebus acio-  
re febrem.*

mū à maximis quæ circa ipsum sunt, est cōside-  
ratio inchoanda: deinde & ab aliis, adeo vt nec  
minimū quicq̄ omittas. Nā vt magis aut minus  
ei q̄ fit ex maxime indicatione credamus, ex ali-  
orum fit adiunctione. Maxima quidē in omnib.  
febrilib. signa in pulsibus atq̄ vrinis cōsistunt.  
His verō addere oportet, quæ cumq̄ alia circa tā-  
ciē scribit Hippocrates: accubitu quoq̄ & respi-  
rationē. Item et q̄ ab ore excernuntur, atq̄ alui  
sedimenta: & si qd aliud accideret circa aliquā cor-  
poris partē, aut operationē videns. Quæ omnia  
cōmuniā sunt omnibus febrib. Postquā itaq̄ ex  
pulsib. atq̄ vrinis febris naturā perceperis, quū  
pulsus nullū in inflammationē signū habuerit, nec  
omino inæqualitas in aliqua arteriæ cōpulsione  
se ostenderit, aut si hoc adfuerit, omīno sit imbe-  
cille: vrinx autē, aut prius similes ius quæ secun-  
dum naturā se habent, aut nō multū à naturali sta-  
tu recesserint: tunc sane & ad omnia illa quæ nu-  
per à nobis exposita sunt, accedere oportet: &  
quū velut chorus quidā oīa cōcinne loquūtur,  
tūc certē fidere oportet, ac, si libeat, interrogare,  
nunquid aliqua manifesta intecesserit causa. Si  
quid enim huiusmodi eger tateat, expectata pri-  
ma febris solutio, statim oportet lauare: quū  
tūc certior tibi facta cognitio, ex ipso solutio-  
nis modo. Nam arteriarū motus in hoc vi totū  
asimilatur ei, qui in sanis deprehenditur, quum  
in nulla alia febre ad naturālē habitū reuertatē.  
Iam verō plurimus ephemerarū humidū qdā va-  
pores, & quibusdā enā sudores vales cōspiciun-  
tur, accessione cessante. Quo tempore etiā vring  
multo meliores, q̄ circa febris initia, videbūtur:  
& si capitis aut alterius partis dolor simul inua-  
ferit, neq̄ hic amplius philet. Agrotūs quoq̄  
in tolerādo facilitas, magnū & ipsa signū, febris  
suauitatē tibi indicabit. Et si dū lauant, nec hor-  
ror aliquis insolitus molestauerit, nec alia tristi-  
tia adfuerit, post balneiq̄ & deuiceps bene se felia-  
bere pſuerit, tunc ac verearis offerre cibū, & vi-  
num, adhibito tamē per tempore modo. Cōmu-  
niter autē omnib. detentis ephemerā, vrinx rursū  
excernūtur. Aduungitur verō his qui propter tri-  
stitiā febriūt, acritudo potius q̄ abvndātia cal-  
oris: quemadmodū ē diuerso ius, q̄ propter furo-  
rem. Sed & extenuano corporis in iis quos tristi-  
tia aut cura vexauit, cōspēctior existit: oculorū  
præterea cauitas, & quædā inconfusa decolora-  
tio. Hæc quidē sunt & iis q̄ vñ modo aliter co-  
gitarūt, cōmuniā. Maxime itaq̄ ex oculis distin-  
guere oportet. Nam ex his etiā in sanis animæ  
mores cōdicere possumus. At eos qui dū vigila-  
nt, arguit quæ dī palloris forma, faciesq̄ sub-  
tumentis, & necnō ipse oculorū motus, quo vix  
palpebras, humore qdā imbutas, attollere pos-  
sunt. At qui tristantur, aut cogitationibus deti-  
nentur, iis excitantur palpebre. Causas etiā com-  
mune accidēs omnibus, metori, vigiliæ, cogita-  
tionibus, non tamen furori. In hoc enim, nec o-  
culorū cauitas, nec manifestus pallor, & plus ca-  
loris atq̄ celerius ex imo, prumpit: nec pulsuum  
magnitudo destruitur, quemadmodum in vigi-  
liis, tristitia, & cogitationibus. Eorum etiā qui  
ex læsitudine in febrem inciderunt, cutis est lic-  
cior, quā in aliqua alia ephamera. Quæ autem

*Signa maxime  
in omnibus fe-  
brilib. a pulsi-  
bus et vrinis pe-  
tuntur.  
Ephemerarum  
signa.*

*Pulsus in vni-  
libris febriū  
mutatio ad na-  
turalem statū  
reverti præ-  
sertim in eph-  
emeris.*

*Diuturnas fe-  
bres quæ ac-  
cedunt.*

*Ephemeræ re-  
mittuntur & sub  
causis indi-  
cat extenua-  
tio corporis.  
Mores animæ  
ex oculis etiam  
in sanis cogno-  
sci.  
Vigilantiæ sig-  
na.*

*Causes oculorū  
motus quæ indi-  
cat.*

*Ephemerat a densitate aut de densitate rati.*

ex densitate cutis accidunt febres ( densatur enim aut ex frigore, aut ex aliqua qualitate astringente) hæc quidē aliter omnes febres passio astricta existunt, vel solo tactu noscuntur, tum ob densitatem cutis, tum ob differentiam caloris, qui multis quidem in primo tactu sentitur, acris autem, si pluculum tardemus. Non tamē & his vrsing sunt rursus: neq. molea corporis cōcidit: neq. oculi redduntur aut caui, aut aridi: si vti nec pulsus minores, quæmadmodum in morboribus, cuius, vigilis, aut exercitiis immoderans.

De febribus ex inflammationibus inguinum. Cap. III.

Febres quæ ex inguinū inflammatione frunt, pulsus habet maximoa, veloces, atq. frequētes: plurimūq. illis calor inest: ac postq. febris cōstitit, statim ex profundo quiddā emergit humiditas, calida quidem, sed munda. Atq. in totum facies rubicūda illis, & magis tumēs, vrsing subalbidæ. Cōmōnis autem omnibus huiusmodi febribus est pulsus æqualitas. Curare igitur omnes quidē oportet balneo. Ceterum qui ex cutis densitate, aut inguinū inflammatione febriunt, si in aere balneo immorari iusseris, haudquāq. nocib. Reliquos omnes quomocūq. oportet ab aere semovere. Si verō diutius in aqua immorari voluerint, permittere. Oleo aut multo, & tepido, & manibus mollibus perfricare quamplurimum, sed eos perfricare, qui ex labore febriunt. Secundaurē loco, qui moras habet astrictos: attēdō, qui in guinū partium inflammationem, quos nimirum spūs lauare expedit. Cibū autem cōcoctū facili assumere qui ex labore febriunt, possunt multoties, nō quæ tamē, qui ex densitate cutis, aut inguinū inflammatione laborant, quorū enī vrsing tenuis victus est utilis. Sed & vinum potare quantum possunt conuincere sunt permittendū, quibus labor febribus occasio exint. Mensuræ aut ratio, ex vinibus & acate sumitur ægrotantis: necnon ex naturali temperie, consuetudine, anni tēpore, & regione, aliisq. id genus. Qui verō ex inguinū inflammatione febriunt, arcēdi sunt a vini potu, donec inflammationes soluantur. Atque cutis foramina habent astricta, aut refrigerati sunt, si quidem non motum huius affectu laborant, nec pleni corpus habeant, non sunt a vini potu prohibendi. Qui autē supra modum refrigerati sunt, aut plenior corpore, prohibere vtile est. Rursus, aut ex vigiliis, aut aliquo animi affectu febriūt, postq. 30 balneaueris, cibo humido ac lioni succi reficere oportet: vinū verō omnibus iis qui vigiliis passū sunt, intrepide offerre, nisi capitis dolore premant, aut possint venarū in temporib. sentiant.

Sed & iis qui ex ira aut morore aliquo, aut cogitatione febriunt, vinum est exhibendum si vti & illis, qui furore periti fuerunt, quando omnino perturbatio fuerit refrigerata: nam prius fānē vti vini erit periculosus. Tentare autē oportet semper adferre cōnariū ei quod infestant labori quidem, quietem: vigilis, somnum: iræ, furori & tristitiz, sermonibus, ac bonis, spectaculis, enarrationibus, ammi incedit. Sic qui ex cogitatione laborat, omissio ratiocinationes omissat. Et qui ex inguinū inflammatione fe-

bricitat, eius curationi intendat: ac multo prius viceris, vnde origiē habuit. Atq. hæc tenus de ephemeratū indicis, remediisq. Reliquæ verō febres, nōnullæ ex inflammationibus, nōnullæ ex humorib. accidunt. Et quæ ex inflammationibus sunt, sunt veluti symptomata quædam partium inflammationum.

De febribus putridis. Cap. IIII.

Atq. ex humorū putredine accidunt febres, ex & dicitur putridæ, & sunt nō morborū symptomata, sed ipse morbi. Ex his verō nōnullæ quæ ab seip. accidunt. nōnullæ, & multissimæ sunt: nōnullæ item cum accidunt. vrgit. Earū igitur quæ accidunt, sunt carēnt, pance quidem ad exactam cōnstitutionem, diem quartū desiderat.

De signis febrium intermittētiū. Cap. V.

Quæ igitur cum rigore invadunt, nō ab re ex earum esse numero hincabū, quæ per circuitum infestant. Tertianæ enim in quæ quæritur in totum cū rigore accessiones faciunt. Sed tertianæ quidem in primō in saltu cum nimio spe rigore incipiunt: quartanæ autem non videmus cum vehementi rigore incipiunt, sed per eadē tem-

potē magnitudo ei supervenit, præter id, quod nec statim ab initio hæc febris vti plurimū solet invadere, sed aliis quæ antecesserunt, subsequi. Quartanæ itaq. solet errabundis febrib. supervenire. Quotidianæ verō, raro accidit ab seip. leione oris vtriuscū. Rursus quartanæ ex male affecto splene gignitur: vti tertianæ ex affectu iecoris.

Quæ verō cū valido rigore incipit, magis febriū tertianæ, q. aliqua aliarum febriū fore operatur. Quod si reliqua enī signa attestentur; hanc dubio procul in prima tertianæ die tertianæ esse cognosces. Etenim calor multus & acris adesse debet: pulsus autē magni, calidi, vehementes, veloces, atq. frequētes, omnisq. inæqualitatis, præterquam febribus, expertes. Rigor potē, vel vti si a re aliqua acuta, plus q. frigida, corpus percipuerit: quom iis qui quartanæ aut quotidianæ intermittētem patiuntur, ponis frigidum rigorem percipiant. Tempus autem anni æstivū: si vti & locus, & præsens status calidus. Sit autem & ægrotantis natura calidior, & biliosior, & ætas adolescentis: & exercitationes potius quam ociosas antecesserint: magisq. de vtho, q. frigefactio, & parcitas cibi, potius quā eripule. Vigiliæ quoq., microres, atq. labores, & intense cogitationes, ad eundem affectū perducit. Quod si multos alios eodem tempore laborantes cōstigerit tertianis corrip. febribus, hoc quoq. maximum aliquod, præter ea q. nuper diximus, illum erit. Si igitur hæc oia adfuerint dicia, aut saltem quæ maxima sunt, & sitis quoq. vehementis adigant, vomitūq. bulas, aut sudor, vel vtriq. supervenerint, tunc nulla dobitatio relinquatur. Quod si inter hæc a febri quiescerit homo, hac inquam quæ ex suo motu ei omnibus mōra, propriā verō febriū inæqualitas in arteriarū motu reliqua ostendit, tūc firmiter poteris esse tertianā febrem ostendere, ac si tertio iam die accessione fecisse videris.

De signis quartanæ. Cap. VI.

Dum riget qui quartanæ tenetur, pulsus habet satis tardos & raros. Quū autē consistit febris, Quædam non solet vti plurimū hanc a principio curare, sed alio subijungit. Inter omnes morbi singula, quorū potius committatur latioris. Febrem tertianam quæ arguit aut.

*Febres ex inflammatione sunt symptomata partium inflammationum.*

*Febrium putridarum differentia.*

*Quartanæ non solet vti plurimū hanc a principio curare, sed alio subijungit. Inter omnes morbi singula, quorū potius committatur latioris. Febrem tertianam quæ arguit aut.*

*Quædam non solet vti plurimū hanc a principio curare, sed alio subijungit. Inter omnes morbi singula, quorū potius committatur latioris. Febrem tertianam quæ arguit aut.*

*Quædam non solet vti plurimū hanc a principio curare, sed alio subijungit. Inter omnes morbi singula, quorū potius committatur latioris. Febrem tertianam quæ arguit aut.*

*Quædam non solet vti plurimū hanc a principio curare, sed alio subijungit. Inter omnes morbi singula, quorū potius committatur latioris. Febrem tertianam quæ arguit aut.*

*Quædam non solet vti plurimū hanc a principio curare, sed alio subijungit. Inter omnes morbi singula, quorū potius committatur latioris. Febrem tertianam quæ arguit aut.*

*Quædam non solet vti plurimū hanc a principio curare, sed alio subijungit. Inter omnes morbi singula, quorū potius committatur latioris. Febrem tertianam quæ arguit aut.*

*Quædam non solet vti plurimū hanc a principio curare, sed alio subijungit. Inter omnes morbi singula, quorū potius committatur latioris. Febrem tertianam quæ arguit aut.*

*Quædam non solet vti plurimū hanc a principio curare, sed alio subijungit. Inter omnes morbi singula, quorū potius committatur latioris. Febrem tertianam quæ arguit aut.*

*Quædam non solet vti plurimū hanc a principio curare, sed alio subijungit. Inter omnes morbi singula, quorū potius committatur latioris. Febrem tertianam quæ arguit aut.*

*Quædam non solet vti plurimū hanc a principio curare, sed alio subijungit. Inter omnes morbi singula, quorū potius committatur latioris. Febrem tertianam quæ arguit aut.*

*Quædam non solet vti plurimū hanc a principio curare, sed alio subijungit. Inter omnes morbi singula, quorū potius committatur latioris. Febrem tertianam quæ arguit aut.*

*Quædam non solet vti plurimū hanc a principio curare, sed alio subijungit. Inter omnes morbi singula, quorū potius committatur latioris. Febrem tertianam quæ arguit aut.*

*Quædam non solet vti plurimū hanc a principio curare, sed alio subijungit. Inter omnes morbi singula, quorū potius committatur latioris. Febrem tertianam quæ arguit aut.*

*Quædam non solet vti plurimū hanc a principio curare, sed alio subijungit. Inter omnes morbi singula, quorū potius committatur latioris. Febrem tertianam quæ arguit aut.*

atq; etiam augetur, necesse quidē est vt veloces  
siant, atq; frequentes. Seruatur tamē & tunc pro-  
pria ipsius tarditas raritasq;, si additā velocitatē  
atq; frequentiam in accessione principium, si  
namq; omnib. cōmunis est febris, in vno pulsū  
iuxta qualitatē, in hac manifestissimē licet cōpre-  
hendere. Multo namque velocius principium, si  
nemq; motus in veniēs, q̄ medium. Præterea æ-  
stus, & deuotiō, & quendā veluti feruorem,  
qualis in tertianis videt, in quartanis haudqua-  
quam inueniēs. Sed & ægrotantis natura inspi-  
cienda est, an æta in ea bilis absidet. & tempus  
quoq; anni, an sit autūnus: & præfens status, an  
inæqualis. Sic verō & loci natura, et morborum  
peruagantiū vulgaret, & an lien intumuerit, se-  
brisq; antecesserit inordinata, & ætas senior q̄  
cōsistentiū, & an cum sudore febris definant. In  
his verō bilis fluxus vomitus maximē expectan-  
dus est: quemadmodū nec in quotidianis inter-  
mittentibus. Hoc etenim tertianarū est propriū  
signum. At quum febris cessauerit, si adhuc vesti-  
gium febris renāserit, pulsusq; iis, qui secundā  
naturam rariore atq; tardiores fuerint, quar-  
tana proculdubio erit huiusmodi febris.

De signis quotidianæ intermittētis.

Cap. vii.

Quotidianā  
febris.

Quotidianæ intermittētis calorem humidio-  
rem cum quadam acrimonia esse oportet, non  
quā primum manus admouetur, occurrentem,  
sed per moram. Nam quadam fumosa caliditas  
cum multo vapore cōmixta, perspirare videbit.  
Sed & iis lōgē mitiores sunt pulsus pulsi. quar-  
tanarum, q̄ iustarum pulsus pulsibus tertianarū.  
Rursus verō, tanto rariore sunt in quotidia-  
nis intermittētibus pulsus, his qui in tertianis,  
quāto illis pulsus quartanarum. At tarditas in  
vtriusq; eodem modo se habet. Minus verō sicut  
lofa hæc febris est, tantumq; eam quartana exce-  
dit, quāto illam tertiana. Humidissimum et-  
iam totum corpus in his febris est, & vomiti-  
us pituitosi. Quæcumq; autē excernuntur per ven-  
trem, frigidiora, humidiora, crudiora, & pitui-  
tiora exsūt. Et quidem ætā nibus, natura, æ-  
tatisq; statibus, & temperaturis humidioribus, hæc  
febris accidit. Nam adolescentē biliosa & sic-  
ca temperatura, nūq̄ vidi quotidianā corrigi  
febre. Pueri autē, præsertim minores paru, & ex  
adultis pituitosi, & habitudinis crassæ, atq; ocio  
plurimo dediti, necnon crapulæ, ebrietatibus,  
balneis aspiduis, post cibū præsertim, vitæ, fa-  
cile & quotidianis capiunt. Loca enī humidiora,  
atq; ex anni temporis, hybernū, est statibusq; hu-  
midiores, hanc præcipuē cōciliāt febrē. Quod si  
populariter enī grassetur, hoc quoq; nō parum  
ad eam dignoscendā conducer. Non tamen ha-  
rum febrium declinationes, quemadmodū ter-  
tianarū & quartanarū, sudoribus terminantur  
quare neq; ad integram quietem, exceptis pau-  
cis, perveniunt. Quotidianarū vix sunt albæ,  
& tenues, vel crassæ & turbulente, vel rubicun-  
dæ. Tertianarum rursus, vel subrussæ. Quartana-  
rum variz quidem, sed crudæ omnes.

De signis febrium cōtinuarum.

Cap. viii.

Febrium cōtin-  
uarū indicia.

Febres autem cōtinuæ hinc cognosces, quod

nullum eis adest signum, ex iis quæ adesse inter-  
mittentibus diximus: & quod intra quatuor &  
viginti horas nō cessent. Si verō inæquale incre-  
mentū habuerint, hoc quidem præter alia signa,  
longius etiam tempus ostendit: necnon si pro-  
prium febrium signum in pulsibus manifestum  
adsit. Quod si inordinato etiam ac inæqualitas  
ipsis vel incōcinnitas insit, & hoc etiā indicū si-  
mul magnitudinis atq; cōtinuitatis. Si verō in  
hoc statu permanentes, tertio die maiorē acces-  
sionem ostenderint, aut eicremēta & vring omni-  
nino crudæ apparuerint, nō possunt huiusmodi  
di febris ante septimū diem terminari. Ad hæc,  
si quarta dies tertæ diei similis fuerit, & febris  
veluti deuens, nec facies, aut reliquum corpus  
collabatur quicquid, huiusmodi febris ad long-  
gus extendi tempus cōsuevit. Ac tales quidem  
sunt differentie earum febrium, quæ accedentibus  
tarent. Curatio autem cuiusq; earum deinceps  
scribetur: primum tamen intermittētium, dein  
cōtinuarum. Ex intermittētibus igitur brevis-  
sima misissimāq; est tertiana. Longissima autē,  
& quantum in ipsa est, haudquaquā periculosa  
quartana. Quotidianā verō, & longa, & nō sine  
periculo. Porro \* vbi morbi existunt acuti, cele-  
riterq; ad statum perveniunt, etiā valde tenacem  
victum exhibeat, non multum lædes. Vbi verō  
sunt diuturniores, nisi ab initio cibo vberiore  
reficiat, hominē simul cum morbo perimes, aut  
intempestivē victus modum commutabit. Neq;  
enim oportet statū accedente offerre largiorem  
cibum quā prius: sed contrā, potius tenuissi-  
mum victum, qui in toto morbo exhibetur, in  
statum referatur. Distinguendum autē est, num  
exquisita, an minimē exquisita sit febris. Etenim  
exquisita tertiana, ad maximū septem circūitib.  
iudicatur, estq; minimē periculosa. Alteram ve-  
rō non exquisitā, quādoq; vidi, quā m ætatem  
no incepisset, in vere desisse. Quāto autem hæc  
natura inter se differant, tantum ratioabile est  
& rationem victus mutare. Ergo si quæ in  
principio sermonis tertianarū febrium indicia  
scriptissima, omnia adfuerint, exquisitæ reddunt  
tertianā. Cuius accessionis tempus breue, qua-  
tuor, aut quinq;, aut sex: ad longissimum, vnde-  
cim aut duodecim horas cōplectitur. Atq; huius-  
modi febrium vring, tertio die, aut ad summum  
quarto, coctionis signum ostendunt. Quibus la-  
tē indicia exquisitā, & non exquisita tertiana di-  
stingues. Eadem quoq; ratione exquisitā quar-  
tanā & quotidianā. Cui enim omnia insunt  
indicia, quæ in quartanis febribus antea defec-  
tissimæ, hæc vera & exquisita est quartana. Cui  
verō minimē, spuria & nō exquisita existit. Quo-  
tidiana enī cui omnia quæ diximus insunt, ex-  
quisita est: quæ autē eam naturā non habet, spu-  
ria. \* Nō igitur quemadmodū exquisitæ quoti-  
dianæ & quartanæ, sic etiam non exquisitæ, sunt  
lōgæ. Nam quemadmodū exquisita tertiana est  
brevis, sic & quotidianā & quartana diuturna.  
Ceterum non licet nobis bene prænoscerē, nisi  
quantitate morbi atq; virium accuratē expen-  
damus. Etenim si vires ad valde fuerint, vi  
morbum vincere possint, necesse est ægrotum  
evadere. Sin verō contrā, omnino morietur.

Tertiana est  
brevisima in-  
termittens.  
Quartana est  
longissima in-  
termittens, ac  
periculosa.

Quotidianæ est  
prolixæ, im-  
periculosa in-  
termittens.

Acuta & re-  
sistens morbi,  
temperamentū  
vbi ratione po-  
tissimum re-  
mouetur.

Tertiana ex-  
quisita ad ma-  
ximū septem  
circūitibus  
iudicatur.

Tertiana ex-  
quisita ad sex  
diebus, aut  
ad septem ho-  
ras cōplectitur.  
Exquisita in-  
termittens, a  
non exquisita  
quædam distat  
quantum.

Prænoscerē  
autē vires  
ad valde  
fuerint, vi  
morbum vincere  
possint, necesse  
est ægrotum  
evadere.

De

De cura exquisitæ tertianæ. Cap. ix.

Exquisitam ergo tertianā, ut quæ ex flaua bile cōmota inualeat, quāmaximè fieri potest refrigere, atque humectare oportet. Nam cōtrariis cōtraria remedia sunt: quæ quidem quod superfluum est, reprimat. quod verò deficit, suppleant. At flauæ bilis humor, omnium qui in corpore sunt, aridissimus, calidissimisque existit. Hunc igitur, qui ad ventriculū repit, per vomitum educere oportet. Quū verò vergit ad inferiora, eodē modo per aluum: id quod fieri solet sponte in exquisitis tertianis. Per vrinam quoque & sudores oportet ipsum vacuare. Ac venter quidē, mollibus clysteribus inaniedus est: vrina verò, porionibus, in quibus apū, aut anethū maduerit, pvocanda. Quod si tibi cōtione signa monstrantur, iam cū fiducia aliquid abstinēti exilibeas: quod alioqui summū est remediū, vbi infestauerit bilis, si præsertim ex ipsius coma, quantum sit satis, accipies, melicrato intinxeris. Balnea verò calida ex aqua potabili, p'sunt: tum quia aliquid bilis educunturum quæ sua qualitate & humectat, & potētia refrigerat. At maritæ aque & salis, nitroque & sulphure, plus quidē bilis educunt, sed magis sua qualitate nocent, quæ evacuant non ibi. Semp̄r autē oportet cōtrarias qualitates, illis que in valuerint præternaturā, opponere: quā hoc multū plus iuuat, quomodo dolbet evacuari. Hic iterum balneis loco sit, ut corpus maderet, vtrūq; humectetur. Vbi igitur plurimum olei calidi infunderis, ad aquam perducere, ac maderescere oportet. Quod si in eam natate voluerint, quantum id facere possunt, permittendū. At qui balinea admodū dēlectatur, si etiā bis in die lauari p'sueris, nō aberrabis. Sed illud semper habere in memoria, ut tēp̄stius id faciant. Si verò etiam cōtione signa ostendantur, si scipius laetis, nihil deliquis. A vino autem, antequam morbus cōquatur, prius est abstinendum. Verū vbi cōcoqui is ceperit, dandum est ab initio tenue, a quaticum, atque paucū. Vbi verū iam prop̄ est ut morbus solvatur, amplius est offerendum. Cibi autem quicūq; humectant, atque refrigerant, omnes viles sunt exquisitis tertianis. Cæterum quantitas in ipsis sit recta, ut bene concoqui possint. Ex oleribus quidem, atriplex, blitum, lapathū, malua, laetuca, & cucurbita. Ex aliis verò, p'sane succus, sorbitio ex alica, ex piscib'q; saxatiles. Ex volanilib; denique ea, quæ mollibus constant carnibus. Quæ autem talia non sunt, eorum alia: testiculi quoque gallorum, & suum pedes, & cerebra. Paruorū verò si etiam dederis carnes assas, nihil nocabis. Sed & quia ad sorbendum sunt offerenda, & præsertim vitelli eorum: nam hi facilius quam pars alba cōquantur. Ex fructibus autem illos tantū degustent, qui nō sunt omnino difficiles cōcti: Oportet abstinerē a melle, sinapi, salinis & acerbis omnibus: sicuti & a vinis sanis vitiis & calidis.

De cura tertianæ nocturnæ. Cap. x.

In his verò quæ nō adeo exquisitæ sunt, provi-  
dendū est, ne morbus augeatur, neve egrotantes vires corrumpantur, quæ laborare longiori tempore debent. Quare oportet precium est scire, ad quam magnitudinem morbus ipse sit perventurus, & quæ sit ipsius ægri vires: ut ad ea inspicies

quæ maius auxilium pōstulant, inedia quidē in valentioribus vtriusque vitiis, & morbo cōcoctū diffidili: largioria autem cibo, vbi vires sunt infirmiores, nec morbus admodū ad cōtione dētinat. Iam verò in tertianis non exquisitis, nec statim circa initia balneare expedit, sed quū primum cōtione signa apparuerint. Nec cibū quoque offerre expedit, sed alternis dieb; Quies verò & caliditas circa præcordia iuuat, & forbitiones quæ concoquantur faciliē, & clystera nō admodum mollia. Quod si sanguinē minere oporteat, neque hoc quoque omittendū est: sed ab initio statim tantum sanguinis detrahendum est, quantum præsens status exigit. Sit autē totius vicius ratio, non quæ humectet, aut refrigeret vniuersum corpus: sed quæ aliquē modum etiam assumat, ad calfaciendū, incidendūq;. Plurimū igitur eos iuuat p'sane succus pipere adiecto. Ad hæc, hyssopū, vel organū, vel ipsū nardi mulsa infundens, & decoquens, ad bibendum p'pina, & quæcumque alia pvocantia vrinā, exceptis illis, quæ præter modum calfaciant, excitantq;. Maximè verò post diem septimū danda eis iugiter est abstinentia coma. Et quidem oxymel portione plurimā morbi iuuat: & aliquid ex his quæ molliet venter subducunt. Vomitus etiam post cibum, aded his quibus hæc febris perdurauerit, vtilis est, ut multo sciam solis vomitibus statim fuisse curatos.

De cura quartanarum. Cap. xi.

Quartanas ab initio medicare, ac leniter tractare oportet, nullis forte medicamentis, aut evacuationem exhibentes: nisi forte sanguis vehementer superabundans appareat. Cæterum si vena incisa, in qua illic, tinger & crassius videatur (qualis in us præcipue videtur, qui liene laborant) andentius mittendus est. At si flauus, aut tenuis cernatur, subridi suppressendus. Venam verò secare oportet, vel interiori, vel mediā, quæ est in sinistro cubito. Vitiū deinceps instituire sine sanibus, ac optimis: ventremq; emolliere, iis quæ vitiata sunt, expedit. Quod si hæc nihil proficiant, clysteribus utendū est, a principio quidem mollibus, postmodum verò acrioribus. Arcēdi sunt autē a suillis caenibus, ab omnib'q; edulibus quæ tenacia sunt, & tardū habent exitum, quæque tum refrigerant, tum siccant corpus. Vini verò utendum est albo, tenui, & medioriter calido, & volatilibus quæ boni sunt succi, nec in paludibus degunt. Pisces sunt adhibendi, qui faciliē cōcoquantur, ac molles carnibus, nihilque tenax habentes. Utendum est autem salisamēnis, & sinapi ac certis diebus mēdicamē diatrion pepercon, vel diosporitici est assumendum. Quod si quondam p'per tantum cum aqua biberent, rectē etiam facerent. A frictionibus autē, ambulationibus, atque balneis, nō sunt penitus prohibendi. Quamquā si omnino possent a balneo abstinere, solis cōtenti frictionibus, in de plurimū iuauerent. Iam si quartana ipsa sit brevis, nec admodum violēta, nihil nocuerit si dieb; interiectis ad cōsuetā exercitia se n'flectant. Hæc igitur ab initio, & vtrūq; ad statum sunt peragenda. In statu autem subtiliori vicius ratio adhibenda est, quæ ante, vel post. Statim verò æger cōtinendus in quiete est: ac vitiis: providēdum vnguētis & cataplasmatibus.

Tertianæ nocturnæ vitiis contrariis.

Tertianæ nocturnæ vitiis contrariis.

Quartanæ vitiis contrariis.

Quartanæ vitiis contrariis.

Diatrion pepercon, vel diosporitici est assumendum.

Quartanæ vitiis contrariis.

Tertianæ vitiis contrariis.

Tertianæ vitiis contrariis.

Tertianæ vitiis contrariis.

Tertianæ vitiis contrariis.

Tertianæ vitiis contrariis.

Tertianæ vitiis contrariis.

Tertianæ vitiis contrariis.



que molliore et laxare possint. Deinde medicamē-  
tis vtendū, quę cōdi vrinā vim habēt. Vbi verō  
coctionis signa apparuerint, tunc sanē purgare  
oportet iis quę humores attros inaniāt, nō semel  
tantum, sed ſæpius, ſi videat necesse. Vtendū autē  
& vomitib. statim a cibo: & ſi nihil prohibuerit, el-  
leborū album eſt exlubendū: primō quidē, per-  
miſtum radiculis: quodd ſi nihil profecerit, iſtium  
per ſe. Cæterum qui nequeunt evomere, h̄ vhe-  
mentius p̄ inferiora purgētur: ac poſtmodū offe-  
ratur eis in potu, medicamē conſectū ex viperis:  
necnon quod ſuccū cyrenaeū recipit. Quicunq;  
verō ab initio aliquid ex hiſce medicamētis ex-  
hibuerit, aut omnino ante ſtarū, quartanā quę  
erat ſimplex, duplicem reddiderit: aut omnino  
maiores, atq; difficiliorem: ex duplici autem tri-  
plicem, aut omnino ambas difficiliorem.

## De cura quotidianæ. Cap. xii.

Quotidianā autē quum volueris curare, oxy-  
melite vitior poſt primos dies, & illis quę pro-  
bē poſſunt vrinam clere: vniuērſumq; totius vi-  
ctus caput ſit ad incidendū efficiacius. Circa ſta-  
tum verō, de ventriculo eſt labenda ſoliſitudo,  
ac de ipſius ore præſertim. Denſceps iubendum  
eſt, vt poſt radiculas & cibos aſſumptos vomāt.  
His etiam quę puritatem ſubducunt, vtendum.

De cura febrium continuarum, quę carent  
accidentibus. Cap. xiii.

In cōtinuis autem febribus, quibus nō vltra  
ſeptimū ſaturus ſtatus eſt, ſi vires validę ſint, &  
ætas cōſennat, admodū exquisitus & tenuis vi-  
ctus eſt inſtituendus. In quib. verō vel ſtatus to-  
tus morbi longius abeſt a ſeptimo, vel vires ro-  
buſte nō fuerint, vbenon cibo ægri ſitu reſtice-  
re: quemadmodū prope ſtatū tenuiori. Quū autē  
iam adeſt ſtatus, tenuiſſimū victū ſeruare opor-  
tet: deinde ruriſ ſemper vbeniorē. Sanguinē ve-  
rō mittere oportet, & ob morbi magnitudinem.  
Quibus autē rubor multo intensior, quā p̄ na-  
turę ordine, & maior, quā pro conſuetudine,  
totius corporis moles, vbeniq; eminentes, exten-  
ſiq; fuerint, iis etiam eſt auferendum, niſi vires,  
aut ætas, aut aliquid cōmemoratorū, prohibue-  
rit. Quod verō humidus victus in febribus acu-  
tis omnib. iuuat, rectē iam dictum eſt. Cremorē  
igitur p̄ſtanę, iis quibus nō acceſcit, exhibere o-  
portet: & melicratum quibus nō bileſcit, & ſor-  
binones ex alica, & panem ex aqua. Porro in fe-  
bribus præter modum calidis, vrentibꝫ, quib.  
primū coctionis ſigna apparuerint, tunc auda-  
cter aquam frigidam propinabis. Modus verō  
in quantitate ſeruetur, quemadmodum tempus  
anni, regio, ætas, natura, conſuetudoq; exigunt.

De curatione febrium cum accidentibus.

## Cap. xiiii.

Quę febres cum accidentibus vrgent, non p̄-  
que ſimplicem exigunt curationem: ſed p̄ viri-  
bus menendum eſt, quanta ſit ſtipſa febris, quan-  
tūmq; ex accidentibus imminet periculum: atq;  
ad id quod vehementius fuerit & difficilius, in-  
tendendum, non poſſi habita omnino etiam alte-  
rius cura. Etenim vbi ſimul cum ipſa febre ſenſi-  
tur circa os ventriculi anxietas, morſus, & imbe-  
cilitas, prius ſanē vacuandi humores non ſunt,  
quā os ipſum ventris corroboretur, etiā ſi cru-

dirate aut cacochymia exerceſce laborat. Sed nec  
ſi fuerit febris cū ventris proluſio, alia eſt opus  
evacuatio. Verū hęc ſola ſufficit, quāvis nō ſir  
pro ratione ipſius plenitudinis. Iam verō ſi quis  
ſimul & diſtentione neruorū laborauerit, & ſan-  
guinis eguerit miſſione, neq; huic tantū ſemel  
mittere oportet, quantum exigit morbus, ſed ali-  
quid etiam accidenti eſt linquēdum, cuius cauſa  
ſæpe ſudores eveniunt, & vigilię moleſtę, & vi-  
res ægroti debilitantur. Ita etiā ſi vehementes vi-  
gilię, aut dolor intenſus ægrotū cruciat, cauē-  
dę ſunt ſubſtę evacuationes, ac multę. Ipſa præſe-  
rea ambiētis aëris tēperies, lo co accidentis cauſa  
dam habēda eſt, dum exquisitē calida & ſicca fue-  
rit: qualis eſt tēpore medio inter Canis & Arctū  
ri ortū. Si etiā valde frigida fuerit, tūc quoq; ſan-  
guinem mittere formidandum. Ob hęc etiā neq;  
in locis admodum calidis, aut frigidis, ſanguinē  
mittere audent. Quod ſi regioni temporis ſta-  
tus cōſennat, etiā omnino abſtineamus: ſi verō nō  
cōſennat, evacuiamus quiddē, ſed multo minus, q̄  
ſi neutri prohiberet. Tolerantia etiā ægri, ceu q̄d-  
dam accidens, expendenda venit: nec ſecus ipſa  
tēperatura. Nam quicunq; calidi & ſicca natura  
ſunt, hi omnes facile ab integris evacuationib.  
offenduntur. Cōſuetudo quoq; nō parui momē-  
ti eſt, quā ad omnia alia, tū præcipue ad eva-  
cuationis indicationē. Quidā enim nunq; prius fue-  
re vacuati, & multis cibis ſunt viſi. Nōnulli eotrā  
nec multis cibis ſunt viſi, & evacuationib. aſſue-  
uerūt. Hos igitur intrepidē evacuare oportet, ſi  
reliqua etiā conſentiant: alios verō, ne ſi reliqua  
oīa id ſuaſerint. Eodē pariter modo & corporis  
habitus conſiderandus. Nam qui deſa & ſolida  
carne cōſtant, nō offenduntur facile. Quare non  
oportet vereri ipſos vacuare ex toto, ſi quiddē  
& alia id iubent. At qui mollē, & tenellā, & diffi-  
cilem carnē ſortunt, n̄ mirū in modum ſunt ad  
patendū habiles. Quare vel ſi reliqua omnia ſan-  
guinem eſſe mittendū ſuaſeāt, non tamē id face-  
re audendum eſt, ſed vtendū aliis evacuationib.  
moderate. Eodē modo & in iis qui ſupra modū  
craſei aut macili ſunt, ab incidēda vena ſuper-  
ſedendū, ceteraſq; integrę evacuationes vereri  
oportet. His etiā & ætas annuēntida eſt, vel vi-  
quoddā ſymptoma, q̄d prohibendi integrę va-  
cuationem vim habet. Neq; n. pueri, neq; ſenio-  
res hęc ſine noxa tolerāt. Hoſce igitur omnes, &  
æq; belcicis. Quod ſi duo cōtraria ſymptomata  
aut morbi cōſtant, ad verſus id q̄d magis vrgat  
inſtandū, nec interim alterū negligendū. Eaſ ve-  
rō quę habentur ex accidentibus & morbis indi-  
cationes, non ſimpliciter, ſed ſecundū cauſam a  
qua ſingula ſiūt, cōſiderare oportet: qualia ſunt  
deſectūs animi, & exolurio: quę duo nomina de  
vnicā re dicūtur, cuius plures exiſtūt cauſe. Si q̄-  
dam nō ſolum p̄ varios aſſectus corporis, ſed etiā  
in vehementiſſimis perturbacionibus animi,  
nōnulli exoluti fuerūt: præcipue ſenes, & natu-  
ra imbecilli. Etenim plures eorum triſtati, aut læ-  
tati, aut irati, alio deſecerunt. Qui autē magis ro-  
buſti ſunt corpore, ex immodiciſ evacuationib.  
bus

Febribus quę  
cum alio ſtore  
inſeſſant, non  
eſt alia opus  
evacuatio.

Evacuacioni  
ſubſtę ac mul-  
te, quando ca-  
uenda ſunt.

Sanguis miſ-  
ſionem proba-  
bi alio conſi-  
deratione imple-  
ca-  
lida aut frigi-  
da.

Calido & ſiccū  
offenduntur ab  
immediat vacu-  
acionibus.  
Cōſuetudinem  
plurimum poſſe  
ad vacuacionem  
indicationem.

Habitudo  
corporis quan-  
tum facile miſ-  
ſionem ſangui-  
nis ferat, &  
qua difficilius.

Pueri ſcilicet,  
interque vacu-  
acionem nō ferat.

Animi vhe-  
mentium offe-  
ſſionem pro-  
cipue atq; imbe-  
ciliſ evolvunt.

Quarta de-  
tenuis, eſt plu-  
res purgatio-  
nes, ſed apparen-  
tibus ſan ſignis  
coctionis.  
Quarta pro  
diſtentione.

Thiæ in  
quarta pro  
cipio exhibita  
quid meliorat.

Quotidianæ  
curatio.

Febrium conti-  
nuarum quę ſe-  
ntia accide-  
ntia inſeſſant cu-  
ratio.

Vitæ huius-  
modi in febribus  
omnibus acutis  
conducit.  
Aquam frigidā  
propinanda eſt  
in ardentibus  
febribus quum  
primū ſigna te-  
nuis.

Febrium cum  
accidentibus inſe-  
ſſationis cura-  
tio.

bus idem patiunt. Iam verò si abscessus quipiù  
rumpat, vires vehementer laedit, ac tum præcipue,  
cum materia simul rota ad ventriculū, vel ipsius  
os, aut thoracē defluxerit. Quod si quidō etiam  
nos abscessus secantes, totū simul emittere pus  
voluerimus, animi defectū sublequi est necessa-  
rium. Nec verò laborantibus aqua inter cūctōs, to-  
ta simul humiditas (quā vis ea præter naturā sit) po-  
test sine noxa vacuari: sed tunc quoq; necessum  
est, hominē deficere animo. Ex dolorō enā velie  
mentia, similiter dissolutiones accidunt. Quin-  
etiā neruus percussus, & musculi caput, & mali-  
gina in articulis vlcera, & immoderata quædā fri-  
giditas aut caliditas, vitalisq; roboris exolutio,  
præterea insignis cruditas, obstructiōq; aut in-  
flammatiō alicuius præcipue partis, aut os ven-  
triculi malē affectū, aut improbæ evacuationes,  
aut deniq; alia multa, de quib; postea dicemus, in-  
ferre possunt defectū animi. Quarū sanē causarū  
singulę, p̄pria curationē desiderat. Porro eos q  
ex cholera, & alui, p̄stusio, & aliis tum largē, tū  
vno impetu factis evacuationib; dissoluunt, frigi-  
da spargere oportet, & nares cōprehendere, &  
os ventriculi perficere, iuberēq; vt vomant,  
stomachū irritādo digiro vel pennæ immisiōne,  
ac deniq; alligare pedes & manus. Oportet  
autē nexus fieri, plures quidem ac formiores circa  
manus, quādo per inferiōrē partē sunt eva-  
cuationes. Nā si vacuatio per superiora fiat, plures  
ac vehemētiōres ligaturæ cruribus admollendę  
sunt. Si tum quoq; aliquem parti fluxionem pa-  
tientis expedit invenire, in aduersum tendētem,  
sed moderatē. Nam si nimīū tendat, atq; ex hoc  
fatigat, nihil minus irritatur, q̄ si inclinaret ad  
eundē. In vniuersum autē, aut ad cōmuniā mem-  
bris patientib; in aduersum trahere oportet, et  
ad ea in quib; est fluxiōnis origo. Atq; ideo ve-  
hementes evacuationes quę ex matricib; sunt, cu-  
cubitalis iuxta m̄lmas apponere, statim sedāt.

Quę verò ex naribus, hepā ac spleni, secūdm  
narē patientē. Quod si ex ambabus narib; simul  
plurimus sanguis effluat, vtriq; visceri applican-  
da sunt. Vinū etiam aqua frigida temperatū, curat  
ea, quę ex magnis sūt evacuationib; dissolu-  
tiones: ac tūc præsertim, quādo humores sūnt  
ad ventriculū. Ceterū si aliquod viscus sit inflā-  
matū, aut caput doleat vehementius, aut aliqua  
aliteratio animi affuerit, aut febris ardēs in mor-  
bo crudo, magna & pestē in sanabilia ex potu vi-  
ni, huiuscemodi affectib; nocumēta proveniūt.

Iam verò qui frigidū potare nō sunt assueti, aut  
manifestē ex ipso lædunt, quicq; natura sunt frigi-  
diores, & qui in extrema sunt senectute, & loco  
degit natura frigidior, & tēpore hyberno, caue-  
re à potione frigida debent. At qui cōtrario mo-  
do se habēt, ūs intrepidē illā offerre licet. Sit autē  
vinū, in fluxionib; quę ad ventriculū sūt, calidū  
simul & tenue, quale Lesbū. In sanguinis verò  
fluxibus, crassum & nigrū, & acerbū. Ipsi autē lo-  
cis imponere oportet, vel vtriq; ventriculo, & ma-  
trici, stomacho, & thoraci, quę corroborandi vim ha-  
bent: capiti autē & fronti, præter hæc, illa enā quę  
refrigerēt. Et quibus vel in superficie, vel in nari-  
bus, vena aliqua disrupsa est, medicamen aliqd  
ex iis quę sanguinē supprimere possunt, est im-

ponendū. Porro balneū in fluxionibus ad ventri-  
culum quidem aptissimū sunt: at sanguinis flux-  
um acriter irritat. Et quicūq; ob sudoris copiā  
animi defectū patiūtur, his enā plurimū nocēt:  
vt quas potius astringere oporteat, atq; refrige-  
rare. His etiam vinū frigidum exhibendū est, ac  
nihil omnino calidū. Sed nec etiam artus ipsorū  
ligare oportet, neq; cogere ad vomitū, neq; vilo  
modo mouere. At venis refrigerantibus aditū  
præparare: aërem quoq; domus alterare frigida  
& acida qualitate, myrtorū frondibus, & vitū  
capreolis, ac rosas pauimentū cōsternentes. Ni-  
hil verò horū confert, vbi fluxiones ad ventricu-  
lum sūnt. At qui exolunt ob plenitudinē, eorū  
artus q̄ plurimum perficere oportet, calfacere,  
ac deligare. A vino verò & cibis sunt abstinēda,  
& a balneis, si febriant. Sufficit autē, si eis dederim-  
us melicratū potū, in quo ebullierit thymus,  
vel origanū, vel pellegiū, vel hyssopus. Conue-  
nit quoq; oxy meli. Quę ex matrice laborāt, atq;  
exolunt, non aliter sunt curandę, excepto quo  
melire. Fricare autē ac deligare magis earum cru-  
ra oportet, quā manus. At quibus vterus aut  
scrum, aut ad latus reuolvitur, inguinibus & co-  
xis cucurbitulas applicamus: & naribus quidē,  
ea quę fucidiū sūnt habent odorem: matricibus  
autem odorata, & ea quę laxare calfacereq; pos-  
sunt, medicamentā offeremus. Si verò ob imbecil-  
litatē ventriculi, animi sequat deliquiū, ea quę  
roborandi vim habent, oportet emplāstra adhi-  
bere: quale est quod fit ex palmulis, vino, farina  
hordei, croco, aloē, & mastice. Madefacere autē  
iis quę cōstant ex abstinētia, oleo melino & ma-  
stichino, necnō nardo, vino, & ananthe. Quod si  
exvranetur, miscere ex refrigerantibus aliqd  
cōvenit, vel vni cucurbitæ, lactucę, porulacę, so-  
lani, intybi, atq; vix acerbę succū. Aqua enā fri-  
gida plerūq; iuuat malē affectos stomacho, si  
tempestiue, hoc est, in declinatione, exhibetur:

alioqui plurimū obest. Atq; his qui os ventricu-  
li imbecillū habent, vinū calidū exhibere oportet,  
si nihil prohibeat. Plurimum verò iuuat eos  
qui sic laborant, etiam frictio extremorū. Quod  
si ex iis remediis nihil melius se habuerint, eos  
quidem qui aduētū, quamprīmū ad balneas  
ducere oportet. Qui verò aliquid frigoris sen-  
tiunt, medicamen diatrion pepercon, ipsūm  
piper solum, atq; etiam abstinū bibant. At qui  
ex inofis humoribus os ventriculi mordicanti-  
bus exolunt, hos post aquę calidę, aut hydre-  
lxi potū, fac vomere. Vacuant humoribus, par-  
tem læsam oportet modis omnibus roborare,  
partim iis q̄ admovent extrinsecus, partim  
abstinētia. Ceterum si humores adhuc in  
ventre cōsistant, minimē sanē astringere, sed tan-  
tū cōcalfacere oportet. Vbi verò multa pitui-  
ra in ore ventriculi accruata fuerit, fouere quidē  
plurimū oleo, in quo ebullierit abstinū:  
postea melicratū exhibere, in quo hyssopū, vel  
qd simile infusum fuerit: atq; oxy meli, & piper, &  
diatrion pepercon, & diosporicon medica-  
men. Victus rano in summa, inuicidū vim ha-  
beat. Quę verò ex nimia frigiditate eveniūt exo-  
lutiones, eodem modo curandę sunt, quo bu-  
limi, omniūmodi calfacientibus. Vinum igitur

Deliqui animi  
ob sudoris cura-  
tio.

Exoluti à pluri-  
tudine quomodo  
sunt curādi.

Vteri suffocatio  
non curanda.

Exolutio ab  
vtriusq; ambu-  
litatione cura-  
tio. Ventriculū ro-  
boranda.

Vinum calidū  
proponendi in  
bello ventris  
lo.

Exoluti ob pra-  
uam faciem, ven-  
tri in infusum  
ranæ, quando in  
raudi sunt.

Exolutio ab  
refrigeratione  
curatio.

Pu pro scilicet  
non abscessu,  
si totum simul  
vacuatur, vix  
dicitur.

Hydropis aqua  
nō potest totam  
simul vacuare,  
ob q̄ deliquit  
anima.

Deliqui animi  
a vacuatione  
immodica, cu-  
ratur.

Profluvia uul-  
nera sicut  
cucurbitula tu-  
cia manibus  
apposita.  
Sanguis flu-  
ens ex narib; cu-  
cubitalis præ-  
cordis ad m̄lmas  
compressa.

Vinum frigida  
temperatū, vt  
ex caridatis ac  
immodicis exu-  
rationibus in-  
flatur.

Vinum quib; non  
dandū. Propter  
potū quē  
degit natura  
frigidior, et quib;  
his q̄ propo-  
nenda.

Artus per quos  
fit fluxio, cor-  
roborandi.  
Caput esse refri-  
gerandum, vbi  
sanguis fluxit  
per nari.

eis exhibere oportet, calida temperatū: ac cibos qui calfaciendi naturā habeant: fricacēq; & calfacere a dignē simul. Quē ex calore nimio accidit de liqua animi, iis quē refrigeratū et roboratū vim habēt, curant. Statim igitur ipsos corroborabis, si aqua frigida sparsis, & stibellaueris, et os vētriculi gfricaueris, & agitauesis, vinūq; & cibo refeceris. Atqui ob inflammationis magnitudinē, aut vellemus febri malignitatē, animi defectū pantur, et in principis accessionū refrigerant, 10 us artus fricare foriter, & calfacere, crurūq; amanus alligare, & vigilas, cibiq; & potus omni modū abstinentiā precipere oportet. Optimū verō in his, quid futurū sit p̄conoscere. Eos enī qui ex siccatate in principis accessionū, defectū animi sunt incursum, optimū est p̄videre. Nam si duabus aut tribus horis ante accessionē exhibito cibo cōcoctū facili, manū ac pedes cōstrinxi iusseris, nō interibūt. Quōd si magnū imminere periculū suspicari fueris, vinū in alicū elixam infusum, dare anticipabis: aut panē quoq; ex alica. At si mediocriter expectantur defectus animi, parcendū est vino: sed sufficere tunc mālā punica, aut pura, cibus ipsis miscebis. Quē p̄ter expectationē in periculū incidit, vinū calidum, & panis est excludendus: parūq; aliquid cum eo alice calidē. Qui ob p̄cipui membri obstruktionem inquantur animo, iis oxymel dare oportet, atq; ex hysopo, origano, pulegio, & mel 20 le potum: cibosq; incidendi naturā habētes. Sed nec deterius fuerit artus perficere, deligare. Prodest etiam hysce potibus vī, qui vinū cendi vim habent, velvī qui anethum, feniculū, apium, petroselinū, ammi, daucum, & spicam nard recipiūt. Quē vbi vbi manifeste iuuerint, iam vino albo & tenui, nec admodū antiquo, est vtenū. Funt verō & in leuissimodis dispositionibus, cum vehementer fuerint, pulsus inæquales intercedentēq;. Qui ex abscissus disruptione, aut sectione exoluiti, aut ex superflua aque intercutim inanitione, h̄ quidem cōfictum optimis odoribus sunt fovendi. Paulō autē post, forbinonibus cōcoctū facilibus sunt reficienda. Si verō ob trinitatē, aut gaudium, aut timorē, aut iram, aut terrorē, exolui videantur, odoribus, & narium apprehensionibus revocandi sunt, cōgēdū ad vomitū. Eodē pariter modo, qui ex vulneribus, aut purgationib; aut dolorib; qui in articulis, nervis, & muscularib; chordis eveniūt, exoluitur, revocandi statim ab eo affectu sunt: postmodum verō, cōveniens passionalis cura asse-

renda. Defectus animiq; ex intestini laxioris doloribus, aut lei, aut similibus cruciatib; fiūt, ex patientiū lororū calefactione frictionēq; extremorū curantur. At quē ex propria imbecillitate vitiū, quē regunt corpus, eveniūt exolutio nes, ex intempere videlicet ortē, patitur a quib; vires proficiunt, cōtrariis intemperatū curandē sunt. Virtus ergo vitalis quē ex corde nascitur, ex pulsū imbecillitate cognoscit. At quē 30 ex hepate oritur, et naturalis dicit, ex sanguineis egestionib; ab initio aquosis atq; tenuibus, postmodū verō crassis, ad modū fixis. Quē ex cerebro originē dicit, quam animalē appellant, ex motū voluntariorū imbecillitate deprehendit,

De cura capitis a variis occasionib; laesi. Ga. xv.

Igitur symptomatū causē, cōgruam curationem ostendunt. Velvī si quis doleat caput, simūq; fastidiat cibos, ex fameq; sentiat mordicā nonem, iubendus est ut evomat: nam vel bilem vomet, vel pituitam, vel vtrūq;. Porro qui cum graquitate dolores capitis sunt, multitudine indicant. Qui autem cum mordicatione, vaporis humorisve acutudine. Cum pulsu verō, intam manent. Cum tenfione, h̄ quidem sine gravitate ac pulsu, spiritus statulent & crudi multitudine. Si verō cum pulsu, inflammationē corporis membranosi. At si addit grauitas, multitudine intra membranas cōtenta significat. Cū igitur omnia distinctis, causam ex qua horum singula sunt, cōsiderare oportebit. Velvī si multitudine vaporis atque humoris continetur, ad vitare oportet, nūquid ob magnitudinē febrilium humores diffusi, ac velvī effluentes, ad caput ascenderint, aut propter eius partū imbecillitatē, aut ob bonius corporis plenitudinē: hanc enim totius corporis evacuationonib; hāc difficultate curabis. Eam verō quē ex parte imbecillitate cōngit, partim quidem in cōtrarium trahendo per totū corpus, partim ipsi capiti remedia adhibendo. Atq; in contrariū quidē trahes, clysterib; acribus, nexibus, friccionib; plurimis infernarū partū, & si expedit, sanguinis aliquā tula detrahēne. Partem autē sanabis eo tempore quo ad vniuersū corpus retrahis, iis vites asperginibus, quē a capite vim repellēdū habēt: ac dein evacuationib; postmodū deusq; corroborabis. Repellit autē oleum quod immaturū dicitur, ac tum oxymel mū, tum rosacū, & quē cū quē ex capibus papaueris, & teneris olivę germinib; & lader ex corymbis, menthag; viridis, & silymbro sunt. Vtendū verō ipsis, in quib; dant crudiorē & frigidiorē, tepidus in calidioribus autē & biliosioribus, frigidus. Evacuat enī dissolutiq; oleum calidum, ipsum per se: & magis si antiquum fuerit, & Scymionis, aut anethum si usacūm in ipso fuerit. Quod si spondyliū, vel serpyllū, vel pulegiū comam, vel calanū thę, vel menthę, vel silymbrij, intus decoxeris, ita etiam crassiores succos vacuaueris. Hæc verō ipsa, virium enī aliqd mēbro imbecillo adiciūt. Quōd si etiā ex vfu videat, per nares atq; palatū expurgatio molliēda est, sternutantiūq; excitandū. Si ad balneis hominē duxeris, siccis sindonibus caput est perficiendū, salq; & nitrū, & synapi, sine oleo imponendū. Hæc itaq; sunt ex particulis imbecillitate, doloris capitis medicinæ. At quando ex magnitudine febris accidit, & medicamēta ad habere cōvenit, frigidę qualitates ac vires, & quę ex laydēlo & oxymelino, & papaueris capitulis, persuasiones cōstunt, expedit. In dolore autē capitis, q; sanguinis fluxū, aut vomitū decretoriorū significat, remedia in vestigia adiciunt: cū nō accidēs, sed talis dolor bonū existat signū. Si quidē vbi natura excretionē aliquā, ac p̄cipuē vomitum, aut sanguinem per nares fluxū molit, hoc in separabile indicat est capitis dolor. Cōsiderandū igitur ad cognoscendū crīsum, primū quidē sint febrilē species, an calidē sint, atq; vrentes: nō hæc per excretionē iudicari cōsueverūt: quāddo-

Exolutio ab calore orta curatio.

Exolutio ab frigore, aut phlegma, aut magis modis, curatio.

Exolutio ab siccitate, seu ra, curatio.

Exolutio p̄ter expectationem, obstru-  
ctio, curatio.

Exolutio ab vitiis p̄cipui obstructionis fa-  
cta, curatio.

Exolutio ex ammodica potu aut aqua in terrore, curatio.

Exolutio ab animi afflictu orta, curatio.

Exolutio ab dolore intestini, curatio.

Exolutio orta a vitiis imbecillitate, curatio.

Faciles vitiis, naturalis, ammodi vnde proficiunt, aut ex quib; agnos-  
co aerem imbecillitas posuit.

Capitis doloris per causam curatio.

Capitis doloris species sunt.

Capitis doloris ab imbecillitate, et contrariis, curatio.

Repellens humores a capite, quæ cōmode possunt.

Vacuari dicitur, terripue capiti humores quæ cōmode possunt.

Capitis doloris ex vitiis, aut febre orta, curatio.

Capitis doloris, quæ cōmode non in seipsum respiciunt. Ad vitiis p̄cipui cōmune ut dicitur per excretionem.

dum quæ molliores sunt, ac veluti fumigantes, diu durat, & sæpius in abscessus cõtenetur. Secundo loco, an morbus sit salutarius. Nam quis, obsecro, bonâ crism in morbo pncioso expectaret? Terrio ad hæc totius morbi tempus considerandum. Nam si principij vel augmenti addit signû, minimè aut statim, nec concoctionis signa in vrinis, vel spuris, vel alius excrementis cernantur, nõ est quod boni speres crism. Porro difficilis

10 ralerantia antecedit omnè crism soler. Quæ quidem si in die accidat, crism sequetur noctu, si aut noctu, in die. Si igitur tale aliquid videas, considerandum est, quonam sit aggritudinis dies. Etenim septimus dies, etiâ ex paruo nature apparatu, ad crism per excretionem mouet. Sextus verò

magno apparatu indiget, & sæpe neq; vlla in eo fit crism, nec sine periculo, nec fideliter accidit. Ergo si dolor capitis statim ab initio nõ inuasit, sicut quoddâ ipsius morbi symptoma, sed

15 in ipsa ante crism perturbatione: dein si collentiam aliquid cõdoleat, & precordia retracta sint, aut repetè supervenient difficilis respiratio, pulsusq; in tumore subito elati, uõ reciderint in paritatem, neq; debiles fuerint, statim crism per sanguinis fluxû è naribus expectanda est. Si verò

20 nõ modo nõ deciderint, sed etiâ in altr̃ atrolantur, & vlemennè assumperint, faciem iam agrotantis inspicere oportet. Nam si quod in ea membrû palpiter, aut venæ quæ sunt in temporibus pulsant, aut malè, vel nasus, vel oculus rubidior sit factus, magis etiâ talis crism est expectanda. Quod si etiâ iniuri illachrymet, vel imaginè se splendoris cernere, ac nares ipsas scalpanè, tunc nõ iam fluxurû, sed iam fluentè cõspicies sanguinè. Nec verò ex his perterrearis, si hominem desipientè, aut resiliuntè videris. Nam & hæc humorû repentiû ad partes supernas indicia sunt. Præterea si agrotus sit adolescens, aut aliqui natura calidus, aut multo sanguine abdu-

25 ctus, magis adhuc de hoc sperandû erit. Quod si sæpius etiâ antea illi sanguis è naribus fluere est visus, hoc vel solum sufficit fluxus sanguinis spem cõfirmare. Si verò & tñpus anni xras sit, vel calidus oculi sitatus, & si plures eo tẽpore crism ex sanguinis fluxu habuerint, ægrig; corpus plenû exstiterit, & consuetæ excretionis retentæ, hæc inq; omnia spem vehementius augebû.

Has itaq; & alias excretiones omnes prænosce-  
30 lacer, si hæc duo tantû exploraverimus, & vnde nature motus agatur, & in quam partem. Si quidem quæ deficiunt aduabimus, & quæ immoderate feruntur, cõtrecabimus, si ista nouerimus. Veluti cõsistent sanguinis fluxus ex splene magnæ cucurbitæ sinistris præcordiis superpositis, facile retrahunt. At qui ab hepate proficiû, dextris. Qui ab aliis membris, eadem ratione.

## GALENI PERGAMENI de arte curatiua ad Glauconem, lib. II.

### CAP. I.

DE istis autè quæ in singulis corporis partibus sũt passionibus, deinceps sumus dicturû, ab inflammatione auspiciat: qd si prius hæc accidat, plurimèq; ipsius finè differet, ex quarû singulis solent febres oriri. Cõmu-

nis igitur in omnib. est immoderata caliditas, & veluti quoddâ effluenscentia, vnde & phlegmones nomen de ipsi efferte veteres conueuerû. Propriam autè quandam in singulis differentiã

10 luvenis, ex qua eius speciem agnosces, & conuenientem assequeris medelam. Porro prima in inflammationis differentia est, secundâ quâ hanc quidem humidam, illam verò esse siccam cõn-  
15 git. Humidâ quidè, quæ ex calida fluxione membrum occupat accidet. Sicciâ verò, quando nullo humore influente, calor naturalis effluenscit. Hæc autè, vsq; ad aliquand quidem, veluti febris est membrum. Cum verò iam ad immoderatè caliditatem ac siccitatè penerint, corruptio atq; extenuatio omnimodo fit. Rursus illius differentia

20 qd cû humorû affluxu accidet, multæ species existunt. Nam fluente sanguine, altera: flaua bile, altera ambobus simul, alia tertia. Et quidem in earum singulis, vel iam putruit id qd induxit, vel in membro impactum putrefcit. Præterea vel crassum est, vel tenue, vel optimum, vel deniq; acre. Sanguine igit optimo ac mediocriter crasso ad patriculâ aliquâ consuetè, atq; ob multitudine

25 cõcalcat, vchemens dolor arripit hominè, nisi hebetis sensus ipse fuerit particula: pulsusq; in profundo permolestus sentit, tendiq; omnino & cõrundi membrû apparer, cum vehemènt incendio, remittit, & rubore. Quæ sanè passio totius generis nomen recipit, inflāmatiōq; vocat, ex omni ferè occasione pueniens. Quippe vulneri-

30 bus, distentionibus, disrptionibus, contusionibus, scissuionibus, exercitiõ laboribus, excitationibus, ac præterea fracturis, & spontaneis vlcibus aduenit. Quinetiam si quando immo dicam plenitudinè veng ipse cõtrahant, tunc id quod superflû est, effundit ad aliquâ partem, quæcumq; eo tempore fuerit aptior ad recipiendum. Eadè namq; erit reliquis omnibus imbecilior, vel rarior, vel ad motum procliuior, vel minus uobilis. Flaua verò bilis, quando pro priam naturâ seruans, vñ cum sanguine per totû corpus defertur, morbum regij product. Cum autem seceruit sola, in aliquamq; decumbit partè, herporem gignit. Cæterum si sit cõsistenna crassa, totam exulcerat curim, vsq; ad carnem subiectam, qui affectus herpes exedens vocatur. Si vero tenuior fuerit, id quod in superficie est tantum, veluti dunt: quæ species generis sortitur appellationè, quum simpliciter herpes dicatur.

35 Nam ex reliquis speciebus duabus, si illa quidè cuius nomen mentio fecimus, vocatur herpes exedens: altera verò, miliaris, quod in ea pustulæ parue ac multæ, per summâ quodam similes milio, exantentur. Fit autem herpes huiusmodi etiâ ex bile quidem, sed minus calida & acri, q; illæ species priores. Quod si ex sanguine & flaua bile turbidioribus quàm oporteat, mista ipsa fluxio fuerit: aut ex sanguine quidè, sed seruido, & substantia tenuissimo: erysipelas hic affectus vocatur, multo inflāmatiōe calidior, magisq; flauis colorè referens. Non doler tamen affectus hic, quemadmodû inflāmatiō: nec vt aliqua inflāmatiōis species pulsus, aut cõpressionè, aut si mitem in veluti tensionè. Cæterum interdû miscetur inflāmatiō cum erysipelate. Si igit in m-

Inflammationes  
sunt omnes, et  
ex omni caliditate.

Inflammationis  
potest differre  
ita.

Inflammationis  
quæ cum afflu-  
tu humoris in-  
flamat, multi-  
plex differentia.

Inflammationis  
orta à sangui-  
ni inducitur.

Inflammationis  
causa.

Recipiens for-  
porosa parti-  
cula, quales ne-  
cessario esse do-  
beant.

Regij morbi  
productus.

Herpes gene-  
ratur.

Herpes exedens  
unde accidet.

Herpes miliaris  
unde exorta  
tor.

Erysipelas unde  
designatur.

*Erysipelas phlegmonosus quod dicitur accider.*

*Phlegmonis erysipelatos quod dicitur.*

*Erysipelas phlegmonosus quod dicitur.*

*Carbunculus generatus.*

*Bubo quid.*  
*Phyma quid.*  
*Phygelion.*

*Ophthalmia quid.*  
*Pleuritis quid.*

*Synanche.*  
*Pneumonia.*

*Inflammatio causa una est fluxio.*

*Inflammatio per alio.*

*Evacuatio corporis quod sunt primum consideranda.*

*Genua collima.*  
*is curatio.*

scella ipsa experiet propria erysipelatis accidentia, affectus is erysipelatis inflammationis participes nominantur. Si vero inflammatio erysipelato des. At si accidentia vniuersa esse appareat aequalia, tunc erysipelatis & inflammationis ex aequo mixti dicuntur. Exquisitum itaque erysipelatis, cutis solus est passio. Non tamē ipsa inflammatio pertinet tam rari ad cuti subiecta partem, sed ad has quidem præcipue: nonnullis verò etiam ad cutem. At verò si sanguis in illius calidus sufficiens fuerit & crassus, quodcumque membrum iuxta fuerit, hoc exvirendum, viciis cum crusta excitat: quicquid autē circumiacet, in inflammationē atollit effluenscentē, graviterque dolentē: qui affectus carbo appellat. Similiter etiam, si sanguis influens niger extiterit, crassusque & faculentus, & serues, simul aut & sanie quandā tenuem admixtam habuerit, pustulas per summā cutis exciunt, similes inque ex igne sunt. Quibus disrupis, crustosum sub ipsa viciis invenit. Qui affectus enī est carbo. Phlegmonis itaque in hac species vniuersales distinguunt, ad quas nimirū referuntur ab omnes paraculæ. Etenim bubo, phyma, & phygelion, glandularum affectiones existunt: bubo quidē, inflammatio: phyma, quod statim augetur, atque ad suppurationē festinat. Phygelion autē erysipelatis participes inflammationis, aut in inflammatione erysipelatis participes nominantur. Sic enī & ophthalmia, eius membraneque corneae inhaerent, est inflammatio. Pleuritis verò, costarū succingentis membrane. Quemadmodū & synanche gutturis: atque peripneumonia, pulmonis. Eas igitur quæ in partibus apparentibus conspicuntur inflammationes, promptū est quidem cognoscere. Quæ verò in occultis, & febres omnino afferunt, non æque discerni possunt.

De causis inflammationum. Cap. II.

Ei autem una quidem apparentis inflammationis causa, ceteris non visquædam occulta, quæ fluxio appellatur: nisi quando eas coniungatur, quæ aliqua alia ex causa evidente, facite videmus. Cum enim nulla ex his præcedit, repente membrum inflammationē patitur, ea quæ hunc affectum pignit causa, fluxio vocatur. Affectus autē ipse, dispositio rheumatica. In curatione cuius, duo magis committantur errores, vbi statim in ipsis auspiciis, vel nulla de toto corpore providentia habetur: vel ipsum calidum, atque humectatur membrum. At qui rationē simul & experientiam sequunt, si totū in primis corpus vacuare quibuscumque evacuationibus. cōsulant: ipsam verò inflammationē paritē, persolvende, ac superfluitate eia, quæ quid influit repellendū vim habent: ac denique quod in membro patitē cōtinetur, educere: vniuersa ac robre aduungere iū, quæ iam affectu sunt partibus. Verū ut recte quis vacuatio sit vitatur, ætatem, anni tempus, regionē, præsentem aeris statum, robur eius qui afficitur, habitumque & consuetudinē, necnō ipsius morbi naturam oportet considerare. Ex his namque, quando vacuandū sit, aut minime, et vnde, & quomodo, invenitur. Si igitur ad genu fluxio ferat, atque id plenitudo atollatur, præterea totū corpus sanguine plenū appareat, & valida laborantes vis,

tempusque ante sit ver, & temperata regio: æger verò sit adolefcent, aut iuuenis sanguinis evacuatione ex superio ribus partibus. iudicet: oportet eius incidere in cubito venā, aut iacularetur interiorē, aut incidit: cum semper fluxionis motum ad contrariū revelare oporteat. Ipsi autē la horā particule, si quidem non admodū doleat, emplastrū ex sempervivo, & cornibus puniceorum maiorum in vino decoctis, & rhu, & farina hordei cōstans, est admoventum. Hoc siquidem repellat quod influit, atque id quod contineat excicat, & circumiacentia membra corroborat. Cum magno autē dolore fluxio incidente, sufficit vehementi doloris lenire, cum aliquo ex his, quæ ex vino dulci, oleo rosaceo, & pauca cera, in vitro liquata, cōstant. Oportet autē hac lenius excipere pinguibus, quæ plummū habeant: ætate autē quidem frigida, hyeme autē tepida apponere. Sic enī cataplasma ex arno glosio, leute, pane, & tolosco oleo adhibere: paulo verò si pra patientes particulas admovent spongiam vino austero intinctam, aut aqua frigida, cui missum partem aceti fuerit. Quod si ex hac medendæ ratione magnus visus fuerit, nec alibi pus se ostendat, ruilibus medicamentis ad fluxiones vitandum. Optima verò ex his sunt, quæ excuciant & repellendū quod influit, sine dolore vim habent. Quemadmodū ea quæ vehementer cōtendunt, atque idcirco dolore afficiunt, plus doloribus obviunt, si excuciendo proficiant. Tale igitur sit medicamentum, quale est quod ex chalcide cōstat, remissum oleo rosaceo. Si vero laam mundā visus acerbis humectans apposueris, plus iuvet. Quod si pus in particula ostendit, cataplasma offerre oportet: si mel aut ius. Plus verò ad prægens iuvat farina hordeacea. Adaugendum tamē aliquid vel acetū, vel vinū. At posthūc, si excucis, & pus evacuaues, cavendum est deinceps, ne oleū aut aquā imponas. Quod si quando vultus abluere oporteat, melicrato, vel oxyrato, & vino, & mulso est vitendum. Superponendum verò, si adhuc inflammē, ex lenie cataplasma. Si verò abigis inflammationē fuerit, aliquid ex his medicamentis, quæ emplastica nominant, & præcipue quod ex chalcide cōstat, imponenda autē super hoc extrinsecus, spongiam, aut lana vino acerbis infusa: ad quæ quidem opportunū est, quod aqua marini recipit. Vultus autē nullum ex pinguibus medicamentis est admoventum: quandoquidē exquisitē excucare expedit. Ac sic sane sanare oportet inflammationes ex fluxione ortas. Quæ verò alia de causa sunt, humectare cal facere, nihil prohibet. Quas quidē si perducere ad suppurationē volueris, cataplasma ex farina triticea, quæ in oleo & aqua bullierit, est apponendū. Quod si quando scarificare oporteat, ne hoc quid vitandum est. Si vero eas quæ ex fluxionibus sunt inflammationes scarificaveris, magis adferet malū, ac per inania præsentis. Quæcumque aut ex ipsis, iam inveterate existēs, post totius corporis evacuationē, quidam durities atque nigrities retinet, ab his per scarificationē sanguinē auferre uil. phibet: & emplastrū ex farina hordeacea, & ceratū, & aliud ab quod medicamen ex discutiens, admovent. Non tamen ex vna

*Remissum spongiam lavandū esse in oleo rosaceo, cum in cubito capillatū commovetur.*

*Genua inflama. is dolorem augent lenius, hyeme quibus calida, ætate parit admovent de frigida.*

*Superficies esse appropinquat per se partem partem la.*  
*Non tamen de partem quæ munda membra cōtinent.*

*Vultus, si visus po re, quibus sit admovent.*

*Superficies inflammationem em gerre cataplasma. ita re ferat triticea, quæ in oleo rosaceo bullierit.*  
*Inflammationes quandoque per scarificationē.*

ex vena in talibus sanguis necessarii mittendus est: sed ventrem tantummodo expurgare sufficit, medicamine quod bilem flauum educat: vel solo clysteri acri, si affectus ipse sit parvus. Quæ verò ex vlcetibus sunt erysipelata, & quæcumque adeo manifestas causas sortiuntur, si statim volueris cataplasma apponere ex farina hordeacea, & præsertim si ante scarificaueris, nihil nocebis. At inflammationibus quæ cum erysipelate sunt coniunctæ, & erysipelatis cum inflammatione, adhibenda mista curatio est: semperq; illi, quod magis præpollet, testis dandum. Herpetes autem, quantum ad tonus corporis evacuatione attinet, vt erysipelata curare oportet: quantum verò ad eam quæ patienti debetur particulæ, non omnibus similis cura adhibetur. Nam qui exedentes sunt, refrigerantia quidem desiderant, quemadmodum alij herpes, & erysipelata: non tamē ea ferunt medicamenta, quæ præter id quod refrigerant, humectare etiā sunt apta: sed sola admittunt refrigerantia, quæ maximè excicare possunt. Quare superimponere ipsis oportet, ab initio quidē ex vite capreolos, & folia rubi, & rubi canini, & plantaginis. Post hæc verò & lentē adiungere oportet, & aliquando mel, & hordeaceam farinam, quodq; antea scripsimus ad inflammationes quæ ex fluxione eveniūt cataplasma, dempto ab eo semper vino. Ipsas verò partes exciccratas in vngue medicamentis, quæ ad herpes in phararmacuticis libris descripta sunt: quæ quidē, vbi vti volueris, ex vino dulci, aut tenui & albo, & subaustero, minimè tamen acri, liquefacere oportet. Quod si postea aquosa vice horū aliquando visus fueris, nihil deterius feceris. At in longum tēpus protrahis vlcetibus, ad id vina sufficenter austera cōveniunt: præcipue verò nigra. Quo tempore ipsis etiā medicamēta congruūt, quæ ad Polyidiam, Pasionem, Musam, & Andronem relata extit. Herpetes verò qui summa tantummodo exulcerit, nisi diu perdurauerint, nulli horum invingere oportet (advenit enim fortiter, & vehementer excicat) verū istis sufficere, quæcumq; vim glaucij habent medicamenta. Quæ quidem aqua diluenda sunt, vel aceto, si nil ex aqua profecerint. Quod si etiā solani succo innixens, vel amigdalosus, plus etiā cōferat. In summa verò, omne vlcus excicari possit, idq; medicamento neutiquā urriante, nisi vbi malignum, putrilaginosumq; ipsum vlcus fuerit. Talis siquidem, acriora medicamenta postulat, & quæ igneas vires possideant: quale est misy, dialctis, arsenicum, calx, atq; sandaracha. Sepe verò vbi ista cesserint, admouemus ignē. Eadē ratione vto caris carbonibus, super ipsam crustam, huicemodo medicamentorū est natura cōveniens. Non tamen loca circumiacentia tangere expediat, alioqui diffusio loci, exulcerans quæ minimè expediat. Sed Andronem trochiscis potius vendū est. Si quando verò invaluerit rubor, plurimūq; inflammatio, medicamentū ipsum dulci diluendum est, vel succo plantaginis: quemadmodū si magnus tumor simul insisteret, vino quidem aceto in principio, postmodum verò & aceto. Cataplasma etiā ex ocoibi farina & oxymelite confectum, est apponendum: atq; ante hæc omnia,

statim ab initio tantum sanguinis auferendum, quantum sit satis, nisi quid aliud prohibuerit. Hæc itaq; sunt passionē per genera curationes, quæ pro naturæ instrumētōrū patientium varietate mutantur. Quatuor autē ab his indicationes inveniuntur: ab eorum nempe temperie, a formatione, a sita, ac deusq; a facultate. Oportetq; in curationibus intentionem habere ad membrum naturam: hæc enim, quo usq; infrigidandū, aut excicandum sit, docet. Nam si carnosæ partes inflammationē patiuntur, paulum sunt excicandæ. Venosæ quoq; quævis sunt carnosæ longè sicciores, non tamen & ipsæ multū excicari desiderant. Sed quæcumq; natura arrenosæ sunt, magis venosæ sunt excicandæ: atq; his amplius nervosæ: & multo magis carnaligulosæ, ossicij. Et enim priusq; ad scopū naturæ particula redeat, nondum curationi est impōssibilis. Porro sicciorē temperantiam inducunt, quæ sicciissima sunt: & frigidiorē, quæ frigidissima: & secundum alias qualitates eodem modo. Ad mediocrē verò habitum referūt, quæ sunt in vnaquaq; medietate. Ac sic sanē partium temperaturæ, curationes affectuum variant. At formationes hoc modo: Nam quædam intra sese habent cauitates: quædam extrinsecus, quædam vtrobiq; quædam neutra in parte. Quæ igitur neutra ex parte cauitates possident, in quas fluxio recipi possit, eas partes fortiter excicare oportet, vel si non fuerint natura sicciores: vt venosæ, & præcipue qui in artibus sunt. At quæ intus & extrā relaxatæ aliquid possunt inflammationis, non multum huiusmodi fortiter excicantibus egent: præsertim laxam carnē habuerint, quemadmodū pulmo. Indicatio autē ex posita, loca per quæ sit vacuandum, & quo pacto, demonstrat. Fluentium ergo humorum, revulsio medela est: deriuatio autē, eorum quæ iam obfcederint membrum. Vtrūq; autem evacuationis genus per cōmunes venas molendum est. Si quidem a matrice reuelles, si eam quæ in cubito est, venā secueris: aut & iuxta mamillas cucurbitas admoueris: vel manus & calceferis, fricueris, deligaueris. Denuabis autē, si eas quæ in poplitibus sunt, aut in talis, venas dimiseris, & \* feminibus cucurbitas admoueris, & crura calcferis, perficaueris, atq; vinculo exceperis. Et si quidem in parte dextra matricis ipse affectus consistat, a dextra manu, vel crure, sanguis est detrahendus. Sin verò in sinistra, a membris quæ illi ē directio sunt. Ceterum in teriores venas tunc incidere oportet, quod viciniores, magisq; ē directio sunt patientibus membris. Similiter si liene inflatio sanguinē vis detrahere, interiores in manu sinistra venas secaro: vt si hepate, eadē ratione in dextra. Si quid verò ex superioribus inflammationē patiatur, veluti in ophthalmia, & angina, in ceterisq; insensibilibus caput, eas quæ extrinsecus sunt, atque ē directio, perturbando. Si verò artus patiant, a cōiugatis membris sanguis detrahendus est, siue reuelles, siue deriuare sit animus: præterq; vbi passio fuerit in veterata: tūc quippe a membris ipso patiente detrahimus. Sic ergo in angina eas quæ sub lingua sunt venas incidimus, vbi totum corpus vacuū cū sit, \* producit ipse affectus. Sic

Indicationes  
quæ sunt  
ab affectu partium.

Natura partium  
affecta quid ad  
docet.  
Partium inflammatorum  
quædam magis, &  
quædam sunt  
excicandæ.

Temperaturæ  
partium, curationis  
natura affectus  
variatur.

Formationes  
partium  
quædam curationis  
variatur.

Situm partium  
affectus, quod  
indicationem  
revelat.

Revulsio est  
fluxio humorum  
mediculis: vt deriuatio, tunc quæ  
iam obfcederint  
partem.

Revulsio et  
deriuatio a matrice  
quæ, si sit  
medela.

Loca inflammationis  
inveniuntur in  
sinistra manu  
venas secantes  
esse: vt in dextra,  
si hepatis  
fellea fuerit.

Superius partium  
inflammationem  
curationem a venis  
directis illi  
inducit esse.

Angina in  
sinistra manu  
venas secantes  
esse: vt in dextra,  
si hepatis  
fellea fuerit.



Scarificatione  
quando ritien-  
dam.

Vacuatio in  
quoniam modum  
singula parva  
debent.

Alii remedi-  
ta afflicta va-  
lentiora medi-  
camentis exi-  
gunt, quoniam si  
in superficie ef-  
figuntur.

Ventriculo sti-  
machique aff-  
licto, sola talia  
exhibentur, que  
liba ab afflic-  
tus extrahit.

Partium diffe-  
rentia.

Principia facit  
parum videtur  
si corpus sunt,  
hupauer, corre-  
bri atq. reser.

aliud quodcumque membrum affectum scarifica-  
mur, si non amplius humores insiluant (tunc e-  
nim magis irritaueris, ipsiusque duplicaveris ma-  
lum) verum ubi vniuersum corpus iam expurga-  
tum fuerit, nec quicquam præterea insiluit, sed quod  
prius influxerat, iam hæret in membro impa-  
ctum. Et quidem laborantibus convexus hepatis  
partibus, quod per vinam trahere oporteat  
concauis autem, per subductionem alui, sinus ipsius  
visceris indicat. Atque etiam thoracem, pulmo-  
nemque, per tuiles expurgari debere: venter  
& stomachum, per vomitum: intestina per cle-  
ctiones: quemadmodum per vrinam, & plenem,  
& renes: matricem autem, per menstrua: cerebrum  
atque eius membranas, per palatum, gargareonem,  
nares & aures. Sed & quod his que in superficie  
sunt partibus, talia medicamenta apponere opor-  
tet, quilibet eger passionibus autem que in pro-  
fundo sunt sit, & quas per multa interposita de-  
bent eorum virtutes attingere, non qualia nunc  
sunt, sed qualia futura sunt, ex his membrorum  
agnoscimus. Tanquam quippe ad veniunt robo-  
ris adiungere oportet medicamentis, quantum  
in transitu exoluitur: ut quod relinquatur, æqua-  
le remaneat, quod tactu inuatur. Ob id igitur in  
thoracis inflammationibus, que in superficie  
constitunt, ea que solida laxare possunt, suffi-  
ciunt: intrinsecus autem, sicuti in costis engen-  
te membrana, requiruntur acriora. In vniuersis  
autem visceribus eadem habenda est ratio. Sa-  
pius enim ex medicamentis impositis viceratur  
cutis, quamvis durior, minusque ad patendum  
habilis sit, quam viscera. Quod si ipsis visceri-  
bus medicamenta applicare possemus, quibus  
frequenter indigent, tanto molliora oporteret  
esse, quæ ipsorum natura, ut afflictaur, est prom-  
ptior. Quia verò hoc necnitiqum nobis datur,  
ob id nimirum, que eduntur ac bibuntur medi-  
camenta, conferentia affectibus visceri, ea mul-  
to acriora & potentiora esse cõueniunt, quibus  
indigent ipsæ partes affectæ: exceptis tamen il-  
lis, que ventriculo stomachoque auxiliantur. Hæc  
si quidem sola talia exhibentur, qualia in passio-  
nibus exiguntur. Reliqua verò omnia, acriora  
& fortiora sunt, & præsertim que vel renum, vel  
pulmonis occasione sumuntur. Sed indicano que  
a facultate sumitur, etiam curationem immutat.  
Nam ex partibus corporis nonnullæ ab influen-  
tibus virtutibus gubernantur, quedam verò à  
propriis atque naturis. Atque ut ipsi, quedam si-  
bi ipsis duntaxat, quedam etiam aliis fons & ori-  
go sunt facultatum. Et alia quidem opus pecu-  
liare habent, alia autem cõmune. Permutare ita-  
que opus est curationis formam, pro ratione ha-  
rum omnium differentiarum. Nam pleraque ex  
remediis dictis, morbum quidem finiunt, sed na-  
turam membrorum facultates offendunt: que quid-  
em offensus ad totum pervenit corpus, idcirco  
ratione duplici: vel quia membrum est aliusvis  
ratis origo, omnibus partibus cõmunicat: vel  
quia ipsius opus vniuerso corpori est utile. Etenim  
hepar, cor, cerebrum, atque testes, cõmuniter  
vniuerso corpori principia sunt facultatum. At  
ventriculo matricique, propriæ facultates insunt,  
nulli alteri parti cõmunes. Opus tamen ventris

quidem toti corpori confert, matricis autem ne  
quaquam. Quæ igitur immodice laxant, exol-  
vunt robur, quare & facultatem particulæ. Quæ  
autem supra modum refrigerant, vniuersum calo-  
rem extinguunt, qui fortassis substantia facultas  
tum existit, aut certe primus & maximè necessa-  
rium instrumentum ipsarum. Nonnullæ etiam alie  
qualitates: ut immoderate, facultates exolvere  
possunt. Ad hanc autem indicanonem, quispiam  
referre posset & facilem & difficilem sensum. Ete-  
nim quæ facile sentiuntur partes, acriter medicamen-  
ta non tolerant, licet neque acres humores. Ob  
idque os ventriculi, atque eo magis oculus, infesta-  
tur ab erodentibus medicamentis. At quæ sen-  
suum obtusum habent, cataplasmata graui susti-  
nent, atque medicamenta mordacia. Qui igitur fe-  
cundam solam, videntemque intemperiem ab his hu-  
moribus affluxu sunt morbi, per contrarias qua-  
litates curantur: ut (exempli gratia) calida intem-  
peries, per refrigerantia, siue primò, siue ex acci-  
denti refrigerentur. Perfusio quidem frigida, cal-  
facit ex accidens, ubi caloris reuocationem fece-  
rit: calidumque refrigerat, ubi calorem naturalem  
discussent. At quæ ob materiam influxum labo-  
rant, si quidem fuerint optimè temperata, solam  
evacuationem desiderant: si verò dis temperata  
sunt, vniuersum evacuationem. Per contraria qua-  
litate alteratio non possibit. Sed tam dicamus  
de ædemate.

#### De ædemate. Cap. III.

Oedema est mollis quidam tumor, atque dolo-  
ris expertus, ex pituitosa substantia, vel spiritu va-  
poroso ortus: qualis in cadaveribus, & pedibus  
hydropicorum & tabidorum plerumque cernitur. In  
hisce tamen morbis oedema symptoma est, pro-  
pria curatione non indigens. Sola quippe frictio  
ex oxyrhodino, aut ex sale & oleo, compescit li-  
psum. Cum vero propter influxum pituitæ in ali-  
quam partem gignitur is affectus, ipsaque re-  
centi, imbura oxyerato, quod possit bibi, eum  
sedat. Quod si ex his non discutatur oedema, a-  
luminis parum est adiucendum. Si vero in ali-  
quo artuum tale fuerit oedema, mœdoanda liga-  
tura est ab imis partibus, finiendæ verò in alto-  
ribus: vniuersam iniectionem & compressionem  
facientibus molis, vel vniuersa fractans. Quod si  
morbus diutius remedium non cedat, aliquid for-  
tiorum medicamentum adiciere oportet, cui discuti-  
endi simul & consurgendi facultas insit.

#### De scirrhus. Cap. IIII.

Exquisitus scirrhus est tumor præter naturam,  
insensatus durusque. Non exquisitus verò, non  
omnino insensibilis est, difficulter tamen omni-  
no sentit. Porro insensibilis scirrhus minime cu-  
rationem recipit, qui verò cum difficultate sen-  
sit, nec incurabilis est, nec facilem curationem  
admitte. Fit autem ex humore viscido & crasso  
tenacissime partem, in duris infuso. Scirrhus  
itaque interdum ab initio conerescit, atque augetur  
paulatim. Crebrius verò insensibilis medicorum pa-  
ratur, ubi vehementer erysipelata & inflamma-  
tiones attingunt refrigerantque. Quod si quis  
fortiter discutiencia in duris medicamenta ad-  
hibeat, digeret quidem tenuiora: quod verò re-  
li-  
quid est cõpactum, lapidis instat, relinquere. Non

Leuissimus  
dicitur, emolui-  
rebet, atq. ef-  
fusiorem por-  
tione.

Sensu acutissi-  
mo præditi, o-  
mnia indicant  
ta non vident,  
ut ea que in-  
fusa obrem in-  
fusa.

Frigit per se  
fusa calidæ ex  
accidens.

Calidum re-  
centi re-  
centi.

Oedema quid.

Oedema in  
quibus sympto-  
matibus  
Oedema re-  
centi re-  
centi.

Scirrhus quid.

Scirrhus insen-  
sibilis, non  
sensibilis recipit.

Scirrhus quid.

Scirrhus quid.

Indurati quibus medicamentis curantur.

Medicamenta ad duritiam. Aliqua differunt.

Indurati quibus medicamentis curantur.

Indurati quibus medicamentis curantur.

Indurati quibus medicamentis curantur.

Indurati quibus medicamentis curantur.

Indurati quibus medicamentis curantur.

Indurati quibus medicamentis curantur.

Indurati quibus medicamentis curantur.

igitur curande sunt indurare particule medica-  
mento siccitae immo dact, sed emollit, quodq;  
calorem possidet tepidum, humiditatem vero  
nec multam, nec omnino minimam. Si quidem  
quod superfluum humorem habet, nihil omnino  
diffusit: quod vero minimum, plus quam  
oportet excicat. Ergo medicamenta idonea scir-  
rhus sunt omnes in dactile atq; adipos. Ex medul-  
lis primas partes obtinet cerum, dein vitulina.  
Ex adipibus, asinus leoninusq;. Ar vero qui  
ex gallina fumit, asinus: qui ex pardo, leon-  
um sequitur: postea vero vrinum, atque tauri-  
num. Ceterum qui ex capris accipit, & crassior,  
& siccior predictis efficitur magis, si ab hisco ca-  
piatur. Porro tendonibus induratis oportet va-  
ni cum praefidis iis quae simul & emollant &  
digerant, (cuiusmodi sunt, idellum, ammo-  
niacum thymiana, solutū in quom accerimo a-  
ceto, opopanax, chabbandmq;) etiam pyriti-  
lidem candentē, aut si eius copia non sit) mola-  
rem, acerrimo aceto aspergere, ac dein super i-  
psum dimovere partem affectam, vt a vapore  
sursum elato, scirrhus dissolui possit.

De splene icoreq; induratis. Cap. v.

Induratum splenem, nō tantū foris, foribus  
medicamentis curare convenit, sed inane enam  
portionibus velamentisissimis: nam eas sine mo-  
lestia tolerat. Inter quae sanē primas sibi vendi-  
cant partes, cortice radicem capparis, & scolop-  
endrij, & myrtice rami radix, nam germina, om-  
nia videlicet haec in vtero et oxy-melate cocta. At  
speminiore splenem, cum tangitur, renitit videtur,  
nō ob scirrhum, sed ob struēnto tumore. Tūc igitur  
vbi ipsū abstinēdo decocto fouetis, aliq; quod ca-  
taplasma mīnis facultatibus praedictum superim-  
ponet: quale est quod ex sulfure & alumine co-  
stat. Verūm vbi lien in scirrhum obduraui, praepo-  
llere vim digerentem oportet: parum autem eius  
quod astrigēdū possidet facultatem, est  
admiſcendum. Merito igitur salis bos indura-  
tos splenes sanant, si extrinsecus ipsis in vesica ap-  
ponantur. Porro hepari scirrhum, in iū dū quidē sa-  
nari nō potest: in veteratū autem, neq; ipse potest sal-  
nare, neq; aliū vidi qui posset. Quippe omnibus  
ita affectus omnino aqua inter cutem subsequit.  
Nec verō perferit hoc viscus foris medicamen-  
ta, vt splen. Quare si sit indurātū, augere oportet  
ea quae rane inflammationis illius apponun-  
tū, in mīstura emollitioris: adhibita enām  
cōgruente victus ratione, vñ cum potu omnibus  
& dissipantibus, & abstergentibus eam, qui in  
viscere continetur, humorem. Admiscere autem  
oportet, & ex iis quae crece possunt vrinam, ali-  
quid. Iam verō in omni struēnto tumore, astri-  
gere corpus est vitandū, extenuandū sūt  
ipse crassus spiritus. Si igitur subiliori aliquo  
medicamine anodyno, vbi dolor addit, collesce-  
rit, id quidem quod densū est, rarefacies: exte-  
nuabis verō, quod crassus est reddidit. At partiē-  
tem particulatim namque, coincidit conueniē-  
tem a auxiliōri materiam, in ipsius maiore mīno-  
risq; rationem. Ac secundum differentias earū-  
dem, materiam etiā curationis variat, intensi-  
tatisq; ang remittit. Si igitur a crasso spiritu ob-  
statur dolor in ventre inferiore, subtile oleū pre-

lūm, vñ cum medicamentis quae in ipso ebulli-  
runt, per chylerem inuacens, itam hunc dolorem se-  
dabis. Quae verō debent bullire in oleo medica-  
menta, cum partium tenuitate calfacientia, sunt  
cumini, apri, petroselinū, marathi, sinonis, ane-  
si, libyfici, felleos, dauci, atq; pōndijq; semen.  
Quōd si consuetudo comprehenderit frigidam  
esse dolentium partium dispositionem, rutam  
& marahū, & grana lauri usque decoques: mi-  
serabisq; asphaltum, ipsūmq; oleum laurinum, &  
si quae similititer calfaciūt. At si inflammacionem  
doloci adiūctis putaueris, auferes ea quae ad-  
modum acra sunt, quaeq; calfaciunt impetius:  
ad relaxata verō, quae vires illas mediores pos-  
sident, transibis. In oleo itaq; anethum coques,  
miscabisq; adipem asinū, vel gallinacū. At  
verō mediciores dolores extrinsecā tantum cal-  
factione iuuantes, emperici quae ex milio sit  
vel ex sale calfacto, vel ex lino semine crudo. Cu-  
rabitur etiam magnus cum multa flamma absq;  
cuncta scarrificacione, scarpus statim dolore amo-  
uit, vmbilico admodum. Quōd si etiā rō dolores  
permanerint, vñ medicamentis ex opio ne dubi-  
tes, quale est quod ad Philonē refertur. Sic enim  
hominem liberaueris a cruciatu, & sequentibus  
diebus noxam ex opio cōtrafactam, corriges. Au-  
ferentem id genus medicamentis dolore, non  
tamen dispositionem sanant, sed vim sciendū  
quodammodo struēntum. Vñ autem oportet  
Philonem medicamentis, omnibūq; ex opio con-  
fectis, non statim, sed post tempus compositionis  
annuum, aut omnino seminare. Non modica  
verō sit vrinis distributio, & ex cibis ad  
inferiores intestinorū partes, dum afficiūt: &  
ex his quae ingiuntur per sedem, ad superiores,  
vbi dolores cruciantur. Porro discutiedū statim  
in pambus carnosis collecto (qui & nōnunquā  
vacat dolore, & longiori tempore durat) ea me-  
dicamenta cōgruant, quae insigniter subili-  
cant substantiam: cum quibus misceri debent, quae  
molliendi facultatem sūntur.

De abscessibus. Cap. vi.

Dispositiones in quibus a se invicem distant,  
quae prius se contingebant corpora, cōmū ter  
abscessus vocantur. Spedum igitur vacuum in  
medio fieri oportet, quod aliquam substantiam  
spirituosam, aut humidam aut multam ex vris-  
que comprehendat. Quae substantiae vbi diutius  
harent, varias alterationes suscipiunt. Nam &  
lapidibus, & arenis, & testis, & lignis, & carbo-  
nibus, & limo, & amarca, & permixtis aliis id  
genus similia in abscessibus corpora saepe  
contineri videntur. Transiunt verō in abscessum  
inflammationes quaedam, atque erysipelatosae  
phlegmonae: sicut & erysipelatosae phlegmonae  
non paucae: nimirum ab vno loco humoribus  
translatis in alios. Quae igitur per summam, sub-  
cute consistunt, facilius cognosci possunt: neq; est  
sahatio ipsorum difficilis, cum solis medicame-  
tis quae extrinsecā applicantur, curentur, nec  
medicamentis intus assumptis indigent, veluti  
quae in visceribus accedunt. Curatio igitur earū  
quae in superficie cutis abscedūt inflammationē  
firincipiente quōdā iam abscessu, per ea quae do-  
lorem sedant relaxantq; procedente verō tem-

Flatus distendi medicamentis.

Dolores vñrū medocum vñrū.

Curabitur etiam magnus cum multa flamma absq; cuncta scarrificacione.

Opio recipiunt medicamenta.

Opio recipiunt medicamenta.

Opio recipiunt medicamenta.

Opio recipiunt medicamenta.

Opio recipiunt medicamenta.

Opio recipiunt medicamenta.

Opio recipiunt medicamenta.

Opio recipiunt medicamenta.

Opio recipiunt medicamenta.

Opio recipiunt medicamenta.

potest, ad ea que cōcoquendi, suppurandiq; vim habere dicuntur, trāsferri oportet. Statim igitur a qua abundanti in qua fuerint decoctæ althææ radices, perfundere, atq; oleo calido partem inflammata confpergere, necnon ex farina triticea, quæ in aqua & oleo moderatè ebullierit, cataplasma imponere oportet. Si aut suppuratio non prohibet equi animus, panē in oleo & aqua plurimum ebullire permittito, postea vero subigens ad mouero. Si tamē aque ad oleū propor-  
tio multiplex. Plus aut quā hoc suppuratiōē prohibet et hordeacea farina, similiter preparata. Si verō per summa cutis in parte inflammata tensio valida fuerit, multis ac mediocribus scarificationibus in superficie incidere oportet: ac postmodū ex farina hordecea ( vt diximus ) elixata, cataplasma apponere. Ceterū in quib. difficulter ad suppuratiōē pervenit, nec facile discuti tumor potest, sed suspicio est humores crassiores & tenaciores ibi impactos existerē in tantū dispositiōib. coovenit ea que sit per profundiores scarificationes curano. Convenit etiam id quod ex caricis pinguib. dulcib. & decoctis, cōficiatur cataplasma. Quarū sanē decoctio, aliquando hordeacea farinam adiciunt: aliquando panē syncomistum, hoc est, miscellanum, sed quā generoso confectus sit tritico. Porro farina triticea maximē ad suppuratiōē promouet: hordeacea verō resoluū plurimum. Si igitur resoluatur tumor, minus tamen quā opes, cum caricis hysso p. et organum simul coquere oportet. Quod si vehemētius excurrat tumorem volueris, sal decoctiōi adicias: dein farina hordeacea, detractō prius fursure, insperge: & postquā plurimū ebullierit, appone cataplasma. Si veretaris ne tumoris reliquæ in scirrhū durefcāt (quod cōtingit, vbi quæ fortiter exiccāb. vtiunt) radice agrestis cucumeris, aut bryoniæ, aut asari, in aqua decoque: sæpius qui dem per se folas, nonnūquā caricis pingues ad iiciens. Deinde aque farinam admisce, iniciens aliquid adipis anserini, vel gallinacis, vel etiam suillæ. Eadem quoq; radices, atq; etiam quæ pro ducit aliter, si post moderatā decoctiōē cum pane & adipe cōtundātur, huiusmodi discutiūt tumores. Fortior aut huc omnibus est draconū radix. Verū fortiter resoluentibus medicamentis semper sunt miscenda emollientia, ne tumores ipsi in pertinaces scirrhos degenerent.

De tumore suppurato. Cap. v. r.

Potro vbi suppurati tumorē amissa spes est, ex farina triticea vtere cataplasmatib. Dein verō postq; suppurata secueris, si videris ea q; circa sectiōē sunt omnino ab inflammatione libera, emplasticis medicamentis vti, sed quibus exiccandi resoluendiq; citra morum facultas in sit. Equidē sæpius in huiusmodi vsum sum medicamentum ex fermētō & ostrea cōbustis cōfecto. Si verō pars aliqua circa sectiōē inflammata videatur, quod ex chalcitide cōstat, liquabis oleo: atq; vbi sensim refrigeratū fuerit, infundens vinū, in mortario emolles & subiges, ac deniq; vni accommodabis. Vbi verō cutis per suppuratiōē plus q; par sit, colligata & velvī lacerata fuerit, nō facile subiectis corporib. agglunat: qua-

re necessū est vt p. linicinia latiora vulnus ipsum curetur. De sinu. Cap. vii. r.

Sin autem amplius agglutinandi cum sabie etis partibus creuerit difficultas ( qui sanē affectus vocatur sinus ) sanus est fistulæ dirēctē perforatā, vel ex grē, vel ex coruū fistulam, habere in promptu: aut etiā aliquod ex his instrumentis, quibus pus extrahi cōsuevit, quod foramē latissimum habeat: ac per id, exguū medicamentū nō sit, qd ex charta cōbusta cōstat, liquatū oleo rosaceo in ipsum sinū infundere: ac deniq; linamēto cōcepto, ipsius os claudere. Ceterū quæ sic liquantur medicamentā, oportet vt sint acriora, q; quæ linamētis excepta illinunt: qualia autem sunt quæ o. m. n. i. sunt in vis, colore viridi. Nam cum liq. ipsa oleo rosaceo nō pauco solvere expediat, vt iniici possint in sinū, necessariō certē ipforum virtus exsoluit. Quæcumq; igitur medicamenta exquisitē emplastica, quale est Machæronis, Epigoni, & quod lūs cognominat, vbi ad emmotoriū vsum perducunt, cerati indigent admitione, eadē etiam ad curandos sinus sunt cōmoda. Si quidem qua ratione ipsis ceratis miscetur ( nempe quod vires mordaces liabent, si per se sola liquefcēt ) eadem sunt ad sinus vti lia. Vbi verō sinus mediocriter fuerit oppletus carne, nunc agglutinantiā medicamēta apponere oportet: veluti si recēt, & sanguinolento vulnere medicaris. Sciendum autē est interm, omnia metallica medicamenta subnliorū partiū existerē: fortiori maiore vim exccandi, vbi fluctum ebullient. Quāto verō subtiliora medicamentā fuerint, habuerintq; maiore vim exccandi, tantō plus in sinū operabunt. Porro cum ad superiorem locū ipse sinus extenditur, facile per os humor vinarus elabuit. Si verō ad ima deciderit, nec tunc retineatur intus, partem aliquam cōtinuam erodit. Quare in huiusmodi sinibus, nisi prius ad effluxum sectiōē feceris, nihil proficiet, nec cum carnem gignere, nec cum agglutinare volueris. In aliis verō nō est opus sectiōe, si modō cōuenientem figuram in patiente parte seruaeris. Ex qua figura potes aliquid sinum ad partem superiorem vergentē, facere vt deorsum inclinē: sicv & vergentem ad ima, convertere ad superiora. Adverte autem melicratiū esse aptum ad conglunandas peuihores ipsius sinos particulas. Post cuius vium, prius quā aliud glutinans medicamen adhibeam, aliquando vino solo, aliquando vino mislo, ipsum soleo sinum adiuue. Et enim ad abstergēdam, expurgandūq; adhaerentem sanem, melicratum est præstans: ad cōglunandum verō, vium est melius, & efficacius: præcipue quod in medio vultis & austeri cōsistit. Ea quidem post medicamen agglutinantis appositionem, spongia recens ex mislo, aut vino, circumlicatur, quā mollissimē fieri possit. Arque alligatio quidem incipiat a fundo sinus: & deinat autē ad os. Linteum verō circūduciōnes constringantur quod em io fundo sinus, sed non ita vt dolorem inferant: paulatim autem laxentur, vsq; ad os sinus: quod quidem liab et laxam alligatiōnem, emplastrūq; quod et extrinsecus admo-netur, ad os discissum forficibus, vt ex ore ipso, humores

Scarificationes profundiores quando non veniant.

Emplastrū ex caricis.

Farina triticea quidem, maxime ad suppuratiōē promouet: hordeacea verō discutit.

Tumor in scirrhū abeunte curatur.

Distinctionibus fortiter, curantur per se mixta da emollientia.

Tumor suppuratus curatur.

Sinus quid. Sinus curatur.

Medicamen ex charta cōbusta.

Sinus curandus vtiā melicratū a qua fiat.

Metallica omnia fortiori maiorem vim exccandi, vbi fluctum ebullient.

Effluxus prius effi. facendum sectiōē apt.

Melicratum apt. p. apti sinū cōglunandum.

Sinus quando abstergitur ex vino. Vium sanū glutinat.

Sinus quomodo deligendus.

humores vitari, si qui excremuntur à sinu, facile effluere possint, paruo aliquo alio ipsi impossibilem emplastro, vix ad solutionem: quam tertia quaq; die facienda, auferes hoc ipsum, quod velviti operculum hæret: id quod per totū sinū circumiectū est medicamentū relinquit. Iam vero ex quantitate, & qualitate emanantis humoris, præterea ex dolore, vel indolentia, tumore, vel depreffione patris afficte, cognoscere nam parū ipsius hinc profunda sit præter conglutinata. Siquid si neq; in ipso sinu dolor sentiat, neq; tumor appareat, sed totus locus depreffus, siccus, atq; expers doloris exiit, viderisq; ad osculū pus exatē concoctū, necnō quantitate paucū, bene sperandum est de sinu glutinatione. Si autē contraria se ostendant, nondū sinus cōglutnatus. Sit vero medicamentū quod circūluitur sinui, vehementer ficans, circa tamē mordacitate: quale vix nostrum exiit, siue cera confectū ex metallico medica mētis thuris, & oleo cicino, & aceto: quod nimirū vulnera cruenta cum conglutinatione, siue sine molestia ficans, si luxurio prius foras abluere fuerint. Porro vbi qui abfcesserint tumores tardē facti fuerint, cutis ipsa admodū extenuatur, reddensq; laceræ velli per similia. Quo tempore viendum medicamentū est, subtilitā quidem humiditatis, potētia autē siccitatis: quale est quod cōstat ex lithargyro, & sulfo adipe antilquo, & chalcitide, quib; additū sit venustissimū oleum. Constat enim in lacera cute non minus mel, si vix ad consentiā emplastri elixetur. Satiū tamē fuerit ei myrrham subtiliter tritam, aaralio, aut thus, aut aliquod ex his, vel omnia simul aspergere, tum præcipue, cum luteo inunctum humidus apparet. Vix enī sum aliquando & tenui centaurio, qd mirū est ad effluendi medicamē. Post ipsum vero & symphytū vtilē est deinde ieros llynci radix. Postea farina ex orobis: omnia hæc & per cribrū subtile transmissa, & inspersa melle, dum ab igne amonetur.

## De gangrena. Cap. ix.

Nunc vero opportunum videtur de gangrenis aliquid dicere. Sic enim vocant mortificationes eas, quæ ex magnitudine inflammationum sunt, nondum tamen absolute sunt factæ. Etenim cum ita membrum effectum est mortuum, vti nec punctione, nec sectione, nec etiam vitro nem sentiat, statim ipsam recidere oportet, quāvis iam sanam partem aringat. Ceterum quod sic affectum est, denigratur. Quod vero in medio consistit vt ad mortem proficiscatur, appellatur gangrena. Curatur autem, evacuationibus quidem nobis plurimū sanguinis, qui in patente membro compingitur (cuius causa mortificationis fuit) reliquo autem, exhibentibus transpirationibus. Igitur autem cū vniuersam multas sectionibus profundis secare oportet, vna cum subiecta substantia: aut plurimus (sanificationibus profundis incidere. Vbi vero sanguinem effluere permittis, imponendi aliquod medicamentū, ex quo imp ad putrescentia conducunt: cuiusmodi est ex oxy melle farina orobi, lolivæ. Si vero talia non adsint, fabarū farinā adhibe, atq; ipsum oxy mel solū. Quod si foris medicamentum apponere vis, adde sal, aut ex trochi-

scis aliquæ exquisitissimè tritum, qualis Andronia, & Polydora, & Passio, & Muscæ existit. Verum qui duras natura carnes formatur, si fortissima medicamenta desiderant: molliora vero, qui tenera. Ad maiorem autem securitatem, quando abfcessus aut circūcidis id quod iam putruit, satius est ipsius mali radicē, parti sanæ coniunctā, adverte, vti si pus obducimus tu pudens facere, nōnunq; ipsius carnis paribus ad mouentes cautela, nōnunq; inamentū interponentes. Facta verō aduisione, solemus vti succo porri, aut, si is non adsit, recitans trochiscis: ad detrahendam aut crustam, medicamentū dicto Cephalico, ex melle vitæ: aut pane ex hydrelzo decocto. Iuatur etiā liordeacea farina humiliter preparata, aut cum ipsa tritica mella, allitig. Præterea tetrapharmacum, & Macedonicum nominatū sunt crustarum suppurationibus, atq; earū excidentis ac commodatissima: & quæ quæ vim habent perducendi ad suppurationē. Paus etiam cum apio, vel ocymo rufas, optimè crustas dirumpit, & à sanis partibus eximit. Ex simplicibus autem medicamentis, iris, vel radix panacis, vel aristolochiæ, vel acori ex melle. In mollibus vero corporibus. sat est farina orobi, cum melle, vel thure. Auserit etiam crustas Machæreion medicamentum. Cilm vero exciderint crustæ, atque huiusmodi vlcera idoneis medicamentis carne repleta fuerint, debet induci cicatrix.

## De Cancris.

## Cap. x.

Carcinosis tumores in omnibus consueverunt fieri corporis partibus, sed præcipue in mamillis mulierū, quæcunq; naturali, suis purgationibus priuant. Nam quando hæc, vt oportet, adfuerint, tandiu mulier integrā sanitatē fruatur. Si vero tumores omnes ex atra bilis recremento pignatur. Qui humor facti vinaris similis, dum sanguis in hepate sit, ab splene expurgatur, cui etiam nimirū nutriendi. Cum igitur naturalis temperatura hunc humorem paucum genuerit, optimè victus ratio præcessit, & ex ipso qui generatur, splen abunde sanis attraxerit, nullā huiusmodi superfluitas coaccruatur in venis. Si vero contraria acciderit, tunc succus is melancholicus multiplicatur in venis, si quibus nonnunquam, facultate expellendi extraneis præditis, per hemorrhoidas excremunt. Sæpius autem & aduantes decubit. Quandoq; ad cuspi vniuersam expellitur, vbi gignit elephantiasim. Est cum ad alias corporis partes, quæ ceteris imbecilliores sunt, humor iste decumbit. Quo tempore evidenter apparent quæ in loco affecto sunt venæ, crassæ & nigro sanguine imbutæ. Qui quidem crassior fuerit & nigrior, tanto deterior est passio. In mamillis autē sæpe vidimus tumorem figura animalis cancro per simile. Hunc igitur morbum per sui autia sepe sanamus, medicamentis quæ atram bilem educunt. Vbi vero in molem iugiter attollit, curari sine chirurgia non potest. At scopus in huiusmodi curatione est, totū qui circūstat tumor præter naturam, quā partibus sanis adhaeret, abscindere: ob valorem tamen magnitudinem, præsertim si fuerint arteriæ, pluriū sanguinis datim periculi imminet. Quod si laqueus ipsa excipias, & per consentium

Adverte, si  
radix panacis  
in particula.

Etheram quæ  
detrahant.

Cancris vbi op  
er quæ humore  
expurgatur.

Atra bilis ex  
purgatur a he  
pate, quæ alit.

Atra bilis quæ  
morbus excutit.

Cancris duplex  
natura.

Cancris medica  
tio per calidam.

Medicamentū  
sine circulo  
arido, efflu  
ens vitæ  
in faciem.

Cutis lacera  
in abfcessu  
medicam.

Cicuta quæ  
ad

Membrum mor  
tificatum, qua  
ritur sit abscis  
sio lani.

Gangrena co  
nata.

Putrescentibus  
apra medica  
menta quæ.

GALENI PERG. DE VE-  
næ sectione aduersus Erasistratum, lib.

Ynus.



Idi quidem illud inquisitione ædili  
gēnissima dignum esse videtur, cur  
nam Erasistratus, cum cetera quæ  
ad artem spectant omnia, enā mini-  
ma quæq; satis superfluitate tracta-  
rit, de venæ ramē sectione illo vni-  
cōq; remedio, & quod apud veteres fuit maximū  
ponderis, ne minimū quidem, nisi obiter & per  
transennā, sermone fecerit. Nam dum ast, inflam-  
mationes (exempli gratia) q̄ vultibus super-  
veniant, vacuatio ne quæ per iugum fit, esse cu-  
randis, miror sanē, quod auxilio expeditissimo  
omisso, ad tardissimū, numimōq; ratū cōfugiat.  
Ego verō, quandoquidē per inflammationes nec-  
cessaria vacuatio est (vel Erasistrati testimo-  
nium) eam omnī facillimā promptissimāq; venæ  
sectione perfici arbitror, y tōte per quā ipsas enī  
phlegmonas solas, celeritē curare possumus:  
cum ē diuerso in edux, præterq̄ quod longū tem-  
pus requiratur, æqualiter enā vniuersū corpus  
evacuanti, id quod certē nō est expediti: vt in-  
terim alia retineam in cōmōdia, quæ in edux \* lō-  
gā necessaria sequuntur cuiusmodi sunt virtus  
defatigata, succi biliosiores atq; amarulenniores  
effecti, morfus cordis frequētes, iniquitudines,  
deceptiones suppressæ, ac breuiter, omnia recite-  
mentā \* mordaciōra & acriora reddita. Quorū  
Erasistratus nihil animadverrens, ecorū more,  
qui amplam cōpendiosissimā, & planam viam in  
propinquā habentes, sēp numero angustā, pro-  
lixam, asperamq; errabundā inueniunt, & ipse pro-  
pinquam admodū, fatigū expeditā & amēnā se  
misi aspernatus, ad impeditā illam, salebrosam,  
& longam se cōsulit: quippe qui loci tantū cō-  
siderauit, num quō ipse contendit, via eō ver-  
gat: nō autē, an cōpendiosē, & sine periculo du-  
cat. Nam quod vel in edux ad pleuritidis vacua-  
tionem cōterat, ego nō eo inhiac: verū lōgo  
tempore, magnōq; cum no cumento, eam effice-  
re id prohibeo. Iam verō cum Erasistratus per-  
petuū admiretur naturā, seu artificisq; am, provi-  
dētiq; animalū gubernatricem, nusquam tamē  
eam imitatur. Aut cur illā plurimis morbis san-  
guinis evacuatione mēdendū cernens, ne in vno  
quidem, ipse tali præsidio vitur? Itaq; mihi aut  
modis omnibus demēs, aut in naturæ operibus  
quāuisimē vi scatus esse videtur. At omnī ho-  
norum, quæ ad medicam artem spectant, nobis  
auctor Hippocrates, nos monet accuratissimē (id  
quod enā Erasistratus nos monere debuisset)  
vt quandoq; natura sortis atq; vegeta existēs, se-  
se ad crīsim accingit, uō perturbemus quidē mo-  
tum ipsius, pectū iam ueniē ea, quæ superata  
morbo sārū causari velleminē, nō potest ad in-  
tegritatē perducere. Quæ iudicantur, & iudicari  
sunt (inquit) integrē, nec mouere, nec nouare,  
sed finire. Idū quidē habes propriū naturæ in-  
tegrē mouenti præceptū. Quod verō huic suc-  
cedit, naturæ & ipsam, vbi diminuit ad crīsim  
mouenti congruit: eamq; ob rem viliū simis au-  
xilio iubens, ait: Quæ ducere oportet, hæc quō

maximē natura vergit, plocā cōferentia, ducen-  
da sunt. Natura liquidē tum temporis expellere  
adversariū conatur: cum autē præ imbecillitate  
imponere operi sinē nō possit, auxiliū nostrum  
implorat. Propterea enā laborantes dolore late-  
ris, iugulū affligente, aut regionē quæ supra præ-  
cordia est, secta interna cubiti vena dicit esse va-  
cuandos. Vbi verō dolor sub septo transverso  
fuerit, vt subdual alius vel nigro veratro, vel  
peplio, cōsult. Similiter in quopis renū affectu,  
venam quæ in poplite est, incidendam censet.  
Idem enā Margei famulam, cui ob contortū ad  
vertebras coxarū os, vteri purgatio suppressa e-  
rat post partum, atq; inde grauis dolor secutus,  
restituit, venam prope malleolū secans: q̄vis tre-  
mores totū corpus iam occupassent. Sed neq; ex  
his qui rationalem empiricūq; scētā amplius  
sunt, quisquā à venæ sectione abstinent. Vt autē  
naturæ op era producamus, an nō ipsa cunctas  
mulieres singula mensibus, quod ob ignitiā &  
oculū, multitudinē humorū coaceruat, superfluo  
sangune evacuat. An nō eam idem post partū  
mouit, q̄vis futura ipsa quodam species vacua-  
tionis existat. Ad hæc verō, postquam factus e-  
ditus est in lucem, lactis generatio in mamillis  
non parua & ipsa evacuatio plenitudini existit.  
Vna siquidem & lactis & menstruum substan-  
tia est: amborūq; (vt quisq; am dixerit) quorū  
fontes cōmunes, sunt venæ. Quāmobrem qui-  
buscūq; per ætatem menses fluere cessant, vs-  
neq; in mamillis hæc amplius gignitur. Quæcūq;  
etiam purgandi tempora adhuc habent, atq; in-  
tetera lactant, ex nō purgantur. Præterea cum  
lactant mulier sanguis per locos erumpit, sic  
huic lac evanescit. Insuper quæ animalia non ge-  
runt vtero, in neq; lac vnquam adest: rursus qui  
bus id suppetit, illa enā ad cōcipiendum idonea  
sunt. Porro si mulier per excretionē illam men-  
struū probē expurgat, nec podagris, nec articu-  
lorum doloribus, nec pleuritide, nec peripneu-  
monia, nec aliis deniq; ex plenitudine affectibus,  
infectabit. At mēstruis retentis, eam cuiuslibet ma-  
lo implicari facit: huicq; rursum evacuatio-  
nes mēdant. Ex hominibus enā, quibuscūq; pro  
consuetudine superflua per hæmorrhoides va-  
cuant, q̄ omnes vitā morbus minimē impeditam  
agūt: quibus item suppressis inflammationes, in  
perniciōsissima quæq; labūt. Ac promde cum  
vel in tremore, vel in hydropem, vel in aliū a de-  
tūm frigidū, mens quidem ob hæmorrhoidā,  
mulier verō ob mēstruū retentionem, incidens,  
Hippocrates cōmendat mentis evacuationē san-  
guinis, per cōvenientia loca, cum rumirū cōtra-  
riorū cōtraria remedia existit. Naturā quip-  
pe (quā illē vir imitatur) in edux adiectione, re-  
plenione evacuationibus, frigus calfactioni-  
bus, calorisq; refrigerationibus curat. Nam (vt  
alia multa subitecane naturæ miracula) frequen-  
ter conspexi canem se se provocantem ad vomitū.  
Vidi & aem Aegyptiam, quæ dīsimū imi-  
tabatur. Grues enā, aquilāq; prælongo vsq;  
ad vltimos terrarū fines volatū, paritū frigus, pec-  
tim æstū vitantes, quō cōtraria cōtrarius pro-  
pulsent, videre licet. Sectio itaq; venæ (vt eō  
vnde digesta est, nostrā revocetur oratio) ob

Pierius quo-  
modo sint vas-  
culi et de  
clima Hippo-  
crati.

Mentis co-  
muniō. pro-  
fluat singula  
mensib.

Lactis et men-  
struum. vna  
substantia est.  
Lac in non ge-  
nerat, quibus  
menses cessant,  
nulla gignitur.  
Lactant non  
purgantur.

Lactis non ad-  
est qui non ge-  
nerat vtero.  
Mulier cui men-  
ses probi fluit,  
quod mēstruū  
infectat.

Hæmorrhoides  
faciles suppressi-  
ōis, quæ ha-  
pōt in aliq; ma-  
lorū vastant  
causa.

Contraria  
quæ cōtraria re-  
media.

Bruta sibi ipsa  
natura docet,  
mēdant.

Erasistratus ne  
monem quē-  
dam formam  
hæc de sangui-  
nis tractatus

Phlegmonas ve-  
næ facillimē  
promptissimēq;  
per sanguinis  
defatigationem.  
Iam vbi eva-  
cuetur phlegma  
arua, longū tem-  
pus deficiant,  
et æquū vai-  
orū corpus  
maxime.

Iam vbi sangui-  
nis in cōmōdia  
de solis super-  
venit.

Iam vbi vacua-  
tio longū tē-  
poris, & cum pe-  
nita.

Natura pluri-  
mos morbos sol-  
uit per excrecio-  
nem sanguinis.

Naturam non  
esse impedita-  
dam sed uocan-  
dā, mouet Hip-  
pocrates.

Ynus.

Ynus.

*Sanguis deprehendus mensuratur. Quod alio rum auctoribus, multis facilius deprehendit.*

*Sanguis evacuationem silem de, medicum habet liberam potestatem, alio autem nequaquam.*

*Purgatio si per venam sit, periculis, diffinitur.*

*Cibi in mensura errati, gravissima incommoda inducunt.*

*Inedia, priusquam sit, nec interiri, nec ita inter posse. Interisse ob ciborum inopia non potest. Latencia ab ipso cibo durare.*

*Inedia non, si d raritas est, variatur.*

causas dictas perperā ab Erasistrato omittitur. Quod autē mensura in venæ sectione multo facilior deprehendatur, q̄ in cæteris quibuscvis auxiliis, hinc declaratur. Nam & coloris mutationem, nunc quidē in ipso fluentē sanguine, nunc verō in ægrozantis corpore, discipere licet. Animi quoq; defectio in plurimis affectibus vacuationis terminum obtinet: quemadmodū sanguinis fluentis vigor languescens, & pulsus mutari. Adde quod & medicus huius solius evacuationis liberam habet facultatem sistentē, quando cumq; illi placuerit: aliarum autem nullius. Nam vbi propinandum sit aliquod medicamen, prima exhibitio in sua potestate sita est: cætera verō, fortuna a ministratris obtingunt. Ingens præterea in propinationibus pharmacorum periculum est, cum vel non commouetur purgatio, vel quod in alui attractum est, nō facili excremitur, vel cum dolore, torminibus, refrigeratione, pulsū evanescentia, ac defectu animi exprimit: vel cū corpus vehementer perturbatur, interimq; paulū admodū evacuat, aut evacuatio modum excedit: id quod spissius, seu extremū malū, contingit. Neg enim vt venæ incisæ fluxū mox digito superposito sitis, sic sistere alui, p̄suis poteris. Cibi etiā cuiuscq; in mensura erratum gravissima incommoda inducit: vt in hominibus extenuatis & imbecillibus cōstat. In quibus si quid minus, q̄ par sit, nutrit, virtutem tabidā reddet. Si verō modum exuperet, nature potius oneri, q̄ nutrimento, fuerit, illamq; penitus & extinguit & suffocabit. Vt autem funditus Erasistrati opinionē evertam, solam instituentis inediā, ad evacuandas omnes inflammationes, nemo ignorat, mea quidem sententiā, inediā ipsam priuationem quidam existere, ac proinde nec nutrire, nec evacuare posse, cum inter inanitionem & vacuationem sit media. Nec verō existimandum est, aliquem vnquam perisse ob inopiam ciborum: alioqui animantia delitescerent in latebris sine cibori copia, perdurare nequa q̄ possent, quemadmodū certē perdurāt: quia nutrimento non indigent: quandoquidem ob desidiam atq; torporem, in quō versantur, nec non ob astrictam cutem, nihil ab eorum corpore exhalat, quod cibo instaurari postulet. Itaq; nō inedia, sed raritas cutis evacuat: quam si frigore & quiete densaueris, quid commodi fuerit ex fame expectādam? Cæterū dum Erasistratus cuiq; instituire inediā contendit, videtur mihi ipsemet affectuum qui inedia opus habeant, auctor & promotor existere.

### GAL. DE VENÆ SECT. ADVER. ERASIST. LIB. DE VENÆ SECT. ADVER. ERASIST. LIB. DE VENÆ SECT. ADVER. ERASIST. LIB.



*Inflammationes omnes sola inedia evacuantur. Efficiuntur Erasistrato.*

Vm Romam initio venissem, incidi in medicos quosdam, qui a venæ sectione tantopere abhorrebant, vt cū aliquando eger quispiam propter plenitudinē iam præfocaret, ne tūm quidem hoc auxilio vi vellent: idq; secvri Erasistratū, qui nūquā venæ sectionē probans, omnes inflammationes sola inedia evacuandas esse dicebat. Quā in re quāto pere vir ille hallu-

cinatus fuerit, quis non cernat? Etenim si ob id inediā probamus, quod vacuatis per eas venis, affectū minui cōtingat: multo fortius cōmodius fuerit, vt semel adhibita evacuatione, potissimū quæ per sectam venā administrat, ab inedia abstinemus, vt quæ & ægrotos in gēni molestia soleat afficere, & vigilias, & inquietudines, afflictionēq; oris ventriculi, tum corruptionē fucorum, necnō alui, atq; interdum vrinæ suppressionē, inferat. Quamobrem nōnulli in Romana vrbe medici, præcipue qui medebātur mulierib, cūm explorasset infestē cuiusdā puellæ, ob nō sectam venā, successum, in quibus sanguis ferebatur ad superiora, tempore quo eruptio menstruorū expectabat, venæ sectionē iam vsurpabant. Nec verō quietē, nec inediā eis inisigebāt, sed medicatū propinabant: victūq; humectante ac laucris affatim vti eis videbāt. Ab his enim, si vel mediocri quāitate sanguis fuerit detractus, purgationes exoriri cōsestū solent, præsertim si infra poplitē, aut iuxta talū venę sectio fiat. Sin autē quis ventā sectā iunxerit ipsi mulieri inediā, menses prius fluentes cohibebit, inculpalibzq; reprimet purgationes. Siquid nāq; cibori inopia atrescit, ac desior seipso redditur: eāq; ob rem, ad fluxum ineptus evadit. Quæ igitur tum lota fuerint, melicratūq; & vt in oideoneos sum pferint, ac vinum neq; austeri, nec crassum biberint, his purgationes procul dubio cōtingent: ob idq; ego inediā post venæ sectionem nō frustra tantū, verum etiam adhiberi cum magno damno profiteor. Tam verō cum nostra hac tempestate mulieres quædam Romanæ frigidissimæ ex niue ponant, ob idq; aut nullo pacto purgarentur, aut diminuerēt: eas tamen medici sectione venæ ad id incolumes servauerunt, vt nec sanguinem spuerent, nec pleuritide, peripneumonia, aut angina vncūq; corperent. Porro in auspiciis inflammationum, omnis forbiditō iborūq; adiectio subrahenda est: vitandum verō venæ sectione. Siquidem inflammationes quæ febres faciūt, vt plurimū ex plenitudine sunt. Quamobrem si vasa nutrimento impleantur, maiores ac vehementiores ipse inflammationes reddent. Cæterū si adolēcentes qui neq; de sanguinis detrahendi mensura, nec de venarum secundariā ratione quicquā audiuerint, ad præsidium hoc sese accingant, ægros in exitum perducunt. Plures nāq; ob perperā sectam venam perierunt, q̄ quibus adhibuit id auxiliū nō fuerat. Quippe seniores medici tam tēporis venas secantes, vtebant aliis evacuationis auxiliis, quæ idem q̄d & venæ sectio, verū longiore tēpore, efficere poterāt: nisi quod quandoq; ob principem partē affectū, aut ob plenitudinis exuperantiam, æger morte præoccupabatur. Verū qui febres canctas in principio venæ sectione indigere autumant, nō mediocri etiā noxa ægrotos afficiunt. Itaq; mihi aberrare eos consentaneum est (vt Plato ait) qui nō aggrediunt illa quæ ignorant, quā qui ea tractant, quæ didicerunt nūquam. Porro quod vas aliquod ruptum possit absq; inflammatione coalescere, dummodo nos cetera ritē administraverimus, sanguinisq; quantum nobis visum fuerit, in tempore evacuationis

*Inedia, que ad ducit pleuriam, symptomata.*

*Inedia evocans venas, silem infra poplitē, ut alio, talium.*

*Inedia post venam sectam, cum magno damno adhibetur. Menstrua quibus suppressa ob auro purum non fuerit, venam sectam iuxta talē, infra poplitē, in inflammationem convertit.*

*Vena si sectionem perperam adhibita, per se placere, quæ quibus adhibetur id auxiliū non fuerat.*

*Febres canctas in principio non aggrediunt illa quæ ignorant.*

*Deiunt qui plenam etiam ducant.*

FINIS.



mur, liquidò constat. Frequenter liquidè yidimus, quò quibuscù pugnannibus singulari certamine\* totius crûs brachiũvme dissectũ effecit, eo alius tamen vulnus, antequam in inflammationem ori etur: quòd quidè multo magis cõtinget, (si vt Hippocrates ait) illud sanguis copiosius fluxerit. Sæpius etiã vulnus in causis thoracis partes illarum, rēduò cõglutinatũ vidimus. Quòd autem Erasilitratu nũquam fuerit vsus venæ sectione, hinc perscrutari licet, quòd in plenitudine omni semper inedia inungat: id quod ne nĩquĩ facturus esset, si eam sanguinis detractio- ne vacuaret: quum minime cõsentaneum rationi sit, vt quis circa vnum eundemq; ægrũ, vtracque auxilia, nempe inedia, & venæ sectione, vsurpet. Nec verò existimandum est, plethoricos omnes sanguinis esse detractio- ne vacandos. Prius siquidem distinguenda natura plenitudinis est, habitudoq; & ætas ægri expendenda: tempus item, regio, & æris constitutio conside- 10 randa, necnon quicunque antecesserunt, quæq; ipsum ægrum enamum infestant symptomata. Et conversò alios plerisq; tibi ob oculos ponã, qui absq; repleto quum sit, nihilominus venæ sectione opus habent.

**GALENI PERGAMENI DE**  
curandi ratione per missionem sangui-  
nis, liber vnus.



Vi de sanguinis missione speculat- 30  
tur, primò quidem investigare de-  
bent, quoniam corporis affectio-  
nes evacuatione indigeant. Secun-  
dò, quæ illa, quæ per sanguinis sit  
detractio. Tertiò, qui innoxie hanc ferre pos-  
sit: quartò, quoniam potissimum  
tempore ipsa molienda sint. Quintò, quæ ex ve-  
nis secare oporteat: quò nimirũ haud parũ in-  
ter sit, hancne, an illam incidas. Porro hæc quoq;  
cõtemplatione absoluta, succedit de scopis oratio.  
Quibus mentè adhibens quia, vacationis  
modũ facili per cõiecturam inveniri: necnò in  
quibus semel aufferre præsit, & in quibus repe-  
titam ablatione moliri: tum in quibus nam inaz-  
nare vsq; ad animi expeditat deliquit: & in quib.  
id, ceu summũ malũ, vitare. Calm aut per omnẽ  
vitam, omnia quæ in quæstione veniunt, duo in-  
ventionis organa obtineat, nempe rationem &  
experientiã: necesse esse arbitror & nunc quoq;  
me, aut ratione sola, aut sola experientiã, aut iun-  
ctis ambabus, quæ propòsita sunt, scrutari. Si  
quis ergo affectiones quæ vacatione indigẽt,  
velit experientia collectas exponere, sola opus  
est ad explicatione memoria. At si via rationali  
id efficere instituit, necesse est, vt prius cõmune  
ac generale inveniat, ex illiusq; deinde in species  
differentiasq; sectione, vsq; ad species vltimas,  
affectũ numerũ, vacatione desiderantũ, inve-  
nat. Etenim ratio ipsa, hæc quidè, ex cõmuni-  
tantum, ppgrediẽs non omnibus, invenit & demõ- 50  
strat: hæc aut, enĩ quæ ex illis invẽta sunt, ad de-  
mõstratione adhibet. Ac priori sanè ratione, om-  
nes artes, omnẽsq; homines vniã sollet. Secunda  
verò, nò omnes homines: nam propriè ad artifi-  
ces pñet. Eam igit nos impræsentiarũ sequuti,

vtetur multis, quæ in aliis cõmentariis sunt de-  
monstrata. Nemp cõplures esse facultates quæ  
animalia gubernant: quarũ alias naturales, alias  
animales vocari. Generationis aut principis p-  
matena, quatuor plementa subici, eaq; tota per  
se mutuo misceri: effcig invicẽ in se agere nata,  
idq; per qualitates suas effectrices, caliditatẽ, fri-  
giditatẽ, humiditatẽ, & siccitatẽ: ex quibus vnq;  
omniũ temperamenta cõstantur. Præterea dari  
duplicẽ plenitudinẽ, nempe secundũ vasa, & se-  
cundum vires: primariãq; actiones, à similari-  
bus corporibus pferri: vt secundarias ab instra-  
mentariis. Quĩ igitur plenitudinẽ bifariã & fiat,  
& dicatur: vno quidem significato, vt ad vires:  
altero, iuxta laxitatẽ continentũ valoriũ: vtriq;  
sanè opus est vacatione, siue ea in homine va-  
letudinario, siue etiam in valente cõtingit. Vo-  
co etiã plenitudinẽ iuxta vasa, magnã humorũ  
colluie, ipsa vasa tendentĩ. Iuxta vires autem,  
eam quæ vel minimè vasa distendat, vires ta-  
men grauat, & premit, hominẽq; reddidit ad  
monones pigrum & tardũ. Quòd si simul adit  
vlerosus etiã aliquis sensus, ac potissimũ dum  
mouemur, signum est autem ipsum vitio si fa-  
ciẽ esse sobolem. Quandoq; autem & in partibus  
quibuscumq; corporis, nò in tota mole, plenitudi-  
nes adfunt similes istis, quæ vniuersum corpus fo-  
lent opprimere. In omnib; igitur id genus affe-  
ctibus, maxime ex vsu sunt vacationes humo-  
rum, aut vaporũ, aut spiritũ peccantiũ: mini-  
mè tamẽ semper sectio venæ desideratur, sed suf-  
ficet interdum purgatio, sictio, balneum, inven-  
tioq; ex aliquo digerente medicamentis. Quæ  
autem affectiones venæ sectione indigeant, de-  
inceps dicemus. Nou solum nutrimentũ animã  
tis partibus præstat sanguis, sed calorẽ etiam na-  
turalem cõservat. Itaq; ipsius cordis calor inter-  
dum quidem scilicet minor efficitur, aut propter  
sanguinis copiam, à qua nimirũ extrin-  
gitur, aut propter ingentem inopiam, aut propter  
frigidam qualitatem: interm vero maior, aut propter  
calidã sanguinis qualitatem, aut propter exi-  
guam inopiam. Quicquid aut cor in caliditate fri-  
giditatem perperit, eius quoq; & alie corpo-  
ris partes protinus participes fiunt. At quæ mō-  
bratim accidunt caliditates, aut frigiditates, eas  
quæ parti quidem affecte vicinæ sunt, vnã alte-  
rant, in totum tamẽ extendi corpus, pñsq; in  
cor immutent, non possunt. Cæterum quando-  
quidẽ omnia simul calida & humida\* cõfusi-  
mè computrescunt, sanè si quod nutrimentũ fugge-  
ritur, aut ventriculo ad hepar, à natura non supere-  
tur, vniq; probum sanguinem non convertatur,  
alias aliam perperitur putredinem. Quum au-  
tem quæ ex materia putrefuit calida, quàm an  
ea calidiora redditur, calidioran profectò erit  
ipse sanguis putrefcẽs, ac, pñde etiam particula,  
in qua ei putrefieri contingerit. Quia verò ab in-  
signiter calidis, simul quæ vicinæ sunt in calefcit,  
vniq; calor illa acris & mordax (qualis à putre-  
dine ortur) illis quæ viterius sunt, communica-  
bitur. Ergo si pars quæ hoc pacto incaluit, in-  
ignis sit, aut calorem suum in cor extendere va-  
leat, vnã & ipsum accendet, vt quod natura cali-  
dissimũ sit. Quòd si semel illud accensum fue- 10

Facultates ani-  
malis dispen-  
tationis pñ-  
Elementa qua-  
tuor subici  
principia gen-  
erationis, q-  
ta per tota mi-  
sceri.  
Plenitudo est  
duplex: nempe  
mala vires, &  
iuxta vasa:  
quorum vtracq;  
est vacatione  
no.

Plenitudo iuxta  
vasa quid.  
Plenitudo iuxta  
viros quid.

Sanguis non, s-  
alio animal,  
sed calorẽ eius  
naturalem cõ-  
servat.  
Corde calidior  
de minor aliq;  
magis reduci-  
tur.  
Corde interm  
non pñsq; in  
vniq; partib; cõ-  
municatur.

Putrefcẽs eius  
simil calida &  
humida.

Putrefcẽs res  
di calidiora,  
quum autem.

*Idriguid.*

rit, facile tota ipsius iam corpus simul exaliet: qui affectus vocatur febris. Nonnunquam verò, prius quam cōputrescat sanguis, ingens ipsius vis decubit in partē aliquā: quam aut extinguit omnino, ita ut actio ipsius pereat: aut illi certē noxam nō contemnendā infligit. Hoc siquidem pacto apoplexia pvenit, multonimū sanguine incumbente cōsertim in animātis principiū.

*Apoplexia hinc multo sanguine incubente in animātis principium, Plethorem generatam. Scierint, Cōdem a. Erysipelas.*

Quod si in aliam particulam ruat, tumorē inibi præter naturā excipit. Cuius generis plethorem exstitit. Verūm si crassior sit, atracij bilis magis naturā referat: si quid decubuit sanguis, carthior tumor efficitur: si cū sit purior, si sit fluxus, laxior: et si biliosus, tumor erysipelas dicitur.

*Plenitudo in venis facit in putredinem abire.*

Quum itaq; plenitudo (quemadmodū exposuimus) sit duplex: & ex ipsius, ea quidē quæ ad vires refert, facile in putredinē abeat, interdūq; in partes quasdā ingruat, inibi tumores præter naturam excitet: altera aut, quæ iuxta vasa ducitur, fape enā in partes quasdā decumbat, tumorēq;

*Sanguinem detrahere quæ sunt prius expleta danda.*

& apoplexiā, venarūq; ruptiones moliat: vtrāq; celeriter evacuatē tentandū, prius quā aliquid perniciē conciliet. Si igitur qui plenitudinē grauat, aut tenditur, nec puer sit, nec senex, an illi venam secare oporteat, expendes, præ oculis habens hocce principalis scopos: plenitudinis nempe tum quantitātē, tum qualitatem: virium robur, atq; earundē infirmitatē. naturalem totius corporis labiū, tempus, regionem, anteaquam vitam: tum, an cibiporosity copia, & præcipue astatum nutrimentū, qui sic accēsus est, fuerit visus: ad hanc cōsuetudinē, & res præter consuetudinē actas: quo visq; motus exercuerit, quas excretionē habuerit, aut præter solitum compescuerit. Præter omnia autē hæc, num gracilior, aut crassior evaserit. Porro vtriusq; plenitudinis quantitas, ex propriis signorū magnitudinē desinit. Quāto enim grauior sibi viro videbit, tantū & plenitudinē quo ad vires crevisse constat. Ad eundem modum, quantum ad

*Plenitudinis vtriusq; qualitatem quælibet, quæ signa sit designanda.*

aliter fuerit tensionis sensus, tantū & auctā alteram plenitudinē, quæ secundū vasa vocat. At vtriusq; plenitudinis qualitatem, partim ex coloribus iudicabis, memōi colorem humorū esse, si quidē ab externo calore vel frigore totum corpus haud immodicē affectū fuerit: partim ex iis, quæ humorū nature cōiuncta sunt. Etenim calidiores, calidior totius corporis sensus sequit, vt frigidiore, frigidiore: tum eos qui in venis quidē acuerant humores, vasorū tumor atq; distēsiō: qui verō in carne, sensus in ea vel grauitatis, vel tensionis, vel etiā caliditatis. Porro dispensantū nos facultatū infirmitas atq; robur, propriis indicant functionibus: voluntariis quidē, illis quæ in nervis cerebrāq; consistit: pulsificis aut, eius quæ in corde ac per arterias mouetur. Nam secundū bonam nutritionē aut abolitam, & colorem probum, aut parū, terna facultas, quæ nutrit est, & à iecore proficiscit, cognoscenda venit. Vbi ergo extrahit, plenitudinis signis,

*Color humorum indicat.*

valentes facultates extiterūt, incides venam: videlicet si tensus quidē sit ipsa affectio, nihil distinguēs: magisq; etiā in phlegmonodis: si verō degrauius sit plenitudo quæ infestat, haud semper sanguinis molenda detractio est. Nam si-

*Facilitas vel difficultas robur imbecillitatisq; ex propriis indicant functionibus.*

ri potest, vt crudus per corpus collectus sit humor, à quo talis affectio giatur. Quem succū sanguinis missione vacuare non expedit, sed fluxionibus, vñctionibusq; medio ceteris exalciaciētib;: necnon potionib; cibiq;, & humoris crassitudinē incidentibus, & calciaciētib; modicē. Siquidem quæ valenter exalciaciūt, nimis subito vires deiciūt, fape etiā vires adangit. At verō qui sanguine reiecto ex pectore, in præ-

*Sanguinis detractione quid sit plenitudo vacanda.*

fectu quidē curat, ceterū tam lorum sunt thoracis pulmonisq; structura, vt vel paululo plus collecto sanguine, prout aut valis alius osculum referetur, aut ipsum rumpatur: us, vel si nullum in corpore etiamdū adfuerit symptoma, inuente tamen vere fanguine mutere oportet. Similiter in iis qui promptē morbum comitalem, aut apoplexiā, aut peripneumoniam, aut pleuritidem, aut anginam incurrit, eiusmodi affectus antequā tenū sunt fanguinis detractio. Eodem modo quibus hæmorrhoides re-

terent sunt, potissimū si natura sit attrahidaria, quip; quorūmā scilicet plethorici morbis corrupti assolent, & hos quog; veris initio vacuare expedit: nec secus eos, qui ipso etiā vere illiusmodi malis veniūt. Extremi iumentperantes & ymolentes, veniūt & gula deditos, nec purgatione, nec missione sanguinis magnopere iuu-

eris: nam per vires intemperata nū rursus ciudorū humorum copiam quāmocysimē colligunt. Quare ius ne manum quidē admoueas. Etsi verō qui præceptis salutaribus obsequenter, sum-

ptopere pfuerit, si principio vena primū quidē vacuaueris: dein autem ad exercitiā, salubremq; victus rationē perduxeris. Sed nec tantū vbi ad eā plenitudē, siue ea secundum vires sit, siue secundum vasa, misit, & prodest veng lectio. verumetiam cū plenitudinē initio phlegmones, aut ut propter istum, aut propter dolorem, aut partium debilitatē provenit: quippe

dolor sanguinē ad se trahit, & fape partium debilitas phlegmonē, absq; corporis plenitudine, contrahit: quum videlicet partes fortiores, per venas, seu præter alios quosdā, propria excrementa semper ad imbecilliores expellant, do-

nectandam ad partem imbecillimā omnium de fluxerint, & quæ ex se amplius propellere, quod in ipsa redundat, nequeat: id quod acciderit illis partibus, quæ vim excretricē vicinis omnib; imbecilliorē possident. Quāmobrem omnīū primis infirmiores partes corripuitur excrementis morbis: quemadmodū glandulæ, quæ sunt fluxionibus excipiente idoneæ, tum ob subtilitatem laxitatē, tum quia inter omnes partes minimē robustas naturales facultates (excepta alteratice) sunt, sic vti & pinguis dō. Post glandulas sequit pulmo, fluxionē recipiendā promissimus. Nam & hic tres facultates infirmas possidet, corpūq; laxum. Deinde est lien. At re-

brum, aut perinde vt illi, aut etiam plus, excipiendū fluxui est habilis: cōstructionē rāmen habet eiendens iis quæ recipit, appositissimam. Quibus ergo carnoso genere pulmo, lien, ac cerebrū, natura sunt robustiora, in us ad glandulas carnēq; pvenit fluxionē, vbi totū mirū habet, infirmo fuerit, vel vti in rheumaticis aff-

ectibus

*Crudus humor quæ ratione va vacanda*

*Sanguinis detractione quid sit plenitudo vacanda*

*Intemperantia cur modico danda non sit.*

*Phlegmones accipiente, nam si plenitudo ad adfuerit, fape sanguis molitur.*

*Dolor sanguinis trahit, imbecilliores partes a se trahit, imbecilliores recipient.*

*Imbecilliores partes, ut omnia prima accipiente recte mittuntur morbis. Glandula cor picipit accipit fluxionē. Pulmo. Lien. Cerebrum.*

ctibus accidit. Merito igitur in his curandis scopus est, nō evacuatio, sed totius corporis robortatio: quamvis tamē curationis initiū illis oriat̃ a misso sanguine, & si excrementa prauā qualitatē habuerint, vñ etiam adhibeatur purgatio. Rectē autē admonemur in libro de viciis ratione in acutis morbis, vt si magnū sit ipse morbus, & vger floreat etate, adsitq; robur, sanguinē de trahamus. Ceterum principes scopi mittēdis sanguinibus, sunt duo: nempe magnitudo morbi præsentis, immunit̃sue, & cum ea viriū robur: quibus si adicias etiam florentē etatē, nihil sermōni defuerit: modō sub etate florente, præcedens sequensq; illam intelligant, excipianturq; distinctiōne, tantū senilis atq; puerorū etas. Quamvis etas senilis in virium verbo cōprehendi potest, quum eorum nulli adit̃ robur. Si itaq; magnam fore morbum timeamus, aut iam præsentia est, aut incipit, venā secabimus, virium habita ratione, tantūq; ex oratione excep̃tis pueris. Nec verō vbi tanta humorū crudorū copia accumulata est, vt secandam venā \* prohibeat, sermo hic redarguitur, quū ipsi viriū robur non adit̃. Estq; hoc indicit̃ eos haud posse sanguinis missionē perferre, \* quod præter colorem totius corporis, degenerantem in ipsib; eo, qui solet sanguinis copiam ostendere, etiam ipsorum pulsus ruxqualis in vellemta & magnitudine existit: præpollentibus secundū ipsam inæqualitatē, imbecillis simul & parus. Itaq; ex morbo, etate & viribus, minuscū esse sanguis cognoscitur. At vacuationis quantitas, cum ex istis, tum etiā ex plethorica vocata syndrome, æris nos ambientis tēperie (quæ in tempus & regionē diuiditur) anteaq; viciis ratione, ex ætē onib; factis, aut impedientib; cōmōdē deprehenditur. Igitur ad hæc omnia respiciens, tempus odagriticū, tum arthriticū, tū morbo comitali obnoxius: præterea melancholicū, quicq; sanguinē antea expuerunt, aut thoracis itreturā sortiti sunt ad id malum idonei: vertiginosū etiā, quicq; assidue corripit solent angina, peripneumonia, pleuritide, hepatisde, ophthalmia vehementi, ac breuiter morbo aliquo insigni, sanguinē detrachere consueui. Porro in redundatā melancholicū humoris, sanguinē mittere oportet, aut certē medicamentum vti expurgatē atram bilem. At vbi crudū succū exuperat, anteq; morbus inuasent, cautē evacuabis: vbi verō iam corripuerit febris, nequaquā. Indicit̃ autē crudorū humorū est color plumbeus, aut albus pallidus, omnizq; porius quāvis rubeus: tum inæqualis pulsus. Verum si ob hæc morrhoides suppreffas cumularis aliquid sit sanguis in corpore, auct̃ sit venā incidēs, etiam si antea expertus graui morbi non fuerit. Sed nec euacuatio is proroganda est, quibus res sunt menstrua purgatio. Non tamē necesse est, illi semper secare venam, quū malleolorū scarificationes quandoq; superbiunt vacuandæ sint facis. Plenuit̃ dines tamē a suppreffis mensib; or 60

nibus malleolorū adhibitis, maximē solent iuari. At quæ nigiores sunt, eas venā secā curābis, quum tales crassiorē sanguinē, ac magis melancholicū gignat, præcipue verō si magnas habere venas appareant: id quod accidit illis, quæ graciliores simul atq; nigiores fuerint. Etenim carnosæ & candidas parue infunt venæ, ac proinde ipsi malleolos scarificare, q̃ secare venam, præstiterit. Porro validi sanguinis eruptionem, venæ sectio solet sæpe cōpelcere, tanq̃ reuulsorium auxiliū. Secare autē in cubito venā, si ex dextra nare prorūpat sanguis, in brachio dextro expedit: sin ex altera, in sinistro: minimē tamē vsiq; ad lapsum viriū detrachendus est sanguis. Simil aut, quū agis, artubus vincula indicito, aut ex la na, aut canabe, hypochondriq; directē supposito, cucurbitulā admoeto: quandoquidē ius remedium semper erumpentem ē naribus sanguinē cōpelcimus: quum antea q̃ inierunt n̄ nares, atq; fronti illinuntur, infirma omnia cōperi remus. Nihil aut xq̃ ætatem medicū in agendo cōiecturalem efficit, vt cuiusq; remediū quantitas. Si quidem interdum exploratum habemus, quid nam xgro, quale, & quidō sit exhibendū, at quantum exhibere oporteat, non nouimus. Hoc tamen summum bonum in sanguinis missione habetur, quod potes sistere euacuationē, dum opportunum videtur: ac rursus si quando animus sit, sinere vt fluat, quovis videbitur tibi rectē se habere negociū: id quod nō licet in purgantib; pharmaci exhibitione. Nam quod semel in ventrem deuoratum est medicū, quod minus omne sit deuorātū, fieri non potest: iteq; possibile est, vbi plus quā conueniat, purgetur, partem oblati auferre. At verō dum, aliquid sanguinem mittimus, nisi quid virget, præstat priori missione minus detrachere, iterūq; illā repetere, imō, si lubet, tertiq; vbi igitur multa euacuatione est opus, sed vires sunt imbecilliz, in iis euacuationem partiri expediat, vti & me fecisse vidisti, in iis quibus crudorum iuerat humorum copia. Nam detractō pauculo sanguine, spiritus exhibeo melicratum, probē coctum, cum incidentium medicaminū quopiam vel vni hyssopo, origano, nepita, pulegio: aut certē cū melicrato oxymeli, aut oxyglycy: ac sic rursus sanguinem minuo, vel ipso eodem nonnunquam die, interdum die postero: in quo rursus exhibitō propolisiorum medicaminū quopiam, ali quid de sanguine aufero: ac rursus tertio die similiter bis. Ceterum vbi fruescentis inest sanguinis plenitudo, acutissimā febrem accendēs, subito ac simul vacuare expedit, eamq; priusq; in principē aliquā partem ingruat, inanire tentandum, vel ad animi vsq; deliquiū: viriū tamen inspicit̃ robore. Quare nec per noctem sanguinē detrachere veretur. Vtile autem fuerit, fluētē enānum sanguinem, expendere pulsuum diminutiones: ne videlicet, nobis non aduertentibus, pro animi deliquio more hominem occupet. Quinetiam & reuolutionē, non leuē & ipsam auxiliū, quodq; sæpe secta adhibetur venā, quantō maiorem in numerum particulares auxeris detractiones, tantō efficaciorē effeceris. Ergo si magnitudo morbi, missione sanguinis

Sanguinem mi  
tendi principes  
scopi q̃ sunt.

Iam omnia  
causa robore,  
tunc præcā  
na isti venā.  
Cruda succū  
refertis nō ad  
mittere vna  
sistunt, quæ  
causa robore.

Vacuatio  
quantitas ex  
quibus mittit̃  
de sit.

Sanguis quib;  
in detrahēdis.

Cruda succū  
quando vacua  
re oportet, &  
quidō prout  
ni.

Crudum ha  
morū crudū,  
hemorrhoida  
bus, aut men  
strua suppre  
ssis, sanguinem  
detrachēdis of  
fi.

Menstrua offe  
rreanda per  
vna: reuolū  
ta per vna si  
cūna sistunt.

Scarificatio  
omnis sit adhibē  
tenda multo  
bus, & quib; sit  
the vna.

Vena quibus la  
tuit quib; ex  
que inist multo  
bus.

Sanguinem eru  
ptionē venæ se  
cto compellit.  
Sanguinem eru  
ptionē per nari  
quæ recte co  
tenda.

Quantitas ro  
mediūm præ  
cipui reddi ar  
tem medicū cō  
iucturalem.

Sanguis detra  
ctus quæ tem  
modatā infia.

Purgatio phar  
maci, vbi de  
uorata simul  
in ventrē iuat,  
reuerari non  
possit.

Euacuationem  
quidō partiri  
expedit.  
Sanguinem mis  
sio, in quibus  
aliqui crudorū  
humorū copia  
quandoq; calu  
branda.

Sanguis quādo  
mittendus  
ad animi vsq;  
deliquiū.

Sanguis dum  
fluat, pulsū esse  
expirandos.  
Reuolūta per  
vna sit efficacior.

Sanguis de  
trahitur. Sanguis  
vacuus qui  
fuit liberatus.  
Et qui parvus.

Parvus autem  
quod dicitur  
animum fanguis  
non nisi esse intem-  
peratum.

Vires robustas  
quo pulvis co-  
ditur.  
Septuaginta  
quando vici-  
tus fuit sanguis.

Sanguis flos-  
cit per hanc  
venam super  
mentis esse  
alterant pul-  
vis.

Sanguis de-  
trahitur per  
infirmitatem  
efficitur, datur  
vires, flosci-  
tus, aut luvius  
conficitur.

Sanguis mu-  
tatu post solis  
venam, quan-  
do expectanda  
non sit.

Gallus parvus  
fanguis de-  
trahitur, tra-  
hendum.

Sanguinem effi-  
parum detra-  
hendum sub Ca-  
ne, et in repu-  
mentis collis si-  
mul et ficut, et  
in frigida et  
constrictione.

Sanguis flos-  
citur, aut de-  
trahitur flos-  
cit.

postulet, adhibet viriū robur, nulla potest esse tan-  
ta crudorū humorū copia, q̄ inhibere id auxili-  
um possit. Ceterū quib. amplē sunt venæ, quig  
modicē grāciles sunt, nec candidi, nec tenera car-  
ne prēditi, eos copiosius vacuabis: cōtrarios autē  
parcos, quū exigūū habeāt sanguinis, cāmēq;  
facile transpirabilē. Quā ratione nec periculis per-  
tūndes venā, autē quartumdecim annū post  
quē, si multus cōgelus sanguis appareat, tēpū-  
que anni sit vernū, & regio tēperata, putēq; uarta  
ra sanguinea, aut aliusvis acun morbi discretimē  
impēdeat, sanguinē minues, in primis quidē ad  
corylā vsq; q̄ si postea vires valide pmanere vi-  
deatur, dimidiam eius adicies iterata misione.  
At vehemēs, equalis, & magnus pulsus, incorru-  
ptū viriū robustū est signū. Quare si in septua-  
gentariis in adit, affectūq; iubeat, etiā secabis ve-  
nā. Proinde nō tantum annorū numero, sed cor-  
poris etiā habitū animū intendendus est. Ad  
hęc, vbi incisa vena effusus sanguis, mutatiōē e-  
ius, & maxime quā ad est phlegmone, labacēsē  
fluxionis robur, expendere oportet: sed potissi-  
mū alteratiōē pulsū: quib. quidē aliteracti-  
bus, aut in magnitudine, aut in quavis inēqua-  
litate, cōtinuū quiescendū est. In quib. aut iux-  
ta sectam venā phlegmone est ingēs, optimū est  
sanguinē, & in colore, & in consistētia expecta-  
re permutatiōem. Id q̄d senēs Hippocrates in  
curatiōe pleuritidis, ait: Sectā verū in cubito  
vena interna. Nec veritas multum detralere,  
donec rubrior, fluiōrve multo effluat. aut p pu-  
ro ac rubro lividus: vtrūq; a. accidit. & Eius si  
quidem trāsumponis, quā nōnihil sanguinis  
a parte phlegmone obsecra rapit in vulneratē ve-  
nā, cōstituit signū, ipsius sanguinis mutatiōē.  
Quē tñ nō omni ex parte expectāda est, quā ali-  
quando, priusq; ipse sanguis mutet, cessandū sit,  
nimiram duplici nomine: vel ob vires infirmas,  
vel ob malignitatē phlegmones, i qua interdū  
nihil emittit, sed inibi fortiter impactus est san-  
guis. At si ex vacuatiōe vires minime resolu-  
deantur (id quod ex pulsu cognoscitur) xger autē  
dem sit arate florēt, expectāda mutatiō sangui-  
nis est, potissimū si ambiens sit temperatus. Mi-  
nus autē detralimus, quā plenitudine commō-  
net, secundum arates quidem, in pueris: secun-  
dum corporū habitus, in cōditiis, & carne mol-  
libus, cuiusmodi Galli existunt, secundū tem-  
pora verō, sub Canē: ac similiter secundū regiones,  
cōstitutiōēq; in his que calidiores iuxta & sic-  
ciores existunt, quū nimirum hęc omnia, quā  
maximē ad resolutiōē sint apta. Alia autem ra-  
tione in contrariis, hoc est, temporibus & regio-  
nibus frigidis, Jargam fugimus vacuatiōē, pro-  
pter insequentem refrigeratiōē. Quare vnum  
vacuatiōis modum in distonum singulis de-  
finire nō licet. Memini enim quibūdam ad sex vsq;  
que libras sanguinem fuisse detractū, ita vt se-  
bris protinus extingueretur, ceterā villam virium  
iacūra: quibūdam verō seculislibram tantum,  
nec id absq; insigni damno. Porro ex venis quę  
ad magnos oculos angulos conspiciuntur,  
aut sub lingua, quod certē mētiōe sit dignum,  
effluere nō solet: sicut nec si quis summa in ma-  
nu, aut pede venam fecerit: quemadmodum pu-

rant tñ, qui liene curari aiunt, i sectione venę fi-  
te iuxta scēdum ex digitis parvis. Quod verō  
ad differentiam venarum pertinet, quibuscūq;  
hęc ipse, hoc est, i directio erupio sanguinis acci-  
dit, iustum id commodū laborantibus ad-  
fert. Quibus autē contrā evenit, nihil iuvat, aut  
etiā interdum nocet: quōd vires solent, citra  
morbū leuamen, deciaur, vt, si liene turgēte, dex-  
tra nare sanguis elinueret. aut hepate, ex sinistra.  
Dextra igitur nare sanguis erumpēs, ad dextrū  
hypochondrium fixa cucurbitula, clare, celeri-  
terq; sistitur: sicut ad sinistrum, si ex sinistra pro-  
fluat. Similiter si venā reuulsioni studio secēs,  
secundum rectitudinem quidē sectā, oppositis  
sanguinis erupitionibus cōsumē cōspiciam v-  
tilitatem adferet. At si cōtrā feces, nihil sanē pro-  
fuerit. Quare liene affecto, perinde adiuuente ve-  
na secta in sinistra manu, iuxta annularem digi-  
tum, ac si interna in cubiti venam secueris. Pluri-  
mum namq; mutat absēctum liene, sanguinis ex  
sinistra manu interdum vsque ad libram vnam,  
detractū. Preclar autem nō semel quantum cō-  
veniat, detralsere: sed in duos dies ipsam evacua-  
tiōem parari. Pleuritidis etiā, quę i directio la-  
boris lateris adhibita fuit sanguis missio, cla-  
rissimam sepe vtilitatē attulit. Quę verō ex bra-  
chio opposito, aut omnino obscuram, aut certē  
post temporis intervallū. Ad hęc, oculorū per-  
sepe dolores gravissimos i directio venę lūme-  
ralis scēto, aut medianę, quę ab ea deriuata  
est, intra hore vnius spaciū cōspicitur. Conari au-  
tem in omnibus affectibus pręstat, post modicā  
misionē sanguinis, iteratō mittere, intermodi  
odie, interim potissimē: nisi quando ad animi vsq;  
deliquim, vacuatiōē ducere oporteat. At do-  
lente latere aut pulmone, aut septo transverso,  
aut liene, aut icore, aut ventriculo, secta vena,  
quę per axillas ad cubiti iuncturā pertingit, aut  
etiā quę illi & humerali est communis, iuculā  
tam vilitatem adfert. Sunt etenim et res venę,  
ex quibus in cubito mitti sanguis, interior, ex-  
terior, & media. Inter quās sanē interior viliis  
est, misis quib. inferiores collo partes patiunt. Ex-  
terior verō, in us viliis, q̄ his superiores sunt:  
vt facies, aut caput. At media, medio genere am-  
bigit: quum inter vtrāq; versus obscuritē ma-  
num, suos ramos producat. Quare si vena quę  
parti affectū propria est, aliquando fuerit obscu-  
rior, cogarisq; ob id aliquam mediarum incide-  
re, conare vt quę i propria ducitur, eam po-  
tius peritdas. Interdum etiā, eas quę inferio-  
res i dextra cubiti sunt, nempe quę in vlna cōsi-  
stūt, nihil prohibet venas secare, sed tamē recto  
transire particulis affectus correspondentes: idq;  
vbi venę quę in cubito sunt, non appareant. E-  
quidem diuisis cuiusdam æconomum, oculo-  
rum maxima inflantur, atq; fluxione affli-  
ctum, quamocysimū in pristinam sanitatem re-  
stitui, detractū primū ex humerali venā, libris  
sanguinis ternis: ac dein, modico interposito rē-  
pore, alia. Quā ratione, soluta phlegmone,  
potē in palpebris relicta aspernate absterri, ali-  
quo ex medicamentis mordacibus: quod neunq;  
ger ferre potuisset, nisi fuisset prius evacuatus.  
Siquidē i cubito omnia medicamenta parti cuius  
ad mora,

Sanguis vni  
si applicata h  
i dextra, et  
tor curare lo-  
cum.

Sanguinem  
pauca i dexte-  
ra, et  
vlna labora-  
tibus, aliqui  
non iuvant.  
Sanguis  
flavus per axi-  
lā, quemad-  
modum  
supra.

Liene affecto  
iuxta vlna ve-  
na in sinistra  
mano iuxta  
annularem di-  
gitum.

Vacuati quidē  
de se in duos  
dies paritdas.  
Pleuritidis  
efficiendi vna  
in cubito par-  
tis affectu.

Oculorum dele-  
ra compo-  
sita humerali,  
aut media.  
Vtrāq; dextrā  
efficiendi de-  
trahimus.  
Venarum cubi-  
ti quę in quib.  
afflictis sunt  
secanda.

Vena tres in cu-  
bito conspici-  
tur: interior, ex-  
terior, quę hu-  
merali est, et  
media.

Vena cubiti ab  
exterior, postea  
in vlna ab  
dextra, et  
sinistra.

Oculorum ma-  
ximam inflant  
matorem quā  
rationem curant  
Galienus.



*Arteriam inter  
indidem pul-  
satam quam se-  
cutus Galenus  
ab infirma  
mentis libera-  
tus est dicitur  
non praecurari  
dolore.*

*Arteria in mel-  
liore diffecta,  
dicitur cura  
dilectum fuisse.*

transversim secantes. Ego vero aliquod moni-  
tus per quoddam infirmum, secui dextera manus ar-  
teriam, inter indicem & pollicem sitam: permittens  
vnde fluere sanguis, donec sisset sponte: su-  
bitque diuturnus mihi exstinctus est dolor, q in  
illa maxime parte erat fixus, qua secur per tras-  
verso committitur. Minister etiam Dei Perga-  
mi, a diutino cruciatu laetis, similiter liberatus  
est, arteria in summa manu incisa, idque monitu  
infirmum. Porro alteri, cui ex vulnere in malleo-  
lo inflecto, diffecta fuerat arteria, sanguinis qui-  
dem cursus haud quieuit, donec ipse dissecui to-  
tam: ac medicamentis ex aloë, mēna, onorū albu-  
mine, & leporis pilis imposito vīns, ubique socu-  
rissime vlcus ipsum curavi. Vir aut ille prorsus  
sano relictus est a coxæ dolore, quo iam diu fue-  
rat exiguus temporum intervallis vexatus.

### GALENI PERGAMENI de hirudinibus, revulsione, cucurbitula, & scarificatione, libellus.

DE HIRUDINIBUS.



*Hirudines af-  
ferenda alieni  
sunt et applica-  
da recte.*

Væ hirudines sunt recte capite, eas  
diem vnum asservare oportet, pau-  
culum sanguine in passum exhibitio.  
Sic enim prius earū venenū expri-  
mitur. Pars autē cui iam admo-  
verit, nitro prius perficeretur, aut vnguibz scilicet  
pauca: nam sic propius eam apprehendens. In-  
cienda autē sunt in aqua tepida vas putum, la-  
rigi oris: deinde spongia eam comprehendentes,  
viscositatezque ab eis detergetes, tandē manu ap-  
plicabimus. Vbi autem adhaeserint, infundendū  
particulæ oleum tepidū est, ne scilicet refrigeretur.  
At si manibus aut pedibus admoventes sint,  
ipsam partē, a qua cui infunt sanguine, immer-  
gere oportet. Quod si parum depalcantur, forsi-  
ce candam praecidito, secundū rectitudinem fi-  
lamentorū. Nam effluente semper sanguine, tra-  
here non desistent, donec salem, aut cinerē, ipsa-  
rum ori insperferimus. Vbi verō deciderint, cucu-  
bita venenū est avellendum, aut pars fouenda  
ex spongia. Quid si particula emorfa lachry-  
met, cumini, aut farinā inspergito: superque lana  
madidata oleo paululo, involvito. Sin sanguis  
eripat, linteæ ex aceto iniicito, aut gallam vitā,  
aut spongiā liquida pice madentē, posteaq v-  
itam imponito. Sciendum autem est, hirudines  
haud eum qui in profundo est sanguinē, sed tan-  
tū quo caro est imbuta, exvgerē. Vmureis p. 30

*Hirudines ut  
deposcatur in  
neglectis,  
praecidenda in  
candis rē.*

*Hirudines autē  
h, sale aut cinere  
respersu vire  
sunt.*

*Hirudines iam  
de lapsa, cucur-  
bitula rē parti  
admoventes.*

*Hirudines san-  
guinem citius  
sunt vnguenti.*

*Hirudines natu-  
rae esse frigi-  
das.*

*Avellendi mo-  
di diversi.*

cucurbitulis: detrahimus ipsas, vbi demidiam  
sanguinis partem iam extraxit cōducimus. Pro-  
hibemus autē, & nō permitimus effluere, quo-  
visque quod sanis est evacuetur: quandoquidē par-  
ticula tū a sanguinis ipsi natura frigida, tum  
ab aere nos ambiante refrigeratur.

De revulsione.

Vehementissimos humorū influxus remediis  
revulsoribus prohibemus. Quales sunt, incumbē-  
te in pectus vni in ventre humore, ad manus rec-  
tractio. Vomitus, vbi deorsum decubuit. Sicuti in  
vomitu, p acrioris clysmos revulsio. Duo verō  
haec momenta, quæ ad superiorē inquam ven-  
trem, & inferiorem vergunt, ad vrinam, sudo-  
resq revelles. Quin & vrina, ad sudores, & deie-

ctionem trahitur. Revulsorū quoque auxilium est,  
iuxta mīmas cucurbitula admoda. Ceterum  
hypochondriis affixa, sanguinis ad nates impetū  
revocat: sicuti & immoedicū ex vtero effusū.  
Porro vergentes ad caput aut viscera humores re-  
trahunt acia in sinus imposita medicamina. In  
summa, revulsio mollida est, humoribz sursum  
fluētibz, deorsum: deorsum verō, in contrariū.  
Rursus, intro vergentibus, foras: sicuti si foras  
sunt, ad interiora. Similiter si ad dextram inclu-  
dent, ad sinistram: ad sinistram verō abeuntibus,  
in partem diversam. Sic quæ retrō cōcedunt, an-  
tē: quæ verō antē, retrō revocabus.

De cucurbitula.

Cucurbitulae usque ad vacuam sunt, cōve-  
niunt. Nam in plethoricis, minime sanē ipsa vti-  
mur. Eadem ratione neque in cerebri aut menin-  
gū phlegmone incipiente vtiur cucurbitula:  
sicuti nec alia in parte vili phlegmone obse-  
sata: vbi nihil præterea enī infusit, fuerit quo  
rum corpus antea vacuū, atq opus nobis iam  
sit, aut monere, aut amoliri, qd in phlegmone  
obsepta particula infixū est, aut deniq foras ex-  
trahere. Porro dum affectus enīnū siūt, haud  
in ipsis iam laborare occipitibz, partibus, sed in  
eis q illis continne sunt, revulsione causa est cu-  
cubitā imponēds: in principio autē vtiendū repe-  
lentibz est. Cucurbitula potest evacuari materiā,  
dolorē solvere, minuire phlegmonē, infirmū nō  
discutere, revocare appetentiā, ventriculo infir-  
mo robur recuperare, animi liberare deliquio,  
ab alto fluxione trāsferre reficacēq, sanguinis  
eruptiones colubere, facultates mensium corru-  
ptices extrahere, ac deniq menses ipsos levare.

De scarificatione.

Scarificamus partes corporis aut phlegmone  
sestivē tentatas, aut tenas, aut dolore vexa-  
tas, aut fluxione affectas, sed q iam resint: ut acri-  
tūmbas materia, aut vbi extrinsecus aliqua  
virulenta facultas in corpus incidit, aut vbi mate-  
ria ex alia parte in alia trāducere est animo. Vbi  
in crura scarificamus affecto capite, aut materiā  
in corpore exvndantē movere statuetes, potissi-  
mū vbi exvndantia, pvenit ad suppressa materia,  
q solēnter evacuari cōsueverat. Sic suppressa hū-  
moroidibz, scarificamus crura, prius ea per spō-  
giā fouentes calida. Nam si ipsas venā incide-  
re in anno, haud expedire arbitror, quā vna cū  
sanguine viralis exhaustus spiritus. Prodest autē  
scarificatio & oculis diutina fluxione afflicto: tū  
capitis affectibus, quique pectori atq dorso eve-  
niunt: ad hæc angini, atq impactis humoribus.

### GALENI DE PURGANTIVM medicamentorum facultatibus libellus.



Adem de cāsa medici vultissimū  
prauas opiniones reliquasse irrepre-  
hensas videm, quæ grauissima enī  
delicta antiquissimalegulariores im-  
punita fuerūt. Quā n. eo tempore  
minor esset malina hominū, vi qui nec maxime  
crimina perpetrare aggrediebantur, nec maxime  
stissimis impudentē cōtradecere, quomodo ali-  
quis punitionē eis quæ non dum admissa esset,  
prescriberet, vel redargueret ea quæ nemo pro-  
fus

*Cucurbitula  
hypochondriis  
affixa, sanguinis  
ad nates impetū  
revocat: sicuti &  
immoedicū ex  
vtero effusū.*

*Cucurbitula  
vbi nihil præterea  
enī infusit, fuerit  
quo rum corpus  
antea vacuū, atq  
opus nobis iam  
sit, aut monere,  
aut amoliri, qd  
in phlegmone  
obsepta particula  
infixū est, aut  
deniq foras ex-  
trahere.*

*Cucurbitulae  
vbi nihil præterea  
enī infusit, fuerit  
quo rum corpus  
antea vacuū, atq  
opus nobis iam  
sit, aut monere,  
aut amoliri, qd  
in phlegmone  
obsepta particula  
infixū est, aut  
deniq foras ex-  
trahere.*

*Scarificamus  
partes corporis  
aut phlegmone  
sestivē tentatas,  
aut tenas, aut  
dolore vexatas,  
aut fluxione  
affectas, sed q  
iam resint: ut  
acri tūmbas  
materia, aut vbi  
extrinsecus aliqua  
virulenta facultas  
in corpus incidit,  
aut vbi materia  
ex alia parte in  
alia trāducere  
est animo.*

*Scarificamus  
partes corporis  
aut phlegmone  
sestivē tentatas,  
aut tenas, aut  
dolore vexatas,  
aut fluxione  
affectas, sed q  
iam resint: ut  
acri tūmbas  
materia, aut vbi  
extrinsecus aliqua  
virulenta facultas  
in corpus incidit,  
aut vbi materia  
ex alia parte in  
alia trāducere  
est animo.*

*Scarificamus  
partes corporis  
aut phlegmone  
sestivē tentatas,  
aut tenas, aut  
dolore vexatas,  
aut fluxione  
affectas, sed q  
iam resint: ut  
acri tūmbas  
materia, aut vbi  
extrinsecus aliqua  
virulenta facultas  
in corpus incidit,  
aut vbi materia  
ex alia parte in  
alia trāducere  
est animo.*

*Delicta gravif-  
sima, quæ anti-  
quissimalegulari-  
tatis impunita  
fuerūt, quomodo  
aliquis punitionē  
eis quæ non dum  
admissa esset,  
prescriberet, vel  
redargueret ea  
quæ nemo pro-  
fus*



Præterea etiam  
dicitur graviter.

his dixisset: At quia temporis spacio eo crevit  
hominū pravitās, ut nihil nō aut tacere, aut dice  
re ausi sint, legū quidē laiores multas puniō-  
nos rationes nō ut adinuēniūt, quibus facino  
rosos plectant: veritatis autē studio, varias con  
tra sopilitas reprehensionū species exogrant,  
quibz ipsos coēreant: id quod nos imprecientia  
rum quodāmodo facere cogimur, improbatum  
eos, qui medicamētis purgantibz vim attrahē-  
tricem humorū quos evacuat, inefficacem: mura  
tricem verō quandā omniū ex æquo illorū, quę  
ipsis appropinquāt, eis tribuit. Quā nimirū fa  
cultate aliunt medicamētū quod flauū efficiat bi  
lem, quencunq; humorē contigerit, hunc in pro  
priam sui speciem mutare: vocariq; medicamen  
tū cholagogū, quod bilem flauū & efficiat, & mo  
ueat: aliisq; similiter medicamētis sua esse indi  
cata nomina, nō quidē ab humoribz, quos natura  
liter vacuat, sed ab his, quos suo contractu effi  
ciunt. Ex cuius sanē opinionis absurditate sequi  
tur, siue bilem ducēs, siue purgāt, siue atrā bilē,  
siue serosam humiditatē, aliquę medicamētū  
assumpserit, vniuersos ex vniuersis humoris vacua  
ri. Neq; alia ratione purgatio ab humifimodō me  
dicamento petra, disiecta ā sanguinis euacuatio  
ne per venę sectionē, quā quod in hac quidē,  
ille qualis prius erat, excernit: in purgationibus  
vīt, inalterat, nō colore tantūm, sed etiā consi  
stentia: id quod maxime ridiculū est. Siquidem  
per detractionem sanguinis æqualiter omnes,  
qui in venis sunt, humores vacuant. Per purga  
tionem verō (quę scilicet sanguinē ipsum purifi  
cat) non æque omnes, sed unus aliquis, præci  
puę is, ad quem naturaliter educendū medica  
mentum est aptum. Atq; hæc sanē existit opti  
ma Asclepiadārū sententia, cui etiā ratio simul et  
experientia patrocinant. Nam si ex tribus abiq; se  
bri laborantibz morbo arguato, vni quidē san  
guinem detrahās, alteri autē medicamētū quod a  
tram educit bilem exhibeās, tertio deniq; propi  
nes pharmacū eliciens diffusam illam bilem per  
corpus, certē duo illi priores longē deterius ha  
beant: tertius autē, cui exhibitum medicamen  
tū fuerit familiaris succi attractiuium, nā unum co  
lorem recuperabit. Atqui iuxta illorum insaniā,  
perinde erit siue misisonē sanguinis, siue me  
dicamento quod bilem ducat, arguato morbo la  
borantē manias. Idem etiā & in reliquis mor  
bis est incundū iudiciū. Igitur opimionibz, ipso  
valere iusis, singula medicamēta purgantia im  
tio familiarē humorem trahunt: postea verō il  
lum qui vt sequatur, liabilior atq; aptior fuerit.  
Exempli gratia: medicamen quod flauū bili du  
cendū est, primo quidē illam expurgat: dein a  
quosam humiditatē: pluitam tertio: mox atrā  
bilem: vltimō deniq; sanguinē, quod sit is natu  
rę familiarissimus. Reperiunt tamen aliqua me  
dicamina, quę statim ab initio sanguinē ducant:  
ceterū illi nemo vteat, quandoquidē hoc lu  
gulare esset hominē, non purgare. Siquidē pur  
gantia, hoc nomine talia dicuntur, quod repur  
gent sanguinem ab illis recementis iam dictis.  
Quare inter deleteria, id genus omnia medicamē  
ta annuerant, quę sanguinis euacuatio  
nem, per veas ventris, & intestinorū, molunt.

# GALENI PERGAMENTI, QVOS

purgare, quibus medicamentis, & quan  
do oporteat, liber vnius.



Vi sano sunt corpore, purgationes  
grauiter ferunt. Nam quū purgantia  
medicamentū familiarē sibi humo  
rē attrahere desideret, sanē dum eo  
detrahatur, sanguinē & caenes elo  
quat, confumitq; vt quod silis, apertū est, trahat.

Sanē cur purga  
tiones grauiorē  
ferant.

Porro q; sani quidē sunt, verūm ægrotaturi, nisi  
fuerint vacuati, in animi vere ineute debent: idq;  
vel sanguinis detractione, si plethoricis corrip  
iant morbis: aut purgatione, si factis ex corru  
ptione assigant. At melancholia, cancer, elephā  
tiasis, ceteriq; id genus affectus q; ab humore a  
tro proficiunt, atræ bilis purgatione indiget:  
quā non vere rantū, sed ausino etiā ipse moliri  
cōsueui. Iam comitales morbi, apoplectici, sus  
pensoriiq; vacuationē prius postulat. Articula  
res affectus, qui quidē vni cum insigni calidita  
te assigant, biliosorū: qui aut cum tumoribz frigi  
dis, peritoforū vacuatione iuuant. Quidā ætiā  
uo tempore tertiana febribz, semper corripī soli  
tus, iam multis annis nō febricitant, quod bilis  
flauæ purgatione ad finē veniāt nobis admini  
strata, illi prospectū sit. Sic u, satius est tales va  
cuare: quemadmodum comitales, articularios,  
melancholicos, quibz ab humoris crassos ægro  
tant, ineunte vere melius vacuant. Ceterū hu  
mores crassos & viscidos prius attenuare et inde  
dere oportet: meatūq; p quos transiunt, at  
trahunt, aperire, ante medicamēta purgantia, si  
purgatio modis omnibz, optima fit futura, præ  
ferunt mihi q; veratū assumūt. At verū q; ægrę p  
superiora purgant, si, nisi prius reddantur habi  
les, præparanturq; ad vomitū, minime assumāt  
veratū. Præparabunt autē medicamētis vomito  
riis medicoribz, necnō cibo vberiori, & quiete.

Vacuandi qui  
sunt veri incuati  
sunt, et quomodo.

Atræ bilis pur  
gatione q; aff  
fectus iudicabit.

Vacuandi pri  
us qui morbo  
in postulant.

Remis non radicales ex oxymelte propina  
mus, quas aridūne pforatas, ac ramulis veratū  
albi transfixas, p totū diē atq; noctē reliquimus.  
Atque eiusmodi ex elleboro facta purgatio erit  
imbecilla. Verūm q; angustū habet pectus, coliq;  
etiā cōpressum, ineptissimū ad purgationes cogi  
tunt, quę p vomitoria medicamēta fiunt, ac po  
rissimū p albū veratū: siquidē thoracis aliquod  
vas, ipsis rumpitur. At bilis suprà, pmuta p infer  
na vacuari debet. Est quādo cōtrario modo acci  
dat, si quidem in ventriculo pituitosus, biliosus  
aut in intestinis humor residat. Melancholicū  
verō semper p inferiora vacuare oportet. Sic æ  
tiores quidē superiores ventres, hyeme verō in  
fiores mouere cō veniūt, vt auror et nobis Hippo  
crates. Sed regionis etiā, anni repositi, ætatis, cō  
suetudinisq; nō exigua ratio est habēda. Siqui  
dem q; (grana exempla) vomere soliti sunt, faci  
lius purgationes ferūt p superiora: q; nō assuee  
runt, haud citra periculum: magisq; ex verato.

Crassos siccis  
prius remouet  
q; quā euacu  
entur.

Vomiti quali  
ter preparati  
egro debent.

Vomendi tem  
pus q; finē.

Nam bilis per  
superiora quā  
to p inferiora  
maior ex parte  
vacuari de  
bet: ut atra bi  
lis semper per  
inferiora.

30  
40  
50  
60

30  
40  
50  
60

Hydropicū a  
vacuati ratio.

Veritas pur-  
gandi ratio.

Porro in acate, medicamentū aliquod aque cū-  
da idoneū exhibebimus: sicut etiā in arquatō,  
quod bile elicit. Nam & in his etiā bile multatū  
supra & infra, per vrinās, palatū, & hares, purga-  
re convenit. Morbi itaq; dispositio & vacuandū  
humorē indicat, & locū per quē debet vacuari.  
Verbi gratia, si quis in icore habent inflammationē,  
ubi tumor cōcoctus fuerit, eius expurga-  
tionē molimur, per inferiōrē sanē ventrē, ubi ca-  
uās ipsius partes affectus occupat: per vrinās au-  
tem, quā gibbas. Accedit his omnib; tēpus & oc-  
casio. Per iniūa namq; serofos tenuēsq; humores  
vacuabimur: in crasis autē & yscidia, expectabis co-  
ctionē. Ad hæc, in accessu febriū quidē, per supe-  
riora vacuabis: in remissionib; autē, per inferio-  
ra. Atq; hæc sanē, si spōrē accidit, iuvant in acces-  
su febriū quidē, dum multū vomunt, & per na-  
res sanguinē fundunt in remissionib; autem, dum  
vrinæ deiectionēq; excreantur. At tēpus  
diuturnū accessu febriū & deiectionū, quā  
infra copiosē purgare aggredieris, cauere oportet.  
Vbi enim humorum impetus sursum vergit,  
medicamentū purgātis facultas impeditur. Por-  
rō in morbis diuturnis, semper corū maturatio  
expectanda est: in acutis autem, quum turgent,  
ac priuor, vel per iniūa vti medicamētis licet.  
Verum quā omnia purgantia medicamenta fa-  
cultate calida exstant: febriū autem sursum  
humectatis & refrigerantia postula: certē non  
ipsius calorū grata purgatio à nobis admini-  
stratur, sed humorum causa, quā nimirum illum  
accendunt. Igitur vti evacuatur, primum sanē  
discipiendum venit, num exger sit ad eiusmodi  
purgationem idoneus. Nam qui ex crudis sibi  
multis, aut viscosis crassive cibis laborat, item  
quibus præcordia intenta sunt in flatib; aut su-  
pra modū calida & ignea, aut aliqua inflammā-  
tione laborent, omnes hi ad purgationes inepti  
sunt. Proinde hæc abesse, & humores quāmaxi-  
mē licet diu dios facere oportet, hoc est, tenues, et  
nullius lentoris participes, meatūsq; p quos pur-  
gationis futura est, adaptatos. In acutis autem mor-  
bis rarō per iniūa purgantibus medicamētis e-  
gebimus, eo quod nec frequēter ooxi humores  
per iniūa turgēt, priuāntve nec, si hoc detur, ge-  
ger sit ad purgationē idoneus, ac oe tēpus qui  
dum oobis præbeat præparandū idoneum. At hu-  
mores prurire, seu turgere dicūtur, quum motu  
vehementiori agant, & à particulis in particulas  
transiunt, per morbi iniūa molestant, homi-  
nem dolore afficiēt, irritantes, & quiescere nō  
permittūt. Tales igitur evacuare convenit. Par-  
ticulæ autē alicui inhxos, nec alio quodam præ-  
sidio mouere oportet, nec medicamentis solici-  
tate, priuāntque fuerint concocti. Tunc si quidē  
& naturam vacuacioni opitulanti habebimus:  
quippe quæ post coctionē, & discernere humo-  
res, & superfluum deponere apparet: quo tēpo-  
re etiam crises accidunt. Quod si natura ipsa ab-  
soluēt moueatur, nihil tūc est opus medicamen-  
tis. Vbi verō imbecillius actionem obit, id quod  
deest, oportet nos per medicamētā adicere. Sciē-  
dum autem est, transiuxiones humorū ab vna  
in alterā partem rarō acciderē: sed maiori ex par-  
te ipsos in vnicō loco hærere, inibiq; per totum

morbi tēpus ad solutionem vsq; concoqui. Si  
nō acutus modō sit ipse affectus, sed etiam cum  
febre vehementissima accidat, in edicamen pur-  
gans exhibendum nō est, præsertim si quis non  
habuerit naturam ægri exploratam: At si febris  
vehemens non fuerit, nonnig ægrotantis natu-  
ram minimē abhorere à cathartica, eliboro  
nigro vtrius, aut hiera diacolocynthidos, q̄ elle-  
borū recipi, absq; scāmōio. Assumpto pharma-  
co, cōducit mox isper forbere tremorē pñānti:  
vt qui id q̄dam trāitu affixū applicimq; est, ab-  
stergere, & deorsum trahere: qualitatē verō me-  
dicamentū, particulis insidentem, cōtemperare  
& inalterare possit. At vbi purgatio fieri incipit,  
pñāntiam amplius nōo dabimus, ne actio medi-  
camentū, exoluatur. Porro alius nonnūquam  
medicamento purgati nō credit: vel ob ægri na-  
turæ proprietatem, vel ob medicamētū exhibiti  
pñāntiam, vel ob sterus diuturnū, atq; in aliquo  
intestiniōrū impacm, quod clystere evacuari  
potuisset, ante pharmaci exhibitionem. Fieri e-  
tiam potest, vt natura impetum ad vrinās facien-  
te, pharmacum nihil proficiat. Ex ipsis, autē ta-  
thartica quæ sua actione frustrantur, hæc qui-  
dem iuterum non modō nihil offendant cor-  
pus, sed alimentū illi etiam sūt: hæc verō in cor-  
ruptelam atq; exitium vertuntur. Quom autem  
omnia purgantia medicamenta ventriculum vi-  
trent, præcipuēq; os ipsius, quod maxime sit ner-  
uosum & sensile, odoratorum mistura commo-  
de ex cogitata est, ne videlicet sola, ac syncera i-  
psorū facultas, os ventriculi attingat. Conuenit  
itaq; ea quæ miscitū femina, cuiusmodi esse, quæ  
& malignitatē possint obtundere, & actioem  
ipsorum non impedire, extraxitoria & inciden-  
ti facultate prædita, quæ crassos humores dis-  
scent, & vias ipsorū aperiant. At purgantia quæ  
miserunt, sibi invicem congenere esse, & nulla  
ex parte dissidere oportet. Dissident autem, nō  
quā aliud bilem, aliud pituitam evacuat (ambo  
enim eodem modo vacuari possunt) verum vbi  
hoc statim, aliud multo post quā assumptū est,  
purgationē mouere solet. Ita enim inæqualis sit  
evacuatio ex illis simul assumptis. Dico inæqua-  
lem, quum vna cessante, altera vacuano incipit.

## GAL. ENI PERGAMENI

consilium puero comitidi morbo  
laboranti.

**A**meti nec filiū tuum viderim, nec  
ab initio quæ fuerit eius natura ante  
morbum cognouerim, nec etiam nū,  
vbi in ipso morbo se habeat, milui cō-  
pertum sit. Ceciliæ enim charissime, sed  
id tantum ex te intelligē, comitalibus eum ac-  
cessionibus infestari: vt tamē obsecundem tuis  
vōtis, curabo quā diligēter fieri poterit, eam tibi  
victus rationem perscrubere, quā si (vt par est)  
vratu potest, tum non parum iuuabitur, tum ab  
eis etiam quæ sibi inopinatē accidunt, minus le-  
detur. Etenim nōnūquam necesse est homines  
in frigus atq; æstium incidere: ad hæc in validio-  
res ventos, vtiōsis balnea, alimenta stupefacien-  
tia, resolutiones verginofas, coruscationes,  
tonitrua, vigiliās, cruditates, trāstiam, iram,  
lassi-

Cathartica au-  
detur.

Pharmacū ef-  
fectū est pro-  
fana cōmota  
forbentur.

Pharmacū al-  
tū est iuter-  
dum si solū.

Odorata com-  
modi amodo  
in pharmaci.

Purgantia quæ  
mixta in se in-  
ter, congruē  
esse oportet.

Hæc in  
afflictis  
sui reposita  
causa.

Tenues humo-  
res, sicut  
vacuabimur,  
sunt in  
duriā esse ex-  
pectanda cō-  
tione.

Accidit in  
accessu febriū  
actio, quæ  
dum per supra-  
vā, in remissi-  
onē tūc per  
inferiōrē.

Diuturnū acces-  
su febriū deie-  
ctionēq; excre-  
antur, quæ  
dum per inferi-  
orē purgant.

Purgantia om-  
nia facultate  
calida.

Purgantibus  
sunt qui sit.

Humores esse  
necesse est  
ad purgationē  
adit morbi ra-  
rō per iniūa in  
digi purgato-  
nis.

Turgere quan-  
do humorē di-  
cuntur.

Pharmacū quod  
vacuandi.

Crisis quando  
accidunt.

Naturam ad-  
mānt esse me-  
dicamenta.

laxitudinē, atq; id genus alia, quæ vehementer commouent atq; perturbant corpus, & morbi tum memoriam innouant, tum eius accessione accersunt. Quare omnia id genus multo ante sunt præcauenda. Quod si quando vbi illa præcesserint, subsequatur deus morbi accessio, tum temporis puer penitus ab omni motu se abstinere, domique se contineat, ac victu valde tenui utatur, quovisq; corpus exacerbationis molestia prorsus destituit. Igitur inter vena inuicta (tunc enim prope cōtingit eos morbos moueri, qui per intervalla redeunt) puerū purgandū censeo, idq; purgatione mediocri. Post purgationē autem, hac victus ratione utatur. Manē quidē, vbi electo surrexerit, priusquam ad præceptores accedat, modicē inambulet, nō admodū tamē citato gressu. Dein vero vsq; ad palatium tepus, discipulis ex eius more incumbat. Cumprius autē illinc discesserit, vbi rursus inambulauerit modicum, sic ad prudentē pedotribū committet. Quippe totius curationis summa in hisce duob. est sita: nempe vsu medicamentū olim nbi à me dari, et idoneis exercitationib. Reliqua verō, tanq; præparationes quædā ad ista existūt. Ceterū exiti rationē scipi, quod ad eandē modū, sunt hinc nēpe vt prius quā tangetur puer, quiescat: vtrq; corpus illius calidat, necnon moderatē exareat. Quod si vltra hos terminos producat exercitatio, nō nihil iam attingit solida corpora, atq; latitudine ipsam colligat: in articulis aut potissimum, atq; in musculis, colligationes congregat: vnde virū inuicinas sequit: deinde viciorū sensus, quando æger conatur aliquā mouere partem. Atq; hoc est, quod laxitudo appellatur. Scopi autē exercitiorū, quo ad qualitatem, in eo præcipue consistunt, vt de omnīs corpōris partēs, & caput præsertim, & ventriculus, roboret: potissimūq; illa partes, quæ ad os ipsius pertinet. Quum igit vcllementes exercitationes caput replant, ad his illam abstinere præcipio. Quibus si quādo sit opus, erecto capite cōstitutus partes inferiores commoueat, & potissimum crura. Verū à paruis tardisq; motibus prædotti ba orsus, ad vehementiores & celeriores ipsū puerū conducatur. Sed & frictio exercitatio quædam existit, imbecilliorib. præsertim corporib. Imo nonnunq; si sola ea decenter fuerit administrata, nullis alijs præterea morib. indiget. Proinde primū linteis corpore rubefacere oportet, ad supernas ad inferiores sensim manus deualientes, ad brachia manib. sumpto inuoluita deinde ad pectus & ventrem est procedendi. Postea verō & crura exactius fricanda sunt, vtriusq; huc à superiorib. defluat. Vltimo denique ipsum caput est perfricandū, si abq; aliqua pinguitudine administrat frictio. Nam ad ipsum statim accedere, admodū periculosam existit. Si verō oleum in frictione admoueris, nihil prohibet caput simul cū alijs membris fricari, ita vt hic quidē caput fricat, aliq; verō duo pectus & ventrē, duo item aliq; crura: atque eodem paret atq; post exercitationes: imo & sic magis simul mēbra omnia fricare cōvenit. Nam citius hoc paret cōquiescit corpus, & minus refrigerat: citius est non leuis habenda cura. A laucis autē vtriusq;

plurimum abstinere cōvenit. Nec palatium cōfessim puer ab exercitatione egrediatur sed vbi spiritus exactē cōquiescit, & quæ exercitatio sequi pertinebat prorsus sedata fuerit. Tunc verō caput linteis diutius est cōfricandū, sic priusq; pectus vtrūq;. His sic peractis, ad prandium debet accedere, in quo aliquid olei venterem molliendū, aut saltem rōrā, aut pisanet, aut olu trā, vñ cum tertia panis parte ipsi offeratur: in cōtā tertia duas partes reliquas cum valentiorib. opsonis reponendib. nobis. Ex oleis itaq; nec lactuca, nec molux, nec arriplici, nec blitō, vt prorsus abstinere, rubeo. Verū nō semper idem, sed modū hoc, modū illud, modē tate sumendū est: nec diutius eorū vsu abstinendum. Huius autē generis est & beta, & brassica: Nam & hæc modicē degustare opus erit. Pari ter & portū, & apium, & symyridū aliquando cōducet attingere. Ita ex autumnalib. enām fructibus, quicūq; non omnino crudū, & durū coctū difficilis sunt. Igitur mora, & quæ præcocia appellant, & ficus, & si qua alia id genus sunt, et tra molestā descendūt: ad hæc & satius cucurbita, nulli mollissimorū oleum est inferior: pari modo & cyclopepones. Præterea & vuis maris, & mālīs, & piris, & palmulis potest vesi nō nunq; paret: parē tamē, & rarō. Quos fructus & in arbore, & domi manuisse priusquam edantur, oportet. Prutiosa autē cibaria summopere illi vitanda sunt. A fungis etiā vt omnino abstinere, consulo: quem admodū & à rapis, & à rebus alijs, quorum radix est esculentā. Sunt enim hæc ex eis quæ crassos humores pignat, & perq; difficulter intra corpus elaborat: excepta quibusdā, quæ nonnihil acris & calidi in seipsis cōtinent: quæ sed modū pastinacæ & raphani. Verū raphanos ex aliquo diutū intervallo degustare nō prohibeo: hortor tamē, vt pro viribus à pastinacā abstinere: & magis etiā à rapis. At eorum cibariorū copiosus viciū, salubris erit, quicūq; acris quippi atq; incidens obtineat, citra insignem prauū succi notam, aut odorem ali quem, capiti adferre noxam valent. Sunt autē & in hoc genere, quæcumq; ob caliditatē caput replent, sic vñ vinum, sinapi, petroselinū, pastinaca, cypa, & symyridū. Hæc si quidem plus quā par est, excallacit, vniolosq; succos producit. At oxymelitis iudicatur vitandū est: ex quo etiam capitis potest sumi, paucissimē olei instillatū. Quod si acētum ipsum sellitum fuerit, dup meli longē magis iuuabit. Ceterū si oxymelilibere puer velit, temperet copiosior aqua: & hyeme quidē, calidum: ætate autem, frigidius offeratur: sic si quidem præterea, maxime si nim sedat. Permittere autē etiam puerū & in tempore cōvenit, quæcumq; nō insigni viciū puerū possint habere, ut cūm atq; inuicentur eis potius, multo magis licet. Quippe raphanis et laugis inplem: his quæ deinde viciū puerū eis vt prohibent. Petroselinū & pastinacā quid interquiescent: puerū ad studiū iterarum accedat, non illi ipsū lente inambulare præcipio. A quibus vbi et dierit, rursus ante eorum deambulet modicē: ac demicis panis offerantur portiones reliquæ: aliorum verō

Epileptici, effi  
candus a la  
uacis.

Propter epile  
psiam danda.

Propter epile  
psiam danda.

Propter epile  
psiam danda.

Propter epile  
psiam danda.

Propter epile  
psiam danda.

Propter epile  
psiam danda.

Propter epile  
psiam danda.

Propter epile  
psiam danda.

Propter epile  
psiam danda.

Propter epile  
psiam danda.

Propter epile  
psiam danda.

Muli qui per  
intervalla re  
deunt, vtrūq;  
opos mouetur.  
Epileptici pueri  
viciū variis  
de morbis.

Exercitatio re  
ducit modum  
aliquat corpo  
ra.

Laxitudo quid

Exercitationes  
vehementes ca  
pi replant.

Frictio est exer  
citatio, ambulet  
lambens præter  
ita corporibus,  
fricando epile  
psiam rariō.

so

so

so

so

so

so

so

so

so

so

so

so

so

so

so

so

# GALENI PERGAMENI de Ptisana, liber unus.



Vandoquidem cōposita quedam res est tum ptisana, tū eius cremor (ex hordeo enim probē decorricato, & aqua, & certa quiddā coctio- ne cōficitur) prius de illius partibus summatim aliquid dicere est animus, ij de eius cōpōitione atq; vīū disserē. In primis igitur ad cōficiendā ptisanā, aquam optimā deligere oportet, quæ nimirum nec olfactu, nec gustu, vīlām extraneā qualitatē tēctat. Pīsterea sit pel lucida & pura, operæ precii est: minimeq; limosa, sed velut exactē colata. Porro huiuscemodi aqua, quo ad vīū quiddā satis erit accommodata: natura aut ipsa, neq; hoc pacto prorsus sincera fuerit, si vti nec vīlū abud sensibīlū elemētō rum. Est tamē vīlūm partū, atq; ad cōcōctio nem, dīstributionēq; prōptā: nec tantum ā iua rurali calore alterabitur facīle, verum etiam igni externo admodū, potius calefit: quod etiam testatur Hippocrates, aquā quæ calist citō, & citō refrigerat, leuissimā esse existimandū: non restimam ponderē, sed quod partū tenuitate prepolleat, facīleq; cōtrariis qualitatē recipiat. Itaque huiuscemodi aqua, frigida & humidā, propriēq; omnino aqua censenda est. Hordeum aut ipsū, refrigerat exaccatq; habet tamē nōn hīl dīcergens & flatuosū. Quod si insipiat particulatim, illius extremus cortex, furfuraceus, & siccior existit, & magis deterget accōmodus. Quod vero intus, cū carnis vicem gerens, atq; nutritio idoneū habet, deterget quidē & id, sed furfure longē minus, & pariter quippī flatuosū iū se cōtinet. Quamobrē fursure quidē abstergit minus, valētius aut hordeo. At verō, quod hor- deum ad ptisanā cōficiendā eligimus, esse ple- num oportet, nec admodū recens, neq; antiquū valde, & quod omnis asicinitis qualitatē sit ex- pere: in tumoreq; dum coquit, attollatur in- genit. Vbi aquā & hordeū delegeris, ipsū hor- deum etudum in aqua prāmacerato: deinde ira manibus versato, quovisq; delubat tenuis me- brana. Postea rursus valētius etiam manib; eo- vīs cōfricato, vt quicquid palaceū inest, deci- dat: nisi quis fortē velit eam magis detergentem efficere: tunc siquidē sātius fuerit ipsū vīdū cū membrana decoquere. Ipsū aut decoctio sit ra- lis, vt primū quidē ebulliat plurimū: postertus aut lento igne, quovisq; ab vīdē in succum verta- tur. Hac em ratione pēscōctā ptisana, quicquid inerat flatuosū, deponit, restitūq; sitim, & deter- get, abluat, facīle coquitur, atq; abq; asicinitōne aliqua humectat. Iam verō quom cetera vīscī- da quo ad gustum nullam sanē suauitatē obri- neant, ptisana gustus nescia quid suavis & blan- di asient, & præsentim ægrota. Facīle etiā in tho- racis partes dīscendit: etiā ad dīscētionem, atq; dīstributionē, accōmodata. Hīs de causīs maxi- mē ex vīū est ardentibus febribus: quod nimirū is quacūq; ex parte obīstāt, refrigerans & lu- mectans, necnō putridos humores detergens, & corpori non exiguum nutrimentū suppēdi- tans: eos verō humores qui ex dimidio putre- runt

Ptisana ex quo- bus conficitur.

Aqua optima qualem esse de- bet.

Hordeum vī- lūm esse per- se.

Aqua que sit leuissima.

Hordeum re- frigerat, accit.

Hordeum sub- accitendo ptisana apta, quia ad esse debet.

Hordeū de- cōctio ratiō.

Hordeū hanc- quomodo de- cōctio ptisana magis ab- sterget & dīca.

Ptisana suau- tas.

Ptisana maxi- mē ex vīū est ardentibus fe- bribus.

Epilapsi qui- bus vīdē carni- bus debent.

Sau extremis partem conferre epilapsi.

Candimentum simplex ex quo bus conficitur.

Legumina con- gregata epila- psia quæ.

Medicamentum ptisana cōfictum cōferre epilapsi.

Oxymelitis dī- ffracta.

Stilla siccū m- opendo ratio.

Stilla siccū m- opendo ratio.

Stilla siccū m- opendo ratio.

Stilla siccū m- opendo ratio.

Stilla siccū m- opendo ratio.

Stilla siccū m- opendo ratio.

Stilla siccū m- opendo ratio.

Stilla siccū m- opendo ratio.

vnumquodq; Verum carnes omnium ferē vola- tilium conveniēt, exceptis iis quæ in stagnis de- giunt. A' quadrupedū autem omnium carnibus abstinere debet. Quod si & quodq; ius opus sit vī, ius quidē domesticū extremis atq; ventre ve- scatur. Sed sylvestris etiam suis carnibus vti po- terit. Hædos etiam gustare licebit, atq; nonnun- quam lepores, probē ramen conditos, aut citra nīdorē assatos. Simplex cōdimentū sit ex aqua, quæ anethum, porrum, oleum, atq; sale m rece- pit. Quantū verō ad marīna pertinet, omnia tes- tis infecta sunt perniciofa. Ex piscibus autē, sa- xatiles cæteris omnibus præstant. Torpedo au- tem sola ferē ex cartilagineorum genere illi con- veniens est. Inter legumina, ptisana quidem pri- mum locum obinet: deinceps lentēs, alica & pi- sa conveniēt: reliqua noxia existunt. In vniuersa autem, quæcūq; glutinosa sunt, & crassā suc- ci, quæq; insant, & excrementa pignunt, necnō quæ ægrē coquantur, ea prorsus vitare debet. At verō medicamēto cōfecto ex scilla, post purga- tionem, quæ ad ventantē vere molienda est, vītar singulis diebus, priusquā m palatū accedat. Et sanē, nisi valde rebellis sit morbus, ipso quadraginta dieb; ipso ipsum, sola etiam medi- camenti ope, prorsus solum in. Post purgatio- nem tamē, antequā eo medicamēto vīatur, abstinilium & semel & bis in pota accipere cōve- nit. Cæterum oxymel quod acidissimum quidē est, quantū ad mel aceti portionem habet: quod verō dulcissimum, octauam recipit. At crassā & glutinosā existentibus succis, acidiori atq; mera- ciori est vīendum. Sin autem minus sint tales, di- luniori, atq; dulciori. Quo pacto autē ipse scillæ succum excipiam, iam adiciā. Primum vase me- liore præparato, in ipsum scillam frustatim ma- nibus cōmunitū iniciō: deinceps angustio ope- rulo cooperiens, & extrinsecus corium vniuerso corpori vās circūducens, & diligenter li- gans, in locum omnino ad meridiem cōvertum repono: ita tamen ab aquilonis flantibus cōmu- nitum, vt nullatenus ab ipsīs perferatur. Id autem eo anni tempore efficio, in quo exoritur Canicū- la: nempe ante illius quidem ortum, viginti die- bus, postq; ipsum etiam totidē. Tunc igitur per aliquot dies paulatim sū vās permutō, vt æ- quē quacūq; sui parte incalecat. Quo tempore exacto dissolvens vās, in eo scillæ corpus pēnn- deat decoctum inuenio, atq; adhuc ex ea humo- rem quendam effluere, quem excipiens optimo melle cōpono. Ex huius quodidē plenū cochleare vīum, insantibus quidē paruum, adultis ve- rō magnū, exhibeo. Quinētis quod totius scil- læ corpusculum superest, exquiris cōfundens, & cum melle leuissimū, eius quovis cochleare vīū, vt pērdissimū est, porrigo: istud tamen, vīnbus est longe inferius. Qui verō scillā in aqua coque- res subigis, plura diebus vires dissoluit. Quemad- modum quicūq; ex aceto tam decoquant, calidum quidem medicamētum sit, & ab vīdē efficiuntur: æquū autē non iano- xium.

runt concoquens, atq; in opimum succum permutans. Pryter has itaq; vires omnes, nullam habet aut astrictionem, aut stomachi subversionē ptisanā. Nam astrictio quantum ad ventriculū roborandū idonea est, tantū ad incrassandos humores prōpta: at ea humiditas quæ quoddā crassescat non habet, facile subversionē molitur. Ptilisanæ sic cōfictæ, lues, æquales, atq; ex æquo omnes partes continuæ & vnitæ existunt. Ceterū nec eam vis qui in discrimine sunt, porrigere cōvenit: nec his q; veng sectione, aut purgatione, aut clystere, aut fomento indigēt: nec eis qui excrementa plurima in regione ventriculi congesterūt, aut ingenti dolore vexantur. Sed neq; in siccissimis etiā morbis eam dare cōvenit: quod scilicet valētioribus egeat pōnōibus quā sit ptisanā, vt humectentur vberius. Tempus sōrbitioni opportunū tunc fuerit, quando æquāliter dispositum corpus redditum est: id quod titulum morbo inclinatē accidit. Porro morbi sicci sunt, lateris pulmonisq; inflāmationes, atque adeo quicquid morbi in thorace fiunt, si nihil per excrementum excreant. At morbi qui circa iecur, & ven-

triculum, & intestina accidunt, tunc sanē sicci dicuntur, quum nihil excreant, aut dura, & non vt necesse est, neq; effatu digga. Siccatates verō q; in venis & arteriis consistunt, ex lingua & exteriori cute noscuntur: pariter & aliectus qui in capite sunt, si nihil per palatum excreantur, aut nares. Eadem etiā ratione, & inflāmationes & vlcera esse contingit sicca, ex quibus nihil per sanem excreantur. Igitur in huiusmodi morbis ptisanam minimē propinare conveniet, quod ita eis eos humectare non valeat. At verō quando corpus humidius extiterit, aut ex pulmone aliquid excreatur, tunc eis semper sōrbitionem augere, atq; adicere oportet. Verū neq; ipsam statim ptisanam offerre expedit, sed prius sanē eius cremorē solū, aut cremoris quoddā plus, ptisanæ aut parum, mox vtriusq; æquāliter: deinceps & solam ptisanam: idq; non ignorantes, ad corporis robur & nutritionem, maxime conducere ptisanam: ad faciliē verō cōctionem, atq; in corpus distributionem, cremorem ipsius.

Siccitates pariter  
caleres quibus  
nota deprehenduntur.

Ptisanæ cur in  
ferre morbo ad  
danda.

Ptisanæ cremor

## SECTIONIS TERTIÆ FINIS

## EPITOMES OMNIUM GALENI OPERVM SECTIO QVARTA.

ILLVSTRISSIMO ET REVERENDISSIMO D. D. PETRO  
PACHECO, GIENENSI EPISCOPO, ATQVE S. R. ECCLE-  
SIÆ SENATORI VIGILANTISSIMO, ANDREAS LACY-  
NA, Scobienfis, Doct̃or Medicus, Mules San-  
cti Petri, S. P. D.



It corpus erectum fortitur homo, sic animum ad sublimia erigeret, nentiquā caduca-  
rum (vt solet rerum teneretur admiratione, Pater obseruandis, sed perpetuū & diuina  
susciperet, & assidue in eorum exerceret meditatione. Ceterum quum ita sit natu-  
ra comparatū mortalibus, vt pars quidē vici, ac veluti captiuū ductū a suis cupiditati-  
bus, illū tantum inferuant: pars autem adeo ignauū stupidiq; sint, vt animā habeant nec ne, ignorent  
penitus: cōtinuē sanē, vt per pauci eorum sursum aspiciere queāt (lux enim lippas maxime offendit)  
sed omnes ferē humi serpsit, instar crocodiloriū. Id quod certe est in causa, vbi quando rideant canē  
transluentē per circulum, aut tripudiantem simiam, aut deniq; sedisumū Scytham supra funem sal-  
tantiem, vniuersi sui ipsorum oblitū, confertim ad id genus spectacula confluant, atq; ea quidē admi-  
rentur stupefacti: nobis autē & alpernentur coditorū illius nostri opera: quæ si, vt decet, expen-  
derentur, omnium spectatorum animos in maximā admirationem sui, cōmendationemq; conuertere-  
rent. Nam vt impræsentiarū præterea ordinatas illas orbium cælestium lationes, constantissimos or-  
sus siderum, vicissitudines temporū, animaliumq; generationes & incrementa, quæ captum huma-  
num superant, de us autem disserā quæ indies calcantur pedibus, quid obsecro admirabilis posita in  
quam cōtinere, quā ex eruca, nasturtij, aut alio vix perceptibilis semine, oriri herbas biculturalē?  
ex nucleisq; aliquo exiguo, nasci prodigiōse magnitudinis arborem? Etenim posteaquā semē in ter-  
ram, veluti in matris quādam, coniectū est, attractū humorū copia intumescit, intumescensq; rū-  
pitur, ac duo de se erunt germina: vnum quidē, quo terræ adhaeret, ab eāq; sibi alimentū sugit, quæ  
est radicalis eū. Verō, quod solem versus, a quo viuificatur, erumpens, ab vno eandem in varios tan-  
dem ramos diuaticatur. Atq; hic sanē plantarū est ortus: quas quidem vniuersi Philosophi & Me-  
dici, animatas esse dixerunt, neq; id iniuria: quod numrū animantium ritū gignantur, crescant, viuāt,  
atq; senio absumantur. Primō siquidem sunt molliuicula, ductilesq; & tractabiles, vt infantes. Dein  
processū tēporis adolefcunt, suūq; articuli roborantur. Postea vero iam cōsistentes, vt crescere desi-

Ptisanā quibus  
arthritis non  
fit.

Morbi sicci qui  
dicuntur.

## GALENI

PERGAMENI DE SIMPLICIVM

medicamentorum facultatib. lib. I.

## CAPVT I.



*Simplicia medicamentorum quodammodo quod uisitat.*

*Medicamentum quod.*

*Medicamentum quod.*

*Medicamentum quod.*

*Medicamentum quod.*

*Medicamentum quod.*

*Medicamentum quod.*

*Medicamentum quod.*

*Medicamentum quod.*

*Medicamentum quod.*

*Medicamentum quod.*

*Medicamentum quod.*

*Medicamentum quod.*

*Medicamentum quod.*

*Medicamentum quod.*

*Medicamentum quod.*

*Medicamentum quod.*

*Medicamentum quod.*

*Medicamentum quod.*

*Medicamentum quod.*

*Medicamentum quod.*

*Medicamentum quod.*

*Medicamentum quod.*

*Medicamentum quod.*

*Medicamentum quod.*

*Medicamentum quod.*

*Medicamentum quod.*

*Medicamentum quod.*

*Medicamentum quod.*

*Medicamentum quod.*

*Medicamentum quod.*

*Medicamentum quod.*

*Medicamentum quod.*

*Medicamentum quod.*

*Medicamentum quod.*

*Medicamentum quod.*

*Medicamentum quod.*

*Medicamentum quod.*

*Medicamentum quod.*

*Medicamentum quod.*

*Medicamentum quod.*

*Medicamentum quod.*

*Medicamentum quod.*

*Medicamentum quod.*

*Medicamentum quod.*

*Medicamentum quod.*

*Medicamentum quod.*

*Medicamentum quod.*

*Medicamentum quod.*

*Medicamentum quod.*

*Medicamentum quod.*

*Medicamentum quod.*

*Medicamentum quod.*

*Medicamentum quod.*

*Medicamentum quod.*

*Medicamentum quod.*

*Medicamentum quod.*

*Medicamentum quod.*

*Medicamentum quod.*

*Medicamentum quod.*

*Medicamentum quod.*

EDICAMENTORVM simplicium facultates explorare cognoscere, cum ad variorum compositionem, tum ad inventorum opportunitatem vsum, admodum necessarium est. Porro medicamentum omne id dicimus, quod alterare nostram naturam potest: sicuti nutrimentum, quicquid substantiam augere. Refertur enim vtrumque ad aliquid. At verò medicamentum simplex, & ipsum per oppositionem ad compositum nuncupatur. Estque id quod secundum naturam suam, sincerum est. At facultas, causa quædam est effectrix: eorum partium actus, ut calefaciendi in igne, partium potentia, siue futuro tempore: quali nimirum calefacit pyrethrum. Cum autem lingulis medicamentis propria quædam effectrix facultas insit, aut purgatoria, aut vomitoria, aut alterius generis alia: nosque alibi demonstrauerimus, ex calido, frigido, humido, & sicco, corpora vniuersa constare, certè facultatum effectricum essentias (de quibus neque inter medicos, neque inter philosophos conuenit) tum in aliis omnibus, tum in medicamentis, hæc ipsas qualitates statuimus.

## CAPVT II.

In primis autem ac maxime sumendum est iudicium facultatis experimentum ab ea re, ad quam dicitur. Nam quæ vim in homine aliquod medicamentum habet, in alio animali eandem non necessario fortietur. Proximè est, ut quod ex accidenti est, distinguatur ab eo quod primario & per se. Nam aqua frigida calorem quandoque reuocat, cutem refrigerando contrahendoque: ad quod sanè consequitur reuocatio caloris. Rursum calida quæ ipsa refrigerat sæpè numero, d. gerendo excalfaciens humorem. Quæ igitur admota corporibus nostris, primario ac per se excalfaciunt, ex sanè facultate dicuntur calida: si verò contrà refrigerent, frigida: non autem quod alba vel rubra sint, tali facultate sunt prædita.

## CAPVT III.

Etenim quod ab initio ad finem vsque dum applicatum est, magis semper calfacit, aut refrigerat, id non ex accidenti, sed ex sua natura est tale. Danda autem opera est, ut quodcumque medicamentum in iudicium vocare velis, durius hæreat applicatum, omninoque sit alienæ tum frigiditatis, tum caliditatis experire, ne nascamur facultatem illius ascribita adulterare qualitas. Porro quædam tota substantia in sese mutuo & agunt, & pariter quædam vna duntaxat, aut duas qualitates. Ad hæc, alia quidam tenui partium sunt, alia crassiora: tenuium quidem, quæ facili in tenues comminui partes possunt, crassarum vero, quæ contrà.

## CAPVT IIII.

Si igitur primò aquam, quæ & communissima vniuersis hominibus tam sanis quam ægris est, & ad vitam maximè necessaria, nec frigidam in-

signiter, nec calidam, corpori temperato applicueris: dein in quæ natura sint temperata: tertiò, quæ aliquo affectu tenentur: temperato qui dem admota, plusculo tempore omnino ipsum refrigerabit: intemperato verò, cinis quidem re frigerabit id quod frigidius natura fuerit, tardius autem quod calidius: semper tamen refrigerabit, cum videlicet talis existens, nequeat reuocare calorem, quem admodum summè frigida, quæ si quadralore, aut iuuentis corporis nature paululo fuerit tempore admota, caloris molietur reuocationem. Sin aliter vtamus, semper refrigerabit: id quod etiam facit admota eis, qui simplici laborant affectu. Nam ubi affectus compositus fuerit, contingit aliud primario à medicamento fieri, aliud ex accidenti: ut licet cernere in phlegmone, quæ calide copiosèque fluxionis est solum. Si quidem quæ modice ex calfaciunt phar maca, dum superfluitatem euacuant, id quod affectum est, protinus frigidius efficiunt. Aqua itaque portabilis vtròque videtur frigida: id quod non licet de his asserere, quæ sulfureæ, bituminosæ, atque nitrosæ existunt. Imò verò neque marina ipsa, priusquam ascitum frigus summum acceperit, admodum refrigerare conspicitur. Ergo quæ exactè ac sincere aqua est, omnis alterius substantiæ missione vacans, ac necessario ex sua facultate est frigida. Si qua verò per bituminosa, sulfurea, nitrofa, aut aluminosa loca distillata, aliquid fecum eius substantiæ absterferit, mista iam ea est, non autem exactè aqua. Quod si etiam ipsi aque portabilis ignem aut essentiam, aut qualitatē adieceris, sic etiam quodammodo compositam illam effeceris. Quin etiam aqua limosa, quali apud Aegyptum vntur, composita quadantenus est: sed ea per fictilia vasa optime percolata, quam purissima efficiatur.

## CAPVT V.

Iudicatur autem aqua gustu, visu & olfactu. Si qui dem gustu est pura, si omnis qualitatis experta videatur. Visu, si sincera & pellucida fuerit. Sic nec odoratu villam præ se ferre qualitatē debet, ut sunt quædam prauitatis extremæ, quæ aut aciditatem, aut acrimoniam, aut saliditatem, aut putredinem præferunt. Igitur aqua, quæ absque his est omnibus, ut ad naturam certè, ne ipsa quidem ad amulsam sincera fuerit, sicuti neque aliud vili sensibilem elementorum, sed vtriusque sensum & visum, sincera est. Quæ itaque examinanda venient medicamina omnia, omnis extraneæ qualitatis valentissimè aliena funto.

## CAPVT VI.

Quod autem omnis aqua dulcis manifestè refrigeret, hinc discas licet, quod si ceræ oleo liquaueris, humidumque cerarum confeceris, ac postea ipsum refrigerarè, largiorique affusione frigide alitum admoueris, valenter eorum quæ febre vntur refrigeret, si hypochondriis supponatur: nec non omnem phlegmonem, herpes, carbunculos, erysipelata, phlegmela, & breuiter omnes calidos morbos: id quod non contingeret illi per aliquam nuper dictarum aquarum, quæ calidis ad versantur affectibus, calidæ nimirum cum sint.

## CAPVT VII.

Ceterum quod aqua quoque portabilis sola sit

Vu

*Aqua summi frigida in quibus calorem reuocat.*

*Aqua portabilis frigida existit.*

*Aqua omnis sincera, et naturaliter frigida.*

*Aqua limosa, quod Aegypti vntur.*

*Aqua debet laudari gustu, visu, et olfactu.*

*Elementum purum maximum refrigerat.*

*Aqua omnis dulcis refrigerat. Ceræ humidum alterius frigida, calidum omnes afflicti refrigerat.*

*Tenuis et crassa parua quæ durius est medicamenta.*

*Aquam esse ad vitam maximè necessariam.*



*Aqua potabilis  
sola est humida*

inter propofitas humida, ex eadem dulces methodo. Nam si vlcera supra modum ficca, hac irrigata, statim admodum humida & mollia redduntur, cum aliaque vniuersa vlcera deficiunt, nonnulli etiam ob acrimoniam exasperentur. Quin etiam si ueniunt, dulcis aqua remedio est: ceteris vero, acerbior etiam solum relinquunt. Tum aqua inter cutem laborantibus aduersissimum est & periculum & lauari aquae dulcis. Sal farum vero, nitrosarum, sulfurarum, bituminosarumque omnium, sanè peruitile. Imitari autem potes, sicuti marinam, sic aliarum quamlibet, subitanea videlicet admittis, quae in quaque vinere cernitur.

*Aqua dulcis re  
sanguis fiam.*

*Aqua nictura.  
Aquam somni  
humectat.*

Aqua igitur propria natura humida & frigida est. Ceterum summè quidem humectat, siue tepida, siue temperata ea sit, non autem calfacit summè, nisi quae extremè feruat. Quod si corpus alicquod eucratum, calida moderatè perfundas, in ipso quidè perfusionis tempore, calidius simul atque humidius efficitur: paulò verò post, id seipso evadere frigidius, non tamen siccius, conspicies. Nam tamen si humores qui in vasis, aliisque communibus spaciis sunt, per id genus perfusiones vniuersi exhauriuntur, ipsa tamen vasorum corpora & vniuersum genus carnosum seipso humidius reddit. Quale exemplum, quibus ratione dixeris, licet videre in senibus: quibus cum genuinas partes, quam adolefcentes, magis siccas fortiantur, pluribus tamen excrementis redundant. Hanc itaque humectant vim solam, nunquam aqua deponit: neque, si seuerè sit, siue etiam extremè frigida, parte cui affusa fuerit, sicciorè efficit: quamquam ob evaporationem quae à calida perfusione excitari solet, perfusa particula nonnullis longè siccior videatur, cum praefertim vapor, humor sit extenuatus.

*Sani partibus  
quidem solidis  
sunt sicci, excre  
mentorum autem  
 copia humida.*

*Vapor humor  
est extenuatus.*

Nec verò visque adeo absurdum fuerit, quod facile in ignem vertitur, id calidum facultate parare. Vni quippe ex iis quae facultate talia dicunt, est id quod est, propria eius quod dicitur materia, tale est facultate, ut, si quid facile in ignem vertitur, id non actum, sed facultate est ignis. Nam hoc quod est facultate, ex aduerso et diuisum, quod est actum: sicut & quod est per se, huic quod ex accidenti contingit.

*Ignis potestate  
est, quod facile  
in ignem verti  
tur.  
Facultate ali  
quid, ex aduer  
so diuisum est  
quod actum.*

At quibus consiliu est, tuto à rebus extraneis, ad corpora transire animalium, videre primum debent, an tenuis sit essentia, an crassa, quod explorandum venit. Secundo, an sibi continuu, densumque soli solum: an intervallis interceptu, an rarum.

*Calida potestate  
est, ut non calfa  
vere possint de  
bitè prout in de  
monstratione.*

*Pipere calfacit.  
Ignis omnium  
tenuissimus &  
calidissimus est,  
ob idque facile  
penetrat.  
Caliditas non  
est crassa quae  
sentis.*

Eorum autem quae in confectio est facultate esse calida, nullum omnino apparet non calfacere, priusquam in tenuia sit comminutum. Nam si quis piper integrum cum inspergat, nullis planè caliditate percipiet: si vero pollinis instat cum inspergatur aut linguae, excalfaciet vtrique, ac potissimum si fricueris. Quare multa quidem facultate sunt calida, facilièque in ignem vertunt, quae nos tamè haud facile excalfaciunt. Ignis siquidem, ut qui omnium tenuissimus & calidissimus sit, minimo negotio penetrat illa, atque vincit. Nostra autem caliditas, praeterquam quod crassa est essentia, halituosaque, adeo existit infirma, ut ægè quod contingit per-

mutet. Quare nihil eorum quae calfacere nos videntur, pertineat ut ignis calfacere possit, sed tantum materia quae accenditur faciliè. Si quidem mutationis principium à nostra caliditate accipiente, ut calami adhibere igne, nos cetera recalfaciunt, et veluti partes fiunt quaedam natui caloris, ut ignis illa. Quare mirandum non est, si quaedam medicamenta primae quidè mutationis principium à nostro calore nata, in de iam pergant, cum quoque qui mutabat, vincere & superare.

*Calfaciunt  
corpus, ab eo  
autem calore  
assumere.*

## CAPVT XII.

Porro cutia omnia in primo statim ortu sibi continua cum sit, temporis spacio pertundi, sic ut vniuersum corpus fiat perispirabile, arteriisque (quae in cutis meatu, quemadmodum venae, aperunt) vndeque se dilatatis, per poros attrahant, non aerè modò, halitumque, sed quicquid est trahi faciliè potest, ac prae tenuitate sua, motum ipsius spiritus consequi. Quamobrem quicquid pipere ad exactissimam fuerit redactum pollicem, verumtamen est, simul cum ambiente aere, ab ipsis arteriis attrahit, prout in aere calore nativo alterari, idem tum ob paruitatem, tum ob ingentiam ut à calore alteretur aptitudinè. Quod quidem si semel illi inhiat, per totum corpus, temporaria progressu, perlatum, ipsum recalfaciet: prius tamen calfacit sibi proximiores particulas. Vnde liquet, crassiorè nullum, priusquam ad vnguentum comminuat, neque ipsum à nostro corpore quicquid perpeti, nec rursus in nos posse agere. Quod verò in pipere adduximus exemplum, idem licet ad alia transferas, siue ea calfaciendū, siue etiam refrigerandi facultatem fortiantur.

*Corpus vniuersum  
est perispirabile.*

*Medicamenta  
vniuersa quae per  
sunt in corpore  
sunt vniuersa  
essentia.*

## CAPVT XIII.

Considerandum autem est non solum, crassum ne sit partu, an tenuis, explorandorum medicamentorum substantia: verum etiam, rarum an spissa, densaue. Voco sanè rarā, cuius partes inanis spaciis sunt interceptae. Vbi igitur spaciis eiusmodi multus, quae plena semper sunt aëre, corpus fuerit distinctu, facilius quae spissum accendit, etiam si calidius illo non fuerit. Nam qui in na spaciis continetur aer, primo statim ignis occurrit accenditur, atque inflammatur (aër enim accensus est flamma, quemadmodum terra, carbo) vni verò secum corpus vniuersum accendit. Sic itaque calamos ari do a ignis exvnt celeriter, tamen si minus alia substantia calidos, idem ob meatuum multitudinem, quos prius aer occupabat, quorum argumentum summum, calamos leuitas est. Nam siccū natura corpus, leue esse alioqui non posset. Quare cumque aut fistulosi sunt, multumque vacui obtinent, ponere existit levis. At calamus à nostro corpore ægè calfaci potest, quod essentia sit crassa. Si igitur alius medicamentum substantia tenuia sit & continua, eandem in nos uariè offendit, quam prius in ignem: si autem rara sit & crassa, fieri poterit ut ab igne quidè alteretur perfaciliè, non tamè à calore nostro, ac proinde nec nos recalfaciat.

*Rara quae sunt,  
Rara quoniam  
sunt aëre acci  
dantur facili  
ter.*

*Flamma est  
aut accensa,  
Carbo est terra  
succensa.*

*Fistulosi  
autem sunt leues.*

## CAPVT XIII.

Quamvis aqua ipsa tenuis substantia sit, non tamen ob id ex sua natura non calfacit: nec primum est ignis nutrimentum, sed potius exinguit illum, ut quod illi sit aduersissimum. Nec mirum si cum igne tum calidissimo, tum siccissimo pugnet aqua,

*Aqua a igni ad  
uersissima, no  
nutrit ignem,  
& humida.*

aqua, frigida & humida existens. Porro oleum, tamen in flammâ ventri facile, nō tamen admodum celeriter, nec manifeste nos calificat, ob lentorem subtilitatis, quo tenaciter inhaeret us, quæ semel cōgit: neq; ab ambiētē facile aut extenuari, aut augeri valens, nec propē intus in corpus transiit. Aqua verō & celeritē in halitū soluitur, & expeditē digerit. Quod si in idem vas coniectam aquā, oleumq; decoquas, prior aqua absumetur.

## CAPVT XV.

Ut autem calfacientium, aliud est simpliciter calidum, ut ignis: aliud experientia, ut qui in nobis est calor: eorumque facultate sunt calida, aliud quidem ad id quod primō & absolute est calidum, aliud verō ad id quod per experientiam refertur. Non ergo quod citius accendatur, proprius ad nos simpliciter apparet calidus.

## CAPVT XVI.

Sed neq; citra limitationem, ex eo quod aliquid in glaciem cogatur, debemus frigidum esse colligere. Nam in eis quæ eandem habent aut tenuiorem, aut crassiuscundē consistentiam, quod occlusum a frigore cōgelatur, temperamento est frigidioris. Si verō alterum sit tenuius, pura (exempli gratia) vinum: alterum crassius, ut oleum: nō est necesse aut citius aut magis cōcrescere quod est frigidius: nisi frigiditatis excessus, quæ huic inest, excessum crassitudinis, quæ inest alteri, superet.

## CAPVT XVII.

Est autem refrigerant, frigidam qualitatem recipere: at congelari, durescere est præ frigore. Quæcumq; igitur corpora tenuis essentia sunt, promptè tum incalescunt, tum refrigerantur: at non æquē congelantur, ut aer & ignis. Nam hic planè non congelatur: ille autem, nempe aer, nō perinde ut vitum, pax, cera, resina & bitumen: cuius quidem tamen calidissimū sit, terrenitas tamen crassitiei, ad congelationis celeritatem adiuvat. Porro ad aquam quæ celeriter & incalescit, & refrigeratur, mentio leuissimū esse dixit Hippoc. Nam quod tenuior fuerit, tantò pariter propior. Atqui quæ tenuior est, minimū habet limi terrestris. Non ergo absolute ex materiæ passivitatē, ad ignē, cōducere eius ad nos facultatē oportet: cum multo securius sit hoc iudicium, quo ad nostrū corpus quippiā examinamus. Quod lac similitare nō sit, nec vnde equaq; sibi simile, coagulatione indicat, quæ ferose partes à caseosis facili separant. In vniuersis etiam liquoribus, qui à finetibus exprimuntur, crassum defertur quippiā, quod spacio temporis subsidet, vocantēq; hux in vino, in oleo autē amura. In aceto verō est eius modi quippiā, ac forsan ipsum est, qd calor est participes. Nam quod frigoris, id qd tenue est. At acetū maiori ex parte frigidius est, qd calidus.

## CAPVT XVIII.

Perperam igitur faciūt, qui vique adeo calidū esse acetū pronuntiant, ut cautio nihil asimilent: cum tamen nec tantū sensu percipiamus in aceto caliditātē, nec ipsum crustus, in ista cautē, exciret. Constat siquidē, vbi per cautēna cōsiliū est sanguinē sistere, crustam relinqui haud exigū, quæ velut operculū sit corporis sanguinem profundentibus. Ac proinde illis cauteria planè candentia applicamus, quæ haud quidem

quod calfaciant, sed quod vrant, atq; subiectis partibus operculum, quam Græci vocant cēstia ram, relinquunt, fluentē sanguinē supprimunt. Itaq; acetū, haud perinde ut crustas facientiā medicamenta, sed potius ut astrigentia, citra crustam, sanguinis fluore cohibet: quæ ranore nō excalfacere, sed refrigerare potius ipsum exiliandum est.

## CAPVT XIX.

Si verō idioram aut pleheim aliquem (nam liorum in vniuersum rebus incorruptū est iudicium, quæ nulli dogmati serualiter sunt additi) rēperato aceto ex spongia fouerimus, dein sūt interrogauerimus, iuum calorem an frigus percipiat, fatebitur quidē fr, primō sanē frigus percipere: postea autem, nempe spongia sublata, sensim nascentis in parte quandam calorē phantasia sentit. Vnde perspicuū est, omnino quidē frigidum esse acetum, obtinere tamen quēdam calorē, qui acrimoniæ ratione per accidens succellit temporis corporis calfacit nisi forte vbi laxus ac doloris expers tumor inest. Si quis etiā illo ab illata thapsia vrat, ardor aceto restringitur: non quod acrimoniam & mordacitatē obstruat, ut oleum atq; rosaceū, sed quod evidenter refrigeret. Quare nisi molestia facultatis spectaret illi inesse, non alio vtendum ad refrigerationem foret.

## CAPVT XX.

Cum autē aliq; ad acrimoniam ipsius, calidissimum esse acetum contendat: aliq; contrā, maximē frigidum, quod parent ipsum gramus cōstringendo dissoluere, verisimile est id iuxta medium cōsistere. Quippe si longē ab extremorum vtroq; distaret, oon tanta incidisset de facultate ipsius controversia.

## CAPVT XXI.

Quia verō quæ neutra sunt, dicuntur tripliciter, secundū diuisionē Herophilæ, partim amborum extremorum participatione, partim neutrius, partim nunc illius, nunc illius: multū sanē tum acetum, tum etiā rosaceū, vtriusq; extremi necessitudine, esse neutra videtur: & quod nūquidem sensibilibiter calfacere, nunc refrigerare cernitur.

## CAPVT XXII.

Quod verō ad aērē spectat, iudicatur eius tenuitas, ex sola in tenuia diuisionis celeritate. Ceterum si ea ratione ignis sit tenuis, haud omnis ignis tenuis existimabitur, cum q; & ferrum fiat ignis, nō tamen q̄ antea tenuius. At sūmā, cū aliud sint ignis genis, reuera tenues existant. Quocirca nō omnis ignis est tenuis, nec quicqd tenue, proprius & ignis fuerit. Nam pruna ignis quidē est, & nō tenuis: & aēr tenuis, verū non ignis.

## CAPVT XXIII.

Quo circa minimē cōcedendum arbitror, acetum, quod mordax & tenue sit, vbi dū continuū esse. Nec enim quicquid mordax fuerit, id & calidum est: fortē verō, nec quicquid mordax iucrit, & tenue.

## CAPVT XXIV.

Eorū igitur medicamentorū quæ vchemētē aut refrigerant, aut calfaciūt, nō sunt iaculantes ambigū. Verū ea de quibus dubitare cōtingit, neutra omnino esse necesse est. Pleraq; autem, ut ad sensum simplicia, ex pugnantiū facultatib;

Cauteria (sanguinem supprimunt, quod coagulante operantur). Autem quæ raneis fluxum sanguinis sistit.

Istam artem iudicium est: cum ex iudicium.

Actum est frigidum, inam quod calidum potius est.

Actum est frigidum, inam quod calidum potius est.

Actum est frigidum, inam quod calidum potius est.

Actum est frigidum, inam quod calidum potius est.

Actum est frigidum, inam quod calidum potius est.

Actum est frigidum, inam quod calidum potius est.

Actum est frigidum, inam quod calidum potius est.

Actum est frigidum, inam quod calidum potius est.

Actum est frigidum, inam quod calidum potius est.

Actum est frigidum, inam quod calidum potius est.

Oleum cur ab igne non calidum est.

Aqua frigidissima cum oleo, citius quam aliquid absumitur. Calfacit autem per partem, vbi quod dupliciter docetur.

Concreta in glaciem faciunt, debemus frigidum esse colligere. Nam in eis quæ eandem habent aut tenuiorem, aut crassiuscundē consistentiam, quod occlusum a frigore cōgelatur, temperamento est frigidioris. Si verō alterum sit tenuius, pura (exempli gratia) vinum: alterum crassius, ut oleum: nō est necesse aut citius aut magis cōcrescere quod est frigidius: nisi frigiditatis excessus, quæ huic inest, excessum crassitudinis, quæ inest alteri, superet.

Tenuia corpora promptè incalescunt, atq; refrigerantur, licet non congelentur.

Aqua quæ dicitur leuissima, ret, & refrigeratur, mentio leuissimū esse dixit Hippoc.

Lac non est simile.

Tax. Amara.

Acetum maiori ex parte frigidius est, quā calidius.

cōstant: ob quas quidē fieri potest, ut acetū vim illam obscurē calfaciendi, quam ostendit, formatur, existens alioqui tenuis, & refrigeratoriū atque exicatoriū medicamentū. Etenim quidā efflorescere rubor in parib; ab aceto irritata cōspici.

*Artis facultas.*

**CAPVT XXV.**

*Facilitas medicamentorum excipitur & gradus descendit.*

Ceterū nō sat est generaliter vires medicamentorū cognoscere, quōd hoc videlicet calfaciat, illud autem refrigeret, nisi etiam ipsarū facultatum excessus & gradus, accuratissime didicimus. In qua quidē cognitione, tum artificialis simplicium visus est: constitutus, tum ratione proficiens: ac methodo compositis ipsorumq; compositorum recta visui accommodatio.

**CAPVT XXVI.**

Perperam autē superioris fecit homines in cōposita orsi medicamentis, eorū quā in illa ingrediuntur medicamentorū simplicū vires diiudicabant, cum nō licet rectē cōposita ipsa cognoscere, priusquam simplicia sigillatim examinamus.

**CAPVT XXVII.**

Atq; hi quidē, cum citra indicū simpliciterq; compositis omnibus facultatibus fidem habēt, vel Empirici ipsi reprehensionis locum & occasionem exhibent.

**CAPVT XXVIII.**

Cū autem non aliunde ignem calidum esse, ac glaciem frigidam cognoscimus, quāvis ex seclū ipso: omnino stupidi sumus, qui sensus esse contemnendos existimant.

**CAPVT XXIX.**

Porro aestivo tempore oxycrati potu, quidā planē refrigerant, atq; sitis experte permanent. At nōdum constat, an id accē causā cōngat. Dixit tamen aliquis, aquā, tardioris distributionis cū sit, ab aceto, tanq; vehiculo, duci digniorq; in vniuersas partes. Sic etiam si cum vino bibat aqua, sitis estiacus extinguit, q̄ si sola. Refrigerantē itaq; sitisq; sanationē ab aqua provenire, ut quae frigida humidatq; naturae sit: ceterū adminiculo esse, ac velvī alas illi ad omnes corporis partes permittendā, tum vinū, tum acetū: quae ipsa nequaq; frigida sunt & humida: alioqui ad restringendam sitim, praeterer ea sola, q̄ cum aqua, exhiberi. Porro vt a vino appareret homini semper sitim incrementē, sic ab aceto epoto, interim quidē augeri, interim verō sedari.

**CAPVT XXX.**

Cū igitur sitis, partim humoris inopia, partim caloris copia proveniat: neq; si calida dispositio provenientē sitim, neq; si calida & sicca, lepotum sanare vnquam potest acetū. At si quando in vni cōstant humiditas atq; caliditas, emisce sanē sitis, acetū medea optima existit. Siquidē humectare neq; at refrigerare, nō in strenuū. Verūm si q̄ ex cōposita affectione, videlicet calida & sicca, nascitur, composita medela est oxycratum, quod ex aceto constat tenuium partū, atq; refrigerante: & ex aqua, quae non modō refrigerat, sed humorū etiam omnium est humidissima. Nihil enim aqua est humidius.

**CAPVT XXXI.**

Per se autē solum, quod iudicandū est, expendere oportet, tum in sanis temperatisq; corpori bus, tum etiam in interperatis: ac praeterea in iis

qui alicui sunt morbo obnoxii. In reperiatis quidem, vt supra in interperatis autem: sic vt dicit Hippocrates: Natus picrocholis vniuersū esse acetum, at melancholici aduersū suū. Porro in morbo aliquo affectū, si simplex fuerit, in simplici explorare affectū: sin mixtum alicui, necesse est id cui miscetur, temperatura sit medium. Siquidem quod medio cōtinentiā fuerit, ipsum eorū quae perficiēt, exiter causā. Quare si acetū simplici cerato cōmiscetur, cerato ipso longē frigidius medicamen effecit: atq; tibi id remedium vel opmū, ad erysipela, phlegmonas, herpes, & carbunculōs. Sin autem quod mixtū est, tanq; simplex expendas, hallucinaberis. Nam quem admodum utrago neq; carnem producere, sed ceratum quod illam respergit: sic vlcusum glutinatorum, non acetum, sed oxycratum est. Quippe acetū per se, vlcera erodit & mordicat.

**CAPVT XXXII.**

Iam verō cum licet ex astrictoriis complura offendere: quae minime sanē conglutinant: sic vt ex cōglutinantibus haud etiam pauca, quae minime astringentia videntur, falluntur. Quibusdū finē, quae astrictoria omnia conglutinare, cōglutinantia omnia astringere profuerint.

**CAPVT XXXIII.**

Miserē etiam hallucinantur, qui astringentia omnia refrigerare dicūt: cū si nihil aliud, saltem chalcitis, dialcarthos, & misy, quae valenter astringunt, tantum affluuntur siue caliditatem, vt nos etiam exstant.

**CAPVT XXXIII.**

Herodotus autē & Dioscorides, quōd medicamenta quādam profluuiū alui, atq; dysenteriae medeantur, ob id astringentia ea esse colligunt: cū tamen ne minimū quidem astrictiois fortiantur, sed potius rarefaciem & laxantia sint. Nam (exempli gratia) caprinus adeps, omnibus quae & gustu & facultate sunt astringētia, aduersissimū est: iis tamen quae acris & mordacia per alium fiunt, manifestē estifica citēq; auxilia: quōd scilicet confectat facili, invngantq; intestinis, ac plorimo tempore inherere, illa demulceat & foueat: cū videbret condensare, constringere & cōspicere, opna sit astringentium.

**CAPVT XXXV.**

Vnaquaq; sensibiliū natura, priuatiū subiecta est, tactui quidem caliditas, frigiditas, durities, atq; mollities: albedo verō, nigredo, atq; vt summatim dicam, vniuersum colorū genus, visus: amaritudo, dulcedo, austeritas, acerbitas, aciditas, salcedo, acrimoniaq; gustui. Planēque demens videat, si quis gustu colores iudicare tenter, aut sapes visui: iudicetq; & de aliis sensib; Siquidē tactu iudicandae sunt differtē tangibiles, auditu audibiles, odoratu odorabiles. Omnia autē inuentionis demonstrationeq; principia sunt, quae sensui atq; intellectui euidētia exsūt.

**CAPVT XXXVI.**

Porro Plato in Timaeo, sapes (quos Graeci *xypha* appellant) duos primū assignat, cōsy vt speciei eiusdē, hēratior maioris & minoris inter se differēt. Quorū sanē alterū austerū, alterum acerbum (qui ex illius inuentione procedit) nominat. Secūdam speciem facit, eorū quā illa opposita

*Acetum bilingue esse videtur, ad versumque melancholicum.*

*Ceratum simplex cūto abile tunc, cūto tamen calidū opmū esse pro fletu.*

*Oxycrati valora plantarum.*

*Astrictiois omnia haudquaquam conglutinant, sed potius rarefaciem astringere.*

*Astringentia omnia haudquaquam refrigerant.*

*Dysenteriae profluentia Galieno.*

*Caprili aliq; cetera sunt astringentia, sed non per alium, sed per se sunt astringentia.*

*Astringentia omnia.*

*Tangibilesque caliditas.*

*Visus quae sensui exstant.*

*Gustui quae sunt tangibiles.*

*Saporum distinctiones ex doctrina Platoni.*

*Sensui cur non sensu contemnatur.*

*Oxycrati vires.*

*Aquam ab aceto deduci per vniuersum corpus.*

*Aqua vires per mixta, quoniam sola, cur effluunt resinguntur sitim.*

*Vinum semper adauget sitim.*

*Sitis unde est natus.*

*Acetum cui sit remedium sit.*

*Oxycratum ex aqua & aceto conficit.*

*Aqua humidiorum omnium est humidissima.*

*Medicamenta quae indicata volumus, quolibet expendere oportet.*

opposita sunt, nitroforum videlicet, falforum & amarorum. Et in his quoque amarus ex nitroso provenit intentione. Salus vero, aut nitroso imbecillior est, aut attritionis quoque assumens aliquid. Deinde à Platone actis expostus est: mox acidus: postremo dulcis. At à Theophrasto additus est vnicuique, quem nimirum omisit Plato, ut qui ad gustum nihil attineret.

## CAPVT XXXVII.

Exponere aut hos sapores exacte, impossibile le est: quandoquid neque aliam vilam senoniam passionem: cum tamen qui tali sensu communicat, recordari fuerit possibile. Igitur quando quod lingue nostræ fuerit ad motum corpus, vehementer deficiat, contrahit, & in multam profunditatem vix illam exasperat, sicuti pura sylvestria immanera, & corna, cuiusmodi omne appellat acerbum, ab austertis tantum inrensione ducitur. At quod astrigenus vocamus, idem videtur significare quod austertus, aut etiam commune esse genus totum huius, tum etiam acerbis. Quæ verò lingua, dum eduntur, non contrahunt, neque cōstant, sed detergant potius & abluunt, etiam si astrigenum quippiam permixtum habeant, hæc omnia falsa cognominamus. At quæ his etiam magis detergant, ita ut etiam moleste exasperent, amara vocantur. Porro quæ mordere solent, idque cum valida quadam caliditate, dicuntur acia: si hæc absit, acida: ceterum hæc fermentandi quoque vim obtinent. Rursus, quæ veluti invigilant atque implent, in statumque suum restituit exasperatas ac veluti erosas lingue particulas, hæc, si cum volaplate manifeste cōstant, dulcia: si hæc sine, pingua vocantur. Quod si ex calido, frigido, humido & sicco, cōtinentur, vniuersa consent, verisimile profecto est, dicatur quantum qualitatum, ex horum etiam mixtella consistari.

## CAPVT XXXVIII.

Verum non quale vnumquodque ex se sit, & ad totam naturam, sed quale secundum corpus nostrum, consideramus. Alioqui nec aeris, nec marina aqua nos exicare possent, sicuti nec sicca dici, cum utrumque illorum sit actu humidum. Ceterum si nos exicare appareant, sicca dicentur, ad nos videlicet, & nostram naturam, parem siccandi vim obtinent: ad ceterosque qualitates. idem est ferendum iudicium. Quare facultatum omnium quæ medicamentis insunt, experientia erit certissima iudicatrix. Quam qui relinquunt, non solum falsa pro veris ducunt, sed tractationis etiam utilitate destruit. Idcirco prius delendi sunt: discipuli omnes paralogismi à discipulis amentis, quam vera disciplina imbuatur. Nam quemadmodum corpora impura, quanto magis nutren, tanto magis lædes: sic quoque si impuri animi nutrentes sermones omnes, non modo nihil prosit, verum etiam magnopere obiciunt.

## GALENI PERGAMENI

de simplicium medicamentorum facultatibus lib. II.

## CAPVT I.

Non desunt qui nobis, mortales cum simus, à sensibus auspicandum esse contendunt, ad facultates omnes examinandas:

in illis tamen perpetuo immorandum non esse, sed ad partem diuiniorem accedendum, nempe rationem. Sensus quippe & animantium, insensibilium expertibus: rationis autem solam, hominibus esse cum diis communem. Qui sopulæ non sentiunt, si à sensibus recedendum sit, demonstrant: rationis primordia futura esse longe incertiora, quam ea quæ demonstranda veniunt.

## CAPVT II.

Equidem optatum nullas nos res clare sub sensus nostris cadere, nec quicquam esse quod illos fugerit. Hoc enim pacto nihil ambigui vnumquam aut anceps foret. Veram quoniam illos quædam effugiunt, ratione ipsi superinducere conandum est, sic tamen ut nec cōfusa, nec infinita colligamus, sed ante omnia, nominum significationem diligenter definiamus: deinde quod ex se quid agit, ab eo quod per accidens, separat. Irrendi autem meritum sunt, quæ de olei aut rose colore nimis exacte ratiocinantur, cum rebus ipsis vanè uti liceat, de illis periculi facere. Ac tales mea quidem sententia, perinde faciliare videntur, atque si quæ ex aliqua imagine cognoscere quempiam conatur, quem etiam viuū intuetur, maxime illis est licitum.

## CAPVT III.

Tribus ergo modis in sermone peccant, qui aiunt rosas temperata esse calidas, quæ sint rubre. Primum, quod non demonstrata hac propositione, Omnis ignis rubet: convertere ex hac alia, videlicet, Omne rubrum est ignis, tanquam verum conantur. Secundum, quod nesciunt, propositiones quæ ex mutuo veris conuertunt, non aut simpliciter convertentes, veras existere. Tertium, quod etiam in mutuo conuerterent, non tamen omne quod colore sit rubro, calidum esse, ex mutua illa conuersione sequatur, sed rubrum omne esse ignem: id quod minime investigamus. Eodem errore tenent, qui ex odoribus, medicaminum facultates cōiciunt. Nec enim quicquid bene reodorat, calidum est: nec quicquid calidum est, bene olet. Quin etiam est: nec quicquid graueolens est, calidum etiam fuerit: nec si calidum, etiam graueolens. Sic nec si quis, quicquid grauer oleat, frigidum dicat: nec si quis quid frigidum sit, oleret grauer, verum dixerit. Si quid calidorum innumera sunt, partim bene olentia, partim grauer, partim neutra: atque frigidorum similiter. Quamquam quid calida dico, ac frigida, cum dicere debeam nos caliditatem, & refrigerantiam: Etiam aliud est facultate calidum, aliud actu. Et huius quod actu calidum est, aliud absolute docitur calidum, aliud per experientiam, aliud ad symmetriam sui generis, aliud ad quidvis obuium collatum. Homo autem non absolute calidus, quemadmodum ignis, sed experientia calidus dicitur: quod maior in eo portio caliditas, frigida. Ergo & quæcumque ad hoc modum dicunt calida potestare, illi dicuntur ex caliditate: facilius de ipsi iudicium sumitur per experientiam solam, cui aduixeris paucos quosdam epilogismos. Quare neque à calore, neque à odore, neque à consistencia, aut huius generis aliquo, de medicamentorum facultatibus est opus ratiocinari.

## CAPVT IIII.

Taceo sopulæ minime quidem rationibus scientificis uti, sed ut inductionibus, aut experientia.

## CAPVT V.

Color non facit ad medicamentum calidum, sed per experientiam calidum dicitur.

## CAPVT VI.

Color non facit ad medicamentum calidum, sed per experientiam calidum dicitur.

## CAPVT VII.

Color non facit ad medicamentum calidum, sed per experientiam calidum dicitur.

## CAPVT VIII.

Color non facit ad medicamentum calidum, sed per experientiam calidum dicitur.

## CAPVT IX.

Color non facit ad medicamentum calidum, sed per experientiam calidum dicitur.

## CAPVT X.

Color non facit ad medicamentum calidum, sed per experientiam calidum dicitur.

Rationes solam esse nobis communem cum diis.

Sensus deterrendi non est.

Ambiguum nihil est, si omnia sub sensibus cadunt.

Ratio est inter partem de sensibus.

Rosæ quid rubra sint, caliditas esse dicuntur, non per se, sed per experientiam.

Propositiones quæ ex mutuo veris conuertunt, non aut simpliciter convertentes, veras.

Odor non facit ad medicamentum calidum, sed per experientiam calidum dicitur.

Calidum multiplex dicitur.

Homo non absolute calidus, quemadmodum ignis, sed experientia calidus dicitur.

Color non facit ad medicamentum calidum, sed per experientiam calidum dicitur.

Color non facit ad medicamentum calidum, sed per experientiam calidum dicitur.

Color non facit ad medicamentum calidum, sed per experientiam calidum dicitur.

Color non facit ad medicamentum calidum, sed per experientiam calidum dicitur.

plis. Differt autem, ex exemplis quippiam suas-  
deas, an ex inductione. Siquidem qui ex exem-  
plis fidem facit, vnum aut duo generis eiusdem  
a fterit, aut certe planè pauca, plerisque ceteris  
præteritis. Qui verò ex inductione, omnia com-  
prehendere nititur, que per experientiam sunt  
cognita. Quare talis inductio vehemens est, ac  
plurimum persuadet.

## CAPVT V.

Quod verò ad oleū spectat (quo de multa Ar-  
chidamus citra demonstrationē atq; ineptissimè  
prodidit) quæ in ipso coquantur omnia, sicca &  
friabilia efficit, contrā quæ in aqua contingit:  
quæ verò sunt illo imbuta, magis propriam hu-  
miditatem conferuant, q̃ si eo madidata non ef-  
sent. Quinetiam scillæ & vtriusq; morfus oleū per-  
sanat: & cū reliquū vniuersum corpus demul-  
cat, tantū oculos mordicat, nec non gattur exa-  
sperat. Subducit aut aluum, lasitudines tollit,  
tueritq; inuictos frigore, atq; lora emollit, in-  
fectiq; animalia perimit. Quorū omnium causam  
reddere debuisset Archidamus. Porro coci oleo  
tum carnes, tum pisces, interim dum affant, obli-  
nunt, quod sicce adstrictiq; exsicc eorū reddant  
partes, si assentur citra talem vñctionē. Athletas  
enī oleo gymnastæ inviguit, quod præsentē qui-  
dem lasitudinē soluat, occurrat autē futuris: ac  
breuiter frictiōnem tum æqualem, tum mitem  
efficiat, corpūq; ad motus futuros præparet.

## CAPVT VI.

At Archidamus nō solum quæ in multis per-  
spiciæ apparent cōtemnit, sed hac etiam parte iu-  
re taxandus est, quod dicat, meliorē esse frictiō-  
nem siccam ca quæ cum oleo adhibet, quia cor-  
pus durius & siccus iis qui inviguitur, evadat:  
mollis autē iis, qui fricantur siccis. Falli præterea  
mihi in hoc videtur, quod similiter affici putet  
tum ca quæ in illo coquantur, tum eos qui frican-  
tur. Neq; enim eadem agere dixerim oleum ca-  
lidum, frigidum, temperatum, repidum, aut fer-  
uens, sicuti neq; aquam ipsam. Nam qui obcu-  
ro simile fuerit, herbas in oleo feruente coque-  
re, ac exercitantū corpora oleo temperato frica-  
re? Etenim si quis velit expēdere oleum, ab om-  
ni prius aliena qualitate (ā qua semper propria  
obscuratur) ipsum liberum reddat, atq; ita de-  
mum ad explorandum se accingat.

## CAPVT VII.

Præparare oleū solemus, nō aliter atq; aquā,  
nempe prius excalcificēs, ac deinde in aquam  
mergentes summè frigidam. Quod si etiā fons  
in ipsum cum strepitu decadat, vasculo cui inest  
oleum, antè diligenter oculo, magis quoq; ac  
magis ita reddetur frigidū. Multum item frigete  
ceris, si præcalcitum ita in puteum demittas, vt  
aqueo coningat. Ac sic oleum reddimus frigi-  
dum: contrariū autem modo, calidum. Quo fa-  
ci vniuius in refrigeratis corporibus, in aleum  
olei calidi demittentes, quibus pars quæpiā ob-  
stipuit, aut qui tremuli sunt, aut cōvulsionē, aut  
tremore, aut motus sensilivē oblesione tentan-  
tur. Porro fructus ex quo premittitur oleū, olua  
nuncupatur: & arbor, olca: itaq; hoc quidem sim-  
pliciter & primario oleum dicitur, reliqua autē  
omnia per ab vsum & translationem.

## CAPVT VIII.

Ceterū veri olei plures sunt differentiæ. Se-  
cundum ætatem quidem, cū aut recens est, aut  
ætate vigens, aut inveteratū. Secundum præpa-  
rationis modum, cū simplex atq; impermixtū  
fuerit, aut præparatum cum sale. Secundum fru-  
ctus diuersitatē, cū is aut immaturus, aut ma-  
turus extiterit. Secundum inductam arte altera-  
tionem, cū vt ab initio fuit, sic relinquatur, aut  
candidum reddatur.

## CAPVT IX.

Experiri aut solū oportet, quæ impermixta  
sunt, & ab omni extranea qualitate aliena: eiq;  
primū in optima corporis constitutione, deinde  
in interperatis, demum in morbis simplicibus.

## CAPVT X.

At nonnulli medicorum nō solum in explo-  
randis medicamentorum viribus hallucinantur,  
verum etiam in opinionibus quas habent de as-  
fectibus. Nam oleum quod lasitudinis reme-  
dum sit, omnes propemodum consentunt, ex-  
terū quæ affectus sit lasitudo, nō consentiū:  
ac prouide secundum ipsum doctrinam, nihil  
certi de olei facultate colligi potest.

## CAPVT XI.

Nec verò parū interest, an iniiciatur in ventrē  
piruita scatentē oleum expers sale, an quod plu-  
rimū accepit sale, in ventrem purum. Vtrumq;  
enim aluum subducit, facultatibus tamen duer-  
sissimè: illud quod sale vacat, in pruitoso vē-  
tre per lubricitatem: quod verò sale habet, in  
puro per acrimoniam, perinde vt muria, & mari-  
na aqua. Idcirco sanè hoc radet, alterū nō radet.

## CAPVT XII.

Nonnulli autem mordicationes ex acciden-  
ti quod saluginosum est, sanauerit, vni secun-  
educens acres & mordaces humores, perinde vt  
cetera omnia que abluunt. Sed non itam vbi  
immissa sunt id genus medicamenta morfus sa-  
niant, quin potius tunc etiam magis exasperant.  
Siquidē evacuationis, haud multo minus ratiōne,  
sanationem molitur. At ceratum ex rosaceo &  
adape infusum, spem numero moribus continū  
succurrit, idq; cōmissionis ratione. Oleum etiā  
solum, sed diluissimū, idem frequenter præstat:  
sicuti certē adeps hirci, aut succus chondri, aut  
ceratum ex oleo dulci. Nos autem sex numero  
quibus ex frigore torquebantur dolore interna,  
infecto oleo calido liberamus: atq; vbi ma-  
ius esse frigus cōcicimus, addidimus & anethū  
si verò adhuc etiam maius, rutam quoq; & bitu-  
men. Ceterū occurrunt interdum quedam as-  
fectiones permixtæ, ex interperie videlicet atque  
mordicatione, in quibus consuevimus nos ane-  
thinū, aut rure oleum infundere, anserino in eo  
liquato adape: si non addit, saltem gallinæco,  
aut aliquo aliorum, aut cera mordacitatis expe-  
te, qualis nimirū est lora. Vnumquodq; autē me-  
dicamentorū temperantū, vbi valentius eua-  
sit humoribus mordicantibus, morum eorū re-  
tundit. Verū si aut valentioribus facultatibus,  
aut multis, paucū permittū fuerit, vni & ipsum  
corumpitur, alitq; cacchymiam. Quam obre-  
ptum evacuandi sunt, qui ab iis que temp-  
randi naturam habent, exasperantur.

## CAPVT

*Inductio quæ  
exemplum va-  
lidior.*

*Olei effluui-  
varg.  
Oleo mactila  
volvulæ facta.*

*Oleum oculis  
mordicat.  
Oleum aluum  
subducit.  
Oleum asistia  
perimit.*

*Oleum lasitudi-  
dinem lenit.*

*Archidami opi-  
one cōtrariū.*

*Olei viri quæ  
luer expēden-  
da.  
Qualitatē pro-  
pria ab alie-  
na obscurari.  
Olei refrigeran-  
di ratio.*

*Olei perfuso  
calidi, quibus  
aer vniat.*

*Olina. Olua.  
Olei simplici-  
ter & per ab v-  
sum duci.*

*Olei differētia  
completi.*

*Experiri quæ  
et quando in  
demonstratio-  
bus.*

*Oleum lasi-  
tudinis lenit.*

*Oleum expers  
sale, in pruito-  
so, quæ  
lubricitatem al-  
nunt.*

*Saluginosum  
autem vniuius  
quæm mordaces  
humores sanant.*

*Dolentibus in-  
teritis quæ si-  
lentius operantur.*

*Cera dato dī  
mordicationem  
expert.*

*Vacuanda pro-  
tinetur effi, quæ  
ab iis quæ tem-  
perandi naturam  
habent, exasperantur.*

## CAPVT XIII.

Sic sanè lac frequenter simulatq; sumptū fuerit, alius accescit, alius in nidore vernit, priusquam probe cōcoctū, corruptionē temperet. In quib. vniq; primum cacochymia pars evacuari debet: atq; in de sumendis chondrus, & pīfana, & lac, & alia: quæ vbi probè fuerint cōfecta, conferūt ad boni succi generatiōem. Porro pīfana, ex sua propria natura boni quidem est succi: verū in interdum vna cū illis succis, qui excitāt mordicationes, corrupti, atq; ipsum augēt symptomata.

## CAPVT XIII.

Ceterūm cacochymia, nō temperando, sed id quod mordicat educēdo, mordicationes sanāt. Ac proinde, donec vacuēt, hominē mordicare non desinunt: & insuper evacuata, in paribus asperū sensum relinquūt, aliud medicamen desiderantē: quod non faciunt quæ boni sunt succi & dulcis, cuiusmodi existunt chondrus, lac, atq; pīfana, quæ in id genus affectib. & edenda præbemus, & per sedē iniicimus, vbi aut melle, aut quoptam eiusmodi, quod infestabat exterius. Quo tempore opportunus est & adeps, & ceratū dulce, & oleū dulce. Quatuor itaq; indicus, cūm possis quod per felenitis leniōē distingue re, ab eo quod per accidens, facile cuiusq; talū medicamentorū facultatē inuenies. Primum indicium est, an starim minget, an nō. Secundum, an simul cū mēdēntibus evacuetur, an nō. Tertium, an asperitatē quandam in corporib. ipsis zelinq;at, an non. Quartū, an nō ita affectus cōmodū vtilitq; videatur. Nam cū nec protinus mordicationē sanāt, nec intus leniōē remanēt, molestiam asperitatem parti affectæ relinquit, quam, si denud offeratur, exasperat: argumētū est rodentis, ac mordicantis ipsum esse naturæ, ex accidenti tamen quandoq; morbus sanare. At quod cōtinuō mitigat, & nullū excretionē provocat, sed nec exasperat dum intus manet, imō exasperatōis medela existit, ipsum quidē naturæ bonū est: verū interdum à cacochymia quæ ipsum alterat corruptiq; mordax efficitur.

## CAPVT XV.

Lauanda porrē est nō modò cera, sed pix, resina, & oleū, omniūq; breuiter, quæ calfieri & fun di cūm possint, aque misceri nequeunt. Singula igitur modicè calfacta, in vas latioris orificiū & magnū, cuiq; insit aquæ copia qualitas experitis infundiro. Dein tunditio & frangitio, manib. impetē subligit. Postea effusa priori aqua, rursus qd abluīt exalfaciēt, in aliam aq; synce ram aquā iniicito: rursusq; in aliam & aliam, donec aqua nullā ex eo qualitatē recipiat: qd quidē gustu datur cognoscere. At si quæ sunt lapidosa & dura, vt cadmia, & res iquama, & æ vñum, ea cōminuent ex acētē in tenuia plurimū terere in aqua fontana & purissima oportet, idiq; sapias aqua priori effusa, alinq; denud inthillata, donec nihil in eo innatet, maneatq; aqua prorsus à contenti medicaminis qualitate immunis. Sic itaq; abluta omnia quæ elui possunt, experta mordicantis reddunt. Ac præter id sanē, oleum etiam candidius reddidit: minus tamē id verberari, q̄ alia, debet, ne videlicet adeo ipsi aquæ miscetur, vt ægrē postea fecerini possint.

## CAPVT XVI.

Oleum aut quod immaturū nō fuerit (hoc n. astringit) nec præparatū sale, nec recens, ac velut etiam nū feruens, ad hæc adamusum lotū, id hec eporū, neq; insulsum, excitabit mordicationem. Quod si guttur ad rufis impetū pvoceat, nō idcirco mordax dicendū erit. Nam quicquid mordax est & acre, ad rufim incitat: nō tū quicquid ad rufim incitat, existit mordax & acre: cūm & pinguis mouere impetū ad rufim appareant. Sequit itaq; si quid nō clear ad rufim impetum, id aliud quāq; mordax existere. nō tamen periurē cōstiterit, quicquid ad rufim impetum moueat, cōtinuō mordax esse, nec si categoricas, nec si hypotheticas cōficiamus propositiones: qudd scilicet ex duobus vniuersalibus affirmatiuis, nihil concludi in secunda figura possit, nec conclusio ex necessitate sit vera.

## CAPVT XVII.

Natura hominibus sternutandi vim indidit, vt præsidio ipsius, quæ in naribus insecta molestæque sunt, propulserit: sciendi verō, vt quæ in gutture. Contingit autem hæc affectio dupliciter: aut resiccata exasperatæque, quæ in arteria est mēbrana: aut à delato corpore, inæquali red dita. Hinc siue panis micula, aut alterius culuspam edulq; nobis inutis in spiritus meatū decedat, tulsire adigimur. seu si bibentibus affiat impius potus quippē ed influat, similiter ad rufim cōpellimur. Percolat tamē per asperā arteriā perpetuo in pulmonem ipsius potus tam exille quippē, vt protinus ab instrumētis rapit, perspicile quocunq; distribuit, nec animal ad rufim leriet. At vbi vel id ipsum pluculū, vel aliud quodpiā seu liquidū, seu solidū corpus, per asperam defertur arteriā, iam inde rufire est necesse, donec à spiritus vehemētia molestū id excutiat. Mordacia itaq; gutturis exasperatio: oleosa verō & pinguis, illius, inæqualitatē, & ad rufim impetum faciunt. Spiritus quicquid in eminentia quadam impingit, efficit inæqualē concussionem in gutture, ad rufimq; animal provocat. Ceterūm nō eo inficiās, ex oleis esse mordicantis plerūq; qualia tum salia, tum recentia videntur: atq; hæc quidē non appia essentia, sed qudd omnibus plantarū succis geminū excrementū insit, alterum crassius, tenuius alterū. Quæ ambobus reperiant etiam in oleo, ad cōcoctionē & discretionē tempus sine postulant. Procedente verō tempore, quod crassum quidē est, nunc parū amurca, subsidit: quod verd tenuius & velut aquosius, & ipsum compositū quoddammodo est, ex acri scilicet essentia, & tenui serosa.

## CAPVT XVIII.

Ceterū serosum istud rubi coloris est, à crasso illo scilicet qualitate absterfa. Ar oleum ipsum, sit minimè mordax, tum candidū sua natura exstet. Quapropter vbi tenue hoc excrementū secretum fuerit, candidius & dulcius reddet. Separant aut ipsum, aut insolantes oleū, & cūlq; artollentes in alē, aut vasculis in quibus est oleū, calidos subficientes cineres, aut oliuarum nucleos, aut frumentū circa ipsa apponētes, aut de nig medicamenta in vasa ipsa iniicētes. In summa, quod aqueum est consumūt: reliquum vtrō

V u lū

Oleum simplicius astringit.

Tasim excitata non esse necessaria mordica.

Tasim minimè provocat, nisi mordica non possunt.

Dronationis rufim. Tasi rufim. Tasi causa.

Politione destituta semper ali quid in pulmo ne per arteriā effluat.

Succis plantarum annuunt dapius ex rementum iussu.

Olei parum.

Oleū reparatū do ratio.

Cacochymia quæ ratione mordicationis facit.

Mordicationibus ubi apti quæ sit.

Lentitudo per feli in quæ ex accidenti ed facit, quatuor indicia distinguere posse.

Lentitudo interdum à cacochymia vñum, mordica redduntur.

Lentitudo quæ facit medicamentum, et quomodo.

Lapidosa abluta de vasa.

Abluta reddunt mordicantis reparationem. Oleū ablutum candidius reddunt.



olei dulci na-  
tura de vi.

reponunt. Tale igitur oleum, si salis expertum sit, medicamentorum omnium maxime mordax erit, maximeque lumentur & molliet, si nec summe frigidum, nec calidum applicetur. Porro cui iniectus sal est, nonnulla quoque necessario mordacitas inest. Frictio itaque ex oleo, magis quam sicca, lasum duntaxat tollit: emolliatque corpora, colubis occidensque quicquid est nobis foras effluere est naturam haud quam digerens & exicans.

## CAPVT XIX.

Primum ex  
oleo quidem e-  
quale, sicem  
vero inaquale.

Quæ autem ex oleo sit frictio, prorsus æqualis existit: inæqualis verò quæ sicca. Cutim siquid per siccam frictionem manus coadducit, ac veluti duplant, violentiusque præter naturam complant. Deinde ubi non amplius prior veluti duplicatio labentes sequi manus potest, ipsa quidem recurrit, atque ad cōtinuum reuelatur: manus autem semel ac vno impetu in alteram cutis partem transeat, inferiore transgressa ipsius duplicationis partem: ac proinde inæqualem, duram & laboriosam talem frictionem sentimus. Quod si levis lubricitas exacte sit cunctis, nec duplicari facile poterit, nec inæqualiter admittet ipsos manuum decursus. Quare externo aliquo medicamento indiget, quod rugas implet, manibusque lubricitate cōcilet: quas ad res oleum nihil aptius inuenias.

## CAPVT XX.

Oleum frictio-  
nibus acutissi-  
mum esse.  
Oleum experi-  
endum esse in  
dumiditas.

Cum autem liceat in hominibus de ipso oleo periculum facere, nescio equidem quam occasione ducti cōplices veteres, ad diuersa alia ver-

## CAPVT XXI.

Experimenti ra-  
tione diuerse.

At recta experundi ratio, in primis quid sit ea est, quæ in corporibus sit temperata: deinde ea quæ in temperatis: mox, ut sepe numero antea monuimus, quæ in simplicissimis sit, hoc est, calidis, frigidis, humidis atque siccis affectibus: dumque gentibus, semper nobis id quod per se sit, ab eo quod ex accidenti. Curandum etiam est, ut oleum de quo experimentum sumatur, alienæ qualitatæ sit expertum: ad quod est in omni medicamento obseruandum. Si igitur ita oleum adhibeas, manifeste cōpentes, refrigerat ne, an sit calfacere naturum. Atque hæc quidem summa est rationis. At opus ipsum quod perficitur, experientia cōmonstrat. Nam qui ardore tenentur, tantum abest ut calore liberentur, ut etiam magis & æstuent, & processu temporis calidiores evadant. At algenibus ex olei inuentione, perspicua nulla aut non, aut vtilitas conspicitur. Ex quo liquet, calfacere quidem ipsum, non tamen admodum, nec eviderent, ut resina, pix, & bitumen, quæ videlicet sponte rati. Nam quæ sicca sunt, ut eis inuigino possumus, sic nec simplicia, nec sponte natura medicamenta existit. Ceterum in ardentibus, si salis sit expertum oleum, perfundaturque frigidum, nonnullum sane solatium affert. In erysipelatis autem, si cui in omnibus quæ pura bile sunt fluxionibus, quantumvis sit frigidum, vel maxime ledere est natum. Quæ verò ex sanguine sunt misco cum bile, eas fluxiones minus aliquotulo affligit: videturque calorem parem eis quibus applicatur, accendere: quandoquidem modice calida, calfacit medicante: immodice autem illa, quæ magno ardore æstuant.

Oleum calfacit  
quidem, sed non  
evidenter ad-  
modum.

Oleum quibus  
sit nervorum fla-  
mationibus.

Oleum videtur  
calorem parem  
non quæ, appli-  
catum accendere.

## CAPVT XXII.

Igitur medicamenta omnia quæ facultate dicuntur calida, caloris sui à nobis accipienda principium, partim similiter nos recalfaciunt, partim valentius. Atque ex his sanè quæ nos æqualiter recalfaciunt, oleum esse mihi videtur: ac proinde nec cōvulsiones, nec tremores, nec sensum tum difficile, sum deperditum magis opere aut iuvare, aut ledere potest, nisi ascititius sibi compararit calorem: tunc siquidem plurimum proderit. Vnde merito velum materia quædam cæterorum medicaminum fuerit. Nam si frigidum illi commisceas, frigidum efficiet quod misit: est fin calida, calidum. Quippe quod ex media temperie est, vtriusque summis interit. Porro non calfacere oleum hac ratione quis dixerit, quod caliditate quam reperit, non augere, sed cōseruare videatur.

## CAPVT XXIII.

Calfacere itaque nos dicunt, & quæ energia, siue actum, sunt calida, ut igitur: & ena quæ potestate. Hæc tamē partim alimēta sunt, partim medicamenta, partim tegumenta. Sed & calidum actum est, quod simpliciter calidum est, ut ignis: & quod per experantiam, ut animal: et quod ad sui generis symmetri comparatur, & quod ad quidvis obuium. At quod potestate dicit, primo quidē distinguuntur ab eo, quod ex accidenti est. Deinde totidem habet significationum differentias, quot actum calidum. Etenim cum sit velum quædam apta materia et quod est actum calidum, partim ad ea quæ absolute calida nuncupantur, partim ad ea quæ per excellentiam quædam, tum ad quiddam sui generis, aut speciei denique, & ad obuium quiddam collatur, propria fuerit materia. Quocirca cum ea calida quæ ad hominem referuntur expendimus, ut alia omnino omittant, æquum existimamus.

## CAPVT XXIII.

Accidit autem fortassis oleum, ut tanquam alimentum nos excalfaciat, ubi intro in corpus assumitur: cum phlegma medicis quibusdam videatur, sic ut ex cibis, ita ex oleo fieri corpori appositionem. Accidit etiam illi, ut tanquam medicamentum sit medii inter nos calfacientia & refrigerantia: tum ut ipsum nos veluti tegumentum excalfaciat. Nam quemadmodum vestimenta à nobis excalfacta, nos excalfacere cōsueverunt, ita & oleum. Et quemadmodum illa excalfacient corpore calidiora minime evadūt, ita quoque negotia olei. Medici siquidem aëris nos ambiens temperaturæ similis est tunc qui à vestimentis, tum qui à oleo proficiscitur calor. Quamobrem tum vestimenta ipsa, tum oleum, calfacere nos non proprie, sed per abyssum dicunt, quod frigori obstant. Quemadmodum si duos æque temperatos adolescentes, qui contingantur mutuo, sese dixerimus calfacere, tamen si haudquaquam excalfaciant, sed duntaxat arceant frigus ambiens. Quæ enim similia vndeque corpora sunt, à se mutuo nullam mutationē accipiunt. Respondet itaque calidiori aëri pyreticū, & piper: moderato autem, oleum & pinguitudo actum tamen aëres sunt calidi, potestā verò, medicamenta. Si quidem à nobis accipientia excalfactionis principium, partim nos recalfacere sunt nata, partim plus, partim minus. Oleum igitur ex genere eorum, quæ æque

Medicamenta  
faciente cal-  
da, quæ  
nos calfaciunt.

Oleum est vel  
in materia cal-  
quæ videlicet  
medicamentum.  
Medicamentum  
per, vtriusque  
temperie aptum.

Calfacit an  
quæ dicatur.

Calidum sunt  
tamen aëres, v-  
triusque quæ  
pluriter accip-  
tur.

Oleum vnde  
sanum dicunt  
nos calfacere.

Vestimenta à  
nobis calfacta,  
nos recalfaciunt.

Olei cum vesti-  
mentis calfaciunt.

Oleum etiam  
non proprie nos  
calfaciunt, sed  
obstant frigori.

Similia corpora  
à se mutuo  
nullam muta-  
tionem accipi-  
unt.

Medicamenta  
quædam an  
calfaciant.

recal-

recalcificat nos, existens duplici ratione ut exal facere videatur eventus; quod nimis multas vestimentis, aut munimentis illinat: & quod meatus infartus, prohibeatque foras effluere magnam vaporosi spiritus caloris partem. Hæc ratione, quos largius sudare volumus, non prohibere his ab initio admoveamus oleis. Verum eos quidem qui morbo laborant, ubi sudare inceperint, tunc exalfacto perfundimus: eos vero qui etiamnum laborant, ubi abunde iam satis sudaverint. Porro sanis quævis occasione exhaustis, in vngi & ante sudore perimitimus. Verum quibus cruditas inest, aut corpus laborat plethora, his nec in balneo in vngi concedimus.

## CAPVT XXV.

Quemadmodum inter calfacientis & refrigerantia, sic oleum nihil inter humectantia nos, et siccatia, medium esse videtur. Atque humectat quidem aqua: excicat vero etiam laurinus, tam cedrinum oleum. At expers qui sitis sitis oleum, tamen semper nostram temperiem, qualem scilicet accipit, vaporosas omnes expirationes vel maxime prohibens. Quod si placuit membra oleo fricere, et paribus aciebat calorem: quia ratione lasos non parum iuvabit, quod videlicet in multorum corporis meatus pingue ingreditur, ac sic quæ dura sunt, molliat: & quod acere & subtile humidat, quæ larebat sub cute, per halitus digerant. Nam cum in lasitudine similes quidem animalis partes siccant, speciosa aut vacua, tenui, acris & mordaci humor eimplant, ea certe corpora remediis indigent, quæ & siccitatem trigenet, & humorem acrem discutiant. Cui negotio aqua per se sufficeret, si inhæreere posset corporibus. Quia vero facile dissiuit, ob id nimirum illi eodem modo oleum miscet: maximè quæ vtriusque finitio auxiliatur siccis aequalibus corporibus, cum ipsius olei ratione diutius aqua adherescat. Quare humectantia & exiccantia, siccis calfacientia atque refrigerantia, olei veluti materia exiit. Nam si exiccantia cõmiseris, totum efficeret exiccantia: si humectantia, & ipsum humectantia, ac plerumque magis quàm antea reddideris: vrin aquæ exemplo docuimus. Cum itaque omnibus quæ sibi cõmiserint subseruiat oleum, recta ratione veluti omnis materis existit: nam licet eorum necessarium propriam actionem retardat, ac minuat, non tamè utilitatem immo est ubi eam quod adauget. Quippe cõmista cum oleo aqua, magis auxilio est laetitudinibus, quæ si esset sola: non sanè quæ intendat viribus, sed quod his quibus opus est, diutius inhæreat.

## CAPVT XXVI.

Quod autem nihil mediæ habet temperiem, id quod ea quæ primario affectu, auxiliant veluti devincit, spem numero ipsorum repugnabit actionibus, generant quidem ex ipsi rerum omnium natura: speciatim autem, ex medicamentorum historia licet addiscere. Exerim generant, quomam id quod miscetur, si in contrariis retrahat, admisti sibi facultatem medicamentum vincere interum poterit, & in alteram planè speciem id quod ex ambobus miscetur, transferrit. At speciatim, sic etiam id ipsum cognosce. Nam si exalfacientia resciantur medicamentorum culpam aquam miscere velis, non modo nihil eorum quæ agere nata est, fieri videbis, sed omnino obscura

tam esse, perinde ac si admista non esset. Omnino ergo constat medium obtinere temperaturam debere, quod vtriusque extremis tanquam materia inferuet. Quem in ordinem si oleum statuas, vti quæ nihil peccaveris.

## CAPVT XXVII.

Cum igitur oleum veluti mediæ quædam materia sit medicamentum calfacientium atque refrigerantium, consistetque tantum ex oleo & robor rosaceum (quod saltem exactum & simplex est) vti quæ & ipsum talis temperaturæ fuerit, qualis rosarii succus existit. Quare illos qui ad vitionem tantum, experientia sed eo refrigerant, vtriusque aliquid utilitatem percipere: qui vero refrigerant sunt, omnes lædi. Non tamen valida in ipso apparebit refrigeratio, sed quæ in primo refrigerantium gradu collocari mereatur.

## GALENI PERGAMENTI

de simplicium medicamentorum facultatibus, lib. III.

## CAPVT I.

Corporum vnumquodque aut calidum, aut frigidum, aut humidum, aut siccum, & aliter & apparet, interim quod ex his natura, hoc est, primario, & per se interum aut adventitia qualitate assumpta, quod est per accidens. Porro eorum quæ propria sua natura calida, aut frigida, aut humida, aut siccæ dicuntur, quod actu suæ emergiæ talia existant, quæ dant potentiam. Sed & eorum quæ actu dicuntur, aliud quiddam absolute est calidum, frigidum, humidum, siccum, veluti elementa: aliud, excessus, ut homo, quæ talia ad symmetrum, seu generis sui speciem, ut leo cum homine: & pariter, homo autem ex parte florens cum puero: aliud ad quidvis iobvium, ut Dion ad Theronem. Quin & corpora quæ potentia talia aut talia dicuntur, vnumquodque ut ad id quod est actu retatum dicitur necessarium omnium: id quidem quod facit accendit, ad id quod actu est absolute calidum: hoc vero quod alia calfacit, ad id quod per experientiam.

## CAPVT II.

In eo igitur corpore periculosa est sumendum, ad id vnumquodque tale & est & dicitur: a ceteris autem recedendum. Elementa namque humiliter tractationis, in primariis quatuor qualitatibus, videlicet caliditate, frigiditate, humiditate, & siccitate cognitione cõsistunt. Porro alimentum si medicamentum differat, quod hoc quidem alteret in qualitate, illud autem substantiam corporis assimilatur.

## CAPVT III.

Verum cum duplex sit in genere alterationis alia specificæ, quæ proprie sanè & primario dicuntur alterationes: alia vero quæ cõturbant & cõturbant corporis nostri particulas, quas vtriusque per abvitionem potius quàm proprie alterationis cognominant: in primo sanè genere edinetur vires medicamentorum consensus. Nec enim quicquam mutari ex specie in speciem possit citra exalfacientiam, refrigerationem, humectationem, & resiccationem, etiam si cõtstringatur, contundatur, cõtvolvetur. Dico autem mutari ex specie in speciem, veluti cum ex pane fit sanguis, aut ex hoc

Medicum esse de  
bere, quod v  
triusque autem  
est faciat me  
tem.

Refecit ex  
alio et resic  
tione.  
Refecit temp  
orari, quod  
fuerit raturam  
sueti.  
Refecit in pri  
mo gradu resic  
gerat.

Calidum, frig  
idum, humidum, sic  
cum, quod op  
eris vnumquodque  
natura dicuntur  
actu suæ emergiæ  
talibus dicuntur  
potentiam dant  
actu dicuntur  
aliud quiddam  
absolute est calidum,  
frigidum, humidum,  
siccum, veluti elementa:  
aliud, excessus, ut  
homo, quæ talia ad  
symmetrum, seu  
generis sui speciem,  
ut leo cum homine:  
& pariter, homo  
autem ex parte  
florens cum puero:  
aliud ad quidvis  
iobvium, ut Dion  
ad Theronem.

Alimentum si  
medicamentum  
differat, quod  
hoc quidem  
alteret in qualitate,  
illud autem  
substantiam  
corporis  
assimilatur.

Alimentum si  
medicamentum  
differat, quod  
hoc quidem  
alteret in qualitate,  
illud autem  
substantiam  
corporis  
assimilatur.

Medicamentum  
vires medicamentorum  
consensus. Nec enim  
quicquam mutari  
ex specie in speciem  
possit citra  
exalfacientiam,  
refrigerationem,  
humectationem,  
& resiccationem,  
etiam si cõtstringatur,  
contundatur,  
cõtvolvetur.

Oleum corpori  
adsum, caloris  
ex sudore efflu  
um prohibet.  
Oleum vngi  
quod sitis, quod  
munit.

Oleum esse me  
dium inter hu  
mectantia et sic  
cantia.  
Oleum talum fer  
at nostram tem  
periem, quod  
oleum accipit.

Laetitia hinc de  
finitur, quod  
repositur  
remedia.

Prolio ex hy  
dralis corporis  
repositur.

Oleum est ali  
quid medicame  
ntum materia.

caro. Itaq; nō ab alio q̄ a calore, frigore, humiditate, siccitate, & specificis alterationibus singuli corporis affectus accipiūt. Quā ratione quatuor et qualitates elementares, primæ & specificæ nominantur. Earū igitur quam vnumquodq; medicamentū in mixtura pollentē fortiat,ur, investigamus.

## CAPVT III.

Cū autem totius nature respectu bifariam vnumquodq; dicatur calidum, frigidum, humidum, atq; siccum, partim absolute, vt singula elementorū: partim per exuperantiam, vt homo, equus, & bos: minime perfectō nos medici inuestigamus, an in aqua marina humidū simpliciter plū sit quā siccū (id enim clarē cōspicimus) sed an corpus humanū facultate sua æqualiter resistere valeat. Cuius sanē rei summum periculum, si eam admoveamus corpori, per fomenta aut emplāstra: id quod ex accidētē, ab eo quod propria medicamentū vi proficiūtur, distinguētes.

## CAPVT V.

Ceterū quod per exuperantiā dicitur, id philosophi accipiunt dupliciter: aut enim secundū substantiæ molem, aut secundum qualitātē effectum. Atq; hi quidem calidum vincere in omnibus plantis, pronūciāt, ob incrementa earū & germinationes id iudicantes. Quibus sanē, cū de tota natura forūent, rectē hæc & similia alia dicuntur medicis aut non rectē. Si quidem nulla planta, quod planta sit, calida dici debet, sed quod hominē calfaciat. Sic enim et salamandrā, et cicutā, ad hominē frigida esse decernimus: quā ratione sunt alia omnia etiā diiudicanda. Nam cicuta nō modō sturnos non refrigerat, & enecat, vt nos, sed alit quosq; ob idy nimirū etiā & calfacit. Insunt quippe omnib; rebus amicitie quedam, & qualitates pugnantie. Præterea quod familiare est, promptissimē assimilat: quod verō contrarium, ad interniciū en ducit, tum animalia, tum plantas. Ceterū familiaritates illæ, à tonus substantiæ proprietate exoriantur. Porro cū acetum & rosaceum nos primariō & per se refrigerent, nemo ea calida duxerit.

## CAPVT VI.

Quod applicitū nobis videt actū esse calidū, eodem gradu quo nos, aut ex contractū similiter calidū reddidit, id ex media est temperie, nobiscū collatum: ac per se etiam calidum secūdum exuperantiam, quemadmodum nos. At si quid nōdum adeo calidum est sicut nos, nec tale admodum redditur, id temperie humanā frigidus est, quantumcūq; in eo caliditas exuperet: ac proinde admodum, nostrum calorem minuet.

## CAPVT VII.

Ea autem est cōmunis alterabilitū corporū omniū natura, vt in se agant & pantant admodum: quodq; minus est calidū, à magis calido calidius reddatur: quod verō magis calidum, à minus calido remittatur. Nam id vel ex ipso tactu clarissimē discas. Etenim eadē subinde illū tum calidū, tum frigidū esse videntur: calidiori quidē factū, frigidā, frigidiori verō, calidā. Quæ sanē causa est, vt in balneis quidem frigida videatur nobis vna, foris verō calidā: cū tamen semper ipsa reddatur tepida. Similiter dum rigeamus frigore, aquā ex puteo profundissimo hau-

stam, calidam iudicamus: quæ eandem nobis in balneo, aut balneum ægrediens, apparet frigida. Itaq; tactum calidi frigidūq; dignoscendi nōmponentes, atq; eius dispositiōis curvis iudicium omne tribuētes, meritō sanē crebrō salimur: vt qui quod haud ex se est frigidum, id frigidū esse dicamus: quod verō calidum ex se nō est, id calidū pronūciamus. Absolute autē & vna, & aqua putralis, qualis ad nos optime temperata, atq; ab aliena qualitate immunes videtur, talis perfectō & est, & dici etiam potest.

## CAPVT VIII.

Cū igitur nec an absolute vnumquodq; calidum sit, vt ignis: nec an per exuperantiā, vt sanguis: nec denique an cum sythmetro sui generis aut speciei collatum, considerare nobis propōitum sit, sed an ad hominē sit tale vel tale: nec rursum ad hunc, tanq̄ id quod ad aliqd aliud cōparatur: sed an admodum ipsū, eam partē quam tengerit, reddat aut calidiorē, aut frigidiorē, aut humidiorē, aut sicciorē: certē in experientia omnis iudicandi & dignoscendi cōsistit ratio: per quam nimirū docemur, & rosas (exempli gratia) & rosarū succū euidenter refrigerare.

## CAPVT IX.

Sine enim in iis qui inculpati sanitate fruuntur, sine in iis qui laborāt simplicissimo affectu, videbit tibi planē oleū quidem in media temperie existere: quod verō cōponit ex ipso rosaceū, ex primo esse ordine refrigerantiū. Si quidē rosarum succus frigidioris nature est q̄ oleum: sed nō ita multo, cum tepidam quandam in se caliditē possidet. Eiusdem cum illo ordinis est, quod ad calorē quidem tepidum attinet, linospermum: ab eo tamē haud minimum tenuitate relinquitur. Nam rosarū succus est exquisitē tenuis essentia: proinde sceleratim arefcit, odorēq; aliorū vnguentorū exoluit. Est & chamamelum tenuitate quidem, rose persimile: calore verō, ad olei vires magis accessit, hominū tum familiares, tum temperatas. Quapropter laissudinī, vt si quid aliud, in primis cōfert, dolorēq; sedat. Præterea tensa remittit & laxat: medioctē dura emollit, cōstipatiōē rarefacit. Ad hæc se bres quæ citra viscera inflāma non ē infestā, cōcoctas discit ac dissoluit: & potissimū quæ ex cutis densitate & humorib; biliosis pvenit: ob idq; Soli à sapientissimis Aegyptiorū est cōsecrata. Est autē hypochochondriis gratissimū. Quibus etiā lini semē est gratū: minus tamē q̄ chamamelum, cum & minus calidū sit, & essentia crassior. Ceterū ad ascensum, augmentūq; inflāmationum, chamamelum rosaceum præfertur, cū lix tepida caliditate cum leui attritione indigeant. In principio siquidē, quæ refrigerant atq; attringunt: per incrementa verō, tepida, & medioctē constringentia: at in vigore ac statu inflāmationum, quæcumq; tum moderate calfacere, tum laxare possunt, magis cōpetunt: sicuti in declinationibus, quæ valenter calfacereq; & discutere.

## CAPVT X.

Ceterū quæ mediæ temperaturæ sunt, & quæ vtramvis in partem declinant leuiter, interim calfacere videbuntur, rursumq; refrigerare: interim talia feruere corpora, qualia in principio accepe-

Qualitates sunt  
resque quæ sunt,  
et cur sic dicantur.

Salamandra est  
frigida respectu  
humani.  
Cicutæ humor  
alis et calfacit.  
Coniosus quod  
dam ex dydro  
pitis qualitas  
tum rursū vni  
uersi rebus.  
Familiaritates  
videt exoriri.

Media temperie  
propter quod  
media cognoscitur.

Alterabilitatem  
omnium natura  
quæ sit.

Vinea cur ap  
paret nobis fr  
gida: in bal  
neo.  
Putealis aqua  
cur apparet ri  
gidius frigida.

Tactum delat  
esse ab omni a  
liena qualitate  
immunes si re  
frigerant.

Medicamentum  
sanum fundens  
in quod modum  
exsuperantiam a  
medico.

Rosæ rosarū  
succus, cuius  
refrigerant.  
Oleum est me  
dium temperie.  
Rosarū est ex  
primo refriger  
antiū ordine.

Rosarū succus  
liquidi quædam  
caliditē possidet  
adeoque aliorū  
virescens ratione  
causa.

Chamamelum se  
cundum naturā  
est.

Chamamelum  
li ab hypochon  
driis contrahit  
Liospermum.

Inflāmationem  
quædam medica  
menta debilitant.

*Urina videtur  
in balneo frigida.  
Refectum refu-  
gitur et calidum  
et diuina cur-  
pura.*

accepit. Nec mirum sanè, cum aqua tepida, vrinam, in balneis quidem frigidis, algensibus verò calidè appareant. At rosaceum, oleo quidem minus, succo autem eosarum magis existens calidum, refrigerat sanè ex vltis, idque suæ caliditatis tepore algere verò, paulatim etiam exalciat: qui effectus etiam caloriam est tepidi.

## CAPVT XL

*Admodum ad  
temperamentum  
modum, sed  
quarantia, et  
qua quod si me-  
diu vlt, pra-  
fida postulat.*

Quocirca si aut refrigerantibus medicamen-  
tis, aut calificantibus, rosaceum indiderit, sicvi nec 10  
magnopere obfusca, ita nec admodum profue-  
rit. Nam caliditas tepida, nec est sufficiens quæ  
refrigerata sunt laedere, nec eadè curare potest.  
Siquidem quod curari debet, tanquam quod ab im-  
moderatione et ad symmetriam redactur, non id  
quod probe temperatum sit postulat, verum id  
quod contrariam habet temperaturam, & æquè  
recedente à media. Etenim si quod curari deside-  
rat, multo frigidius sit, necessariū oportet quod  
ipsum curabit, multo etiam calidius existat: sin 20  
paulo frigidius, paulo etiam quod curabit calidius  
erit: ac de cæteris intemperaturis, pari iudi-  
cio. Porro si exquisita vtamur nominū appella-  
tione, quod medium in singulari est, id eucratum  
sive temperatū dicemus: quod aut ab huius ex-  
cedit modo, si ad calidius quiddam, tum plus, tum  
minus calidum: sin ad frigidius, plus minusque fri-  
gidum: nec de aliis alia ratione. Quandoquidē  
igitur corpora humana, tum us quas ab ortu na- 30  
ta sunt temperata, tum iis quas ab ætate po-  
stera acquirunt, tum us quæ ex vitæ consuetudine  
adveniunt, plurimum inter se differunt, ab istis  
ea medicamentis variè alterantur necesse est.

## CAPVT XL

*Gradus vlti  
modum, quomodo in vo-  
canda sunt.  
Temperatū me-  
dicamentū quod si  
excedit.*

Medium ergo horum mihi quæpiam intelli-  
gas, qui & natura sit temperatus, & moribus &  
consuetudine conuenient, hanc ipsam eucratiam  
tuatur. Deinde loca tres optime temperaturæ  
scopos concipiens animo, secundum corpora illi-  
um, veluti secundum regulam quandam, vires om- 40  
nium medicamentorum explores. Quod si simile  
illius temperiei caliditatem accendit, temperatum  
vocetur, etiam si vel maxime exalciatet senem  
refrigeratū videatur. Quod verò calciat aut re-  
frigerat corpus eiusmodi, illud quidem calidum,  
hoc verò vocetur frigidum. Eto aut ipsorum ex-  
cessuum ordo, ad frigidum quidem, primus, cu-  
sus esse dicat rosaceum: secundus, cuius sit ipsa ro-  
sæposit hunc tertius & quartus, quoad sermone  
ad frigidissima pertigerimus, nempe cicurum, suc-  
cum papaueris, mandragoræ, hyoscyami. Rur-  
sum ad calidum, anethum quidem & fenugræ-  
cum, prima: secunda verò deinceps, tertium, &  
quarta, donec ad extremam perventū sit. Ad eun-  
dem modum in medicamentis humectantibus  
& exiccantibus est ineundum iudicium.

## CAPVT XLII

*Medicamenta  
proprie modum om-  
nia esse et opo-  
sita, contrariisq;  
in si facultates  
sunt.*

Verum omnia proprie modum medicamenta, il-  
cet sensu simplicia appareant, natura tamen cō-  
posita sunt, diversissimamque in se facultates possi-  
dent, excurrentem, sistendi, incrassandi, extenuan-  
di, atque alia id genus vniuersas oppositiones.  
Nec mirum id esse debet, cum vni eisdemque medi-  
camento, vim calificantem & refrigerandi esse ap-  
pareat, aut exiccandi humectandique. Quæ primæ

efficacissimæ virtutes nisi hoc pacto cōpiscarentur,  
haud sanè quæ ex illis sequuntur, similiter cōplica-  
te forent. At si non ipsi rhu succum mellis miscua-  
mus, quod ex ambobus conficit, astrigendi si-  
mul & abstergendi vim possidet: sicut & cohi-  
bendi ventris, atque laxandi. In laete aut duas esse  
facultates, nempe sistendi ventrem atque eva-  
cuedi, non item cōcedimus: ramentis casus qui-  
dem secretus, ventrē sistat, serum autē resoluat.

## CAPVT XLIII

Quod verò & brasica duas tanquam contrarias  
in se facultates obineat, neque id quidem prom-  
ptè cōcedimus. Nam tamentum succum eius planè  
aut solum, aut ex melle purgare cernamus, at-  
amen quoniam quod reliquum est, edere minimè  
possumus, astrictionū esse id distindimus. Quam-  
vis si bis terve aut quater elixit, ipsam brasicam e-  
damus, cōperiemus sanè, succum eius qui in 20  
qua fuit relictus, purgare ipsam verò ventrem  
astringere. Eadem est ratio in beta, lente, atque in  
iis quæ testa per cute integunt: ac breuiter in om-  
nibus semē illarum, quibus vapor aut acris, aut sal-  
sua, aut nitrosia inest. Gallorū etiam veterū ius,  
ventrē subducit, tamentis caro eundē sistere pos-  
sit. In æta aut squama, sicut duplex qualitas, ita  
gemina quoque facultas inest: nam & astringit  
& mordicat: cæterum si illam corpora sumat, pur-  
gat quiddam ventrē, verum non cohibet. Quippe  
vincitur eius astrigendi facultas, ab acris purga-  
toriarum potentia, quemadmodum si rhu succum  
scammonie commisceas. Sic enim cum melli cy-  
donie carne, aut cum alio quopiam eorum quæ  
& astrigenna & grata ventriculo sint, non pau-  
ca purgantium medicamentorum dum mista exhi-  
bentur, gustum quidem fallunt, at effectū solo

*Casus sicut  
ventrē sistit.  
Serum album  
laxat.*

*Brasica huius  
est elixir succū  
ventrē sistit.  
Ipsam autē sup-  
primere.*

*Gallorū veterū  
iūs ventrē sub-  
ducit, caro autē  
cohibet.*

quid valeant cōmonstrant. Perispe siquidē lin-  
gua à materis victa est copia: at acido, pro facul-  
tatis robore, viribusque pericitur. Itaque cum sub-  
stantia exigua quidem, sed valdis prædita viri-  
bus, mista alteri substantiæ plurimæ, eisdemque im-  
becillæ, corpora ingreditur, gustū quidem fallit,  
attamen effectum, quæ illa, efficaciorē exhibet. Por-  
ro si ab aloë quod purgat, ab eo quod est astrin-  
gens, eluatur (id quod fieri potest per exactis lo-  
nomen) tunc certè aut debilitet, aut planè nihil  
purgabit quod vlti etiam venit ætis squamæ,  
æriq; vlti. Iam verò ipsius quoque qualitatis me-  
dicaminosus vapor, primo statim gustu facultates  
mixtuem demonstrat. Nam si vnica semper  
qualitas, vnicuique gustu astrigentium medicame-  
ntū inest, haud sanè inter ipsa, alia elui apta,  
alia medicaminosa existeret, sed tantū intentione  
aut remissione astrictionis differrent. At nō  
ita res habet: cū videamus ætis squamam mlo cy-  
donio astrigentē minus, gustu tamē eo longè  
insuauiorē existerē: quæ gustu ab absurditate pro-  
ficisci à vehementi astrictione, dicere id quiddam  
nō possumus. Si itaque vlti astricuo, ita etiam astrin-  
gena vnum perpetuū esset, sanè vnum quoque  
perenniter eius esset opus. Verum cum præter  
astrictionem insuper alias qualitates, neque pau-  
cas, sortiatur, semper quiddam omnibus illis ager:  
sed evidentius aliā per aliam, nempe vincen-  
tem: idque vt ad corporis cui admotum est affec-  
tionem. Astrigens igitur hac ratione, non est

*Aloë lola dno  
substantiæ parū  
purgat.*

Astringens non  
esse vitæ rationem  
purpuream.  
Rosa partes  
quatuor.

ei quod purgat contrariū: quāq; si quia illa esse  
cōtraria statuatur, nihil inde absurdū sequi. Et  
in rosa succo, aliud quidē grauiusimū est, amur-  
cæ & feci proportionale: aliud leuissimū, & i-  
psū, oportune respondē flori in quoq; succo su-  
pernatan: aliud tertiu, quale est quod in musto  
seruet: ad hæc quatuor, ipsum videlicet purissimū  
ac syncerissimū, cuius hæc tria excrementa exi-  
sunt. Eventū autē alios quidē succos aut acce-  
re, aut corruptos putrescere: rosa verō, oleum,  
mel & vinum, in longū tempus durare. Quare  
nec per ebullitionē, nec per secretionem in alia  
succis, has excrementorū differentias invenire po-  
ssimus licet: verum protinus ab initio coctione  
quādā illis esse opus, aut salte aliquid perduran-  
ti succi mixtura. Nam sic rose succū melli miscē-  
tes, aut totas rosas ei immergentes, reponimus.

Succus alius ac-  
cere, aut cō-  
trahere: sola an-  
tem, oleum, mel  
et vinum, lau-  
gum tēpus du-  
rare.

Cum autē rosa nō astringens modō, sed etā dulcis  
atq; amara gustanti appareat, satis apertē ostē-  
dit, se habere illorū succorū quatuor miscellam.  
Quinetiam vel ex hoc tantum, quod non extre-  
mē astringat, aliorum quoq; saporū mixturā in-  
telligere in ea possemus. Quippe si solus sapor  
austerus illi inest, summus inde fuerit quo mo-  
do si sola corpori cuspī caliditas summa inest,  
id ignia vni foret: at si nō summus, sequimur  
quod neg etā solus. In vniuersum enim contra-  
riorum mixturæ, summutates ipsas frangunt.

Rosarū succum  
affundē ratio

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Atq; in similibus quidē corporibus calor, 10  
frigiditas, siccitas, & humiditas, particulares dif-  
ferentias efficiūt: in dissimilibus verō acrimo-  
niæ, siccitates, austeritates, acerbitates, dulcedi-  
nes, amaritudines, siccitates, aquositates, et pin-  
guitudines. Quare vniūquodq; corporū simila-  
rium, hoc est, quæ nō ex diuersis substantiis con-  
stant, in ipsa partibus nō multas, sed vnā ex his  
qualitatē obtinet: quod verō toti est dissimila-  
re, cōplures: quarū hæc quidē astringūt, hæc laxāt,  
aliæ aliam facultatē ostendūt, sic vt omnes qui-  
dem linguis partibus diuersis, pro contrariis ra-  
tione afficiant: affectio tamen ipsa, ex eo quod  
primō affectum est, in totam eam quāc celerit-  
mē diffundat. Cuius simile in tranquillis aquis vi-  
dere licet. Nam si in duas eius partes duos cōie-  
ceris lapides vno eodemq; tēpore, ij sine duos  
efficiēt circulos, qui mutuō per sese ferent, cōtra-  
riōsque cernes in quavis ipsius aque particula  
morus. Quod si vnū pedem in calidū, alterū ve-  
rō in frigidū simul demittas, haud dissimile ha-  
bebis etiā exemplū. Quippe in totū corpus vtri-  
usq; affectionia motus pervadit, cōtrariūq; in vi-  
cem sibi occurrunt: id quod etiam evenire au-  
tumo in lypyriis, & hepialis febris, nisi quod  
in illis nō extrinsecus, sed ex ipso corpore calidi-  
tatis frigiditatisq; affectus oritur. Si verō parem  
abstinth portionē mellis exquiritē cōstitam, lin-  
guæ imponas, simul dulce & amarum, quod ex  
ambobus mustū fuerit, videbis: cum nō alio tem-  
pore mellis saporē lingua ipsa sentiat, alio autē  
abstinth, sed vtrūq; simul. Quemadmodū igitur  
ab his lingua afficit, ita necesse est quāq; a li-  
quarū corporis partiū ab eia similitur affici, e-  
tiam si qualitate ipsa nō sentiat. Neq; enim in  
patiēdo, aut non patiēdo, ab aliis linguis dif-

Lypyria febris.  
Hepialis feb.

Saporē quali-  
tatem afficiunt  
reliquas etiam  
partes, vt lin-  
guam. Sed non  
pervadit ab in-  
tercipianur.

ferre est purandum, verum eo quod ipsam fami-  
liam affectū, ob exquisitā sententiā facili-  
tem, nihil latere possit. Ad quod sane nō nihil  
ipsius conducit raritas, sic ut. succi facilius pene-  
trant. Porro si solano & anthemide aliquid parti  
simul applicitis, neq; ita densa, dura, tensa, li-  
uidaq; reddatur, ac si solo vīfū solano essent: neque  
adeo rara, mollis, tepida & rubēs, ac si anthemi-  
de sola vīfū fuisset, sed dictorū mediā accipere  
affectiōē particulā cōspiciat: consentaneū cer-  
tē est, vtrūq; medicamentū secundū suam facul-  
tatem esse operatū, ac proinde particulā ipsam  
codē tempore cōtraria simul perpeffam fuisse.  
Igitur quemadmodū mirū non est, si a medica-  
mentis cōpōsis cōtrariū simul affectus corpori-  
bus indigant, ita nec si a simplicibus: cōm & ipsa  
sensui quidem simplicia appareant, natura autē  
cōpōsitā sint. Siquidem quemadmodum noa in  
iā quæ indes cōponimus, sic natura in simplici-  
bus ipsi, contrarios temperare succos conse-  
quitur: quorū sanē actiones, si pari facultate & por-  
tione ipsi in mixtura cōstant, evadent similes: si  
dispari autē, diuersæ. At verō, vt astringitū quidē  
vna res est, ita astringens, duplex. Aliud quippe  
summū existit, vt allumen & galla: aliud autem  
quod astringitōis sit particeps, vt pirum, vinū,  
& rosa: nam huius minimū est id quod astringi-  
git, quare medela existit in inflammationum.

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Rosaceum verō (vt ipse cuius natura olei ro-  
sæ in medio est) in inflammationē augmētis,  
hoc est, in illarum medio, optimū est præsidium.  
At oleum cōmodū est, vbi inflammationes ma-  
ximē vigent. Et enim per initia repellere compri-  
merq; influxus oportet: in vigore autē ita per  
halitus digerere, vt morbus abit: at in incremen-  
tis, repellere simul ac digerere. Vtrūq; autē ro-  
saceum præstare potest. Nam præterq; quod te-  
nuum est partium, leuem quandam astringenti-  
æ sortitur, nimirum inter oleum & rosam exstena-  
medium. Quippe medium omne ex contrariis  
mixtum existit, usq; tota per tota cōtemperata  
est, aut per exiguas particulas, solum effugiētes eo-  
rum quibus admouentur. Et enim quæ magno-  
pere austerā acerbāq; sunt, primo statim conta-  
ctū superficiem densantia, humorē ingredi pro-  
hibent. At quæ modicē astringit, ceterū plu-  
rimum in se continent essentia tum tenuis, rum  
repide, tantum abest vt per astringentiā ingredi  
altius corpora admota prolubeant, vt etiam ab  
ea, magis scilicet impellente, inuenitur. Quæ au-  
tem penitus tenuia calidāq; sunt, magis digerūt  
humores ex corporibus quibus admouentur,  
quom alios ipsa apponant. At quæ frigida sunt  
& essentia crassioria, omnino nullum introdu-  
cere humorē queunt. Quæ itaq; humida, tenuia  
& modicē astringentia sunt, ea inter omnia hu-  
meftantia efficacissimē humectant.

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Ad hæc autem omnia non mediocriter cōferti  
innata nobis caliditas, & intro ad sese attrahē,  
& cōtemperando extenuans. Hinc est quod frigi-  
da deleteria medicamenta, vtpura cicuta, papa-  
uer, hyosciami semen, mandragora, & alia id ge-  
nūs, citius magisq; in caliditia naturis vni suam  
extingunt,

Lingua ut in  
fem habuit ex  
quiritur.

simplicia medi-  
camenta affligi  
cōtrariū propo-  
ritū est, ut  
cōm natura in  
pōssit sint.

Astringitū do-  
plex.

Rosaceū quod-  
da cōmmodū  
est inflammationi.

Inflammationi  
omni curatio.

Rosaceū facul-  
tat.

Medicam omne  
ex cōtrariis  
fieri existit.

Humectant  
quæ possunt in  
vni cōtrariū  
fieri.

Calor innatus  
ad quod cōtrariū  
est.

Tepida ex du-  
la etia medica-  
mentis, ut cicuta,  
magisq; in cal-  
ditiā naturarū  
suam extingunt.

Qualitates om  
nes quadantenu  
m in se mu  
tuam  
Legit ab affe  
ctu sollicitudo  
naturae  
Galenus etiam  
scilicet habet  
tunc a quibus  
deducitur per  
corpus.

La. Inca facit  
si interius ad  
pericardium  
non sicut de co  
lora pericardii.

Doleria qua  
putrefactio  
necesse, quom  
ab in diffen  
tione qua fua  
consequitur  
quidam  
Iuveneri multo  
animal possit  
nisi ut a mune  
in agere cesset.

Cicuta pro mi  
nori furore o  
mni.

La. Inca facit  
liberaliter sum  
pui esse letali.  
Vtula quadi  
Atheniensis al  
batur cicuta.  
Consequendo est  
edificatio mae  
ra

La. Inca frig  
re, non generi  
sol sola quan  
tate decidit  
lethalis, contra  
quam ea qua  
putrefacit  
non erodendo  
interimunt.

exerant. Nam quod sit impossibile ut talia interficiant, nisi prius cor refrigeretur, necessarium sane est, ut intro cōmuniatur ingrediatur: id ex sua natura praestare nequeunt, crassa & incepta ad motum quum sint. Quare alicuiam caliditatem requirunt, quae in minuta extenuetur, ac veluti manu ducatur in subiles meatus. Itaque si quando ea ab his, cunctantur, in maioribus haerentia meatibus, in ipsius fluctuantia arteriis & venis, repositis spatio aliquid perpetuantur. Si quidem qualitates omnes quadantenus in sese agunt. Nam & lapis ab aëre suo stillicidio excavatur: gladii quoque ceram secant, ut hebetetur. Quia igitur solida partes (a quibus periculi sunt actiones) si refrigerantur, medicamentis non debent refrigescere, tunc animis supersit, est necessarium refrigerari aut nequeat, prius quam illa subierint, prius laetum meatus, id quod sua ex natura non possunt. Deducit appere succos, ut causa quidam primaria, arteriarum attractio: ut secundaria vero & materialis, ipsorum tenuitas: quae destituta quod sunt, frigida ora & crassiorum partium medicamentis eis opus habet, quod praestant. Ceterum corpora frigida trahebant arteriarum immixtiorum possident, medicamentorum substantias cōminue re nequeunt: proinde medicamenta ipsa cunctari est necesse, praestant repositis tamen immutat, tum cōcoque: quod si soler succos lactucae: qui si integer ad perveniret, non secus ac cicuta perimeretur. Haec igitur & similia, nisi celeriter perierint, nullus tamen effectus redduntur. Atque aut erosione aut putredine enecant, ut ut tempore vires acquirant, accidit: quod temporis spacio putrefacit omnia, eoque magis, quo fuerit humidior atque calidior locus. Merito ergo sit, ut quae frigore suo noxia insensibilis, ut actionis celeritas ad perniciem praestant. Quippe quae alioque spacio excelsa, vim per quam agerant, perdat. Atque in putredine actus subsistit, ut tempus actionis adauger, quoniam et putredinem. Nullum autem animal interire potest, nisi cor ab agendi munere cesset: ac fieri ut cesset non potest, citra maximam interperit. Cicuta itaque hominem medio tollit, tum ob meatuum amplitudinem, caloris multitudinem, tum ob validam arteriarum in attrahendo vim, visque ad coe ipsum pervenit. Sturnus vero ob causas contrarias haud enecat, vixit quod & retineat, & cunctetur, ac sese temporis tractu concoqui, preparari a corde patiat: quemadmodum & in ipsis lactucae accidit, quae moderata quidem sumptis, alunt hominem: si vero quispiam expressum earum succum largiter hauriat, non secus proculdubio morietur, quam qui aut cicuta, aut papaver sumperit. Ad eundem quippe modum cicuta hominem quidem celeritate distributionis interficit: sturnus autem tarditate ipsa, nutrit. Sin autem exiguum quippiam sumatur, mortem homini haudquaquam inferret: id quod anus illa Atheniensis experimēto docuit, quae ab exigua cicuta porzione auspicata nullo detrimento ad permagna progressa est copia: adeo consuetudo videtur esse a dicitur natura.

## CAPUT XVIII.

Eorum ergo medicaminum quae frigore interimit, nullum genere letale est, sed sola quantitas: quod si exigua porzione sumant, mortem non inferant. At in erodentibus, putrefacientibus, & cal-

facientibus, haud ita res sese habet. Ad haec, quae admodum frigida medicamenta, nisi calore ostendant validum, qui cōmuniatur atque deducatur ipsa, non perimunt: sic si quod cōminuit deducitque, multo valentius fuerit, devincet prius, mutabitque, ac alimento ut sibi sit medicamentum, efficiet.

## CAPUT XIX.

Quum igitur medicamenta refrigerantia quadantenus a nobis accipiant suam refrigerandi vim, sicut & calfacienti calida (neque enim quicquam moliri possent, absque corporis patientis auxilio) iure potestate dicuntur frigida. Nam ut actus non refrigeret, non potius ex sese obtinent. Ea propter meconii & cicuta, si cum modico eoque minime generoso vino bibantur, ocyus quidem interierant. Si quis vero papaveris succum, quantum interficere potest, hauserit, ac etiam nullum iam super sit, haec large eorum vinum vetus generosumque & calidum auxiliabit. Ceterum quod tenui pelliculaque substantia est, colore vermiculo aut flavo, odore grati, quodque multam aquam misturam postulat, id tum admodum exallescere est natum, tum facile vixit per corpus vniuersum defert. Tale ergo natura vinum, vate veritas, multum atque imperitiosum, non modo perfrigeratum omni, sed cor etiam qui aut ex ipsis ventriculis, aut cordis dolore, animi deliquit patitur, praestantem remedium exiit.

## CAPUT XX.

At eorum medicamentorum quae erosione atque putredine interimunt, plerumque sine perinde vitiorum quae potestate dicuntur calida, actus etiam calida exiit. sed idcirco nos fugiunt, quoniam aut ipsi plurimum habemus caloris, aut crassa est ipsorum substantia. In balneo quippe vrina nobis videtur frigida, quemadmodum algentibus hyeme, aqua putralis, calida: ceteris aut frigida. In summa, pro suo vniuersoque affectu, admodum cōsequitur sentire corpora. Sic ergo si manum habens frigidam, eam in tritici acervum immiseris, luculentior calor percipies. Sin calidam nequaquam. At si columbino & hercori accumulato, potissimum columbarum sylvestrium, manum inferas, etiam si calidam, manifestam tamen senties caliditatem. Sic myrsi, sori, chalcitis, xerugo, calx, aliquid id genus innumera, si illis acervans manum altius iniicias, proinus videbunt exallescere. Ceterum si bolum ex eis vnum acceperis, cuius extrema perferies ab ambienis fuerit refrigerata, mentis nullum percipies calorem. Quam ob rem fieri etiam potest, ut quae respectu nostri sunt potestate calida medicamenta, in secundum alterum animantium genus calida esse actus videantur.

## CAPUT XXI.

Quae igitur nos contrahit per putredinem aut erosionem enecat, ea recta quidem ratione deleteria humanae naturae toto genere existimant, non ut refrigerata, quantitate duntaxat. Haec enim interdum vincuntur, & nutrimenti animali redduntur: putrefaciencia autem, vel si sumant porzione minima, omnino tamen corrumpit, quod videlicet quae putredini obnoxia sunt, calore humiditatem putrefacit, calidius autem humiditatem sit sanguis. Proinde longo etiam post tempore a quo sumpta sunt, nonnulla interimunt, potissimum

X x

Medicamenta calida & frigida a nobis sumuntur in actus suum, ac prout potestate dicuntur talia.

Cicuta si cum modico & minimi generoso vino bibatur, ocyus perimit. Vinum vetus, generosumque, & calidum, auxiliatur venis refrigerantibus.

Vinum refrigeratum, amantibus vixit, quia non efficitur.

Quippe pro suo affectu admodum cōsequitur sentire.

Doleria humanae naturae toto genere existimant.

Putrefaciencia, vel si sumantur porzione minima, corrumpunt animal.



mum quæ crassa terrenaq; effennia sunt prædita.

## CAPVT XXII.

Erodentia.

Interdum aut ipsa erodentia medicamenta adeo exigua sumunt, ut externi cum excrementis possint, prius quam iniuriæ corpus afficiat. Interdum etiam illa sumunt, opportunitas remediis vniuersis, asferunt. Nam ubi grauis ab iniuria illata est, malum ipsum sibi nullis prædiis potest. Externis citharides medicamentis diureticis commodè permiscetur: sicuti alexipharmacis alia plerumque letalia. Feruntur. n. alioqui spore sua per vniuersum ad vesicam citharides, ac sic rodendo illis exvicerat, nisi ubi copia in modica in datur. Ex quibus patet, quæcumque frigiditate intermisit, si exigua sumantur, nutre corpus posse: ac quæ putrescentem, nequaquam, quum nature humane advenierunt.

## CAPVT XXIII.

Medicamenta multas diuersi generis substantias esse amittunt.

Purgantium medicamentorum descriptio.

Purgantia, ubi à natura vincuntur, talia quæ sunt hominibus, qualem doctrina erant.

Purgantia medicamenta esse familiaria purganda hominibus. Diagonis ferro est spore similia, ut tamen feruntur. Causa est pituita similia.

Veratrum alii coturnicis. Attractionis ferri substantiarum similitudine. Similitudo differt ab identitate.

Purgantium medicamentorum differentia.

Vt igitur in alimentis mistos esse varios sapores diximus, sic in medicamentis intelligere oportet, multas diuersi generis mistas esse substantias: id quod in venias facili, si consideres granum cadium solium hoc à cnicis differre, quod plurimum habeat caliditatem. Porro attractio quæ in ipsis cernitur, à qualitatibus proprietatibus, quæ sunt in substantiis, perficitur. Idcirco purgantium medicamentorum, ubi forte purgatione frustrantur, quedam præterquam quod noxam corpori nullam inferunt, etiam alimentum corpori præbent: alia verò in corruptione ac venenum vertuntur. Omnia siquidem medicamenta purgantia, vel cum vno saltem humorum, qui in nostro corpore sunt, si malitiam habet: non autem perpetuo mista esse via virosa. Quamobrem nec perpetuo, licet non purget, iniuria afficiat, verum & concoctionem admittit, talique producat humorem, qualis erat natum educere.

## CAPVT XXIIII.

Plerumque itaque attractiones sunt qualitates familiaritatis: ac prinde singulæ animalis particule familiaris sibi alimentum attrahunt: ad quod sententiam sequitur, medicamenta purgantia familiaria esse purganda humoribus quodammodo efficaciora, valentioraq;: sicuti magnes ferro, quippe quæ ad ferri naturam accedat, repenitque in ferri fodinis, eius specie magnopere sit per similia: verum fortior est quodammodo, ut attrahere sit aptior, quam trahi. Causa etiam (quem cathartum vocant) colore quidam pituitæ similia, calore illi superat, sic ut trahere quam trahi sit, promptior. Ad eundem modum granum cadium, si quando à corpore nostro vincat, vice purgationis alimentum efficit: veluti veratrum semper coturnicibus. Verumimmo quoniam attractiones, substantiarum similitudine fiunt, necessum est ut si quod purgat pituita est, id quod trahit sit non pituita, sed pituitosum. Differt siquidem similitudo ab identitate.

## CAPVT XXV.

Ad hæc, purgantium medicamentorum quedam iam actu possident idoneam ad attrahendum si similitudine: quædam ab animalia illa corpore accipiunt. Præterea in vnoquoque medicamento, permixti similibus sunt alii succi dissimiles, qui partim quidem medicamentosi sunt, partim minime. Quare ubi purgationem haud assequitur, quedam in perniciem, quedam in alimentum vertuntur.

## CAPVT XXVI.

Ceterum ubi purgantia pharmacia vique adeo inualuit, ut in vasorum ad ventrem pertinentiū oculis mordicationem apertionemq; multā relinquant, asiduè irritant, cōuellensq; corpora, vasorum facultates dissoluant, vacnationes immoderate contingunt: ita, ut si quod pituitam educit medicamentum exhibitum fuerit, prima quidem omnium ipsa evacuet, dein sua bilis, mox atra, quarto denique loco sanguis. At si quod fluxibilem detrahat, pituita consequenter postquam atra bilis, quartus demum reddetur sanguis. Sin atram bilem purgare sit natum, eam quidem primam eliciet: postquam, fluxam: dein pituita, ac omnium vitium sanguinem, tanquam ex inanibus vasis effluente, ut quæ summa iam imbecillitas occupet, quicquid ad extremam oculorum apertionem pervenerit. Ex quibus manifestum est, postremum in immodicis purgationibus vacuari humorem qui familiarissimus est: aliorum autem singulos, prout crassi existunt, aut tenues.

## CAPVT XXVII.

Quum igitur vascula non amplius lo fa conti nere succos possint, & oscula eorum reclusa fuerint, neque irritare medicamentum desinat, nec possit amplius familiare succi attrahere, necessum est reliquos quoque, quod diximus ordine, sequi. Fit autem orificiorum apertio, ob medicamenti violentiam, ob quam videlicet mordicatio etiam promouetur. Vasorum autem imbecillitas, tum ob ingentem defangationem, tum ob intemperantiam, quæ immodicas purgationes præcedit.

## GALENI PERGAMENTI de simplicium medicamentorum facultatibus, lib. III.

Constat igitur vniuersas corporis partes operari afficiq; ab artibus qualitatibus, quemadmodum lingua afficit: sed passionum sensum non exactè percipere: at lingua ob sensationem quam habet sensus, posse naturas earum omnium dignoscere: tametsi passionum similitudinem invenire sit etiam in aliis partibus. Vniuersis, ac precipue in exviceratibus: quandoquidem curis duntaxat densitasque prohibet, quo minus foris incidentium facultates intro in carnem penetrare.

## CAPVT L.

Sic enim & illud ab Hippocrate dictum est, Viceribus frigidum mordax: tametsi cum prius quod exviceraretur, mordax nequaquam esset. Porro quicumque frigus contingit, eorum & contrahat, & condesat, & costringat substantiam, primamque tuen tum excrementi humiditatem, sicuti ex oculis lachryma, ex naribus mucus, necesse est: postea vero etiam mordax appareat, licet alia ratione, quæ in calido. Nec enim erodendo quod contritum est, sed divellendo, mollemque substantiam in arcum contrahendo, ac breuiter ipsius partis cōtinuitatem per diuisionem solendo, molestum, ac mordax est frigidum. Ceterum ut in his pronua contractionis cōdensationisq;: sic in illis quæ calore suo mordant, dissolutionis et fusionis sensus percipitur. Ad hæc, in refrigerantibus quidem vitium tardior est atque cōtinuatur mordacitas: in exsiccantibus verò quæ celeritate penetrat,

Vacuatum immoderate quando quomodo accedat.

Sanguis vacuari omnem vitium, et non tamen sensum.

Vasorum reclusa imbecillitas, unde accedat.

Viceribus frigidum mordax.

Principium quo ratione sit ut datur.

*Mordicantium  
alia sunt facul-  
tate calida, alia  
frigida.*

trat. Quam ob rem medicaminū mordicantiū,  
alia sanē calida facultate, alia necessariū sunt frigi-  
dida. At q̄ moderate calida sunt, quęq; tempera-  
ta potius quā calida dici deberēt, vt poculum  
atq; balneū, dum mediū temperē fortiantur, no-  
bis grata & amica existūt. Funditur enim per ea,  
quod in corporibus nostris consistat atq; con-  
cretum fuerat, vnde animābus voluptas maxi-  
ma oritur. At si quis in eis immoretur diutius, sen-  
sim quidē & ipsa molesta evadunt, id q̄ nō quod  
mordicatione infestent, sed quod substantiā no-  
strā soluentia digerentiaq; deliquit animi, ac  
tandem mortē inducūt. Quę autem his calidiora  
sunt, secant, distrahuntq; substantiā: quare ne-  
cessariū mordacia vident, vt tum aqua feruens,  
tum ignis. Igitur subiectam materiā contrahere  
condensareq; frigidi semper est propriū: funde-  
re autem atque liquare, calidi: vtriusq; verō im-  
moderatus auct, communis est mordicatio. Ve-  
rū quę a summa frigiditate, aut caliditate ab-  
sint, minimē eum mordicant. Plurimū autem  
ad id genus affectiōnes facit essentia medicamē-  
torum vel tenuitas, vel crassitudo. Siquidē frigi-  
da quę tenuiū partū sunt, quum magis in pro-  
fundum transcant, vehementius mordicant. Ca-  
lida verō q̄ crassiorum sunt partium, quoniam plus  
vicerant, vehementius idcirco affligunt. Tenuio-  
rum itaq; partium aer est: crassiorum terra: me-  
dium eorū tenet aqua. Sed aer accensus fit flamma:  
terra autem pruna: at aqua vehementem sanē  
caliditatē recipit, sed nec flamma nec pruna,  
propter imatam humiditatem, efficiunt. Siquidē  
flāma & pruna ignis sunt genera: ignis autem  
omnis, calidus est & ficcus: aqua sicca vt  
sit, fieri nequit. Nullum autem est adeo calidum  
plurimacum, vt flamma, aut pruna, aut aqua fer-  
uens. Proccedit tamen visq; ad vitionē ipsa medi-  
camentorū caliditas, vbi in crassa consistit essen-  
tia. Quę verō subtiliū partium sunt calida, non-  
nunquam omnino nō mordicant, sed calfaciūt  
duntaxat. Et vbi mordicent, non tamen vrant.

## CAPVT II.

*Tenuium &  
crassarum parti-  
um quę esse di-  
cantur.*

Potro quę celeriter in tenuia solvūtur, tenuiū  
dicuntur partū: quę id perpeti nequeunt, crassa-  
rum. Quod ergo ea solvūtur, calor animalis, cui  
applicantur, est causa: quod in tennes crassasve  
partes comminuantur, id ā propria natura ob-  
tinent. Quocirca refrigerantiū medicaminum ea  
quę crassiorū sunt partium, mordicare nequeūt,  
quod extrinsecus superficiem penetrare non  
valeant. At quę tenuiū sunt partium, maximēq;  
in ea qualem temperē fortiantur, valenter mor-  
dicant. Sed superius demonstratum est, in ea quabilia  
esse propemodū omnia: vbi ostenderemus, & in  
vino, & in oleo, quatuor reperiri succos diuersos,  
in summāq; vniuersa medicamēta facultati-  
bus cōtariis consistere. Enim verō acetū, tamenū  
ingenitū vini caliditatem amiserit, ex putredine  
tamen sibi aliam adeptū est. Quippe vinose vint  
partes, dum ipsam in acetū transtulit, refrigerātur:  
at aqueum recrementū putrescens, aciditū calidi-  
tate acquirit, vel vt quę putrescūt omnia: sicut  
acetum quiddā ex cōtariis facultatibus mistū,  
partim refrigerantibus, partim calidis: sicut vi-  
storum lignorū oēs cineres, qui ex aduisione nō  
nullas partes igneas conferuant, quas macerati

*Mordicare quę  
volant.*

*Medicamenta  
omnia facultate  
tenu consistant  
matriarū.*

*Acetum ex om-  
nibus facultati-  
bus constat.*

postea solent in aquam deponere. Hanc enim a-  
quam marinā & muric per omnia cōtēpon-  
dentem, vulgo lixiuum appellāt. In vniuersum  
autem, quod tantum est acidū, quicquid id fue-  
rit, planē frigidum est, eodē vt cōtra omnes cali-  
dos affectus cōmodissimē poteris, vt opliacij  
succo. Qui quidem quū omnino acidus sit, per-  
fectē etiam refrigerat, vnicūq; ardoribus p̄dest,  
inimicus affectuionibus frigidis, quemadmodū  
omnia exquisitē refrigerant. Ea autē quę quā ac-  
da sint, habent etiam saporem quendā acrē per-  
missum, qualis planē inest aceto, laud dubie nō  
nihil caliditatem possidet. Verūm si frigiditati as-  
trictio cōiuncta sit, aliud est frigiditatis genus.  
Quippe acida frigiditatis tenuium est partium: at  
astringens, crassarum.

## CAPVT III.

Non igitur sola ratione per methodos logicas  
nos exerceri oportet, sed exercere etiā sensum in  
saporibus singulis: quod fiet, si omnia ea sedulo  
experiamur lingua, quę vnamquęq; qualitatem  
præ se ferunt manifestissimam. Vt, si acrimoniam  
cogitatione completū velis, in alio, capis, atq;  
his similibus, ea sæpe gustando te excrescere opor-  
ret. Sin astrictionem, in galla, rhu, & similibus. Si  
amaritudinem, tum in turo, tum felle. Si quali-  
tatem saporis expectem, in aqua immuni ab om-  
ni qualitate est acritas. Nam hinc exorsus, prom-  
ptus ad aliorum obscurorū omnium saporum  
cognitionem peruenies.

## CAPVT IIII.

Sin autē qualē præbet sensum aqua planē om-  
nis qualitates vacua, talē in re aliqua sicca inue-  
nias, ea nimirū medium constitutionem fortie-  
tur, aut certē ad frigidius paululum inclinabit.  
Quod si talis quum fit in calorē & frigoris differe-  
rentia, insuper consistentiā nascita sit siccam, terre  
stris sit, ac citra morsum deficiet, est necesse. Atq;  
huius generis medicamēta omnia, medici appel-  
lant emplastica.

## CAPVT V.

Duplex autem est emplasticorum natura: alte-  
ra exactē terrea & sicca: altera viscosa quidē om-  
nino, sed ex aqua & terra, & plerūq; etiam aere,  
commista, sicut oleum dulce. Hoc siquidem ex  
aerea, terrea, aqueiq; essentia cōstat. At qui al-  
bumē, ex iisdē quodāmodo, sed magis terreū est  
oleo. Quin & quod laetius est caseolum, emplasti-  
cum quoq; est: & siuillius adeps. Nam tauri, & hir-  
ci pinguedo, acrimoniam & multam, & igneam  
possidet: bouis itē, ouisq; adeps acris existit. Por-  
ro asneris & gallinacei calidior est pinguitudo,  
& sicior quam vniuersa: necnon sublioriū partū,  
& minimum terrestris, sicut & anium omnium.  
Quęcumq; ergo pinguedines nōdum illam natū-  
ram acrimoniam, emplasticā & illinendi po-  
ros possident facultatē, eamq; tantō efficaciorē,  
quantō sicciores, magisq; terrene fuerint. Huius-  
modi enim est cera elota, quę ex melle tū a quo-  
siore, tum minimē mordaci cōfistit.

## CAPVT VI.

Astringētia porro terrena sunt, & crassa corpo-  
ris consistentia: qualitate verō frigida. Acida au-  
tem, tenuitate pollent corporis, sed perinde vt  
astringētia refrigerant. Etenim arborū fructus,  
quorū vobis, vbi maturauerūt, dulces apparēt,

*Lixiuum.  
Acida omnia  
sunt frigida,  
quatenus acida.*

*Omphacij fa-  
cultas.*

*Acida frigiditatis  
tenuium est  
partium.  
Astringentiū frigi-  
ditas crassarū  
est partium.*

*Sensū quo pa-  
llo excrescere di-  
cantur.*

*Emplastica ne-  
dicamēta quę  
dicuntur.*

*Emplastorum  
natura duplex.*

*Olei partū.*

*Adipis differē-  
tia.*

*Cera elota est  
emplastica.*

*Astringentiū  
natura.  
Acidiora natū-  
rata.  
Fructuum sapo-  
res.*

nuperenati, acerbis sicci sunt cōstitūtia: progres-  
su verō tēporis, lauiuidiores reddunt, acquirūtq;  
ad acerbitatem, aciditatē quamdam exue-  
rent sensim, postea dum perficiuntur ac mature-  
scent, dulces evadūt. Sunt qui nō in arboribus,  
sed posteaquā repofiri aliquandū fuerint, dul-  
cedinem indispicantur. Alij nō interveniēte aci-  
ditate, paulatim in dulcedinē transeunt. Omnes  
thi coquantur & maturefcunt calido: quod qui-  
dem duplex existit: alterū nempe & propriū, &  
cuius ingentium: alterum externum, à sole vide-  
licet, sed naturæ ipsorū conveniens & familiare.  
Si igitur quā initio acerbis essent, tēpore matu-  
rescentes dulcescent, sequitur ex calore ipsi p-  
venire dulcedinē: acerbitate verō acidaritatemq;  
ex frigore. Ad hæc etiam, initio quidem lignosi  
quid sint, nec non siccis & acerbis, postea verō hu-  
more adveniente reddantur calidi, palam est, sa-  
porem acerbū acido magis tetrumū existere.

Fructuum disti-  
rentia.

Fructus omnes  
coquantur, &  
maturefcunt ca-  
lido.  
Calidū duplex

Acerbus sapor  
acido magis ter-  
renus existit.

Acerbus sapor  
est frigidus.

Acerbi et acidi  
saporis distin-  
ctio.

Astringens om-  
ne ex quibus af-  
fi frigidum.

Dulcium est  
nullū frigidū.  
Amara omnia  
calida.

Acerbū corpus  
emulsi triplici-  
ter.

scens, aut humefcēs, aut vtrūq; simul perpetiēs.  
Si ergo incalcescat duntaxat, solidam dulcedinē  
contrahet, qualis castaneis inest. Sin tantum hu-  
mefcat, si quidem ea crassior sit partium, & a-  
liqua humiditas, austerū evadet: sin verō ætea,  
acrescet. Si pariter humefcat & calfiat, humidita-  
te quidē aqua, in dulcedinem: ætea verō tran-  
sibit in pinguedinē. Ac sane secundum propor-  
tionem qualitātū mixturas, varias fructus mu-  
tationes sortiunt. Exterium acerbū ad extremū  
perseverat fructus illicis, arbuti, sagi, & corni. A-  
cerbus simul & dulcis, myrti fructus est, piri a-  
grestis, & roboris. Austerus vñ & dulcis palma-  
rū fructus. Pinguis exactē, tū fructus, tū succus  
oleæ.

## CAPVT VII.

Quicunq; ergo fructus oleosū duntaxat sunt, e-  
dendo nō sunt, & dulces. Quib; verō altera scen-  
tibus amaror advenit, si edi non possunt. Quippe  
amarum omne edi nequit: talēq; efficitur à calo-  
ris excessu. Verū dulce omne calidū est, nec im-  
modicē calorē nostrum exsuperat, sed inter limi-  
tes se continet fundentis, lauiuidantis, mollioris,  
Qui autem quidam sint quæ vna, quædā quæ  
duabus in se qualitatibus & agunt & patiunt,  
quædā verō etiam totis substantiis sunt: in horū  
certē numero medicamēta non pauca ponuntur,  
sicut & nutrimenta vniuersa: quorū duplex est ge-  
nūs. Siquidē quædam sunt pinguis, vt ipsa pin-  
guedo: quædam dulcia, magis minūse, vt om-  
nia illa quibus nutriment.

## CAPVT IX.

Est tamen & pingue ipsū, & quicquid nutri-  
tis, dulce. Nam quō nutritio evacuati repleto  
sit: quod evacuatum autem est, familiare & beni-  
gnū esse: certē etiam id qd nutrit, familiare, iu-  
cundum, & amicum sit: esse necesse: ac proinde cali-  
dum modicē, respectu illius qd nutritur. Sed in  
hoc non parua est maioris minorisq; ratio: quā-  
doquidem nec ad cibos accedimus exactē secun-  
dum naturam affecti. Corpus siquidem eorum  
qui cibos appetunt, sit duntaxat inaniū oportet,  
si absolum suari sint familiaris ipso rum qua-  
litate cognitores. Nā si præter id calidiores qd  
veniat, aut frigidosiores evaserint, non solum quæ  
nutriant, verum etiam quæ refrigerent aut calfa-  
ciāt, postulabunt. Quocirca cibū quom illis aliis  
aliq iucundiores vidētur. Nam quum duplex sit  
genere iucundū: alterum quod impleat id quod  
vacuum est, cuiusmodi est nutriti entium: alter-  
um qd medeat uti quod alteratū est, id quod  
medicamentum existit: evenit vt quib; cibis, vbi nō  
modō vacuatis exhibentur corporibus, sed etiam  
qualitate aliqua mutatis, vt duobus nominibus  
delectēt, vt cibi scilicet, & vt medicamēta. Quā-  
obrem nec eduliorū nec medicamentorum vna  
est animantibus, omnibus species: siquidē pro sua  
vnaqueq; familiarī substantiā simul & affectione,  
tū delectant, tum iuvant ab vtriusq; Sed si hæc sic  
habēt, id quod in cibis minus erit dulce, minus  
quorū erit calidū: quod dulcius, tantū nimirum  
erit calidius, quantum videlicet dulcius: sin ad im-  
modicū recidat calorē, nec eiusmodi dulce erit,  
sed iam apparebit amarum.

## CAPVT X.

Etenim vt à moderato calore bifariū cuius cor-  
pori dulcedo pvenit partim enim sunt proprio  
&

Acerbius in  
alio qualiter  
est in eis.

Saporis disti-  
rentia in vari-  
is fructibus.

Fructuum qui  
nam sunt vna,  
et qui omnes,  
amara ab aliis  
genus.  
Dulcia a pingui  
natura.

Nutrimenta  
duplex gene-  
ra.

Nutrimenta  
omnes qd dicit  
Natura quib;

Nutrimenta esse  
inducuntur ca-  
lida.

Inaniū esse  
duplex gene-  
ra.

Dulcedo à mo-  
derato calore  
provenit.

Et infuso calore dulcia, partim vero ascitio: ad eundem modum amara. Alia nam sunt, quæ suæ pænatura exaltantur: alia autem id accidit ab æquissimo calore accensio. Porro dulcia ois proximè accedunt ad naturam eorum quibus apparet dulcia: idque aut proprio calore, ut mel: aut æquissimo, ut sunt omnia quæ ab igne præparantur. At maistum non suo modo, sed etiam ascitio calore dulce esse videtur. Siquidem haud parum veluti ardoris ex solari calore est acinis, tñ aliis inest fructibus, à quo id quod illis aquè ac veluti semicoctum inest, ad concoctionem ducitur.

Nam ex quibuslibet pomis, si succum exprimas, cum pronnis non secus atque multum feruere deprehendes: tanto tamen feracioris discrimine, quanta erit vinus fructus ab alio in calore diuerfitas. Ceterum ubi quod semicoctum erat, transmutatum iam fuerit, evanueritque exibat foris uore calor, iam tum denique synceræ succorum præsertates cernunt, proprioque vinorum natura agnoscitur. Iam vero quæ inveterant vina omnia calidiora redduntur: ac primum quidem quando dulcedinem acrimoniamque asciscunt: quæ vero prius inerat illis astringitio, austeritasque, tempore ipsam deponunt. Dein rursus acrimonia interfecta, dulcedinem in dies abicitur, paulatimque amarescunt. Vnde constat, dulce esse calidius austro, sicvi & dulcia amara. Atqui si verum est dulcedinem provenire à moderatione caloris, patet astringentiam à frigido vincente perfici.

## CAPVT XL

Vt igitur vinum acerbum, tempore dulcius primum, mox acrius amarumque, vltimò vero planè amarum naturaliter redditur: ad eundem modum quod veluti rigorem præter naturam perpeffum est, pronius acidius efficitur: ac si prius refrigeretur, accitit penitus. Propterea quod in vindemia ipsa per assiduum pluvium, aliena humiditate fuerit imbutum, leui occasione accitit. Cetera vero accidit iis quæ talia quum sint, igni admoventur: nam & pronius, & ægressu temporis dulciora reddunt: randoque si perduraverint, alius similiter amarescunt. Quum itaque omniplax fit acida, vna vero dulcis, ac fructibus omnibus maturatio non à solari calore provenit, planum est, imperfectissimè & frigidius esse quod acidius: perfectius vero & calidius, quod dulce fuerit. Ceterum diuerfis vinibus acetum atque succos omniplacis constitunt. Nam acetum proprio quidem vini calore, est frigidum: ascitio autem, contractioque ex putredine, calidum. Aromphiacis succus calorem non habet, ac proinde nec acrimoniam. Præterea omniplacis succo acetum tenuius est. Quamobrem frigiditas quæ ab aceto infigitur, excelsam eam quæ procedit à succo omniplacis, idque & vehementi, & minime.

Nam tamen si succo omniplacis ne minima quidè caliditas inest, aceto autem acrimoniam quædam exaltantem: hæc tamen fans non est, ad superandam ab aciditate provenientem frigiditatem: sed potius veluti iterum viam, atque aperientem, alius celeritatem promouet. Caliditas quædam quæ à precedente aceti acrimoniam oritur, pronius à frigore insequens aciditatem exnngitur, ita ut multo maior ex aceto frigiditas percipiatur. Ad hæc autem, si pari mole aceti mellis permiscere, aceti frigiditas superabit mellis caliditatem:

edque magis, quo fuerit maior aceti copia. Quod si multo plus mellis quam aceti indideris, patet calorem atque frigiditatem in ea mixtura competere. Siquidem multis numeris acetum plus ab iis quæ moderate sunt calida, ad frigiditatem recessit, quam ad caliditatem. Porro omniplacis succus, quæ ipse (ut omnes fructus in primo sortu) est acerbior, ad ardentiam hypochondria longe præstentior est, quam acetum: quod nec violentiam, nec ferientem, nec mordaci calori iunctam frigiditatem sortitur.

## CAPVT XLII.

Porro quod vinum quoddam invalida Vere atqueestate accescant: quodque vehementius mota; in meridianis locis reposita, idem etiam panantur: cetera vero hyeme atque versus æquilonem defossa, intergra & secundum suas vires feruunt: nonnulli à calore nasci aciditatem existimant. Scit autem si falsum esse deprehendunt, vbi videmus non calida & vetera vina, sed quæ principio sunt frigidiora, sic per calorem accescere.

## CAPVT XLIII.

Per simile autem quid vinis accidit, quæ natura frigidiora aquosioraque sunt, quædè flammæ exiguis & imbecillis. Quippe si eas ad feruidum solis exponas, prius obfcurari, aut etiam extingui conspicies. Quod si valido etiam flammæ concutias infirmis ac parvis flammis, citius illa extingueris: quæ inanis. Natura enim infirma, validè nec motum nec calorem sustinet. Cetera multum in locis foriora vina ex industria commouent & manpiorant, necnon soli exponunt, & calfaciunt, ac deindeque ad meridiè obvertunt cellas, ut citius sicca turescant, & potui idonea evadant. Nam quod multo tempore alius, hoc iis quæ sic exaltata sunt, breuissimo accidit. Quænammodum igitur exercitia valida & sol, calida & robusta corpora, etiam validiora efficiunt: prosterunt autem, digerunt, & refrigerant quæ non sunt eiusmodi: sic vina natura calida, motus veluti venalis, sol exaltantem, flammæque iuxta ardentem, celerius concoquunt: quæ vero frigidiora & aquosiora existunt, eorum arguit omnia id genus imbecillitatem, celeritatemque perpeti cogit, quæ alioqui post passura essent: quæ nimirum res quælibet in propria natura feruet: calorem proprio: corruptatur autem ab immoderatione extrinseca, non minus caloris, quam frigiditatis.

## CAPVT XLIII.

In viniferum autem aciditas nasci calore quidè mutante, non aut vincente siue alimentum, siue medicamentum: quemadmodum videre est in acidis rusticis, qui à semio cibus omniuntur. Quod autem opus sit calore alterante, arguunt sunt lac, & pisanus succus, quæ tempore æstivo citius accunt quam hyeme. Quum enim saporis res acidi sint essentis simili tenues, & frigide, quædammodum contristano borealis, nasci ceteri sine calore non possunt, sicvi nec ille ipse acris: pum de licet frigidis sint omnes saporis acidi, nullum ramed eorum quæ extreme refrigerantur enecat, acidum est. Exploranda porro acidi saporis natura est in oxalide & oxylapatho, ut in quibus reperitur maxime syncerus & simplex. Et enim quod propriè in saporibus appellatur acidum, à sola lingua percipi potest, sicvi & acre: ceterum quod vtrique est commune, nempe mordacitas, etiam à tactu fen-

X. x. in

VITIS VINIFERA

Acetum magis refrigerat quàm calfaciat. Fructus omnes in primo sortu esse acerbos.

Acetum magis refrigerat quàm calfaciat. Fructus omnes in primo sortu esse acerbos.

Flammæ exiguis & imbecillis. Quippe si eas ad feruidum solis exponas, prius obfcurari, aut etiam extingui conspicies.

Infirma natura non validè nec motum nec calorem sustinet.

Vina calida à quibus concoquantur calorem.

Calore proprio fermentatur similia, corruptur extrinseca. Aciditas vinis acris.

Acidi saporis sunt effusius in oxalide & oxylapatho reperitur.

Acidum saporis feruor in oxalide & oxylapatho reperitur.

Dulcia pronius accitit ad naturam eorum quibus talia videntur.

Succum quilibet per pressuram, ut muscæ.

Vina natura calidiora.

Dulce est calidius austro. Amara esse calidius dulci. Astringit à frigido oritur.

Vina igni acrimonia, dulciora reddunt.

Maturatio fructibus omnibus provenit à solari calore.

Acetis facilius.

Omniphiacis et acetum in quibus differant.

Generaciones  
omnium corpo-  
rum ex quatuor  
elementis consti-  
tuuntur.

titur. Porro ex quatuor elementis impari multura  
coiunctibus, particulam omnium corporum con-  
stant generationes. Ex ea autem imparitate per-  
ficiuntur proprietates corporum particularium.  
Quippe ex elementorum iniqua multura, plan-  
tarum: ex plantis autem, animalium proprietates  
oriuntur. Ac transiunt sane quaedam pronius in  
se mutuo: nonnulla medianibus aliis. vcluti ter-  
ra in triticum, hordeum, & alia id genus: rursum  
horum singula in carnem humanam: quam tam-  
en ipsa terra caro vt fiat sit impossibile, transi-  
liendo eam quae in medio est mutatione. At eor-  
um quae in sese mutuo transiunt, quaedam cele-  
rem, quaedam diuturnam alterationem obnunt. Ve-  
rum quae maximae sunt inter se similia, celerem  
dissimiliora, tardiorum. Lingua igitur exactissimam  
no sensu praedita, oes qualitates diuulcat, nec  
non familiaria & similia, ab his quae sunt contra-  
ria discernit. Cuius vsus gratia in hanc solam par-  
ticulam complures nervi inferuntur: quoniam in alia-  
rum singulas inferatur aut vnus tantum, aut al-  
ter, necis magnitudine insignis. Quum igitur  
quaedam naturae nostrae magis sint familiaria, quae  
minus: atque haec quidem temperamento huic, illa aut  
illius necessarii plures qualitates ipsius gustus exi-  
stunt. Ceterum omnium quae nutriunt communis  
dulcedo est: quandoquidem quicquid nutrit, ne-  
cessario plus aut minus sit dulce oportet. Quae  
vero non nutriunt, ea aut non dulcia, aut falsa esse,  
est dicendum. At vero id quod cuius rerum fami-  
liare est, vni est: nam & natura eius est vna: quae  
autem aliena, complura, partim plus, partim mi-  
nus a substantia eius dissidentia. Porro quae dul-  
cia simul & acerbica sunt, ea crassioris essentiae  
sunt, & temperaturae frigidae. Quae acida simul &  
dulcia, tenuiora sunt quam acerbica, refrigerantia  
& ipsa. At amara, calida sunt: sed acra lusa calidi-  
ora. Nutriunt ergo haec omnia, si vnicuique habeant  
dulcedinem. Per se autem nullum dicitur nutriri,  
quorum saporum multiones minime quidem  
sunt subito: sed in alteratione consistunt. Nam his  
quae a natura mutant, sensum sunt alterationes.  
Sicvni igitur quod est summe amarum, aptum est  
est: quod vero exquisitum amarum, ineptum est: quia  
quae in medio sunt eorum, nutriunt quidem, ve-  
rum minus quam dulce. Eadem ratio est in ceteris  
qualitatibus: siquidem praeter dulcem, nulla nu-  
trire potest. At elementa multo sane etiam minus  
nutriunt, nullamque gustus qualitatem offerunt.

## CAPVT XV.

Sed quemadmodum edulia quae nutriendae  
naturae quam simillima sunt, ea & dulcedine pre-  
se ferunt, nec vllam preparationem requirunt: sic  
quae temperaturam naturae sunt remotiorum, alia  
condimentis, alia coctione, alia vtroque indigent.  
Etenim condimenta, quae ex se edendo non sunt,  
suauitatem tamen his quae per ipsa preparantur,  
consiliant, quod illa reducant ad medium. Appa-  
ret etiam natura calidi, quibus admodum fuerit, ea  
celeriter alterare, atque in aliam mutare speciem. Quae  
dam tamen suauiora, quaedam insuauiora igni ap-  
plicata redduntur: sicvni & quaedam longo tem-  
pore, quaedam minime, vt coquantur, indigent. Ete-  
nim quae nutriendorum corporum temperaturae  
similia sunt, ea vel circa coctionem, aut prepa-  
rationem, iam dulcia apparent. Quae vero dissim-

ilia existunt, omnia infusa sunt, antequam prepa-  
rentur. Atque ea quidem quae nimis calida sunt, fri-  
gido corrigi debent: quae vero impense frigida, ea  
lidorum multura obfusiorum, & igni. Ad eundem  
modum humiditate, quae terrea sunt & sicca: sicci-  
tate, quae humidiora sunt quam expediat. Maxi-  
mam eorum quae dicta sunt, faciet fidem, quae in  
ore sit transmutata. Nam qui pluvialium fustione  
sunt ieiunium, ius salua salsa reddi: qui vero pla-  
rimam, amara. Sic etiam vniuersum corpus bilio-  
sum reddit. Est autem ipsa staua bilis amara: atra au-  
tem, acida: sanguis qui secundum naturam est, dul-  
cissimus. At purita linguam contingens, nunc  
dulcia, nunc acida, nunc insalva videtur.

## CAPVT XVI.

Nihil igitur mirum, nec cur rem omnium dul-  
cissimum mel, succo generet amarisimum: nec cur  
similium astate florentibus & calidis natura, &  
sequebentibus accidat. Nam vt foris quum pluuia  
longe igne admodum amara efficitur, ad eundem  
modum in animalium corporibus, vbi sincerum  
validissimum calorem fuerit, biliosum suc-  
cum procreat. At in temperaturis & astrictis, fri-  
gidioribus, facile in moderatum sanguinem ver-  
titur. Nec vero ab alieno tantum calore, sed a suo  
etiam proprio, mel amarum temporis spacio reddit.  
Porro lac, etiam si gustu sit dulce, ex se tamen nu-  
quam amarum efficitur. Vincitur, n. in eo calidi-  
tas & frigidiore, ac proinde acescit positis. Con-  
stat autem ex tribus substantiis, qualitate diuersis:  
prima quidem crassius, quae calens cohsistit: se-  
cunda pinguis, ex qua butyrum: tertia aqua, quae  
nominatim serum. Ex quibus pinguis quidem,  
maxime temperata est: crassa vero, paululum ab ea  
declinat: excrementum autem illud serosum, fri-  
gidum est & humidum. Si igitur gustari lac pos-  
set, vbi in ventre & per venas coactum est, ipso  
melle dulcius inueniret. Nam quod fons & ex  
se se mel obnunt, id dum coquiritur lac accipit. Et  
verum quod amarum ingens calor in animalium exi-  
tent, tantam acquirit lac dulcedinem, quantum  
deperdit mel. Recte igitur ratione evenit. Etenim  
quod summe dulce est, ac proinde nihil appo-  
ni ad eius dulcedinem potest, id vt in obsequentem  
verum pergat qualitate est necesse. At qui quid  
deest, id per concoctionem acquirit. Verum lac  
vbi cruditate in ventre perperit, in frigidiori  
quod acescit, in calidioris nidorosum amarum effi-  
citur: nunquam autem inter coquendum mel aciditate  
contrahit. Porro vtraque, tum quod acidum est,  
tum quod amarum, linguam mordacit. Cete-  
rum mordacitas ipsa, a tactu proprio, non a gu-  
stu sentit: tribusque istis saporibus, acido, amaro,  
& acro, est mordacium commune: verum acido  
quidem, vt frigidum simul atque subtilis: amaro vero  
& acro, vt calidus.

## CAPVT XVII.

Quod sapor acer sit calidus, non est cur in de-  
monstrando sim anxius: quandoquidem id nemo  
a dubio & euidentia sensus, demonstrationis si-  
dem praeremittit. Porro quae ex acro, idonea sunt  
esui, dulcem quandam, etiam obsecram, necessariam  
habet qualitate admixtam. Proinde multum ipso-  
rum, ob punctionem vniuersum: multum vero vt condimen-  
tis tantum: at vt cibo, ipsorum omnino nullo, idque  
ob vitium vehementiam. Eorum autem quae non  
eduntur,

Alimenta inter  
perata quomodo  
corrigenda.

Homonum quae  
in corpore sunt  
saporum.

Mel quibus de  
bilis vertitur.

Mel pluvialium  
ignis admixtum,  
amarum.

Mel temperis  
spacio amari-  
ficat.

Lac ex tribus  
substantiis con-  
stat.

Lac incitum in  
ventre coactum  
calore, seu  
tam dulcedine  
contrahit quod  
est amara mel.

Lac quomodo  
in alium qua-  
litatem mutatur.

Mordacitas aci-  
di, amari, & acro  
saporis est  
mixta.

Acer sapor est  
calidus.

Amara esculentia  
necessaria ha-  
bent admixtam  
dulcedinem.

Similium fami-  
liarum esse trahi-  
torem se in in-  
ven-  
am.

Lingua facili-  
ter,

Linguae cur plu-  
res nervi inferan-  
tur.

Dulcedo est om-  
nium omnium  
quae nutriunt.

Familiaria cuius-  
que esse vniuersi  
alimenti autem,  
plura.

Aria amari-  
calidiora.

Elementa nec  
nutriunt, nec vi-  
lem gustus qua-  
litatem offerunt.

Condimentorum  
vna.

ariorum medi-  
camentorum diffi-  
cultas.

eduntur, alia mortifera sunt, alia simpliciter me-  
dicamenta: oīa tamen cum nostris imposita, ce-  
lesteriter vicijs moliantur. Sunt & quæ negitare  
quidem audeas, cuiusmodi sunt citharides, tha-  
psia, & ea quæ erosione aut putrefactione interi-  
munt. Multa verò etiā ipso statim odore pugna-  
riam cum homine indicit: velvñ & hæc ipsa quæ  
nunc dicimus, & ex summe refrigerantibus, ac-  
tæ, papaveris, mandragoræ, lycopterij, & hyo-  
scyami succus. Terminis autē sue finis saporis  
amari, est abstergere: actis verò, viree: at dulces,  
nutrire: vbi in sua q̄q̄ natura absolutus fuerit,  
hoc est, minime aliena qualitatibus confuscat.  
Porro quod in ykteribus nan sunt præstare ama-  
ri saporis, id ipsam assumpti in corpus efficiunt.

Amari saporis  
facilitas.

Amara quibus  
morbus curantur.

Abstergunt quippe & expurgant, quæ in vñ  
est crassitudo incidunt. Quamobrem meīsa mo-  
uent, educēdōq̄ ex peccore & pulmone puri au-  
xiliantur: communēq̄ etiam competunt morbo,  
si modo naturā deleteriā non habent. Ita tamē  
qui sanguinem expulsi, sunt noxi. Aristolochia  
autem, uti, & panax, adeo amara sunt, vt proxi-  
mē ad saporem acrem pertingūt: nob̄ idē nec ab-  
sterget tantum, sed etiam exedant & mordicent.  
Staphis agria etiā, nihil ab istis amaritudine vin-  
citur, citiq̄ iam adeo & actia & calida, vt non mo-  
do fordem vlcerebus auferat, sed ipsam etiā car-  
nem colliquet.

## CAPVT XVIIII.

Acritum saporis  
facilitas.

Igitur saporis acres, primum exacte esse cali-  
dos dicimus: dein exedētes, vrētes, crustam mo-  
llescentes, & colligantes, si vel ipsi cuti imponan-  
tur. Nam intra corpus assumpti, si quidem tota  
substantia animanti aduerferit, ipsum putrefa-  
cientes corrumpunt: sin verò calor in modera-  
tione duntaxat, si crasse sint essentia atq̄ terre,  
interna exulcerant: sin tenuia, vñnam atq̄ su-  
dore promouēt, in summūq̄ incidendi & digerēdi  
in halitū obnunt facultatē. Ex quo genere quid-  
am tum expunctionibus ex rhorace, tum mensū-  
monibus auxiliantur. Nec verd sola velenēti ca-  
litate ad amarissimos acres saporis differunt: sed q̄  
amari omnes non modo calidam habeant facul-  
tatem, sed etiā siccam & fuliginis asumilem: nimirum  
a dulcibus exaltatis & exaccata sua susci-  
pientes generant: oīes acres autem, quicunq̄ ama-  
ri non sunt, admissi nullam humiditatem fortian-  
tur: quo fit, vt eiusmodi corporum a nobis non  
pauci essentent. Ceterum astrigentib. medica-  
mentis non parum tenuiora sunt: medicamenta  
amara: acribus verò, crassiora. Quare nec facile  
crassos viscidōsq̄ humores p̄transcūt, vclvñ ea  
q̄ tenuiori essentia sunt prædita: nec ad inciden-  
dam inepta sunt, perinde vt crassiora. In medio  
siquidē sit vñviusq̄ excessus oportet, quæ incisu-  
ta sunt. At verò ferro lapidig ignito, ea quæ per  
erosionē interrimunt medicamenta similia sunt:  
quæ corpora nimis calore huc perducuntur:  
velvñ chalcitis, misy, sori, arsenici, hydragyros,  
lichargyros, & alia innumera. Crassarum enim

Acritum saporis  
facilitas ab a-  
maro differt.

50 sunt parui id genus omnia, & potestate calida:  
proindeq̄ temporis spacio accensa, per eam quæ  
ab animante proficiscitur mutationē, non aliter  
quā lapis ferrugis ignitur, ventrē tum exul-  
cerant, tum exvunt: quō scilicet in corpus distri-  
bui præ gravitate nō possunt. Hæc tamē tenuiora

Incisiva qua-  
lia esse debent.  
Eroditiva me-  
dicamenta fer-  
re esse ignita si-  
milia.  
Eroditiva spe-  
cies vñ.

sunt, calx, cantharis, lepus marinus: necnō aristolochia, & ins: quæ quidē hæc vltima duo, & ma-  
gia sunt illis actia, minimeq̄ deleteria existunt.  
Cantharis autē modice sumpta, quibuscūq̄ opor-  
tet admittit, nō modo nihil offendit vetustati, sed  
renes etiam expurgat.

Cantharis cum  
medicamentis  
expurgat renes

## CAPVT XIX.

Quod itaq̄ amarus sapor siccis temperie cor-  
poribus insit, hunc colligere est, quod & minime  
omnibus amara putrescant, minimeq̄ cum ver-  
mea, tum animalcula illa, quæ in radicibus, her-  
biscis & fructibus putrescentibus oriri solent, pro-  
ducant. Maxime namq̄ videmus in humidis na-  
sco corporib. vermes ac putrilagū. Quamobrem  
quæ exacte amara sunt, animalibus propemodum  
vniuersis sunt elui inepta: quō vñmū animal  
omne sit humidum. Porro abstinium non  
solum amari est, sed astringit: marina verò aqua,  
falsa potius est, quā amara. At aqua quæ est in  
lacu Syrtæ Palæstræ, quoniam alij vocit hæræ mor-  
tum, alij stagnum berumiosum, alij demq̄ So-  
domenum, gustantibus nō falsa modō, sed ama-  
ra videtur: citq̄ adeo grauis & corpulenta, res-  
pectu aliarum, vt ne si coneris quidem insulens, in  
ipsum domus deferri possit. Inest enim ei salis sub-  
stantia admodum grauis & terrea: ac prouide tā-  
rō est aqua quæ in eo lacu est, marina grauior,  
quantō marina suauis. Poteris autē ipse aquam  
marinā efficere, colligatam sale in aqua fluuiali:  
cognoscetq̄ simul quantō grauior reddatur a-  
qua eiusmodi, quā sit dulcis. Quin & modum  
tam inmodum moderatū ad saluendū conficiē-  
di salugine, si in ea oīū nature videatur. Quod si  
decoquere saluginem ipsam velis, pronus  
amarior reddetur. Nam quicquid salum piscium  
hum exallescens, amarum evadet. Ergo in eo Sy-  
rtæ lacu, quod mirum aqua quæ in eo est ama-  
ricet, nullum neq̄ animal, neq̄ planta inesse con-  
spicitur. Imō quō duo in eum longe maximi flu-  
uij confluunt, pisciumq̄ copia scatentes, præcipue  
qui prope litchontē fluit, quem Iordanem ap-  
pellant, nullus omnino piscium fluuiorum olita  
excedit: & si caprea quæ in lacum iniicit, celeriter  
eos mori cōspicit: adeo est omnibus tum ho-  
minibus, tum plantis aduersum, quod amarum  
existit. Omni autem salū obicūra quædam astrin-  
gendi via inest, quæ eas quæ conduntur carnes  
constringit ac densat, porissimum vbi durus, &  
minime fragilis fuerit. Talis est exactissimus q̄-  
dem fossilis: ferē omnis: minus autem illo, mari-  
nus: tum q̄ multæ in loca aqua leuiter salia a-  
rescentibus provehit, tertium locum obtrinet, ab-  
stergere magis quā astringere cōtrahereq̄ po-  
tens, proximis hæc vires Sodomiticis habet, æ-  
quæ atq̄ marinis duras.

## CAPVT XX.

Propinquus est sapor salis amaro, quum ter-  
reni sint ambo, & calidum obicūra tamē diuer-  
sitate distendit: quod videlicet amarus a calore a-  
rido magis sit extenuatus, & elaboratus. Sic in  
genere salis, q̄ durior, densior, atq̄ terrestrior est,  
qualia ferē est vniuersis foetilia, minus existit ca-  
lida, subtiliusq̄ minus partitū: quod iumpi fa-  
cilis, laxiusq̄, tenuior simul atq̄ calidior est: in q̄  
genere & subamarus consistit, mediā naturā in-  
ter salum durum & aphronitū obtinens. At verò

Amara minime  
omnibus po-  
tuerunt.

Amara tunc an-  
imalibus vni-  
uersis sunt elui  
inepta.  
Animal omne  
est humidum:  
marina tunc  
aqua calidior  
est.

Salugine non  
esse ad salu-  
dam oporem,  
cum eam in  
lacu videatur.

Salis amari-  
tate amplius  
exaltata.  
Mare mortuū,  
ut nec plantæ  
nec animal vñ  
iam alit.

Amara esse ho-  
minibus atq̄  
plantis aduer-  
sa.  
Salis vñm  
differt.

Salis q̄ amari-  
saporis depen-  
det.  
Salis densior.



spuma niri omniū est iam dictōrū tenuissima: velvī & Aliq petriſore, qui aphronitro tamē minus est calidus: quare hic creſcētis caeniū mi nori cruciatu colligitur. Mordicat verō eas niri ſos ſue ſpuma: mordicat etiā tum aphronitru, tum nitru. Ceterū quę ſunt craſſa eſſentia, plus ro dunt, vbi quendam fuerint calorem naſcia.

## CAPVT XXI.

Odores pleriq;  
ſimiliter ſaporib;  
bus non afficiūtur.

Pleriq; odores ſimiliter ſaporib. nos afficiūtur. Siquidē acida omnia, & præcipue acetum, ſimili ter odoratū gūſtūq; mouet. Tum acris quoq; velvī alia, capræ, & ipſa nō minus quā gūſtū, odoratū offendunt, mordicantq;. Itaq; nonnul lorum corporum, etiā nō gūſtantes, qualitatē cognoscimus, velvī ſimil. pinde ne gūſtare qui dem aggredimur, quōd maxima fides odoratui habeat. Quinetiā ſi qua boni odoris edulia pu trilagine corrupta, odore nos ſuo offendant, ne gūſtare quidē illa dignamur: ſerēq; in omnibus mutuo cōſentiūt odoratus & gūſtus. Attramē in odore ſuauiffimis, velvī roſa, plurimū ſanē diſ ſident. Tantiū. n. aliēſt vt gūſtantes ſuauiā ſint, vt amaritudinē non vulgare exalibeant. Tameſi quod amarum eſt, nunquā ſit odoratum. Si qui dem generatio amari ſaporis ex dulcibus pro ſeiciſcitur a calore extenuante: ac proinde amara ca lidiora ſimul & tenuiora ſunt dulcib. Porro ſen ſus odorū in cerebri collocatur ventriculis an terioribus: odorabiliumq; vaporofa eſt ſubſtan tia. Ea quippe quæ a corporibus deſcunt, aëri ambiēti permixta, in cerebriq; per narium in ſpirationē delata, ſenſum mouēt. Recta ergo ra tione odorata omnia, eadem & calida ſunt qua dantenus, quum vaporum copia a calore excite tur. At non quicquid odoratum eſt, ſuaue conti nuō erit: ſiquidem non omne id ſpīritui conten to in vetriculis cerebri, familiare exiſtit. Iam vērō in beneolentia & graueolentia odorabilium pleriq; reduciunt, appellētis beneolentia qui dem proportionē quādā ad ea quę linguae ſunt dulcia: graueolentia autem, ad ea quę omnino inſuauiā. Ceterū ab iis quę exactē tum falſa, tum acerbā ſunt, aut nihil, aut omtuno parum vaporis deſcunt.

## CAPVT. XXII.

Odor nō perma det vt ſapor ſen ſibilium tempo ris indicat.

Itaq; haud ſolida res eſt, ex odore de ſenſibiliū temperatura conſicere, perinde vt gūſtu: nimirū ob ſubſtantiarū inæqualitatem & differentiam. Etenim quę odore carent, craſſam quidem eſſen tiam obhænet: cæterum quę ſit eorum in calore & frigore cōſtitutio, id non dum conſtat. At quę odorata ſunt, tenuia vtiq; ſunt quadātenus cali dia. Porro quā in roſe ſucco: præter ipſius roſe corpus durum terreūq; tria excrementa inue niantur: vnum craſſum, quale eſt in vinis ſp̄: al terum aërium, quod vini ſori reſpōdet: tertium aqueum, quod in omnibus bullitionem cor ruptionēq; molitur: certē gūſtus id genus omnia diiudicat. Siquidem roſam gūſtibus aliud qui dem acerbum eſt: id quod terreum vt ſit, & craſ ſum & frigidū, eſt neceſſe: aliud verō amatum, quod tenue eſt & calidum: tertiu deniq; aqueū, neceſſariū quidem frigidū, ſed in tenuitatē craſ ſitudiniſq; oppoſitione, quod modo extremorū, quorum vires exoluit, medium. Hæc itaq; omnia de ſucco roſe per gūſtū ipſum diſcernas:

Roſa inſeſſe ex crementis tria.

Roſa perſitum ex aërio.

at per odorē, haud æque: quum nō perinde om nes eius partes evaporēt, nec pinde ſenſum mo uet. Multo minus ex coloribus de vinibus me dicamentorum licet ratio cinari: quum in colori bus ſingulis, calida, frigida, humida & ſicca repe rias. In particularibus autem ſeminum, radicū, aut ſuccorū generibus, aliquam ex coloribus li cet ſumere indicationē. Vt ſi dicas, capræ, ſcellam, vinum, quādo fuerint albidiora, tantō & minus calida: quæ verō ſubſtāia ſuauiaq; calidiora. Idē vſu venit tritico, milio, ochris, phaeſis, ciceri, i reos radicē, aſphodeliq; & aliis compluribus. In quog; enī genere in vniuerſum ſuauia, ſuauior, vir brāq; omnia, albis ſunt calidiora. Itaq; eſt linē quog; coniectura fieri queat, opium tamen fuerit per experientiā diſcretam facultates inuen ire medicamentorum. Siquidē in hac ſali non poſſit: licet prius quā experientiā virtutem ag noſcas, gūſtus pleriq; indicet, pauculum etiā approbate ipſo odore.

GALENI PERGAMENTI  
de ſimplicium medicamentorum ſacul  
tibus, lib. V.

Sunt ergo (quatenus diſtum eſt) qualitates primæ, caliditas, frigiditas, humiditas, atq; ſiccitas. Quæ verō ab illis denominant cor pora, ea ſunt tum cōmūia omniū elemēta: tum ea quę per harum excellentiam, calida, aut frigi da, aut ſicca, aut humida nuncupantur: tum ea quæ ad cōueniens ſue ſymmetriū generis eſſe dem, aut ſpeciei conſeruantur: quęq; ad quidiſ obuium. Diximus præterea nutrimentum vinci ab eo quod nutritur: medicamentū autem vince re ac ſuperare alteratq; corpus cuius fuerit me dicamentū: idq; aut vna qualitate, aut coninga tis duabus, aut vniuerſa ſubſtantia, vt complura letalium medicamentorum, nec pauca etiā a mulietorum: tum purgāia omnia, & plerq; eo rum quę attrahentia vocantur. Quæ verō vna duabusq; qualitatibus in vniuerſum noſtrū cor pus agūt, ea hoc in libro exponemus, hinc ſum pra hypotheſi, quod ſimplicium medicamentorū plerq; diſſimilium ſunt partium, rēq; ve ra cōpoſita, tametiā appellenſur ſimplicia, quōd cuiuſmodi ſint, talia natura ſint, nec quicquam ex noſtra induſtria aſſumpſerint.

## CAPVT. I.

Medicamentis frequēter vniſ homines, tum ob alterationē q̄ qualitatibus primis moluitur, dum videlicet calida ciſit, refrigerant, humectant, & ſiccant: tum ob eam quæ a ſecundis proſifici tar qualitatibus: quarum nimirum ratione, alia emollientia dicuntur, alia tendentia, alia laxan tia, atq; alia deniq; aliter nominantur. Siquidem quā particulatim vnumquodq; medicamentorū non pari modo ex illis primis qualitatibus ſoam temperaturā acceptit, inde ſit, vt hoc quidē ex iis vim laxādi, tendendi illud, aliud alia facultatem ſortiarur. De quibus ſanē ſue ſecundis, ſue ternis facultatibus, agere in hoc quinto cōmentario eſt animus. Porro ad ſimplices intē peries facileſq; affectus pellēdos, ſp̄e natura du ce pleriq; idiotiarum ipſa remedia inueniunt. At phlegmōnes, ſcīrri, eczēmati, eryſipelatiſque, nullus ex illis ſibi remediū ducit pervertendū: tanquam

Calore ad se dicantur ut res dissimiles pari confici.

Caliditas sunt alba, suauia, suavia, nitroq.

Qualitas prima quæ sunt.

Nutrimentum vinct ab eo quod nutritur. Medicamentum vincit alteratque corpus cuius est medicamentum. Quæque ad quidiſ obuium.

Simplicium medicamentorum plerq; dissimilium sunt partium, reque vera composita, tametiā appellantur simplicia, quod cuiusmodi sint, talia natura sunt.

Medicamentis frequenter vniſ homines.

Medicamentum vinct ab eo quod nutritur. Medicamentum vincit alteratque corpus cuius est medicamentum.



ut & ex familiari materia animantis nature alteratio fiat, & materia ipsa a calore ingenito superetur. Ea verò quæ præter naturam est, & ab alia caliditate mutatio accidit, & ad nihil vile. At media eorum, quæ comitatur suppurationes, ab ingenito quidem calore fit, sed non plane vincente. Præterea nec ex materia prorsus benigna pervagatur, nec etiâ omnino aliena. Itaque quemadmodum naturales alterationes, quæ ab innato calore proveniunt, à simili iuvantur extrinsecus (nam quid acquiri cõcoctiovi ventura conferre novimus, quod si humanum corpus ad morbum unde nonnulli tum quædam tum catelles, per quietem venter imponitur) pari modo & quæ in movendo pure conspiciuntur. Ceterum tale esse debet quod movendo puri adhibetur medicamentum, qualis est in naturæ temperatæ calor humanus. Quare si iusto calidior natura fuerit, in eo corpore, medicamentum quod pus movebit, tunc oportet sit temperato calidius, quod & natura eius temperatam in caliditate exuperat. Quare cuiusvis humilitatem hominis fusi purum est movendo purum medicamentum. Exploranda autem sunt universæ facultates medicamentorum iuxta hominem optimè temperatum: quo quidem proposito canone, quæ movendo sunt pura, calida & humidiora dicimus, quæ illius calidæ & humidæ temperatæ sunt cõsimilia: sicut calidiora multo, quæ tunc duriora emolliunt.

## CAPUT VI.

Initium autem summi induratum affectus ex fluxione viscidæ & crassæ, puris particule portio impacta. Digestio verò per halitum quod in ea fluxione est tenue & subtile, ac deinde quod reliquum est refrigerato, ac veluti cõcreto, vocata sequitur scirrholosis. In qua quidam quoniam si cum frigidity humor tervidat superfluum, idcirco etiam cõpositam eius esse oportet medellæ: ob refrigerationem scilicet exalciaciua poscitur affectus, ob superventam autem humiditatem, vacuata. Quia verò quæ immodec tum calificant, tum siccant, fluxionem ipsam magis impactatæ reddunt, manifestum est sola ea quæ non admodum calificant, quæque non magnopere exiccat (vocant enim talia emollientia) eiusmodi affectus posse sanare.

## CAPUT VII.

Quapropter calida sunt id genus medicamenta, nec admodum siccæ, à pus moventibus eo dissidentia, quod calidiora sunt & sicciora. Illa enim cognata ac similia corporibus nostris caliditatem possident: emollientia verò, licet validiorem habeant, non tantam tamè, ut attractionis violentia deficiant reliquum. Præterea quæ pus movent, humorem qui præfuit in partibus induratis consensu: emollientia autem paulum quidem eia assument. In summa, illa quidè quæntate potius quæ qualitate caloris agunt: quæ verò indurata molliunt, qualitate potius quæ quæntate. Itaque si in parte quæ suppuratione indiget, assidue impositas licet seruire manus, celerrimè suppurationem perficeret. Porro inter emollientia cõnumeratur bdelium, styracis, galbanum, ammoniacum, rhyamiama, medulla tum cervina, tum vitalina, adeps caprinus, taurinus, & quæ eiusdem sunt generis.

## CAPUT VIII.

Quinetiam quod emplasticum esse debeat id genus medicamentum, ut exactè puria generatium

fit, liquidò constat. Nam si substantiam innatam caloris augere, non intendere qualitatè ipsam conveniat, poros corporis obstrui est necesse, quod videlicet halitusque transpiratus includat. Siquidem ea cataplasmata quæ aut de tergentia, aut validius exalciaciua halitus diffusi permittunt, excocant quidè, sed pus non movet. Talis est hordeacea, cicuta, feniç greci, fabacearum farina: amplius enim strina, eruna, panici, lupinorum, milii, omniumque similiter excocantur. Per de tergentia quippe, quod meatus referret, particule caloris evolat: ab immodec autem calificantibus, etiâ nativum caloris substantia minuitur, sed qualitas ipsa intenditur: quod tamen halituosus quidam exuberantissimus spiritus deficeretur, caliditate tamè cõmoderata. Qui quidem qui in pueris copiosissimus sit (quod nimium intellexit Hippocrates, crescentia ducit plurimum habere calidi innati) ortus omnes actiones naturales adauget. Verum nihil prohibet, sanguineam substantiam, similesque aëres, vni cum spiritus, calidum inaudire innatū. Qui spiritus in omnibus animantibus cõtens parvus, licet non vndequaque sui similis, si non sit essentia animæ (ut Stoici quidè existimant) at certe primus eius est instrumentum. Continetur autem in spaciis inanimibus quidam veluti spiritus ipsius materia, etiam mutationem exposcens levisculi, ut spiritus innatus evadat, nihil secus tunc condensens admodum ad naturalia opera: ex quibus vni est quæ in pus fit cõversio, quæ in ipsa quædam etiam perficitur cõcoctio.

Quæ igitur aliquid cõcoquere nobis consilium est, quamplurimum spiritui intrinsecus oportet, non autem discutere: quod faciunt illa quæ nuper commemoravimus. Porro oim ad pus generationem aptissimum est, ex his quidem quæ irrigantur, aqua temperata, aut hydrelæ: cuius verò quæ profundum, oleum temperatū. At ex his quæ ex hydrelæo illinuntur, farina triticea, & panis ipse, quod videlicet modeste est coctus. Nihil quæ plurimum cõtinet, quodammodo siccior est, aptiusque phlegmonia, quæ ægrius cõcoctionem admittit: qui verò minus, his quæ feruere sunt. Et sane quod ex pane cõficiat cataplasma, difficulter coctioni cedentibus phlegmonia idoneus est. Siquidem panis, tum sal, tum fermentum miscet. Quod verò ex triticea farina præparatū est, calidioribus vilius est. Et ipsa enim triticea farina quæ pura est, tum panis quoque qui purus est, puri movendo cõgruenter existit: qui furfur & minus fit calidum, & magis deficit. Farina autem pura, humidior est & calidior: qualia certe ad pus movendum conferunt. Itaque medicamenta quæ phlegmone tentant imponuntur partibus, si calida sunt & humidiora, ad pus movendum cõducunt, vnde adeps suillus & vitulinus. Nam taurinus caprinusque illis acrior existit: quod obrem phlegmonia tum frigidioribus, tum durioribus, magis cõgruit. Est & adeps gallinaceus tum phlegmonia coquenda familiarissimus, magis etiam asperum: quodammodo tamè ad digerendum potenter. At grethium omnium autem melius adeps, multo acrior et siccior est, quàm domesticiorum, maximèque pardalis, atque leonis. Quare horum nulla movendo puri est idoneus. Porro pus movet & pix, & resina: ad feruentes quidem phlegmonas, ex rosaceo: ad frigidiore verò, ex calciaciua aliquo oleo liquat, ut puta cicino, et phanino,

Concoctio quæ ab innato calore ab extrinsecus calido iuvatur.

Pus moventia qualia esse debent.

Pus movens medicamentum, equale habet calorem cum corpore, in quo pus movetur.

Exploranda autem sunt universæ facultates medicamentorum iuxta hominem optimè temperatum: quo quidem proposito canone, quæ movendo sunt pura, calida & humidiora dicimus, quæ illius calidæ & humidæ temperatæ sunt cõsimilia: sicut calidiora multo, quæ tunc duriora emolliunt.

Pus moventia esse calida & humidiora.

Scirrhus quomodo fiat.

Scirrholosis.

Scirrhus tollendus qualia sunt.

Emollientia quæ pus moventia quomodo differant.

Pus moventia humorem qui præfuit in partibus induratis consensu: emollientia autem paulum quidem eia assument.

Manducandi affidendi appropinquandi perfecti suppurationis tamen calorem emollientia.

Pus moventia debere esse emplastica.

Pus movens plurimum habet calidi spiritus.

Innatus calidus spiritus est animæ substantia, cuius primus motus illius instrumentum.

Pus movendo quæ cõgruunt.

Porro facultas.

Adipem dicitur.

phanino, veteri, aut scyonio. Quā autem cera per se minus sit calida, quā ut pus mouere possit, foliis feruentibus phlegmonis apta est, ex calidiorū oleorū quopiā liquata. Igitur quæ pus mouent, naturā modicè excalescentē & humectantem fortuntur. Ceterū medicamē puri mouēdo idoneū, facultate quidē est tale: vbi verō corpori nostro est admodum, sit actū tale, siue energici. Ergo scirrū vocant tumorē præter naturā,

doloris vacuū, fed durū: interdū etiā sensus expertē. Oritur scirrhus ex humore crasso & frigido, quales sunt duo dūtaxat: bilis videlicet atra, & superexaricata pituita. Proinde tumores scirrhosi omnino aut pituitosē substantiā sunt, aut atrabilariæ, aut ex verag misti. Propriē aut emollientia dicūt, q̄ medicū scirrhosis tumoribus, ex pituita exsiccata, crassissq̄ humorib. ortis. Cōsueuerūt. n. ij potissimū in musculorū capitibus gigni. At q̄ ab atrabilario succo durerūt, cæcrosia sunt oīa, & ab emollientibus medicinis exasperantur. Sed his quo pacto prospicere oporteat, in cōmentariis methodi medendi docebimus.

Quæ verō à lento crassiq̄ humore concreto indurata sunt, calida in secundo aut tertio ordine, succa autem in primo, medicamenta desiderant. Sed quum non exigua sit in corporibus induratis maioris minorisq̄ latitudo, necessum est medicamentorū istius medentū non paruum etiā latitudinem esse. In vniuersum autem, ex emollientibus medicamentis præstantiora sunt, quæ recentia existunt. Siquidem inueterata, validius quā expedit exsiccant. Porro radix altheæ & cucumeris agrestis, nonnullæq̄ aliæ plantæ, par tū in oleo, partim in aqua decoctæ, emolliunt: sicuti malux agrestis folia, tum cruda, tum cocta. Atq̄ hoc simplex medicamentum est, sicuti porcum adeps inueteratus, cui salis nihil indere oportet, sicuti nec emollientiū vlli. Valde si quidē sal exsiccat. In summa verō, quæcunq̄ alia emollire possunt, calida sunt ex secūdo, & interdum ex tertio ordine: leuius verō sicca. Sed & his etiā emplastica vis inire oportet, nō secus q̄ pus mouentibus: at quæ nō perinde meatus obstruat, quod magis, q̄ illa, evacuare sint nata.

## CAPVT XL

Ar indurantia frigida sunt, & humida, vt semperuiuū, portulaca, psyllū, tennicula palustris, solanum: quanq̄ hoc, in medio exsiccatū & humectantū consistit, duplicem in se habens substantiā, nēpe terrenā, & aquea. At verō si quid simul & refrigeret & desiccet, sanē & ipsum indurabit omnino: impropiē tamen, quā concione potius q̄ evacuatione indurēt corpus. Illa siquidē potius siccitas est, ac proinde non emolliuone, sed humectatione curatur: quemadmodum tensio relaxatione, & relaxatio tensione.

## CAPVT XL

Porro laxatio in articulis fit, humectatis immodicè quæ circa eos sunt ligamētis, pariter & tendonibus: tenuis verō, non etiā simpliciter, sed aut piusculum exsiccatū, aut refrigerari, aut phlegmone affectis, aut scirrho. In cutē aut non tantum ita, sed muscularis quoq̄ subditi quoquo modo in tumorē sublati: quemadmodū etiā in inflammationib. accidit. Quamobrē nō sim-

pliciter vna est species remediōrū laxantiū: vt pote quā alia humectando, alia calfaciēdo, alia emolliendo, quædam vacuando, nōnulla tumores præter naturam purgando, alia etiā per conuagationē, horū quippiā agendo, laxare assolēt. Est autē empiasticū medicamentū, quod terrena viscidissq̄ substantia, minimèq̄ mordaci præditum, illitum meatibus corporis tenaciter hæret.

## CAPVT XL

Quod emplasticū contrariū est, dici queat poros repurgare, & infarctū liberans: estq̄ nec viscidum, nec mordacitatis experte, sed subtile & nitrosum. Nam in ratione tantū maioris ac minoris differit, tum emplastica ab istis quæ sordes nutrant, tum repurgantia ab extergentibus. Nam quæ poros obstruēt referant, subtiliora extergentibus sunt, emplastissq̄ cōtraria. Sunt autē hæc, tum nitrosa, tum amara. Ceterū ad extergenda ea quæ in superficie sunt, requiritur vt cuti extingui possint medicamenta ipsa, solam exactamq̄ nitrosam quaiatē possideat. At intro in corpus assumpta, enī si adhaerētia sit quædā attractio, possint tamen sic quocūq̄ magnos purgare abstergeretq̄ meatus, cuiusmodi in vasis consistunt. Nam foris meatuū exiguitas prius ab attractione & occlusa, q̄ probe queat expurgari, nō etiā inde in altum abstergentē substantiā recipit, nec expurgat. At quæ circa ventrē visceratū sunt partes omnes, quā maximas in se habeant meatus, maius accipiūt cōmodum ex vasorū corroboratōne, q̄ propter osculorū exiguitatem laedant. Proinde inrus abstinētiū repurgare potest, foris nō potest: quippe qd ex amara acerbiorū facultate est compositū. Quæcunq̄ igit repereris nitrosa & amata, ea ad purgādos meatus omnes, valere noueris. At cutis & vlcerū sordes, non hæc tantū, sed & virib. minora possunt auferre: quælia sunt dulcia quæ tenuissq̄ sunt partū. Porro sol la, itis, nitru per se, aphronitru, spuma nitri, seriphon, abrothōnum, cum cibo poriq̄ assumpta, crassos viscidissq̄ humores extenuandi vim obtinent. Quā ob rē lentia ac pituitosis thoracis pulmonisq̄ humoribus, aut paruientis & incidentis, & extenuandis, & educēdis, aptiora inuenire alia præ istis medicamēta nō possis. His ipsis & iecinoris obstructions expurgare, & modicas etiā lenis. Nam quæ maiores sunt, vehemētiora desiderat: nempe capparis corticē, radices tamarices, scolopendriō, & scilla, & asplenom. Sed tamen istis vtendum est, ad iecur quidem ipsis per sese dūtaxat: ad lienē & vtrūq̄, mistis aceto, aut ei incoctis: ad thoracē pulmonemq̄, melicrato, ptiisanx, oxymelini, aut dulcium vinorum cuiquam.

## CAPVT XL

Quum autē plurimū vinum ad mouere est consilium, non admodum dictis vtendum est phar-macis, sed quæ actiora sunt, et magis excalesciūt. Est enim omne acte calidū: cuius generis sunt, semen apri, petroselinū, feniculi, dauci, agrioselinū, smyrnū, ipsilūq̄ seseli, ammi, phu, meon, asaron, & cum his acoron: a quib. sanguis non exenatur dūtaxat, sed & funditur & secermit: nempe seroso & tenui seorsū segregato ad renes, crasso verō in sese cōiūnte. Quamobrē puris est thorace expulsiōni ea oīa aduersantur, quum nimi-

Laxatiua sunt  
non vna.

Emplastici sunt  
essentia quales.

Emplastici sunt  
quales.

Extergentia sunt  
quædam, de  
bent esse calida  
nitrosa: vtriusq̄  
autem, vel si a-  
liquod asphritum  
non fortissimè ad  
huc occurrat.

Abstrachium  
inrus repurgat  
meatus, foris nō  
quædam.

Medicamenta  
ad crassos viti  
dissq̄ humores  
expulserunt  
commoda.

Obstructions  
in iecur, ac lēues,  
quæ potissimū  
solant.

Actis omnia  
sunt calida.  
Diversitas medi-  
camentis qua.

Pus mouentia  
modicè excales-  
cent, humec-  
tant.

Scirrhus quid,  
et unde gignat.  
Scirrhi qui gignunt  
sunt.

Emollientia  
quæ.

Cæcrosia scirrhus  
aut vix  
emolliens aut  
exasperans.

Emollientia.

Ad emolliendū  
pus inueteratū  
aut aliq̄, quid  
uocet valde.

Emollientia de  
bent esse etiam  
empistica.

Indurantia sunt  
frigida & hu-  
mida.  
Solanum mactore.

Laxatiua sunt  
et quædam.  
Tigianu canis.

rum excofactoria exicatoriaque sint, necnon se-  
cutoria & coactoria. At quæ expui debent, me-  
diocrem caliditatem desiderant, ne videlicet impen-  
sè exsiccetur: ac proinde medicamenta illis con-  
gruentia, eiusdem virtutis gratia, cum forbitu-  
culis potionibusque exhibentur. Quæ verò renes  
expurgant, & ipsa incidendi vim possidentia, la-  
ge humiditatem non indigent. Porro quæ callosas  
côssistentias sunt incidere idonea, admodum qui-  
dem incidunt, sed minimam sanè caloris possi-  
dent. Caliditas quippe calum potiori ve gignat,  
nò incidit, nec diuidit. Exterum quæ & incidunt  
& mediocriter calida sunt, meliora existunt: ut ra-  
dices regiorum asparagorum, & rubi, & betoni-  
ca, & posium, tum oclara, & vitrum vitum, & ex  
solla confectum acutum, & consilium.

## CAPVT XIII.

## Rarefacientia.

Quæ cutis meatus referant, ea rarefaciētia di-  
cimus: quæ verò valoris oscula, aperientia. Quin-  
que illis contrariorū, quod poros cōstrahit, cōden-  
sans dicitur: quod autem osculum claudit, occlu-  
dens siue obstruens nominant. Cæterum rarefa-  
cientiū quidem natura modicè calida est, ac tum  
minimè siccat, tum resulum partium: apertientiū  
verò, tum crassarum partium, tum acris ac mor-  
dax. Illis porro contrariorū, condensantium  
quidem, frigida sunt & aquea: occludentium au-  
tem, tum frigida, tum partium crassarū. Rarefacit  
igitur chameæliū, & althea, quodq; ex ipsis cō-  
ficitur oleum: nec minus quod ex agrethibus cu-  
cumeribus. Quin & yerus, & cicinū, & raphani-  
num, ex eadem sententia nota. Apertientiū aut cyclami-  
nus, alia, cæpæ, fel taurinū, vnguentimq; inuū  
& amaricini, quæ & occæatas hæmorrhoidales  
aperiūt. Ac cōdenstantia sunt, aqua frigida, sem-  
perviū, portulaca, tribulus viridis, ptyliū, auri-  
cula marie, lenticula palustris, ac deniq; quæcū-  
que refrigerant, sed nō astringunt. Proinde man-  
dragora, cicuta, altercum, papauer, si eis quis  
modicè vitæ, cōdenfandi vim obtinēt. sin libera-  
lius, nō modò cōdenfandi, sed stupefaciendi, &  
necandi. Occludunt porro meatus omnia quæ  
valide astringunt, nec tamen acrimoniæ habent  
admixtā: quam nimirum essentia talium sit  
simul terrena & frigida. Medicamenta verò quæ  
frigida quidem sunt aut aquæ, aut amplius, sed  
substantiā fortiunt aquæ, ea in quā debilitat &  
contrahunt & contringunt, videlicet propter  
ipsam molliē: quare cōdenstantia potius quā  
obstruentia dicuntur. Quippe qui quid valen-  
ter tum cōstipare, tum cōstringere debet, robur  
quoddam reuerens, & durū, libeat oportet.

## CAPVT XIII.

## Rarefacientia.

## Colligantia.

## Anæsthetica.

Quæ itaq; citra molestiæ excofaciant, ea sola  
omniū sunt rarefacientia. Si verò nō modò cali-  
da fuerint, sed etiā cōsistentia crassa, si quidē ve-  
hementia sint, & caustica, hoc est, vrentia, ignis  
instit corpus colligant, & sæpe escharas ritu  
cautem inducunt. At si debilius & vt vrere pos-  
sint, excofaciant, anæstomica, siue apertidi vim  
obtinēt. Quod aut causticū, nō tamē vehemētē,  
est, præterea essentia tenuioris, est proflus ab o-  
mni mordacitate abest: aut cū exiguo, nō dolo-  
re, tū moriū eliquabit partes carnosas. Nam qd  
nō cōferum alterat, vt quæ vehemētē sunt cali-

da, quodq; nō ægrè penetrat, vt quæ crassæ sunt  
essentiæ, ea latentē actionē obtinēt. Porro altera-  
tionū subitæ cōfictæ mutationes, siue & pene-  
trationū quæ violētæ sunt, quales proficiunt à  
causticis & escharoticis, maxime sensibiles sunt.  
Cæteri de quib. nunc agimus, minimè faciūt es-  
charas, vocitūque putrefaciētis, licet improprie,  
atq; ob symptomatis tantū similitudinē: quā ob  
vitiū nullo doloris sensu corruptio fiat. Nam  
quæ verè putrefaciētia sunt, humectant simul &  
calfaciūt. Multis sūt modis corrupti quid potest.  
Corrumpunt siquidē plus nimio refrigerata, aut  
excofacta, aut humectata, aut exsiccata. Non est  
quicquid corrupti cōputrescit, sed quib. ad cū facto  
re accidit. At medicamēta de quibus nūc sermo  
est, putrefaciētia, qualia sunt auisipimentum  
(quod arsenici vocant) sandaracha, elrysocol-  
la, dryopteris, pityocampe, & aconiti, oia collu-  
quare sunt nara, & potissimum carnē tenellam,  
idē absq; dolore. Ex quib. quidē nōnulla imbe-  
cilliora cæteri, vt vitæ petre floris, existimant tan-  
tum superficiem, quam contingunt, excedēdo, vt  
ceribus excretescentibus cicatricem inducūt: quan-  
quam medicamenta quæ verè ad cicatricem pro-  
ducunt, nec detrahē, nec liquare carnē, sed duri-  
rare, & siccare sunt nara: vt alumē, galia, omphi-  
acris, æ-vissum, ac maxime lorū, cū casti fructus  
spinæ Aegyptiæ, sicq; mali granati putamina,

## CAPVT XV.

Id igitur est in planis vicibus. ad cicatricē du-  
cendis consiliū, vt caro alteretur, fiatq; cutis: id  
quod perficitur per ea quæ illam cōstrahere, con-  
stringere, cōstipare, densare, siccare, & in callum  
eogere valeant: quæ nimirum cutis, velut in  
callum durara caro sit. Ea ergo medicamenta quæ  
sic agere possunt, primariò propriè dicuntur  
epulonica, siue ad cicatricē ducentia: cætera verò  
quæ exedūt carnem, secundariò, & per accidēs:  
sicut & ea quæ absq; attentione dēficiendi vim  
habent mordacitatis expertæ. Nam & licet quo-  
que ex accidenti cicatricem inducunt: cuiusmodi  
vitiū medicamentum est, myrrha, lithargyrus,  
ostreum, & diaphryges combustæ: quandoquidē  
& ipsa cicatricem sæpe inducunt illita. At verò  
medicamenta citra morsum medicotētrę ab-  
stergentia, cautantes vicerum implent.

## CAPVT XVI.

Porro attrahentes facultates sunt, quæ ex al-  
to vehemētius extrahūt: percutientes verò, quæ  
in altū occurrētes sibi succos repellunt. At essen-  
tia illis quidem calida est & tenuium partium: his  
verò frigida, & crassarū. Attrahit enim perpetuò  
calidum: repellit verò frigidum. Verum quod ca-  
lori iunctam partium tenuitatem foris trahit  
vehementius: quod autē crassitudinem frigori,  
violentius repellit. Atq; astringētum quidē no-  
ta est essentia. Attrahentium autem, alia spōte est  
nata, vt dictamni, propoleos, thapiz, sagapeni,  
faccig Cyrenaiici & Medici essentia: alia verò  
putredine exasperate suam duci originē, qualis  
tum fermento, tum phorico inest. Quod si finis  
quorū ex putrefactione generatio constat, vtiq;  
omnes attrahētē facultate pollebunt: sed nō par-  
ua illis differētia inest. Nam columbinus admo-  
dum attrahit. Ex æquo aut vtrinq; ab eo recessē-  
runt,

Corruptio  
modi dicitur.  
Putrefactio  
fuerit accipit.  
Putrefactio  
que corat ab-  
que dolore li-  
quant.

Cicatricem in-  
ducunt modis  
causis que.

Epulonica que  
dicuntur primari-  
er que foras  
trahunt.

Attrahit cali-  
dus, repellit fri-  
gidus.

Attrahentium  
essentia duplex  
est.

Primus omnis  
attrahit.

rū, ad calidius quiddē anferimus, ad frigidius verō gallinaceus. Hoc enī magis vincuntur humanus & fūllus. At canum stercus simile est medicamentis extergētibz, maxime si vescant osibus, Crocodilozū autem stercus magis etiam id perficit. Est & aliud attrahentium medicamentozū genus, quod qualitate familiaritate attrahit: id quod aliud est nihil, quā totius essentię similitudine, ceu quę nutritiū, familiaria nutrimenta attrahunt. Talium enim medicamentozū sunt purgantia omnia, & amuletorum nonnulla. Ceterum calida vt sint id genus omnia est necesse. Quinetiā inter ea quę essentia similia sunt, qđ calidius fuerit, id potentius attrahet.

## CAPVT XVII.

Iam verō facultatum alexipharmacarum natura est duplex. Quędam siquidem alterant, quędam evacuare vtenli lādens, aut deleteriū medicamentum. Alterant igitur vna qualitate, idę ratione cōtrarietatis: aut duarum cōiugatione: aut deniq; rora substantia. Evacuare totius substantię similitudine, & caliditate subtilium partibz. Ceterum alexipharmaca medicamēta, sanē facultate sunt media inter corpora quę ob lēdunt, & medicamēta lādentia: vt videlicet eadem sit proportio corporis ad facultatem alexicrā, quę illius ad deleteriā. Quamobrē omnia propemodū quę deleteria aduersant medicamētis, si largius sumpta fuerint, grauior animā corpus offendunt. Quāpropter ea exhibeantur modē deratione, vt nec copia nimia corpus oblādant, nec exiguitate sua ā deleteris vincant. Evacuatur autem omne deleterium venenū ā foris impositis medicamētis, nempe aut caliditate attractionem molientibus, aut totius substantię similitudine. Quā igitur omnia deleteria medicamēta aduersissima secūdu temperē sint corporibz, quę ab ipsis lāduntur, certē si ā finalibus temperie medicamentis vacuent, erunt vtiq; & hęc corporum naturis contraria: vt sunt laudubē alia quę ex parte contraria, non tamen adeo vt interrimant, sed in corporis perpetentis, & medicamenti lādentis medio liberentur.

## CAPVT XVIII.

At facultas qđ verē & est & dicitur anodyna, eorum est, qđ primo ordine exalfaciunt, tenuēq; essentiam sortiontur. Quę verō improprie anodyna vocatur, iis medicamētis inest, quę suo ingenti frigore partem stupefaciunt. Est autem stupor paulo minus quā in sensibilibz, ac sensus priuatio. Ceterum quę affectum sanando dolorem sedāt, nec merito dici anodyna possunt: nā id est omnium curantium commune. Quę itaq; reuera sunt anodyna, partium sint tenuium, & calidiora quā qđ symmetra sunt, est necesse: vt scilicet evacuent, digerant, rarefaciant, extenuent, cōcoquant, & equabile reddant, quęquid partibus doloris est causa. Quare nihil prorsus attritionis habēt oportet, ne si pars quidem aut affectus exposcāt. Ex quibus liquet, quod interdū affectionem non suauibz, sed tantūmodo mitigabunt dolore, quādo videlicet verē anodyna dicuntur. Intendū adiuuabz affectū, dicentūq; simul anodyna, & salubria. Igitur medicaminū anodynorum quędam ex primo sunt calfacientium ordine, qđ proprie anodyna dicunt, vt anodyna facul-  
tati natura.  
Sapor quid.  
Anodynorum opera.  
Anodyni nihil debent melle & stibium.  
Anodynorum differentia duplici.

linū oleum: quędā similiter vt corpus nostrū, qualia sanē pus mouētia. Quę vtrōq; soporem e-pota inducūt, temperiem sortiuntur vel summē aduersam us quę reuera sunt anodyna. Refrigrant siquidē omnia corpus, & sensum eorūq; stupefaciunt, vt si paulo liberalius bibantur, morē afferant. Ceterū ad vsum propositum optima sunt quę desiccant. Quę verō exultantia frigida, humiditatis etiā copii obtinent, vt citra, ea potui nō sunt vitia. Talis est mādragora, excepto eius cortice sicco: & altercū, pręter semē. Sunt tamen & qđ nobis rora essentia aduersent. Proinde si vel minimum eorū assumptū fuerit, omnino lēdat necesse est ceu dryopteris, ptyocampe, thapsia, solanum manicum, hydrargyros, & singulorum nonnulla: pręterea fulua & fel animalū venenatorū. Nam talia omnia genere sunt deleteria, nō quantitate: ac pnde nihil eorū in alexicratis antidotos inditur, vtiolet papaueris succus, myrria, styrax, & crocus. Nam tamen quędam horū dementē largius bibita, quędā mortem inferūt, mensura tamen conuenienti permixta alia, diuuant. Eorum potro quę mentem laedunt, plerūq; etiam caput degrauiant, vaporibus ipsum implentia. Sunt quę id asilugant, oblescentia ventriculū. Communiter verō cerebrum vniuersū duobus modis infestāt: aut totius substantię contrarietate, aut quum vna duabz uisualitatibus alius temperaturam immutat.

## CAPVT XIX.

Vocabulū hoc, purgans, vna quidem, eāq; cōmuni ratione, de iis omnibus dicitur, quę quouis modo animalis excrementa expurgāt: talia verō de iis tantum enunciantur per excellētiā, quę aut per vomitum, aut per alui deiectionem, purgationem moliantur: ita vt ab his diuersi generis sint ea quę rum per nares, tum per os ā capite humores eliciunt. Eiusdē cū istis sunt generis, quę vultu admoza, vi quadam attractione illius excrementa purgant. Quęcumq; siquidē purgare animadvertimus, ea trahēdi vim possidēt, alia vnum quempiam succum, alia duos, aut etiam plures: idę illis inter se commune existit. Nam quę crassos humores extenuando, aut vti nam ciere possunt, aut ex pectore pulmonēq; eliciendū excretionibus auxiliari, aut mensuras purgationis ciere, purgant sanē & ea aliquo pacto, verum antedictis non similiter nuncupantur, sed alia dicuntur diuretica, alia bechica, alia menses mouentia, hac re ā superioribus diuersa, quod nō habeant vim familiarū succorū attractionē, vt illa. Bisaria autem dicuntur bechica: partem quod tussim provocent, partim quod eandem sedent. Atqui contrarietate horum sunt facultates. Alia enim extenuandi naturam habent, alia incrassandi. Ang extenuandi quiddē facultas, in calidis & tenuium partium substantiis sita est: incrassandi verō, frigidis, & crassarum partium essentia inest.

## CAPVT XX.

Lactis & seminis effectrices facultates sunt, partem in medicamētis tantū, partem in alimentis. In medicamētis quidem, quom succos pimitosos exalfacientes in sanguinem vertunt: in alimentis autem secundum substantię totius similitudinē, vbi videlicet boni sunt succi, & humida,

Deleteria, tota substantia.  
Deleteria generis quę sunt.

Purgantia media ceterum multiplex habet significatiōem.

Purgantia alia duo trahunt humores.

Bechica dicuntur bechica.



*Humorem cor-  
poris humani  
temperet.  
Lactis superius.*

*Lactis gignendi  
ratio.*

*Lactis genera-  
tioni quæ pro-  
hibeant.*

*Sanguis est ma-  
teria mensium  
& lactis.*

*Venas esse tem-  
peratas & mater-  
iales.*

*Lactis mensuris  
que generantur,  
eandem vim  
et medicamēta  
rationem deside-  
ratis.*

*Menses demitti  
in vitrum, non  
ab illis astratis.*

*Menses ex vi-  
nis que stratis.*

*Menses dectis  
à duobus differant*

& tepide calida, seu ipsum lac. Si quidem sanguis est caloris mediocritas particeps: plus verò quàm mediocritas, bilis: sicuti pituita frigiditytis. In medio autem pituitæ & sanguinis lac ipsum consistit, propius tamen sanguinem versus inclinis. Vbi igitur ob penuriam sanguinis parum lactis in mamma constituitur, humectante simul & calfaciente viâ ratione est opus. Si verò quoddam biliosus fuerit, in primis purgatione ipse sanguis desiderat: mox victum cum nuper diximus. At si quoddam pituitosus, medicamentum requirit excalfacientia aut primo, aut secundo ordine, non tamen exiccantia. Verum inter ea potiora sunt, quæ non tantum medicamenta sunt, sed & nutrimenta, veluti eruca, feniculum, anethum. Intellego enim ipsas herbas etiam nunc virentes & humidas: nam quæ siccæ sunt, plus quàm par sit & excalfaciunt, vel deficiant. Huius generis est symyrium, apium, sion, polion, eiq; prius quàm exiccantur. In summa verò, quæcunque calfaciant plus quàm expellant, quæq; deficiant aut refrigerant, partim qualitatē ipsius sanguinis viciant, partim ipsum minorē reddituri, lacis prohibent generationē.

## CAPVT XXI.

Porro dictis ad similitudinem facultatē obninent, quæcunque provocare aut sedare menses possunt. Vtrotumq; enim cōmuni materia est, nempe sanguis in venis contentus. Quare vbi hic auxilia fuerint, & qualitate temperatas, vtriusq; abvndantem copiam suppediat. Cōmunes præterea vberibus, vtriusq; venæ sunt non exiguae. Itaq; vbi ad alterutram partē sanguis defert, altera succescit. Proinde quibus menses mediocriter deferuntur, iis lac minimè in mamillis colligitur. Quibus verò hoc largè suppetit, iis planè menses colubentur. Quocirca mirandum non est, si tum victus, tum medicamenta similia sint, nempe & ea quæ gignunt, & sedant menses vteri purgationes: & ea quæ lactis in vberibus generationē tum procurant, tum supprimunt: quoniam lac tenuius differit, quoddam calidioribus, & magis incidentibus nonnquam mēstrua purgatio indiget: quum nimirum ea in parte sitz veng magis aperiri debeant, quàm quæ tendunt in mammas, & sanguinem fluxilem magis requirunt, vtero ad delationem eius nihil conferente. Mittuntur enim in venas quæ comituntur illi, non attrahuntur menses. At sanguis in vbera non tantum mittitur, sed etiam trahitur: ac proinde leuiori subdido medicaminum opus habet, quum non abvndè in mammas is confluit. Medicamenta etiam quæ iuvant ut sanguis in mamillas feratur, imperfectas etiam purgationes promouent. Sin autem nimia oblatz sint, aut planè retentæ, nullū eiusmodi eas sanare potest: verū fabia, mēion, iura, calaminta, pulegiū, dictamnium, asarum, colus, cassia, cinnamomum, amomum, aristolochia, buniū, & eius generis reliqua, exacta vteri purgationū retentiones persanant: taliq; etiā vrinam promouēt. Sed ab iis quæ diuretica tantum dicuntur, hoc quidem differunt, quoddam non vehementer deficiant. Etenim quæ non deficiant, & modicè calfaciunt, lacti sunt generando vtilia: quæ verò plus excalfaciunt, non tamen valenter deficiant, mensibus elicendū sunt cōgrua. Verūm & vtriusq; hanc vrinam provocant, necnon

in primis ea quæ deficcantia, etiam calfaciunt. At præter alia & reddētia ex pectore pulmonēq; excreationibus in cōmoda sunt deficcantia. Poscūt quippe & ipse incidi quidem, non tamen exicca ri, seu & renum vesicæq; calculi.

## CAPVT XXII.

Semen generant cibi qui probe nutriunt, & statulenti sunt, familiarēq; tons substantia: medicamenta verò statulenta etiā & calida. Extinguūt autem deficcantia & refrigerantia omnia, quæq; tons substantiis cōtraria sunt. Porro provocant quæcūq; calida sunt & statulenta absq; deficcatione: supprimūt verò contraria. Etenim quum feminis substantia ex bona superfluitate generationem fortiat, sitq; etiam statulenta: bene nutrit: & statulenta sint, necesse est, quæcūq; semen aut p- creare, aut p- vocare possunt. Quare bulbi, cicera, fabæ, polypodes, cornua, edulia multi feminis & dicunt & sunt. At scincus & saryrid medicamēta ad id apta existūt. Porro simul cibi & medicamina multa feminis sunt, lini semen, & eruca. Ceterum quæ refrigerare sunt nata, tam edulia, quàm medicamēta semen cogenā, incrassantia, & statulenta reddētia, vim habent ipsum suppetimentem, non aut corruptentem: ut lactuca, blitum, atriplex, cucurbita, mora, melopeponē, cucumeres siue maturi, siue immaturi. Iam verò quæ deficcant, ne esse quiddam semen permittunt, etiam si natura calida sint: ut rura. Quoddam si ens nō calfaciunt, multo minus: ut symplica. Eandē proportionē tum esculentorū, tum medicamentorū est invenire, circa lac & mēstrua. Sub idem genua cadunt, qvia alio modo, quæ respirantium instrumentorū reiciendis excreationibus auxiliātur, quæq; vrinā ciere possunt. Hæc enim omnia extenuant & facultatem obtinent, vti contraria incrassandi.

## CAPVT XXIII.

Tametsi chylario diarrhodon, & diapophylagon, & cygnio, & thure, vti posuimus ad aures, aut os, aut nares affectas, necnon ad pudendum & anum: quia tū frequentiū ad oculorū morbos iis vtiuntur, ob id nimirum ocularia medicamenta vocant: sicuti alia hepatica, alia splenetica, stoma chucæ, secundum differtē nō particularum quibus solent auxiliari creberrimè.

## CAPVT XXIV.

Dum autē qui Methodici nominantur, metz syncrinicas quasdam materias & facultates appellant, præterquam quoddam obscura & falsa loquuntur, etiam suæ ipsorum laxetis maximè repugnātia astruunt.

## CAPVT XXV.

Ex operibus autem contrariis iudicare facultates oportet: dicentes quasdam esse facultates emplasticas, & hia cōtrarias, tum extergentes, tum farsu liberetæ: præterea emollientes, indurantes, laxantes, & contudentes. Nam astringētes, acres, amara, acida, atq; dulcia, non facultates, sed medicamentorū, sed gustu esse qualitates monstravimus. Quamquā & laetū etiam tum actiones, tum temperatuz nobis veniunt in vestigandæ. Etenim astringētia, terreste & frigidum: acidum, subtile & frigidū: amarū, terreste & subtile: insignis qualitatē expers, frigidum & aquū: acre, igneum: salium, terreste & calidum,

*Semen quod dicitur, autem, quod dicitur.*

*Semen procreant, autem, quod dicitur.*

*Semen suppetimentem, autem, quod dicitur.*

*Semen ut dicitur, quod dicitur.*

*Ocularia vnde dicuntur.*

*Culpa quælibet, aut quæ sit.*

*Superiorum temperata.*

dum, nondū tamen igneus: similiter dulce, calidū, sed nondū vrens: quæ deniq; oleosa sunt, omnia aquea sunt & ærea. Sequuntur sanè sunt tēperaturas eorū, & opera. Nam astringens, contrahere, constingere, densare, repellere, incrassare, omniq; refrigerare, exsiccareq; est natum: acidū verò, incidere, extenuare, faciliū liberare, & purgare citra calfactionem, & cum aliquā tula repercusione potest. At acris similiter vti acidum cure nuatq; & perpurgat, necnō perūpīr, attrahit, & 10 escharam inducit: ceterū calfaciēs, & digerēs. Sic amarū quoq; meatus ppurgat, abstergit, extenuat, incidit humorū crassius abiq; manifeste calfactione. Quod qualitas est expers, incrassat, cogit, contrahit, extinguit, stupefacitq;. Porro salum cōtrahit, constingit, cōdiendo feruat, desiccāt citra apertū aut frigiditatē, aut caliditatem. Dulce verò cōcoquit, laxat, rarefacit: oleosum deniq; lūmeat, emollitq;, & laxat. Ex quib; sanè faciliē venire licet, quāvis saporis 15 temperie, & qui sint operibus contrarij.

## CAPVT XXVI.

Symmetrum appellare medicamentum cōvenit, quod nec exalfaciat, nec desiccāt, nec refrigerat, nec humefact: nec calidū, frigidū, humidum, siccūve existit. Quod verò aut calidius, aut liuidius, aut frigidius, aut siccus est, ā vincente, seu excedēte facultate cognominatur. Porro per vñū quēq; excessum quatuor posuisse ordines, quod ad vñū spectat, sufficit: calidum quidem, 30 exempli gratia, nominātes primi ordinis, quod nos exalfaciat, nō tamē evidētē, sed ita vtopius sit rationali demonstratione. Quæ verò manifeste calfacere nos dicūt, ea secūdi ordinis esse dicuntur. At quæ iam vehemētē quidē, non tñ summe, tertij. Quæ autē ad exalfacere possunt, vt escharā molliant & vrant, quartæ similitēq; in aliis ex vñāntiis existimandum. Nam quæ adeo vehemētē refrigerāt, vt extinguant, & ipsa quæ sunt ordinis. Ceterū nullū venire est, quod quarto desiccet ordine, quod nō etiā vrant. At tertij ordinis exiccatum quippiam esse possit, quod minimē vrant, cū omnia quæ vehemētē astringunt: ex quibus est omphaciū, rhus, alumen, balauſtia, galla omphacina. In his aut ipsi quædā vicina sunt ad vtrūq; vt squama grise, & æs vitū, quasi inter tertij quartūq; ordinē hæreant. In medio tertij est æs vitum, si lotum sit in principio tertij hypocrisis. Sic in secūdo & quarto differentias licet cōstruere triplices: quā non perinde vrant cæterum & napy, licet ambo quartū sint ordinis.

## GALENI PERGAMENI de simplicium medicamentorum facultatibus, liber VI.

Generalis igit sermo de facultate medicamentorum simplicium, vniuersus iam su perionibus libris finem suū consequutus videtur. Tempus verò iam est ad sermōnes particulares, siue speciales trāsire, hoc solūmodo repentes: primum quidem, in natura tēperatissima: secūdo, in tēperata: postea deinceps in simplicibus morbis, faciliū esse periculum de facultate ipsorū medicamentorū. Ceterū quānam 40

medicamēta oīa, partim quidem sunt animalū partes, aut plantarū, aut fructū, aut horū liquores, aut succi: partim autē ex metallis sumunt: optimū nihilivm est de plātis ante oīa differere: dein de metallicis tractare, ac vltimū ad animalū partes trāsire, idq; obseruato literarū græcarum ordine. Curabimus autē semper, vt (quod monuit primo oraculo Hippocrates, vti pronuncians breuem, & artem longam) festinantes quammaximo studio, viam incedamus compendiosissimam, per ea nempe quæ sunt in arte vtilissima. Inter oīs porro Dioscorides perfectissimē mihi videtur cōfecisse tractatum de medicamentorū materia. At qui aggregandis figuris herbarum describere, quas neper somnū quidem viderunt, & certē vident præconib; similes, qui notas ab aliis accipere fuginū mancipij pubicant, quem ipsi nunquam viderunt, imō quē ne agnoscere quidē possint, si propē assisteret. Illos etiā nō possum nō accusare, qui primi herbarum formas, scriptis docere conati sunt, quū melius existimē ab ipso præceptore oculis dūcere, ac non a simulari iis, qui ex libris prodeūr gubernatores.

## Abrotonum.

Abrotonū calidum & siccum est facultate, in tertio recessu, aut ordine, qui ad temperatā naturam expenditur, situm. Valde siquidē est amarū: qui sapor, quū essentia terrena sit, ā largo est calore extenuatur. Porro si quibus per circuitus redeunt rigores, ante invasionem rigorum eos abrotono confrices, minus vtiq; concutiantur, su bitoq; sensum caloris percipiant. Quod abrotonum etiam lumbrosos perimat, par quidem est, quum sit amarum. Ceterū & digerendi & incidendi quandā vim habet, ipsūq; absinthio maiorem: quando quidē paucissime acerbioris particeps est abrotonū, haud autē exigue absinthij. Vnde inimicū sanè est ventriculo abrotonū, vel vti etiam scripsum: grātū verò & amicum absinthij. Per se quippe amarū omnia sanā est insensum ventriculo: austerū verò, aut acerbū, aut ita summa astringēs, amicū & familiare. Abrotoni duæ sunt species: quarum alteram sanè mærem, alterā fœminam vocant. Similiter & absinthij tres species, aut differentie assignantur. Quarum vnam eodem cum genere ipso nomine appellat absinthium: cuiusmodi est Ponticum. Secundam autem Santonicum: ac tertiam deniq; Seriphum. Quibus omnibus absinthium quidē minus est calidum, nempe plurimam astringentem obtinens. Non tamen minus desiccatorium existit, Cæterorum autem, Santonicū ā Santonia regione, in qua nascitur, nomen sortitur, proximam habet facultatē, Seripho paulū imbecillius in extenuando, calfaciendo, desiccandoque. Porro id ipsum Seriphum Abrotono minus est calidū, verū calidius absinthio, Rōmacho impendio inimicum, nempe cum amaritudine, præ se etiam quandam ferētis falsedinem. Sed nonnullam tamen, etiā minimā, astringentem sortitur. Sic Abrotonum & Santonicum admodū sunt infesta ventriculo. Solū enim inter ea absinthium, & maximē ponticum, grātū stomacho existit. Abrotonum vītū, calidū siccūq; facultate est, magis enī quā cūcubita sicca vītā, & anethi radix. Illa 50

Y y η

Vita brevis.  
Ars longa.Dioscorides ex  
allijone tradi  
diffe hñteram  
plantarum.Abrotoni stipo  
ratura & effen  
tia.Abrotono si  
quo perfector  
ante invasio  
nem, manus ā  
fibris rigore  
infestabitur.  
Abrotoni ver  
mes prout.Abrotonum in  
monte vascu  
lo.  
Absinthij ven  
triculo grātū.  
Astringentia  
siue amica v  
triculo.  
Absinthij in  
specul.Ponticum,  
Santonicum,  
Seriphum.Seriphum  
in vñā  
vñāAbrotonum  
in vñā  
vñāCallistū quæ  
in vñā facultate  
est & opera.Symmetrum  
quid dicitur.Ordines, siue  
gradus exco  
lunt quatuor.Exiccatum  
quid dicitur,  
nam vñā.Vita brevis  
in quibus opo  
ret dicitur.

*Cerebrum v. sta propter v. cerebrum cernit. Abrotani enim ex aliquo oleo calido, herba tardius nascitur elicit.*

enim vlcibus humidis simul & citra phlegmonem callo induratis conveniunt: ac proinde maxime preputij vlcibus congruit. At c. nis abrotani vlcibus omniibus mordax est: atq. idcirco ex oleo aliquo tenui, cicino sollicit, aut rapianino, aut Sicyonio, aut veteri, & maxime Sabino, ad alopecia accōmodatur. Tum barbā tardius nascentē, in eorum aliquo, nec minus lenissimum maceratum, elicit.

#### Agnos, Vitex.

*Agnos. Vitex.*

Agnos, aut vitex, fruticosa illa planta, calidus quidem & siccus est tertio ordine: verum multū tenuis substat: tum gustu acris simul & astringens: ipsas tamē vitices ad medicinam habet inviles. Ceterum folia, semineq. & flos, calida siccatq. sunt facultate, nec nō tenui substatia: quare sepe nobis sunt viui. Porro semen edēdo est: tam perspicuo tamen calicis, vt capiti dolorem hoc nomine pariat: quanquā si id fringatur, minus caput tēat. Vtcanq. autem sumatur, flatus ventris discutit. Præterea tum semen, tum flos, tum folia, venereas interperitias compescunt. Quare nō tantum esā potius cōferre ad castitatem videntur, verum etiam substrata: vnde planta ipsa, agnos, hoc est, casta vocat. At ruta quā agnos, magis quidem excafcatoria & exiccatoria existit. Ad hæc, agni quidem semē ac germiua, modicam astrictionē ferunt: at ruta vbi auerit, exa est amara est & acris: quandiu verō humida fuerit, subamara. Nulla tamen aueritias aut acerbitas illi inest, aut illa certē obfusissima. Quocirca & ad tētur & lenē indurata & obstructa, agni semen potius quā ruta competit. Præter dicta autem agnos & mensis mouet, & indurata digerit, & lasitudinem tollit.

*Vitex venereas interperitias compescit.*

*Ruta facilius.*

*Vitex astrictionē citius, non flos promouet.*

*Agnos. Gramen.*

#### Agrostis, Gramen.

Graminis radix modicē frigida est & sicca, mordacitatē quandā raiquā, & partium tenuitatē obtinens. At herba ipsa primo quidem reces su refrigerat, in humiditate verō & siccitate existens quammoderata.

#### Gramen esculentum.

Eius radix est modicē frigida & sicca: proindeq. cruenta vlcera gluniat. Ipsa autem herba illa non veliementer refrigerat, in medio constituta humiditatis & siccitatis. Radici porro mordacitas & tenuitas quædam exigua inest, qua nimirum lapides frangit, si quis eam decoctam bibat. At semen alterius quiddam esculentum est: eius verō quæ in Parnaso nascitur: vinam ciet, ac fluxus vētris & stomachi refecit. Vis enim eius est exiccatoria, tenuium partium, & subacerva.

#### De quatuor Anchuis.

Onoclea quam vocant, radicem habet admodum refrigerantem, desiccantem, astringentem, & subamarā, corporibus condensandis & modicē extenuandis idoneam: tum abstergeōdis quoque & abluendis biliosis & falsis fucis. Quare aurigini & lienosis est vtilis. Præterea cum pollesta illa, iuuat erysipelata, & abstergit nō modō epota, sed etā admoda exarsens: proinde aceto macerata vitiligines & lepras sanat. At folia ipsius herbe imbecilliora radice sunt, non tamē ad refecationē & astrictionē aliena. Itaq. profusius sanāt cum vino pota. Lycopos nominata, refrigerat etiam & siccat, similiter erysipelatus con-

*Anchusa quatuor species.*

*Onoclea quid. morbo conuenit.*

*Lycopos.*

gruit. Cæterum radicem quā onoclea magis astringentē fortitur. Onochilo cognominatq. vis & calidior & medicamentis osior inest. Quare eos qui à viperis mori sunt, admodū iuuat, tum illata, tum suspēsa, tum esā. Reliqua verō quæ quarta est, & parua, ceteris est calidior, amarior, & me dicant: ac proinde ad lutos lumbricos idonea, oxybaphi mēsurā cū aſturno & lyſſopo epota.

#### Agarica radix.

Primō quidē gustu dulcis, sed paulō post subamara apparet, acrimoniæq. & astrictionis leuicula: quandā specē tēporis spacio inducit: estq. cōsistentia laxa. Quare composita hæc radix est ex substantia aërea & terrea, a calore extenuata. Minum aut habet essentia aqueæ. Hæc ratio- nē & digerendi vim possidet, & crassitudinē incidēdi, tum anfractus viscerum expurgandi. Idcirco regio morbo laboratē ex obstrucone ie cinoris, necnon morbo comitiali obnoxios, sanatur: tum rigores per circuitus recurrentes, ex crassitudine visciditū humonibus ortos exterminat. Iuuat & morios à bestis frigore læditibus, aut cōpūctos, tum fortis in aſſecta parte impositus, tum intro in corpus assumptum, pondere drachmæ vnius cum vino diluto. Est etiam & purgatorius.

#### Agaranton.

Facilitatē digerendi habet, & leniter quādamtenus phlegmone liberandi.

Adiantum, Polytrichum, Callitrichum.

#### Vulgo capilli Veneris.

In calore & frigore symmetrū est, siccāt tamē, & extenuat, & digerit. Caput ex alopecia glabellū, capillis vestit: strumas & abſcessus digerit: epotū iapides frigit: viscidiorū crassiorūq. e pectore pulmonēq. excretionibus, nō mediocriter confert: ac deniq. ventris proſuium soluit.

#### Aizoon, Sempervivum.

Aizoon vtrūq. tum maius, tum minus, deficiat quidem leuiter, vtpote astringēs modicē: est tamē ex tertio ordine refrigerantium, in eōq. aqua cōsistentia præpollat. Quare ad erysipelata, herpes, & phlegmonas à fluxione ortas accōmodatur. Aegilops, Avena.

Digerēt vim obtinet, exstēs leniter acris. Vnde phlegmonas induratas, & aegilops sanat.

#### Aera, Lolium.

In principio tertij ordinis excafcantiū, secūdi verō extremo exiccantiū consistit, sic vt accedente magis quā iris, naturæ acrimia videatur: à qua tamen essentia: tenuitate relinquitur.

#### Aegyros, siue populus alba.

Populi flores calidi sunt in primo recessu, paulūq. ad ficius declinant, sub biliorūq. potius q. erasiorū sunt partium. Floribus similia sunt folia, licet imbecilliora. Refina etiam floribus similem facultatē, sed calidiorē obtinet. At semen, tum refina, tum floribus sub biliorū est partū, & exiccantiū: non tam multo calidius.

#### Acacia.

Acacia & planta ipsa acerbā est, & fructus, & succus: q. lorus acrimoniā deponit. Porro si paritū illinatur, protinus eam sicciorem atq. contractam reddit: estq. tertij ordinis exiccantiū, & secūdi refrigerantiū, vbi quidem elorus fuerit: alioqui si illorus sit, primi. Est autem consistentia terreus, habetq. in se partes quasdā aqueas, necnon

*Onochilos.*

*Anchusa quatuor species conueniunt. Latius libetius paratur.*

*Agaricum radi- cem esse vnde Galenus.*

*Agaricū facili- tatem digerendi.*

*Agaranton.*

*Adiantum. Polytrichum. Capilli Ven.*

*Aizoon. Sempervivum.*

*Aegilops. Avena.*

*Aera. Lolium.*

*Aegyros. Populus alba.*

*Acacia facili- tas.*

necnon alias tenues & calidas.

Aculeph. Vrtica.

Huius herbe tum fructus, tum folia, admodū digerētia sunt facultatis, adeo vt phlymata & pa-  
rotidas sanēt. Sed & quiddā statuosum exhibēt,  
dum coquantur, quo excitantur venerē, & ma-  
ximē vbi semē cum multo lebitur. Quōd nō cal-  
faciat vehementer, sed nimis tenuium sit partū,  
testimonio est crassior ex pectore educio: tum  
puritus quem in partibus excitat. Porro subdu-  
cit ventrē inllatione magis quam purgatione.  
In vniuersum, quæ exiccari citra mordicationē  
postulant, ea conuenienter persanat.

Acanthos. Spina vulgans.

Folia quidem medioctiter digerētē faculta-  
tem obnēt: at radix exiccatoria est, & leuiter in-  
cisoria, & tenuium partium.

Acathium.

Radix huius & folia facultatis sunt excalfa-  
toris, vt & is qui conuelluntur auxiliantur.

Acanthos leuce. Spina alba.

Radix exo deficcatoria est, modicēq; astringēs:  
quamobrē & coeliacos & dysentericos iuuat, &  
sanguinis reiectiones colubet, cœdemq; illius  
cōtrahit, ac dentes dolētes iuuat, si decocto eius  
colluant. Semē tenuis essentia & calidæ faculta-  
tis est: itaq; potui dari is qui cōuellunt cōvenit.

Spina Aegyptia.

Validius q; spina alba, tum astringit, tū siccat.  
Quare, piliuū muliebre radix eius supprimit.  
Fructus verō & columellæ prodeū, & is quæ in  
sece inlata sunt: vlceraq; ad cicatricē perducit.

Acoron.

Huius radice vitmur, q; gustu modicē amarū  
est, odorēq; non iniucundo. Itaq; facultatis calid-  
æ est, & consistētiæ tenuis. Quare & vinū mo-  
uer, & lienes induratos discunt, ceratoidisq;  
crassitū detergit, extenuat. Ad qd succus præ-  
stantior existit: calidat. n. & siccat in tertio ordi-  
ne.

Aconitum pardaliancien.

Hoc putrefacit & deleret facultatis exis-  
tit: quare in cibo potius fugiendum.

Aconitum lycoctonum.

Est & hoc similis alteri facultatis: sed pecalia-  
riter lupos interficit, vt illud pardos.

Acte, quā fabicum: Chamæactæ, quam

Ebulum vocant.

Vtrāq; potentiam habet & deficcandi, & con-  
glutinandi, necnon digerendi modicum.

Alum.

Semen simul & lac hæc planta gignit, estq; gu-  
stus acris & subastringentis: ex quibus cōstat i-  
plam esse dissimilare. Maior ramens pars eius tē-  
perate est calida, cum humiditate incoflecta, & le-  
uiter statiosa.

Aloe.

Hæc herba, optima in India nascit, cuius liquor  
est id qd ad nos importatur, cognominatū aloē,  
medicamentū ad plurimas res, propter siccitatē,  
mordicationem experit, vtile. Quod quidē astrin-  
git modicē, sed fortiter amarū est: ac pinde sub-  
ducit ventrem. Est autem tertij ordinis exiccanti-  
um: calfaciendū autem, aut primi intentū, aut  
secundi remissū. Ad hæc verō, gratum est ventri-  
culo medicamen, vt si quid aliud: & unus gluti-  
nat. Sanat vlcera quæ græ ad cicatricem perdu-

ci possunt. & maximē quæ in ano sunt & puden-  
do. Confert similiter si maceretur aqua, ad eorū  
phlegmonas, necnon eas q; in ore, naribus, ocu-  
lisq; oborunū. In summa, repellere & digerere  
simul potest, cum hoc vt paulum extergeat, quā-  
tum videlicet vlcibus puris non sit inolectum.

Alysson.

Nuncupata est hæc herba Alysson, q; mifficē  
iuuet moriōs & cane rabido. Sed rabienū quoq;  
data, sepe in totum sanauit, ob totius substantiæ  
similitudinē. Siccat autē digeritq; medioctiter,  
ac præterea detergit nōnihil. Quæ ratione vitib-  
ginem, & ephelin purgat.

Alfine, Auricula muris.

Hæc quum essentia sit aqueæ, citā astrictionē  
tum refrigera, tū lumentat. Quare ad seruētē  
phlegmonas & medioctia erysipelata confert.

Amaracon, Maiorana.

Calfacit quidē in tertio ordine: in secūdo autē  
siccat.

Ambrosia.

Illius vim habet astringentem, ac repellentē.

Ami.

Eius semen est admodum vtile. Quam enim  
sit subamarum & acre, cōstat ipsū & digerere,  
& provocare vrinæ. Calfacit autē, resiccatur in  
tertio ordine intenso.

Amaranthum.

Facultatis est incidentis & extenuādis. Quare  
coma eius cū vino pota, menses educit: omnesq;  
pota fluxiones deficcit: stomacho insecit. Gru-  
mos enim sanguinis dissoluere creditur.

Amurca.

Ex secūdo est ordine calfacientiū: at siccantiū  
intenso quodāmodo magis, terrēstris substantiæ  
quum sit. Sic & vlcera corporum tēperatura sic-  
corū curat, quæ verō in aliis omnibus sunt, exa-  
sperat, perinde vt resina, pix sicca, & bitumen.

Ampeloparabon, Porrum agreste.

Est enim herba hæc porri agreste: ob idq; 2-  
40 etius eo, atq; siccus, vt agrestia omnia hortensia  
bus. Proinde stomacho quā illud nocentius.  
At crassos & lentos humores potius incidit, vā  
lenniusq; infarsitæ organis obstructione liberat.  
Hæc quoq; ranone sepe pvoctat vrinæ, vbi d  
crassus & lentis retinebat humorib. Adeo verē  
est calidū, vt illius caraplasmati ritu, exliceret.

Ampelos agria, Vitis agrestis.

Racemi eius extergēdi vim possident: ac pini-  
de cuns extimæ vlcera purgare possunt. Sed a-  
50 strictionem quandam fortitur extrema germi-  
na, quæ & sale conditi assolent.

Ampelos hemeros, Vitis satius.

Vitis cultæ asimilis facultas est agresti, sed ad  
omnia imbecillior.

Ampelos leuce, Vitis alba, Bryonia.

Prima huius germina vere edi solit, edulium  
vtriculo propter astrictionē acceptū. Cæterim  
subamarā, & modicē acré astrictionem possi-  
dent: quare & vrinam modicē ciunt. At radix &  
abstergentem, & deficcantem vim habet, & mo-  
deratē calidā. Quamobrē & lienes induratos li-  
quat epota: cum scibilibus foris imposita, pforā  
& lepram sanat. Porro fructus eius, racemi spe-  
ciem præferens, is qui coria deplant, est vtilis.

Ampelos melæna, Vitis nigra.

Vocatut autem hæc proprie Bryonia, prædi-  
Yy in

Aloi quibus af-  
filiis conferat.

Alysson mersa  
à cane rabido,  
rabienūq; i-  
plum sanat.

Alfine,  
Auricula muris

Amaracon,  
Maiorana,  
Ambrosia.

Ami.

Amaranthum

Amurca vitæ.

Ampeloparabon,  
Agrestia oom-  
ma esse et vici  
hortensium.

Ampelos agria,  
Vitis agrestis.

Ampelos,  
Vitis.

Ampelos leuce,  
Vitis alba,  
Bryonia.

Ampelos melæna,  
Vitis nigra.

Et ad omnia similia, nisi quod imbecillior.

### Amygdala.

*Amygdalorum  
vires.*

Quæ quidem palam amara sunt, omnino extenuat vim possident. Siquidem ephelim purgat, & excretionibus, ex pectore pulmones, crassiorum lentiorumque humorum mirè auxiliant. Obstructio nes præterea iecinoris à crassâ & viscidâ fuccis ortas expedit. Quin & lateris, & lienis, & coli, & renis dolores, ab huiusmodi causâ natos p sanât. Ipsius arboris etiâ radices coctæ illarum, ephes purgat. Porro amygdala dulcia, & ipsa nonnulli forniunt amaritudinis, moderatè sunt calida. Ammoniacum.

*Ammoniacum.*

Cuiusdâ ferule est lachryma, inteream emollit à vim possidens, ad eò vt articulorum topicos dissolvat, & lienes induratos sanet, & claudas per halitû digerat. Amomum.

*Amomum.*

Acoro similè facultatè obinet, nisi quod acorû siccior sit, maiore autem concoquendi vi amomû.

### Anagallus.

*Anagallus viri-  
giss. facul. ten.*

Anagallis vtrâq. & q. cæruleâ, & quæ purpureâ fert florè, extergens est facultatis. Habet verò nonnihil etiâ caloris, & quandâ trahendi vim, quæ corpori infixa extrahunt. Succus earû ex naribus purgat eadem de causâ. In summa, deficcandi vim habent citra mordicationè. Quamobrem vulnera glutinant, & putrida corrigunt.

### Anagyris.

*Anagyris facul-  
tas.*

Frutex est grauior olèis, & digerens, exalfacièntis facultatis. Cuius folia viridia tumores reprimunt: at resiccata, incidens sunt exiccantis potètia. Similè ferè vim habet eius radice cortex. Semè aut sublior èst partiu, vomitû trahit, p vocat Androsamum, officinis Mille pforata, Hispanis Coracillo, hoc est, corculum.

*Androsamum.  
Millepforata.*

Mania est fruticosa, natura duplex. Vnum est dicitur Ascyron, species hyperici: alteru à quibusdâ appellatur Dionysias. Est autem semè eorû purgatoriu: foliorû verò facultas modicè extergens & deficcans, vt & ambusia curare credetur. Cæterum in vino austero decocta, vini ipsium vulnerum grandium glutinatorum efficiunt.

### Androsaces.

*Androsaces.*

Amara & acris est herba. Potest autem resiccata ebibitâq. tum ipsa, tû fructus eius, magnopere provocare vrinâ, & nimiru etiâ digerere & deficare. Andrachne, Portulaca.

*Andrachne.*

Frigida & aqua est tepere, paucæ particeps austeritatis: pinde fluxiones repellit, maximèq. biliosas & calidas. Estq. tertij ordinis refrigerans tû humectantiu aut secundu. Quare maximè estiuantes adiuuat, tum vètris osculo imposita, tû ly pochydris: ac præcipuè in febribus, hæcticis. Præterea deniu stuporè lenit. Quoniam aut restringit, vilius dysentericis edis, & muliebri pfluio, & sanguinis reiectionis. Sed ad hæc sanè multo est quàm herba succus ipsius efficacior.

### Anemone.

*Anemone.*

Radix cõmansa pituitâ evocat: succus è naribus, purgat, & oculorum cicatrices extenuat. Insuper sordida vlcera anemonis expurgant, & lepras de trahunt, mensisq. appositæ eliciunt, & lac trahunt. Anethum.

*Anethi facultas  
ten.*

Ad eò exalfaciat anethû, vt habendû sit aut secundij ordinis intensu, aut tertij remissi. Exiccantis verò ordinis est secundu incipientis, aut primi

finientis. Itaq. meritû in oleo decoctum digerit, dolorem sedat, somnum cõciliat, crudos humores concoquit. Vtium autem, tertij ordinis tum calfaciennium, tum exiccantiu sit. Proinde vicèribus nimis humidis, pdest, pnsamû illis quæ in pudentia cõsistunt. At quæ in præpuri sunt inveterata, ea, pbe cicatrice inducit. Cæterum viridè humidius & minus calidû est: itaq. magis cõcoquit, & somnum conciliat, sed minus discutit.

### Anthyllus.

10

Anthyllis vtrâq. modicè deficcant, vt & vlcera glutinet. At quæ chamæpityi a similia est, subtiliorum est partium, magisq. detergit, præterea comitialibus competit.

*Anthyllus vtrâ-  
que.*

### Anthemis, Chamæmelum.

Calfacit, & deficcant in primo ordine, estq. tenuium partium, ac promide digerendi, laxandi, & rarefaciendi vim obinet.

*Anthemis,  
Chamæmelum.*

### Anisi semen.

20

Calfacit et siccant in tertio ordine. Proinde vrinam mouet, ac digerit, flaridq. ventris reprimat.

*Anisi semen.*

### Austrinum, Anarium.

Semen habet invile, estq. cû bubonico similis facultatis. Aparine, Philanthropos.

*Austrinum.*

Modicè extergit & deficcant, habetq. nonnihil subtiliû partiu. Apios, Pirus.

*Apios,  
Pirus.*

Piri folia pariter & ruriones, austera sunt. Ex fructu autem, pars vna terrea est, alia aquea. Cæteru vtrâq. frigida, necnò alia temperata. Proinde est pira Romacho grata sunt, & sitim prohibent. Illa aut deficcant, modicè refrigerant. Vnde etiam vulnera glutinant.

*Apios,  
Pirus.*

### Achraden, Pira sylvestria.

Magis quàm pira reliqua astringunt & deficcant: ob idq. maiora vulnera glutinant, fluxidq. reprimunt.

*Achraden,  
Pira sylvestria.*

### Apocynum, Cynocrambe, Cynosorum,

30

Syluestres mercurialis.

Canibus iuxta & hominibus est venenû, herba grauior olens, ob idq. vehemèter calida: nò tamen proportionè deficcant. Itaq. illa, admodum digerentis est facultatis.

*Apocynum,  
Cynocrambe,  
Cynosorum.*

### Argemone.

Ethiuis herba facultas absterfiora est, & digerens. Arisaron.

*Argemone.*

Multò minus estaro. Radicè habet oliuæ magnitudine, sed multû est ipsa acris.

*Arisaron.*

### Aristolochia.

40

Radix eius est amara & subacris. Sed ex illis omnium subtilissima est, quæ rotunda. Aliarû verò durû, quæ demanius appellatur, fragilior est, infirmior tamen. Ar longa, tenuitate quidè à rotunda vincitur, abstergendi tamen calfaciendiq. & ipsa potentiam obinet: minus sanè quàm rotunda abstergens & digerens, sed nò minus calfaciens, imò forsân plus. Itaq. in quibus vsus est modicè absterfioris, cõmodior est longa: vtpura in vlcibus carne implendis. Ar in quibus crassum humorè validius extenuare oportet, illic vsus est rotundæ. Proinde dolores à crasso spiritu inductos, rotunda exactius persanat, extrahit spicula, putredines corrigit, vlcera sordida purgat, dætes & gingivas splèdidas facit: auxilio est asthmaticis, singulisientibus, comitialibus, padagriticis, si cum aqua bibatur. Tum ruptis & convulsis, vt si quid aliud, medicamentum idoneum est.

*Aristolochia  
triplex.*

*Aristolochia  
rotunda abster-  
da opus.*

### Arceuthus,

Arceuthus, Iuniperus.

Calida & sicca est tertio ordinis. At fructus, si-  
militer calidus est: sicque tamē in primo ordine.

Arctium.

Quod Thapsia Vrbasco est simile, radice tene-  
ra, candida, dulci, caule obliquo & molli, semine  
cymino simili, tenui est partium: ob idq; facul-  
tatis modicē exiccans & extergens. Quamob-  
rem radix ac semē eius in vino cocta, quadante-  
nus denū dolores mitigant. Porro ambusta &  
chymethila non horū modō decoctū, sed & cau-  
les teneriores sanare possunt.

Arctium aliud, Lappa maior, Bardana.

Digerit simul & desiccatur: astringit tamē adni-  
hil: unde folia eius antiquis vlcibus prosunt.

Arnoglosson, Plantago.

Refrigerat pariter & siccatur in secundo gradu  
haecq; non nihil austerum, ratione terrearū par-  
titiū. Porro medicamenta, q; cum hoc quod refri-  
gerat, vna enī astringūt, ea & ad vlcera rebellia  
omnia, & ad fluxiones & putredines cōueniunt,  
ac proinde & ad dysenterias. Nam & sanguinis  
plurima sistant, & si quid aduertat, refrigerant.  
Tum sinus quoq; glunūt, & alia vlcera recēna  
simul & vetera. Atque in omnibus ferē id genus  
medicamentis primas tenet, aut certē nulli secun-  
dū est arnoglossum, ob tēperatū symmetriā &  
cōueniētiā. Nam siccitatem obtinet mortuus ex-  
pērtē, & frigiditatē quē nouū stupesciat. Fru-  
ctus enām & radix similis sunt facultatē, nisi q;  
tum sicciora, tum minus frigida. Quin & semē  
subtilū est partiū: radices verō crassiorū. At her-  
bae folia exccata subtiliū partū existunt, & mi-  
nus frigida facultatis. Radicibus vnt ad dep-  
nium dolores tum mandentes, tum collationib;  
incoquentes: praeterea & acinoris renūq; ob-  
structiones non has tantū adhibent, sed folia  
quoq; & multo magis semina.

Arum.

Mediocre extergēdi vim possidet, estq; pri-  
mi ordinis calfacientium & exiccantiū. Radice  
eius comest mediciter humorū crassitie inedi-  
dunt, ita vt sint excretionib; ex pectore idonee.

Artemisia.

Duplex est, vtrāq; tamen calfacit secundo or-  
dine: intensio autem primo, aut secundo remissa  
desiccatur: estq; tenuiū partium: unde calculi res-  
sio, vteriq; somētationib; haud mediocriter  
congruunt.

Afarum.

Radices eius facultate similes radicibus aqori  
sunt: intensiores tamen.

Aclepias.

Huius nondum nos periculum fecimus.

Alpalathos.

Acris simul & astringens est. Quare partibus  
quidē suis acribus exalfacit, austeris verō refri-  
gerat. Itaq; vtriusq; ratione desiccatur: unde ad pu-  
teridies & fluxiones est vnus.

Alparagus petrius.

Abstergendi vim habet extra manifestam cali-  
ditatem aut frigiditatē. Hinc tenes ac iecur infar-  
ctū liberat, & maxime radices eius, & semē quia  
& denū dolores sanat.

Aplenum.

Tenuium quidem partium, nō tamen calida

est herba. Hac vniq; ratione lapides frangit, & lie-  
nes liquat.

Astragalos.

Radices astrictiores forsitur: quare nō infre-  
nue siccatur. Nā & vlcera glutinat, & eluuiū fluen-  
tem sistit, si quis in vino decoctam radice bibat.

Aster aticus, Bubonium.

Partim quidem digerens est, partim autem re-  
frigerans: verum id non astringit.

Astaphis, Vva passā.

Cultra quidem, cōcoquendi, astringendi, & le-  
uiter digerendi, facultatē obinet. At agrestis, &  
hementer scris existit, a ded vt ex capite puerget,  
abstergētiq; valenter. Itaq; ad pforam accommoda  
est. Sed & vrendi vim habet.

Alphodelus.

Huius radix extergens est facultatis. Vñ autē  
cinis, calidior, exiccantior, subtilior, ac digerere  
potentior existit: ac proinde alopecias sanat.

Attactilus, Cucis agrestis.

Fa cultatem habet desiccandū, & modicē dige-  
rendi: exq; spinarum est genere.

Atrophax, Atrepex.

Humida quidem est in secundo ordine, frigi-  
da verō in primo: estq; aquea similiter malua.  
Quin & ventrē celeriter pmeat, vt illa, ob lubri-  
citatē. Hortēses sūt atrepex & malus, q; agrestes,  
sū humidiores sunt, tum frigidiores: pinde phle-  
gmōis & phlegmatis in capētibus, horatēses: vi-  
gennibus aut & declinātib; agrestes magis cō-  
ueniūt. Semen eius abstergēdi vim habet. Itaq;  
icteriq; ab obstructione iecinoris ortū auxiliat.

Aphace.

Astringit, edirēq; vt ipsa lenticula: agrius ta-  
men cōroquatur. Ceterū valentius desiccatur,  
moderati calorē est.

Abfenthium.

Astrictiorā, amarā, & acrem qualitatem for-  
tetur, exalfacit, extergens, roborat, & exiccās.  
Proinde biliosos ventris humores deicit, ac per  
vrias evacuat. Verū contentam in ventre pe-  
nitētiā vñ adiuuat sumptū. Sic nec si in thorace  
aut pulmone cōtineatur: nam astringēdo in co-  
fculis, quā amara, valētior est. Est autem cali-  
dum in excessu primo: siccū verō in tertio. At sus-  
cus longē quā herba est calidior.

Balanus Myreplex, Glans vnguentaria.

Succo eius, qui calidus est, vnguentarij vniū.  
Reliquiq; aut vnde expressus est succus, vincentē  
habēt qualitatē amarā, cui admixta est quā-  
damsitictio: Proinde extergentem, incedentiē,  
contrahentem, & astringentem cōsecum possidet.  
Quod si quis carnē eius draclmā pondere, cum  
melicrato bibat, medicamen expenerit vomito-  
rium. Scpe etiam per infernū alium subducit la-  
gier. Sed sienes liquat, iecurq; indurētē ita: ad  
quorum vicerum expurgationem, ex oxycrato  
ipsam exhibere cōsuevimus. Ex aceto etiam le-  
pras, pforas, lētes, vinligines, iouthos, optelium,  
exanthemata, achoras, aliōq; id genus cōsue-  
fectus exteri. Abstergenti itaq; & incidenti cū  
astrictio obinet facultatē. Cortex autem eius  
admodum astrictioris existit.

Balsamum.

Balsamū desiccatur & exalfacit secundo excessu:  
est sūt & tenuium partium, a ded vt odorati sūt.  
Eius lachryma subtiliorum est partū quā ipsa

Yy iij



Carpobalsamum

planta non tamē adeo calida ut nonnulli existimant. Fructus eius persimilis facularis est, longē tamen in subtilitate parum inferior.

Balaustium.

Balaustium.  
Cynurus.

Flos est agrestis punice, sicuti domesticarū cytinus. Valēter gustum astringit. At verō si omne astringens terreis et & frigidū, merito quis dicit nrisplum valēter & exicare, & refrigerare. Quo nomine vlcera ad cicatricē perducit. Quinetiam ad sanguinis reiectionē, dyenterias, necnō vētris vteriq; profusiva, nemo est qui non hoc medicamento vtatur.

Batus, Rubus.

Batus, Rubus.

Rubi folia, germina, flos, fructus, & radix, qualitate astringēte, neq; obscura, participat. Sed folia germinaq; recena nataplurimum in se habēt substantiā aqueā, parū verō astringētionis. Quare vulnera glutināt. At fructus maturus, nō parum habet succi calidi rēperatī, qui existit dulcis: ob idq; & ob modicam astringētionē, nō est insuavis gustui. At immaturus, acerbus est, & valide excitatorius. Ac sanē vterq; recondit, valdius quāim recens desiccans. Flos candē vim fructui immaturo possidet. Vterq; ad dyenterias, vētris profusivum, robur deperditū, sanguinisq; expulsiōnem sunt idonea remedia. Radix pręter astringētionē, nō paucam habet substantiā in se se tenuē, per quam & lapides renem comminuit.

Rubi radix comminuit lapides

Batrachium, Ranunculus.

Batrachium,  
Ranunculus.

Huius omnes quatuor species adeo acres existūt, ut cum dolore exulcerēt. Quare si cōvenienter vtare, plorā & lepras exornāt, & vngues diuellunt. Tum leprosis stigmata digerūt, & verrucas detrahunt. Quin & alopecia tuant, exiguo tempore admortę. Radix arefacta sternutatiōē provocat. Sed & dentes dolētes iuvat, sic ut eos frangat. Est itaq; valde calida & sicca, tum radix, tum vniuersa herba.

Bdellium.

Bdellium.

Quod Scythicus nominant, estq; acris & resinosius, emollitē admodum & efficacis virtutis est. Arabici autem, quod splendidius est, magis quā emolliētia exicat: videriq; in potu sumptū calculos renū frangere, tum vrinas citare, & crudorū statum discursus, præterea laterum dolores, rupturāq; sanare.

Bechion, Tuisilago, Vngula caballina.

Bechion.  
Tuisilago.  
Vngula caballina.

Tusses & orthopneas iuuare creditur, si quis folia arida aut radicem in prunis vrens, ascendentem inde fuliginē inspirato attrahat. Est autē modicē acris: ut sine molestia, noxię, omnes thoracis affectus credatur rumpere. Folia virentia partē recenti phlegmone obfessā illius adiuvant.

Bisium.

Bisium.

Holus est esculentū, humidę frigidęq; temperaturę in secundo ordine.

Bulbus sativus.

Bulbus sativus

Frigidior quidē & crassior agrestis est, lentius succum percat. Nam & coctū difficilis est & satiosus, & venter provocans. Attamen illius ob amaritudinem simul & astringētionē abstergit mul & glutinā, & nimirum etiam exicat.

Bulbus vomitorius.

Bulbus vomitorius.  
Aster atticus.  
Bubonium.

Multō est calidioris temperaturę q̄ superior. Bubonium, Aster atticus.

Credatur sanare bubonas &amp; illitū, &amp; alligatū

inguini. Digerit enim mediocriter, quia modicē est calidum. Ceterum non ita siccā, ut tendat.

Buglossion.

Humidę calidęq; temperiei est: viniq; iniectū hilarans causa esse credit. Sed gutturis etiā lenit aspredinem, si melicrato coctum sumatur.

Buglossion non amittit halaritatem parit.

Bunium.

Adeo exalfaci, ut & vrinas moueat, & menses provocet.

Bunium.

Buphrasmon.

Flos eius floribus chamæmeli est tum maior, tum acrior: vehementiusq; digerit, adeo ut & durinas sanet, cerato mistus.

Buphrasmon.

Brathy, Sabina.

Quātm in acrimonia cupressum vincit, tantū ab eo superat in astringētionē: quare illo & calidior est, & potentius digerit. Quin & similiter cupressi putredinibus accommodari potest, maxime vbi rebelliores fuerint, & diuturniores. Carbūculos esse soluit: mentisq; ut si quid aliud, essentis tenuitate provocat, & sanguinē per vrinas mouet. Fortū etiā viuētē interficit, & mortuum educit. Est autē hoc medicamē tertij ordinis tum exalfaciētiū, tum exiccantiū, ex numero eorum quę vel maxime tenuis sunt partium.

Brathy.  
Sabina.

Bretanica.

Huius folia astringētia sunt, & vulnerū glutinatoria, similia agrestibus laparlis. At expersus ex illis succus perinde natus est astringere, videriq; sanare iam putrescentia.

Bretanica.

Bromus.

Illitum desiccāt, digeritq; mediocriter & sine moris. Temperiem autem habet paulo frigidiorē. Nonnihil etiā astringētionis obtinet, ut ventris profusiva iouet.

Bromus.

Bryon thalantion, Alga.

Compositū est ex terra & aqua essentia, vtrāq; frigida. Siquidem & gustum astringit, et calidus quibuscvis illitum, ea refrigerat, adiungit.

Bryon thalantion.  
Alga.

Bryon aut Splanchnon, Muscus.

Vim habet astringētiē inuālidā, ceterum mediocriter frigidā. Nam & digerendū, & emolliēdi facularis est particeps.

Bryon.  
Splanchnon.  
Muscus.

Gallium.

Inde nomen sumpsit, q̄ lac agulet. Faculratem aut obrinet exiccatoriā, & subacri. Flos eius cōpetere sanguinis profusulis videtur, & cōbustis mederi. Est autem boni odoris, & coloris lutei.

Gallium.

Gentiana.

Huius radix efficacissimē extenuat, purgat, abstergit, liberat obstructiōē, utpote impētiā existens.

Gentiana.

Gigarta, acinorum vix nuclei.

Ex secundo exiccantiū sunt ordine: refrigerantium verō, primo. Omnibus autem ventris cum profusiuo iunctis astringētib; impēdi cōferunt, utpote quum acerbū appareant.

Gigarta.  
Acinorum vix nuclei.

Gingidium.

Gustū amarum & astringēti quā sit, temperie calidum frigiditūq; videtur. Secundū vtrāq; verō qualitatē desiccatoriū est. Ceterā porro stomacho amicum existit.

Gingidium.

Glaucium.

Astringit cum quodam fastidio: tum adeo insigniter refrigerat, ut solū sæpe erysipelat, si valentia nō fuerint, curare possit. Constat enim ex aqua terreisq; substantia, vtrāq; frigida.

Glaucium.

Glaux

*glauca herba.* Ex lacticiis quum sit, calida quodammodo humiditas fuerit.

*Glauca. Pulgium.*  
*halysom.* Quando gleichen acris & subamar est, valde extenuat & calfacit. Quare & illa rubricat, & exsiccat si diutius lixetur. Quinetiam humida, crassa, & leuiter, ex thorace & pulmone excreta facit, mensisq; mouet.

*Glauca. fringenta balneorum.*  
*Strophomella. Glycyrrhiza. Dulcis radix.*

*Strophomella. Glycyrrhiza. Dulcis radix.*  
Similiter radice ipse succus, dulcis leuiterq; astringens exiit. Proinde non modo asperae arteriae, sed vesicę etiam scabietis leuire potest, idq; temperaturę mediocritate. Quare fucit sanę natura eius familiaris nostrę temperature. Ceterum tepidam quandam caliditatem sortitur. Porro quoniam temperie quoque est humidum, id quod modice est dulce, iure sanę etiam si congruens medicamentum est, nimirum modice humidum, humanę natura frigidius. Dioscorides ait, arefactę radice pollinem vnguib; oculorum mederi.

*Dolcis modice est, humida. Glycyrrhiza fucit sanę.*  
*Glycyrrhiza. Dulcis radix.*

*Glycyrrhiza. Dulcis radix.*  
Radice habet leuiter astringentę, cum quadam dulcedine: at si plussculi deitibus mandas, acrimoniam item quamquam subamarę subesse percipies. Proinde menses ciet ex melicrato, amygdali pota quantitate. Expurgat porro etiā secur obstruētiā, & renes: ventriq; sistit fluxiones, si in aliquo austero vino cocta sumatur. Est præterea omnino resicatoria: quare ex collo puera suspensa, merito eo multalē morbum persanat: idq; aut aliquem a se fluorem per infantulū inspirationē immittēs, aut aciem alicuius murtis, atq; alterum reddens. Nam hoc pacto fucus Cytenaicus columellam phlegmone affectam iuuat: & melancholicū frictū palam catarrhos & coryzās deficiat, si quis id in calidum linteam rarum liget, asiducę calorē ex eo per inspirationem in nases attrahat. Quinetiam si compluribus lino, & maxime marinę purpurę collo viperę iniectus, illis viperam præfoces, eaq; postea culuspiam collo obvincas, mirifice profuens, tum paritissimē, tum omnibus usq; in collo expullulant. Pronia itaq; & exsiccat, & tenuiū est partium: calfacit autem mediocriter.

*Pennis appropinquat remouit morbum profanat.*  
*Cytenaicus fucus. Melancholicus.*

*Vincula quib; præfocant vi prius, cetero murtis guttata.*  
Gnaphalium. Folia eius modice astringūt: quare ex aliquo vino austero dysentericis profunt.

*Gnaphalium.*  
Gongilis, Rapum.

*Gongilis. Rapum.*  
Gongilidis semen venerē excitat, utpote splritum stasosum gignēs. Sic & radix coctū distichalis est: in illisq; & semen generat.

*Damaconium. Alisma.*  
Decoctum radice eius calculus renū comminuit. Quare absterforis facultatis est particeps.

*Damaconium. Alisma.*  
Daucus, Staphylius.

*Daucus. Staphylius.*  
Domesticus esus aptior, sed imbecillior, acre caliditasq; facultatem sortitur: ac prouide etiam extenuat. Ac radice sanę stasosum quide obtinet, ac venerit. Semen autem, domesticū quidem, & ipsum quandam ad Venerē ciendi potentia possidet: agrestis verō planē stari caret, ac prouide vrinam mensisq; ciet.

## Dauci semen.

*Dauci semen.*  
Adēo vehementer excalfacit, vt inter primā, tū vrinā, tum mēses provocet. Multum etiam di gerere per haliū foris impositum valet. Ipsa verū herba, moderate calida est, supilem; etiā vim obtinet, ceterum infirmiore.

*Daphne arbor, Laurus.*  
Huius folia calfaciunt & siccant vehementer: at fructus ad huc vehementius. Radicis cortex inus quidem acris est & calidus, ceterū plus amarus: habetq; etiā astringentis nōnihil. Quamobrem & calculos confringit, & icori prodest. Bibitur ac vino fragrate trium obolorū pondere.

*Daphne herba, quam Alexandrinā appellat.*  
Evidenter est calida, acris, & subamarā, potaque tum vrinam, tum menses prolicet.

*Chamaedaphne.*  
Per similia quide est vrinis daphnæ Alexandrinæ: sicut & quod daphnoides vocant.

*Chamaedaphne.*  
Dictamnium.

*Dictamnium.*  
Tenuiori essentia consistit quā pulgium, cetera illi simile. At pseudo dictamnū ad omnia vim beccilius exiit.

*Dipsacos.*  
Dipsaci spinæ radice ex secundo ordine exicata toria est, habetq; nōnihil & absterforium.

*Dorychidion.*  
Aquea excedit frigiditate. Quamobrem pauculum quidem saporē conciliat: plussculum verō sumptum, perimit.

*Dracontium, Dracontulus.*  
Quiddāaro persimile obtinet, tum foliis, tum radice. Ceterū illo acrius est, & amari: ac pinde calfactorium magis, & tenuioribus partib;.

*Dracontium, Dracontulus.*  
Habet etiam & astringentem leuissimā. Radix omnia viscera expurgat, opumūq; remediū, est connumaciū vicerum. Verum extergit etiam cetera omnia quę extersionē desiderant. Folia præterea similem facultatē sortiuntur, ob id q; si sint viridia, recentia vulnera glutināt. Fructus valehior est, non folius tantum, sed radice. Itaq; & can crop; & polypodas credidit eliquare. Succus eius quoq; vitia oculorum expurgat.

*Dryopteris, Filicula.*  
Dulcis, acris, amara, & in radice etiam acerba exiit. Habet aut facultatē purificandi: prouide pilis glabram eum efficit.

*Dryopteris, Filicula.*  
Drys, Quercus, Robur.

*Drys, Quercus, Robur.*  
Exiccandi astringendiq; possidet facultatem, cum mediocri quadam tepiditasq; caliditate. Ceterū plus ceteris eius partibus astringit, quę in trunci cortice membrana subest: tum quę ipsius fructus cōstitit carnē. Quamobrem ad prodiū muliebrem, sanguinis expunctiones, dysenterias, & diuturnos ventris fluxus esse credunt accōmodam. Valentius tamen astringunt saguis & ilex. Quarum plantarū folia tenella illata non infrequē deficiāt, nec non vulnera glutināt. Eandem foliis vim habet & spūctus robotis: cōg Medici nonnulli vrinam ad incipientes atq; crescentes phlegmonas.

*Althea, Agrestis malua.*  
Facultate digerendi, laxandi, phlegmone liberandi, mitigandi, & concoquendi difficles coctū affectus est prædita. Ceterum & radice & semen quā foliis, & tendiorum sunt partium, magisq;

*Althea, Agrestis malua.*  
Ebisus, Althea, Agrestis malua.

*Ebisus, Althea, Agrestis malua.*  
Ebisus, Althea, Agrestis malua.

*Ebisus, Althea, Agrestis malua.*  
Ebisus, Althea, Agrestis malua.

*Ebisus, Althea, Agrestis malua.*  
Ebisus, Althea, Agrestis malua.

*Ebisus, Althea, Agrestis malua.*  
Ebisus, Althea, Agrestis malua.

*Ebisus, Althea, Agrestis malua.*  
Ebisus, Althea, Agrestis malua.

*Ebisus, Althea, Agrestis malua.*  
Ebisus, Althea, Agrestis malua.

*Ebisus, Althea, Agrestis malua.*  
Ebisus, Althea, Agrestis malua.

*Ebisus, Althea, Agrestis malua.*  
Ebisus, Althea, Agrestis malua.

*Ebisus, Althea, Agrestis malua.*  
Ebisus, Althea, Agrestis malua.

*Ebisus, Althea, Agrestis malua.*  
Ebisus, Althea, Agrestis malua.

*Ebisus, Althea, Agrestis malua.*  
Ebisus, Althea, Agrestis malua.

exicatoriam & exterforiam facultatē ostendūt, vt & vitilignes detergant, & semē renū calculo frangat. At radice decoctum, ad dyenteriam, diarrhœā, & sanguinis reiectionem est aptum, quum nimirum etiam nonnihil astringat.

Ebenus.

*Ebenus.* Ex his lignis est, quæ trita in aqua solunt. Vis ei inest excalcificandi, extergendi, & tenuiū partium. Quamobrē, quæ pupillis offuscant, extergere creditur: macteturq; aliis ocularibus medicamentis. *Elæa, Olea.*

*Elæa.* Oliuæ rami quantum habent astrictiōnis, tantę sunt frigiditatis participes. Fructus verō, si qdē ad vnguē maturuit, moderatē calidus est: sin im maturus, magis tum astringit, tum refrigerat.

Elæon, oleum.

*Elæon.* Oleum quod ex oliuis exprimit, humectatorium esse, & moderatē calidum, iam suprà docuimus. Eiusmodi est, quod est dulcissimū: frīg potissimum ex oliuis quas druppas appellant. Ceterum quod omotribes & omphacinum nuncupant, quale ab Hispania velitur, id quantum in se habet astrictiōnis, tantum etiam illi inest frigiditatis. Porro oleū vetus quod quidē ex dulci in veterato efficitur, & calidius est, & potentiorib.

*Olea diffinitio.* ad evaporandū vinibus: quod verō ex crudo, id, dum reliquū quippiam seruauerit astrictiōnis, mixtę permanet facultatis: vbi verō illam prorsus abiecerit, reliquo evadit simile. Quinetiam quicumq; in præparando ramos iniciunt, in omni placino simile oleum efficitur. Porro quod oleum lotū minimē omnium mordacitatem continet, suprà etiam traditum est. Sunt autem varia oleorum genera: quibus sanē cicinum & tenuius, & ad discutiendum potentius est, quam si nullū oleo ex oliua vestito. Raphaninum autem, cetera huic est simile, sed calidius tamen. At hoc etiam calidius sinapinum: cui simile est qd ex melanthio conficitur. Pugnār cum istis myrtinum & sesaminum, tum quod astringant, tum quod crassiora sint partium. Mixtę facultatis est leniscinum, terebinthnū, & mastichinum. Non enim tantum emolliūt, sed & astringunt. Amygdalinum porro amaritudinē exasperantem possidet, ceterum cuiusdā astrictiōnis est participes: non tamen caryinum, sed id vel maxime simplicis est digerendi facultatis. Calidius eo est laurinum, & hoc etiam magis, cedrinum. Proximum ei est qd ex nigra pice conficitur. Dadiuinum, minus quidem laurino calidū, verum valētius desiccans. Hyoscyaminū verō mixtę facultatis est; emolliendū videlicet, ac refrigerandi. Oleum porro cicinum, ventrem subducit. Hoc verō magis, qd sit ex Gnadio grano. Quod ex agresti oliuā exprimit, extergit, similēq; astringit. Squalidissimum tū id est ex omni olei genere: & post, Ithricum quodq; deinceps illis Hispanum. Pinguisimum est Lybicum, & Cilicium: simul autem pingue & tenue, Sabinum. In medio comprehensorum omnia sunt, tum id quod per Cyclades insulas nascitur, tum quod per Græciam, Asiāq;.

*Oleum pingue, tenueq; quæ ratione affinitate.*

Etenim oleum pingue æstimatur viscositate: tenue verō, si pellucet, si purū sit, si pluriū minimā eius portione invngatur, si facile a cuti cōbiatur. Omne autem oleum, p cuiusq; insectorū natura variari contingit,

Elatine.

Modicē tum refrigerat, tum astringit.

*Elatine.*

Elaphobolcos.

Excalcificat, & tenuiū est partium: ob idq; exicat, maxime in secundo ordine.

Elenium, Enula campana.

Radix eius calida & sicca est cum recrementi humore. Quare eclegmatici q̄ faciunt ad educendos crassos ex pectore succos, idoneē miscetur. Iuvat etiam ad rubrificandas partes vexatas frigidis diuturnisq; affectibus.

*Elenium.*  
*Enula campana.*

Eleliphacos, Salsia.

Evidenter excalcificat, ac leuiter subastringit.

*Eleliphacos.*  
*Salsia.*

Helleborus, Veratrum.

Tam albus quam niger helleborus extergentis calcificantisq; est potentior. Quamobrē ad albos, lichenes, sporas, leprās, accōmodi sunt. Quinetiam niger si in fistulā callo indurātā infundat duobus tribusq; diebus, callū detrahīt. Denibus prodeit cum aceto coluennibus. Sunt autē in tertio ordine excalcificatium & desiccantium.

*Helleborus.*  
*Veratrum.*

Porto niger gustu calidior est, cādidus amarior.

Helbunc, quam Parthenium vocant.

*Helbunc.*  
*Parthenium.*

Absterget, contrahitq; tum humiditate subfrigida: vnde phlegmonas incipientes usq; ad augmentum sanat, maxime si calidę fuerint. Incipientibus etiam phlegmibus cataplasma rito illinitur: ad auriumq; dolores phlegmonosos succus eius instillatur, si vti ad paristhemia gargari zatus, conducit.

Helxine, quam cissampelon vocant.

Digerendi obtinet facultatem.

*Helxine absterget.*

Elynus, Meline, Panicum.

Facultate pauci nutrimenti est, & exicatoria. Siliū nonnihil ventris fluxus, vt milium. Si verō foris illinatur, exicat atq; refrigerat.

*Cissampelon.*  
*Elynus.*  
*Meline.*  
*Panicum.*

Empetron.

Ad solas purgationes esse videtur commodū, bilem ac pituitam educens: iuvat tamen ad alia, 40 gustu salum existens.

*Empetron.*

Epithymum.

Thymi facultatem habet, ad omnia efficacius.

*Epithymum.*

Exicat & calcificat in tertio gradu.

Epimedium.

Refrigerat moderatē, cum aqua humiditate. Vberibus illitū, surrecta ea seruare potest. Alius verō, si poro hauriatur, sterilitatem parere.

*Epimedium.*

Epimelia, Pomus sylvestris.

Fructus eius acerbis est, stomacho tamen in- 50 gratus, & capitis mouens dolores.

*Epimelia.*  
*Pomus sylvestris.*

Erebinthus, Cicér.

Legumen est flariuosum, copiosū nutrimentū, alio modo endē habile, ciendę vniū idoneū, lacti & semini generando aptū. Prolicet verō & menses. Ceterum quod arisethum dicitur, efficacius vinam provocat: cuius decoctū renū calculos frangit. Reliquū erebinthorū genus eadem vi pollet, puta attrahendi, digerendi, incidendi, extergēdi. Sunt enim calidi & modicē sicci: participes itē amaritatis, cuius vi & lienē, & iecur, & teneas expurgat, psonasq; & lepras, & lichenes extergunt, tum parotidas & testes induratos discutunt, tum vlcera maligna cum melle sanant.

*Erebinthus.*  
*Cicér.*

Erebinthus agrestis.

Calidior & siccior domesticū est, quantō & acrior & amarior casit.

*Cicér agreste.*

Erice.

Erice.

*Erice.* Digerendi per halitum facultatē obtinet: sed præcipue flore eius ac foliis utendum.

Herypillus, Serpyllum.

*Serpyllum.* *Herypillum.* Viqueadeo calicis, ut urinas & menses moueat. Edig & gustu admodium acre.

Erysimum.

*Erysimum.* Semen eius igneum est, & calfactorium. Vile est cū elegnatis ad promouendas crassiores expeccationes. Quin & parotidas induratas, & durinas anniquas vberum & testiculorū, iuuat: & ut Dioscorides ait, etiā occultos cæcos.

Erythrodanum, Rubia pasciua.

*Erythrodanum.* *Rubia pasciua.* Est autē nñctorū rubia, radix acerba & amara: quare lient, & iccus expurgat, & urinas crassas, multas, & interdum sanguinolētas promouet. Quin & menses ciet, extergitq; mediocriter. Proinde vitilignes albas cum aceto illa iuuat.

Eupatorium.

*Eupatorium.* Tenuum est partū, incidendū & extergendū vim, circa manifestam caliditatē, obtinet: quo circa obstructions iecoris aperit. Inest ei quiddā etiam astrictio, per quam robur visceri addit.

Euphorbium.

*Euphorbium.* Vrentem & tenuiū partium facultatē sortitur, Ephemerum, Iris agrestis.

*Ephemerum.* *Iris agrestis.* Astringit quidem, & itq; suauis odoris. Quare & repellit, & per halitum digerit. Non inefficaciter autem radix eius in dentium dolore colluit. At folia cocta in vino, phytanum augmento & statui congruunt.

Echinus herba.

*Echinus herba.* Fructus eius acerbus est, atq; idcirco repellentis facultatis & exicatoris. Vtuntur eo ad oculorum auriumq; fluxiones.

Zeia, Spelta.

*Zeia.* *Spelta.* Vniuersa sua facultate, quodammodo in medio est trini & hordei.

Zingiberis radix.

*Zingiberis radix.* Excalfacit, sed non primo statim ocurso, vel uti piper: vnde sanē & minus est subniliū partium, quā piper existimanda. Etenim illabora tam quandam, & crassam retinere in se videtur humiditatem, quemadmodū piper longū. Quare diuiniū perseuerat quæ proficitur a zingibere, aut pipere longo caliditas, quā quæ ab alio, aut nigro. Porro vbi totum corpus celerimē calfacere cōsilium est, ea tunc exhibēda sunt, quæ & celerimē a caloris nostri contactu incalēcant, & prōptissimē vndequaq; ferantur. Verum vbi partē quamvis refrigeratam recalfacere studemus, contrā agendum: nimirum quæ tædē calefētia, plurimo tempore perdurēt, ea præbendo. Cæterū licet zingiber & piper longum hac ratione a nigro pipere differant, non magna tamen est differentia. At nascitūrium, nāpi, thapsia, & agrestium columbarū stercus, maiori tempore perfectē accendunt, & plurimo tempore perdurant.

Zythus.

*Zythus.* Non parum est acrior hordeo, succisq; prauis, quā ex putredine oriatur. Est & statuosus, ac partim acris & calidus: parte verō pluitima frigidus, aqueus, acidus.

Zyme, Fermentum.

*Zyme.* *Fermentum.* Tenuiū est partium, & mediocriter calidum:

proinde circa molestiam quæ in profundo sunt extrahit & digerit. Particeps autem est aciditatis cuiusdam frigida, & caliditatis ex putredine nate. Cui accedit ea quæ a sale est, & quæ etiā a farinæ natura.

Hedyosmos, Mentha.

*Hedyosmos.* *Mentha.* Tam mentha, quā calamintha, gustu acris, & facultate calida est, ex tertio calfacientiū ordini. Inferior tamē est mentha, & minus exalta: cæterū mediocriter ad Venerem excitat: id quod omnibus accidit, quæ humiditatem femicōctam & statuosam continent. At calamintha, quā valentius calfaciat & exiccat, habet etiam quiddam amarum in se, atq; acerbum. Quare illo quidem lumbricos perimit: acerbitate verō, si cum oxycrato bibatur, recentes sanguinis reiectiones reprimat. Substantia est, ut si qua alia herba, tenuium partium.

Hedystrum.

*Hedystrum.* Huius semen amarū & subacerbum apparet: ob idque porum stomacho gratum exiit, viscerūq; obstructions expurgat. Idem præstat totius fruticis germina.

Hemerocalles.

*Hemerocalles.* Radicem habet liliū radici similem, & figura & virtus: prodēty vt illa, igni ambustis, nimirum leuiter digerens, tum nihil astringens.

Hemionus.

*Hemionus.* Astrictionem simul & amaritudinē possidet. Quamobrē cum aceto pota lientosis auxilio est.

Erigeron.

*Erigeron.* Refrigerat & modicē digerit.

Eryngion.

*Eryngion.* Calorē quidem est temperatū, nō paruum tñficatatem sortitur, consistētē in tenui essentia.

Thalictrum.

*Thalictrum.* Folia habet coriandro similia: caulē crassitudine rutæ. Vis eis inest citra morsum exicatoria: Itaq; vlcera in veterata ad cicatricem perducit.

Thapsia.

*Thapsia.* Acrē habet ac valētē excalfacientē facultatē cū humiditate coniunctā. Quare ex alto violentē extrahit, & quod extraxit, digerit: celeriter tñ corrūpitur.

Thermus, Lupinus.

*Thermus.* *Lupinus.* Premaceratus aqua, amaritudinē exiit, edig potest, sed nutrimentum fit crassi succi. Vbi verō natiua etiā nūā amaritas pmanet, extergendi, digerendi vim obrinet. Interficiat autem lumbricos, tum illis, tum addito melle linctus, tñ expositus. Quin & decoctū eius lumbricos euicere potest: tum etiā foris identidē persusum, vitilignes, achoras, exanthemata, pforas, gangrenas, malignaq; vlcera, iuuat. Expurgat iccus & lient cum ruta & pipere suauitatis gratia sumptū. Elicit menses & sortum cum myrrha & melle impositum. Lupinorū porro farina, enām mordicatione digerit: nec liuida tñrum, sed & clueras & phymata curat, si in aceto, aut oxymelite, aut posca coquatur.

Thermos agrios, Lupinus agrestis.

*Thermos agrios.* *Lupinus agrestis.* Amarior est, & ad omnia valēior domestico, eiusdem genere cum ipso fasciatus.

Thilapli.

*Thilapli.* Semen eius facultatē acré sortitur, adeo vt in termos abscessus potē difrumpat. Menses ciet, & sortum enecat, Per sedem infusum sanguinolēta

evacuatis ichthiadicis prodest: evacuatisq; superne & inferne bitem oxybaphi mensura eorum.

Thridax, Lactuca.

Thridax.  
Lactuca.

Lactuca semen  
genitum proflu-  
um coluber.

Humida & frigida est, secundum aquae fontanæ frigiditatem. Proinde ad calidas phlegmonas, & ad parvas & levis erysipelata, est comoda: præterea restituit sitim. At semen potum, geniturum profluuii colubet. Sic & agrestis lactuæ semen. Cuius holeris colligitur succus, argemas & caliginis purgans, invingit ad adfiones cum la-  
50 et muliebri solinus.

Thymum.

Thymum.

Incidit & calfacit vehementer, ob idq; urinam & menses provocat, factum evellit, potum viscera expurgat, educit ex thorace & pulmone confert, ac deniq; ex calfacit exiccatisq; io tertio ordine.

Idæa radix.

Idæa radix.

Admodum gustu est acerbæ. Quare sanguinis effusiones, henterias & dysenterias, mensesq; fluxus suppressit, tum pota, tum etia admodum extrin-  
50 secus.

Icos, Viscum.

Icos. Viscum.

Ex plurima aërea & aquea, paucissima terrena substituta consistit. Quare ex alto humores extrahit, cōsp; diffundit & digerit. Tempus autem ut calfacit postulat.

Ios, Viola.

Ios. Viola.

Violæ folia aqueæ & subrigidam substantiâ superantè possident. Proinde tum per se, tum cū polenta illita, calidas phlegmonas mitigant. Imponuntur & ori ventriculi æstuant, & oculis.

Hippuris, Cauda equina.

Hippuris.  
Cauda equina.

Astringentè cum amaritudine facultatè possidet, ac pinde valenter exiccantè, sed citra mortem. Itaq; vulnera etiam maxima glutinat, vel si perfectos esse nervos contingerit. Præterea vocat enterocelas glutinat: necnon sanguinis reiectiones, fluxus menses, dysenterias, ceterosq; alium fluxum correat. Succus verò eius prodest sanguinis eruptioni per nares, & fluxui obnoxio in ventre passionibus, ex austeriorum vinorum quopiam epotus: ac si febre teneantur, ex aqua.

Hippomarathrum.

Hippomarathrum.  
Iatis.

Vnâ cum focniculo & de ipso differemus.

Iatis.

Domestica quidem qua virtutis tinctoris, facultatis est valenter exiccatis, nondum tamè mordentis: est enim simul amara & astringens. Proinde magna vulnera corporum durorum glutinat: & sanguinis profluuii laborantibus partibus vtiliter illinitur: tumores laxos mirifice digerit, si  
50 mul ac reprimat, & adversus omnia maligna vulnera mirabiliter resistit. At istas sylvestris manifestè iam acere quiddam, tum gustu, tum actione præfert. Proinde & domestica magis deficcata, valentius etia putredinibus obstitit: ad cetera iam comprehensa deterior.

Lopyron, Phasolon.

Phasolon.  
Lopyron.

Semen habet amarum & subacerbum. Extergit itaq; & incidit humores crassos, cum hoc ut corpora contrahat, cōstringatq;. Quare excretionibus pectoris confert, & icur expurgat, cre-  
60 diturq; iuvare hæmopticois.

Itea, Salix.

Itea. Salix.

Salicis foliis ad cruenti vulneris glutinatione vti possit. Verù floribus eius maxime propè omnes vtuntur ad exiccatis emplastri preparatio-

nem. Est enim vis eorum ita deficcatoria, ut mortuæ abstineat. Habet verò etia quandam astringentem. Porro succus expressus medicamen exicatoriū existit, experitq; mordacitatis. Nec enim inventas aliquod medicamen ad plures res vtilius eo, quod citra mordacitatem exccat. Arboris cortex similè facultatè obtinet, tum floribus, tum foliis, nisi quod temperaturæ siccioris existit, vel vni omnes cortices. Etiam cinere corticis macerato in aceto, nonnulli callos atq; myrmecias tollit.

GALENI PERGAMENI  
de simplicium medicamentorum facultatibus, lib. VII.

Calamintha, Nepita.

Calamintha.  
Nepita.

Essentia quidè est tenuis, temperie autem calida & sicca, quodammodo in tertio ordine. Est enim acris gustu, paulimq; amaritudinis obtnet. Extrinsecus admodum, primum quidem valde ex calfacit & mordicat, cutemq; exvigit: postmodò etiam vlcus efficit. In corpus autè intrò assumpta, tum ipsa per se sicca, tum etia cum melerato, perspicuo calfacit, atq; sudores ciet, omnèq; corpus rû digerit, tum exccat. Idcirco ea contra rigores repetètes per circulum nonnulli vtiunt, sicut & contra ichthiadicis morbos: trahit enim quæ in profundo hærent ad superficiem, totimq; ad rû articulum exccat, & cutem non obscurè advrit, mensesq; tum epota, tum apposita, admodum efficaciter provocat, ac deniq; elephantiasin etiam probe auxiliatur. Præterea cicatricibus atris candorem restituit, & fucillatæ digerit. Præstat autem in huiusmodi, ubi in vino decoxerimus, ipsam emplastri rû apponere, & viridem magis quam siccam. At sicca, ad venenatarum bestiarum morsus assumitur: vel vti etia cautera, & quæcumq; medicamenta calida sunt & acris. Succus eius aut in infusus, aut eporus, ascaridas, lumbricos, & auni vermes e-necat. Sic & conceptum interimit, eticq;. Igitur incidit quidem et vis adeo, ob calorem, tenuitatem, amaritudinem: abstergetia verò, propter solam amaritudinem. Quare astilmatos atque ictericis convenit. Ad omnia tamen dicta, montana efficacior existit.

Calamus odoratus.

Calamus odoratus.

Leuculam quandâ astringentem, ac minimè acrimoniam possidet. Si quidè magna ex parte essentia quidem eius terrena est, & aëria: temperies autem, calida & sicca in secundo excessu, nisi q; valentius deficcet. Porro moderate movet urinam: ac facultatib; quæ icconi stomachoq; imponuntur, necnon his fomentis quæ inflammationi vtero, aut movendis mensibus administrantur, commo disimè potest misceri.

Calamus phragmites, Cannæ.

Calamus phragmites.  
Cannæ.

Radix eius cum bulbis, aculeos stipitèq; infixos extrahere ex alto traditur. Etiam abstergentem, minimèq; acrem facultatem sortitur, quem admodum & ipsa folia. Cortex verò cōbitus, admodum tenuium partium & digerentis facultatis efficitur, cum nonnulla absterfione, vt exieet & calfaciat tertio quodammodo ordine. Cæterum eius flos est vitidus. Nam si in aures incidat, adeo tenaciter hærent affigitur, vt avelli non possit, auditusq; vitiat.

Calami flos vitiat auditum.

Cannæ.

## Cancanus, Cacalia.

Cancanus.  
Cacalia.

Radix cancani, crassam, empleticamq; & ex-  
liccantē habet essentiam, sed mordacitatis exper-  
tem. Quare macerata vino, sicuti tragacatha, &  
linctā, aut cōmanā, artemis asperitates sanat.

## Cannabis.

Cannabis fo-  
ma.

Cannabis semē adeo status discutit exiccitq;  
vt si argius edatur, genituram absumat.

## Capiasus, Fumaria.

Capias.  
Fumaria.

Acris, amara, & acerbē qualitatē est parti-  
ceps. Quamobrē vini biliosam, multamq; pro-  
vo carīsanāq; tum obstructiōnes, tum imbecilli-  
tates secinoris. Succus eius oculorū aciem acuit,  
nō parū trahens lachrymarū, velvī ipse fumus.

## Capparis.

Capparis.  
radix.

Capparis radicis cortex vincentē habet qua-  
litate amaram, proximam acrem, deinde acer-  
bam: ob idq; pugnantibus facultatibus consistit:  
quippe abstergere, purgare, incidere, potest ama-  
ritudine: exalacere, incidere, digerere, acrimo-  
nia: contrahere, densare, astringere, acerbitate.

Capparis rado-  
is cortex vici-  
us fieri adhibe-  
re, qui multu-  
m.

Quare lienes induratos, si quid aliud, maximē  
potest iuuare, tum foris medicamentis quæ illi-  
nuntur admittis, tum intra corpus assumptis,  
siue decoctis in aceto oxymeliterve, siue cōtusis  
atq; illis permixtis: cūm nimis crassos lenrosq;  
humores apertē hoc pacto sumptus evacuet:  
nec eos tantū per vrinā, sed per ventrem etiam  
sepe sanguinolentos defert: vnde & lienes adru-  
ti sunt, & coxarū dolores. Quin etiam menses  
promouet, ex capite purgat, auxilial rupis atq;  
cōvulsis, necnō malignis viceribus, cataplasma-  
tis modo impositis. Præterea denarium dolores  
adiuuat, interim cum aceto coctus, interim cum  
vino, sepe solus dētibus mansus. Ad hæc vitiligi-  
nes cum aceto detrahitis, & cherradas, & duros  
rumores digerit, idoneis ad eas medicamentis  
mixtis. Radicis corti fructus proportionē re-  
sponderit, nisi quod ad omnia sit imbecillior. Imō  
& folia, & caules similem etiā vim obtinent. Ad-  
miserimus tamen illis aliquid, quod eorum vehe-  
mentiam obtundat. Nec mirum est, quod aurū  
vermes sua perimant amaritudine.

## Cardamum, Nasturtium.

Cardamum.  
Nasturtium.

Nasturtij semē ad ventris facultatis est parti-  
ceps, velviti napy. Proinde omnia quæ rubrifica-  
tionem postulant, eo exalfaciūt. Mulcetur quo-  
que remediis quæ exhibentur asthmaticis, tan-  
quam valenter crassos succos incidere valeat.  
Porro & herba arefacta, semini similem faculta-  
tem formitur. Nam quæ humida est & viridis,  
multis numeris inferiorem.

## Cardamomum.

Cardamomum.

Quantō suauius magisq; fragrans nasturtio  
est, tantō & imbecillior est calida facultas inest.  
Nec enim vicerare est idoneum. Habet autē ad-  
iunctū quiddam amaritudinis, quæ lumbricos  
interficiat: & cum aceto valenter pīoras detergit.

## Caron.

Caron.

Cari semē calfacit & exiccāt tertio quodāmo-  
do ordine, moderatē acré possidens qualitatē.  
Itaq; & flatus extinguit, & vrinā ciet, tum semē,  
tum plantā.

## Casia.

Casia.

Exiccāt & calfacit tertio quodāmodo ordi-  
ne: sed & tenuiū admodum partium est, habetq;

acrimonie plurimum, ac leuiter nonnihil astring-  
ens. Incidit itaque simul & digerit, robūq; in-  
strumentis addit. Quare mentibus est mouen-  
dis idonea, vbi à copia simul & crassitudine illi  
suppressi fuerint.

## Carya, Nuces.

Carya.  
Nucis.

Arbor tum in folijs, tum in germinibus astring-  
entem quandam possidet, ceterū evidentem  
multamq; in nucis putamine recenti pariter &  
sicco. Eius autem succo expresso, ac melle deco-  
cto, nos vice stomatici medicaminis vitmur. Ole-  
um quod ex fructu elicitur in veterato, admo-  
dum per halitum digerit. Quare nōnulli eo gan-  
granas, carbunculos, & ægyloas sanant. Sunt  
qui ad nervorum vulnera vrantur. Ceterū si re-  
cens sit, astringentis nōnihil qualitatē obtinet.  
Nucleus arefactus & vltus, tenuium partium &  
exiccatorū citra morsum est medicamē. At pon-  
tica nux, quam *αυξάνη* appellant, & avellanā appellant,  
plus habet essentiae terrestris ac frigide. Itaq; au-  
strior tum cortex, tum planta, tum fructus ap-  
paret.

Nux pomica.  
Avellana.

## Caulis.

Caulis.

Exalfacit & deficcāt. Præterea vrinā ciet,  
muriāq; ad repositionem conditur.

## Carpesium.

Simile est valerianæ, tum gustu, tum facultate:  
sed plus habet tenuitatis. Proinde magis ea vis-  
cerum obstructiōnes extergit, vrinā mouet,  
renēq; calculis degrauat expurgat.

## Cenchrum, Milium.

Cenchrum.  
Milium.

Primo ordine refrigerat. Exiccāt verō tertio  
exoluto, aut certe secundo intenso. Paululum et-  
iam tenuitatis formitur. Quibus de causis inter  
omnia frumentaria edulia minimum nutrimētū  
largitur. Ventrem tamen deficcāt, forisq; admo-  
dum in sacculis, idoneum fomentum est is, quæ  
citra morsum exiccari possunt.

## Cedrus.

Cedrus.

Cedrus specie est duplex: altera fruticosa iuni  
pero asinimilis: altera arbor non exigua. Vtraq;  
est calide siccatq; temperaturæ tertij quodāmo-  
do ordinis secundū vtrūq;. Ceterū cedra (vo-  
catur ita credi oleum) quartum etiam ordinem  
attigisse videtur, admodum calida & tenuiū par-  
tium. Quare mollem viuentiū carnem promptē  
citraq; dolorem putrefacit. Nam mortuorū cor-  
pora exiccāt, similisq; à corruptione tuetur, vipo  
re humiditates eorū depascens, at solida haud-  
quaq; attingens corpora. Nec mirum videri de-  
bet, si cūm tanta vi polleat, lentes, pediculos, ti-  
ncas, aurūq; vermes interficere valeat: tum festu-  
m viuentem quidem interimit, extinctum au-  
tem eliciat: quæ admodū & ipsum semē, si cōeun-  
di tempore, pudendo ea circumlinatur. Proinde  
partis aduersum est medicamentum. Quod etiā den-  
tium foraminibus instillatū, eos & confringit, et  
à dolore liberat. Externuat quoq; oculorū cicat-  
rices, & visus hebetudini ab humorū crassitudi-  
ne cōrre medetur. Vtuntur autem ea plebei, cūm  
ad vulnera ouibus inter tendendum à forfice il-  
lata, tum etiam contra ipsarū scabiem & rici-  
nos, quos *λεπιδωμ* vocant. At fructus modera-  
tiores existunt, adeo vt comedi possint. Quamq;  
si is liberalius vrare, capiti dolore inferret, ar-  
dorēq; ac morsum in ventre percipies.

Cedri fructus.



## Centaurium maius.

Centaurium  
maius.

Radix eius gustui acris simulq; astringens ap-  
parer, cum leuicula quadam dulcedine. Quod  
verò ad aëtionem pertinet, menses provocat, vi-  
uum fortè extinguit, extrinsecusq; propellit. Pre-  
terea viscera glutinat, sanguinemq; reuocantibus  
prodest. Exhibetur autem eius bina drachmæ,  
sebriculis quidem cum aqua: sebriculis verò libe-  
ris, cum vino. Quam etiam ruptis, conuulsis, dys-  
pnoæ, in veteratq; tussi est auxilio. Eadem quæ  
radix, & succus ipsius præstat.

## Centaurium minus.

Centaurium  
minus.

Huius radix planè inefficax est: at caulis & fo-  
lia, & flores, valiora sunt. Vincit enim in eis qua-  
litas amara, paululum libèrè & astringens: ob  
idq; admodum euacatorium est medicamen, ex-  
pers morda citius. Vlcera itaq; magnæ herbe ip-  
sius recentis illitu glutinatur: & venusta, quæq;  
egre ad cicatricem perducunt, cicatrice ob-  
ducuntur. Arefacta verò glutinatoria & defica-  
toris miscetur facultatibus. Misceatur etiã  
quæ rheumaticis medentur affectibus. In qui-  
bus ea medicamina præstantissima sunt, quæ ve-  
hementer deficiantia cum quadam astringente  
nullam habent morda citatè. Decoctum herbe  
quidam infundit ischiadicis, seu biliosis & cras-  
sa extrahis: nam & talis purgat. Succus eius præ-  
ter dicta, cum melle oculis illinitur, menisq;  
foris evocat. Lecinoris quoq; abstrusiones op-  
timè aperiunt, bonumq; durato lieni est remediũ,  
& impositum foris, & bibitum.

## Cerasia.

Cerasia.

Quæ dulcis sunt, magis aliũ subducunt, sed  
minus grata stomacho sunt. Austera verò,  
contrario modo. At acida, pituitosis excremento-  
sisq; stomachis sunt idonea. Siquidem austera  
magis exiccant, & nonnulli etiã incidunt. Ipsi  
arboris gumi, arterias as-  
suescunt, calculiq; ve-  
ratos adiuuat. Ceratonia.

Cerasia gumi.

Ceratonia.

Exiccantia astringentisq; facultatis est, tum  
arbor ipsa, tum fructus. Qui quidem si sumatur  
humidus, magis ventrem subducit: si autem sic-  
cus, magis eundem silit.

## Cestrum, Betonica, Psychotrophon.

Cestrum,  
Betonica,  
Psychotro-  
phon.

Vim habet incidendi, vt gustus indicat: est en-  
im subacris & amaricula. Quare calculos re-  
num frangit: pulmonem, pectus, & iecur expur-  
gat: menses promouet: comitialibus prodest: ru-  
ptis conuulsisq; curat, omnibusq; bestiarum mor-  
bis illita auxiliatur. Postremo acidum ructan-  
tibus & ischiadicis, bibis prodest.

## Cecis, Galla.

Cecis,  
Galla.

Quæ omphacitis dicitur, ad mortuũ acerbum  
est medicamen, plerq; sui parte essentis terrene  
& frigide, per quæ deficiat, repercutitq; fluxus.  
Est verò tertio in deficcando, secundo autem  
in refrigerando ordinis. Altera autem galla, fla-  
ua illa & magna, laxa, & ipsa deficcata quidem,  
sed tantu minus, quantu minus acerbæ qualita-  
tis est particeps. Cocta itaq; ipsa per se in aqua,  
aut si magis astringere vis, in vino aliquo auste-  
ro, ac dein trita, cataplasma est non instrenuum  
sed inflammariq; procedentis. Gallicæ combustæ,  
extrinsecusq; in aceto aut vino, sanguinis reprimẽ  
de facultatem acquirunt.

## Cera.

Inter primas quatuor qualitates mediũ quo-  
dammodo obtinet. Habet verò quiddam crassæ  
efficacis & emplasticum. Quamobrem aliorum  
medicamentorum materia existit. Ipsa autem  
per se ex genere fuerit debiliter concoquentium.  
Habet tamen quiddam digerentis, calidæq; po-  
tentis, quæ plurima melli inerat.

## Cici, Ricinus.

Vt fructus eius expurgat, detergit, & digerit, Cici.  
sic etiã foliũ, sed vnde quaq; debilius. Oleum qd  
ex semine conficitur, calidius atq; tenuius est, q  
comune oleum, ac promde potentius digerit.

## Cinnamomum.

Summe tenuis est partu, atq; ex tertio ordine  
calidissimu. Nihil autem æquè deficcans, eorum  
quæ panter calfaciunt, propter tenuitatẽ effentis.  
At Cinnamomis, veluti imbecillũ est cinnamo-  
mum.

## Circæa.

Dioscorides ait radicem eius ex vino dulci  
potamine secūdus purgare. Est enim boni odoris,  
& calfactoria. Semen autẽ eius in sorbitione ex-  
lubitur, ad lactis generationem conducit.

## Cistius.

Frutex astringens est. Folia eius & parua ger-  
mina trita adeo deficcant astringuntq; vt viscera  
glutinare valeant. Sed flores efficaciores sunt, a-  
deo vt cum vino poti dysenterias, ventris imbe-  
cilitates, fluxusq; & humiditates perferant. Ca-  
taplasmas itru illiri, vicerũ patredmodu iungit.  
Deficcant enim secūdus excessu. Hypocistis mul-  
to est magis astringentia quam folia, admodu effi-  
cax remedium ad omnes fluxionum affectus.  
Quin si quam partem roborare consiliu sit, quæ  
videlicet plusculo humore exoluta fuerit, robur  
ac firmitudinẽ illi haud segniter addit. Quo no-  
mine antidoto ex viperis inditur.

## Cisthos, Ladanaum.

Primo excessu medicamen est quodammodo  
completè calidum, ita vt secundum attingat, ha-  
bens etiã astringentis non nihil. Est præterea su-  
stantia tenui, & emolliens, necnon moderate di-  
gerens, concoquensq;. Peculiariter igitur ad ve-  
teri vicia aptum. Diffusentes tamen capillos  
retinet. Cæterum alopecias & ophthalmias sa-  
nare nõ potest, quod lĩ affectus valentiora me-  
dicamenta desiderant.

## Cissos, Hedera.

Ex contrariis facultatibus constat. Habet enim  
quiddam astringentis substantiæ, quæ terrea & fri-  
gidus existit: habetq; nonnulli acris, quam calidã  
esse vel gustus comprobat: præterea si viridis sit,  
obtinet etiam quiddam aqueum & tepidum. Vi-  
ridis igitur folis in vino decocta, grandis viscera  
glutinant, malignaq; ad sanitatẽ reducent. Igne  
factas exulcerationes cicatrice obfirmant: cum  
aceto decocta lenosius opalescent. Flores autẽ  
quodammodo validiores sunt. Succus medica-  
men est erithimum: venustas aurium fluxiones sa-  
nat, necnon vetera viscera tum aurium, tum na-  
riũ. Lachryma hedere perimit lentes, pilisq; nu-  
dat. Adeo quippe est calida, vt etiã obscurè ad-  
uertat.

## Clinopodium.

Calfacit simulq; siccatur in tertio ordine, estq;  
subtilium partium.

## Clematis

**Clematis.**  
 Hulus folia acrem & advenētē obtrinent facultatem, adeo vt lepras excoriant. Fuent itaq; in quartū ordinis excafciantium in initio. Dicitur etiā Clematis illa herba, quam nonnulli polygonoidem appellant: quæ tantum abest vt exviceret, vt profluuiis & dysenteris cum vino pota auxilietur, manſaq; dentium dolores minger, ac deniq; doloribus vteri in peſſo admota ſit vſui.

**Cnicos.**

**Cnicos.**  
 Cnici ſemine duntaxat ad purgationes vti-  
 mur. Eſtiq; tertij ordinis excafciantium, ſi quis  
 foris eo vti volet.

**Coccus cnicidius, Granum gnidium.**

**Coccus cnicidius.**  
 Eſtiq; quocq; purgat, ſed acris eſt, adven-  
 tiſq; facultatis.

**Coccus baphticus, Granum tinctorium.**

**Coccus baphticus.**  
 Aſtringent ſimulq; amarū poſuidet qualita-  
 tem. Vtraq; ſine morſu deſiccat. Proinde ad ingē-  
 tia vulnera cōgruit, & ad nervorū vulnerationes  
 Coccymeſea, Prunus.

**Coccymeſea, Prunus.**  
 Pruni fructus ventrem ſubducit, recens qui-  
 dem plus, aridus minus. Manus tamen ſubducti  
 na ſunt Damafcena pruna iis quæ ex Iberia adve-  
 huntur. Quin & ipſe arbores fructibus propo-  
 rione reſpondet. Porro quorum in germinibus  
 aſtriſctio quædā manifeſta in eſſe apparet, iis de-  
 coctis phlegmonæ in columella aut ſonſillis cō-  
 ſiſtentes idoneè colluuntur. Iam verò agreſtium  
 fructus, evidentè eſt aſtriſctioris, ventricq; ſiſtit.

**Colla, Gluten.**

**Colla, Gluten.**  
 Gluten quod ad libros præparant ex ſimilagi-  
 ne & gazo, emplaſtice, concoctioriq; facultatis  
 eſt. Colocynthis, Cucurbita.

**Colocynthis, Cucurbita.**  
 Humida & frigida eſt in ſecūdo ordine. Qua-  
 re ſuccus eius roſaceo miſtus, aut ſi doli  
 tracto ex phlegmone, eſt viliſ. Præterea reſtin-  
 guit ſitim. Colocynthis.

**Colocynthis.**  
 Guſtu amara eſt, vehemētèq; purgatoria fa-  
 cultate prædita. Ipſius virentis ſuccus intus, 40  
 ichthiadis prodeſt.

**Comarus, Arbutus: cuius fructus Vnedo.**

**Comarus, Arbutus.**  
 Fructus vnā cum arboꝝ acerbis eſt. Eſt au-  
 tem lic & inſenſus ſtomacho, & capiti dolorem  
 concilians. Commi, Gummi.

**Commis, Gummi.**  
 Lacryma eſt concreta in truncis arborum i-  
 pſam, pducentiū: eſtiq; exicatoria & emplaſtice  
 facultatis, aſperitatisq; medetur.

**Conia, Lixiuum.**

**Conia, Lixiuum.**  
 Omnium maximè abſterſorū exicatoriorūq; 50  
 eſt, quod ex cinere ſicis & triſymalorum effici-  
 tur: ſerēq; putrefactientis eſt facultatis.

**Conyza.**

**Conyza.**  
 Conyza & maior & minor adſimilis ſunt nū  
 temperaturæ, tum facultatis: guſtu amara & a-  
 cres. Laculenter autem excaſciant, ſiue quis ſo-  
 lia cum teneris ramulis parti inſuſcet, ſiue vbi o-  
 leo incoxit, eo vitatur. Si quidē vigores per cir-  
 cuitum redeunt, ſanare tale oleū videtur. Con-  
 ſimilis quodq; flores ſunt facultatis. Quos qui-  
 dem nonnulli ex vino propinquant, ad edu-  
 cendos menſes, atq; pellendū ſerum. Eſt & tertium  
 conyzzæ genus in locis humidioribus naſcēs, v-  
 triuſq; illis graucolentius & imbecillius. At primū  
 memoratæ caſciant & ſiccant in tertio ordine.

**Coriannon, Corion, Coriandrum.**

Hanc herbam refrigeratorium eſſe Dioſcori-  
 des proſedit, quod multa pani aut polentæ, illi-  
 triq; cryſipelas curret. Quanquam certè exaſtunt  
 aliquid cryſipelas, quod vtriq; inflammātū eſt,  
 & ſtuum, haud vūq; à tali cataplaſmate perſana-  
 bitur: ſed illud tantum quod refrigeratum iam  
 fuerit. Coriandrum itaq; ex contrariis facultati-  
 bus conſtat, plurimum habens eſſentiz amara,  
 10 quæ tenuium partium eſt & terrena. Nec parum  
 etiam aqueæ humiditatis obtinet, quæ tepentis  
 eſt facultatis. His adiunctum eſt quoq; aſtriſctio-  
 nis pauſillum. Quod autem longè à refrigera-  
 tione abſit coriandrum, hinc conſtat, quod chæ-  
 radas ſue ſtrumæ, cum lomento diſcuriat: id  
 quod nullum refrigeratium medicamentorum  
 facere eſt aptum.

**Coronopus.**

Coronopidis radix caſtiacis prodeſſe credi-  
 tur manducata.

**Coſtus.**

Leuiculam planè amaram, plurimam autē a-  
 crem & calidam in ſe qualitatē ſimul & facultatē  
 obtrinet, adeo vt etiam exviceret. Quare in qui-  
 bus excaſcere partem quāvis, aut ex alto in ſu-  
 perficiem extrahere quippiam eſt opus, ad coſtū  
 confugit. Eadem de cauſa vrinæ menſeq; pro-  
 vocat: & ad rupta, convulſa, & laterum dolores  
 congruit. Porro ob amaritudinem quæ illi in eſt,  
 20 lateros lumbricos enecat, maculāq; à ſole contra-  
 ctas exteris, illius cū aqua aut melle. In eſt item  
 ſtatuofa quædam illi temperiei humiditas, per  
 quam & venerem excitat cum vino mulſo.

**Coryledon, Vmblicus Veneris.**

Humidam, ſubfrigidam, obſcure aſtringentē,  
 ac leuiter amaram obtrinet facultatem. Vnde re-  
 frigerat, repercurit, abſtergit, & diſcutit. Itaque  
 phlegmonas eryſipelatodes, & cryſipelata phle-  
 gmonode perſanare ſuauitriq; vetriculo cōmo-  
 diſſimum cataplaſma exiſtit.

**Crania, Cornus.**

Fructus eius admodum acerbis eſt, eſuiq; a-  
 ptus: proinde valenter alium reſtringit, quem-  
 admodum & meſpila. Folia quoque & germina  
 peracerba ſunt guſtui, valentēq; deſiccant. Itaq;  
 maxima vulnera glutinare poſſunt, poſſuſuſq;  
 durorum corporum.

**Crambe, Braſſica eſculenta.**

Deſiccandi vim habet, tum eſa, tum foris im-  
 poſita: non tamen admodum acrem. Præterea &  
 vulnera glutinat, & maligna vlcera ſanat, phle-  
 gmonāq; iam induratas, atque egre ſolubiles,  
 necnō eryſipelata id genus, epinyctidāq; & her-  
 petes curat. Habet quiddam etiam in ſe abſterſo-  
 rium, quo lepras elicit. Porro ſemen eius poſtū,  
 amarum cum ſit, lumbricos perimit. Eadem fa-  
 cultate ephelidas, lentes, & quæcūq; modicam  
 abſterſionem poſtulant, adiuuat. Cineres caſtiſſi  
 braſſicæ deſiccant vſque adeo, vt cauſticæ facul-  
 tatis participes eſſe videant. Quibus ſanè cū ad  
 pemittiſſis, cōtra in veteratos laterū dolores vti-  
 tur. Sic nāq; valenter digerēs pharmaçū reddit.

**Crambe agria, Braſſica agreſtis.**

Calidior ſicciorq; & amarior q̄ domeſtica eſt: braſſica agro-  
 quam obrem nec citra noxam intra corpus ſu-  
 ſu.

Zz ij

mirur. Extergit autem & digerit quàm domesti-  
ca etiam valentius.

Crambe thalattia, Brastica marina.

Non solù alui deiciat, sub salsa & sub amara ex-  
stens, sed etiam est ad externos corporis usus ido-  
nea.

Cratogeom.

Fructus eius & acris gustum est, & videnti fri-  
gidus, similis milio.

Cretimon.

Gustantibus salum est, cum paucula amaritu-  
dine: quamobrem vis eius est excoctoria & abster-  
soria.

Crishe, Hordcum.

Primi est ordinis in exciccando & refrigerando.  
Habet etiam absterisionis paucillū. Praestat in ci-  
bo fabis, quod flatuofam naturam exuat. Quan-  
tuncumque enim fabas coxeris, flatuosa semper il-  
lis natura remanet. Sunt quippe crasioris essen-  
tiae quàm hordei, ob idque, eo plus etiam alunt.  
At polenta multo plus hordeo deficcatur.

Crimnon.

Plus nutrit quàm polenta, sed ægrius conco-  
quitur. Sorbino quæ ex eo conficitur, si ex ea  
fiat, leuiter ventrem sistit.

Crino. Lilium.

Crinat.

Lilium.

Lilij flos temperaturā mitā obinet, partim  
ex tenui, partim ex terrena essentia, partim ex a-  
quea, etiam temperata. Quare quod ex eo confici-  
tur oleum, digerit, emolliendū ultra morum  
facultatem sortitur: unde fit, ut vteri sit duritie-  
bus aptissimū. Porro radix foliaque per se trita, de-  
ficcant, absterigunt, & digerunt moderatē. Proinde  
de quoque ambultis compertū. Radicem ergo to-  
stam, ac dein rosacco contritam, ambultis quo-  
ad obducatur cicatrix, imponunt: cum sit etiam  
vicerum aliorum remedium. Emollit præterea  
vteros, mensesque provocat. Ceterū cum aut vi-  
rilignes, aut psoriam, aut lepram, aut achoras,  
aut aliquid id genus extergere volumus, cōmi-  
scetur illi aliquid aliorum medicaminum vali-  
dius extergentium, cuiusmodi est mel. Imposui-  
mus verò etiam quandocumque & foliorū succū cum  
melle & aceto coctum. Eratque respectu vtriusque,  
porrio ipsius succi quincupla. Atque ita cōficien-  
tur in signe medicamentū ad omnia vlcera, quæ  
excicari absque morū postulant.

Crocodilum.

Crocodilij semen acre est, atque odoratum, vri-  
nam mensesque ciens: itaque facultatem habet ca-  
lidam, digerentem, & excitantem. Succus tum  
caulis, tum feminis, ut quæ similes sint facultati-  
bus, nephriticis adunatur. Radix pectoris excre-  
tionebus valenter conducit. Trahit verò etiam  
per nares sanguinem.

Crocus.

Secundi quidem est ordinis excalcificantium,  
primi vero exciccantium. Proinde concoquendi  
quoque vim obinet, adiuuante etiam ad id, quā-  
dam exigua astrictione.

Crommyon, Cæpa.

Cæpa ex quarto est ordine excalcificantium.  
Essentia eius potius crassiorum est partium. Vnde  
etiam hæmorrhoidas aperit, tum apposita,  
rū cum aceto inuncta. In sole alphas abstergit,  
tum alopecias attrita pilos lalcyonio citius resti-  
tuit. Succus eius si quis suffusi sunt, aut acie ocu-

lorum obtusam præ crassitudine humorum ha-  
bent, inunctus prodest. Ob leuius temperatū  
tota cæpa flatuosa est, manducata. Itaque quæ tem-  
perie sciore sunt, minus flatuosa generant.

Cyamos, Faba.

Mediocriter excicat, refrigeratque. At caro eius  
paucillū quoque absterigens facultatis continen-  
sificum putamen nonnihil adstringit. Porro ut  
edulium, flatulenta est, & coctio difficilis, si quid  
aliud: excretionibus ex pectore & pulmone  
idonea. Ut medicamentum verò, foris imposita,  
deficcatur innoxie. In podagricis ea sæpenumero  
vsi sumus ex aqua decocta, & ita ad ipsi sullo ad-  
mixta. Ad nervorum tum contractiones, tum vul-  
nera, farinam eius cum oxymelte imposuimus.  
Ad eos quos ex ictu iam occupauerat phlegmo-  
ne, cum polenta. Sed & testium & vberū aptum  
est cataplasma. Quo quidem & lac ipsum extrin-  
guntur, & puerorum pubes farina fabacea illita,  
sæpissime tempore glaciæ permanet.

Cyclaminus, Rapum, Tuber terre.

Abstergit, incidit, ora venarum aperit, attra-  
hit, & digerit. Succus eius hæmorrhoidas reser-  
rat, violenterque ad secesum provocat, in floccis  
appositus. Sic etiam facultatibus phymatis, stru-  
mas, aliisque durities digerentibus cōmiscetur:  
ac suffusus cum melle illius cōpedit. Ad hæc per  
nares expurgat. Adeo vehementer eius facultas  
est, ut abdomine illito, subducatur alui, & forū pe-  
rimat. Tota autem radix succo melleicillior est,  
quantum & ipsa vehemens satis. Nam & men-  
ses siue epora, siue apposita, evocat & aurigini  
prodest. Modus eius bibendi est drachmarum  
trium siue cum melicrato, siue cum passio. Curæ  
detergit, ac rû alopecias, ephelidas, omniaque ex-  
anthemata curat: necnon auxilio est leni indu-  
rato. Fructus etiam alterius cyclamini, quā nō-  
nulli cyssanthemon nominant, cum vino pluri-  
bus diebus potetur, sanatur lienem, vrinam mouet,  
atque aluum subducens. Locos quoque eiciat, atque  
asthmancis auxiliatur. Qualitas eius gustui a-  
cria est & sublentia.

Cyminum, Cuminum.

Cymini semen calcit in tertio ordine: vrinam  
mouet, extringuntque flatus.

Cynosbarus, Sentis canis.

Huius fruticis fructus nō segnerit astrictori-  
us est, folia verò mediocriter. Lanugo fructus,  
arteriam vitiat.

Cyperissus, Cupressus.

Cupressi folia, germina, pilulæ secetes et mol-  
les, magna vlcera glutinose in duris corporibus.  
Quare resiccandi vim habent absque insigni aci-  
monia aut calore. Tista enim ei acrimonia inest,  
caliditasque, quanta satis sit deducende in alium  
acerburant. Proinde in alio latere in flaccidis pu-  
trescentibus affectibus humiditates, innoxie  
despicit & populatur. Sic enterocolicos iuuat,  
exciccat, roburque addens corporis partibus præ  
humiditate laxatis. Quidam ea vrinatur ad car-  
bunculos, herpetesque polentes miscentes. Sunt  
qui ad erysipelata vrinantur.

Cyperus, Iuncus quadratus.

Cyperii radices excalcificant pariter & siccant  
absque mordacitate. Itaque vlcenib, in veteratis mi-  
liscie

Cyamos,  
Faba.

Cyclaminus,  
Rapum,  
Tuber terre.

Cyssanthemon

Cyminum,  
Cuminum.

Cynosbarus,  
Sentis canis.

Cyperissus,  
Cupressus.

Cyperus,  
Iuncus quadratus.

rificē profunt. Habent etiā quippiā astringens: quapropter viceribus item oris cōveniūt. Quia & incidendi vim quampiam illis in esse restificā- dum est, quā & calulos exterrunt, & vrinā men- seque provocant.

### Cypros.

Huius arboris folia summāq; germina habēt in se quiddā digerēs cum aqua substantia mō- dicē calida: habentq; & astringentem quandam ex terrena substantia frigida. Itaq; eorum deco- cto quidam ambusta fouent, necnō ignea phle- gmonas, carbonē cūdg. Nam absq; molestia siccant. Sed spontē ortis in ore viceribus comman- sa folia commodissima sunt.

### Cyrinus.

Cyrini folia digerētes facultatem obtrinent, a- que & temperare mītant, vt malua.

### Conion, Cicuta.

Quōd extrēmē sanē refrigeret, omnes norūt.

### Conos.

Coni fructus, quem eocalum & strobilum ap- pellant, viridis totus, habet cum humiditate a- maritudinem quampiam & acrimoniam. Proin de purulentis, & his quibus facile expuere est o- pus, accom modatur. Quod efculentū est, nutrim- entum est coctū difficile & validum. Vt medi- camentum autem asperitati leniendā cōgruat, si prae- maceratus in aqua, omnē acrimoniam exuerit. Nam reliquū sic minus mordax efficiē, in medio calidē & frigide qualitates cōstiens, ex aqua & terrea mīstū subdita, minimū parciēis aere.

### Lagopus.

Facultatis est deficcantis, adeo vt fluxus alui probē exiccet.

### Lathyrus.

Et sacco, & purgatoria vi tithymalum refert: nisi quōd semen apparet dulce, licet maximē sit purgatorium.

### Lampfane.

Esa quidem succos prauos procreat. At illitra, abstergendi, digerendi nōnullam facultatem sortitur.

### Lapathum.

Digerit moderate. At oxylapathum nonnullū etiā repercutit. Manifestē isporū semen astringit, ita vt dysenterias & dyarrhasas persanet.

### Limonium.

Eius fructū, vt pote acerbū, ex vino exhibent eteliacis, dysentericis, & haemorrhoidis. Iuuat & profuūū muliebre. Satis est oxybaphi mēfura.

### Lichen.

Lichenas curat, extergentem, modicēq; refri- gerantem, ac siccantem obtrinent facultatē. Na- scitur enim in humidis rocēq; persusis saxis.

### Leonopetalon.

Radix eius digerētes facultatē, & exiccandī, calfaciēdg in tertio ordine possidet.

### Lepidium.

Ex quarto est ordine exalfacientium, simile prorsus nasturtio, nisi quōd minus deficcet.

### Leucas.

Acreni possidet qualiter exuperantē tem- peraturam verō calidam, siccāq; in tertio quo- dammodo ordine.

### Leucacanthion.

Huius radix amara est, ac proinde incidit, ex-

iccāq; in tertio ordine. Calfaciē autē in primo.

### Leucolion.

Extergit, ac tenuium est partium: plus tamen flores, ac precipuē qui sunt fliciores: hui quippe & oculorū crassas cicatrices exterrunt. Præterea menses eorum decoctum mouet: secundas, & partum emortuum elicit, bibulūq; facit abor- tum, maximē amarum cūm sit. Quōd si eius vi- res multa missione aque frangantur, erit contra phlegmonas, & difficilia vlcera, cōmodum me- dicamentum. Semen etiā eiusdem est facultatis, ra- dicēq; similiter, nisi quōd hæ sunt crassioris es- sennæ, terreeq; magis. Cum aceto ramē lichenē induratos persanant.

### Leuce, Populus alba.

Ex aqua, tepida, & terrena extenuata essen- tia consistatur. Quam obrem & abstergentis facul- tatis est particeps.

### Libanotus, Thus.

Excalfacit secūdo ordine, deficcet primo: ha- bet quoq; astringentē pusillam. Cortex eius eui- denter astringit, deficcāq; in secūdo ordine. Est autem crassiorū partium quātm thus, & minimū acrimonie possidet. Quare in hæmorrhoidis, sto- machicis, celiacis, & dysentericis eo vitur. Ra- mus eius siccioris & calidioris est facultatis quā ipsū thus, adeo vt ad tertium vsq; excessum perueniat. Habet verō etiā & abstergentiū quid- dam. Vnde expurgare & implere oculorū vici- ra potest.

### Libanoides.

Libanoides tres existunt: vna sterilis, duæ fru- ctum ferentes. Omnes verō emolliētis, digerē- tis, incidētis, & abstergentis sunt facultatis. Suc- cus tum radicis, tum herbe mīstus melli, obtru- fta oculorum aciem ad humorum crassitudinē emendat. Decoctū eius, quam rorem marinum appellant, porum, regio morbo auxiliatur.

### Lignys, Fuligo.

Fuligo omnis exiccatoria est, ob idq; terrena essentia, habens quasdam etiā ignis est pusil- las reliquias: ratione quarum tenuium est par- tium. Ceterā quæ speciem in ea differentie sunt, ex pro vita materia eveniunt. Titulis fuli- gine vitur ocularibus medicamentis permista, is videlicet quæ ad oculos etiamnum phlegmo- ne tentatos, & qui adhuc fluxione affliguntur, exulcerative sunt, accōmodantur. Nam & illa ex- purgat, & carne implet. Terebinthinæ etiā myr- rhæq; fuligo molestia caret, nō secus quā thuris. Sed styracis quodammodo valentiōr est. Ma- gis etiā picis liquide. Quæ adhuc magis cedri, Porro acrioribus vituntur ad viciā superciliorū vocata ptila, & eroso angulo ocolorū, & ci- tra phlegmonem humidos.

### Libyiticum.

Libyitici radix & semē, ex genere exalfacien- tium sunt, adeo vt & mēses cleant, & vrinæ pro- vocent, siccāq; discutiant.

### Linospermon, Lini semen.

Flatuosum est esum, enā si frangatur. At cal- facit quidem quod simodo in primo ordine, lu- miditatis & siccitatis in medio existens.

### Linozostis, Mercurialis.

Ea vituntur omnes ad subductionē alui diu- taxat. Quāq; etiā admoda, valenter digerit,

**Lonchitis.** Radix eius, quæ semen gerit triangulare, vrinam ciet. Folia eius quæ scolopendryæ similis est, viridia quidem, vulnera glutinant: sicca autem, & cum aceto epota, lienes induratos perficiant.

#### Lycium.

**Lycium.** Arbor est spinosa, ex qua lycium fit, medicamen id liquidum, quo ad sugillata, sedie, orisq; phlegmonas, vicerationes, herpetas, putredines, vlcera cõsumacia, aures pure fluentes, inter 10 trigines, & paronychias vtuntur. Est enim facultas exiccatorij, compositum ex diuersi generis substantiis, altera quidem tenuium partium, digerente atq; calida: altera terrestri & frigida, ex qua astrictionem exigui obtinet. Ceterũ digerit & siccit in secundo ordine: in calore aut medius est proximum. Est porro lycium Indicũ ad omnia valentius.

#### Lysimachios.

**Lysimachios.** Superantem astrictionem sortitur, per quam omnes sanguinis fluxus reprimat, tum potatum cataplasmatis modo admoda.

#### Lychinis.

**Lychinis.** Semen eius calidum & siccũ est, secundo quo dammodo, aut etiam tertio ordine.

#### Lotos herba.

**Lotos herba.** Lotos domestica, quam trifolium nominant, vt mediocriter concoquendi, sic etiam exiccandi vim possidet, in caliditatis frigiditatisq; coniugio media quodammodo existens. Semen 10 agrestis loti, secũdũ est ordinis caliditatis: habetq; nonnihil absterforium. Porro Aegyptij loti semen etiam in panes fititur.

#### Lotos arbor.

**Lotos arbor.** Non ita multæ astrictionis qualitas est parti cepe: sed & tenuium partium est, & exiccatoria. Cuius sicce ramenta profluuium muliebri, dysenteris, capillorum cõfluuii, colicisq; affectibus accommodant, aut in vino, aut in aqua concocta.

#### Macer.

**Macer.** Cortex est qui ex India advehitur, gustu multum acerbis, cum leuicula quadam acrimonia odorata. Constat aut ex mista essentia, pleraque terrena frigida, paucula verò calida & tenuium partium. Itaq; valenter medicat, astringitq; ob idq; colicis & dysentericis medicamentis miscetur, in tertio exiccantium cõstitens ordine: in caloris frigorisq; discrimine, neutri insigniter præstat.

#### Malabathrum.

**Malabathrum.** Malabathri folium cum spica nardi simillimũ 10 obtinet facultatem.

#### Malache, Malua.

**Malache, Malua.** Agrestis quidẽ, digerens paululũ & emollientis leuiter est facultatis: liortensis verò, quanto plus habet aqueæ humiditatis, tãtò facultate imbecillior est. Fructus eius tãtò validior est, quanto & siccior. Ceterũ Althea omnĩ efficacissimẽ digerit.

#### Mandragora.

**Mandragora.** Refrigerat tertio excessu. Nonnihil tã pomis caloris atq; humiditatis inest. Vnde soporẽ conciliat, 10 radicis cortex nõ tantũ refrigerat, sed etiam siccit. Quod eo includit, imbecillimũ est.

#### Marathrum, Feniculum.

**Marathrum, Feniculum.** Calfacit in tertio, deficcit in secundo ordine: proinde lac gignit, auxiliatur sussis, mensesq;

& vrinæ promouet. Radix & semen hippomarathri, amplius quàm domestici siccit: quare & ventrem videntur fistere. Possunt etiam & calculos frangere, cutare ictericos, mensesq; & vrinæ mouere: minimẽ tamen lac gignere.

#### Mastiche.

**Mastiche.** Candida quidẽ & Chia, astringit simul emollientisq; proinde stomachi, ventris, intestinorum, se corisq; inflammationibus competat, vrupta secundo ordine exalfaciens & siccans. Nigra verò, quæ Aegyptia dicit, magis deficcit, minisq; astringit: quam obrem aptior est ad ea quæ validiorem digestionem per lialtum postulant. Porro oleum, quod ex præcipue ex Chia conficit, similis est cum mastiche facultatis.

#### Melanthium, Nigella.

**Melanthium, Nigella.** Exalfacit & siccit in tertio ordine, estq; amarum, atq; tenuium partium. Quare carati hos sanat in linteo admotum, atq; alindue olfactum: 10 flatus potum extinguit: lumbicis enecat, non estum modo, sed etiam foris applicitum: lepras, clauos, atq; myrmecias extert: orthopneam iuuat, & menses provocat. In summa verò, vbi seclione, extersione, deficcatione, exalfactione est opus, præstantissimum id remedium existit.

#### Meliorum.

**Meliorum.** Quiddã habet astringens, digerit tamen, concoquitq; Copiosior enim in eo est substantia calida quam frigida.

#### Mel.

**Mel.** Deficcit exalfacitq; secũdo ordine: at detergentem facultatem obnnet. Porro coctum, minus acre absterforium redditur. Itaq; ad sinuorum vlcera glunnam non eo vtuntur. Ceterum quod mel est amarũ, mixtæ facultatis existit. At Saccharo, quod ex India & Felici Arabia conuehitur, cõcreuit in calami, inteq; mellis species, minus certè nostratè dulcius, sed similes ei vires obnens, quod ad abstergendũ, deficcandum, & digerendũ pertinet. Quatenus verò nec inimicum ventriculo est, vt nostras, nec finit ad ferens, eatenus ab illo substantia differt.

#### Meliosphyllon, Citrago.

**Meliosphyllon, Citrago.** Marrubio similis est facultate, sed plurimũ ab eo vincitur. Quam obrem nec vititur eo quispiã, cum larga marrubij copia suppetat.

#### Mespilũ, Tricocon, & tria grana gerat.

**Mespilũ, Tricocon, & tria grana gerat.** Fructus eius admodum est acerbis, vixq; edi possit, ventrem extremẽ cõfcrens. Quin & in germinibus & folijs acerba hæc qualitas nõ pauca reperitur.

#### Medion, Trifolium odoratum.

**Medion, Trifolium odoratum.** Radix quidẽ eius austera est, omnesq; fluxiones cohibet. At semẽ tantũ abest vt id moliarur, vt etiam menses ciet: nimirũ tenuium partium cum sit, & facultate inquadri præditum.

#### Mecon, Papauer.

**Mecon, Papauer.** Cum quatuor eius insignes species sint, facultas omnium existit refrigeratoria. Ceterum fatiũ semen, mediocriter somnũ conciliat, visu can didum: proinde panis ipsum inspergunt, ac mel le maceratum eitant. At ex syluestribus, eius qd rhoras dicitur, quia flos ipse celeriter defuit, semen validius refrigerat: itaq; nequaq; eo quis innoxie solo vt possit, illius verò quod calicem inciden-

Mastiche.

Melanthium, Nigella.

Meliorum.

Mel.

Saccharum.

40

Meliosphyllon, Citrago.

Mespilum, Tricocon.

Medion, Trifolium odoratum.

Mecon, Papauer.

Rhoras.

incidentem sustinet, atrum existit semen, medica mentosumq, atq, impense refrigerans. Quod autem longiore emitit calicem, medicatissimū omnium est, admodumq, refrigerans, idēq, omnibus partibus suis. Adeo quippe refrigerat, ut stuporem ac mortem etiam inducat. Est enim ex quarto & ultimo refrigerantium ordine.

Mecon cerantis, Papauer cornutum.

Vim habet incidenti exurgendi. Itaq, radix eius in aqua ad dimidium decocta, & hepaticos affectus adiuvat. Folia & flores sordidis & contumacibus vlcenibus proficiunt. Sed ea rectissime oportet vlcenibus iam repurgatis: alioqui sanam carnem excedit.

Mecon Heraclaea, Papauer Herculeum.

Semen habet pituitam expurgans.

Melea, Mālus.

Mālus non omnis eiusdem nature est, sicut nec eiusdem fructus. Succī liquorem, cortices, foliaq, arborū, etiam inter se disijciunt. Itaq, si acidosi austerioraq, sint, illis vultura glotinare possunt, tum in phlegmonarū initio repetere milaxum, ac ventriculū exolutum & languidum roborare: ac aquosioribus, mediores phlegmonas incipientes & gliscētes remittere. Quod autem plurima pomis omnibus recrementis frigidiq, insit humiditas, hinc liquet, quod nullus eorū succus seruari possit: verū accensū cor rumpanturq, vniuersi. Solus enim cydoniorū & struthorū (quæ propter astrictionem vehementem, cæteris minus sunt humida) succus coctus cum melle durare potest: per se autem minimē.

Melea Perfice, Perfica mālus.

In germinibus & foliis vincentem habet qualitatem amarā. Proinde folia eius trita, & super vmbilicū posita, lumbricos enecant: estq, digerens medicamen. Fructus humidior est, & temperie frigidior.

Melea Armenice, Mālus Armenica.

Fructus humidior frigidiorq, est, vtrunq, secundo quodammodo excessu.

Melea Medice, Mālus Medica, Citrium.

Quod in fructu semen amplectitur, tertii est ordinis resiccantium atq, refrigerantium. Cortex deficcatur quidem in excessu secundo, non tamen frigidus est, sed temperatus, aut paulo infus, Caro eius pariter crassū succū est, & piruifosa, frigidiq. Semen amarū est, digerereq, & exicare potens, secundo quodammodo ordine il temperatis recedens. Folia exuccandi & digerendi vim obtinent.

\* Meum.

Radices eius sunt calidæ tertio excessu, in secundo sicce. Proinde vrinas mensiq, mouent. Quod si liberalius sumant, capiti dolorē conciliant. Milax tracheia, Milax aspera.

Varis dauiculis suis arboribus circūvoluitur. Folia eius & acra gustati, & vtrē calida existūt.

Milax leuiss.

Quodammodo iam dictæ similes vires obtinet.

Morea, Morus.

Mori fructus maturus quidem aliū subducit: immaturus verō, ubi aruerit, restringit admodum. Quare ad fluentes affectus est cōmodus. At maturorū succus, propter astrictionē quam

habet, ad stomacica medicamēta est vtilis. In radicis cortice purgatoria vis cum quadā amaritudine exuperat, ita ut latos vermes enecet.

Myagros.

Oleum quod ex semine ipsius funditur, emplastricam facultatem obtinet.

Mycetes, Fungus.

Frigida humiditq, admodū planta est, quare proxime ad enecantē facultatē accedit. Et sanē inter eos sunt qui interficiūt, maximē qui ex natura multā habent qualitātē purulaginosā.

Myle.

Radix eius contrahentis est facultatis: quam cum farina lolij apertū vulū sanare ait Diosc.

Myosotis, Auricula muris.

Deficcatur secundo ordine, ceterū nullam evidentem caliditatem fortitur.

Myrice, Tamarix.

Abstergit & incidentis est facultatis: absq, per spicua delicatone. Habet verō etiam astrictionem nonnullam. Igitur cum aceto decocta pro destiliens indurato. Sanat etiam dentium dolores. Fructus & cortex non paucam possident astrictionem. At cinis myrice, admodum deficcatoris facultatis est, plurimam habens abstergentis vim, astrigendi paucillam.

Myrsophyllon.

Adeo exiccat, ut vulnēra glutinet.

Myrrhis.

Radix eius est odorata & dulcis, mēsciq, mouet, necdō thoracem atq, pulmones purgat. Cal facit itaq, secundo ordine, cum partū tenuitate.

Myrrhine, Myrtus.

In hac planta vincit terreum & frigidum. Habet tamen aliquod tenue & calidum. Quare valenter deficcatur. Porro quod ramis & trunco adnatis tuberosum, quanto siccior cæteris partibus est, tanto deficcatur & astrigit vehementius. Folia item arida viridibus plus deficcant. Itaque omnes partes eius restringunt, tum foris imposita, tum intro assumpta.

Moly, Ruta sylvestris.

Radice habet nigram, & florem lacteum. Vis eius tenuium partium est, & calida tertio ordine: unde crassos humores deficcatur, digerereq, & vrinam mouet.

# GALENI PERGAMENI de simplicium medicamentorum facultatibus, liber VIII.

Nardu stachys, Spica nardi.

Alfacit excessu tertio, deficcatur secundo cōpleto. Constat ex astrigenti, seri, & leuiter amara substantia. Quare radix iccori & ventriculo cōuenit, & pota, & admota extrinsecus. Vrinam ciet: morfus stomachi sanat: ventris, capitis, & thoracis fluxiones deficcatur. Valtior tamen est Indica, quæ nigrior quam Syriaca existit. Nardus Celtica, hoc est, Gallica.

Ad omnia est imbecillior dictis, præterquam ad provocandam vrinam. Nam calidior illis est, sed minus astrigit.

Nardus orea, hoc est, montana.

Plurima in Cilicia nascitur, sed prædictis infirior.

Zz iij



- Narthex, Ferula.** Semen eius calcificat & tenuat. Medulla autem astrictionis est particeps. Vnde hæmoptoicis & carliacis convenit.
- Napy.** Calcificat deficcans ordine quarto.
- Narcissus.**
- Narissus.** Eius radix deficcatur adeo, vt vel maxima tendonum vulnera glutinet. Habet verò quiddam abiterforium & attractorium.
- Neuras, Poterium.**
- Neuras, Poterium.** Deficcatur citra morsum, adeo vt incisus nervus glutinare credat, ac præcipuè radices eius.
- Nerium, Rhododaphne.**
- Rhododaphne.** Foris quidem illius is frutex, digerendi vim obtinet. At si intra corpus sumatur, virulentus homini & plerisque pecudibus est.
- Nymphaea.**
- Nymphaea.** Tum radix eius, tum semen, deficcandi citra morsum vim habet. Itaq; ventris profluua, semineq; immo dicere profluua sunt: At cui adest candida radix, ea & muliebri medetur profluuiis, ex vino nigro & anthero epota. Vtriusq; autem abstergendi quandam vim possidet. Quare maceratae quidem aqua, sanant alpihos: liquida verò pice, alopecias. Ad hæc ramè aptior est ea, cuius radix est nigra.
- Xanthion.**
- Xanthion.** Semen eius digerendi vim obtinet.
- Xyris.**
- Xyris.** Tenuium partium, attractorie, digerendi & deficcandi facultatis est, cum radix, tum multo magis fructus: qui quidem & vrinam ciet, & lene in duratos sanare potest.
- Xyplison, Gladiolus.**
- Xyplison, Gladiolus.** Xyphii radix, maxime altera quæ superior est, attrahit, digerit, deficcatur.
- Oë, Sorbus.**
- Oë, Sorbus.** Astringentem vim obtinet, at multo q; mespilus imbecillior. Proinde fructus eius gustus incundus est, minuscule ventrem q; mepilus cõtrahit.
- Omos, Vinum.**
- Omos, Vinum.** Ex secundo est ordine calfacienti: sed quod admodum vetus est, ex tertio: si ceterum multum ex primo. Caliditatem proportionem respõdet siccatas.
- Olynthi, Grosia.**
- Olynthi, Grosia.** Acrem facultatem fortuntur: Cocti itaq; duos tumores discutiunt: erudi myrmecias & thymos eiciunt.
- Olostum.**
- Olostum.** Deficcandi vim obtinet cū astrictione: ideoq; propinatur ad rupta.
- Olyra.**
- Olyra.** Mediam tritici & hordei naturam possidet, ram vt nutrimentum, quam vt medicamentum.
- Onagron.**
- Onagron.** Huius radix arefacta vinosum quiddam reodoler, maximeq; ad vini facultatem accedit.
- Onosma.**
- Onosma.** Acri & amara substantia constat. Cuius folia in vino pota, scortum extingueret expelleretq; creduntur.
- Onobrychis.**
- Onobrychis.** Rarefacienti digerendi vim obtinet. Proinde folia eius virentis illius, phymata digerunt: arefacta verò, & cū vino pota, stragulas sanant: sudoresq; eliciunt, cum oleo inuicta.
- Oonon.**
- Oonon.** Radix eius calcificat quodammodo in tertio ordine, abstergitq; & nõnihil incidit. Itaq; non tantum vrinam provocat, sed & lapides frangit, & crustas detrahunt. Præterea ad dolores dentium, oxycrato in quo fuerit cocta, colluuntur.
- Oxos, Acerum.**
- Oxos, Acerum.** Ex frigida calidissq; substantia constat: vtriusq; tamen tenuium partium. Verum calidam frigida exuperat. Deficcatur porro in tertio gradu.
- Oxyacanthos.**
- Oxyacanthos.** Vt specie, sic facultate licet arbor piro sylvestri est similis. Ceterum piri sylvestris fructus, prosus \* acerbus est: oxyacanthos verò, & tenuium est partium, & nõnihil incisoriis sortitur: estq; rubens & rarus. Qui quidè affectus omnes fluxionum cohibet.
- Opos, Succus.**
- Opos, Succus.** Cyrenaicis quidem reliquos omnes caliditate & tenuitate exuperat: ideoq; omnium maxime per halitum digerit. Quamvis sanè & ceteri admodum calidi sint, & spirituosissimi. Porro licet complures etiam sine alijs succis, quæ effluunt, in cista radice: ob excellentiam tamen fædiciatur Cyrenaicis, & Medicis, & Syriacis.
- Origanus.**
- Origanus.** Heracleotica quidem efficacior est onitide: agrestis tamè est valentior vtriusq;. Omnes verò incidendi, extenuandi, calfaciendi, & exiccandi obtemperant facultatem, in tertio minimum excessu. At Tragonganus etiam quippiam astringit.
- Orobanch, Eruum.**
- Orobanch, Eruum.** Deficcatur quidem excessu secundo intento, calfacit verò primo. Porro quatenus amaricans est particeps, extenuat incidit, extergit, atq; obstructiones expedit. Ceterum si sumatur copiose, sanguinem per vrinam evocat.
- Orobanch, Eruum.**
- Orobanch, Eruum.** Siccat frigidiq; temperaturæ est, in primo ordine.
- Oryza.**
- Oryza.** Habet attractorium quippiam, quare mediocriter aluum sistit.
- Orchis, Testiculus canis.**
- Orchis, Testiculus canis.** Radici eius bulbosæ & geminae, vis inest humida & calida, gustantibusq; dulciscula. Ceterum maior radix multam habere videtur humiditatem excrementariam, & statulentis: quapropter epota venerem excitat. Minor verò, cum ad calidius & siccius vergat, tantū abest vt ad coitus stimulet, vt etiam cohibeat, & reprimat. Eduntur bulborum more, tosta.
- Orchis Serapias.**
- Orchis Serapias.** Siccat ultra primum excessum. Quare non ita est vt venerem commodos. Oedemara illius discutit. Vlcera fordidæ expurgat. Herpetes sanat. Siccat multo amplius deficcatur. Nam putrefactia contumacisq; restituit vlcera, & subastringens cum sit, ventrem sistit ex vino potus.
- Ofiris.**
- Ofiris.** Amara est, & aperiendi vim obtinet. Quare iecur obstructum adiuuat.
- Pancratium.**
- Pancratium.** Radix huius, scilicet similem gustum refert, & vires, multo tamen imbecilliores. Ea itaque pro salla, vbi hæc non adest, vrinatur.

- Paliurus.** Folia eius & radix adeo perspicue astringunt, ut fluxum ventris colibeant: adeoque digerunt, ut minora phymata curent. At fructus, tantum incidendi vim possidet, ut calculos vesicæ comminuat, & pectoris pulmonisque excretionibus auxilietur. Papyrus.
- Papyrus.** Oxyrato vinove macerata, recensia vlcera glutinat, maxime in circuli circumposita, ut materia sanantia medicamina excipiat. At vbi vltima fuerit, medicamen exiccationum existit, ut chartæ combustæ cuius. \*Hoc tamen cinis papyri est infusior. Panax Heraclium.
- Panax Heraclium.** Ex hoc conficitur opopanax, radicibus & caulibus eius incisitis. Porro opopanax ipsum tum molliat, tum digerit. At calcit idem in tertio ordine, in secundo autem siccatur. Cortex radicis excalcit etiam & siccatur, minus tamen quæ succus. Ceterum abitergendis nonnullam facultatem sortitur. Quare eo vitumur & ad nuda osiua, & ad vlcera contumacia. Sufficiens siquidem quæ talia sunt, eam nem procreant. Fructus calidus est & ipse, ac mensibus mouendis accommodatus. Panaces Asclepium.
- Panaces Asclepium.** Minus est calidum supra dicto panace. Quare floribus eius & semine mellis misus, ad vlcera, phymata, & phagedænas vituntur. Panax Chironium.
- Panax Chironium.** Prædicto similem facultatem obtinet. Paronychia.
- Paronychia.** Paronychias & fauos sanat, digeritque ea que discuti postulant. Calcit enim & desiccatur in tertio ordine, citius tenuium partium, & sine mordacitate. Pentaphyllum.
- Pentaphyllum.** Radix eius digerit vehementer, nimirum in tertio ordine, citra mordacitatem tamen. Nuntium siquidem habet cum acrimonia, tum conspiciæ caliditate. Peplos.
- Peplos.** Succu habet similem tidymalia, cum in aliis, tum quia purgat cœli. Peplum.
- Peplum.** Etiam fructus luc succu habet ut nithymali, validiusque, non tamen admodum valem. Radix eius videtur super vacante. Semē vtile est, & statulentum, pepli semini similiter purgans. Peper, Piper.
- Peper, Piper.** Piperis radix vires costo similes obtinet. Fructus nuper germinatus, longu existit piper: quare maturo citius madius. At fructus qui veluti omphax est, piper album est, nigro quidē acrius. Nam illud iam veluti superassatu videt. Vtrunque tamen valenter & calcit, & desiccatur. Persea.
- Persea.** Persea folia modice astringit, ita ut nonnunquam sistere queant sanguinem erumpentem. Penclymenos, Volucrum maris.
- Penclymenos, Volucrum maris.** Fructus eius & folia adeo vehementer incidunt & calcit, ut si diutius bibantur, vrinam sanguinolentam efficiant: principio tantum vrinam mouentia. Foris cum oleo illis etiam exalcit. Iuuant & benofo, & difficulter spirantes. Competens mensura est drachmæ vnius cum vino. Desiccatur etiam semen, & (ut quidam tradunt) si liberalius bibatur, sterilitatem inducit.
- Vim habet hæc lenius desiccantem, ut & vulne** Peristernon.
- Petalites.** Ex tertio est ordine delicantia: quam obrem ad coactiue & phagedænicæ vlcera etiam adhibent. Petroselinum.
- Petroselinum.** Eius semen est gustu acre, cum amaritudine. Sic & in operibus calidum, vni cum incidendi effectu. Hinc menses & vrinæ assanm provocat, flatuque discutit. Calcit itaque & siccatur in tertio ordine. Tota herba similem, sed imbecillio rem possidet facultatem. Peucedanum.
- Peucedanum.** Succus eius admodum excalcit & digerit, citius tenuiu & incidentiu partiu. Quare omnibus neruoru asiectibus creditur opitulari: tum morbis in pulmone & thorace ex crassitudine humoru ortis. \*Nec verò inter corpus sumptus duntaxat, sed olfactu etiam prodest. Ad hæc si sepe foratorum dentium dolores, cautius impossitus, protinus mitigaunt. Quin etiam induratos lites iuuat. Ad quæ omnia, licet etiam vni radice, quæ & squamas celerim ab osibus detrahit, & arida illa viceribus contumacibus remediū est optimum: minus quidem quam succus excalcit, nempe in secundo ordine iam completo, delicans verò in tertio incipiente. Peganon, Ruta.
- Peganon, Ruta.** Agrestis quidem in quarto ordine excalcit, domestica verò in tertio. Est autem non solum gustu acris, sed et amaro. Ex quo sanè digerere, inciderere crassos & lentos humores potest, atque mouere vrinæ. Quin & tenuium est partium, flatuque extinguit. Quare ad inflationes competit, ac venetis appetentia iulubet: digeritque atque exccat stenuē. Pissa, Pix.
- Pissa, Pix.** Siccata quidē siccatur & calcit secundo ordine. At plus siccare valet quæ calcescere. Humida verò cōtra, plus calcit quæ siccatur habetque partiu tenuitatem nonnulla, quæ asomaticos & purulentos adiuuat. Satis est autē cyathi linixisse mensuram mellis misce. Abstergendi etiam edoquendi, digerendi quondam vim habent, veluti in gustu lenem amaritatem & acrimoniam. Sic leprosis vngues exiungunt misce cum cera, lichenisque deterunt. Coquant item duos & crudos tumores, cataplasmatibus indig. Atque ea omnia, humida valeunt: et arida verò glutinandis vlnibus aptior. Pissellum.
- Pissellum.** Ex humida pice efficitur, genere quidem ei simile, sed essentia tenuioris. Pistacium.
- Pistacium.** Fructus eius quodammodo tenuioris essentia est, subamarum quid & odoratum retinens. Obstructiones itaque omnium viscerum aperit, sed præcipue iecinoris. Pirydes, Picærum fructus.
- Pirydes, Picærum fructus.** Astringit, simili acris est, cum amaritudine quadam. Vnde thoracis pulmoniisque expuitionibus confert. Piry, Picea.
- Piry, Picea.** Piceæ cortex vincens facultate astringentiā sortitur, sic ut intertrigines sanat, ventremque potius sistat. Sed & ambusta cicatrice includit. Todeg

*Tela ceter.* cortex illi adsimilis est, viribus tamen moderatioribus. Vt utiq; arboris folia glutinant vlcera. In con. foliis & cortice validior facultas est; adeo vt cū molestia mordicet. Fuligo q̄ ex dictis colligit, ad pilos supercilios est cōmoda, itēq; ad angulos oculorū erosos, leppientes, & lachrymanes.

*Pyrusa.* Viribus est similis rithymalo, succūq; fortiter simitem, & similiter purgat.

*Platanus.* Humidioris frigidiorisq; est essentia, non ita multo quā symmetra. Proinde folia vindiā trita & illita, non obscurē nascentes phlegmonas adiuuat. Cortex & pilulæ magis deficantē vim obninent: vt ille quidem in aceto coctus ad dentium adhibeat dolores: pilulæ verd cum adipe, ad vlcera ambusta. Vitandus est pulvis foliis arboris insidens. Alioqui si attrahatur spiritu, arteriam offendit, valenter siccat, exasperatq;.

Necnon vocem lēdat, sicuti & auditū & visum, si in oculos aut aures incidit.

*Polygonon.* Polygonon, Gentinodia.

Vnī astrictionis est pariceps, ita in eo frigidū, æquum vincit vt secūdo excessu refrigeret, aut etiam iniūo tertio. Itaq; æstuantī ventriculo, erysipeli, atq; calidis phlegmonis, si illinatur frigidum, auxiliatur. Sicut præterea vniuersas fluxiones: quā ratione videtur exiccatoriū. Quare ad herpetas, vicerāq; bonum remediū est. Quin etiam cruentā vulnera glunnat, auridūq; puri & vlcenbus confert. Stillicidio & stranguri affectus exhibitum, vrinam mouet, vt Dioscorides ait. Fecminæ ad omnia mas præstat.

*Polygonum.* Polygonum. Eius folia modicē astringūt, videnturq; si bibantur, lac generare. Itaq; superauem in eo calidum humidūq;.

*Polygonatum.* Polygonatum. Astrictionis pariter & acrimonie habet quipiam, cum fastidiosa quādam amaritudine. Quare nō vique adeo est viciū. Sunt qui radicē eius illinant vlcenib;.

*Polemonium.* Polemonium. Tenuium paritū est, & deficandī vim obninet. Vnde quidā radicē eius cum vino ad ischiadas, dysenteriam, lienēq; in duratū propinant.

*Polygonum.* Polygonum. Amarū est ac modicē acre. Obstructione itaq; omnia viscera liberat, vniūq; & menses promouet. At viride magna etiā vulnera glunnat, & maxime species eius frusticosa. Aridum sanat rebellia vlcera, præcipue quod minus est.

*Polygonum minus.* Polygonum minus. Acrius & amarius est hoc quā maius, adeo vt ex tertio fit ordine deficantium: ac secundo autem completo calfacientium.

*Polygonum.* Polygonum. Deficcat & calfacit secundo excessu: itaque & ipsum vulnera glunnat.

*Potamogeton.* Potamogeton. Astringit & refrigerat similiter polygono, sed essentia eius crasior quā polygoni est.

*Polypodium.* Polypodium. Dulcē simul & austerū vincentē obninet qualitatem, vt facultatis sit citra morsum admodum exiccantis.

*Prasium.* Prasium, Marrubium. Prasium amarum cū sit, iecur ac lienem liberat obstructione, thoracem & pulmonem expurgat, ac menses promouet. Sed illud etiā detergit & digerit. Calfacit itaq; secundo excessu completo: siccatur autē tertio ineunte, aut completo. Sueco eius ad aciei oculorū claritatem vruntur cum melle: per narēque auriginem purgat, ipsūq; ad inueteratos aurū dolores adhibent.

*Propolis.* Propolis. Modicē quidē extergit, ceterū validē trahit. Est enim essentia tenui. Excalfacit porro ordine secundo completo, aut certē incipiente tertio.

*Præmia.* Præmia. Flores eius ciendæ sternutationis vim obninent. Sugillata & cæteras echymoses digerit. Viridis porro calfacit secūdo ordine, tertio autem siccatur.

*Prælia.* Prælia, Vinus. Vini foliis quandoq; recens vulnus conglutinauimus, confidentes astringentem simul & abstergentem inesse eis facultatem. Cæterū cortex magis amarus est, astrictiorisq; magis. Itaq; cum aceto & lepras sanat. Quod si viridis circūligatur vulneribus, ea glunnat potest. Radices etiam eandem vim obninent. Quarum decocto sunt qui perfundant fracturas, quæ callo obdaci desiderant.

*Pteris.* Pteris, Filix. Radix eius larum lumbicū perimit, si in melicrato pondere drachmarum quatuor bibatur. Quare ipsam partum viuū necare, mortuum autem expellere, non est mirum. Siquidem amara exstitit, paulūq; astrictionis obninet. Vnde validē vlcera deficcant, citra morsum tamen. Similem ei vim habet Thelypteris.

*Pycnocodum.* Pycnocodum. Radix, fructus, & folia eius, digerendi attrahendiq; obninet facultatē: acria nimirū cum sint. Folia eius phymata furunculorū discantur. Fructus valentior est: nam & palos, & tela infixā, ad eximiam curem elicit. Radix ad supradicta est infirmior, cæterū flauam bilem expurgat.

*Pyrethrum.* Pyrethrum. Radix eius caulicam possidet facultatē, quā dentes refrigeratos mingat. Porro ad rigores ante periodum cum oleo conficit: stupidosq; & resolutos adiuuat.

*Pyros.* Pyros, Triticum. Pyros. Foris impositum, primi est ordinis calfacientium: cæterum nec siccare, nec humiditate manifestū potest. Habet verō etiā quiddam lentoris, obstructorisq; naturæ. Quod ex eo amyllum conficitur, ipso est tum frigidius, tum siccius. Quod ex pane fit cataplasma, magis digerit, q̄ quod ex tritico, salis & fermenti ratione. Fermentum quippe vim attrahendi habet, digerendūq; in alto residet.

*Rhamnus.* Rhamnus. Deficcat & digerit excessu secūdo. Refrigerat in primo cōpleto, aut secūdo incipiente. Proinde herpetes sanat, & erysipelata nō magnopere calida.

*Rhaphanis.* Rhaphanis, Radicula. Excalfacit excessu tertio, deficcatur verd secūdo. Agrestis in vtroq; efficacior est. Semen etiā effiacius est plāta. Et enim inest digerēdi facultas.

*Rheum.* Rheum.

## Rheum, Rha.

Quiddam habet terrestris frigidum, seu indiduo est astrictio: adiuncta est illi tamen quedam caliditas. Si quidem si mandatur phisiculum, subiacere conspicitur. Est etiam aëreæ cuiusdam substantiæ sublimis particeps: quod indicat laxitas, leuitasq. Quare cōvulsis, ruptis, ortopneurijs prodest. Sic quoq. liuentia & lichenas cum acetum illatum perianat. Astrictionis ratione, sanguinem expueuntibus, carliacis, & dysentericiis confert.

## Rheriaz, Resine.

Resine omnes desiccant & exsiccant. Lenticine tamen (quam vocant mastichen) primis de bestur partes. Nam præter q. quod pauca ei inest astrictio, qua stomachi, vëtrij & iecoris imbecillitibus, phlegmonisq. etiam accommodatur, desiccant insuper citra mordacitatē. Minimū enim acris est, & maxime tenuium partium. Inter ceteras præfertur terebinthina, manifestam quidem, nō tamen similiter atq. mastiche, astrictionem possidens. Verū adiuncta habet quandam amaritudinē, per quam magis q. mastiche digerit. Per eandem etiam vique adeo abstergit, vt pistoria sanet. Qui enī quē in profundo residet, magis ceteris extrahit, ob maiore tenuitatē parium. Attamen picea, & hac etiam magis strobilina, aciores ea sunt, sed nō magis tamen digerunt, attrahuntve: Media inter has sunt picea & abietina. Habet porro & emolliens quiddam terebinthina. Secundum locum habet in emolliēdo lenticina, sicuti cyparissina in ipsa acrimonia.

## Rhodos, Rosa.

Ex aquea substantia calida, duabus aliis qualitatibus mista, astringenti videlicet & amara, composita est. Floa tamen magis, q. ipsa rosa, est astringens: ac proinde etiam exsiccatoris est.

## Rhodia rhiza, Radix rhodia.

Tenuium partium & digerens est facultatis. In calfaciendo verō secundi ordinis est censenda, aut certe tertij incipientia.

## Rhododaphne.

Tota sua essentia venenū est & homini & pecoribus. Porro calfacit excessu tertio: primo autem desiccant.

## Rheza, Mālum granatum, siue puniceum.

Omne mālum granatū astringentē qualitatē sortitur: non tamen in omnibus ea exspectat. Nam inter ea quedam sunt acida, quedam plus dulcia q. austera. Pro ratione quærum qualitatū vincentium, suos vsus præstat. Porro acrimonia gentiores, & exsiccantiores sunt succo. Sicuti & his putamus, quæ sidia dicuntur. Adsimilem illis vim habent flores qui cynni dicuntur.

## Rhus, Sumach.

Ad desiccandum & astrigendū coriarū hac planta fruticosa vtuntur. Medicis in vsu sunt fructus eius & succus, austere admodū qualitatia. Exsiccant itaq. in tertio ordine, refrigeras verō in secundo.

## Rhypos, Sordes.

\* Sordes quæ à gymnasiisq. statuis creta abra ditur, digerendi emolliēdisq. vim obninet: quæ autem ab illa qui in palæstra exercetur, quantū accepit pulueris, tantū ab ea est diuersa: atq. hæc sordem vocat Græci nominant. Prior igitur, quæ ob contractam ruginem, acrior etiam existit,

cruda phymata digerit. Secunda autem, optimū est phlegmones mamillarū remedium: Constat enim ex puluere repercutiente, oleo emolliente, ac deniq. sudore & fordidis digerentibus.

## Sagapenum.

Liquor est calidus & tenuiū partium, sicuti & alij liquores. Sed absterfione quandam obtinet, qua oculorum cicatrices expurgat, extenuatq. Suffusionibus etiam & hebetudinibus oculorū, quæ à crassius humorem proveniunt, non malum est medicamen. At planta ex qua provenit, ferule asinilis, imbecilla est & inuitilis.

## Sampfychon, Maiorana.

Tenuium partium & digerentis est facultatis: desiccant enim & calfacit ordine tertio.

## Sapotes pæni, Caries lignorum.

\* Caries eorum præcipue lignorum quæ participia sunt astrictionis & absterfionis, vt vlmæ, expurgat, impletq. vlcera humida.

## Sarco colla.

Mistam vim habet ex emplastica quadā substantia, & pauca amara. Itaq. citra morsum desiccant, ac proinde glutinæ vlcera valet.

## Saryion, Triphyllon.

Humidū calidamq. est temperie, ob idq. dulce. Recrementitiam tamen & statuosam humidatē possidet. Quocirca ad venerem incitat.

## Selmon, Apium.

Ad eod. calidū est, vt & vinam & menses cieat. Flatu quoq. digerit, & magis semen quā herba. Orofelsini & hippofelsini similia vis existit. Verū Hippofelsinum imbecillius est, orofelsinum valentius.

## Seria, Cichorion.

Holus est subamarum, & magis quod agreste est. Id namq. est frigida & sicca temperatūra, secundo excessu. Ceterū domestica magis quā agrestis refrigerat. Porro vtraq. astringētis qualitas est particeps, vt chondrilla, quæ est etiam sericeæ species.

## Seriphum.

Abstinthio est rum specie, rū gustu simile. Ceterū nō æque astringit: sed calfacit valentius, necnon amaritudinem quandam saluginosam effert, ventriculorū est infestum: magisq. abstinthio lumbicis enecat. Calfacit itaq. secundo ordine intensio, siccant autem in tertio.

## Seseli.

Ad eod. exsiccant rum radix, rum fructus, vt moueat vrinæ. Est etiam tenuium partium, vt & comitialibus morbis, & orthopneia competat.

## Sesamum.

Viscosum & pingue cum sit, emplastici etiam existit, emolliēsq. ac modice calidum. Oleum quod ex eo conficitur, & ipsa herba decoctū, eiusdem sunt facultatis.

## Sesamoides magnum.

Semen eius vt helleborus purgat, similiterq. abstergit, calfacit & desiccant.

## Sesamoides album.

Huius semen nonnullam acrimoniam fortitur, vehementerq. est amarum. Exsiccant itaq. rumpit, extergitq.

## Sideritis.

Nonnihil abstergit, sed plurima pars eius est

Sagapenum.

Sampfychon. Maiorana.

Caries lignorum.

Sarco colla.

Saryion. Triphyllon.

Selmon. Apium.

Seria. Cichorion.

Seriphum.

Seseli.

Sesamum.

Sesamoides magnum.

Sesamoides paruum.

Sideritis.

humida & mediocriter frigida, cum exigua astringitione, qua phlegmonē sedat & glutinat. Sideritis autem Achillea, dictam superans astringitione, sanguinis eruptioni, dysenteriz, & muliebri profluvio est aptissima.

#### Sicyos, Cucumis.

Maturus, tenuioris essentiz est: immaturus, crassioris. Sed incidendi & abstergerendi facultas eis inest. Quare & urini mouent, & corpus splendidum reddūt. Sunt enim humidi frigidiq; quasi in secundo ordine. At arfacta tum radix tum semen, siccant primo, aut secundo incipiente, ordine: magisq; abstergant, q̄ ipsius melonis caro.

Sicyos agrios, Cucumis agrestis.

Tum ipse, tum eius saccus, quem elateriū vocant, aut ex foliis & radicibus pressus, per vitis ad medicationes exsistit. Elaterium itaq; menses ciet, strāq; perimir applicatū, ceu alia omnia amara & tenuius parium. Summē siquidē est amarum: calfacitq; in secundo ordine, ac proinde etiam digerit. Sic enim eo angina laborantes invigūt quidam cum melle aut oleo veteri. Bonum item est regio morbo affectus infusum cum lacte in nares. Similiter dolores capitis lauat. Radix atq; foliorū succus similem, sed imbecilliorē facultatem sortitur. Radix etiam abstergit, digerit, emollit. Cortex potentius deficcet.

Silplium, Lascrptum.

Silphij liquor calidissimus est. Necnon folia, caulis, & radix, strenuē etiam sunt calida: omnia tamen statulentia magis essentia sunt, ac proinde difficilia concocta. Fons autem impolita corpori, efficaciora, liquor precipue, admodum traientem facultatem possidens. Arramen & excrecatias extirpat, & quandam liquandi vim possidet.

#### Sison.

Calidus & subamarus exsistit. Vnde urini mouet, concoquit, menses provocat, omnēq; viscērum obstructions referat.

#### Sion.

Quantum gustu \* aromaticū est, tantū etiam excalfaciens facultatis est particeps. Quare & digerit, & urinam mouet, & calculos senū frangit, & menses evocat.

#### Sisaron.

Sisari radix cocta stomacho grata est, & urinam mouet: secundo ordine excalfaciens, cum amaritudine & astringitione leuicula.

#### Sisymbrium.

Tenuium est partium, facultatēq; digerentis, calfaciens, & exiccantis in tertio ordine. Quidam semen cum vino exhibent singulnentibus, tormināq; patientibus.

Sisymbrium, quod Cardaminem vocant. Si sicum sit, tertij est ordinis calfacientium & exiccantium, si humidum, viridēq; secundi.

#### Scandix.

Agreste est olus, subacre & amarum. Calfacit itaq; & siccet secundo ordine intenso: valenter mouet urini: viscēraq; liberat obstructionibus.

#### Silla.

Admodum quidem incidit: calfacit autem secundo ordine. Porro præstat eam assam aut elixam sumere, quod sic eius vehementia exoluat.

#### Scolymos.

Radix eius, si quis illam in vino coctā bibat, graueolentem urinam abundanter elicit, fortioriq; alarum medetur. Succus enim eius est purgatorius. Calfacit porro secundo & completo ordine, aut tertio incipiente: siccet verō secundo.

#### Scordion.

Nonnihil amarum obtinet, & acerbum, & acriusq; acrimonia, alij acrimoniæ est permixtum. Expurgat igitur, excalfaciens viscera: menses urinaq; provocat. Conuulsa, rupta, dolorēq; laterum ab obstructione & frigore obortos, eorum sanat: illitum viride, magna vulnera glutinat: purgat sordida: in persūsq; aridū, contumacia ad cicatricem perducit.

#### Scorodon, Allium.

Deficcet & excalfacit excessu quarto. Porro opulens corodon, aliū agreste est, domestico valentius.

#### Scorodopraffon.

Vt gustu & odore, sic viribus inter allium & porrum median naturam sortitur.

#### Scorioden.

Excalfacit ordine tertio: deficcet secundo.

#### Smilax, Cactus arbor.

Facultatis est venenose.

#### Smyrna, Myrrha.

Secūdi est ordinis calfacientū & exiccantiū. Vnde capitis vulnera glutinat. Inest illi amaritas non exigua, qua turtum & lumbros enecat, cicicq; habet etiam & abstergerendi vim moderatam. Quare ocularibus miscetur medicamentis, & iis que ad veterem tussim, atq; anhelationem administrantur.

#### Smyrna Boice, Myrrha Bactria.

Vim habet calfaciendi, fundendi, emolliendi.

#### Smyrnium.

Ex eodem genere cum apio est & petroselinio: fuerit apio quidem validius, imbecillius verō petroselino. Itaq; & urinas & menses prorit: calidum siccūq; tertio ordine.

#### Sonchus.

Dum viridis est, aqua terreęq; essentia consistat, utraq; leuiter frigida: nam & astringitionis cuiusdam est particeps, & manifestē refrigerat, tū illius, tum estus. At arfactus, terrestrior redditur, modicam asciscens caliditatem.

#### Sparganium.

Deficcantis est facultatis.

#### Spartum, Genista.

Sparti (quo & vites alligat) tum fructus, tum succus virgari, valentē trahendi vim possidet.

#### Straphilinus, Pastinaca.

Satina imbecillior, agrestis ad omnia potētiore est. Urinas mensēq; provocat, abstergitq; nonnihil, cum herba quidē tota, tum vel maxime semē & radix.

#### Strachys.

Gustu est acri & amaro, tertij calfacientium ordinis. Vnde menses rationabiliter provocat. Facit ramen abortum, atq; secundas elicit.

#### Sterbe.

Fructus eius & folia astringunt citra mordacitatē, deficcantq; in tertio ferē incipiente ordine: Quare decoctum eorū iniicitur dysentericis, a uribūq; purē fluentibus: quod etiam magna vulnera glutinat, præcipue cū vino atro & austero. Valenter

Valenter enim deficiat omnes præter naturā humilitates. Folia viridia illata erumpentē sanguinem supprimunt, suffusionibusq; oculorū ex seculis medentur.

Stechas.

Amara est & mediocriter subastringens, cum nimis ex terrena essentia frigida exigua, & exaremata altera terrena copiosa, consistit. Quare obstructione liberat, extenuat, extergit, roboratq; & viscera & vniuersum corpus.

Stratiotes.

Aquaticus quidem humida & frigida facultas est terrestris verò, nondum habet astringentis. Proinde & viscera glutinat.

Struthion.

Radix eius est acris, calida, siccaque temperamento, ex quarto propemodum ordine exallescens. Sed & abstergit, & irritat: proinde & irritationem provocat.

Stryax.

Excalfacit, emoluit, concoquit. Quamobrem tussis, catarrhus, pituitæ destituta nonibus, rauedinitibus auxiliatur. Tum menses, seu potum, seu admodum prolicet. Combusti eius fuligo, thuris fuligini est similis.

Syca, Ficus.

Arida exallescunt ordine primo aut secundo incipiente, habentq; partium tenuitatem quandam: quare tubercula dura concoquunt, digerunt, tumescunt, tum ipsarū decoctum. Verum ubi magis concoquere consilium est, miscenda est farina triticea: ubi verò plus digerere, hordeacea. Panis horum in medio. Porro quæ sunt pinguioribus, magis possunt concoquere: quæ acrioribus, magis tum extergere, tum digerere. Ficus vides, imbecilliores sunt. Vray tamen & sicce & humidæ alium subducunt.

Sycc, Ficus arbor.

Calida, tenuiumq; partium temperaturæ est, sic ut indicant tum liquor eius, tum foliorū succus. Valenter enim calidat uterq;. Itaq; non moridicat tantū, aut vehementer absterget, sed & vicerat, & ora vasorum refert, & verucas extirpat. Quin & vim purgatiuam habet. Porro lachryma & succus agrestis ficus, quam caprificū vocant, ad omnia, q̄ sanus, valentior est. Ceterū ipsarū fureculi adeo calidi sunt, atq; tenuium partium, ut carnes bubulas duras, si coquendis adiutur, friabiles ac teneras reddant.

Symphytum petracum.

Habet quandam vim incidendi, qua collectū in thorace pulmonēq; pus expurgare potest: ac simul contrahendi facultatis est particeps, quæ eiectionibus sanguinis auxiliatur: estq; humidam, ac non immodicè calidum: unde & dulce apparet, atq; odoratu iucundum. At hæc, mansum sitim extinguit, & arteriæ sanat asperitates. Laquet igitur ipsum etiam & digerere, & cōstringere possit. Unde & enterocæcus imponit, & ad convulsā & rupta cum oxymelite bibitur.

Symphyton magnum.

Similem dicto vim habet. Ceterū neq; videtur dulce, neq; odoratū. Est verò secundū viscositatem mordacitas rēq; sicillat simile.

Spondylon.

Fructus eius acris & incidens est: itaq; ad astringentem morbum aptum est medicamen.

Prodest & aurigine. At radix ultra tam dicta, fistulas callosq; vulgib; sit circumfusa. Fioris succus, ad diuturniora auris vlcera cōueniēter reponitur.

Schinos, Lentiscus.

Ex aqua essentia leuiter calida, & terrena frigida non pauca, consistit. Deficiat itaq; secundo ordine cōpleto, aut tertio incipiente, in caloris frigorisq; medio cōsistens quodammodo. Astringit autem ex aqua, moderatēq; omnibus partibus suis. Succus bibitur & per se, & cum aliis medicamentis, quæ dysenterias & alii affectus sanant. Quin & ad sanguinis expunctiones, flores muliebris, neq; in sedis vlcusq; prociuentias idoneus est, vtpote ad hypociusta nonnihil accedens propē.

Schinus anthos, Schini flos.

Modicè calfacit, modicēq; etiam astringit, nec planè a tenuitatis natura est alienus. Quare vrinam & menses mouet, siue ponens, siue iouēto adhibitus. Prodest etiā icterici, stomachi, & ventris inflammationibus. Ceterū magis astringit radix, quantū illos etiam attingat omnibus partibus suis. Proinde medicamentis quæ laxa moricis exhibentur, miscetur.

Schinus leia, luncus leuia.

Quidā oxyfchinus, alius oligofchinus dicitur: gracilior duriorq; oxyfchinus, crassior laxiorq; oligofchinus. Fructus huius formi consiliat. Oxyfchini autē duæ sunt speciei: altera sterilis, cuius nullus ylus in medicina altera quæ fert semen somni cōsiliatū, sed minus q̄ oligofchini. Vtrūq;, si cum vino bibatur, ventris fluxus defecit, & muliebre profluuiū rubrū fuit. Est itaq; eorum tempestes composita ex terrena essentia leuiter frigida, & aqua leuiter calida.

Terminthos, Terebinthus.

Cortex, flos, & fructus eius astringunt, & secundo ordine exalfaciūt: unde etiā quod siccit, liquet. Porro fructus aridus propinquus est tertio ordini deficiantū, calfacitq; valenter. Quare & vrinam provocat, & hemibus auxiliatur.

Teutlon, Bera.

Nitrosæ facultatis est particeps, qua tum digerit, tum extergit, & per naves expurgat. Ceterū cocta nitrositate exurit, evaditq; leniter digerē, ad detergendū tamen digerendūq; validior est bera alba.

Teucium.

Incidit & tenuium est partium: quare lienes sanant. Ac exiccat quidem in tertio, calfacit autem secundo ordine.

Tephra, Cinis.

Ex partibus cum terrenis, tum etiā fuliginosis (quæ & tenuis sunt, & cum aqua in qua macerant prius fuerint cineres, excolant) consistit. Pro materis tamen cōbustæ differentia, capiens temperies variat. Quare laudatū quoque ratione. Dico scorides astringere cineres omnes proderit, cum fuligine cinis eiusmodi omnia qualitates sit experta, nimirū ipsa arborē nulla parte sui acerbam qualitatem reddente. At ex acerbis lignis cōfectis cinis, non parū quidem attingit: meminimè eo aliquando sanguinis suppressisse eruptionē. Verū nullus vnq; ad tale vti fuligineo audeat. Siquidē hæc acrimoniæ plurimā, vtrūq; facit.

AA



cultatis obtinet, mixta absterfioni. Est & calx cineris quædam species, cæterū tenuioris essentie, quæ ex lignis fit. Porro elota, medicamen est contra morsum desiccans, magis si bis tervè lauet. Cæterū si marina aqua abluta sit, admodū digerit. **Telephium.**

**Telephium.** Exiccandi & detergendi facultate est, non tñ insigniter calida, sed forsā secundi ordinis. Desiccatur etiā secundo, intenso tamen, aut tertij principio. Proinde ad putrida vlcera cōgruit, & cum so aceto vitæque vitiliginem sanat.

**Telis, Fœnumgræcum.**

**Telis.** Calfacit secūdo ordine, desiccatur primo. Proinde ferētes phlegmonas irritat: quæ verō minus sunt calidæ, & magis duræ, eas digerēdo planat. **Tithymali.**

**Tithymalus.** Tithymali omnes vincentem habent acrem, calidamque potentiam, cum amaritudine quadam. Validissimus eorum est liquor: dein fructus & folia postremò radix. Hæc aceto incocta, sanar erosorum dentium dolores: liquor in ipsa foramina inditur. Cæterū si aliam partem cōiungat, cōtinuò adurit vlceraque illam, ex quarto exiēs calfacientium ordine, qui ad exvrentia pertinet. Sic pilos quoque, & verrucas, & myrmecias, & pterygia, & thymos, cum oleo inunctus succus evellit: dererigit lichenas & pŕoras, propter amaritudinē: necnon vlcera phagedænica, anthracode, & gangrenode, quia valenter calfacit & desiccatur, aliquando iouare poterit. Ad hæc fistularū callos eximit. Prædicta omnia folia & fructus præstare possunt, sed imbecillius. Quibus sanè & ad pisces in aqua stagnali capiendos, vti assolent. Ceterimè enim ab illis in vernigmem asti, ac semimortui redditi, ad aquæ superficiem feruntur. Porro cū septem sint tithymalorū genera, rarissimissimum est quæ characiā marēque nominant: & femina nuncupata myrsinites: & qui in petris nascitur arborescens. Deinceps qui phlomo asimilis est, & cyparissia. Dein marianus: ac deniq; helioscopus. Pro portione autem facultatis ipsorum, & cinis & lixivium existit.

**Tragacantha.**

**Tragacantha.** Emplastica facultatem similem gummi obtinet, necnon obfusciorem acedinem. Ac sanè similiter illi desiccatur.

**Tragion.**

**Tragion.** Tragii folia, fructus, lachrymæque, trahentis digerentisque sunt facultatis. Est verò & tenuiū parum, & facultate in principio tertij ordinis calida. Striptes, & infixæ corporibus extrahit, lapides frangit, menses mouet, diachmæ pondere potum. Porro in Creta sola nascitur, lentisco simile. Alterum minus, cuius folia scolopendrio similia sunt, vifitur quidē multis in locis, sed non parum habet facultatis astringentis, vt & ad fluxuum affectus conveniat.

**Tragoriganon.**

**Tragoriganon.** De hoc in sermone de organo diximus.

**Tribolos.**

**Tribolos.** Ex humida essentia modicè frigida, & sicca non mediocriter, cæterū similiter frigida cōstat. Vnde contra phlegmonarū generationes, & cōtra oēs influxus cōgruit. Porro terrestres ipsius fructus, cū tenuiū sit partiū, porus renū calculos cōterit.

**Tripolion.**

Radix huius est acris, & faculare calida in tercio excessu. **Tripolion.**

**Triphyllum.**

Calfacit & siccatur in tertio ordine, vt bitumen, cui odore est simile. Proinde porum laterū dolores ab obstructione natos iuvat: & vrinā mensesque pvocat. **Trichomanes.**

Eadem præstat quæ adiantum.

**Tryclinon, Solanum, Stryclinon.**

Esculentū quidem astringit, refrigeratque in secundo ordine. At eorū quæ eius non sunt, vnum quidem dicitur Halicabacum, fructū habens rubrum, acino vix persicilem. Alterū verò est fruticosum, à cōstantino somno Hypnoticiū appellatum. At tertij, quod ad insaniam adigar, omnes Maoricū nominant. Halicabacū igitur, fructū fert ciende vrinæ idoneū, comploribusque facultatibus quæ ad iecur, vesicam, & renes accommodantur, miscetur. Solani verò hypnotici cortex radices, si cum vino bibatur, somnū accersit, drachmæ pondere sumptus, exiēs succo papaveris similis, nisi quod imbecillior, vtpote tertij refrigerantiū ordinis, cum ille sit quartus. Huus solani semen vrinā ciendi vim habet. Si plus tamē duodecim corymbis hauseris, dementiam accersit. Quod reliquū est ex solanis, pposuim, est ad medicamenta intra corpus iouile. Nam si quatuor eius drachmæ offerantur, mortē inferent: si pauciores, insaniam. Vna certè usque sumit nihil tamen vtile præstat. At foris corpori allinū, vlcera maligna persanar. Verū ad talia, radices cortex præfert, desiccans secundo ordine iam cōpleto, aut tertio incipiente, secundo autē incipiente refrigerans.

**Hyacinthus.**

Radix eius bulbosa est, desiccans primo ordine: secundo autem, aurinitio tertij refrigerans. Fructus leuiter extergit astringitque: vnde & regio morbo laborantibus exhibetur in vino, ordine quidem tertio desiccans, at in medio caloris frigorisque consistens.

**Hydnon, Tuber terræ.**

Substantiam habet vincentē terrestrem quidem, sed cum paucula tenuitate permixtam.

**Hydropeperi.**

Non vsque adeo calidum est, vt piper. Viridis ipsa herba cataplasmatibus instat imposita, sugillata & tumores induratos digerit.

**Hyoscyamus, Altercum.**

Cui semen atrum est, insaniam ac soporem inducit: cui verò mediocriter sanum, propinquū ei obtinet facultatē. Vtrique tamen fugiendi sunt, vt deleteriū & inuolens. At cui semen & flos est candidus, sanitati idoneus existit, est tertio quodammodo refrigerantiū ordine.

**Hypericum.**

Calfacit & siccatur, essentia tenui, adeo vt menses vrinæque pvocet. Illius viride, ad cicatricem omnia perducit vlcera. Siccum cōfusumque si inspergas, mollia, humida, & purillaginosā sanabis. Sunt qui & ischiadici bibendum propincent.

**Hypon.**

Refrigerat tertio ordine, parumque i papauere distat.

**Hypoglosson.**

Radix eius & succus emollitū vim possidet.

**Hysso-**

*Hysopum.* Hysopum.  
Deficcet & exalcatur ordine tertio, sed tenuius est parium.

*Phaci, Lentis.* Phaci, Lentis.  
Valenter astringunt, mediū tenent inter calorem & frigiditatem. Deficcit tamen in secundo ordine. Ipsum itaque corpus, siccat & sistit alium. Ceterū decoctū prouocat. Proinde prior aqua abicitur, ubi retentionis causa exhibetur.

*Lenticula palustris.* Lenticula palustris.  
Humidæ frigidæque temperaturæ existit, vtrinque ex secundo ordine.

*Phaleris.* Phaleris.  
Succus, semen, & folia eius, commodè potari creduntur cetera vesicæ dolores, cum in se habeat tenue quiddam & calidum.

*Phalangitis.* Phalangitis.  
Sic dicitur, quod morus à phalangis auxilio sit. Est autem facultatis tenuius parium, & excitans, quare remota lenit.

*Philomus, Verbasum.* Philomus, Verbasum.  
Huius herbe dux sunt species. Quædam enim foliis est candida, quædam vero nigra. Rursus, alba quidem mas est, cuius folia ambustiora sunt, cuius maiora videntur. Est & alia philomus agrestis, flores habens aureos & luteos: necnon alia quam philomida appellant. Priorum duarū radix acerbæ gustu est, & fluxionum affectibus prodest, atque adeo denum doloribus: quamq̃ folia digerendi vim habent. Similiter & aliarum folia. Omnium quippe folia deficcandi & detergendi vim possident.

*Phornix, Palma.* Phornix, Palma.  
Astricthoræ facultatis est particeps omnibus partibus suis. Igitur ramorū succus austerus est, ex aqua substantia tepida, & terrea frigida consistit. Similis facultatis est eius cerebrū, cui aptū. At fructus, & maxime dulcis, non paruam obtinet caliditatem. Qui quidem cum edendo sit, magno est vsum, non tantum foris impositus, ubi roborare, deficcare, contrahere, inspirare est consilium, sed tanquam cibis sumptus, & simul cum alia, & per se. Porro tenerū palmæ germen, eandem cum eius cerebræ facultatē fornatur. At cortex astringit quidem, ac plus quam dicta omnia deficcet: \* vtpote minimū habens humiditatis. Quare ad vlcera putrescentia, laxos articulos, hepatis & vetriculi imbecillitates, eo intus & foris administrato videntur. Radix circa morsum deficcet, cum non nulla astrictione.

*Phormion.* Phormion.  
Phormii semine cum melle ad leucomata \* videntur. Sed spicula eius extrahere creditur, veluti & ipsa herba. Quare tenuium partū, & attrahendi digerendi potentiam obtinet.

*Phu.* Phu.  
Odorata quodammodo eius est radix, nardo viribus similis: ad plerumq̃ tamen infirmior. Mouet autem vrinam, ut narus gallica.

*Phycos, Alga.* Phycos, Alga.  
Ex mari exemplum & virens, siccat refrigeratq̃ in secundo ordine: habet enim quiddam modicè acerbum.

*Phyllitis.* Phyllitis.  
Acerba cum sit, meritis & diarrhæas & dyenterias epota iuuat.

Phyllon malabarhu, Folium malabarhu.  
Nardo similem possidet facultatem.

*Chalbane, Galbanum.* Chalbane, Galbanum.  
Succus est plantæ ferulaceæ, mollior & digerendi vi: calfacit enim ordine tertio incipiente, aut completo secundo: siccat verò secundo incipiente.

*Chamedrys.* Chamedrys.  
Vincemtem habet qualitatem amarā. Est & quodammodo acris: quare meritis lienes colligit, quæ, vrinæ & menses prouocat, crassitudinem humorum incidit, viscerūq̃ obstructions re-purgat. Calfacit itaque & deficcet tertio ordine: plus tamen calfacit quam siccat.

*Chamaecissos.* Chamaecissos.  
Flos eius admodum amarus cum sit, lecur obstructū aperit: daturq̃ coxendicæ laborantibus.

*Chamelea.* Chamelea.  
Vincemtem habet qualiter amaram: quare admodum sordida vlcera, & quæ maximè indurata sunt crustis, purgat cum melle est potens.

*Chamaeleuce.* Chamaeleuce.  
Calfacit quodammodo tertio ordine, siccat primo.

*Chamaeleon.* Chamaeleon.  
Nigri quidem radix, letale quiddam obtinet, quare foris vsum eius ad ea quæ abstergionē postulant, administratur. Præterea digerentibus & emollientibus pharmacis commiscetur. Etenim siccat tertio ordine, calfacit autem secundo abfoluto. At albi radix quod dicitur fit perinde acris, potius datur cum vino austero, mensura oxybaphi, laborantibus aqua inter cutem.

*Chamaepitys.* Chamaepitys.  
Magis amara est quam acris: quare abstergit, purgatq̃ viscera, magis quam calfacit. Proinde auriginosis, & quibus facillè lecur obstruunt, bonum remedium est. Qylin & vrinam, & menses ducit tum pota, tum illita cum melle. Viridis vlcera magna glutinat: vlcera putrescentia sanat: durities vberū discutit. Est enim in secundo tertij ordinis: in calfaciendo, secundi.

*Chamaefyce.* Chamaefyce.  
Abstergendi simul & acrem vim possidet. Itaque acrochordonas & myrmecias, caules eius teneriores intrit, quip ex eis profuit liquor, auferunt. Cum melle crassas oculos cicatrices deterunt: hebetudinem visus & crassitie ortam, adiuvant: sicut & suffusionum principia.

*Chelidonium.* Chelidonium.  
Admodum extergit & calfacit. Succus eius ad acutèdum vsum est commodus. Quidam radicē eius ad aurignē ab obstructione lecoris ortam, in vino albo cum aniso propinant. Mansa enim confert dentium doloribus. Chelidonium minus, cum maiori sit acris, celeriter cutem exulcerat, vnguentūq̃ scabro elicit. Succus eius per narē purgat. Hæc itaq̃ siccat & calfacit in quarto incipiente ordine: ac chelidoniū maius in tertio.

*Chondrilla.* Chondrilla.  
Eiusdem ferè est facultatis cum scri:nisi quod amariucula est, ac profinde siccantior.

*Chondrus.* Chondrus.  
Nutrimentū quidem est optimū, sicut triticū. Vt medicamen autem, emplasticè est facultatis, tepere tritico similis, nisi quod viscosior existit: qua ratione plus illo nutrit. Est porro hoc semē

vel ut materia quædā idonea excipiēdia medica-  
mentis fuccanib. Ipſum verò ex numero conco-  
quentiū exiſtit, vt trititū, quæ minimè perfectò  
deficiant. Chryſocomo.

*Chryſocomo.* Radix vinētes habet acrem & astringentem  
qualitates: quare non admodum multi vſus eſt.  
Quāq; cocta in melurato, peripneumonis &  
morbia hepatici auxilia. Sed & menſtruis pur-  
gandia eſt vtilis.

Pſeudodiſtannum.

*Pſeudodiſtan-  
num.* Vim diſtanni, ſed imbecillam fortitur.  
Pſyllum.

Semen habet admodum vtile ex ſecundo re-  
frigerantiū ordine. In deſiccando verò & hume-  
ctando, quodammodo eſt ſymmetrum.

Ocimum.

*Ocimum.* Ex ſecundo eſt ordine caſcantiū. Habet autem  
trecementitiam humiditatem: proinde nec  
cōmodum eſt, vt in corpora fumatur. At foris il-  
litum, concoquit digeritq.

Ocimoides.

*Ocimoides.* Semen tenuiſſimè eſt partium, & citra morſum,  
facultatis deſiccatorie.

### GALENI PERGAMENI de ſimplicium medicamentorum ſacul- tariſus, lib. IX.

**Q**UOTQVE plantarū ſunt partes, fructus,  
ſucci, & liquores, ſuprà dicta ſunt omnia.  
Nunc aut de reliquis medicamētis, quæ  
ex metallorum ſunt genere, quæq; ſpecies ipſius  
terri exiſtunt. diſſerere propoſui eſt. Poſt quæ  
denique nonnihil tractabitur de partibus ani-  
malium, quibus ceu medicamētis ad curationeſ  
vritur. Meminiſſe autē in vniuerſum oportet,  
astringentibus medicamentis facultatem in-  
eſſe cum acris pugnantiſſimam. Astringentia  
ſiquidem contrahunt, conſpiciuntq; & conden-  
ſant ſubſtantia noſtram: ac proinde in quamvis  
corporis noſtri partē extrinſeca impoſita, contin-  
tuō illam & rugoſam, & contractam efficiunt:  
contrā quā acris, quæ admoſa cuti, perſpicuè  
eam excalfaciūt, atq; in molem atrollunt, ruben-  
te colore: ac ſi diutius immorentur, exulcerant.  
Hæc itaq; evidenter apparēt incidere, excalfacere,  
& ſi viciſſim paribus ad ſeſe ſanguinē trahere.  
At astringentia, refrigerando, cōtrahendo, con-  
ſtringendosq; in illis etiam contentū repellere.  
Porro combuſtorum nōnulla calidiora q̃ antea  
redolūt, & ad guſtum, & ad tactum, & ad eam  
quæ in vſu cernitur, facultatē. Quædam contrā,  
ab vſione minus apparēt calida, id quod tactu  
& vſu maniſeſtè diſcernit. Igitur acris multū cal-  
loris amittunt vſitæ: quæ verò nō ſunt eiſmodi,  
aſſumunt. Ceterū combuſtorū nullum planè eſt  
frigidū: relinquuntur enim in illis veluti acrimo-  
nia ignis, quæ per ablutiones extergitur: ita vt  
aqua in qua medicamentum ablutum fuerit, calida  
facultatē compareret, eimq; tenuium par-  
tium: quod reliquū verò eſt, ſit terrene ſimile &  
frigidum, ac deſiccare citra moleſtiam poſſit.

De differentiis terræ.

*Terra diſſeren-  
tia.* Terra cōmunitè ac iecūdum agricolæ, dici-  
tur illa quæ agriculturæ eſt aptiſſima, quæq; hu-  
more macerata, latū efficitur. Atq; in ea ſanè plu-

res differentiæ conſtituunt: allam (exempli gra-  
tia) pinguiſſe dicentes, ex qua lutum ſit viſco-  
ſum & leniū: allam cōtrario modo diſpoſitam,  
hoc eſt, quæ lutū efficiat friabile. Atq; hoc vnum  
vocabulū terræ eſt omnibus vſitātū. Alterum eſt  
ſolia Philoſophia vſurpatū, cum aiunt, elementa  
corporū eſſe terram, aquā, aërem, & ignem. Cor-  
pus namq; extremè ſiccū & frigidum, terrā nū-  
cupant. Secundū quoque nullum compoſitū eiſ  
cor-  
porum terra cenſetur elemētaria. Aſunt tamen,  
quantò corpore fuerint duriore, tantò magis ea  
eſſe terrea: contrā quā agricolæ, qui eam ex-  
actiſſimam eſſe terram cōtendunt, quæ q̃ longiſ-  
ſimè à ſaxi conſiſtentia receſcit. Pro hoc itaq; ſec-  
undo ſignificato, quod à Philoſophia celebra-  
tur, tribus clauſidū generibus diſtrentiſſiſ  
terra: quorum vnum genus eſt lapis, alterū cor-  
pus metallicum, tertium terra quæ colitur.

De differentiis nominare paſſim terræ.

**Terra itaq; vel Latinis enī dicitur vſitatē, quæ**  
inuenta aqua ſoluatur, & ſit lutū. Quæ ſanè quaſi-  
dam differentiæ ſortitur: ſecundum propriam  
quidem rationē, vt videlicet pinguiſ ſi ſit & vi-  
ſcoſa, quæ vtiq; omnino & ſua colore eſt: aut  
contrā friabilis, & pinguiſſimè expers, quam  
argillam appellant, quæ quodammodo candi-  
dior exiſtit: aut ſi inter has maximè cōtrarias ha-  
beat. Secundū miſturam autē alienorū cor-  
porum, vt dum dicimus lapideſcam aut arenoſam  
hanc eſſe terram. Porro talia ſubſtantia admixta,  
ſegregatur larga aque aſſuſione, macerationeq;  
donec vniuerſum perſeiat. Sic enim quod lapi-  
doſum & arenoſum eſt, ſubſidit, & terra exacta  
ſupernat: in quē modum præparat enī & terra  
Lemniz, quam alij ſphragida Lemniz (ob im-  
preſſum illi ſigillum Dianæ ſacri) cognomināt.  
Quæ quidem à Lemnia rubrica diſſert, quod cō-  
tactu nō cōtrahitur, perinde vt illa: quod ſecū-  
do collum in Lemno, qui totus colore eſt ſub-  
ſutus, & in quo nec arbor, nec faxū, nec planta na-  
ſcitur, tantū huiuſmodi terra viſitur. Ceterū eiaſ-  
tres diſtrentiæ aſſignant. Vna quam Lemniam  
ſphragidem diximus: quæq; alij temini, præ-  
ter vni ſacerdotiſſæ, cōtingere ſas eſt: altera ve-  
rò eiaſ, quæ multos eſt, ſive rubrica: ac denique  
tertia, quæ detergen di vim habet. Vtuntur autē  
priorē illa ad vulnera vetera & cōrumacia, ad om-  
nēſq; ferarum morſus, ſicvti ad viciſſas medica-  
menta leralia. Diſtinguere itaq; ab ea terra quæ  
colitur, medicamentofam oportet, quæ ad cura-  
tiones vritur. Tameſſi eiaſ quocq; colitur,  
ſi qua pinguiſ eſt, vtilis ad curationes exiſtit ea-  
rum omnium partium, quæ deſiccari poſſulant.  
Deſiccandæ nanque vim terra quævis poſſidet.  
Cum enim eiaſ corpus natura ſit ſiccum, omni-  
nōq; igne ſubſtantia exiſtens, citra morſuſ citatē  
exiceat. Ad quod quidem etiam abluſio iuuat.

De terræ lotionē.

Ac lauat ſanè terra omnis, vt Lemnia. Pri-  
mò ſiquidem macerata aqua, quæ nullū habet  
medicamentofæ qualitatē ſuſpicionē. Dein ef-  
funditur quod innatur, colligridū id quod eſt  
à lapidoſis & arenoſis ſecretū. Guſtus autem do-  
cet, quam terra lotionē indiget, aut quæ mi-  
nimè. At Lēnia, cum ſit à ſacerdote abluta, ruſſa  
elui non exigit.

De

*Elementa impo-  
rta.*

*Terra ſolia  
viciſſa & ſua  
ita nupera.*

*Terra purpo-  
raſſa.*

*Lemniz ſphra-  
ga.*

*Lemniz  
diſſerentia.*

*Terra quævis  
deſiccandæ vim  
poſſidet.*

*Terra ablu-  
tiſſa.*

## De terra Samia.

At Samiam ne lauari quidē est opus. Vtūtur autē altera eius specie magis, quā Samiū altera cognominant, ad sanguinis expunctiones, muliebrisq; profusua, velvni & Lemnia sigillo, necnō ad verius vlcera dysenterica, priusq; putrescentia evadant. Quāq; etiā & putrescentibus, quae depaſcentia vocant, interdum Lemnia ipsa profuit, inſecta quidem per arnoglossi succū, bibita verō ex oxycrato aquoso: prius tamē abluiri videribus: idē primō quidem, melicrato: dein autem muria. Ceterū Lemnia terra q̄ Samia nō parum efficacioribus esse videt viribus. Quare ab ea, quae phlegmone tentari cōperit partes, exasperantur, cum tamen à Samia iuvenitur. Ex qua & oleo rosaceo mīseimū conficitur pharmacū, etiā cōtra alias feruentes phlegmonas, incipientēscq; bubonas & fluxiones podagricas, & ad ea breuius, quae refrigerare cum mitigatione est animus. Vnde constat à Samiā refrigerare. Quin & magis aërea eius essentia existit, collata à Lemniā, cuius argumēto est leuitas. Aestimabis porro omniū terrarum medicaminosam, tum leuitate, tum grauitate: praeſertim circa gustū asperitatem & lenitatem: ad hanc tenacitatem & abstergerendi potentiam. Tenax enim & viscosus est Samius asfer, cum & Lemnia splargis eiusmodi paululū quiddam habeat. Absterſioria quoq; facultatē moderatē obinent & Selinusia terra, & Ghia: quāmoſrē mulieres quēdā iis ad faciē vrantur. Porro quicquid abstergit leuiter, producendae vlcēri carni est idoneū. Quod si etiā siccat, cicatrici inducendae est habile. At omniū apſissima sunt & ad vicerā quae in fumma cute consistunt, & ad ambuſta, illa quae citra morſum exiccat, nec manifestō exalſaciū, nec refrigerant. Quocirca terra Selinusia & Ghia, pulcherrima suat ad ambuſta vlcērum remedia. Tam verō Cimolia terra cum mīg sit facultatis, partim sanē refrigerat, partim leuiter digerit, operatq; pro natura illorū quibus miscet. Verū vnicū ambuſti cōuenit, velviti & aliae omnes, illatē ex aceto, aut oxycrato: nimirū bullas existerē proliuentes. Ad vertendū tamen est, corpora mollia valentem medicaminū vim haud posse perferre: dura verō posse. Terra itaq; mīſtionis expere, vim habet citra morſum sicciōdi. Cum autē nullū reperire sit corpus à mīſtionē alienum, inspicendum est, qualem nam miscellam ipsa terra forſit. Si qua ergo in ea attractio sentiat, tantū frigiditatis aſſumpſit, quantū habet attractiois. Sin acrimonia, tantum ſit illi inesse caliditatis, quantum & acrimoniae. Similiter, quantū leuior terra ipsa fuerit, tantū accior existit. Quātō grauior, tantū etiam ſyncerior terra. At propriū terrae est, quod igni admota non soluitur, aut liqueſcit: id quod accidit plumbo, ſtanno, auro, & argēto. Cum igitur audis nominare terram argenteam, aut auream, mīmimē intelligas ipsum argenti, aut aurum, per totū terrae corpus misceri: sed particulas quādam exiguas tum auri, tum argenti, illi coniectas, atq; contrarias existerē: calq; ab igne in fornacibus fusas coire inuicē. Eundem in modum quae vitri conſuet terra, arenosa est. Sed & auri quoq; glebuli exiguū ſi frequenter nō paruo numero in quibul-

dam reperiuntur arenis. Terrarū autē id genus omniū qui in metallis sunt, vbi ab eis ſeparatur id metalli aut auri quod continent, reliquae videntur lapideae: nec macerari, rigarive, aut hūmectari per totam ſubſtantiā poſſunt: vt medicinaſa illa, quae cum aqua in iutum degenerat: quaeq; vini circūſta naſcentes in ea vermes interimit, vnde Ampelites vocatur. Cadmia etenim ex illarū lapidearū eſt genere, neq; rigari poſſet. Terra Cretica admodum imbecilla eſt, multū ilia bens ſubſtantiā aëreā. Inest tamen ei quādam citra morſum vis extergendi. Eretrienſis, q̄ Lemnia, valentior poſſidet attractiōē, haſtenus tamen vt nōdum mordicet. Expediit verō hāc terram bis terq; lauare, vt Cimoliam, quō modera tior reddatur. Eam etiam vrant, vt ſubtiliorem, acriorem, & magis digerentē efficiant. Quod ſi poſtea q̄ combuſta fuerit, abluatur, replendus & cicatrice inducendū vlcēribus multo magis oporatur. Ceterū quae colore cineritio eſt, illi quae alba exiſtit, praefert. Eſt & alia terra dicta Pigniret, totū quidē ſaculitate terra Cimoliae aſſimilis, ceterū atra colore, quemadmodū Ampelites. At terra, ſiue lapis, ſiue bolus Armenus, colore eſt pallido, promptiſſimēq; ſolui in leuorē omnino aequalē, vt calx, valde magis deſiccā vim poſſidet. Si quidem ad dyſenterias, ventris profuſia, ſanguinis expunctiones, caranthos, & putrefcentia oris vlcera, in primis cōperit. Quin & illos magnificē iuuat, quibus ex capite in thoracem fluxio decumbit. Quare & iis quibus ex tali occasione anhelitus diſſicilis eſt, valde auxiliat. Sed & eos qui rube laborit, adiuuat vlcēs enim ipſorū deſiccat. Maxime etiā cōfert Armenus bo- lis contra peſtilentes aſſectūs. Si quidem vſa eius non perſanantur, qui prius immedicabiles ſunt. Ceterū bibitur ex vino albo, cōſiſtentia tenui, modicē diluto, ſi is qui morbo eſt correptus aut planē febri careat, aut leuiter ea teneat. Sin grauius febriat, admodum a quo. Non ſunt tamen calore vehementer peſtilentes.

## De lapidibus.

Ex corporibus ſpontē natis ſunt lapides, hōc diuerſi à vulgo nuncupata terra, quod rigari nō ſuſtinent. Vn ex illa bent partim ſecundum ruſus ſubſtantia propiciatē, partim ſecundū qualitates effectrices. Nunc autē ſermo nobis eſt de illis viſibus, quae ſecundū effectrices agunt: quali tates in quibus ſanē eſt vtendi ratio & methodus. Nam facultates quae appropriatis totius ſubſtantiā ratione inſunt, à methodo ſunt atq; ratione alienae, & per ſolam experientiam noſcuntur. Nam cur hic lapis taſto vulnere vnde ſanguis prorumpit, curſum eius reprimat, haud nouimus. At cur hematites lapis in oculorū facultates indatur, nouimus: quod ſit rationis inuentum. Nam ſi in cote oculari cum aqua eum teras, donec accipiat craſſitudinē mellis, aſtringentem facultatem percipies. At didiciſti, quod gileſcentes etiamnum phlegmonas reſtringentibus medicamentis repercutere oporteat: vbi autem iam ſanguis nō fluit, aſtringentibus medicamentis digerentia adiungere, & ſenſim ad ipſa ſola tranſire. Itaq; de iis lapidibus prius diſcēſ, qui mortari aut cote amittit, in liquorem ſolunt.

AA ij

Ampelites ter-  
ra.  
Cadmia.  
Cretica.

Eretrienſis ter-  
ra.

Pigniret.

Bolis Armenus  
deſcriptus.

Febris peſtilen-  
tis non eſt ve-  
hementer colli-  
das.

Facultates quae  
appropriatae ra-  
tione ſunt, eſ-  
ſe à methodo al-  
ienas.

Hematites La-  
pis cōmūdi con-  
ſiderandi medica-  
menti miſcitur.

Phlegmonas re-  
ſtringentiſſi-  
mus.

Phlegmonas re-  
ſtringentiſſi-  
mus.

Phlegmonas re-  
ſtringentiſſi-  
mus.

Phlegmonas re-  
ſtringentiſſi-  
mus.

Phlegmonas re-  
ſtringentiſſi-  
mus.

Phlegmonas re-  
ſtringentiſſi-  
mus.

Phlegmonas re-  
ſtringentiſſi-  
mus.

Cyfrin.  
Pumex.  
Smiris.

Ciferis, Pumex.  
Pumex quidem abtergit. Sed Smiris acrimoniae quiddam obtinet. Proinde causticis & desiccantibus facultatibus additur, eisque quae curant gingivas laxas. Pumex autem si cõbatur, haud est inferior Smiri, eosdem ad usus.

Lapides qui in spongiis reperiuntur.

Spongiarum Lapides.

Frangendi vim obtinent, non tamen ita validam, ut lapides in vesica cõminuant. Rumpunt eam tamen qui cõguntur in renibus: veluti qui adveluntur ex Cappadocia.

Ostracites.

Ostracites.  
Gaster.

Hunc lapidem autem desiccandi valenter facultatem habere, temperatam ex astrictione, acrimoniaque: ut Geodem expurgare pupillas, vberumque & testium sanare phlegmonas, in vultu ex aqua.

Cotis Naxi.  
Tamentum.

Arcotis Naxi: tamentum virginibus mammae prohibet tumescere: sicuti & testes puerorum: tanquam facultatis refrigeratoriæ sit particeps.

Ophitea.

Ophitea.

Extergendi cõstringendique vim possidet, eam etiam vitru. Admodum enim ipsum ex vino albo acetui epotum lapides vesicae contenti, atque cõstringit.

Lapis viridis.

Lapis viridis.

Ventriculū adhaesum, ipsiusque adiuuat. Porro Ophitem lapide suspensum, iuuare morosa & vlcera tradit. Sed eiusmodi facultates non cõstant methodo. Veluti enim cum Hieracites & Indicus profluente ex hemorrhoidibus, sanguine sistunt.

Sapphirus.

Sapphirus.

Ictos a scorpione iuuare creditur.

Aphrodelius.

Aphrodelius.

Liberat comitali morbo vexatos: id quod non dum sumus experiri.

Dioscoridis Thyites.

Thyites.

Sub viridis est vit lappa, soluiturque in succo colore quidem lacteum, gustu verò acrem: a proinde nemo illum oculorum mulet medicamentis, nec fluxiones repercutientibus, nec vlcera sanantibus. Sed eo tantum vitur ad purgandum & abstergendum, quae pupillam abigit phlegmonae offusant: quales sunt cicatrices recentes, & pterygia non nimia dura.

Iudaeicus.

Iudaeicus Lapis.

Colore est candido, specie coccinea, lineas habens eum torno ductas. Vritur ad vesicae lapides in core soluentes, & ex aquae calidae tribus cyathis potui praebentes. Praecipue verò ad eam qui in renibus laerent, est efficax.

Pyrites.

Pyrites.

Validam possidet facultatem, eoque vitur digerenti emplastro admisso. Adicitur etiam ei & schistosus. Ab hoc medicamine & pus sexenumero, & consuetudine grumosa in facie intermedus musculorum nata, per halitum sunt digesta. Nisi autem dum in usum veniunt, pollinis instar cõminuantur hi omnes lapides, ut profundum corporum quibus applicantur subeant, asiniles manent istis manibus suis: ubique arenis: quae & ipse cõmunem omnium lapidum vim possident. Siquidem exiccant tumentem ab aqua intercutem carnem, si in ipsa excaustis decumbat aeger. Non tamen ad aliud quippiam eis vitur.

Phrygius.

Phrygius Lapis.

Hoc semper vitur combusto quidem ad vlcera

putrida, idque ipso aut per se, aut ex aceto, aut cõnomelito, aut oxycrato. Ad oculos verò ex eo permixto alia, medicamentum siccu efficit. Valide etiam desiccant, habes quiddam astrictionis simul & mordicationis.

Ageratus.

Astringit simul et digerit. Atque astrictione quidem evidenter iuuat phlegmone columellas grauat.

Aflus lapis.

Colore & consistencia est tophe similia, friabilia, laxa. Innascitur ei quiddam instar farinae tenuissimae, qualis in molarum parietibus adhærescit. Appellatur hoc medicamentum petrae Africæ. Est verò & tenuissimum partium, ut sine morfu nimia fluidas carnes eliquet. At petra ipsa in qua nascitur, actionis vehementia est inferior. Habet etiam & falsedine quandam ipse Africæ petrae, ita ut iude videatur ducere originem: quod ros ex mari in petram residens, a sole postea exsiccat.

30

Gagates.

Colore est atro, qui ubi igni fuerit admotus, perfumilem bitumini odorem exhibet. Confert autem ad discutiendos statulentos tumores consistentes in genu, diuturnosque & ægre curabiles: ac praeterea cuncta vulnera glutinat. Est & lapis Thracicus, cuius in hunc modum Nicetides meminit:

Si lapis vultu candens Thracicus ignis, &

Post multum aqua fluxerit renuat idem

Max ista effuso penitus resingitur. &c.

Nullus tamen eius in medicina usus, nisi quod suffitu abigit feras.

Magnitis, Heracitis, Magnes.

Asinilem haematit vim obtinet.

Arabius.

Lapis est elephantho similis, desiccatis abstergentisq; potentior.

Alabastrites.

Combustus in medicinis vsum ingreditur. Quiddam eum bibendum dant stomachicis.

40

Smiris.

Vehementer quidem abtergit: quare ipso ad annulos exculpandos vitur, & ad dentes purificandos.

Hæmarites, Galactites, & Melinites.

Hæmarites & Galactites lapides, a colore similitudine, quoniam representant, sic nominantur. Ille siquidem sanguini, hic in succum solutus, laetis videntur similis. At Melinites, non a colore, sed a sapore mellis talem nomenclaturam sortitur.

50

Cum igitur succus omnis dulcis a temperato calore proficiatur, astringens verò a frigore, habebit sanè hæmatites lapis tantum frigiditatis, quantum & astrictionis: Melinites verò temperatam caliditatem: ad medium vtriusque temperiei Galactites. Merito itaque ocularibus medicamentis lapis hæmatites miscetur. Ac solo eo vni possis supercilia exasperatis: si quidem cum phlegmone sint aspera reddita, ex uno ipsam diluens: ac si magis, etiam per decoctum fenigræci. Sin verò circa phlegmonem, ex aqua. Hic idem lapis similiter in core contritus, sanguinis expunctioni conducit, vlcibusque vniuersis. Porro si sicca, redactisq; in tenuissimū pollinē, reprimat exerecentia: ipsaq; oculorum vlcera solus per cicatricem includit attritus, ceteris aut assusus, aut inunctus.

Schistosus.

Atque quomodo excrescit inter cutem carnis.

Phrygius Lapis.

## Schistos.

Hematis per similem vim obtrinet, sed infirmior Schistos: et post eum Galactites. At Melitites non nihil caliditatis ascinuit. Vt igitur vnuquisque leuiter ac sensim ab hematis facultate recedat, ita in vsum oculorum accommodatur: est tamen minor. Et enim mitiora remedia paribus etiamnum phlegmone afflicto semper graviora sunt. Quæ quidem, liberis iam à phlegmone partibus, infirmiora sunt, et per sanare valeat. Porro cum lapidibus omnibus commune sit ut deficiant, quotquot ex iis in succo soluti, aut redacti in pollinem, nullam cōtinuam qualitatem in gustu obtrinent, hos putandum est esse tum infimissimos, tum minimos mordaces. At qui manifestam qualitatem exprimunt, si pro qualitate ratione potentiam possident. Ac si quidem astringant, ad cōprimendum, cōstringendum, spissandum, & cōtrahendum: si vero mordicent, ad excalfaciendum, digerendum, & colligandum. Medij eorum sunt, qui abstergent circa mordicationem. Igitur Hxmatites, Schistos, Galactites, & Melitites, in succo vertuntur. Quamvis sunt & alij in succo solubiles, ut Moroxus qui in Aegypto nascitur, omnium dictorum minimè qualitatis particeps. Quare tantum deficiendi vim possident.

## Metallica medicamenta.

Metallica medicamenta appellare medicis mos est, quorum generatio in metallis cōsistit, siue spontanea, siue per fornacem facta. Vt igitur lapidibus vniuersis, & terre medicaminosæ cōmune est ut siccat, ita metallicis quoque medicamentis omnibus. Est enim essentia eorum terrea, secundum elementaris terre significationem. Porro caliditate diutina, mistam ex terra & aqua, nonnunquam etiam aëre, substantia veniente, temperantem, ac postea deficiente, metallicorum medicamentorum cōsistentia proveniunt. Quam admodum igitur in differentiis terre, plurima essentia terre elementaris habet, paulum vero aëris, ita in metallicis multa ignis substantia est immixta. In medio autem eorum sunt lapides. Proinde alia metallicorum semel aut bis, alia frequentius lota, idonea sunt, ut circa mortuum exsiccant. At locorum, in quibus hæc proveniunt, natura, pro ut plus minusque est frigida, alia plus, alia minus, cogit, congelare.

## Hales, Sales.

Sal partim ex mari sit in salinis, partim est terra effoditur. Ceterum utriusque vis est asinilis, impensè videlicet exiccatrix. Porro aphronitri sapor amarus est, & abstergens: salis vero, tantum abstergendo inferior, quantum in astringitione superior. In utriusque medio sapor nitri consistit.

## Armeniacum.

Vim habet extergenti cum leucula tum astringenti, tum astringente. Unde merito miscet ocularibus frequentibus. Præterea ipso per se redacti in pollinem, atque sicco, vtuntur ad pilorum in superciliis incrementum: ubi præ humorum acrimonia partim excidunt, partim nec crescunt, nec nutrantur.

## Armenicum, Auripigmentum.

Facultatis est causticæ, tam combustivæ, quam vitiois expertæ. Ceterum per visionem tenuiorum partium efficitur. Vtuntur porro ipsi ad emundan-

dum pilis quævis particulam. Verum si diutius hæreat, ne cuti quidem parcat.

## Aphronitrum.

Aphronitrum ab aphronitro differt. Nitri enim spuma medicamentum exiccatoriū existit, aspectu triticæ farinæ similis. Et enim alba est, non vero Afæ petreæ sicut cinerica. Aphronitrum verò farinæ speciem non habet, neque solum est, sed cōcretum & congelatum. Quod quidem adeo extergit, ut non modò sordes expurget, sed etiam prurimum sanat. At spuma nitri, eiusdem cum nitro est tum natura, tum facultatis: licet essentia tenuior. Dictum autem est paulo ante, in medio aphronitri & salis, facultatem nitri consistere. Aphronitro enim sola inest vis detergendi: sal verò etiam astringendi, sed multo magis quam detergendi.

## Gypsum.

Gypsum quidem tum deficcatur, tum vires habet emplasticas. Quare siccis medicamentis quæ ad sanguinis eruptiones accommodantur, utiliter cōmiscet. Nam ipsum per se fæ lapidosum sit, coactum & congelatum. Ac proinde diluendum est oui tenui & cōditi albugine, quæ & ad ophthalmias est utilis, admissio illi tenuissimo farinæ triticæ polline, qui residet in molarum parietibus. Excipere verò quod se maceratum est, tenellis leporis pilis, aut qui perinde sint molles, expedit.

## Gypsum vitum.

Nō habet quæ emplastici vim, ceterum tenuior est partium, & valentius deficcatur. Quin & repperussoriū est, maxime si maceretur oxycrato.

## Diphryges.

Mistam habet tum qualitatem, tum facultatem. Habet enim in se quiddam & mediocriter astringens, & mediocriter acre: unde ulcerum rebellium optimū medicamentum est. Eo siquidē ad putrescentiam omnia ulcera, siue per se, siue cum melle, cum detracta erat spuma, tum ad anginam, ubi iam per astringentia medicamenta cōstitit quid influere, ac breuiter ad columellam præcisum, pudentis & amulcera cicatrice obducenda, sunt infelicissimè vsus. Porro quo pacto adulterentur dictorum medicamentorum singula, non videtur precii operæ scribere, cum talia possent ducere homines sceleratissimi in lucro ponant.

## Theion, Sulfur.

Sulfur omne trahendi vim possidet, etiam temperamenti calidi, atque essentia tenuis, adeo ut ad multa venenatorum animalium resistat, si siccum igitur inspergatur, aut cum saliva, aut vrina, aut oleo veteri, aut melle, aut resina terebinthina illinatur. Quin & psoras, & lichenas, & lepras, non raro hoc medicamentum cum resina terebinthina sanauit. Extergit enim omnes id genus affectus, absque hoc ut in profundum repellat.

## Ios, Aerugo.

Gustantibus acrem exhibet qualitatem, digerens, derahens, & liquans non tamen modò, sed & duram carnem. Hallucinantur igitur qui talia medicamenta, epulonica appellat, hoc est, quæ cicatricem inducunt: cum nimirum epulonica pharmaca contrahant, conspiciunt, & in calli morem ipsam carnem indurent. Quin & gustum mordicæ ærugis, non tantum vlcera. Quod si paululum eius cerato non pauco admiscas, id quod

AA iiii

phosph.  
Galactites.  
Melitites.

Lapides omnes  
demonstrat  
fio.

Moroxus.

Metallica quæ  
deficcant.

Metallica quæ  
non deficcant.

Metallica pluri  
mā ignea substantia  
esse non  
possunt.

Hales.  
Sales.

Armeniacum.

Armenicum.  
Auripigmentum.

Aphronitrum.

Aphronitrum.

Nitrum.

Nitrum.

Gypsum.

Albugo oui ad  
ophthalmias  
utilis.

Gypsum vitum.

Gypsum vitum.

Diphryges.

Diphryges.

Adulteria medicamentorum  
cum cerato  
non sunt.

Theion.  
Sulfur.

Theion.  
Sulfur.

Ios.  
Aerugo.

Epulonica  
pharmaca.



ex ambobus midum est, citra morsum extergit.

### Cadmia.

Cadmia.

Cadmia fit, ubi in fornacibus res paratur: nepe tota terra, aut lapide ex quo res gignit, in sublimem partem fornacis egerente, vel uti fuliginem aut faullam quidam. In argenteis etiam metallis simili secretionem efficitur. Quin & ex pyrite lapide in fornacibus vñto fit cadmia. Cæterum ab his forpae in Cypro cadmia invenitur, quam iure quispiam lapidem vocet. At eius quæ combusta est, aliam botryitin, aliam placitum Medici nuncupant. Botryitin quidem, quæ in edinocibus ipsius fornacis muris colligitur. Placitum verò, quæ in humilio ribus. Ac liquet sanè botryitin partium esse tenuior, crassiorum verò placitum: utraq; autem vi desiccandi, ac mediocriter digerendi prædita. Quæ autem colligitur in fornacibus, igneæ qualitates necessariò etiam aliquidi habet. Merito itaq; eam abluentes, medicamen efficiunt mediocriter tum desiccans, tum extergens ab his mordicatione: vñle ad qua vlcera prælumida, & putrescentia, quæ in oculis & in toto corpore habentur. Igitur recipientes ad temperatam & mediam inter omnes excessus naturam, leniter defecatoris absterforumq; cadmie inesse facultatè dicimus. In caliditas autè & frigiditatis discretia, cadmia quodammodo temperata existit.

Cadmia diffusa.

Cadmia vñta.

### Cinnabari.

Cinnabari.

Modicè acrem facultatè obtinet. Habet verò & astrictionis quippiam.

### Cifera, Pomez.

Cifera.  
Pomez.  
Exusta omnia  
reddo subtilia  
tenuiora.

In sarcorica medicamenta inditur, & ea quæ dentes extergunt, partim vñtionem non expertus, partim etiam exvñtus: quandoquidè aliis omnibus combustis similiter, substantiæ tenuioris efficitur. Cæterù vñtione quiddam acquirat acrimoniæ, quam rursum lotionè exuit. Videri autè poterit, & conciliare splendorem, non tantum facultate, sed etià asperitate: vel uti si simin, aut testam tritam admoneas. Eundem in modum cornua devita dentes reddunt splendidos.

Cornua devita  
dentes reddunt  
splendidos.

### Cornia, Lixivium ex cinere.

Cornia.  
Lixivium.  
Cinere.

Ab luto cinere fit. Cinerem autem, vñtorum corporum reliquias Latini nuncupant. Fit ergo lixivium pro eius quod eluitur natura. Cineris siquidem qui acrimoniâ igneam habet acerrimam, ipsius quoq; acerrimam est: eius quod tale non est, etiam moderatius. Quare & putrefaciendibus medicamentis miscet, utpote causatâ facultatè potius dolorem advens.

### Cyanos, Cæruleus.

Cyanos.  
Cæruleus lapis.

Acrem possidet facultatem, ac tum detrahiendum digerendi, & cinnabari, potentiorè. Inest quoq; ei nonnulla astrictio.

### Lepia, Squama æris, & ferri.

Lepia.  
Squama.

Squama, alia est æris, medicamen multò vñtilissimum: alia ferri, & stomomani: alia deniq; quam uonnulli vocant helitin. Atq; omnes sanè vehementer siccant. Cæterum helites principè in desiccando locum obtinet: nam subtilissimam omnium substantiæ est, nimirum quæ æruginis nonnullum assumpsit. Maiorem obtinet astrictionem squama ferri, & hac etiam maiore stomomani. Quia

Helite.

ob re ad contrumacia viscera meliores sunt quàm squama æris. Detrahit & liquat carnem potentius squama æris, & hac etiam valentius helitis. Omnes autem squamæ non infrenuè mordaces sunt. Quare essentia ipsarum non est admodum tenuis. Siquidem inter ea quæ parum vim possident, minus est mordax quod est tenuius.

Mordacia nihil  
esse quæ  
sunt tenuiora,  
si parum sunt  
tenuiora.

### Lithargyros.

Desiccatur quidè, sed omnium moderatissimè: & secundum alias tum qualitates, tum facultates, quodammodo in medio consistit. Modica tamen astringendi, abstergendiq; facultas ei inest. Cæterum ad intertrigines femorù vñlus medela est. Iure itaq; medi ordinis in metallis habebit. Proinde frequenter vitumur lithargyro: ceu aliorum materia: si vñti in liquecentibus ad pleriq; medicamenta adhibemus ceram, tanquam materiam medi corù quæ valentem possident facultatè.

Lithargyro.

Cera.

### Nitrum.

Inter aphronitru & salem vires medias fortit. Cæterù vitum propius ad aplaronitru accedit, utpote ex vñtione tenuius redditu. Desiccatur itaq; & digerit: quæ si intra corpus sumat, secat & extenuat crassos & lentos succos, multo potentius q; sal. Aphronitru verò, nisi grauius virget necelitas, devorandum non est, nimirum inimicū stomachi: quandoquidè plus etià nitro incidit. Porro ad suffocantes fungos, nitro vñto simul & non vñto, & multo etià magis eius spuma, uti cõuenimus.

Nitrum.

Aplaronitru  
maxime stomachi  
inimicus.

### Melanteria.

Valde quidem astringit, astringentiâq; omnia propemodum tenuitate superat.

Melanteria.

### Melan graphiciu, Attramentu scriptorium.

Admodum & ipsum desiccatur aqua solutu. Vlcera autè igni ambusta protinus illum iuuat: & si acrum quoq; habeat, multo magis.

Melanteria.

Attramentum  
scriptorium.

### Misy.

In metallis ipsis, super chalcitum nascitur misy, ut ærugo super æs. Ac suspicor etiam fori longo tempore mutationem in chalcitum posse accipere. Quare misy non est, tria hæc medicamina eiusdè genere facultatis esse, fori dico, & chalcitum, & misy, tenuitate & crassitudine inter se diuersa. Crassissimū enim est inter ipsa fori, tenuissimū misy: mediam vñtioni facultatem habet chalcitis. Ad vñtū vñtueria hæc tria, & escharas efficiunt. Attramen nonnihil etiam astringit. Cæterù misy admodum corporibus duris, minus chalcitide mordicat, tameti si non minus sic calidum: id quod beneficio tenuitatis fortitur. Porro cum vtraq; hæc cin decoctionibus fundantur, & magis chalcitis q; misy, fori tamè non liquefit: nimirum quod lapidosius sit, & vehementius compactum: si vñti rursus misy, quia à congenito calore elaboratius est, ac proinde siccius chalcitide, idcirco merito quoq; liquefit ægius.

Misy.

Ærugo.

San.

Chalcitis.

### Molybdæna, Plumbago.

Similè lithargyro vim possidet, tantu à media tēperie ad frigidius paulū quid recedat. Sed neq; abstergetis facultatis est particeps. Vñtū autè medicamentu liquari potest, celerimq; vñto oleo nonnihil aceti est additu. Liquanti tamè etiam admixta aqua, sed decoctione iōgissimā. Vidi equidè molybdænā proiectā plurimū cū multis aliis lapidibus, in ea via q; ad ergasteria ducit à Pergamo,

Molybdæna.  
Plumbago.

Molybdos,

## Molybdes, Plumbum.

Facultas est refrigeratrix. Siquidē non modū multā habet substantiam humidā a frigore cōgelatā, sed & aëreā, paucā autē terrā. Igitur quōd plurimum habet essentie humidā coactā a frigore, indicū nbi est, quōd vbi admodum est igni, celeriter funditur fluitq. Quōd verō & aëre sit particeps, hoc habeto signum.

Omniū quæ nouimus, vnicū plumbū tum mole ipsa, tum pondere augetur, si condatur in tēdibus subterraneis, aërem habentibus turbidum, ita vt quæcūq; illi ponantur, celeriter firū contrahant. Iam verō si in mortario plumbeo liquorem quemlibet plumbeo pistillo contriueris, ita vt ex pistillo ipso, atq; etiā mortario exprimai etiam aliquis succus, id quod ex vtroq; constabit, multo erit frigidius, q̄ liquor in fufus fuerat.

Ceterū si vis magis refrigeratoriū medicamen efficiere, oleum omphacinū, aut rosacellū, aut melinum, aut myrrinum, sive liquoris, quem infundes: eritq; remedium optimū ad sedes phlegmonas cum vlcere aut rugis, & ad eas quæ in pudendis, testibus, vberibsq; consistunt: similiter ad versus ceteras omnes fluxiones, quæ articulis accidunt. Sed & vlcibus rebelibus etiā vtile est. Nam ad cancrōs eo vtens, virtutem medicamenti miraberis. Quōd si celeriter multū sūd plūbei velis colligere, conare in sole terere, aut quocūq; certē modo aëre excalcāto. Multo autem vtilissimū habebis medicamentū, si assuso refrigerantium succorū aliquo teras, vt semperuiui, coryledonis, iuribi, lactucę, conditiles, pŷylli, omphacis, portulacę. In laminā etiā ductū plumbū, lumbisq; admodū, pollutionē per infomniā coëcet, nimirū haud obscurē refrigerans. Sed & bractea tenuis probē ganglio illigata, ipsūm disipat. Illigabit autem probē quicquid ab Hippocrate didiceris, in ipsā uoxā potius firmandū, q̄ hinc vel inde. Porro plumbum vitum, ac dein ablutum, refrigerat, cōfēctūq; ad implenda vlcera, eadēq; cicatrice obducenda. Conuenit & chironis dictis, & omnibus cancrōsis vlcibus. Ante lotionē autem, vlcibus pertuicibus etiā auxilio est.

## Ostraca, Testa.

Deficcandi abstergendiq; vim possidet, maxime quæ ex fornicibus est. Ex qua quidem præparata emplastrum, optimē cicatricem inducit.

## Pompholyx, Spodium.

Pompholyx sit & in xris fornace, veluti & cadmia: sitq; dum in fornacib. cadmia viritur, nimirum ab ipsa cadmia in restum fornacis quadā fauilla ascendente, quæ dum colligitur est pompholyx. Nam quod reflectens in pavimentum recidit, nominatur spodium. Cui videtur similem habere facultatem, quod annipodiū appellat. At ego illo vsus sum nunq; cū largē mihi semper pōpholyx suppetere. Nec enim quicquam vbi hæc addit, spodio vñ velit, nedum antispodio. Est autem pompholyx medicamentū prope omnium quæ circa moriūm deficcant, si elota fuerit, prætransmissū. Quamobrem ad vlcera cancrōsa idonea est, & ad alia omnia maligna. Itaq; inditur collyriis quæ ad oculorū imponunt fluxiones, quæq; bullas in eis natas cu-

rant. Præterea ad pudendorū & sedis vlcera optimū est remedium.

## Sandarache.

Vrentis est facultatis, vt arsenicū. Merito itaq; digerentibus faculratibus & extergentibus cōmascetur.

## Sandyx.

Qua sit facultate prædita, in sermone de psim mythio explicabitur.

## Scoria.

Scoria omnis reficicatoriū est medicamen, potissimū autem ferri. Siquidem ad læuorem redigens ipsam in aceto q̄acerrimo, posteq; decoquens, ad aures iam pridem fluitēs pure, ea vtor pro medicamento maxime exiccatorio.

## Siniū.

Cum facultate deficcatoria habet attritionē adiunctā. Quamobrem & ocularibus medicamentis miscetur.

Stryperia schiste, & strongyle, & hygra. Alumen fissile, rotundum & humidum.

Alumen vehemensimē astringit. Ceterūm eim sit crassarum partium, tenuius quodammodo est quod vocatur fissile. Proximū est rotundum, & atregalorum. Admodum crassū est rum liquidum, tum placites & plinthites dictum.

## Titanos, Calx.

Vina quidē vehementer vrit, adeo vt crustas efficiat: exnecia verō propius erit crustam molitur & ipsa: at post diem vnum & alterū minus vrit, minusq; inducere crustam potest. At verō temporis progressu prorsum nec crustę quidem gignere valet, ramentis etiamnum calcasciat, carēcēq; liquet. Porro si lauetur in aqua, suā mordacitatem exuit, efficitq; nunc cuparum lxiuū. At ipsa absq; morfu deficcatur.

## Hydrargyros, Argentum viuū.

Non est ex sponte nascens medicamentū, sed ex iis quæ parantur: velvī psimmythiū, ærago, psorium, lithargyros. Ceterūm intermāne devorāt aut admotum extrinsecus, nōdum feci periculum.

## Phycos.

Facultatem eius, vbi de psimmythio agetur, exponam.

## Chalcanthos, Atramentum sutorium.

Chalcanthos, qui in Cypro ex viridi quadā aqua concreuit, exima sui parte in chalcitē temporis processu degenerat. Habet tuteū cum attritione maxima, caliditate non vulgarē coniunctā. Vnde omniū maxime condire seruarcq; carnes humidās potest: nimirum caliditate humiditatem absorbens, attritioneq; substantiam contrahens, atque costringens. Constringit itaque, ficit, & contrahit in seferonius substantiam carnis.

## Chalcitis.

Mistas habet astringentem acrimōy facultates. Ceterū vincit acris, vi potē adeo vehemens, vt carnem vrit, necdū inducar escaram. Vtū hoc medicamen minus mordet, nōdum tamen minus deficit. Verūm non parum attritionis remittit. Itaq; melior est vndeque chalcitis rum ad vltā, tum lorā, cūm evadat sic minus mordax,

polybdes.  
Plumbum.

Plumbū vici-  
ti nūc ex po-  
dus augetur.

Plumbū mor-  
torio cōferre  
ad confectū  
melicantia re-  
figerantia.

Plumbū lami-  
næ admodū lū-  
bu an-ternas  
piscinas coëcet  
ut.

Plumbū vitum  
quibz obducit  
efficitur.

Ostraca,  
Testa.

Pompholyx.

Spodium.  
Annipodium.

Pompholyx qui  
bus viciat.

Sandaracha.

Sandyx.

Scoria.

Siniū.

Siniū.

Stryperia.  
Alumen diffi-  
cile.

Titanos,  
Calx.

Hydrargyros.  
Argentū viuū.

Chalcanthos.

Atramentū sūo-  
rarium.

Chalcitis.

Chalcos cecumenes, Aes vitum.

*Chalcos cecumenes.* Habet & a crimoniam quandam, sed & astril-  
lionis est particeps. Proinde si laetetur, pulcher-  
rimum est medicum cicatrici inducendae.

Chalca anthos, Flos aëris.

*Chalca anthos.* Tenuioris essentie est q̄ aut aëris vitū, aut squa-  
ma. Quare ex eo factis collyriis extergunt, auge-  
suntq̄ super eliorum magnas asperitates.

Chryso colla.

*Chryso colla.* Carnem liquat, nō tamen valenter mordicat: so-  
quāquam sit facultate admodum digerente, ex-  
siccantēq̄. Preparare autem hanc chryso collā de-  
bet tempore æstiuo, aut aëre prorsus calido: vri-  
nam pueri, mortario & pistillo, viroq̄ ex rubro  
are, contundenda. Hoc medicamentum apifissi-  
mū est vlcibus contumacibus, tum per se, tum  
aliis mixtū. Nam quantū plus q̄ chryso colla me-  
tallica desecet circa morbum, tantō etiam ipsam  
exclut tenuitate.

Psimythium, Cerussa.

*Psimythium.* Si ex acri aceto solvatur, gustu tamen neq̄ a-  
cre erit, neq̄m ordas, sed emplasticon, & refrige-  
ratorium. Cerussa ad vitā, in sandyca transit, me-  
dicamentum seipso tenuius, non tamen ex calfa-  
ciens. Phycos autem feruata cerussa frigiditate,  
tenuitatem assumpti.

Pioricum.

*Pioricum.* Cōficitur dupla chalcite admixta lithargyri:  
antē tamē vtriusq̄ acerrimo aceto solutus, sicut in  
ollam nouam coisectus, quam simo vitate me-  
dica diebus quadraginta obuat ipeles. Hoc  
medicamentū magis desiccatoriū est, minūsq̄ chal-  
cite mordax, cūm partibus sit tenuioribus.

# GALENI PERGAMENTI de simplicium medicamentorum facul- tatibus, liber X.

**E**Xposuimus igitur quinque commētaris  
prioribus, qualitates quas secundas ap-  
pellant, in medicamentis quæ effectricibus  
qualitatibus agunt, pro earundem effectricium  
specificarūq̄ qualitatū mistura nasci. Ostensum  
præterea est, quo pacto vniuersalis facultas vni-  
ca experientia inueniatur neq̄ ea vulgari, sed quæ  
certis adhibeat limitatōib. Porro in sexto, se-  
ptimo, & octauo libro, materiā quæ ad plantas  
pertinet, explicauimus: in nono autē, eam quæ  
circa terrēna & lapidosa versatur. Reliquū verō  
nunc est, vt eam quæ ab animālibus sumitur, in  
hoc decimo persequamur materiā. Nam ad finē  
ynde decimi agemus de iis, quæ proveniunt in a-  
quā, nec plantis, nec terra, nec lapidib, nec animalia  
sunt.

Hæma, Sanguis.

*Hæma.* Pro natura animalū variat. Huic siquidē ani-  
mali est liquidior, sicior illi, calidior alteri. Nul-  
lus autem sanguis est frigidus.

Sanguis nullus.

*Sanguis nullus.* Humidus & minus calidus est, temperie  
humano per similes. Si quidem & carnes suum simi-  
les humanis existunt. Vnde quidam ab hospi-  
tibus prauis appofitas, auidissime humanas car-  
nes ederūt. Etenim ex ipso sanguine, tum gene-  
ratio prima, tum postea nutritio ipsa carnibus  
constat. Itaque quisquis humanum sanguinem  
morbo alicui vtilem esse ait, in suislo primum id

comprober. Nam etsi aliquatenus inferior is sit  
humano, saltem asimile quippiam efficiet: quo  
cognito, ab humano pleniorē iore vilitatē spe-  
rabimus. Porro hūmāno efficiere posse similita, ex-  
perit sumus. Nam colūbæ sanguinē, qui capitis  
ossa cōfracta perforat, in cranium cerebrū in vo-  
lucru effundere assolent. Quidam autē, cūm nō  
esset columba ad manum, palambū sanguine est  
vius, felicitēq̄ succēssit. Alus turturē eūdē  
ad vsum applicans, nihil hominē lēgit. Similibus  
siquidem ad eōsdem affectus vitmur, vbi quæ  
antea experti sumus non adfuerūt.

Hæma periferas, Sanguis columbe.

*Hæma periferas.* Eo ad hypophagmatā in oculis consistētia  
quidā vniū, venis ad alarū exortū incisus, quō  
sanguis calidus effluit, vt sic ad multos viūs idē  
perdurat animal. Alij pullorū tenerorū extractas  
pennas, quæ lumore redyndant, in ipsum ocu-  
lum exprimūt. Quāq̄ sunt nonnisi collyria varia  
hypophagmatō oculorū apifissima, cuiusmodi  
est quod psimythū recipit myrrhā, & quod mul-  
tum thuris admittit: necnon quæ ex croco con-  
stant. Quin & semigræci succus sanguinis colom-  
bini, in hoc vtiq̄ præstat. Præterea sexcentos no-  
ui corum quibus Romæ perforata fuerit capitis  
ossa, nec quicq̄ ab vīu rosā ceit, citra sanguinē co-  
lumbinū, ostēdit. Quare id calidū sit quæ atq̄  
colūbæ sanguis, necesse est. Ceterū præter mo-  
derationē & calorē (cuius fortē cōfractū totum leu-  
ter et alitragit. Itaq̄ melius inuenire nihil pos-  
sis in capite plorato, q̄ vt probior videretur.

Hæma nycteridis, Sanguis vespertilionis.

*Hæma nycteridis.* Si vbi hoc sanguine axillā illueris, postea  
chalcanthōn aut citræ semen inspergas, Xeno-  
crates quidem ait, aut sub illis prorsus pilos nō  
produturos, aut certē lanuginosos. Alij verō &  
puerorū pudēdis sanguinem vespertilionis illi-  
nunt, vt glabras illas partes cōseruent. Ergo ex  
refrigeratione partis vehemētis, cuiusmodi quip-  
pam posse cōtingere, nō est dīratione & alenum.  
Nō tamen adeo frigidā facultatis est sanguis ve-  
spertilionis, cūm in torū nullus sanguis firmiter  
dus. Porro hoc dīnū sanguinē seruēctū cum pa-  
ri aceti portione, hæmopticois iuuare prodidit  
etia Xenocrates. Quod remediū rutō experiri  
poteris, vbi nullum aliorū ad manum suppetret.

Sanguis viridum ranarum.

*Sanguis viridum ranarum.* Cūm assereret quidam, illitū hunc proliabit  
rum quo minus evulsi semel palpebrarū renasce-  
rentur pilī, falsum esse id experimento didici.

Gala, Lac.

*Gala.* Perfectissimū lac, nempe quod ab omni alie-  
na qualitate est immunē (hoc est, odoris experts,  
aut exigui bonū odorem referens, præterea gu-  
stu suauē, pauculam habens dulcedinē: siue &  
saluberimus sanguis, ex quo & lactis generatio  
constat) ad acres & mordaces fluxiones est com-  
modissimū, non abluens modō eas ratione & feri  
ad afflictū particulis, sed etia ob pinguitudinē  
corpora illiens, vt nō in huda cadat, quod de-  
fluit. Porro cūm lac omnī aliteretur facillimē,  
præsertim si ambiens fuerit calidus, multū dī-  
cta facultate amittit, nisi protinus quibz ab vberī  
bus effuso ipso calido vrit. Maximē igitur mulie-  
ris bene habitæ & bonā vītū rationē seruāti,  
lacte

lacte vitendum: nam id humano corpori est longe familiarissimū. Deinde abhorū animalū, quæ quidē ab humana natura non longissimē absunt: id quod scies ex carnū odore. Nam fastidiosus est eorum quæ multū diuersam habent temperiem, vt canis, lupi, leonis, pardalis, vulpis, hyæne, vr si, & similia. Non iniucius est eorum quæ non porro absunt, vt suæ, capræ, equæ, bouis, ouis, & afinæ. Quo circa etiam homines docti experientia, caprinū, ouellū, bubulū, asininūque lactē vtuntur, & caseos ex eis conficiunt, excepto asinano. Nam id planē tenue est, & plenū humoris serosi, veluti bubulū crassum: ceterū consistentia medium capillum est. At sus crudū æquūque lac obtinet. Iam vero lac omne ex tribus constat essentis, caseosa, serosa, & pingui. Hæc plurimam habere conficitur bubulū, ex quo butyrum conficitur, facultatis cōcoquentis & relaxantis. Quare maximē illo vititur ad parondas & bubonas. Seram lactis.

At serum extergendi potentius possidet, adhibeturque subducendi ventris grana, ac per clysteres inicitur, extergens & abluens sine mordacitate acrimoniā intestinorū. Præterea si quis vlcera quæ fame inlesant acri, vice aquæ sero coluat, optime sanē secerit. Quæcumque etiam medicamenta digerere solent ecchymomata, & atra, ea præstat sero quā aqua diluere. At quod lactū caseosum inest, illud adhæret magis: ob id quæ acrimoniā retēdit. Atque vbi aliam quampiam dissicantem facultatem habuerit adiunctam, optimū est dysenterię remedium, & omnium ventris acrium fluxionū. Eam autē accipit à lapidibus, aut etiam ferreia cylindris, quæ prædecocto lactū iniiciunt igniti. Ferrum siquidem astringētis facultatis etiam est particeps. Porro lac totum ad acres oculorum fluxiones tum per se, tum cum mollium collutoriū quopiam, est vtile: præterea ad lypopia & hyposphagmata. Quinetiam palpebris extrinsecus, vbi quæ ophtalmia laborat, somno sese dabbat, impositū simul cum rosaceo & ouo, phlegmonas eorum cōcoquet. Sed hoc etiam lac mulieris recens ex mamillis expressum. Infundimus ipsum & vtero exvicerato, sic ut de ad sedes & pudendorū vlcera vitur, & ad omnia breuiter, quæ leniri possunt. Ea propter & cancrios applicat vlcibus, medicamentis anodynis commisitū, quæ sunt quæ constant ex pompholyge. Collutū etiam, oris phlegmonas mitigat: necnon tonsillas, columellam, antradas phlegmone affectas, & proinde etiam anginam lenit. Est itaque medicamentū leniēs, totam quidem substantiam habens mordacitatis experientem, sed multo magis vbi concoctiōne moderata, potissima pars leni consumpta fuerit. Sic mihi videtur etiā medicū ad venena quæ erosione interrimunt, lac propinare: veluti sunt lepæ marinus, & cantharis. Sunt etiam qui & mento id exhibent, ut qui aconitum & thapsiam deuorant.

#### Caseus.

Vbi pinguitudo cum toto lacte concreuit, seroso duntaxat humore per coagulatiōem secretio, pinguis caseus efficit. Qui quidē qualiscunque sit, temporis spacio acrimoniā acquirit, quam deprendens gustu & olfactu. Ceterum impens-

se acris in veterariisq; iam redditus, maeritūque decocto suillarum carum, topios arthriticorum discutit. At recēs caseus & molli, mirē vulnera glutiat: nam repercutiendū vim possidet, leuiter nimirum refrigerans. Ceterum oxygala cōtinuā, præter hæc, digerendi etiam quandā vim lenem obtinet.

#### Butyrum.

Facultatis est cōcoquentis, paulū etiam habens digerentis potentia, in mediis nimirū corporibus secundū duntiem atque molliem. Nam corporum planē durorum tumores præter natura, hoc n equit medicamen digerere. At quæ in mollioribus sunt phlegmonæ, eas & cōcoquit & digerit faciliē. Nam parotidas, & bubonas, & oris inflammationes, prorsus illo solo curamus: nimirum puerilibus corporibus, mulierilibusque eas perpetuantes. Sed & gingiuis puerorū dentitionem assidue illitū, nihil imbecillius melle, exenuat exitū dentibus: ceterosque omnes oris phlegmonas afflictos, postquam fluxio restiterit, digerit pariter, concoquitque. Proinde cataplasmatum inditur quæ extrinsecus imponuntur parotidibus, hypochondriis, bubonibique. Idem vorat etiam, distributimque, magnifice confert expuitionibus ex pulmone, idem in pleuritidis peripneumoniisque afflicto: cum hoc quod eos etiam concoquat. Quid si solum lingatur, magis quidē concoquit, vterūque minus: sicut cum melle & amari amygdalis, plus educit, sed minus cōcoquit.

#### Pyria, Coagulum.

Coagulū omne acris & digerentis potentia est, atque exicatoria: nam necessariū id superiora comitatur. Ac leporis quidem coagullū cominalem morbum, si cum aq̄o bibatur, præterea profuuium muliebri sanare proditum est: necnon coactū in ventre lac dissoluere: id quod nos sumus haud dubie experti, non solum in leporino, sed in aliorum etiam omnium animalium coagulo. Sed & sanguinem in ventre cōcretum simili modo eorum coagulum leporinū dissoluit, ac efficacius quidem ceteris: verū non solum, cum hoc omni sit commune coagulo.

#### Coagulum phocæ.

Hic nonnulli vires castorei tribuunt. Chole, Fel.

Hic succus omnium qui in quoque sunt animalū crudissimus est. Ceterū pro varia animalū temperie, calor eius variatur. Sunt autem io vniuersum quatuor in singulis animalū sanguine præditorum humores: sanguis videlicet, pituita, & bilis cum fluxu, tum atra. Verū dum absolute dicimus bilem, semper intelligimus fluxuam, quæ in iecoris vesica colligitur. At ipsam fluxuam bilem interdum medicū pallidam nominat. Sciendū tamen est, fluxuā tantū esse pallidā calidiore, quanto & crassiore. Nam seroso recremento fluxu bilis permixto, pallidam consensu cōtigit: sicvbi & fluxuam plusculum ex calcifica, consistentia reddi crassam, colore autē fluxuam. Quin & in animalibus apparet fluxu quidem eius quæ magis sunt calida: quæ verò minus, pallida. Et vbi animalia calida, aut flame, aut fici torquentur, ad atrum colorem vergit, interm illū habens æruginosum, interm cæruleū, interm accuratē fuscū. Porro vbi

Butyri facultas.

Butyrum extenuat infansu etiam dentibus.

Butyrum vterumque pleuritidis expulsiōnem facit.

Pyria, Coagulum, Coagulo leporis comitatur sanguis.

Coagulum vitæ dissoluit lac, & sanguinem in ventre cōcretum.

Chole, Fel.

Hæmorrhagiarum prædictarum omnium comitatur, quæ castorei sunt.

Nam bilis pallida, dysenteria.

Lac asinam et plenum humoris serosi.

Lac lactis quæ præstat.

Extenuat lac lactis subleuati vti.

Butyri facultas. Lactis vti.

Lac collutum acrimoniā lenit.

Lac dissoluit in quo vterque interrimunt, ut lepæ marinus.

Caseus.

Caseus in vtero etiam qui acrimoniā.

ocularia medicamenta preparant, callionymi, scorpi marini, hyenar, galli, perdicia, & aliorum quorundam animalium bilem admiscunt. Quare color eius est explorandus. Iam verò taurorum bilis calidior & siccior est, & boum castratorum:

*Castratorum autem malitiosior sicut leuissima.*

*leuissima.*

*leuissima.*

*leuissima.*

*leuissima.*

*leuissima.*

*leuissima.*

*leuissima.*

*leuissima.*

*leuissima.*

*leuissima.*

*leuissima.*

*leuissima.*

*leuissima.*

*leuissima.*

*leuissima.*

*leuissima.*

*leuissima.*

*leuissima.*

*leuissima.*

*leuissima.*

*leuissima.*

*leuissima.*

*leuissima.*

*leuissima.*

*leuissima.*

*leuissima.*

*leuissima.*

*leuissima.*

*leuissima.*

*leuissima.*

*leuissima.*

*leuissima.*

*leuissima.*

*leuissima.*

*leuissima.*

*leuissima.*

*leuissima.*

*leuissima.*

*leuissima.*

*leuissima.*

*leuissima.*

*leuissima.*

*leuissima.*

*leuissima.*

*leuissima.*

*leuissima.*

*leuissima.*

*leuissima.*

*leuissima.*

*leuissima.*

*leuissima.*

num miscuisse sufficit. Hoc medicamentum est admodum vtile, ad resingendum, & discutendum lac à partu in mamma concrementis.

#### Vrina.

Quanta est in animalibus bilis diuersitas, tanta item est in vrinis. Atque omnes quidem facultates sunt calidae, sed plus tamen animalium calidorum, minus autem frigidorum.

#### Vrina humana.

Hæc aliarum omnium est imbecillima, excepta illa quam reddunt porci domestici, quibus ex cæci sunt testes: quorum ut temperies, ita vrinæ similes humane existit. At montanorum aprorum valida est, ut vel ex odore acerrimo cõstat. Sed & in animalibus cæteris ex odore vim eina conicere licet. Nam degustare ipsorum vrinæ, planè fuerit abominandū: cum ne pueri quidem vrinam vbi quidam honestus vita patitur & moribus, ebibere sustinent, etiā si pessimè egrotaret in Syria,

vbi multum ab humane vrinæ ponere se libera

ros profitebatur. Etenim vrinæ hominum, ut si

quid aliud, extergendi vim obtinet: id quod sa-

tiæ fullones indicat, qui sordida vestium expar-

gant vilius, atque extergit. Quod cõspicitur nō

nullis medicis, ea ploras & lepras detergent, per-

funduntque vlcera præhumida & sordida, multoci-

magis cõputrescētia. Sed & pudenda vbi sic affi-

ciuntur, vrinā infundunt, & auribus pure fluen-

tibus. Quin & achoras & furfuræ ea curant, ca-

put idemdem personæ dent. At nos hæc facere

o diuini, cum ad manū sint alia, quæ illa condu-

cant, in medicamenta. Quamvis vlcera diguotū pe-

dicat, maxime quæ ex illusione inhiesta essent, sepe

numero, vbi carent phlegmone, & ipse vrinæ

curant: idque in feris, & hominibus rusticis. Cæ-

terum medicamentum quod ex vrinæ pueri confici-

tur, quod quidem Chrysocoliam appellant, quia

eo ad auri glutinationem vrinatur, ad vlcera

difficilia sanata optimū esse auctor. At autē id, v-

bi in mortuario æna embel, pistillo enī ex rubeo

ure cõfecto, puerilia vrinæ tandem sub calido co-

lo tunditur, donec ob eliquationē attritionem-

que pistilli & mortarij, mellis crassitudine cõtra-

hat.

#### Sielon, Salua.

Vt vrinæ & bilis, sic etiam salua, sumpto quidem cibo, imbecilla est: valida & acuta eorū qui ingenti aut siti, aut inedia premuntur: in medio vtrinque est, eorum qui probe concoxerunt quidem, nondū tamen cibum potumve hauserunt.

Hæc ergo salua nutrices pueria lichenas curat,

parū videlicet dignum gigante, ac deinde cu-

tem affectum conficantes. Sed & triticum man-

dens rusticis non pauci faruncula imponunt: nam

celeriter eos digerit, concoquitque: cum si

macerarent aqua, non equè prodesset. Ex quo

liquet, salinam inuadi robur adferre. Atque cor-

poribus mollibus, aut puerorum, panem, nō tri-

ticum, imponunt ore commanum. Porro com-

manis omnia digerunt & fugillara, & cætera ec-

chymomata omnia, maxime vbi panis simul

cum paucō radice fuerit cõmanus. Iam verò

vniversa substantia sua vel maxime aduersa est

salua bestis hominem interficientibus.

#### Stercus caninum.

Stercus omne vim maxime digerentem obti-

net.

*Vrina mui, famelicis etia bida.*

*Vrina huma.*

*Vrina humane potum multo sic liberata à pestibus morbo proficit sum. Vrina humane facilius.*

*Chrysocolia facienda a ratib.*

*salua.*

*Salua tritici ventriculo ad que cõstat. Triticum manu formetur et quædam cõstat.*

*Salua humane aduersus bestias homini perniciosa.*

riet. Cæterū canis, qui solis ōsib. fuerit integrū biduum nutritus, durum, candidū minimēq̃ fuerit stercus est: quod quidem exsiccatum, redactūq̃ in pollinem, ad anginam, dysenteriam, & summē in veterata vlcera optimē accommodatur. Ad anginam quidē, is mistum, quē alioque hūle affectus conveniunt: ad dysenteriam autem, iniectum lacti decoctō, & quod filices candētes, aut cylindros ferreos extinxerit.

#### Stercus humanum.

Stercus pueri siccū, & cū melle Attico ad lguō rem tritū, illitūq̃, sanar gutturis phlegmonas.

#### Stercus lupinum.

Quidā lupinū stercus candidum, quale ubi ōssa ederint, lupi solent excernere, quodq̃ nō de eidisset in terram (lupi enim vt canes suspensio al tero posteriorum crurum, & meunt & cæret, in emittēte quoque iam ex terra loco) aut vino albo, aut aqua distemperatum, colicis potandum dabant: nec tantum in ipsa paroxysmis, sed etiam in 10 intervallis, si quidem vacaret phlegmone felici finēq̃ cedebat illi negotiū. Verū illud etiā in eo mirabar, quod vlt appensum illis vinctulo cōfecto ex lana ovis à lupo lanaret, aut ex cetrina pelle, evidenter aliquoties inuisset.

#### Stercus caprillum.

Omniū creberrimē vitmur caprillo stercore, digerentis & acris facultatis: adeō vt induratis scirrhorū in modū tumorib. congruat, nō lenis modō, sed etiam aliarū partiū. Miscere tñ illi solemus farinā fabacē, necnō oxycratum. Quin & ad aquam inter cutem, & ad splenicos, variē caprillo stercore vitmur. Sed & vitum tenuioris quidē essentiz, verūm haud manifestō reddidit acris. Quamobrem sanē ad alopecias congruit, & omnia vitia, quæ extergentia medicamēta potulant, vt psoras, lepras, lichenas, & hoc genus alia. Miscetur & digerētibus caraplasmatiz, quah sunt quæ accommodantur ad paronidas, & diu 40 turniores bubonas. Est enim vis eius tum viti, rum non viti, absterfens & digerēs: nec eam par tam habet digerendū potentiam. Nam eo etiam ex aceto quidā medicus utebatur in agris ad viperarum morsus, ac multo magis aliarū bestiarum: ac profectō ex his complures seruauit. Idem etiam ad auriginem spyraethos ipsas propinauit ex vino: & ad profluuiū muliebre cum thure ap posuit. Acris tamē est medicamē, quā vt mulieres vrbanas, aut pueros, aut omnino qui tene ra sunt carne, sanare possit. Iam verō animalū temperatura sicciōri, exiccantius stercus est: sic vt & calidiorum, magis exalfactoris. Verū nullū omnino stercus refrigerat, siue nēq̃ vllū humectat. Pro natura etiam corū quæ eduntur, multa reperitur diuersitas. Proinde in hominib. maior est, quā in cæteris animalibus: quādo quidem hoc animal diuersissimis maximēq̃ va 50 riis vitur cibis.

#### Stercus bubulum.

Facultatē habet exicatoriā, atq̃ attractoriā etiam, vt sanē ostendit, dum apū, vespertiūq̃ mor sibus auxiliatur. Quidam autem medicos aqua inter cutem laborātes bubulo stercore oblinē, in solem exponebat. Idem partibus risticōrum phlegmone obfesis, humidum illud vere collectum, dum herbam boues pascuntur, admo uat.

Est etiā id moderatius alio, quod à paleis comes tus excernitur: ac proinde accommodatius ad phlegmonas. Stercus ouillum.

Ille idem medicus, ouū utebatur stercore ad acrochordonas, & myrmeclias, & thymos, & fur rículos duos, aceto videlicet diluens. Quin & vlcera ambuila, ad cicatricem illo ducebat, id cerato rosaceo commissens.

#### Stercus columbinum.

16 Stercore columbarū nomadū sicco, trito & cri brato, vnā cū nasturtij semine, vice nappos vitor ad ea quæ rubrificari possunt: nēpe ad omnes in veteratis affectus, cuiusmodi sunt coxendix, hē micrania, scotomata, vertigines, cephalæa, & in lateribus, scapulis, ceruicæ, ac lumbis, aniqui do lores: necnō nephritides, affectus colici, & po da gricæ arthritides, quando in articulis nondū concreti sunt topoi. Est autem hoc stercus multa 20 fendum, præcipuē si sit arefactum.

#### Gallinaceum stercus.

Tritum, propinatumq̃ cum tribus quatuorve oxycrati aut oxymelini cyathis, eos celeriter in uat, qui à comestis fungis anguntur: nimrū per vomitum crassissimos humores eliciēs. Est autē hoc stercus minus calidū columbino. Porro vt animalia quæ excruciantur, oculis sicclora sunt: & quæ cibis vtuntur calidioribus siccloribzq̃, iis quæ frigidis atq̃ humidis: sic etiam eorum & 30 excrementa, & partes. Quare columbarum dome sticā stercus multo imbecillius est eo, quod à montanis excernitur. Gallinarum præterea quæ conclusæ seruantur, & fursibus aluntur, longē etiam infirmius stercus est, quā earum quæ in agris pascuntur.

#### Stercus anserum, & ciconiarum.

Anserinū stercus præ nimia acrimonia inuile est. Colligo etiam ita esse & accipieris, & aquirari. Sunt qui ciconiarū stercus morbo edmutatū me den scripserit. Quo epoto credulus quidā nihil adiuuans est. Stercus adurium.

Sic etiā & murū stercus alopecias curare pro dictum est.

#### Stercus crocodilorum terrestrium.

Crocodilorū terrestrium stercus, & sturnorū, quum solam oryzam ederint, vtunq̃ abstergen di, deficcandiq̃ moderatam facultatem fortituri ac multo modēratiorē sturnorū stercus. Porro crocodilorum stercus, quod mulierum luxus preciosum reddidit, vt à facie ephelim tollit, ita 40 & vitiliginem, & lichenas.

#### Rhypos, Sordes hominum.

Quod auris sordes paronychis sit vtilis, pro dictum est. Quæ verō in tota cute provenit, illius sordis quam paron vocant, nōnnullū actionem adiuuat: vt pote de siccan di vim habens, cum nō nulla caliditate. Porro ea sordes quæ lanis ouibz inhaeret, ex quā cypon constatur, similē butyro concoquendi vim possidet: paulū etiam daga 50 rentis facultatis fortia.

### GALENI PERGAMENI de simplicium medicamentorum facultatibus, liber X. I.

Pleraq̃ partes sunt animalib. vniuersis cō munes: nulla tamē est quæ cōmuniis vt ca ro: hanc enim habet omne animal. Cæterū



*Caro proprie  
que dicitur mero-  
sur.  
Parmedyma.*

eam quæ reperit in muscularis, solam Medici carnis appellatione dignantur. Nam carnem viscenum nonnulli parenchyma vocandam cenient, propterea quod eius crassius sanguis, circû vasta omnia (vri ipsi arbitrantur) concreiscat. Sed nos nominum contentione neglecta, persequamur proprietates particularum.

#### Caro viperæ.

Non oēs animalium carnes hominem nutriunt, sed quorundam etiam letales sunt. Tum inter eas quæ hominem nutriunt, quædam tantum sunt nutrimentum, quædam etiam medicamentum. Nam viperarum carnes palam videre est exsiccantes & exicclies, ubi conduntur, seu anguilla, oleo, sale, anetho, porro, & aqua: horum omnium seruat modo. Quod autem totum corpus per curam vacuent, vel hinc tibi discere licet, quod elephantiaci quidam prorsus sunt restitui, ex poro vini, in quo vipera quædam fuerat exincta. Propterea nos elephanticum quendam, nullo prius sanguine,

*Carnis viperæ  
fuculæ & con-  
crenscit mado.*

*Elephantiasis  
curatio.*

*Viperam a-  
sumam max-  
ime visor.  
Vipera cur ap-  
pellatur displa-  
di.*

arrigibile medicamentum purgat, viperis quas capiebat vniuisimus, preparatis in olla, anguillarum more. Atque ita sanatus est, evaporato per cutem affectu. Porro viperarum caro adeo valentem obtinet deficiendum vini, ut quidam qui eam esierunt, vehementissima luerint siti cruciani. Quæ obrem eas dipladas nominant. Sunt tamen qui dicunt demorosa a viperis sanari potum non posse, sed dirumpi potius quod liberari sint. Cauendum autem est, ne in locis maris, proximus, falsus, non sine, vene-

peratur excedunt, & carnes quoque eorum disse-  
rant atque exuperant. Proinde talium animalium  
carnes perpetuo excludere oportet, quales volu-  
mus. Nam interdum animalis temperie humidissi-  
mi caro salita, longe exsiccatior evadit ea, quæ  
siccæ natura exsistit. Verum inter eas quæ salitæ non  
sunt, siccior est assa, quam quæ in aqua est elixa.  
At verò caro mustelæ arefacta, valenter digerit,  
deficitque: proinde morbo cominali afflicto, si  
uat epota. Salitorum etiam carnes ad le-  
uorem contritam, palos & spicula educere autem,  
impositam, sicut & mutulorum carnem viceri-  
bus à mordente cane inflatis congruere. At co-  
chlearum caro, prius in mortario cõfusa, ac postea  
ad leuorem redacta, omnium valentissimè defici-  
cat partes superfluo humore grauata, adeo ut  
conueniat hydropicis. Ipse autem humor solus,  
thuri, aut aloë, aut myrrinæ permixtus, quoad ceta-  
ti accipiat crassum, medicamentum fit tenax, deficiatque  
purulenter aurium humores. Sed & itrobimpo-  
situm hæret, oculorum fluxiones exsiccat. Quo-  
dam etiam ad palos eximios utuntur totis vi-  
nâ testis, ad liquoris tritis alij ad sistendos menses.  
Carnes etiam solæ cum faring polline tritæ, con-  
tusorum vulnera pluviant. Ipsa cochlearum lu-  
miditas pilos superciliorum præter naturam ha-  
bentes glutinat.

*Carnis asæ  
carnis suis  
m.*

*Staphylinæ  
pignus an-  
themi.*

*Cochleari  
carne, et  
fucus.*

*Carnes anima-  
lium cum oleo  
mixturæ.*

*Vipera lapus  
ad candam ab-  
dicere oportet  
ad singulandis  
artificis choro-  
m.*

*Artificis theria-  
cis conficiendi  
ratio.*

mur viperas, seu ad esum, seu ad Theriacis anti-  
dori præparationem: quum verisimile sit, earum  
quæ in id genus locis capiunt, carnes falsas exis-  
tere. Siquidem cum cibis etiam animalium mu-  
tantur carnes. Porro quoniam ex more dum arti-  
fices Theriacos paramus, non tantum caput, sed  
etiam caudâ abieciunt, sicut mihi frequen-  
ter rationabile fortassis esse, caput quod tori ab-  
ici, ob venenum quod ore continent: verum à ra-  
tione alienum esse, adimere & caudam. Theriacos  
autem ipsos artifices sic præparamus. Purgatas illas  
in aqua cum anetho eliximus tandem, donec à car-  
ne separari facile possint sping. Mox panis puniser-  
mo, probe cocto in cibano, salisq; & fermenti  
quod sit sanis haberi, ac breuiter reficcat, & ad  
leuorem trito, necnon macerato cum ipso vipe-  
rarum decocto, carnem prius in mortario tusam  
miscemus. Postea verò paruos artifices fingentes,  
atque in ædibus calidis & siccis siccantes, in talib-  
eos tandem reponimus. Hos ergo ineunte ætate  
cõficimus, sicut & salis ex devitis viperis, quo  
potissimum tempore optima ipsarum est caro.

Vnimur eis postea cõfusus denuo & cribratis, rur-  
susq; ad leuorem redactis, adiacentes nonnihil  
& salis, ad suauitatem compositi, cuius etiam ali-  
quid ipsi theriaci iniucimus. Itaque caro viperæ sic-  
cat, valenterq; digerit: exsiccatur verò mediocri-  
ter. Propter enim vis ejus ad cutem, per eam vi-  
delicet, quæ in corpore sunt crementa exigens.

Quibus igitur copia mali succi in corpore abun-  
dat, is pediculorum numerosa multitudo exori-  
tur: & à cute seu quædam squama abscedit, deci-  
ditque cuticula extrema, ad quam utique solent si-  
si crassi terrores humores: à quibus sanè piores le-  
prij, & elephantias nascuntur. Quod autem ad a-  
nimalia cetera pertinet, oportet quæ in tem-

#### Pinguedo & adeps.

Differt à pinguedine adeps, quod crassior sit:  
ac propterea animalibus totam naturam terro-  
riorē habentibus, ut bobus & capris, adeps pro-  
venit: humidioribus autem, ut suis bene habi-  
tis, ipsa pinguedo. Proinde pinguedo celeriter  
in igne posita colliquescit: nec facili ubi semel li-  
quata fuerit rursus concrevit, aut coagitur. Ac a-  
deps nec facile fundit liquefit, & iustus cri-  
tinnè cõgelatur. Porro adeps nullus, aliorum om-  
nium est humidissimus, ob idque actione sua vid-  
nam oleo vim possidet: quam quod oleo magnum  
emolliat, sed coagatur: quam obrem caraplastas  
quæ ad phlegmonas accommodari solent, miscet.  
Qui verò mordicationes prestant aut in recto  
intestino, aut in colo, ut potius capillum adipis  
quàm suillum iniucimus. non quod plus a crimonias  
obundat, sed quod cõcrevit citius, iustus aut in-  
star olei defluat. Quare capillum potius dysente-  
ricis & tinnemosis iniucitur, quidam morsum co-  
rum mingere est consilium. Quam quod tenuitate  
essentia nonnulla magis acrimonias retinadunt,  
ubi in alto mordicatorum corporum, quod mole-  
stū est, hærent. Hac ratione adeps asininus magis  
obundat quæ in alto corpore mordicat: præter-  
ea suillo calidior est. Horum tamen in medio est  
gallinæ corollæ & gallinarum adeps. Porro calidior  
semper & siccior est masculinum animalium a-  
deps: & horum ipsorum excrementum minus tum  
calidum, tum siccum: quippe max castreus eiusdem  
semper generis feminæ assimilatur. Omnis igitur  
pinguedinis facultas est humefactoria & ex-  
calfactio: humanorum corporum. Ceterum pin-  
guedo sua, vrad non quidē, largius humeficare  
potest, sed non quæ excalfacit, sicut neque oleum:  
talem quippe caliditatem obinet, qualis ipse est  
in nobis. Taurorum adeps suillo multo calidior &  
siccior

*Pinguetudo  
adeps.*

*Dysenteria an  
adeps capilli  
in adeps.*

*Adeps asini  
na.*

*Castræus na-  
scitur ex  
seu feminæ  
assimilatur.*

*Carnis viperæ  
viti.*

*Cachymia  
symptomata.*

ficcior est. Sic & adeps vitulinus taurino minus  
tum calidus est, tum siccus. & hec dōrū quim ca-  
prum. At caprarū minus quim hecorū. Rur-  
sus taurocū minus q̄ leonum. Nam hocū adeps  
omnium propinodum adipe potēus digerit:  
quippe & caliditate exuperat, & partū tenuitatē.  
Quare nimis vlcera & phlegmonas irritat. In  
veteranis tū tumoribus, atq; scierū in morē du-  
ratū, tū neruorū curuaturis aptissimū est: in q-  
bus sanē nullus videt minimē efficac. Taurinus  
aut quāto calidior ficciorq; suillo est, tantō suspe-  
ratur a leonino. Itaq; tanquam in medio consi-  
stens, merito vtriq; medicamentorū miscetur ge-  
neri, & ei scilicet qd scirrholis medet, & ei quod  
phlegmonas ad suppuratōnem perducit: cuius-  
modi est tetrapharmacū, ex cera, resina, pice, &  
adipe cōstant. Verū omnibus quib. caro est mol-  
lior, adeps suillus conuenit magis. Duram autē  
& siccam habentibus, taurinus. At verō adeps  
dum inueterascit, seipso & calidior, & acrior, &  
tenuioe efficitur: ac proinde valentius siccans &  
digerens, id quod omnibus inueterascētib. ac-  
cidit, nū interim computrescat. Porro veforū  
adipem alopecias curare verē est proditum: quā  
tam en ad eum a fectum probatiora remedia ha-  
beamus. Myelos, Medulla.

Vim habet corpora indurata & scirrholia emol-  
lendi. Oprimam semper sum expertus ceruini:  
dein vitulinū. At loricorū & raurorū, tum  
actorū est, tū ficcior: itaq; durities scirrholia mol-  
lire nequit. Ex vitulina igitur & ceruina pefi cō-  
ponuntur ad emolliēdos vteros. Et extrinsecus  
vteris medicamenta imponunt, quē ex medulla  
parantur, vim emolliendi habēna. Accipitur autē  
non solum medulla ex ovis, quæ sanē cetera  
est medulla, sed ex spina etiam, quæ tū durior, tū  
ficcior est altera. Vtrāq; autem liyeme collectā,  
in sicca editaq; domo cum solis laui sicis repo-  
no, ne videlicet cōputrescat. At si quido ambien-  
te existere calido, aut rinoq; medullas aut adipē  
vteris reponere, vteris ad id cubiculo quammaxi-  
mē fieri poterit temperato, quod qd ad aquilonē  
obuersum, apertas habeat paruas fenestras, vt  
perpenō status inspirantes excipiat.

#### Caput mœnidum.

\* Menidū sale inueteratarū capitibus vitis, ad  
sedis fissuras vtebatur quidā: & ad columellam  
diu induratum. Videtur ego vis illarum esse de  
ficcatoria, non admodum acris. \* Nam vt acri-  
monia ad vitarum nonnullis inest, sic omnibus  
vis exaccandi.

#### Caput leporinum.

Alius capite leporis vitō vtebat ad alopecias  
cum adipe vrsino.

#### Caput saurum.

Sauræ caput contritū quidā palos & spicula  
extrahere prodiderit memori: tū myrmecias,  
acrochordonas, & clausos eximere.

#### Cerebrum leporis.

Id attritū & esum, vile dicimus esse pueris den-  
tientibus. Quidā etiā aduersus tremores vitaler  
edi cerebrum hoc prodidere.

#### Cornua ceruina & caprina, vitā.

Dentes candidos reddūt, fluidaq; ganguias cō-  
trahunt. Quod si ceruinum ad visionē laeuetur,  
dysenteriam, & sanguinis excretionē, præterea

coeliacos affectus sanat. Aurigini etiam dicūt id  
esse vtile. Ex quo quidē duo exhiberi coeliciene  
ad oia ista precipiunt. Quidā etiā ipsum miscue-  
runt collyris de fice tribus oculoerū fluxionibus.

Pulmo agninus & porcinus.

Intertrigines a calcamentis curare credit. At  
vulpinus li bibatur siccatus, asthmaticos iuuat.

Iecur canis raliude.

Si assum edat, remediū existere iis q ab ipso ra-  
biente cane fuerit emorū, quibūsdā p̄ditū est.

Iecur caprinū.

Quidam ipsum assantes, saniemq; excipientes  
fluenter, ea vtuntur ad nyctalopas. Vapōrē autē  
eius, dum elixatur, oculis apertis excipiendum  
precipiunt. Quin & assum si edatur, & ad eisdē  
affectus accommodari aūt, & eos qui comita-  
li morbo sunt obnox, coarguere. Idem potest  
lurcinum hepār.

Iecur lacertæ.

Erosiis impossum dēnibus, eos dolore libera-  
re nonnulli scriptis mandarunt.

Venter mergi.

Qd de hoc & de interna tunica vetriculi gal-  
linarum proditum est, id vanam esse promissio-  
nem, compecimus.

Castoreum.

Testiculos castoris, vocat castorū medicamē  
& celebre & multi vsus. Evidenter siquidem cal-  
facit. Quum aut calfaciētia omnia, quæ cōsisten-  
tia sunt sicca, vbi cōtracta substat: quippā dige-  
runt, continuo etiam illa desiccant: manifestum  
viriū est, castorū etiam desiccare laud obcurrē:  
id quod illi cum multis est medicamentis cōmu-  
ne. Quia verō impēe subnium est partium, ob  
id plus valet quam alia, quæ similiter vt ipsum  
tum calfaciunt, tum siccant. Nam quæ tenuius  
sunt partium medicamēta, iis quæ sunt crassiora,  
efficaciora sunt, etiam si parum forata sint fal-  
tatem: nimirū quia magis penetrat. In cōvulsio-  
ne igitā plenitudine, quæ in neruis est, orta, & bi-  
bendum castorū exube, & aut foris etiam im-  
pone. Vbi verō ex siccitate nimia cōvulsio obve-  
nerit, scito hoc medicamē illuc esse aduersissimū.  
Ad eundem modum iis qui præ plenitudine aut  
tremor, aut singulum patiuntur, est vtilissimū:  
aduersissimū verō iis, quibus id ali inanitione,  
aut acrim humorū morū accidit. Vbi itaq; ex-  
calfactione, aut resiccatione, aut vtrāq; simul a-  
ctione est opus, maximā in vū castorū experie-  
re commoditatem: nec vllam parti alicui noxā  
afferet, potissimū si homo nō febrat, aut febrim  
non admodū calidam perueniat, sed tepidam,  
qualis maximē in cataploris & lenthargis acci-  
dit. Ac multis sanē castorū vna cō pipere albo,  
vtrūq; mensura cocleare, ex melicrato propina-  
uimus: ne quisq; vllam perceperit noxam. Sed  
& retentis mensibus, vbi per vnam quæ in talo  
est, modicē euacuasse sanguinē, oblato casto-  
rio vna cum pulegio, aut calamintha, semp  
medicamē hoc sam expertus pueganonē clere, citra  
vllā assumentis lationē. Præterea locos morātes  
eicit: eiq; ola ex melicrato potū efficit. At quib.  
ab occasione frigida ita venter statu distenditur  
vt agrē curationē admittat, eos ex oxycrato po-  
rum castorium adiuvat. Quæ porro iuuat in cor-  
pus intrū sumptū, in prodest quoq; cuti impo-

Lenthargiurum  
fibros esse topi-  
dan.

Mergi edamē-  
do ratio.

stium, cum Sicyonio, aut veteri oleo. Quæ verò ampliori calore indigēt, ita etiam per se infricari debet. Inuar etiam, si quia sufficit eius prunis impositi, inspiratione hauriat: illos præcipue affectus, qui in pulmone consistunt, aut capite. Atta mē lethargicos & cataphoricos affectus, quodidem habent adiunctis febrim, prærit non dictorum oleorum aliquo macerantes curare, sed potius ex rosaceo capiti colligū imponere.

#### Lumbi scincorum.

*Scincorum lumbi.*  
*Semen quæ pro moueant & ardeant.*  
Quæ circa renes scincorum sunt, bibunt, tanquam pudenda intendere valeant. Contrarium aut moliri videtur semē lactucæ potum ex aqua.

#### Vngues caprarum & asinorum.

*Vngues caprarum & asinorum.*  
Quidam vngues caprarum devitos, moxq; acetopulso, alopecios illiunt. Itaq; fuerit & talia cinis facultatis exicatoriæ. Sunt qui combustos asinorum vngues comitalem morbum curare dicant, si scilicet assiduò bibant. Si verò macerati oleo applicentur, digerere cheradas. Sed & ipsum cinerem, si siccus inpersus fuerit, sanare perniocæs.

#### Ossa combusta.

*Ossa combusta.*  
Admodū digerentem, exiccantēq; vim obtinent, maximeq; (vt quidam ferunt) humana. Noui siquidem nostratū quosdam \* combusta ossa humana porci exhibuisse, ac multorū sic epilepsiam & arthritim curasse.

#### Senectæ serpentis.

*Senectæ serpentis.*  
Hanc scribere quidam in aceto bullitam, dentium mederi doloribus.

#### Pellis ouina recens detracta.

*Pellis ouina.*  
Circūposita verberatis, eos die ac nocte vna percutat. Concoquit eū & ducunt sub cute concretum sanguinem.

#### Equorum lichenei.

*Equorum lichenei.*  
Eas aceto tritas cominales ceræ scriptū quibusdam efficit. Alij verò & ad cuiusvis feræ morsum adhiberi consulant.

#### Tela aranæ.

*Tela aranæ.*  
Hanc scribūt nōnulli à phlegmone tueri summa cutia vlcera.

#### Coria vetera vsta.

*Coria vetera vsta.*  
Eorū cinis exicatorius existit. Quare vlcera ex attritione, & ambusta, & intertrigines quæ in seminibus sunt, perfruat.

#### Ostrea.

*Ostrea.*  
Ostrea quidā nuncupant testacea omnia: ostreum aut, vnam tantū testaceorum speciem. Buccinæ & purpuræ.

*Buccina.*  
*Purpura.*  
Buccinarum & purpurarū testa vsta, redactaque in tenuissimū pollinem (quod sit tibi cōmunepreceptum in testacis & lapidosi omnibus) deiccandi vim obtinet, ac, pinde vlceribus malignis opusculatur: id quod etiam cōmune est omnium quæ citra insignē morum vehementer desiccant: quippe quum alloqui fluxionum causa existant. Hoc etiam est omnium id genus commune, quod ex aceto, aut oxyurato, aut cnoemelite, aut oxymelite, idonea sint vlceribus putrescentibus.

#### Ostrea.

*Ostrea.*  
Ostreorum testa vsta similia est facultatis buccinarum testis, tamen minus crassæ. Exenim ossa id genus cogēdi quando in se faculratē obtinet, perquam cōdensata eorum essentia, dura terro-

sig sunt reddita. Quis vbi perversionē posuerint, digerentē facultatem asciscunt. \* Quod si ea, vbi vsta fuerint, laueris, quicquid habebat igneum, in aqua ponit. Quare aqua sunt ipsa exalfaciā cum tenuitate reddat, adeo vt putrefaciat interdum: reliquū verò terrosū, morbus expers efficitur: maximēq; implēdis & cicatrice claudēdi humidis vlceribus auxiliatur. Cæterum vlceribus, causis & fistulosis, fluxionisq; obnoxios vlceribus, ex fusillo adipe inveterato toris circūpono ipsū: in sinū aut aliquid eorū quæ talia carne implent, impono, quale existit diaphanea vstū. Quin & dentes splendidiore testatū cinis efficit, nō tantū extergēdi potentia, sed & asperitate substantiæ: vclvi & pumex, & testa cibam. Verū in vstu eiusmodi, non est necesse quæ sic vsta sunt admodum laugare, sicuti dum inpersunt vlceribus. Porro excrecentiam medicamenter exerant, cōprimuntq;. Ad hæc, vsta omnia id genus cum sale, dentium smegma efficacius reddunt, vt nō modō laxitatem mollitiēq; gingivarum deficiet, verumetiam vlcera putrescentia adiuvet.

#### Sepiæ testa.

*Sepiæ testa.*  
Sepiarū testa admodū laxa est, non vt ostreorum lapidosa. Itaq; absterfo illi cū alia testis cōmunis est, velvi & desiccatio: cæterum partium tenuitatis eximia illi præ ætēna inest. Quocirca vsta ea vtriusq; ad vinligines, ephelims, lētes, & psoras. Quin & fosili soli mista, in oculis existentes vngues, & sycoses vocatas ehuat. At anteq; vrtur, dentib; splendore cōstiliat, & vlcera defecat.

#### Opercula purpurarum.

*Purpurarū opercula.*  
Ea quidam prodiuerim memoris turgidoa lienes sanare: suffusi eaz q; vteri suffocatione periclitant, inuare: præterea retentos eicere locos.

#### Lana succida.

*Lana succida.*  
Idoneæ excipit irrigationes quæ adhibentur conulsa, aut quovis modo percussa, vt quæ utilitatem ex illis proficiscentem promoueat: idq; propter cxypon. Lora verò, apta est humoribus qui irrigillat, excipiēdiā. Porro vsta vim habet acrem, pariter & calidam, vna cum partium tenuitate. Itaq; molles præhumidissq; vlcerum carnes celerimē eliquat. Inditur & in medicamentis deiccatoriū. Vrito eaz tanquam alia plurima, illa implens nouam, quam tegat operculū multia foraminibus pertusum.

#### Pili vsti.

*Pili vsti.*  
Similiter vstæ lanæ exalfaciēdi exiccandiq; possident facultatem.

#### Quorum facultates.

*Quorum facultates.*  
Qua partes animalium non sunt, sed proportionē respondent lis quæ adnascunt. Sunt aut facta ad propagationē generis, perpetuatēq; ac sunt vniū, seu nutrimenta. Porro ouorum album & tenue illud, quod item ad ophthalmia vtimur, ex numero est medicamentorum minimē mordicanū. At vnam prauitatē solū patiūtur oua, quæ scilicet affert verustas: eamq; facillimē effugias, si vtiar recētib; . Est autem ouū symmetro temperie frigidius. Vtendū autem est oui albumine, nō tantum ad oculosa, sed ad alia omnia, quæ medicamenta requirunt suauissima: vt sunt vniuersa sōdis & pudendorū vlcera cōstumaia. Miscetur quoq; idoneæ medicamentis profluuiū sanguinis ex cerebrū involucria reprimētib; ,

Vitelus oui.

Ovo toto ad  
que vitetur.Ouum in aceto  
peruclit rſum-  
que dyſenteria  
medicatur.Ambuſtus oui  
opulatur im-  
poſition.

Anacollemata.

Ouum forſale  
quid vitetur.Erinacei.  
Erinaceus.Cochlea.  
Lamoris.Dyſenteria o-  
pium medi-  
catur.Carcini.  
Cancer viſi.Galeni pre-  
ceptum ſunt  
Aſiſian Empi-  
rici.

nibus, quæ nimirum citra morſum illinuntur, a-  
ſtringunt. Cæterū & ipſe vitellus aſimilis eſt ſua  
turæ, ac proinde miſcetur ceratis morſus experti  
ous. Verum quantum plus deſiccant que ſunt aſia  
ous, tantò minorē mitigandi vim obſeruent. Miſ-  
ſetur & cataplaſmatis phlegmonem exſtinguen-  
tibus. Iam verò crudo toto ovo vitum admiſto  
roſacco, ad palpebrarū, aurium, mammarū, alia  
rūmq; omniū partū phlegmonas. Ad hæc, in ace-  
to coctū ouū ſi edat, ventris fluxiones deſiccat.  
Quod ſi etiam corum quippiā, quæ ad dyſen-  
teriam aut coctiarum affectum conueniunt, adiun-  
xeris, atq; in igne modico, ſumiſq; experte frixe-  
ris, edendūq; ita præbeas, non minime ſanè ita  
laborantes adiuuans. Ad ambuſta etiam ouū eſt,  
protinus impoſitū, viſe ſiue ſeorum albu-  
men duntaxat ipſum mollī lana excipiat: ſiue e-  
nam cum vitello conſundat, cōmiſcētq; appli-  
cet. Medio critet em̄ refrigerat, & citra morſum  
deſiccat. Tale quum ſit, & ad anacollemata voca-  
ta, quæ fronti impoſunt, eo vitumur, & pilos pal-  
pebrarū agglutinamus: nimirū admiſto idoneo  
rum ſpū, cuiusmodi eſt rhus, poſſiſimū pingue,  
ac nō in veteratum & ſiccum. Ouum igitur me-  
dicamentis quæ humiditates deſiccant, aut elixū,  
aut aſum, aut frictum, tanquam materia miſceat:  
viſe verò quæ lentore humorum in pectore pul-  
monēq; in cūdat, forſit ad quod in aqua coſq;  
elixari debet, donec incaleſcat. Simili modo ſum-  
ptum, gutturis, ſtomachi, ventris, inreſtinarum,  
atq; velicæ medetur aſperitatibus.

Eclunus, hoc eſt, erinaceus, combuſtus.

Erinacei vitruſq; tum matini tū terreſtris cor-  
pus viſum, cinerem efficit ſaculans tū extergen-  
tis, tum digerentis, tum extrahentis.

Cochlex, ſiue limaces.

Cochlex ſi totæ cum teſtis vranſ, admittā gal-  
la omplacride, ſimulq; pipere albo, mirē plunt  
dyſentericis, in quib; vlcera cōputreſcere nō ce-  
perunt. Cōuenit aut vit pipere ſit pars vna, gal-  
læ verò duæ, quatuor coſcleſcum. Hæc vbi ad vin-  
guem ſuſgaueris, cibus inſpergito, bibendūq;  
aut ex aqua, aut ex vino albo & auſtero, præbe-  
tō. Cæterum abſq; gal-  
læ miſtione cinis cochleæ  
admodū reſiccantis eſt facultatis, obſeruens item  
nonnihil ex viſione calidum. Porro coclileſ que  
viſione non ſunt expertæ, ſi vna cum teſtis tru-  
tæ impoſantur, & toti ventri aqua inter cutem  
laborantium, & in articulorum tum oribus, egre  
quidem diuellī poterunt, ceterū impenſe deſic-  
cant, vel ſi viſcidus craſſiſq; humor in alio cōti-  
neat. Ex ſanè inſperere ſine eſt oportet, donec ſpō-  
rē decident. Idem facien-  
dū in tumonibus ex ic-  
tū nans, diſſicile ſolubilibus.

Carcini, hoc eſt, cancri viſi.

Fluuiantium cancerorum cinis, quamſimiliter  
prædictis exaccarioris eſt ſubſtantia: tamen pro-  
prietate mirabilis eſt eius in iſo qui à rabiēte ca-  
ne ſunt morſi, effectus: iſq; tū ſolus, tum cū gen-  
tiana & thure, multo præſtāior. At ruriſ partē  
eſſe vna oportet, quing gentiane, cancorū de-  
cem. Ex quo quidē medicamine Aſechnon Em-  
picus, cōcius atq; præceptor meus, iſi qui à ra-  
bido cane emorſi fuerit, quotidie dieb; quadra-  
ginta menſuram cochleæaris magni rum aqua bi-  
bendam dabat. At ſi nō protinus ab initio, verū

aliquot poſt dies, curā cœpiſſet demorſi, tūc ſtri-  
die duo cochleæaria aquæ inſpergebat. Ad ipſum  
verò vulnus applicabat emplaſtrū, quod ex picē  
brutia, opopanax, acetog; cōſtituit: habens pi-  
cis libram vnā, acen acerrimi ſextarium vnū  
Italicum, opopanaxcis verò vncias tres. Hæc itaq;  
monita volui de cancri, quū nullus eorum qui  
viſi illo medicamento ſuerunt, extinctus ſit.

Chelidonis, ſiue hirundines viſæ.

Sed & hirundinū cinere permiſto melli per-  
mulni vitumur, contra omnes aſſectus gutturis.  
Vitumur & ad acundum viſum nonnulli hoc ci-  
bere. At aliq; eas arefactas drachmæ poudere bi-  
bendas exhibent.

Tetiges, hoc eſt, cicadæ.

Cicadæ etiam nōnulli impoſitæ ad colicos aſ-  
ſectus, cum paribus numero pipere granis. Aliq;  
aſſas edendū offerūt, quibus aſſectū veſica eſt.

Corydos, Galerita.

Galerita, aqua illa puſilla, quæ in capite veluti  
galerū ex pilis habet conſtatū, in iure elixa coli-  
cos adiuuat, veluti & ipſa Jæbera corydalis appel-  
lata. Verū aſiduè eā ſimul cū iure eſſe necesse eſt.

Alectorides, Gallinæ.

Gallinarum ius ſimplex retinendi vim poſſi-  
det, vi gallorū ſub ducendi. Concoquendi autē  
ſunt cum ſalē diuſiſimè.

Gale, hoc eſt, muſtela.

Eius cinerē cum aceto illitum podagricos iu-  
uare eſt prodrū: ipſam verò arefactā, poſſe co-  
mitialibus morbis.

Ranzæ viſæ.

Ranzæ inferum cinerē ſanguinis eruptioni  
mederi referunt: cum liquida autē picē ſanare  
alopécias. Hippocampus.

Huius etiam cinerē alopécus prodeſſe eſt prodi-  
tū, facultatiſq; exicannæ & extenuantiſ exſistere.  
Tellinæ falſæ.

Salſas tellinæ viſas, adeo vrentē efficere cine-  
rē aut, vi in cū cedria euulſos radicatus ex palpe-  
bris pilos, inſtillatus in locum, eos renaciſ prolai-  
beat.

Inteſtina terræ, ſiue lumbrici.

Cōtrita, neruſq; diuſis impoſita, mirū in mo-  
dum ea prodeſſe eſt prodrum. Præterea cum vi-  
no poſa, medicamen eſſe mouēdq; vrinę idoneū.

Cimices.

Eas cum aceto bibitas, elicere hirundines aiūt:  
quas nos ſemper eſu aliorum cecimus.

Cantharides.

Cū idoneis emplaſtris impoſitæ, adeo ſcabros  
vngues educūt, vi toti cadūt. Præceptorū meo-  
rum quidā, earum nonnihil ſolē diureticis me-  
dicamentis inſicere. At nōnulli ſolæ alas & pedes  
iniiciūt: aliq; cōtrā. Cæterum nos rotas indimus.  
Porro apiores ſunt ex cantharidibus, q̄ in vtræ un-  
frumeto, lutea trāſverſim in alis cingula obtinēt  
Bupreſtis.

Animal eſt cithandi tū ſpecie, tū virib; ſimile.  
Pityocampe, Eruca picæarum.

Eiuſdem ſunt ſaculanti.  
Salamandra.

Salamandræ cinerē quidā ſepicis, lepricis, ſpo-  
riciſq; miſcent ſaculantiſ.

Narce, Torpedo marina.

Si applicet vna cui caput doloſ, ſieri poſt vt do-  
lore liberet ſimiliter aliis q̄ ſenſū obſtupesciūt, na.

BB ij

Morſus à rabi-  
do cane curan-  
do ratio.

Chelidonis.  
Hirundines viſæ

Tetiges.  
Cicada.

Corydos.  
Galerita.  
Corydalis.

Alectorides.  
Gallina.  
Gallorum ius.

Gale.  
Muſtela.

Ranzæ viſæ.

Hippocampus.

Tellinæ falſæ.

Inteſtina terræ  
Lumbrici.

Cimices.

Cantharidæ  
facilis.

Cantharides  
aliquid ratio.

Bupreſtis.

Eruca picæarū.

Salamandra.

Narce.  
Torpedo mari-  
na.

Draco mari-  
nus.  
Trigla.

Draco marinus, & Trigle, & alia id genus.  
Vires etiamque haece animantes apertas, & protinus partibus affectus appositae, pdesse traditum est. Nempe draconem marinum in suum ipsius ictum impositum: similiter & Trigla in draconis: mures domesticos in ictum scorpi, veluti & sauram: mygalē in suum ipsius: & saurā Chalcidicam, quam ex vino bibendam praebent, tanquam suum ipsius morsum sanet. Porro scorpionum suū ipsius morsum curare, si tritus imponat, necnon si assus edatur. Congruere autem aiunt & his qui a vipera sunt emorisi: a scalabotam verò us qui a scorprio. Referunt etiam & in Aegypti regionibus arefactum asiracum exhiberi us qui a scorprio percussus sunt: & vocatum cibum, vniuter vulneri a cane inilicito adhiberi. Ceterum in oleo frictis totis animalibus, ipso oleo vrebantur nostrarum medicos quidam: sed & superiorum nonnulli ad pilorum effluuium: nempe pityocapnia, vrticis marinis, lepore marino, & scolopendro marino: ad aurum verò dolore, filpilis in oleo coctis, & us quos Graeci oniscos, Latini mulpedes vocant.

Ascalabota.

Asiracum.  
Cybura.

Pityocamp.  
Vrina marina.  
Lepagmarium.  
Sulphur.  
Onychia.

Vulpus.  
Hyena.

Vulpes, & hyenae.  
Oleum in quo elixa vulpes est, non est potestioris in digerendo facultatis, quam in quo hyena: quae si similiter in oleo elixetur, oleum ipsum longe potentissimae facultatis in digerendo reddit. Talia autem medicamenta vim habent, ea quae in alto corpore delitescunt, ad extimam cutem trahendi, atque eo nomine quidam dolores sedandi. Quare qui videntur vulpibus, & ipsi oleum digestiori efficiunt, atque inde impletis eo alueolis, totos arthriticis in eos demittunt, multo tempore inibi immorari iubentes. Ex quo fit, ut non tantum qui circa articulos sunt tumores vacuentur, sed etiam vniuersum corpus. Vnde certe magnū consequitur commodum, quum nihil praeterea amplius in affectas partes fit deluxurum, nimirum evacuato iam corpore.

Oleum vulpium  
functis axillis  
in morbo arthriticum.

Adarcion.

Adarcion.  
Essentia quidem sua veluti spuma est aquae salis coepta, idque circa arundines & farragines. Est autem acerrimum, simulque calidissimum pharmacum: proinde & per se in vire. Verum commisceri solet us quae vim eius retundunt: sicut fit multo vtilissimum in iis affectibus, qui exallescere possunt, foris impossibile est. Nam id intra corpus sumi impossibile est.

Alcyonae  
faciliat  
et dif-  
ferencia.

Alcyonia.  
Alcyonia omnia detergunt ac digerunt, qualitatem habentia acrem & calidam. Est autem eorum vnum densum & graue, odoris praeui. Olet enim pisces putridos, spongiae in specie simile. Alterum vero figura longiuscula, leue, & rarum, odorem habens similem physcis. Aliud tertium vermi simile specie existit, colore purpureo, consistentia molli: vocant id Miletum. Poit quae quartum, secundo quidem iam posito similem & leue & rarum, verum lanis succidis simile. Denique & quintum, extrema superficiei sui, ceterum interna substantia asperum, nullius odoris, gustu tamen apparet acere. Quod sane omnium alcyoniorum est calidissimum, a deo ut pilos devertere possit. Itaque qui duo prima lichenas, alphas, pforas, lepraque aduenerint, praeterea cutem splendidiore efficiant, idem praestant.

re non potest hoc vitio loco posiri. Nec enim perinde vt illa cutem duntaxat summam extergit, sed etiam excoriatur, ita vt vlcera inducat. Porro quod tertio ordine recensimus, omnium tenuissimum est. Quare vitum alpeccas curat illirum cum vino, colore quidem fuluo, tenui tamen essentia. Quartum autem eisdem cum hoc speciei vires obtinet, verum haud parum imbecilliores.

Sal.  
Sali eiusdem genere facultatis est, siue fossilis sit, siue marinus: verum hoc differat, quod salis est terra efflosa subtilitatem magis compacta sit, ac proinde in eo maior partium crassities, & astringendi potentia. Mannus itaque affusa aqua liquescit protinus: id quod non accidit fossili. Eiusdem speciei cum marino est qui in stagnis quibusdam salugineosis nascitur, gurate videlicet aquis ex his aestu absumptis: cuiusmodi est Tragalus, non procul a Smyrno. Igitur quum qualitas salis digerat simul & contrahat contractam ab ipsa substantia, aphirotum in hoc differt, quod in ipso vnum saporem experantem sit videre, quem vocat amarum, vim habentem digerendi, haud item contrahendi, vti sal. Nam hic, quicquid in corporibus humidum est, id totum absumit: & quod reliquum est substantiae solidae, astrictione contrahit: ac proinde etiam coctura sua carnes seruat, ac putredinem tuetur. Quippe quae putrescunt, excrementum humorem continent, substantiamque tum dissolutam, tum minime coactam. Quibus ergo corporibus nulla prorsum inest superflua humiditas, eum meli optimo, & substantia solida & compacta est, vt lapidibus, ea vt putrescit est impossibile. Quare in iis salis non probatur vires: sed in illis tantum, in quibus suspecta est putredo.

Sal vitus.  
Digerit quidem potius, quam vitiosis expers, quanto scilicet subtilius ipsius corpus accepta ab igne facilius redditur.

40 Litrum, Nitrum.

Ostensum est hoc medicamen in medio salis & aphronitri vires habere.  
Halos anthos, Flos salis.

Liquidum est medicamen, tenuiusque quam sal vitus: praeterea qualitate acris, facultatisque admodum digerentis.  
Halos achne, Spuma salis.

Spumosa est salis efflorescentia, multo tenuioris naturae, quam ipse sal. Quare & extenuare, et digerere quilibet multo plus potest. Verum quod substantiae est reliquum, contrahere vt sal nequit, Asphaltum, Bitumen.

Vnum & ipsum est ex iis quae in aqua marina proveniunt, & in alia quapiam quae non est marina dissimilia, vt in Apollonia Epiri, ubi reperiuntur hoc medicamen in aquis sponte nascentibus, veluti spuma quaedam innatans. Quo sane tempore est molle: postea vero resiccatum, pice sicca durius efficitur.

Bitumen proveniens in mari mortuo.

Optimum verò bitumen in mari quod mortuum vocant, provenit. Cuius medicamina vires ita resicatoria, tum exalicatoria in secundo excessu. Merito itaque videntur eo ad cruentorum vulnerum glutinationem, & ad alia omnia quae excoriari debent, eum modica exalfectione.

Spongios,

Spongia 784.

Spongiæ ar-  
boris americanæ  
in præparandis  
sanguine.

Garus.

Hæmæ.  
Salsugo.

Spongus, Spongia.

Vtebatur ea præceptorum meorum quidam ad sanguinis eruptiones, quæ manuali opera indigent. Porro admovebat eam partibus sanguine profluentibus etiam non ardentibus, ut & crusta parti in ducere, & ipsum spongiæ corpus, seu operculum adhiheret. At verò spongia noua, non sicut lana aut linamentum, materia duntaxat est quæ humores irrigandos excipiat, sed etiam manifestè desiccato. Quare vulnera glutinat, si aqua, aut oxycrato, aut vino admoveatur imbura: aqua sanè, quæ antiqua est, longo spacio relinquitur.

Garus.

Faculratem habet admodum calidam atque siccam. Proinde eo quidam ad viceram vsi sunt putrescentia: tum dysenterici ischiadicique iniiciunt.

Halme, Salsugo.

Similiter garo ad purèdines accommodatur: & ad ischiadas & dysenterias iniicitur. Etenim acrimonia sua humores coxæ infestantes attrahit: ob idque per intestina evacuat: putrescentia verò vicera in dysenteria colligit, & siccatur. Maxime tamen salsugine salisum ulsurorum & mænidum ad talia Medici vruntur.

## GALENI. LIBER DE substitutis.



Vt substituta medicamenta dicunt, quæ in alterius locum substitui possunt: quorum sanè cognitio, plurimum ad medendi usum cõfert. Plerumque siquid delectum Medici illa quæ ad morbum exterminandum maxime expedire arbitrantur, ne quæ expèdientes ea quæ similè ferè vim obtinèntia, vice illorum assumi possunt, ægri opitulari nesciunt. Quod ne nobis aliquando contingat, enumeramus omnia pharmaca substituta, ordine litterarum disposita.

PRO

SVSTITVTES

Abrotono  
Absinthio  
Acacia  
Acoro  
Aerugine  
Amianro  
Agallochio  
Agarico

Origanum.  
Abrotonum.  
Succum lentisci.  
Radice mædari.  
Atramentum futorium.  
Aphronitrum.  
Calamum odoratum.  
Euphorbium, aut epithy-  
mum.

Alga  
Aloe Indica

Anchusam.  
Aloës viridis folia, folium,  
vel glaucium, vel simum  
Ibis, vel Lycii, vel cetera.

Alumine  
Ammi  
Ammoniaco thym.  
Ammoniaco sale  
Amomo  
Amylo  
Amygdalis amaris  
Anchusa  
Aniso  
Arace  
Aristolochia rot.  
Argemone  
Armenio lapide

Salem fossilem. (trium).  
Anisum.  
Propolim.  
Cappadocum salem.  
Acorum.  
Gyrin siccam.  
Absinthium.  
Hyacinthum.  
Daucum.  
Sesamum.  
Aristolochiam longam.  
Silybrium.  
Atramentum Indicum.

PRO

SVSTITVTES

Asbesto  
Aspalatho  
Aphodelo  
Asaro  
Asio lapide

Adarcem.  
Ericis semen, aut vincia.  
Succum betæ.  
Zingiber.  
Gagatem, aut salem ammò-  
niacum totum.  
Sandarachum.

Auripigmento

Balaustio  
Bdelio  
Bstumine  
Brutia pice  
Buccina  
Buprestis  
Butyro

Malicorium.  
Sphagnum odoratum.  
Picem Brutiam humidam.  
Picem in aceto seruata.  
Ostrum.  
Laser, aut hirudinem.  
Lac bubulum coactum.

CAdmia

Calamo odorato  
Canthari  
Cantharidibus  
Capparis radice  
Cardamomo  
Cassia  
Castorio  
Cedria  
Ceraunio  
Ceruina adipe  
Cera

Leucographum Aegypti.  
Sphagnum.  
Bacca lauri.  
Plislangia.  
Ericæ radice aut myricæ,  
Fructum myrti.  
Cinnamomi dimidium.  
Sisplium.  
Ladanum.  
Leucographum.  
Anseris adipem.  
Fabam frescam cum propo-  
li coctam & tritam.

Ceru cornu

Ceruissa  
Chalbæne  
Chamaedry  
Cicuta  
Cinerula Cypria  
Cinnabari  
Cinnamomo  
Clinopodio

Caprinum.  
Scoriam plumbi.  
Sagapenum.  
Lapathi radicem.  
Semen coriandri.  
Cinere foliorum oliuæ.  
Rosaceos patulos.  
Cassie duplum.  
Heliotropium.  
Vitis semen.

Cnico

Colocynthide  
Coloplonia pice  
Coralio  
Costo  
Coryledone  
Crinanthemo  
Croco  
Crocomagnate  
Crocodili adipe

Apoclyma.  
Moly, aut symphytum.  
Cedri fructum.  
Anagallin.  
Aphrodisiam.  
Crocomagma.  
Agallochum Indicum.  
Canis marini adipem.

Cumino

Cynoabato  
Cyperi  
Cyphi

Brasice semen.  
Solani vescicariæ semen.  
Iuniperum magnam,  
Carcam vitam.

DAmafonio

Dauci semine  
Dictamno  
Diphyrie  
Dorycnio  
Dracontio

Eryngium.  
Sis semen.  
Saluiam.  
Phrygium lapidem.  
Alterci semen.  
Aron.

EBeno

Ebisci radice  
Elateris succo  
Elleboro nigro  
Enneaphyllo

Lori arboris lignum.  
Folia mori.  
Eiusdem herbæ succum.  
Papyri radicem.  
Potamogetonem.

BB inq



**PRO**  
 Epithymo  
 Ericis fructu  
 Erini foliis  
 Erucæ semine  
 Erucæ pini  
 Eryfimo  
 Euphorbio  
 Eupatorio

Felle cameli  
 Felle mustelæ  
 Felle hyænx  
 Felle viperæ  
 Flore æris

Galla  
 Gentiana  
 Glycyrrhizæ succo

Hederæ succo  
 Hedychroo  
 Hyacintho  
 Hyænx adipæ  
 Hyofcyamo  
 Hippuri  
 Hyperico  
 Hypocistide  
 Hyfopo

IRi Illyrica  
 Iunco odorato  
 Iunco paluſtri

Lapathi radice  
 Lapidephrygio  
 Lapide afio  
 Lapide pyrite.  
 Lauri baccis  
 Lathyri  
 Lentifco  
 Lepidio  
 Lepidij radice  
 Lepore marino  
 Lini femine  
 Lori femine  
 Lupi adipe  
 Lyguſtico  
 Lyfimachio

Magnete  
 Malabathro  
 Malo cydonio  
 Malua  
 Mandragora  
 Mauna  
 Maſtiche  
 Medulla cerui  
 Meliloti  
 Melle  
 Melle Attico crudo  
 Meo  
 Myrrinite  
 Molybdæna  
 Mori ſucco  
 Myrobalano

**SVSTITVTES**  
 Colocynthis ſemen.  
 Gallam immaturam.  
 Stercus Ibis.  
 Eryſimi ſemen.  
 Velpas cum cedria.  
 Struthij ſuccum.  
 Stercus columbæ agreſtis.  
 Chamæpityn.

Fel Aſcalaboti.  
 Fel cameli.  
 Fel perdicis.  
 Fel ichneumonis.  
 Squamam æris.

Palæſtræ ſordes.  
 Radicem apii odorati.  
 Mori ſuccum.

Perſæ ſuccum.  
 Amaricium.  
 Florem Iſtidia.  
 Vulpis adipem.  
 Solani veſicariæ ſemen.  
 Aiugam.  
 Anethi ſemen.  
 Acacia.  
 Thymum.

Helenium odoratum.  
 Cardamomum.  
 Polygoni radicem.

Pyrethri radicem.  
 Lapidem argyritem.  
 Gagatem lapidem.  
 Lapidem pyrobolon.  
 Serpyllum aridum.  
 Granum Gnidium.  
 Terebunthum.  
 Rubiam.  
 Folia cappar.ſ.  
 Leporem fluuialem.  
 Fabulum.  
 Betæ ſemen.  
 Vrſi adipem.  
 Paſtinacæ ſemen.  
 Spinæ Aegyptiæ ſemen.

Hematitem lapidem.  
 Nardum Indicum.  
 Melilotum.  
 Fornum grecum.  
 Dorycnium.  
 Thuris corticem.  
 Lentuſci caulem.  
 Viruli medullam.  
 Lotum herbam.  
 Sapa.  
 Mel deſpumatum.  
 Myrobalanum.  
 Succum mori.  
 Lithargyron.  
 Rubi folia.  
 Glaucium.

**PRO**  
 Myrrha Troglodyri  
 Myrthi oleo  
 Miſy Cyprio  
 Miſy toſto  
 Nardo Syriaca

Napi  
 Nepira  
 10 Nucleis pineis  
 Nuce pinea

Ochra  
 Ocimo  
 Ocimoide  
 Oenanthes ſucco  
 Oefypo  
 Oleo Cicino  
 Oleo veteri  
 10 Oliuæ lachryma  
 Omphace  
 Opobaliſmo  
 Opopanace  
 Oryza  
 Orminio  
 Ornithogali

Papaueris ſucco  
 Phu  
 10 Pipere

Pipere albo  
 Poliſi ſemine  
 Polypodio  
 Polytricho  
 Pompholyge  
 Populi gemmis  
 Propoli  
 Pſyllio  
 Pumice  
 40 Pyrethro

Qvercus viſco

Rapa  
 Raphanino oleo  
 Refina pini  
 Roſeis paſtillis  
 Roſis ſiccis  
 Rhu Syriaco  
 10 Rubigine

Sagapeno  
 Salua  
 Salamandra  
 Sale ammoniaco  
 Sambuco  
 Sampaſcho  
 Santonico  
 Satyrio  
 60 Scammonio  
 Scilla  
 Scorcia plumbi  
 Scorcia Cypria  
 Semperviuo  
 Sepiæ cruſta  
 Seſamo

**SVSTITVTES**  
 Calamum odoratum.  
 Mori ſuccum.  
 Ochram Cypriam.  
 Diphrygem.  
 Iuncum odoratum.

Rapæ ſemen.  
 Agreſtem mentham.  
 Cucumeris ſemen.  
 Gallam.

Miſy Cyprium.  
 Siſymbrium.  
 Mentham agreſtem.  
 Virigineum ſuccum.  
 Viruli medullam.  
 Laurum, aut vetus olei.  
 Feruſiaſtum duplum.  
 Hypociftidis ſuccum.  
 Gallam immaturam.  
 Guttam myrthæ.  
 Lac ſycamini.  
 Farinam hordei.  
 Lini ſemen.  
 Anthyllin.

Mandragoræ ſuccum.  
 Sphagnon.  
 Zingiber.  
 Nigri duplum.  
 Erucæ ſemen.  
 Chameleonis radicem.  
 Abſinthium.  
 Cadmiam viſam.  
 Sampaſchum.  
 Ladanum.  
 Lentem paluſtre.  
 Terram Creticam.  
 Zingiber.

Chameleonis viſcum.

Heliotropium.  
 Ricini oleum.  
 Terebinthinum.  
 Sinopidem.  
 Perſæ folia ſicca.  
 Oxyacanthæ fructum.  
 Squamam ferri.

Refinam pini ſiccam.  
 Calamintham.  
 Lacertam viridem.  
 Salem Cappadociæ.  
 Spinæ viridis folia.  
 Rhus coquinarium.  
 Abrotonum.  
 Erucæ ſemen.  
 Ricini ſemen.  
 Bulbum eſculentum.  
 Plumbum productum.  
 Melantheriam Aegyptiam.  
 Lactucam.  
 Pumicem.  
 Lini ſemen.

Seſamoide

## PRO

## SUBSTITUTES

Sesamoide	Amaranthi cremorem.
Sinapi	Nasturtium.
Silone	Auisum.
Sisymbrio	Ocimum
Solano vesicaria	Semen solani hortensis.
Splagno	Iuncum odoratum.
Spondylis	Folia oliue.
Stercore vulturis	Columbinum stercus.
Stercore turturis	Stercus columbi.
Stercore felis	Ichneumonis stercus.
Strbio	Aeris squamam.
Struthij radice	Ellebori nigri radicem.
Succo calpsi	Succum myrti.
Succo peucedani	Glycyrrhizæ succum.
Succo rhododaphne	Vicum quernum.
Succo cyrenalco	Synacum succum.
Succo papaueris	MANDRAGORÆ succum.
Succo salicis	Hederæ iugræ succum.
Succo gallæ	Succum mori.
Succo panacis	Lacysfamin.
Succo polygoni	Succum plantaginis.
Sulfure viuo	Sandaracham.
Symphryo	Centaureum.
Seri	Lithargyrum.

## Terra Samia

Terra eretria

Terra alana

Terra asteri

Terebinthina

Thapsiæ succo

Thymo

Tithymalo

Thure

V

Verbenaca

Viola

Vino Rhodio

Vino Falerno

Visco quercino

Vulpis adipe

Vulturis stercore

Vua domestica

Lcucographen terram.

Calcem Thebæicam.

Plumbaginem.

Cimoliam.

Mastichen.

Clamæleonis nigri succū.

Satuream.

Chamæleon.

Ampditin terram.

Clamæleucen.

Florem radiculæ.

Austrium vinum.

Vinum Mendesium.

Chamæleonis albi viscum.

Vrsinum adipem.

Columbinum stercus.

Pulpam palmularū Syria-

carum.

## Xylbalsamo

Radicem violarū albarum.

## Zingibere

Pyrethrum.

## GALENI PERGAMENI

de compositione medicamentorū secundum genera, lib. I.



Vandoquid ex committario quem iam pridem de compositione medicamentorū conscripsi, priores duo libri, quæ extant in lucē, vni cum aliis in apotheca, quæ ad viā facti est, per-

rierunt, dum Pacis delubrum totum, & ingentes Palatij bibliothecæ maximo conflagrarent incendio: equidē amicorū precibus victus, cogor nunc illos eosdē recudere: idq; ab eodē initio auspiciatus, id quo in illis exorsus fuerā. Siquidē statim in auspiciis primi commentarij monebā, esse exterminandos sophistas, qui traditionem medi-

caminum compositorū ē medio tollunt: nonnulli q; simpliciu peculiariter quasdā facultates infesse insciant: eos etiā excipientes scōmate, qui de illis aliquid prodiderunt. Qui quidem adeo vires medicamentorū ignorant, vt nesciant prius, a marino lepore pulmonē solum exulcerari: vesicam solam a cantharidibus. Ar vero Empirici cognoscunt quidem ex frugine cerato simplicia admixta, consicū optimum sarconicum medicamētum: tamen neutrum eorū per se, carnē gignere possit: quæ autem ratione id contingat, ignorant.

Sunt igitur vires medicamentorū simplicium, non generatim tantum, sed particularim enī inuestigandæ. Siquidem non sat est nosse loc phar macum calfacere, nisi etiā quo gradu id efficiat, noris. Calfaciunt quippe res omnes: atramentū maioris minorisq; ratione plurimum inter se acrum calores differit. Atqui in curatione particulari impēs refrigeratq; medicamētū admodū bimus

admodum calfaciens: illi vero quæ paululum ab habitu naturali recessit, calore modico præditi. Merito itaq; nos quatuor ex calfacientium ordinis statuimus, separātes a modice calidis ea quæ euidenter eiusmodi qualitate præcellunt: tum quæ magna, tum q; vehemens adeo, vt vere iam videatur: atq; in singulis hisce ordinibus latitudinem mōtēneam constituentes. similisq; in excessibus reliquarum qualitarum, ratione. Porro medicamentorum materiam, quædam sanē a plantis, quædā a metallis, nonnullæ ab animalib. proficiuntur. Iam vero, præter simpliciu omnium medicaminum facultates, omnium etiā præter naturæ affectuum differētiās ad vnguem nouisse expedit. Quippe primus curationis scopus a morbis sic dispositio nō nascitur: cum quibus simul indicat curationē natura particulæ affecte. Sed aëris etiā nos ambiens temperiem, constitutionēq; præterea ætatem, tempus, regionem, vitæ studia, & mores, multū præstantissimi

Medici vni cum illis inspicunt. Ergo si simplicibus tantum medicamentis, vniuersos præter naturam affectus curare liceret nobis, nunquā egeremus compositis. Quum autem sepe numero aliquatenus calfacere corpus volentes, simplex nullum, quod præstare id possit habeamus, ex variis vnum cōficimus medicamētū, quod eodem, quo affectus, gradu a mediocritate recedens, id quod ex vīu est, moliatur. Taceo nonnulla simplicia, citra alterius medicamētū miscel-

lam, non posse adhiberi in emplastrum: alia, nisi retundantur, aut mitigentur, administrari nō posse. In morbis etiā qui contrarias simul facultates desiderant, vt, repellendi & digerendi, detergendi ac lœuigandi, vel attenuandi simul & incrassandi humores, maximam compositionis medicamentorum est vīus: nec secus vbi vnicū medicamētum habere cupimus, quod multis venenam ciuclantibus feris, ac phar macis exitiabilibus aduersetur.

Quum autē olcum vetus & adeps, vim digerendi fortiantur: clauicinis autem & palmæ succus, repellēdi, astringēdiq; ex his ipse pharmacum phorolinum dictum composui, glutinandis vlcenibus, cicatrice obducendis, & phlegmonis curandis a commodum: quo iam complures vtuntur. Etenim ratio compositionem inue-

Sarconicum a primis confectum ex atraginis re-  
tato simplicis admissa.

Rafina omnes calfaciunt.

Calfacientium ordinis quatuor: quoniam nulli re-  
pelleat est in ca-  
teris qualitatibus.

Medicamentorum materia vna de persicifian-  
tur.

Scopus curatio-  
nis primus a mor-  
bis sic dispositio  
nascitur cum quibus  
simul indicat curationem  
natura particulæ affecte.

Compositum medicamentum cur-  
tiamur.

Pharmacis  
pharmacis cipa-  
suis et vni.

Pacis delubrum  
conflagrante  
et cum in  
bibliotheca pa-  
latii, et nonnullis  
in vicinis aedibus  
Calais.  
Insuper etiam  
museis offici.

nir: experientia, de invetorum virtute decernit. Cum prædictis autem debet coqui lithargyrus, donec consistentiam confingatur emplastricam. Adeps porro ipse sit in infusus, tum vetus, quæ admodum enam oleum: quæ sanè quò vetustiora fuerint, eò digerit præprium. phlegmonemq; diuturniori atq; contumaciori erunt magis accommodata. Verum ad incipientes atq; augescentes phlegmonas, vt quas astringere atq; refrigerare oportet, præstat emplastrum ipsum ex vino, vel aceto, vel aqua, vel oleo immaturo, vel astringente, liquare. Cõmonis autem compositionis modus est talis. Vetusti adipis lib. 2. olei vetus li. 3. Lithargyri tantundẽ. Chalcindos vnc. quatuor. Liquato ad ipsi reliqua elegantior atq; artificiosè miscant, seruetq; antq; simul, ac rudicula palmæ viridi & succulenta moueantur, donec sibi emplastri consistentiam cõtraxerint. Quo quidem medicamine, ad vlcera quæ non faciliè cicatrice obducuntur, & ad cruenta est vitendum. Auxilia tur etiam inflammationibus, articulorum morbis, bubonibus, phyma, ambustis, perionibus, fracturis, contusionibus, rheumaticisq; vniuersis constitutionibus, cuiusmodi plures solent Romæ inuadere. Ceterum in phlegmona rum principis vim repulsiorem esse validiorem oportet: in incrementis verò, hæc imminuenda: q̃ digerit virtus, augenda est. Vigente phlegmone, partes invicem esse cõvenit facultates, nisi vehementer dolor pharmacum leniens requirat. At inclinantem phlegmonem, vim digerendi augebis. Quæ ex methodo licet tibi secundu[m] varias indicationes vti prædicto emplastro, variis oleis atq; succis liquato. Ego verò ad phlegmonas erysipelatos soluto ipso ex rosaceo vtor. Cui etiã si æstas fuerit, vix acerbis simul & portulacæ, vel sempervivui succu[m] miscebo. Quippe vix acerbis liquor per se, plus q̃ oportet astringit: tanta autem astringitio lædit erysipelatam, vt q̃ calore ipsorum, cutè densando, includat. Igitur in exatùs erysipelatis, ea q̃ ad ventia sua frigida auxilant, vbi caperint incallescere, sunt multisda. Postea vero quàm incendium conquieverit, aut si nec perfectu[m] planè ab initio erysipelas fuerit, huiusmodi plius ascitiam frigiditatem desiderabimus: verum iis succis diluemus phœnicinũ emplastru[m], qui moderatè refrigeret. Ab his iam & lini seminis, & chamæmeli succu[m] miscebimus: ipsosq; solos, sed fuso postea vtemur emplastro, nihil aliud illi miscemus. Quod si quando liuidu[m], ob refrigerantium vim, erysipelas ipsum evaserit, solũ phœnicinũ emplastrum, veteri oleo liquatu[m], id discutere potest: quo tẽpore partes liuidæ, aqua fontis calida, atq; enĩ scarificant. Sunt qui calcis vix nonnihil ipsi pharmacu[m] misceant. Interpedit itaq; in rheumaticis affectibus, hoc vitor medicamine: vt potè quod tum astringat, tum digerat, tum robur particularu[m] confirmet. Etiam non semper ob calorem immodicu[m] fluxione assignatur particula: sepe quidem ob propriam imbecillitatem, quæ ab intemperie fit gida vt plurimum proficiscitur, tali corripitur affectu. Quare si humectet eas q̃spis, caliditatem medicamenis laxantibus, dissolutisq; profus & imbecillæ fient. Sin tumores vehementer astringat, initio quidem iuvare videbitur, ceteru[m] quod ex

eis reliquum est, contumax atq; scirrhosum feruè reddiderit. Sed neq; id genus dispositiones feruè nimis astringentia medicamenta, vt si quibus dolore & tensione assigantur. Atqui omnis dolor inflammator ex acuit, irritatq;, & fluxionibus occasionem præbet, vel si rheumatica intẽperie reger non afficiatur.

Sunt autem complura medicamenta, q̃ pharmacu[m] cui miscetur, vim nullam aut periguum exhibent: cõmoditatem verò materiam præstat, vt vel emplastri, vel cerati specie ceterat. Atq; ex eo rum sanè genere existit argenti spuma, nullam insignem possidens facultatē, præter siccandi modici. Quia ratione artata femora ex iunere adiuuat. Est autem ex his pharmacis quæ liquefieri possunt, enam argenti spuma, quam Græci lithargyron vocant. vt chalcitis quoq;, & misy. Ceterum chalcitis quidem omninè efferunt funditur: tardissime argenti spuma: at in horum medio erugo & misy cõsistunt. Porro candidu[m] medicame[n], quo ad parva vlcera vtor, ex oleo, aqua & argenti spuma consistit, ita vt libris duabus aq̃, tres quàm purissimi splēdisimiq; olei, tondenti q̃ spumæ argenti inniciatur. Debent autem simul coqui ad ignem minime fumidũ, idq; in loco sub dio atq; soli exposto. Siquid vt aer nubes pharmacu[m] ipsum denigrat, hic syncerus aut candore eius plurimu[m] cõfert. Hæc autem fiet glutinannus id medicamen, quod plus liquoris iudicemus. Aqua etenim subtilitã propria semper humectat, refrigeratq;. At oleum si recens sit, pharmacu[m] minime relictur. Permanet itaq; liuidum, ac modicè frigidum, quali maxime tenera corpora & cacoethia indigēt. Ergo huiusmodi emplastrum, pruritus, deliquamata, & vt vno verbo expediam, vlcera exigua persanant. vt potè exulceratis partibus ne quid insituit, impediens: & quod iam insituit, de nouo ad partes circumstantes retrudens. Adverte autem, nullum humectans nec propria ratione, nec ex accidenti esse vlcibus utile.

Consistit etiam pharmacu[m] id ex ozelo & lithargyro. Ceteru[m] medicame[n] medicocrite siccans fit, si vtriusq;, nĩpe olei & aceti, duplo maior portio quàm argenti spumæ misceat. Copiosior verò duplo vtriusq; mensura, valde nũs facit pharmacu[m]. Ipse enim triplam vtriusq; nonnunquã miscens, tota die medicame[n] coquere soleo. Atq; hoc sanè modo confectu[m], colore auro splēdiscent, maximèq; siccandi potentia pollet, ita vt curet vel cera cõtumacia, cruenta glunet, fibrilataq; in calum non induratas, adducat: ac breuiter, citra morfum exiccet.

Ex ozelo etiam lithargyroq; similiter medicamen paratur. Equidem per æstatẽ sub sole ardens, ex vino Falerno, aut alio tenui quatuor, lithargyrum cõterere soleo, idq; cõtinuus quindecim diebus. Quib. exactis, medicame[n] ipsum exiccans, repono: quo postea ex oleo soluto, in rheumaticis affectibus vtor, necnon ad vulnera glutinanda. Cruda itaq; ac per se, argenti spuma, attritiones corrigit. Ex aceto autem vino trita, siccatq;, vlcera quæ ob humiditatẽ ægrè cicatricem recipiunt, emediũ fit. Quod si ipsi cupis rosionis experte, clodia vitor. Ac minimu[m] quidem rosionis exhibet, si vino vel aceto abluit. Cõvenit etiã curiosè toto die contrahi, cū liquore per no-

Dolor inflama  
ta exasperat,  
flemmibz  
occulant pra  
bet.

Lithargyri fo  
culum.

Chalcitis an  
non idcirco  
funditur,  
Candorem ve  
licetiam Gale  
mæ.

Aerem subtili  
denigrare phar  
macu[m], hinc  
confertur ad us  
um candore.  
Aqua propria  
faciliter.

Candida empla  
stra Galem fo  
culum.

Vlcibus vbi  
humiditas est  
utilis.

Lithargyri pra  
parando ratio.

Lithargyri fo  
culum.

Lithargyrum  
reddere expen  
siosum si ex vi  
no vel aceto ab  
luatur.

Roma in vale  
stere et plures di  
ffusionem rheu  
maticam,  
phlegmonarũ  
curatio.

Omphacis fo  
culum.

Erysipelati cu  
ratio.

Licentis erysi  
pelati curatio.

Emplastrum ph  
legmonæ facilius

fluxionis cau  
sa.

Etiam

tem relinquere: quem postero die manē effunde mus, aliū denuō instillātes, ac postea rursus tunden tes: id quod singulis diebus facere sub feruē ti sole (hoc enim sit cōmune præceptum in lapi do sis omnibus) minimē desistimus, donec vni cum humore seu quidam flosculus ipsius argen ti spumę cernatur.

Quę ex lithargyro cōponuntur, fieri possunt etiam ex molybdęna. Ceterum molybdęna sub stantię crassioris ac frigidioris quā lithargyrus est: ac medicamenta quę ex ipsa parantur, cin e rina redduntur. Quum igitur dīcutere quid vo lueris, lithargyro potius q̃ molybdęna vritur.

At cerussam vel coloris causa ad emplāstra cō dida conficienda medici lithargyro immiscēt: velut quādam astrigendi refrigerandiq̃ vim medicamēto conciliant. Sed refinam etiam in il lere assolent, quō sequax ac sibi continuam fiat phar macum. Verum quā minūsimę omnīū resinę sint tum terebinthina ipsa, tum illa quę larix dicitur, has miscere præterit, dum conficere ta le medicamē est animus. Multo enā leniora tā ētu omnia sunt, tum quę refinā constant, si cerę quid adiciatur: tum quę ex cera, si modicū resinę recipiāt. At candido emplāstro alba cera defi dera t: quam, si ipse sit nara, prius abluere opor tet: nimirum liquātes ipsam, ac mox in aqua fon ns mergentes, cōmouentes, & repurgantes: qua ratione etiā pix, refinā & phlysemā, abluenda sunt.

Vbi igitur cerussę, spumęq̃ argenti, adeo p̃p̃ coctis vt minimē insciliat manus, cera simul cum refinā fuerit admīsta, candidum emplāstrum ha bebis, cui aquā aut oleum miscere poteris. Ex oleo autē omphacinum, Hispani cōmū, pharma cū vim astrictoriam adiiciunt. Litricū vero cum exigua astrictione quādam amaritudinē refert. Atq̃ principio vlcis, sinig, poniora sunt astrin gentia: dulcia autem in media. Pondus ergo hu iusce emplāstri sit tale: Cerussę, lithargyri, singu torū lib. j. olei lib. 2. cerę lib. 3. Terebinthi vnc. j. Quibus omnibus licebit tantum diuers, quan rium & terebinthi, aut etiā dimidiā portionē addere. Quā industria medicamen maxime ano dym reddere, sed ad cicatricē inducendū ine prius: quandoquidē ex ipsius vfu caro vlcis ex crescat, quā tunc sit facultate sarcoticum. Taceo laxātia medicamenta corporibus plenīs & caco rhyms admota, fluxū ad assectas partes citare. Satis itaq̃ fuerit, tum ad cicatricē inducendam, tū ad digerendū exactius, aluminis scissilis, can didiq̃, vnciam vnam, pipēris semenciū miscere.

Candidi ex pipere medicamētū, quod ad senū vlcera, & eorū qui mollem fornūtur cuticulam, persanāda est efficac, quodq̃ refertur ad Attali regem nostrum, qui olim Pergamēsisbus impe rabat, compositio habet in hunc modum: Argē ti spumę, cerussę, sing. lib. j. olei lib. 2. cerę lib. 3. terebinthi vnc. j. thuris vel tantundē, vel me dia pars, aluminis drach. 6. pipēris drach. j. Verū apud Romanos librari quidem dicitur solē, vt mēsurari humida. Metallica in primis sub so le coquantur, donec duriusculam consistentiā adipiscantur: quibus reliqua postea misceri de bent artificiosē. Hoc pharmacū vlcibus humi dioribus, atq̃ abrasis medetur.

Alba quę oleo recti & aqua citra pipēris atq̃

thuris misturam confici docuimus, vehemēter cōmorās partes offendunt. At minus illas Attā lacum lacerare solet, eō quod terebinthina, oleū vetus, alius, & piper, adiecta sunt. Ad cōmorā nāq̃ minimē alume cōducit: quum opus hic sit non astringēnibus, sed abvnde extrahētib, ea, quę in alio nervo punctos asfigunt, & venenatam animalium saluam. Distinguenta au tem sunt cacoethē vlcera, ab his quę nō facile ad cicatricē perveniunt: quum non omnia cacoē the vlcera agrē cicatricē admittāt. Porro si blan dius medicamentum, ad sedandūq̃ dolorem, cōmodius, cōficere vis, aliquid adipis asferis, vel galliūacei, vel porcini immiscebis. Sic nāq̃ magis anodynum efficeris: minus tū idem cum cicatricē inducendū. In vniuersum autem, nemo probē vti possit medicamēto cōposito, qui sim plicium vires prius non accuratē didicerit.

Aliud albū Andromachi. Lithargyri, cerussę, sing. minam Arcan. j. cerę partem quartam, resinę terebinthi nē tantundem, olei heminas 3. 2. quę heminas duas. Cōficito. Nōnulli porro vncias 20. minam continere tradunt: nonnulli sex decim. Atqui miretur quispiā, quomodo Romę degens, pro libris nominarit heminas: cui vrbī sunt familiaria vocabula, libra, sextarius, & vnciā. Ex multis aut medicamentis iam pridem cō scriptis, priusquam potentia Romanorū vique adeo creuisset, sum cōiectura assequutus, quā il li vocarent heminam, fuisse æqualem novē vnciis vnius librę Romanę.

Aliud album Andromachi.

Argenti spumę drach. 160. cerussę drach. 200. cerę drach. 50. terebinthi drach. 24. olei hemi nam 5. aquę cyathos 6. Cōficito.

Aliud candidū ab Hera descriptum. Cerę albę Pont. lib. 2. lithargyri chrysi drach. lib. j. cerussę tantundem: myrris, medullę ceruinę, singul. vnc. 2. thuris insecti vnc. j. olei veteris sextarium vnum. Lithargyrus oleo incoquit: vbi verō for dum crassitudinem acquirit, cera, mox cerus sa, aspergitur, moueritq̃. Vbi vnita fuerint, nec iam polluit, ab igne extractis medulla iniciunt. Postquam refrinxerit medicamentum, myrris & thus aliis miscēt. Deinde emollitū, subactūq̃ manibus, ad vsum seruat. Etenim rabidorum moribus auxiliatur, tum vulnē impositū, tum mole avelanę nucis, catapoti instar exhibitū, quadraginta diebus. Ad hec, abrafa, suggillara, & vlcera quę difficulter admittunt cicatricem, persanāt ad aliq̃ plerq̃ est vtile. Ego tamen propinare pharmacū hoc contra canis rabidi morius, nunquam fui ausus: quum haberem aliud, nempe ex cancri confectum medicamen tum, ad sanandos illos maxime efficac. His enim remediis ipse vti semper, conatus sum, quę licet non nunquam p̃fidelit quod aliatura essent, du biam spem promitterent, ne utique tamen obo esse possent. Porro Heras cum heminam scribit,

60 sextarii Romani dimidiū indicare videtur, con tinētis vncias viginti, quas cornibus maiores ex parte menunt, incisis extrinsecus linte quibus dam orbicularibus. In vniuersum autē, sub me tallica medicamēta plenius coquant, emplāstrū ex eis constans adeo friabile edetur, vt adhære cuti absq̃ deligatura nō possit. At coquantur

Cornu quę conuēniēti me dicamenta.

Cornu vlcera ab omnia et si dyspaleata.

Compositio re cti non vti po terat, quā simpli cium vni prius non didice rit. Candidum an dromachi.

Heminā fuisse apud nos vnciā librę Ro manę.

Candidi albi andromachi.

Candidi herę

Morbi rabidi canis amilius medicamēta re fracta assest.

Sextarium Ro manū quatuor re vncias 20.

Metallica plenius coquenda esse, vt adhære ant.

Lapidosa om nia quę abluen ti sit sunt ex humore aliquo laugenda. Molybdęna fami lia.

Cerussa viti.

Terebinthina. Larix.

Cera abluenda.

Vlcibus inci piendis porio ra affrangi nē.

Andromachi phar macum.

Thos carnosus vni.

Attalus Rex Pergamē. pa tris Galeni. Candidi re po p̃re aspergillu.

Lithargyrus soli da. Molybdęna hu mida.

largius, dum maiorem liquidorum mensuram in mixtura cōtinent. Quod verò ad adipis differentias pertinet, in omni animantium genere iuuenilia perfectius humidiores, minusq; calidum adipem possident.

*Candidum Mafian.*

Album quod ad Mafian refertur, ad diuturnitas & difficulta cōferens. Lithargyri, cerussæ, singulorū drach. centū; ceræ drach. 50. terebinthinæ, thuris, sing. drach. 25. aluminis fissilis drach. 12. olei heminas 2. Nec verò differe putemus, si drachmas centū alicubi scriptas loco vnius libry inueniat. Libra siquidem drachmas sex habet ad nonaginta. Selibra, octo & quadraginta. Sic & huius rursus dimidium, viginti quatuor.

*Libram conficit drach. 96.*

*Dyssepulotica vicia que dē genitor.*

Porro quæ vlcera ex humorum confluxu, vel multorum, vel acrimiarum oriuntur, ita tamen ut locus affectus huiusmodi in se dispositionē non habeat, quam fluxum humorū, quamvis bonū, corrumpat: ea dyssepulotica, hoc est, ægrè peruenientia ad cicatricem appello. At quæ dictam dispositionē fortuntur, singulari vocabulo cacothæ, hoc est, malignantis naturæ vocantur. Quibus sanè omnibus illa medicamēta conveniunt, quæ absq; ratione & morbi deficiunt: quæq; præterquam quod non erodant, aut manifestō astrigent, detergere etiam possunt. Siquidē plurima generis vlcera, seu ab exsectione maligniorū humorū sunt causa reddita, impleri postulant. Atque omnia que cerni gignunt medicamēta, detergendi facultatem sortiuntur. Multa etiam alia sicca possident vim, vlcibus id genus curandis cōmodam. Eorū tamen meminisse impresentiarum oportet, q̄ aut tueri cōfecti emplastri candorem possint, aut ut vixque deo vitare. Talia autem sunt, cadmia, pompholyx, calx, ostrea cōbusta, purpura, buccina, & sepis pars ossea. Parū offitiet color, & xris squama: & ex vita chalcidide, id quod cinerū est, aut subalbidum. At verò dictorū quodq; si laenetur, torridioris amittet: quædam odōrū tū cera, quæ medicamini cōficiendū admiscebit, tum resina. Ceterū per cera Tyrhenica vel Pōnice est ad candidi emplastri præparacionē præstantior: sic resina, tum quæ latrix, tum quæ terebinthina appellatur, ad vlcera maligna magis cōducunt. Sed thuris aliqua portio etiam iudēda est, ut vicerum maligniorū ipsa dispositio coquatur, & ad suppuracionē perveniat. Iam verò ad prætumida vlcera, ex aceto & marina curiosè laugari debet metallica. In quibus autem acris & mordax est quod in vlcera fertur, ex aqua potius maceranda singula sunt: quæ admodū magis ex vino, ubi copiosus humor vel ceribus influēs appareat. Vbi igitur lithargyri cerussæq; versutq; libram vnam cum tribus olei, & selibra aquæ simul & accuratè coxeris, resine terebinthinæ, aut eius quæ latrix dicit, ternas vncias incito: ceræ autem duplum sufficit: nam thuris sat erit si vnciæ & semissem post ceram & resinā inderis. Deinde metallicorum tres vncias adde, quas drachmæ quatuor & viginti cōstituant. Impones autē duorū, trium, plurium, atq; omnium quæ numeravi: ita ut si omnia habeas, sequi singulorum portionē iniicias, cadmi nempe, pompholygis, buccinarum cineris, vel ostrearum, & xris squamæ, singulorū denarios septē, qui tres vncias absoluit. Quod si calce loti immiscetas,

singulorum drachmæ quinque ponentur. Si vitam chalcidem, singulorum drachmæ quatuor: sic ut ex omnibus in vnum cōcunibus, tres tantum vnciæ conflentur.

Candidum emplastrū Damocratis, ad abrasa, ambusta, & vlcera summa in cute subborra.

Cerussæ lib. j. lithargyri, tryphæq; sing. vnc. 16. ceræ Pōnice vnc. 5. terebinthinæ purissimæ vnc. j. thuris mænæ, vel thuris vnc. 5. olei candidi lib. j. aquæ sextariis. Conficiat uti decet. Porro in iis qui molli sunt carne, in senibusq; aut in q. malo sunt præditi corporis habitu, aluminis lubeat etiam quatuor vncias miscere.

*Candidum Damocratis.*

## GALENI PERGAMENI de compositione medicamentorū secundum genera, lib. II.

Uti igitur si quid perdidimus librū, cui inscripserat insit medicaminum consuetorum compositiones, similia reficere amissis valeamus, necessarium in primis est, nos vniuersalem quandā vix formulam didicisse, quæ positis inueniamus: dein verò secundum hanc in multis particularibus exerceri, scientes absq; tali exercitio nullū posse rectè opus absolui. Proponatur itaq; nobis causum vlcus curandum. Etenim doctū ab ipsa ratione, causorum vlcis curacionē subministrari succrescente alia carne loco deperditæ, ex ea videlicet quæ subiecta est: cogitamus fieri hoc non posse, si in vlcere fordes, aut copiosa humiditas subsit. Verū fordes medicamina detergētia auferūt: humores, exciccatia discutiūt. Quocirca necessariū est huiusmodi plasmacorum matenas cognoscere, idq; non simpliciter secundum genus eorum facultates considerantes, sed inueniētes etiam quo ordine, quove gradu, aut excessu, singula suas vires fortiantur. Fingamus ergo nobis ad manum tantum adesse cerā, fruginemq; quibus causū vlcis repleamus.

Quum enim competum habeamus, ceram quādem solam, vlcis fordes minime prohibebitur esse, ut quæ nec detergere, nec excicare possit: fruginem autē per se adhibitam, excitatam tum roborem, tum phlegmonē: vtrūq; horum vtrūq; vitabimus, mediū aut ex ambobus cōstituemus, ut imbecillius frugine, sic cera valērius. Quia verò paulo hæc intervallo relinquatur, ab eo quod cōmodè administrari possit, ærgo autē magno id ipsum excedit, ob id satē multæ ceræ modicā fruginē admiscebimus. At quantē quāte misce re oporteat, certē ante experientiā exactè quidē nemo invenire poterit: cōueniēti autem poterit, iudicareq; & ita cōficere plasmacum, ut primò nullum infelicē successum sit habiturus: quemadmodum aliquando ergo in quodam vico confecti, cum ceræ fuscæ ex oleo rhodino libra vnica, vnciam vnam fruginis temperans. Ceterum valida corpora validiora medicamenta sustinent q̄ verò imbecilliora existunt, hoc est, humidū & molli habitū prædita, haud itē talia perferūt. Dura itaq; corpora ex copiosiori frugine cerato amista, recipiūt carnē molliā ex pauciori. Quare ipsa experientiā docebit, quatenus vel augere, vel remittere, vel tamen pharmacā facultatē expedit. Sūnt namq; omnia medicamenta ei optima, qui

*Ceram per se non cognoscit vlcis fordes. Acrius per se adhibita, respo- nsum ex phleg- monis excitat.*

*Cera Tyrhenica.*

*Metallica abluenda modo de morsi.*

*Vnciæ conficitur octo drachmas.*

*Corpora valida, validiora medicamenta sustinent. Corpora molliora, quæ sunt, minus quibus respo- nsum.*

affec-

difficilis quibus singula offeruntur, cognoscit.

Viride medicamentum Galii, ad gignenda maiora vulnera potentissimum, ab Andromacho scriptum. Resina strobilina drach. ccc. cere drach. x. xuginis rase drach. i. thuris drach. xxv. Acciti quod sit sanis. Hæc Andromachus. Ceterum quom strobilina resina aliarum omnium longe calidissima sit: ambabus autem qualitatibus moderatissima, quæ terebintina vocat: certè multo sanius videt hanc omnibus medicamentis, quæ reserè curabit vlcera, permiscere: quandoquidè primus, præcipueque in eis scopus est, vt id quod offertur, non mordicat. Cõmendanda est autè ipsius thuris cõmissio, quæ emplastris confitentiam adiuet, dolorè simul leniès & escõquens. Quare si in ea cõpositione et ipsa quibus portio coniuncta xugini esset, et taciuss & minus ipsam redderetur medicamentum: xuginis tamen exiccantem facultatè exoluere, quæ vlcenibus agrè admitterentibus, necesse est desiderari. Meminisse autè oportet, fortium medicamentorum ex aceto diebus pluribus contritiõr, morsum & acnioniã obrudi, vires augeri. Eadè ratio est in metallicis medicamentis cõbuius. Hæc tamen ex ignis cõmercio nõnulli mordax siue erodens perferunt: quod elota deponunt, ac leniã prorsus reddunt.

Proposito itaq; emplastro, si ex rosaceo liquefacto vtaris, p̄derit fordidis, humidisq; vlcibus. Pura verò erodit: ac p̄inde miscendi ei est ceratum liquidum ex cera & resina cõfectum, vel ex rosaceo, vel oleo liquatum. Est autem olei nomẽ vnum, qualitas & facultas diuersa. Quippe emplastrum frigidius est: ex maturis oleis pressum, calidius. Temporis autè progressu, caliditas vim auget. Sic etiam quod saltem habet, quantum ex illo sompserit, tanto calidius est: magisq; succat, quàm quod ipsius est expertus. Tam qd furculos oleæ cõtinet, valentius astringit. Indicat aut quod virulos est, & vlcis forma, & corporis ægni natura. Vlcus siquidem cõtrariis remediis curabit: corpus vlcerat, similis. Rosaceum verò præstantissimũ esse nosti, quod solis rosas pluribus, oleo citra salè præparato, plenius maceratis cõfectum est. Quæ omnia si quis memoriter teneat, nec oblitus sit viridũ medicamentorum simplicium, is & varia emplastra viridia componet, & compositorũ singulis q̄reclissimè vtet. Porro durioribus corporib. magis exiccantia medicamenta exhibenda sunt: minus aut, mollioribus. Ad hæc intendemus exiccatis medicamen-

tionem vim, vbi opus esse videatur, admisso melle: remitemus aut & mingabimus, ex oleo, & cerato, vel oleo quopiam. Igitur caui vlcus in sano corpore, viridi emplastro, qd ex xugine, cera & resina cõfinitur, liquato ex rosaceo, curabitur. In cuius medicamenti cõpositione, equidem cere & resinæ soleo portiones pares miscere xuginis alit duodecimã, vel decimã, vel octauam, nimirò pro vlcere corporisq; diuersitate. Atq; erit sanè duodecima, si cere podo, & resina tantum, xuginis vncias duas temperemus, decimãq; & octauã ad portione.

Viride Hecatondrachmon dictum, quod centum drachmas medicamentum recipiat, ad magna vulnera glutinãda, & purgãda fordidã, maxumè vtile. Ammoniaci drach. viij. squamæ drac.

xij. mannæ drach. viij. resinæ siccæ drach. xij. xuginis drach. viij. sed virulini drach. xij. resinæ terebintinæ drach. viij. cere drach. xxx. olei quartan cyathi p̄strem, aceti quantũ sanis esse videatur. Cõfiscito.

Viride Epigoni, ad carnẽ gignendã efficitur.

Aeris squamæ, xuginis, guttæ ammoniaci, ari stolicæ, thuris, ling. vnc. j. Aloës, myrris, chabani, sing. vnc. s. Aluminis rotundi drach. vi. resinæ colophonæ drach. cc. cere drach. c. olei hemina dimidium. Misceto.

Viride Passionis ad extrahendũ & digerendum vtile.

Resinæ colophonæ drach. ccc. cere drach. cl. xuginis drach. viij. aluminis rot. tantum dẽ: squamæ ari drach. x. thuris drach. xvj. æris combusta drach. viij. Salis Ammoniaci tantidẽ. Olei dimidium cyathi: aceti quod sanis esse videatur. Cõfiscito.

Viride Lite appellatum. Resinæ lib. xij. cere lib. viij. xuginis rase lib. ij. Seui virulini lib. ij. aceti lib. jo. Ego autem mannæ libram inuicio. Liqueat igitur acetum cum duabus xuginis libris, & vna ipsius mannæ, leuigatum esse, ac dein liquida ipsi miscẽda. Hoc medicamentum emollit, concoquitque, adipis atque mannæ ratione.

Porro ad efficiẽda viridia medicamenta, ætuginem non modicam immittere oportet, vt cætera in suum colorem permuet. Quare quæ pertinaciter proprium colorem teneant, ea simplicia ab hac miscella abigenda sunt. Sed neque iactare conquendum est inueniẽda ipsi grugo: verum vbi in mortario vnitã facta est, tunc miscenda.

Cõsilia igitur curandorũ vlcum sunt, fordidis adhibere abstergentia medicamenta: profluentibus exiccantia: atq; id quod in fluxu est, repellẽda. At si copiosum & contrumax sit quod fluit, virulos causa prius est amputanda. Constat autem, inflammatorum vlcũ prius esse sanandam phlegmonem: carnem intemperatam, educendam esse ad temperiem: cui sanè quatuor modis simplicibus, roncẽmq; cõpositis, per contrarias qualitates succurrit.

Porro vbi sinum implere proponimus, medicamentum Isis vocatum, aut Machæronis emplastrum liquatur ex copiosiori oleo, & per foratũ cornu infundendum est: ad quod etiam pylicis vtimur. Est autem ipso medicamento tunc mera ciori vtendum, quum sinus oppletus est sordibus: vt soluto ex oleo largiori, dũ magis purus exstiterit. Ceterum si parux adhuc phlegmones sinum infestantis suspicio adstet, medicamentum ex rosaceo liquabitur. Pari modo & medicamentum siccũ, quod ex chara combusta constat, rosaceo copiosiori diluẽtes, ipsi sinui infundimus. Quemadmodũ verò sinus liquidioribus phlegmatis indigent: ita quæ superficiem corporis caua vlcera infestant, crassius medicamentum postulatur. Merito igitur in id genus vinis, ceratum validè abstergẽtib. admiscemus: in sinibus oleum, vel rosacẽ plurimum. At verò medicamentum quæ ex salibus constat, vbi animus est carnẽ gignere, offerendã non sunt. Sal quippe magis astringit quàm purget: siccit vt nihil minus quàm nitrum ac aphtonitrum.

Viride medicamentum Galii.

Terebintina præparata.

Viride Passionis

Viridum medicamentorum ex aceto tritorum, morum quod dicitur, viridum augeri, hinc acnionem auertere

Oleo differtur.

Vim esse ceratũ dũ vitrius: vlcum corpus similitudo, hinc optima præparata.

Exiccantem vim esse per melle, aut oleo, tunc aut oleo ut cerato.

Viride medicamentum optima temperatura.

Viride Hecatondrachmon dictum.

Viride Epigoni

Viride Passionis

Viride Lite dictum.

Viridia cõfiscito de ratione.

Vlcum curandũ dicitur vlcis cõfiscito.

Vlcum inflammatorum curatio.

Sinus implendi ratio.

Sinus liquidiora phlegmata possunt.

Salis facilius.



## Melina emplastrum.

Melinorum est  
que viridia du-  
scimus.

Quemadmodum viridium emplastrorum plu-  
rima, propter argurinem prepollescentia sunt,  
ita quoque melinorum nonnulla. Sed viridia argu-  
ginem incoctam habent: melina vero cocta, sed  
medicamentosa.

Melinum An-  
dromachi.

Andromachus igitur copulata melina scripsit,  
ad glutinandam vlcera, carnem gignendam, indu-  
cendamque cicatricem idonea: quale est quod sub  
dam. Lithargyri drach. viij. olei heminam quatuor-  
decim sextate, hyeme aut tres cyathos: ceræ drach.  
xlvij. colophonix tantundem: ammoniaci thymi-  
amatis drach. xxvij. arguginis rase, chalabani,  
myrrhæ, sing. drach. viij. Conficito. Aliud sim-  
plex. Lithargyri drach. c. axungie drach. lxxv.  
olei veris tantundem. Misce. Covenit enim cati-  
ne molli prædatis, digeritur. Aliud Heraclidis,  
interiores abfcessus sine dolore discutens. Li-  
thargyri, cerussæ, sing. drach. c. ceræ drach. lxxx.  
resinæ aridæ drach. lx. ammoniaci thymiamatis  
drach. c. chalabani drach. xvj. olei veteris heminas  
ij.

Melinum Hera-  
clidis.

Melinum Menæti.

Lithargyri lb. ij. olei lib. iij. terebinthini lib. ij.  
ceræ lib. j. arguginis, thuris, chalabani, sing. vn. iij.  
ammoniaci thymiamatis vn. c. vj. Conficito.

Melinum Serapionis, ad vulnera, & ad  
resolvendum.

Melinum Sera-  
pionis.

Lithargyri drach. c. ammoniaci thymiamatis  
drach. xxvij. ceræ drach. lvi. arguginis Cypriæ drach.  
ix. myrrhæ drach. j. colophonis drach. lvi. chal-  
bani drach. viij. olei heminæ s. Quod si vitæ sit,  
quartam partem heminæ. Adverte autem, myr-  
rhæ non sustinere coctionem: quam nec thuris,  
nec aloë ferunt.

Collationem ad  
fistulas myr-  
rhæ nec thuris,  
nec aloë.

Hygieni empla-  
strum multis visum.

Hygienes emplastrum multum visum. Lithargyri chrysifidis minam: ceræ tantundem: cha-  
mæcantis nigri i. i. drach. xxxvj. arguginis  
rase drach. xvij. chrysifocollæ drach. xl. olei vete-  
ris heminas iij. Conficito. Preparatur opusculum ar-  
genti spumæ, si immixta vino Falerno sub aestu Ca-  
niculæ, deip assicetur.

Emplastrum re-  
chamæleonte.

Emplastrum ex chamæleonte, quod cicatricem  
viceribus difficillimis, callosis, & inveteratis indu-  
cit. Lithargyri minam j. ceræ minas vj. argu-  
ginis minas iij. chamæleontis minas viij. olei mi-  
nam vniam. Conficito vt decet.

## De ruffis emplastris.

Ruffa empla-  
stra fieri per li-  
gam coctam  
arguinem.

Quemadmodum propter crudam quidem er-  
uginem sunt viridia emplastra: propter medio-  
enter aut coctam, melina: sic ruffa evadunt, vbi  
liberalius ea coquunt. Manifestum igitur est, me-  
lina ruffa quoque oleum copiosius, quam viridia, reci-  
pere. Ruffum porro, quo semper me in industria  
parato vtor, in hunc modum coquitur. Argenti  
spumæ cum oleo prius coctæ, metallica ex aceto lq  
uigara immitto, & sic coquo, donec amplius ma-  
nis non polluat. Impono itaque olei vetustioris  
libras quatuor, argentæ spumæ lib. iij. acti q  
acerrimi lib. ij. Horum trium metallicorum, squa-  
mæ æris nigri, arguginis, chalcidis, sing. vn. c. ij.  
Cæterum hyeme plus olei quam per æstatem mis-  
cendum est. Ac sanè hoc medicamentum cruenta vulne-  
ra glutinat, magisque in duris corporibus curati-  
que difficillima vlcera concoquit. In summa ve-  
ro, solū hoc sinus glutinat, attingit fistulas, exic-

cat, & protius claudit. Ipsum tñ iuvat spongia re-  
cere veteri vino temperata. Deligatura in sinibus  
ab imo fiat, versus vlcera osculum.

De his quoque cicatricem obducunt.

Quæto autem glutinosa sarcotica magis di-  
cuntur siccare, tanto glutinantibus epulonica, si-  
ue cicatrice facientia. Ea tamen ex aliquo astrin-  
genti oleo, cuiusmodi rosaceum, aut myrtæ est,  
solent admixtari. Porro inter ea quæ apud om-  
nes magnifice cõtendantur, inducenda cicatri-  
ei præstantissimū est quod ex cadmia, quodque ex  
ladano consistat.

## Emplastrum ex cadmia.

Cadmia vitæ, & ex vino preparata, chalcidi-  
dis tostæ, sing. drach. lxxx. picis colophonisq  
vnc. viij. vini Phalerici quod lani est. Confici-  
to vt decet.

Epuloticum ex  
cadmia.

## Aliud etiam ex cadmia.

Cadmia tostæ, chalcidis tostæ, diphyrgis, sing.  
drach. xvj. ceræ, resinæ frictæ, olei myrtæ, sing. scil-  
bram. vini Italici quod sit satis.

## Aliud ex cadmia.

Argentæ spumæ, cerussæ, cadmiæ, diphyrgis, res-  
sing, lingulæ drach. viij. chalcidis drach. ij. ceræ,  
drach. viij. myrtæ olei, & vini Amingi quod satis  
esse videatur.

## Emplastrum ex ladano.

Chalcidis, argentæ spumæ, ladani, singulorū  
drach. xxvij. bituminis drach. viij. ceræ vnc. ix.  
myrtæ heminam, vini tantundem.

Emp. strum ex  
ladano.

## Emplastrum Pyricauton dictum.

Olei heminæ, aluminis fissi, mannæ, thuris, ar-  
genti spumæ, chalabani, singulorum drach. c. ceræ  
drach. lxxvij. anchusæ drach. viij. medullæ cer-  
uinæ, adipis suillæ, arguginis, cerussæ, sing. drach.  
ij. oorum trium lutea. Consecratur vt decet.

Emplastrum py-  
ricauton.

Medicamentum Magne dictum, ac verè magnū cõ-  
tra vlcera quæ difficulter cicatricem admittunt:  
quod ex rosaceo dilutū, etiam si sis affectus san-  
tat. Argenti spumæ drach. c. ceræ drach. c. Ce-  
russæ drach. c. terebinthini drach. xxv. thuris tan-  
tundem: aluminis fissi drach. xij. olei heminas du-  
as. Conficito.

Medicamẽtũ Ma-  
gne dictum.

Aliud Thelamonis, accommodatum carbun-  
culis, sinuq  
exicans. Pityng, ceræ, calcis viug,  
lithargyri, sing. drach. c. cerussæ drach. xxv. olei  
tres cyathos.

Emplastrum the-  
lamon.

Aliud Moschionis vnicè cõferens ad amouẽ-  
dum vlcera callum, sanandisq  
sedis affectus. Argenti spumæ, cerussæ, calcis viug, sing. drach. viij.  
medullæ ceruicæ, ceræ, vtriusq  
drach. xvj. olei myr-  
tei quantum sit satis.

Emplastrum  
moschion.

Epuloticum medicamentum Andromachi.  
Cadmia lib. j. chalcidis vitæ, ceræ, sing. tan-  
tundem: resinæ aridæ lib. iij. myrtæ tantundem.  
Vinum fici immiscetur.

Emplastrum  
andromachi.

Aliud eundem candidum epuloticum.  
Argenti spumæ minam j. cerussæ tantundem:  
ceræ, resinæ, sing. minas iij. olei heminas iij. aq  
hemina.

## Candidum Telephanis.

Argentæ spumæ drach. lxxx. cerussæ drach. cxx.  
myrrhæ drach. ij. obo. ij. Sagapeni drach. v. thu-  
ris drach. vj. obo. ij. olei heminas ij. s. Omnia  
simul coquito.

Candidum Te-  
lephanis.

Aliud ad herpetas, carbunculos, cõdylomata  
&

& rhagadas maxime valas: quod est phlegmonas accet. Adipis sulci drach. lxxviij. ceræ candidæ drach. xlvij. cetrussæ drach. xj. argenti spumæ tantundem. Conficito.

Ar vero nonnulla emplastra cephalica, & catagmatica nominantur, potissimum à caluaria fractura, quibus solent operari. Sunt autem talia, abstergerendi, digerendi, & siccandi potestate prædita. Plerique tamen paululum ex astringentibus phlegmatis eis admiscet: ut id quod affectus partibus inflat, repellatur, & abstergentium facultas in altum usque descendat. Ceterum nisi asstringentia conuerterentur tenuissimum pollinem, magis obstant, quàm proflint, his quæ trahendi vim obtinent. Catagmaticis optimum ab Asclepiade traditum, ad confirmanda fractura offa.

Argenti spumæ, bituminis, sing. drach. c. picis aluidæ, ceræ, sing. drach. c. terebinthinæ drach. l. aluminis scissilis, propolis, sing. drach. xxx. ammoniaci thymiamatis drach. xxiij. xeruginis drach. x. olei sextantis quatuor.

Moschionis catagmaticum ad fracturas, contusiones, atque recentia vulnera, aliudque affectus complures celebre. Argenti spumæ minam & picis tantundem: seu vitulini tantundem. Terebinthinæ drach. v. cetrussæ: mannae thuris tantundem: ceræ drach. xl. xeruginis, opoponacis, chalbani, sing. drach. viij. olei cecini, acetici, liquoris vitæ camini, sing. heminam: picis liquidæ heminæ dimidium. Conficitur ut decet. Pro minima impræditiorem intelligo vncias viginti: quarum singulæ pendunt octo denariis. Sic itaque continetur bituminis sextaginta denariis. Proprietatem dicuntur emplastra cephalica, ea quibus Medici in his capitibus fracturis, quæ ad diploen perueniunt, vruntur, ad extrahenda ex alto, superficem versus, ad offa modò, sed his multo magis humores crassos & viscidos, intrusos elutere. Quare acrimoniam quamdam forantem oportet. Itaque catagmaticis cephalica generosiora existunt: quæ quidem ista cerato, carnem possunt producere. Quotiesque farcosas quodammodo sunt similia.

Cephalicis optimam ad capitis fracturas ab Hera descriptum.

Squamæ xris drach. xxv. aluminis, aristolochiæ longæ, sing. drach. xx. ammoniaci thymiamatis, thuris, sing. drach. xxv. myrris drach. xij. seu taburini, terebinthinæ, pityris, sing. lib. iij. olei hemina: acetici quantam sit satis. Conficito.

Aliud eiusdem, arcis phlegmonæ, maximeque ad fracturas, & puncturas nervorum conducens.

Argenti spumæ drach. xxv. bituminis aridi drach. c. picis aridi drach. c. ceræ drach. l. resine piriynæ drach. xxv. ammoniaci thymiamatis xeruginis, aluminis scissilis, propolis, sing. drach. xv. olei veteris lib. iij. Conficito.

Andromachi catagmaticum.

Argenti spumæ, picis, ceræ, seu taurini, thuris, sing. minam: picis liquidæ, heminæ dimidium: liquisitæ sycamini heminæ: terebinthinæ minam: opoponacis, chalbani, xeruginis, sing. drach. viij. cecini heminam. Ammoniaci thymiamatis drach. xxv. Ex vino austero diluatur.

De emplastris glutinamentis.

Quidam hæc simplicia & sparsimque nominant:

Estque opus coram colligere, & diuisas partes conglunare, reducereque ad pristinam integritatem. Sunt autem farcosis ipsa glutinamenta siccora. Ad hæc, farconica quidam detergendi vim, sed absque erosione possident. Glutinamenta autem, tantum desiccantia esse debent. Ceterum cicatrice inducentia medicamenta, præterquam in quod asstringunt, siccora eis sunt glutinamentis. Etiam glutinamentum est visile, nullis inter coactis substantiis humiditate permittitur cicatrice verò inducenti, non modò hæc prohibere, sed consistere eis in his que cicatrice sunt receptura, consumere præterea callo obducere, & asstringere obducere. At farconica sanguine ad refectionem idoneum tam quæritate, quàm qualitate rursus. Tam quod nullus sit mordicationis participes medicamen, puri vi cas confectus, si quidem tale illud acceperit. Porro molliora humidioraque corpora, imbecillioribus medicamentis indiget: ut vehemensioribus, quæ prorsus contraria existunt.

Glutinamentum ab Andromacho scriptum, nomine Barbajum.

Picis, resine, bituminis, sing. drach. c. thuris drach. xxiij. olei heminam. Conficito.

Aliud eiusdem.

Picis lib. ij. bituminis, ceræ, sing. lib. j. Ammoniaci thymiamatis, mannae, sing. vnc. vj. cerullæ vnc. iij. olei hemina dimidiū: acetici heminas iij.

Aliud enazon Iuliani.

Argenti spumæ, bituminis, ceræ, picis brutæ, singul. drach. l. resine frictæ drach. xv. xris squamæ drach. xj. thuris drach. xij. chalbani drach. viij. chalcidis drach. iij. aloës drach. vj. gallæ drach. iij. myrris tantum de aristolochia longæ drach. vj. aristolochiæ rot. drach. iij. olei veteris heminas iij.

Nigrum enazon ab Hera descriptum.

Ceræ, picis, bituminis, piriynæ, sing. lib. j. mannae vnc. vj. cerullæ vnc. iij. chalcantis tantundem: opoponacis vnc. ij. olei seminum acetici heminas duas. Conficito ut decet. Valet ad diuisas partes mortuas dignas, maxime capitis: ad fistulas, sinus, fracturasque. Coluber mirifice sanguinem erumpentem. Canum hominumque moribus auxiliatur: ac prorsus phlegmonem accet.

## GALeni PERGAMENTI

de compositione medicamentorum secundum genera, lib. tertius.

Quandoquidam quæ putrescunt omnia, ex humiditate & calore id patiunt. Certe in vulneribus obnoxii putredine, fortissimum per siccatiam & refrigerantia molienda esse, semper metum existimus. Rursum apud me eorum plures, frigidi natus ab Hippocrate inimici diuocantur, fore medicamen nervorum vulnerum intellexi, quod & siccat, & medium esset inter ea quæ calasciunt & refrigerant: vel quod parum ad calasciendum latus ab ipso medio recederet. Posse etiam calidum abunde esse pharmacum, modò siccandi facultate polleret. Quippe calor citra humiditatem humescere non potest. Ceterum ubi non dantis neruis medemur, tunc prædicta auxiliorum integram medicationem assumi ratio est. Vbi verò punctus, ita ut partes interficere sint

Glutinamentum medicamentum visum.

Sarcocolla facialis.

Epulacorum spum.

Medicamentum visum.

Medicamentum visum.

Medicamentum visum.

Glutinamentum Andromachi, Barbajum nomine.

Glutinamentum Andromachi, Barbajum nomine.

Enazon Iuliani.

Enazon nigro ab Hera.

Enazon nigro ab Hera.

Enazon nigro ab Hera.

Enazon nigro ab Hera.

Enazon nigro ab Hera.

Enazon nigro ab Hera.

Enazon nigro ab Hera.

Enazon nigro ab Hera.

Enazon nigro ab Hera.

Enazon nigro ab Hera.

Enazon nigro ab Hera.

Enazon nigro ab Hera.

Enazon nigro ab Hera.

fana, tenuius pharmacum inveniendū est, cuius virtus interiacentes particulas permeando non dissoluatur, sed in alram penetret. Hoc autem facere poterit pliazmacum vehementer succana. Quod quidem, etiam si non sit in calore & frigore symmetrum, offendere nervum lesum nō poterit: quum facultas calfacendi aut refrigerandi (quæ illi inest) admodum imbecillior reddatur, dum particulas nervoso corpori præpositas permeat. Porro inter omnia quæ refrigerandi vim habent, tenuiorum partium acetum est quamarcerimū: quod etiā caloris modici est particeps. Inter calfacientes aut liquores, qui partium tenuitate sint prædicti, primæ tribuuntur partes Cyrenæo succo. Cæterum si eius facultas non detur, utemur Medico, vel sagapeno vocato, vel euphorbio. Panacia etiā, & nily malorū liquores, & opobalsamū, tenui di facultate fortiuntur. Ex terrestribus etiā niri (pumæ, apilonitrum, beronicū nitrū, petra asia, eiusq; flos, partium tenuitate insignitū. Ex metallicis auripigmentū, & sulfur, tū subtilia, tū calida sunt. Quibus succedit misy, græsquama, & chalcitis, parū simul attringentia. Circa calorē verō manifestū tenuia essentia metallica sunt, spodiū, pompholyx, & sporium. Subtilia abvnde est & chrysocollo. Ex succis, laurinus valenter calfacit, ac præterea tenui di vim possidet. Nilul autem minus eo cedrinus calfacit: calorē tamen qui sensibus subicitur, præter substantiæ tenuitatē, illi cedit. Eiusdē generis cum cedrino est laxivia, quam stacten vocat. Quæ quidē si ex tenuiorū partium materia vitā fiat, cedrinū oleū virtute superat. Iam ex cerealibus, subtilissimus est eruas, sine insigni calfacendi vi: lolium verō, cum insigni. Hordeum nequaquam calfacit. Medit inter ea materis obtinent, qualitant, amara: vt quæ multum tenuibus substantia cedat, & crassi nihil possideat. Igitur medicamentorū materis non semel aut bis, sed se quenter sunt explorandæ: quandoquidem sensibiliū rerū cognitiō, inspectione sedula confirmatur. Cuius rei indicium evidētissimū est, quod gemelli per ola similes esse nobis vīsi, differētes apparerant iis, q non p transennā, atq; obiter, sed accuratē inspicere eos cōsueverunt. Itaq; herbarum, fructū, arborūq; materiā, prius quā in terra eximanī, contemplari pulcherrimum est, dum fructus videlicet futuri sunt, dum gēduntur, dum augescūt, dum vigent. Ex hac nanq; speculatione assequēns, quādo exerpēdi sint, in scificio domanculis reponēdi. Etenim commode reponūtur in locis nec subterraneis, nec sub regulis cōstitutis: sed mediis, atq; ostia ad meridie cōverta habentibus: prope quæ tibi reponi medicamēta nō debēt. Amicos aut omnes adhortor, si artis opera pulchrē obire voluerint, vt me imitentur, qui ex omni natione quorannis præstantissima medicamēta vt mihi adferantur curo, eo quod perditū illi omnigenarū rerum cōemptores, illa indies adulterio cōtaminant. Cōvenit præterea medicum, nō modō affectuosis, qnam singula medicamēta inducant, qualitatem, sed etiam ipsius (vt ita dixerim) quantitatem cōiecturare. Quippe quod humore copioso est actum, non simpliciter humectari potest, sed opus est vt siccitatis قلتitas, copig humiditatis respōdeat,

Porro nervosarū partium doloribus a frigore obortis, vnicē opitulatur emplastrum ex euphorbio, oleo, & liquata cera confectū. ad computrescentes autem circa articulos partes, cōfert cataplasma ex hordei farina & stillatino lixiuio parum. Perfundendæ aut libenter partes circūiacentes sunt oleo caltæ: postea verō, vbi lana sicca, totus mador fuerit exhaustus, humido cerato, & cui euphorbiū admixtū sit, illinendū. Porro secūda die, q hordeæ farina, miscere eruanam cōsuevit: atq; vbi iam totū quod cōputruit extemptum sit, paulatim primō quidem ad carnem gignētia, dein ad obducētia cicatricē trāsire. Quādo aut mihi nervus aliquis vulneratus occurrat, interim p liquida pharmaca curationē molior, interim per emplastrā lanā extrinsecus quāmolissimā, imbutamq; oleo caltæ, applicā. Quod si medicamentum ex aceto vīrperem, aceti modicum cum oleo admixcēs, bis tērvæ quonidē soluo, & oleo calente foueo. Si noscēs longē fuerint, etiā in his solvere cōfuevit: id magis, dum vlcus a medicamentis eroditur. Oleum autē quo fovebimus, satis calēs est: verū ita, ne vulnēratam partē offēdat. Nam vt frigidū humescemodi affectibus adversissimum est, sic tepens nō omnino vitē. Nam quemadmodum aqua ipsa, quatenus calet, aut frigit, maxime contraria facere nata est, ita quosq; oleū. Frigidum frigidum corpori ad mortuū, perspiratum ipsius obstruit, & prohibet: calidū verū digerit, extenuatq;. Porro ab aquæ vīsi in tota curatione ita tēro, vt ne ardeat quidē vlcus. Prouide, quū sanguis in initio statim a vulnerata parte abstergeat, si quando ipso ad affectūs necros vitamur, in se nihil vinolium continet. Olei autem omni afflictione vacet, sitq; omni ex parte tenuissimum: quale Sabinū exiuit. Memini autē me, quum alia remedia deessent, nervorū vulnera propoli rectē curasse, inter dum etiā antiquiori fermento: quæ ambo aliquando commiscui.

Vtq; etiam euphorbiū oleo laxiūq; instāre, cataplasmati adhibens, aliis tendinem punctū sanauit: quod, euphorbio rectē adhibito, ne utiquam successisset, quum calorē magnū, moedicatio nō emq; atq; dolorē exciter. Eorum tamen euphorbiū est, quæ calorem caducum, atq; statim evanescentē fortiuntur. Cæterum aliis multis pharmacis accidit, vt pauculis annis eorum vis resoluatur: id quod, post thapsiam, nullo minus euphorbio cōtingit. Quippe thapsia bimula expirat penitus, quū euphorbiū vires ad sextū vīq; annū seruauit. Porro vbi pharmacū consistit enia simile acopis dictis vñctionibus habere volueris, oleum sit quāduplū cert. Vbi verō emplastri speciem referet, parē certē portionem oleo expedit tēperare, maxime si sicca & vīstia fuerint: tam sanē ipsi cert q tēperare, poteris sextam partem euphorbiū recentis adicere: ita vt illius sex drachmæ, cert sex, atq; itē olei sex miscantur. Licetbit etiā resine aut picis aliquid emplastrū ipsi adicere, vt glutinosius evadat: tunc tamē minus infundendum est olei. Ac resinarum quidem omniū siccissima est, quā aliphryētā, alij colophonā appellant. Huic succedit quæ ex figulinis impura sumitur: quā si purga,

Nervosarū partium doloribus  
quid molietur  
Paterfianum  
circa articulos  
partium cōferre.

Mani valentia  
in cerato.

Tepidum aliū  
calidū non nō  
congruit.

Liqua vīsi non  
arere est  
non inanimata.

Euphorbiū ad  
punctū tendi  
non facit.

Euphorbiū vīsi  
certē evanescit.

Thapsia bimula  
expirat  
penitus.

Resinarum  
siccissima  
est.

huius familiar.

Succo calfacientium differentia.

Tenuiorum partium tenuitate prædicta.

Sensibilium rerū cognitiō, inspectione sedula confirmatur.

Medicamenta reponendi ratio.

Galenus ut omni regione cura bus sibi adferri ammittat medicamenta.



ma portio, vicia. Iam verò prædictis pharmacis omnibus, iuxta ceræ portionē, addatur oleū effusivè tenuioris, minimèq; astringēs, quod quidem cerā ipsam dimidio superet: ita ut octo illius vñcia, duodecim olei misceantur. Quinetiam vbi metallica plumbi, diebus in mortario trita ex aceto fuerint, commodè illis thus candidissimū atq; pingue miscetur. Cuius quantitas mediorumniū portioni sit par: q̄ licebit tibi augere aut minuire, prout volueris efficere. medicamentum mitius, aut acutius. Ceteris etiam oleo liquare, poteris aliquā resinā ex prædictis mittere: scies acutius futurū pharmacū, si obolusina iuxtaq; mitius, terebinthinā: mediū vtriusq; abietina. Ex harum genere quorū est lauræ, ceterū prædictis humidorū, liquidæ piceæ subtilioria similis. Mixture igitur ceteris, sextam vñcia distillatū regnaturū partem, si vis ut medicamentum emplastrū formam retineat. Chalbani verò æquale illius pōdus inde, vbi mitissimum reddere statuis: dum valentius, dimidium: quando ipsorū medium, id quod inter æquale & dimidiū est. Inest porro chalbano, ut emolliēbus omnibus, etn̄ putificū q̄: quare nudatus nervus non vique adeo cōvenit. At si nudus nervus nō sit, haud medioenter misitio ipsū ad dolore leniendū confert. Omnia quippe metallica exasperat, doloremq; excitant: ut ex humidis etiā, acetum. Quare dolori ab his excitato, plurimum auxiliat foras ex oleo & chalbano mīdia administrare. Nilul autē minus chalbano dolore lenit adeps tenuitatis subtilit̄ præditus: qualis a feris, & agrestibus animalibus sumitur. Nam animalium quæ cōcūla in vrbibus degunt, adeps est & humidior, & crassior. Ex his igitur quæ leniant dolore, habere aliquod medicamen expedit, quod ex metallis composito possis interdum miscere.

De medicamentis ex euphorbio cōfectis. Verus euphorbiū recētori lōgē est inferius. Si igit anniculus sit, etn̄ Cyrenpo succo, quē nūciabemus, & cuius irrigatione stirpes angūt, & succulentas reddūt, magis exalfaciū. Porro colore quidē vetus recētis laudius. passū dūq; apparerit: subtilit̄, durius & siccus. Conscit autē ex recēt euphorbio calfaciā medicamentū in hunc modū. Euphorbiū vñ. j. ceræ vñ. ij. olei vñ. xij. q̄ inegmate intrepidē vri ad pūcturas poteris, dū vere ris ne oscula ipsa cōnieat. Quod si imbecillus fuerit euphorbiū ipsū, augenda eius mensura est, pro imbecillitatis ratione. Ceterim cōfectura ceram euphorbiū triplicatam continens, aliarum est valentissima, quum illud recens miscet: quincuplam autem recipiens, in validissima. At quadruplū capiēs, in medio inter vtriusq; gradu cōstitit. Quod si vnguentū proponas facere, qualia heren nuncupantur, oleum ceræ quadruplū immiscebis: si verò, ut in fracturis, liquidum ceratū parare, duplū. At emplastrum medicamen cupis conficere, oleum pari mensura ceræ immisceatur, si quidem ambiēs fuerit calor temperatus, Sin autem ille frigidus sit, cerā autem verus & arida, paulo ampliori misceri debet. Vt autē tenacius hæreat, terebinthinā, aut colophoniam, soleo emplastro aducere. Pix etiā, ceratū consistentiam tuetur. Multo autem præstantia medicamentum, si resina, picisq; loco, propolium ceræ

parē adiunxeris. Quæ si pinguitudine careat, cupimūq; ut adhæreat pharmacū, terebinthinam, vel laricem, vel syncomilem pineæ, vel resinas sua sponte fluentes, miscebis.

Medicamen cōfectum ex liquabilibus.

Ex aceto citra ignē liquefcit ammoniacū rhymaiā, sagapenū, & opopanax. Igni verò solvuntur, propolis, cera, resina, & consimilia, quæ in duplici vase liquare est melius: nempe quā si acabo aquam calidam continente, incumbensq; prunis, alterū vas consistit, præter liquabilia etiam chalbaniū continna. Valentiūm igit ad vulneratos nervos medicamentum sit huiusmodi. Opopanax ex aceto dissolutum diutius cōtento. Postea liquefacta illi super ignē, propolium, chalbaniū, & resinā terebinthinā misceto. Singulorū itaq; aliorum pars vñ. a esto, pro poleos recētis pinguis, sex. Quia si, careas, eius loco, picē pingv̄ inde, qualis est bñria. Quod si hoc non adit, vñ. i. terebinthinā. Ego nōn unquam vel solum medicamentum ex pinguī pice cōfectū impositū, quo etiam ad canum morsus vñmur, id autem recipit, picis lib. j. opopanax xñ. vñ. aceti, in quo illa coquuntur, sextarium Romanū. Etenū puncturæ eras cōnuerre non sinit, sic tñ composito, in duris tantū vñmur corporibus. Nā in mollioribus, ex aliquo molliori, sed digerēte, vnguento vel oleo liquidum est. Quod si loco opopanax, sagapeno prius in pipila trito ex aceto, liquefcit resina, propolium, & adipē quandam acporē adicias, & etn̄c generis medicamū habebis. Mollius autē qd ex resina, propolis, cerā, ac cera cōliquat, absq; aceto, conficitur. Ceterim, qd indetur leuius, sit a cerā: quæ est qd ab agrestibus animalib. sumit, quæ quæ vetustū exuit. Porro ex medullis, certina, vitulināq; antecellunt.

De pharmaco ex columbæ stercore cōfecto.

Columbarū turricolarū sterces acce est: quo interprimurium visus in adolefcēte, nervi vulnere affecto. Cuius sanē tū cōpōsitio, tum visus, idē est, qd medicamini ex euphorbio inest: alio quidem eodem modo se habentibus, sed euphorbiū loco, stercore indito.

De medicamentis ex herbis cōfectis.

Ex herbis enim tenuiū partium, amaritudinem absq; astrictione, aut acorē modicum, referentibus gustu, haud inidoneum ad vulneratos nervos cōfici medicamen potest. Tales enim sunt distamnū, amaracum, aristolochia, polium, atgemone, chamæpitys, sentaurium, atq; id genus alia: quæ admodū etiam radices omnium aristolochiarū, draciculæ, cucumeris agrestis, bryonij, altheæ, iridis, acori, mei, asari, phu, gennang, & panacis: q̄ omnes, perinde ut collitrya arida, leuigari in tenuissimum pollinem debent. Nam quod crassa est subtilit̄ia, nervis vulneratis conducit nihil. Lenigatum autem medicamen, alio qd ceratū modū habeat, est expiendū: idq; ex cōperatura, quæ in euphorbio prius indicata est.

De sumptuosioris pharmacorū cōpositionibus, vulneratis nervis congruentibus.

Itē autem qui odorantis & preciosos oblectant medicamentis, in hunc modum illa soleo conficere. Cinnamomi, cassiamini, mari, singulorum drach.

R. Resinam distillatam.

Emolliens omnia visco putrescit quæ. Chalbani pūctū nervi cōducit. Metallica omnia dolorem excitant. Adipē tenuium partium, leuiter dolorem.

Euphorbiū vñ. i. ceræ vñ. ij. olei vñ. xij. q̄ inegmate intrepidē vri ad pūcturas poteris, dū vere ris ne oscula ipsa cōnieat.

Medicamen ex euphorbio ad nervorum pūcturas cōducit.

Medicamentum variis parit̄ia resina.

Liquandū cammē in duplici vase.

Medicamen ex pice, oleo ad canum mordens.

Medicamen ex pice, oleo ad canum mordens.

Medicamen ex columbæ stercore.

Medicamen ex herbis cōfectis.

Medicamentum variis parit̄ia resina.

drach. xl. amari pifallium. Hinc redacta in tenuissimū pollinem, cum cerā ex opobalsamo optimo, & cera Tyrrhenica factis, unguendo. Debent autem ceræ partes octiduo, opobalsamū decē, in id ceratū coire. Adicio etiam partem vñ tere binthine odoratæ, ut medicamentū non sit sensibile, sed sibi innotat odore. Sed ex eodē ceratū, & si quædam Cyreniaco, similiter aliud medicamentū cōpono, distilla p. portione euphorbia factis; tēnissimū aliud ex vñq; temperansa cōmixtis; quorum demde, quod in semper hēstācē recipiunt. In quibus autem tēnissimū est nudus; ibi tēnissimū ex res q̄ vocatur myrrice, & vnguentū apud Romanos solianū & spicatus dicitur, cōpono, duo decimam partem pompholygis erā dīmisceat. Aliet autem ex Tyrrhenica cerā cōquiesceat; spicam nihil ep̄i prolabet ex vñq; optima liquefacere, idq; in duplici vase, quod in duabus vnguentis sit cōmune precepit. Et rasi ceratū, spicæ nardi, amomū, folij malabathri, & elixir pompholygis, pares singulorū portiones miscebis. Etenim in punctura, aciora pharmanā ex vñ sunt, quæ vulnus apertū cōsequunt. Denuclaria quent, medicorū astrictione, cum degerendi vitæ abiq; moris, prædita offere cōveniant. At amomū, astrictionis cuiusdam est p̄cepto. Magis autem ipso nardi spica, & malabathri solia. Quæ alij scripserint ad sananda neruorum vulnera.

Quidā nostræ ætatis Medicus vrebatur medicamentū, similibet meis cōfecto, ex metallis. Recipebat enī ceræ vñc. vj. olei vñc. ix. misyos drach. vj. chalcidis drach. i. squamæ æris vñ. ij. s. thuria vñ. i. s. chalbanī vñc. i. Cera & chalbanī liquata, metallis aceto intritis superfunditur. Porro si neruorum vulnera non comitetur phlegmone, molliora humidiorq; statim a principio sunt potiora medicamentis durioribus, ac siccoribus præstita; liquata ipsa in digerente quopis, vel mitigatorio medicamine admittunt. Voco digerētia quidem, vetus oleū, & nicinum, & ficynum; mitigatoria autē, rosaceum, chamæmelinū, & quod ex althea conficit. His fortiora, eōq; durioribus corporibus magis idonea sunt, quod ex cucumernis agrestis radice oleo decocta exprimit; & quod ex iride, bryonia, & aro parat. His valentius est, ex dracunculo, tritolochia, & pauca factū. Nos frequenter vñ oleo sumus ex abietis semine, populiq; flore cōmixto.

Claudio Philoxeni Argypia, neruorum vitia, aliq; congruens affectibus. Argentū spumæ, ceræ, sing. drach. lx. amonia tithymamatis drach. lxx. propolis drach. xl. resina sicca, terebinthina, liquamæ æris, thuria, sing. drach. xvij. lane succidæ exvite, liquamæ stomomatis, sing. drach. viij. opopaoxis drach. iij. incens hemina tres. Coactio artificiosā. Fuscum Andromachi, contra puncturas. Ammoniac, ceræ, terebinthinæ, æris combustī, sing. drach. viij. picis aridæ drach. xl. lithargyri drach. iij. aloës Indicæ, anilolochiæ, chalbanī, sing. drach. ij. ruginæ drach. i. thuris drach. i. olei hyeme quantū hemina partem, ætate octauam: aceti tres cyathos, quibus ammoniacum dissoluatur. Con-

fitio.

# GALIENI PERGAMENTI de cōmpositione medicamentorū secundū genera, lib. III.

Quidā quidē ex dysepuloticiis, quodā, si uici humoresq; vlcera paribus insistentiā vñlo, aggre cicatrice admetunt; quodā ipsa alicūta sedā influentē succum, quamlibet probum cōsumpserint, secunda ratione vlcera dysepulotica q̄, acōtēdē propriē nominant: in quibus interim totā partē alicūtam excindunt, vel ad vitare nōnulli coguntur, aut medicamentis crustis indolentibus, aut igne vitentur. Quam autem a mpla vñq;que lātando sit, ito quod alterum aliei magis dysepuloticum malignūq; est, tot sanē desiderant. auxiliata phlegmone quos hucrit ipsorum vlcera differt. Quis ē duo venenimū, quē idem pollicentur, aut q̄, itaq; facillatim ostendat, desiderant tamē maximi sumimq; ratione, in promptu adesse illi cōvenit, quā omnia id genus vlcera cōstituerit curare. Ceterū vbi nullus vitiois succus vlcera partes infestat, tale requirit pharmanā, quod in suo dū quidem humore repellat, in fixū aut partē, dissiciat. Atq; hæc sanē vires contrarij p̄tē antē, siquidem malū reprimūt astringentia, siquidē degert, quæ trahit potestate sunt prædita. Porro quæ altingit, maiori ex parte ex asperis, atq; hac occasione molesta sunt. Trahētia verō ac digerētia ex alto humores, non citra acrimoniā id faciūt. Ac acrimoniā dolor aliquis necessariō sequitur, mordens vlcera tam particula: unde insuētēs humores irritat cōngit, ac proinde in vlcere phlegmone excitat. Ex quib; liquet, medicamentū dysepuloticiū malignūq; que vlcetib; cōgrua, esse q̄ difficillima inventū. Inveniēda tamē aliqua eorum materia est, quæ vlcus citra dolorem siccat: quod accurate si in nulla ratione licet, ignoratē medico, quem effectum ad morum medicamentū ostendit. Quippe ex erodent estimul & astringente, validū conficitur pharmanā. Ceterū si mor des humores vlcet in cumbens, pharmanā rosione exoluit. Itaq; perpenditū est, quantū primus vñs humilitatis ac sordis in vlcere deficiat; atq; ita secundū, tertiumq; vñ illo debemus, donec siccum & purū vlcus ipsum apparat. Vbi verō id tale conspexerit, ad aliud medicamentū tē cōferet, cuiusdem quidem speciei, sed priore imbecillius. Scire autem oportet, medicamenta ipsa nō aliaratione medi vlcetibus, quā in ex vlcetata particula etiam siccitatem inducant, quam formetur quē se haberet secundum naturam: id quod factū intelligimus, vbi neq; tenuis amplius sanies insuit, nec pus p̄ducitur. Revocanda igitur ad memoriā sunt ea que citra mor sum excēdit, cuiusmodi cōplura metallis cōsistunt. Meminisse etiam oportet, combusta, & lora, acrimoniā, quā prius habuē, amittere: ac proinde ipsi vitendum esse, in his qui molli carne sunt præditi, admodū quā ad sententiā prompti, nec non cocochymi. Nam in aliis corporib; illa etiam viūpari licet. Siccat igitur modicē. Lemnia sphragis, cadmiūq; præferunt quæ sponte nascitur: quæ ubi æthio sole pluribus diebus ex aceto, aut vino giluo pellucidūq; interet, excēdit.

CC an

Vlcus ita  
desiderant  
pharmanā,  
quæ ipsorum  
partē differt.

Vlcus arum  
partem, quā  
non infestat  
vñs, facit  
ratio.

Dysepulotici  
cōgruentia  
medicamenta,  
vñs  
difficillima  
invenit.

Vlcus quæ  
ratione medi  
camentis  
mordetur.

Vlcus ita  
desiderant  
acrimoniā  
quā prius  
habuē  
amittere, & ubi  
id ipsi vitendum  
esset in medicari  
bus & cocochymi  
morsu corporibus.

Differētia quæ  
Misyetere.

Argypia Claudio  
Philoxeni.

Andromachi

Andromachi



Chalcitis res  
fuit exotat.

rigorem reddo. Chalcitis cōbusta, quāq̃ eadēma,  
valentius siccatur. Per se autē, nec cōbusta, si ad-  
ministraretur, crustas excitat. Lotam igitur ipsam,  
deinde siccatā habere est scriptum. Minus enim lo-  
ta quāq̃ cōbusta delicat, tum siccior, minusq̃ est,  
minusq̃ mordax. Per similitudinem medicamentū  
est etiam arugo cōbusta. Nam quæ igitur nō  
est experta, formisimū medicamentum est, sicut  
chalcitis. Verū hæc nōn habetis astringit, & ea

Chalcitum.

multo magis chalcitium, quod inter metallicā  
maximè siccatur. Misq̃ autē & fori chalcitidis sunt co-  
quata: tenuius tamē misq̃ apparet, minulq̃ mor-  
dax & vrens: crassius fori, & vtrūq̃ siccatur imbe-  
cilius: quæ modō & summs maiorem astrin-  
genti, siccandiq̃ vim, ac fori, possidet. Porro di-  
phryges viceris, ægrè humoris vitio ad cicel-  
icem veniēbus, apusimū medicamē existit: vā-  
lidè magis siccatur, etsi sit mordax modicè. Ad hęc  
præter acrem quālitatem, tum potentia, vim  
astringentē possidet. Iam omnes differētiæ alu-

Alumne sile-

cer nō sit ad vi-  
cra rēndam.

minis, vlcera sanis exaciat, generosē astringētes:  
quare nemo solius ad vlcera vtratur. Igitur quæ  
plethorā, visioisq̃ succo laborat corpora, quæq̃  
tenetia carne prædita, & ad sentiendum ma-  
ximè præpta sunt, facili ex morbo, rationeq̃ phlegmo-  
nem cōtinent: quare minorā medicamēta de-  
siderant: cuiusmodi sunt, jarcocolla, ichthyol-

Siccatia rēna-

rocinem qua-  
siat, chryso colla, plumbū vīsum, fori, stimuli: si-  
militer etiam cōbusta. Insuper plumbi scoria,  
probit siccatur: quæ modūm ferri squama, quæ  
etiā abstergit, purgatq̃: unde pura vlcera reddit,  
quod reliquæ squamæ non possunt. Quare si hæc  
omnia medicamēta arida vlcerebus, malignis con-  
tumacibusq̃ insperferis, minime videbis citra ro-  
tionem ea deficere: si cuncti vbi buccinorū testas  
cōtematras, purpurarum, ostræorum, aliorūq̃  
id genus similes adhibueris. Lapis etiam dia-  
phanes, siue specularis dictus, leniter ac sine  
morsu exccat. Eiusdem facultatis est vitæ vīsum.

Siccatia simul

ac astringens  
sunt.

Quinetiam Aegypti spinæ fructus, galla immu-  
tura, rlicon, malicorium, siccanda & astringēdi  
facultatem sortiuntur. Aristolochia etiam, tria,  
acorū, artemisia, panacis radix, argemone, cha-  
meleontis uigri radix, cyperus, dracunculus, &  
gladiolus, assatim siccant. His evidentius adhuc  
centauriū & polium: quibus paulo imbecillior  
est terra eternas dicta: vni valenior, vno cata am-  
pelatis. Porro arugo ignem non experta, calx vi-  
ua & illora, & molle aphronitrum (quod reuera  
aphronitrum est) sola per se non admouentur vl-  
ceribus. Nihil autem nobis in prædictis vlcerebus

Vlcerebus cito-

mouibus ad vi-  
cra si oleo,  
tam acra.

tam evitandum est, q̃ tum oleo & molliā medi-  
camentis, cuiusmodi sunt omnes adipēs, & quæ  
scurthos emolliūt: tum acia, vt piper, zingiber,  
sinapi, & alia id genus.  
Medicamentis prædictis quomodo  
sunt vīdendum.

Vlcera quomo-

do sunt tractan-  
da.

Vbi igitur siccum aliquod pharmacum vlcere  
imponere est animus, sordes prius sunt exprimē-  
diæ, mollis, puro, atq̃ sicco linetolo. Medicamē-  
to iam in dicto, platysma ex emplastro labris stre-  
nuandis cōmodo, extrinsecus superdandum est.  
Huc rursus linamentū vndiq̃ æquale foris inin-  
ciendum: cui spongia ex aqua aut vino nictum  
applicabimus: quæ vt frigida maneat perpetuū,  
per aliudum frigidæ fortis curabimus. Porro

deligatur ipsa in vlcere inchoanda est, a quæ il-  
line ducenda versus partes superanas: quæ tertio  
quodq̃ die, nō singulis, solvere expedit. Tunc au-  
tem si ambiente vlcus partes aliquas phlegmo-  
nem referant, moro & phlegmone emplastro liquato  
ex oleo, cui plurimum venis siringentis permi-  
stum sit, exterius pharyngimatis partes quālatē am-  
buere expedit. Verum non ex obvio quovis o-  
leo phlegmone liquare oportet. Sed si rubor qui  
dem, atq̃ omnino caliditas dominet in adiacen-

10

tibus vlcere partibus, ex aliquo astringenti atq̃  
refrigeranti id solucis: cuiusmodi sunt myrrica,  
melinum, & omphacina. Sin durities aliqua cō-  
spiciatur, oleo veteri, vel ricinino liquidum est.  
Tunc autē sunt, vel si nihil in ambiente vlcere  
loco vlcis apparet, superpositæ regioni ipsū  
medicamentū apponere, vt repellat si qd prius vel  
praerum, vel plus q̃ par est affluat: maxime quod  
apertur vlcus obortū, superpositum habet vari-

20

cem. Quæ dum sanguine melancholico turget,  
excidentia venit: quæ iuxta excisionē ipsius, vlcus  
malignū & cōsumax interdū oriri solet. Igitur  
in id genus vitus præstat, vitibus egri consulas,  
a seclione vensū suspicari: dein pharmaco purga-  
re melancholicum succum, similisq̃ etiam pinu-  
torum vacuare: quoniam in quoq̃ interdū vna cū  
melancholico insit, dom vlcere gignunt. Pos-  
tea veni vlcere suprapositum in longum scari  
care cōmodum est. Vbi abunde vacuatis, ei ipsi  
venæ scilicet prius medendum. Postrq̃ exactè iam

30

dicatricē videtur recipere, tunc aggredere mali-  
gnū vlcere carationem. Iam vero si lien nonnullū  
malē affectus, vltioisq̃ humoris est autor: si-  
cuti & iecur: quibus vbi in primis cōsultū fueris,  
sic sandē accedere ad curandum vlcus oportet.  
Pari modo si vniuersū corpus plethoricū, caco-  
chymūq̃ve existat, id prius vacuare, expurgare  
que expedire, q̃ vlcere medicamentū admoueat.  
Cui quidē dum medera, a valentioribus abster-  
toris plasmatis ad mioria, lenioraq̃ digrede-  
re, si vlcus admodum esse purū videat: quæ modū  
in sordidū ad magis abstergentia transi-  
re cōvenit, nisi ex rosione medicamēti sint facta  
sordida. Sepe siquidē ab acri medicamento colli-  
quata & soluta caro, in vltioisq̃ famiē degen-  
erat. Ceterūm cauitas vlcis maior, orisq̃ ruben-  
tiores, & calidiores effectus cernuntur, quum ob  
medicamentū acrimonia ipsæ sordes accrescunt.

40

Compositio emplastrorum.

Quidquidē malignorū & difficulter ad-  
mittentium curationē vlcerebus, summs scopus  
est, vt medicamentū citra morsum exiccat, aqua  
verō & oleum maxime omnium humectant, ab  
eis abstinere oportet. At cetera deligēda est recens  
& pinguis: qua in sole emollita, at apud ignem  
subacta, & in calidā aquam immersa, arida me-  
dicamenta prædicta excipimus. Mediocre autē  
medicamentum fiet, si quarta pars metallicorū  
ipsi ceteris addiciatur: valentius autem si tertia. Ere-  
nim quāsi haud exiguo discrimine in vlcere corpo-  
ra differūt, vnum omnibus medicamentum rectè  
preparari non potest. Erit ergo temperatū phar-  
maci cōpositio huiusmodi. Vtriusq̃ aruginis, tri-  
tis cōbustis, sing. drach. j. aluminis trici drach.  
1. ceræ drach. x. Conficito. Minus autem morde-  
bit, si loco aluminis integrū diphyrgis drachmā  
adicias,

Deligatur vlc-  
ere quāto sit  
adhibenda, ex  
quādo iunio  
da.

Repellentia esse  
applicanda re-  
gioni superpositæ  
si vlcis.

Vlcus quidē  
excidentia fit.

Vlcus ad va-  
rius insidit, ca-  
rat.

Sordes ab om-  
nibus medicamentis ex-  
citata, quomodo  
deligenda est, ut  
quæ vlcere  
temperatū producat.

Vlcerebus cito-  
mouibus, ut  
oleum ex aqua  
ad resorbat.

Vlcerebus cito-  
mouibus phar-  
maci temperatū  
compositum  
fiet.

adicias. Quod si expurgare sordes cōsiliū sit, sic cōficiemus. Aeris, & ruginis vitæ, diphrygis, sing. drach. j. xris squamæ drach. s. ceræ pinguis drach. x. Mucro. Cæterum si cera ipsa sit siccor, emollitā est aliquo attingente oleo, vel lalice, vel terebinthina.

Ad churonia & difficilia vlcera medicamē ab Alcibiade proditum.

Aeris squamæ vnc. j. & ruginis rase tantundē ceræ sēlibramē sine lalice vnc. s. Quæ liquari possunt, aridis affunduntur quibus exceptis, ac curiose emollitis, vitior. Cæterū platysma exiguū soli affectu parti, vt vlcus tantum cōprehendat, imponitur. Ambietes autem particulas pharmaco quod philogemonē arceat, circūdare oportet. Inter curandum tertio quoque die solute, dein formentis mitigare, ipsamq; emplastrum quod platysma vocatur alitudine, ablucendo emollire, ac rursus imponere, donec cicatricem inducere incipiat. Ego certe Attico nonnullū clypeo cerā tē peravi. Meminisse autē oportet, qualitates omnium vicinorum corporum, mutuo in se agere, etiam si alterū ipsorum multo validius sit. Vnde pro celsu temporis quodāmodo evadūt similes. At vbi qualitas medicamētī curādo corpori speciemilia fuerit, maior vtilitas sequitur. Porro diphryges, si vel solum inasperantur vlcibus quæ difficulte cicatricem admittunt, pbe illis medetur: item & xæ cōbustum. Arrugo autem exedit atq; mox rē insignitū. Itidē calignē nō experta, quā insignitū mordet, exigua portione alia medicamētis a nō nullis miscet. Exincta medicocriti expers.

Pharmacū ad mitiora vlcera cicatrice inducenda, ab Andromacho scriptum.

Cadmig totū lib. j. chalcidici vīt tantundē cerē lib. iij. resina aride lib. iij. myrtē lib. iij. Vinum miscetur aridis. Quam autē ad maligniora vlcera valētoribus vtendū remediū sit, vt imbecilliorib. ad mediocria: aliud medicamentū subdam, quo vtor ad dysepulotica. Arruginis, & squamæ, sing. vnc. j. ceræ vnc. viij. miscerantur. Si igitur causū sit vlcus, indito medicamēto repletur. Post hoc rursus aliud platysma super accomodabitur, quod & labra cōprehendat. Huic deinde linteus frigida madēs tantus vndiq; obilici, vt medicamentū occultet. Postremo sponsia mollis, fascia ex linteo excepta, vel semel, vel bis, affectā partē orbiculatim ambiētē, tantē magnitudinis, quō totū vlcus cum labris, ac superpositorū ipsis aliquid, subiectorūq; cōplectat.

Deligato autē ipsa a duobus initiis fiat. Vocant sic quoties tota pars media vnculi affecto loco incumbit: vtrunque autem cūcū in oppositam regionē deducitur. Vbi hæc primo die peregeris, altero aequam frigidā per spongiā irrigato. Si ambiēs aer calidus & siccus fuerit, bis hoc tēre in dies singulos est faciendum, ac deligatur tertio quoque die soluta: per hyemē, quarto. Affectus autem linteū indicabit, num fortius, vel mollius, vel simile sit imponendum pharmacū. Emollies ipsum paululo myrtini, aut rosacei, aut melini, aut lentiscini, aut mastichini, aut cyprini instillato. Validius reddes, aliqd squamæ, aut arruginis addens.

Aliud ad obducenda dysepulotica aptissimum.

Chrysocolle, squamæ, sing. drach. ij. ceræ drach. vj. diphrygis drach. ij. bithagry drach. viij. Cōfundato. Advertendū autem est, initia pharmaca mihi dici sacro collam, chalcidionem vitam, xæ, & ruginēq; combustam; atq; chalcidionem non quæ ignem uō experta, acria omnia sunt: combusta, moderata: lota post combustionem, lenia, rosio nūq; experta.

Aliud mitissimum.

Eloti plumbi drach. ij. spodii, cadmig, diphrygis, sing. drach. iij. terebinthina qua excipiuntur drach. vj. Zeno addit chalbanī drach. s. Etenim satius est modica portione miseri pharmaca id gēnus, quā uimur confestim sibi faciem duritiē cōtrahant. Porro in hisce omnibus, illa q; liquari possunt, liquefacta & refrigerata, a brasig, siccie diligenter redactis in polinū, admiscetur. Nam si liquida ipsis affundas, in grumos concrefēt, maxime vbi inuulerit frigus. In sole autē feruenti si mixtura fiat, licet ea superfundere, mouendo rudicula primū, dein co chleario: præstat tamē ad omnia hæc, ramusculus palmæ.

Aliud ad desperata vlcera ex collecta neis Primionis.

Soreos drac. xxiiij. aluminis scissilis, mallcorij, calcis viue, sing. drac. xvj. thuris drach. xxxij. gallæ omphacitidis tantundem: cerę drach. cxx. seui vitulinū (aut etias loco, adipis porcini & vutū) drach. lx. olei veteris heminā. Cōfucito. Porro fori, alumen, malicorij, galla, nō digerendi facultate, sed attingendi eximia, sunt prædita. Etenim sub attingenti genere cōtinent austerā & acerbā: sed illa quidē attingūt mediocriter, hæc aut, hoc est, acerbā, vchemētē. Oia igitur attingentia cōtrahunt, ac dēstant matus, vni cūq; cōtinent partū sibi cōherentē substantiā: quo fit vt altius ipsorū virtus penetrare nō possit, nisi ab aliis acribus, atq; subtiliū partū ducantur: id qd ipsis calx in præscripto medicamēto præstat. At vero indurantiū vltis labris multo vtilis medulla ceruina adhibet: quæ si non addit, vitulina. Porro iu veteratū oleū ad adipē suillo (quē oleo cōmuni liquatum infiores pro oleo vna dunt) ex odore & cōsistentia discernes. Vtrūq; tamen in veteratū, rosionē quandā acquirit: quo nomine ad vlcera præter modū maligna cōtinentur. Talia em̄ appello, in quibus aut pars affecta tam vitiofo habitu est prædita, vt vel optimū sanguinē, qui nutritionis gratia cōfluit, corrūpat: aut id quod influit, ad eodē peruersum existit, vt etiam si pars rectē se habeat, ab ipso tē solo erodatur. Igitur vt citra rationalem methodū medicamentis cōponere, ita vim illorū certō & accuratē cognoscere sine experientia nemo potest.

Epulotici autē scilicet Critone cōscriptum, quod prætumidis, durisq; & causi vlcibus cōuenit. Picis aride drach. c. & ruginis rase drach. xxiij. gris combusti drachmas xv. squamę rubrę drach. xxiij. ladat vnc. ix. argentī spumę lib. iij. olei sextarium j. s. Etenim arida pix videt̄ erodit. Calfacti autem modicē: ob idq; pus mouentibus medicamentis miscetur. At quum aliqd calidum, frigidum, humidum, aut siccum dicimus, cū optimo corporis temperamēto id cō-

Vlcibus difficilibus, phar-mach Alcibiade.

Quæta 01

Vlcibus corporum qualitate in se agere mutuo.

Arruginis facillitas. Cetera vna.

Vlcera maligniora, valentioribus vti oportet: imbecillioribus autem, mitiora.

Deligatio vni ceræ pariter in quibus molliora sit.

Mixta mitiora quæ sunt.

Astringenti igitur genus cōtinent austerā & acerbā. Astringentium facultas.

Vlcera maligniora, quæ sunt natura quæ sunt.

Epulotici Critonis ex ledæ.

Picis arida facillitas.

Vlcus cauti & ferimus. Igitur cautum & purum vlcus, à medio-  
criter siccantibus in medicamentis curatur: sordi-  
dum verò & malignum, & oris duris & pertrumi-  
dis quidē, sed carne iuxta cutem fluida, validissi-  
mē siccata requirit. Verum quāq; metallica, vt sic-  
cent sine vilo mortuū, praparas, coquere diutius  
oportet. Sic liquidē magis siccant, ac minus ero-  
dunt. Porro ladanū ipsū solū ex vino triti, vl-  
ceribus agrē ad cicatricē venientibus auxiliat.

Metallica dicitur  
tunc colla pinguis  
siccata, et mē-  
tus rudius.

Medicamentum Cri-  
stini ex chama-  
leonte.  
Lentissimum oleo  
facilius.

Medicamentū ex chameleonte à Crisno de deseri-  
ptum, inducēs cicatricem periculosū & callosū  
vlecribus. Lithargyri drach. c. cere drach. xxiij.  
argenis drach. xxiij. chameleontis drach. xij. olei  
minimam. Cōficio. Ego tamen huiuscemodi em-  
plastris ad dicere lenissimum conficiēti, q; emol-  
liat nō nihil, digerat, & astrugaturque omnia, dis-  
sicalia vlcera cum labris induratis, desiderant.

Aliud Heraclidis Tarentini ad versus  
vlcera vetera.

Squamæ drach. j. argenis rase drach. iij. ex-  
cipiantur drachm. octo myrtei cerati. Māce. E-  
tē metallicū facultas à q̄vis cerato resoluū.

Aliud. Squamæ trite acetum affundito, tamq̄  
sub Canicula exortu laugaro vsq; ad crassitu-  
dine mellis: vel etiā incoquito. Postea exiccate,  
redactaq; in puluerem, cerati partes octo misce-  
to. Vallet ad versus recentia vulnera, & vlcera in-  
veterata. Lacebit etiam ad ignem exicare ipsā  
squāam, si alio tempore medicamen id confici-  
amus. Porro subnitiōra sunt quæ ex aceto lapi-  
gantur: atq; ob id melius purgant, attenuant, &  
siccāt. Verum ad cicatricem inducendam sunt ex  
vino trita meliora.

Aliud Andromachi cicatricem ducens.

Osmum vltorum drach. ij. māne drach. j. cad-  
mæ obolos iij. tritis vtror.

Aliud eiusdem, quo malignis cica-  
trix inducitur.

Piceæ corticis drac. vj. cornu ceruini vtri drac.  
iij. cadmiæ drach. xviij. manne drach. iij. xerugi-  
nis rase drach. x. sicci vtror.

Aliud ad excrescentia vlcera cicatricem  
absq; mortu ducens.

Sandarachæ, chryso collæ, arsenici, singulorū  
paribus æquis confusus, aridifq; vtror.

Ad vlcera quibus callus obducit non po-  
test. Ex Archigene.

Cōmuni quodam oleo expurgatis, vetustissi-  
mum cū linamētis imponit. Aerugo rase cerato  
rosaceo, qd paulū resine habeat, excepta, impo-  
nitur. Item squamæ æris rubri quamplurimū ce-  
rato myrteo exceptum vsurpatur.

Eiusdem ad putrida & nomas.

Sori crassiusculē tritum, in persūm q; condu-  
cit. Vel aristolochi rotundam, & gallam, equali  
pondere ex oleo in vngito. Vel cucumeris agre-  
stis radicē cum solis iligatā, calido cinere recō-  
dit: quā aut emolliet, contritam imponito.

Eiusdem ad cancrofa.

Cancrī fluuiantis vtri, & cadmiæ, pares portio  
nes tritas in persūo. Vel cinerem cancrorū cum  
cerato imponito.

Eiusdem ad callosa.

Nitrū torrefactum & calcem viam cum lo-  
tio pueri impubis liguata circumlinito. Confe-  
ciunt etiam caustica medicamenta.

Andræ emplastrū ab Asclepiade scriptū, om-  
nem excrescentiam reprimens, atq; arcens in illi-  
mationem. Argenti spumæ lib. iij. squamæ æris,  
chalcididæ, argenis rase, sing. vnc. vj. acetū hēmi-  
nam: olei veteris lib. viij. Māce.

Asteris medicamen ad idem.

Lithargyri lib. j. olei veteris lib. ij. æruginis,  
chalcididæ, squamæ rubræ, sing. vnc. j. acetū hēmi-  
nam. Cōficio.

Isis emplastrum rufum, ad fluida, diu-  
turna & maligna vlcera.

Argenti spumæ drach. c. minij. sinoplei drach.  
viij. diphyrgis, ceræ, chalcididæ combustæ, sing.  
vnc. j. chalcididæ crudæ drach. ij. olei hēminas ij.  
Cōficio vt decet.

Aliud Scribonij Largi, ad eadē accōmodatū.

Ceræ drach. c. lithargyri drach. c. olei myrtei  
hēminam j. nufyos cōbusti, chalcididæ vtræ, alu-  
minis scissis vtri, cerussæ, resing terebinthine, sing.  
drach. xij. Cōficio.

Aliud ex chameleonte, ab Asclepiade scriptū  
ad fluentia & agrē curabilia vlcera. Lithargyri  
lib. j. olei veteris lib. ij. chameleontis radicis trien-  
tem: aristolochij tantundē: chalcididæ vnc. ij. gal-  
læ vnc. j. thuris tantundem. Cōficio.

Aliud ab Asclepiade scriptum ad vlcera quæ  
vix curatio nem recipiunt.

Squamæ grise, argenis rase, sing. vnc. j. ceræ fell  
bram, resine laricis vnc. s. Cōficio.

Dedebūt cephalicum ab Asclepiade scriptū, à  
quo educant ossa corrupta. Aeris squamæ, man-  
næ thuris, resine sicce, sing. drach. c. acetū hēmi-  
nas xij. Tenu squamæ ære aceto, & quū leuis fa-  
cta fuerit, thus in pollinē redactum aducito, res-  
sinæ: atq; paffulos fingito: quorū assiccatōrū  
in vmbra mīscens partē vniū eū cerati ex rosaceo  
cōficti pari portione, ipsa vtror.

Aliud Hygie-  
ni scriptum ab Hera, vtilē vlcerebus agrē ad cica-  
tricem venientibus, necnon paro nyctius. Lithar-  
gyri chrysididæ, ceræ, sing. minimam j. chameleontis  
nigri radicis drach. xxxvj. argenis rase drach.  
xviij. chryso collæ drach. xl. olei hēminas ij. Cōfi-  
cio vt decet. Aliud egregium. Ceræ, picis, bitu-  
minis, sing. lib. j. manne, argenis, gallæ, spinæ  
Ægyptiæ, uridis Illyricæ, aristolochiæ rotundæ,  
chalcantidū, singulorū vnc. iij. aristolochiæ lōgæ,  
grise cōbusti, vtriusq; vñ. j. Cōficio. Aliud. Bitu-  
minis, aluminis liquidi, sing. lib. j. picis, resine  
pityiæ, ceræ, sing. lib. ij. mali terre rossi, gallæ,  
spinæ Ægyptiæ, sing. vnc. viij. malicorij, grise vtri,  
māne, mali terre lōgi, sing. vnc. iij. olei ricini,  
aut veteris, lib. ij. Cōficio. p dignitate. Aliud q̄  
vtror in mollī carne p̄dita. Ceræ lib. j. rosacæ tā-  
tundē, cerussæ vnc. viij. salis ammoniaci vnc. iij.  
squamæ Cypriæ vñ. ij. thuris, calcis vix, alumi-  
nis, argenis, malicorij, sing. vnc. j. Cōficio dili-  
genter.

GALENI PERGAMENI  
de compositione medicamentorū seculi  
dum genera, lib. v.

Polypharmacia medicamentū, siue ad multos v-  
sus vtilis (de quibus agere in p̄fenn com-  
mētario est animus) ex contrariis pharma-  
cis cōstituta, etiā iuxta qualitates secundas, nō ran-  
tūm primas. Etenim primas appello, caliditatē,  
frigi-

pharmacæ ex  
contrariis con-  
sistere.  
Qualitates pri-  
ma ex secunda  
que dicuntur.

frigi-

Subtiliora sunt  
que lentius  
actio: que ex  
vino magis  
cicatricem obdu-  
cent.

Archigenis ad  
vlcera chronicā  
causa remedia.

Cephalicum  
ossa corrupta  
educunt.

Polypharmacia  
pharmacæ ex  
contrariis con-  
sistere.  
Qualitates pri-  
ma ex secunda  
que dicuntur.

frigiditatem, humiditatem, & siccitatem: tum ex harum coniugatione compositas: secundas autem, quæ has ipsas primas sequuntur.

Ex his est emplastrum descriptum ab Hera, boni coloris, epuloticum, glutinans, implens, valensq; ad Chironia vlcera: cum temperies est talis. Cere lib. ij. phrycæ lib. ij. æruginis rase vnc. vj. manne vnc. ij. olei heminas v. aceti seuatium. Conficito.

Panacea Heræ, ad omnem malignitatem vlcis gerit mirè cōducens. Rumpit atq; dissoluit quicquid corruptū est: omnem sanguinis eruptionē suppressit: hæmorrhoidas ipsas consumit & tabefacit: omniq; vlcis imposita, quævis agrestis, minis ipsum statim reddit. Chamæpityos, chamæleontis, sympliyi, marrubij, singulorū drachmas un. polys, centaurei tenuis, singulorū drachmas vj. lieleni, aristolochiæ, singulorū drach. iij. thuris drach. x. s. myrrhæ drach. ij. aloës drach. vj. chalbani drach. vj. obolum vnum: olei drach. cxxx. mellis drach. xxx. propolis drach. xij. s. aluminis scissi, terebinthinæ, chalcididis, sing. drach. vj. obo. s. binuminis, terre ampelididis, liliargyri, drach. l. gallæ & pulueris indis sing. drach. ij. Conficito diligēt. Porro marrubio vel solo vti etiam queas in iis qui carnē ab vnde humidā & fœdandā circa vicus habent. Helenion verò haud item conuenit solum inspersum: si vti nec aliud quodvis acre. Nosti siquidem acria irritare, mordere, calcificare, & fluorem concitare ad af-

prædictis etiam radicem draconculi adiecto, quæ vel per se in orbiculos secta, assecantq; & redacta in polinem, si inspergatur, malignis vlcibus auxiliatur.

Emplastrū ex Diētambō ad eadem faciens.

Olei veteris heminas iij. lithargyri drac. c. xxi. ginis ruse drac. viij. squame drach. vj. colopliome liquidæ drac. s. manne drach. x. ammoniaci thymiamatis drac. xxvj. æris combusti drach. viij. diaphrygis drac. vj. genianæ tantundem: aloës drac. viij. chalbani drach. xij. propolis drac. viij. cere drach. xxv. aristolochiæ drach. x. diētami Crenel tantundem. Conficito accuratissimè.

Emplastrum ex vtrâq; aristolochia, cephalicis enicium, callosis vlcibus congruens, atq; artuculos solutos confirmans. Picis, cere, bituminis, terebinthinæ, sing. lib. j. mænæ æruginis rase, cerussæ, sing. felibræ: chalcanti, aristolochij longæ, indis illyricæ, sing. vn. iij. malcorij, gallicimaturæ, æris combusti, sing. vnc. ij. sping vnc. iij. aristolochiæ rot. drac. un. aceti heminam. Ricini ni, vel olei cōmunis tantundem. Conficito. Porro manna exigua asfringendi vim possidet. Vocat enim sic quod à thure excutitur, non nihil etiā illius corticis obtinens.

Emplastrum Asanitiæ, malignis vlcibus, necnon ambustis conueniens.

Picis aridæ vncij. ceræ, adipis suilli, seui taurini, ætysij, sing. vn. iij. resine picis vnc. v. Conficito.

Emplastrū Haliei ex sinopide, nihil minus quàm priore vtile.

Ceræ, lithargyri, vtriusq; minam: manne, terebinthinæ, chalbani, sinopidis, sing. drac. viij. olei veteris heminas duas. Conficito.

Emplastrū Machæronis à Critone descriptus, phlegmonē arcens, mirèq; cōducens vlcibus, Aristolochiæ rot. chalbani, opoponacis, æruginis, iris illyricæ, ammoniaci thymiamatis, myrrhæ, sing. terebinthinæ vn. vj. s. ceræ vn. lx. s. olei omphacini vnc. vij. s. Conficito.

Emplastrum ex salicibus à Critone in multos vsus descriptum.

Misyo, chalcididos, æruginis, cerussæ, gallæ, aluminis scissi & rotundi, cretæ sutoris, sing. vn. vj. ceræ, resine pilyris, picis, binuminis, salcis foliorū, sing. vn. ij. olei heminas ij. vn. iij. chalcid. vn. vj. mal. corij tantundem: aceti sextarios sex. Conficito.

Emplastrū venarorū, ad quadrupedum ictus, morsurūq; & ad reliqua venenata. Argenti spumæ minæ olei veteris, squamæ æris rubri, ceræ, resine phrycæ, sing. lib. ammoniaci thymiamatis trientē: chalbani, sinij sinopici, sing. vn. ij. Conficito.

Viride Alcimionis, cōueniens fistulis, educens ossa, & strumas dissecans.

Chalbani drac. xvj. æris viti drach. viij. squamæ drac. xxij. ceræ drach. l. seui capilli, vel vitulini, drac. xxx. thuris, resine siccæ, ammoniaci thymiamatis, terebinthinæ, nitri, aristolochiæ, sing. drac. xxv. bryonij drach. xij. orchos drac. x. iris aridæ drach. iij. aloës Indici drach. x. scissidis drac. viij. felis taurini tantundem: aceti, olei, vtriusq; heminam. Conficito.

Viride ad heptas, & ad Chironia vlcera ab Andromacho scriptum.

Hordel combusti drac. x. æruginis drac. xx. ceræ drac. lxxx. cyprini heminā. Ceterū hoc medi-

Emplastrū ex distanno ad multa vtilis.

Manna quid sit.

Emplastrum Asanitiæ.

Emplastrū Machæronis.

Viride Alcimionis.

Panacea Heræ.

Acria facilius, amara est et vlcisat cōducant.

Thuris facilius

Ita mentium facilius,

Olei facilius.

Chalbani viti

Terebinthina, bitumen, Propolis. Mel non potest potius: ceterū huius maxime magis.

Putredinis quæ fac aptissima.

Ipsi Epigoni ad multa vtilis ducant.

dicamen aruginem multam cōtinet. Porro com-  
bustum hordeum, vel si per se inspergatur, clero-  
nia vlcera sanat.

*Passillū Aristar-  
cha.*

Passillū Aristarchi *αριστάρχου*, hoc est, ad mul-  
tos vsus. Nā prater alia viles sunt in principio  
pūthificia, lienosis, coeliacis, & dysentericis, trib.  
o bolis in potu datus. Myrrhæ drach. vj. croci,  
crocomagmanis, sing. drach. iij. cinorum, chal-  
canthi, aluminis scissilis, aloës, sing. drach. vj. exci-  
piantur vino Falerno, singantur orbiculis, & af-  
ficcati in vmbra feruentur.

Polyidæ Sphragis.

Malicorij drach. vj. myrrhæ drach. viij. aluminis  
scissilis drach. v. thuris drach. iij. chalcāthi drach.  
iij. sellis taurini drach. vj. Vino dulci excipiuntur.

Passillus Threpti ad aures pure sinētes, carnis  
excrecentia, & tianum vlcera.

Malcorij drach. x. aristolochiæ, gallæ, singul.  
viij. aristolochiæ tantundem, aloës drach. iij. myr-  
rhæ drach. viij. fisis drach. ij. thuris drach. iij. pas-  
sillo excipiuntur.

Passillus Aulæ *αὐλῆς* ad nomas &  
scabiosos affectus.

*Passillū dia-  
chylon.*

Licij Indici, aloës Indici, myrrhæ, aris, alumi-  
nis scissi, cinorum, thuris, sing. drach. iij. succi  
myrti hemina dimidium. Conficito.

Passillus niger, quo vitor.

Malicorij drach. x. aristolochiæ, gallæ, singul.  
drach. viij. aluminis scissi, aloës, sing. drach. iij. myr-  
rhæ, chalcāthi, sing. drach. ij. thuris drach. iij. Vino  
excipiuntur, & quā res exigit, vino dulci diluuntur

Ad erysipelata.

Acaciæ drach. viij. misyos drach. iij. opij. drach.  
ij. thoris drach. iij. cū aceto excipiuntur. Faciunt  
etiam ad herpes.

Ad herpes, Tiberij Cæsaris.

Diphrygiæ, meconij, aluminis scissi, acaciæ, sing.  
vnc. iij. aceto vel aqua diluens vitor.

Andum putrefaciens absq. morfu, ex  
descriptione Andromachi.

*Pueris suis ab-  
que morfu.*

Sandarachæ, arsenici, sing. drach. ij. calcis viij.  
drach. iij. trinis vitor.

Passillus sanguinem comprimens.

Chalcitidis, misyos, manne, sing. drach. iij. tri-  
tis vitor. Ad ani vicia, alumine liquido nu-  
cis magnitudine cum mellis cyathis duobus co-  
cto vitor.

Andum cephalicum ab Asclepiade scriptum,  
quod tollit squamas, ossa corrupta educit, & ca-  
ua implet. Iridis Illyricæ, panaciæ, sing. drach. iij.  
Aristolochiæ drach. ij. manne tantundem: cōm-  
sis cribratij vitor.

Andum Asclepiadis, cicatricem  
inducens.

Calcis viuz drach. vj. manne thuris, squamæ,  
sing. drach. iij. redactis in pollinem vitor.

Cruetas inducens, Asclepiadis.

Chalcitidis crudæ, cadmeæ, sing. drach. iij. ieu-  
nus ex salua excipit.

Medicamen Diatesaron.

Chalcitidis tostæ, misyos tostæ, diphrygiæ, chal-  
canthi, sing. drach. iij.

Ad nomas Asclepiadis pharmacum.

Sulfuris viui, auripigmenti, squamæ, sing. drach.  
ij. gris combusti quantū color exigit. Arido & ex  
melle vitor. Etenim putrida vlcera, quā ambu-

tes partes depalcant, nomas propellē appellant.  
Qui affectus vehemensissimus medicamentis in-  
diget, vt sepe in eis etiam cauteriis vtiatur.

Apellis medicamentū *ἀπὲλιν*, quod nomas  
nō solum sistit, sed incipientes probat. Chartæ  
combustæ, plumbi viti, aris viti & loti, arsenici,  
squamæ homomaris, singulorum æquas portio-  
nes, su laris viui dami disutritis vitor, vel cum  
melle, vel ex rhodino.

Ad carbunculos.

Nitri tubæ, arsenici, sandarachæ, chalcitidis,  
atramenti surorii, diphrygiæ, singulorū parēm mē-  
suram aceto leuigatis, excussisq. postea eis tritis  
vitor. Etenim carbunculus vlcus est crustam cū  
tō cum valida phlegmone circumstantiū parti-  
cularum excitans: adeo vt febres vehēntes, &  
extrema pericula inferat. Quare ipsi crustæ val-  
dum medicamentum imponere expedit, & ex his  
quæ ad nomas conducunt.

*Nomas quales  
vltima sunt, &  
quales vltima  
mentis pectus  
Medicamentis ex  
charta combus-  
ta, nitro cum  
pessulo.*

*Carbunculus  
quid, & quales  
viti sunt viti  
carnis.*

## GALENI PERGAMENI de compositione medicamentorū secun- dum genera, lib. VI.

IN presenti cōmentario ad ea *αριστάρχη*, hoc  
est multi vsus medicamenta, me cōvertere &  
animos, quæ tum ad alia multa singulatum fa-  
ciunt, tum ad putrescentes particulas aliter qui-  
dem affecta quā illa vlcera, quæ difficulter cu-  
rabilia appellantur. In putrescentibus siquidem  
ipsa putredo vagat, ob idq. tales dispositiones  
cōplures Medicorū *αριστάρχη*, hoc est, depautiones ap-  
pellant. In illis aut, affectus secundū vnum locū  
est circūscriptus, absq. vlla putredine: ita vt plia  
gedemq. vocat, exedant quidem partes vicinas,  
non tamen putrefaciūt ipsas, nec febres inferāt,  
quæ cōsequi ad depalcantes affectus cum putri-  
lagine, consueverunt. Hæc igitur quæ nunc scri-  
bentur omnia, mordacia sunt, si quis ipsis solis  
nō cerato tēperatis vtiatur. At quæ cerato misce-  
tur, purgare quidē vlcus sordidum, & carne re-  
plere possunt, atq. etiam duritiē quandā & ten-  
sionē discutere: nō tamē difficilia curare. Quo-  
circa tum plurimū cerati miscemus medicamen-  
tis acribus, quū vlcus purum & sicū est: corpus  
autem curandū, & molle, & ad sentiendū prom-  
ptum: paucissimum verd, si vlcus quidē ipsum  
sordibus, humiditatēq. reduit plurima, ægri-  
antem corpus sit durum, & parum sensile.

*Nomas,  
Phagedæna.*

*Cerati pluri-  
mum quando  
acribus medi-  
camentis mi-  
scemus, ut quid  
de curati, par-  
tisum.*

Anictos Critonis, quasi dicas insupe-  
rabile pharmacum.

Extrahit, rumpit, purgat, glutinat, pus educit,  
duritias discutit, lassitudines lenit, fracturas cū  
vulneribus auxiliatur, curat hominū atq. ferarū  
morbus, ad innumērāq. alia cōducit. Squamæ ze-  
nis drach. lvij. pyrethri, staphisagariæ, cocci gni-  
dij, suapii feminis, cadlyros, columbini sterco-  
ris, aristolochiæ tenuis, aruginiæ, cyperi, eruciæ  
feminis, cumini, singulorū drach. xvj. nitri, falsiæ  
ammoniaci, singul. drach. xxxij. baccarū lauri,  
mannæ, iridis, singul. drach. cxx. aceti acris sextar-  
tios sedecim, decocti caricarū cyathos iij. & femi-  
na. Tusa cribratāq. omnia simul cū aceto sub  
actu caniculæ leuigantur. Vbi sicū & viride eua-  
serit, sicū decoctio adiciatur, & simul emollita  
tolluntur, & in olla aris rubri asseruātur. Vtēris  
autem

*Anictos Criton  
est.*

*Medicamēta des-  
tuerant.*

autē vna ipſius medicamēti parte aceto diluta, viſq ad conſiſtentiā ſordium, permiſta ſex reſing portioniſbus, cui nōnnull cerę ſit temperatū. Scribitur etiā impetigini agreſti cōgruere. Sic enim vocant, quę a medicamentis imbecilliter ſiccantibus nihil iuuatur. irritatur autē d validis. Porro caricarū decoctum leniſſimū eſt, & maximē concoquit, ſimiliq digerit. Acetū verd efficacil aliorum medicaminū iuuat. In quo quidem quę macerantur ſub ſole æſtuoſo, tenuē ſubſtantiam acquirunt, eōq alius virtus ipſorum penetrat.

Emplaſtrū Serapionis, cōtra omnia vulnera, punctus & paronidas maximē valens. Educit etia pus, gluninat, ſenſilēq & chironia perſanat. Olei veteris heminas iij. argēti ſpumę drach. cc. ammoniaci rhyimiatis drach. clxviij. reſinę colophoniz, ptyinaz, ſingul. drach. lxviij. cerę drach. clxviij. chalbanī drach. xx. xruginis tantundem, myrrhę drach. viij. Conſicito.

Humidum Andromachi ad nomas.

Cerę, reſing terebinthinę, vtriuſq drach. viij. adipis taurini curati, drach. iij. chalcitidis drach. ij. ſquamę æris drach. iij. mannę thuris drach. ij. gallę immaturę drach. iij. olci myrrę heminas v. Arida aceto & melle excipiunt, dein liquida ſu perſunduntur. Porro quod auxiliorū quędam d ratione ſola inventantur, quędā ab experientiā, \* quę ad id ratione nō indiger, nōnull vtriuſq opem deſiderent, perſeipſam vobis eſt demonſtratiſſimā: ſicvti & quod ratione & experientiā com perta, coniecturali via ad eorum quę inquirentē iuvententi perveniunt: quę verd per rationem ſperata ſunt, conſiſtunt experientiā. Cū igitur omnia artium opera frequenti exercitiō abſoluantur, non ſanis proſectō eſt generalia duntaxat iſpoſuā addiſcere, fed etiam in particulariſbus ſubinde exerceri oportet. Nam actiōnū vſus exercitatioq, ad perfectiōū poſſeſſionē eſt via.

Aegyptia Andromachi.

Argēti ſpumę drach. xliij. ricini heminas vj. ce rę drach. cxliij. ammoniaci rhyimiatis drac. lxxij. terebinthinę drach. xxxvj. lanę viſę drach. xviij. ſquamę ſtomomatis, ſquamę æris, ariſto lochię, thuris, ſingul. drach. viij. myrrhę drach. iij. opopanaxi drach. ij. marinę aquę, ad conſpergendam ceram, drach. l. Conſicito. Etenim argenti ſpuma, quum mediū temperamentū ſit, quod pertinet ad calorē & frigus, paululum ad ſiccitatem inclinat. At cera, materię locum obtinet, non virtutis efficaciam adiuvat: tamenſi viſ quędam ei perexigua emolliendi inſit. Tam tere binthina, q̄ cera, magis molli, calſcit, & dige rit. Porro ammoniacū inter emollientia princi pium obinet: in digerentibus mediū eſt. Quare compoſitum ex oleo riciniſno & gutta ammo niaca medicamētum, abvndē poteſt digerere, e mollire, & nimirū etiā ſiccare. Iam lana cōbuſta; ariſtolochię plurimū digerūt, exciſcingit, thuſ autē digerit cōcoquitq. Myrrha etiam nō igna vitur calſcit & exicat: fed vtrunq opopanax 60 præſtat multo abſolutius. Cæteri ſquamę æris, ſtomomatiſq, præterq̄ quod validē ſiccant, vim etiam aſtringendi ſoruntur. Conſentaneū autē eſt, Andromachum pro hemina vncias novem menſurales accipere, ita vt ſex heminę vncias

quinguaſaginta quatuor menſurales abſoluant: quod idem eſt ac ſi dicas, menſurę Romanę lib. iij. 2. Ego verd olei Romanę libram, quam per diſſecta cornua metiunt, ponderavi: quandoq, diſcere cupiens quāto gravatius pondus cōtineret, invenij quoddecim menſurales, decem vnciis ponderis æqualibus exiſtere. Præſcriptum igitur medicamē, cruentis vulneribus, vlcenſibq aliis nō paucis bonum medicamētum redditur: ſicvti & ad abſceſſus, & omnia quę diſcuti po ſſunt. Nec ignoratis, medicamenta quę ſimul cum digerentibus etiam aſtringentia recipiunt, longē iunora eſſe: quę verd abſq adſtringentibus digerūt, efficaciora quidem, non t̄ perinde tuta. Sæpe ſiquid fluxiones attrahunt, diu cor pus quod curatur, plethora cū eſt, aut praviſ ſucci redvndat. Adeo itaq digerit generoſe prædi ctum pharmacum, vt enā pus, ſi non admodum copioſum ſit collectum, diſcutiat, abſq incifione cutis: emolliatq calloſā, & quomodoſq in dūrata poſſit. Cōgruit etiam nudas nervus, & ſi in parte quapiam abiecti fuerint. Etenim præ di nervi, tamenſi periculo qd cōforti lege obo riri ſolet, careant, tamen eas partes, in quas inſe runt, ſenſu deſtituit: talęq medicamen deſide rant: nam quę humectant, facile eos putrefaciūt. Medicamen ſuſcū Andromachi, Athene di ctum, ad diſſicilia vlcera congruens.

Argenti ſpumę drach. l. terebinthinę drach. xxxvj. cerę drach. xxv. minij ſinopici drac. xxiij. ammoniaci rhyimiatis drach. xxxvj. chalba ni drach. xj. aloē drach. viij. diphrygis tantundem, æris combuſti, maſſichis, ſing. drach. vj. ariſtolochię drach. v. propolis tantundem, mannę drach. vj. ſquamę æris tantundem. Lapidis aſij drach. iij. triſolę ſeminis drach. ij. ſymply ti ſadiis drach. j. & obolos iij. olei heminas iij. Conſicito.

Hellespontia Andromachi, propulſans phle gmonem, ſtrumas, panos, & paronidas curans: necnōn pus maturans, abſceſſuſq rumpeans & glutinans. Argēti ſpumę drach. c. picis drach. l. ladanī drac. xxv. xruginis raiſę drachmas viij. æris combuſti tantundem, ſquamę drach. ij. olei veteris drach. cc. Conſicito.

Tyria Democratis, vlcenſibus ac morſi bus quodcuſq congruens.

Lithargyri lib. v. cerę lib. ij. ptyinę pinguis lib. iij. xruginis, chalbanī, æris combuſti, ſqua mę, ſingulorum vnc. iij. pinguis olei lib. xvj. cu moſe conſicito.

De emplaſtris digerentib. & attrahentib. Attrahentia medicamēta nōnihil etiam diſcu riunt: & quę diſcutiunt, pariter etiam attrahunt. Verū in digerentibus medicamentis, diſſiciora virtutis: in trahentibus, attrahetrix præpoller.

Salſum Andromachi, digerens, extra hens, ad multūq vtile.

Salis cōmunis lib. iij. ſquamę æris vnc. iij. ma gmatīs lib. 3. mannę lib. j. cerę lib. xliij. olei Cy pri lib. xvj. quibus acium aſſunditur.

Aliud Cteſiphonnis, partim diſcutiens, par tim evocans, atq detergens.

Aphoniri lib. mannę thuris tantundē, lixinę ſtactę lib. Sunt qui addant etiam libram aceti.

DD

Impetigo agreſta.

Caricarum decoctum, aceto ſaccharat.

Serapionis emplaſtrum.

Humidum medicamēti Andromachi.

Artium opera frequenti exercitiō abſoluantur.

Aegyptia Andromachi.

Ammoniacum inter emollientia principium obinet.

Hemina

Latram menſuralem oleo, con trare vnt. u. pidiſtali. Gal. cap. xxiij. ij.

Digerentia quę ſunt adſtringen tia ſunt multa, q̄ longē iunora eſſe, ſed minus ef ficacia ſunt quā attrahentia.

Humectantia, præter nervos ſanſe potuerunt ont. Aſthene Andromachi.

Hellespontia Andromachi.

Tyria Democratis.

Salſum Andromachi.



*Medicamen-  
ta ex  
baccis lauri.*

**Aliud** ex baccis lauri. Refinæ, nitri rufi, ceræ recentis, baccarum lan-  
ri, colophonis, seu vitulinis, ammoniaci thymia-  
maris, fing. drach. lxx. Cyprii decimam sextâ he-  
minæ partem. Confectio.

*Digerens Ale-  
mandi.*

**Aliud** atrahæ & digeræ, ad multa vitæ.  
Argentii spumæ, cerussæ, chalcabani, fing. librâ:  
salis fossilis, fruginis rase, sing. sebulam: olei se-  
xtarios tres, atramenn futuri vnc. ij. Confectio.

**Aliud** digerens meliceridas, Alexandri.  
Salis Hispani, argenti spumæ, cerussæ, fing. li-  
bram. Cerg, terebinthinæ, vitruisq. vnc. j. chalcabi-  
ni, vel opoponacis vnc. ij. sinapios vnc. vj. olei ve-  
teris lib. iij. aceti sextarium. Confundito.

**Aliud** epispasticû, discutienti strumas, paroti-  
das, atq. omnes abscessus, conferensq. ad articu-  
lorum vitia. Salis fossilis lib. strigenti purissimâ  
lib. iij. Chalcabani drach. l. Confectio.

**Aliud**, quo vsus est ad ead. Andromachus.

Cerussæ, sing. fossilis, fing. drach. lxxx. chalcabi-  
ni drach. xij. olei veteris hemina iij. aceti hemi-  
na iij. **Aliud** Asclepiadis ad eadem, quod valen-  
ter etiam mammarum abscessus digerit. Cer-  
ræ, terebinthinæ, nitri, olei veteris, singulorum  
libram, aquæ heminam. Nitrum in aqua solutû  
igni admoueto, vasq. cooperto, coquito, mo-  
uens ex intervallis. Cû aut strepere adeo de-  
fuerit, liquida infundito, mouens assidue, donec  
non coinquant. Postea in mortarium transfu-  
sa, rursus tundito: inde excipiens, vitior.

**Aliud** ad eadem.

Cerræ, terebinthinæ, singul. drach. c. nitri spu-  
mæ, olei veteris, mannæ thuris, sing. libram: la-  
pidis asij floris sebulam: chalcabani, propolis, am-  
moniaci thymiamatis, sing. drach. xij. aquæ luxi-  
næ quod sit sanis. Confectio.

### GALENI PERGAMENTI de compositione medicamentorû secun- dum genera, lib. VII.

*Malagratæ  
qua ducuntur.*

**M**alagratæ siue emollientia vocant Me-  
dici, quæ partes præter naturam indura-  
tas emolliunt, calido omnia tēperamen-  
to prædita: non tamen exsiccantia, quemadmo-  
dum nec manifestò humectantia. Nam cû exa-  
ctè emollientia medium quendâ ordinem inter  
humectantia siccantiaq. sortiantur, indurascen-  
tum substantiæ vel vii fusionē quandâ molliun-  
tur. Vbi verò fusa durities fuerit, digerentiû me-  
dicamentorum vsus succedit. Porro leoninus a-  
deps valentissimè tum calfacit, tum digerit. Pro-  
ximum locum habet pardi adeps, vt quæ modicè  
emolliat. Vim minorem in calfaciendo ac dige-  
rendo habet asnerius: habet tamen aliquatenus  
maiorē in molliendo. Pari spacio ab hoc re-  
cedit gallinæcus. Suillus adeps, mollissimus, hu-  
midissimus, atq. aliorû imbecillissimus est: quare  
tenuis corporibus conuenit. Capræ & boum  
adeps quâto suillo est validior, tantò magis cor-  
poribus & natura durioribus, & inter duriora  
scirrhorosioribus congruit. Taurinus hircinûque  
adeps validioribus tum corporibus, tum affectû  
bus auxiliatur. Est autem commune tum phle-  
gmone, tum scirrho particulis laborantibus, reni-  
n prementibus digitis: distinguant tamen affe-

*Digerentibus  
quâto recidi-  
t. Adeps differre  
tia.*

ctûs ij sensu doloris & indolentia. Igitur magna  
phlegmone cataplasmatis & humidis quibuidâ  
medicamentis sanatur: parua, cui scirrhi hofa du-  
rities permixta fuerit, tum cataplasmatis, tû me-  
dicamentis cerati modo cōfectis: liquidisq. em-  
plastris atq. emollientibus.

**Medicamen** Paryggon Heræ, quod medetur  
parculis exigua phlegmone afflictiis, non mul-  
tò post cōfectionem tempore. Si verò duritiem  
abiq. dolore pars affecta contraxerit, aut si phle-  
gmone afflicti sit libera, paulò etiam recentî  
vetustius vitæ fuerit. Eius itaque composio est  
talis: Adipis suilli recentis curati vnc. xliij. cer-  
ræ vnc. xxij. cerussæ vnc. vj. argenti spumæ re-  
tundem. Confectio. At duritiem in scirrhum ab-  
euntem, valentiora prædita persanant: cuiusmo-  
di sunt, tum medullarum genia, tum bdellium  
vtrunq. Arabicum nempe, & Scythicum: necnò  
styraces, ex quibus eligendus est pallidus: nam

niger deterior est. Iam ammoniacû thymiamata,  
inter ea quæ emolliunt durities annumeratur,  
præcipuè quod pingue est & recens. Medullarû  
optimus est vitulina. Ex resinis apsisima est,  
Chia vocata, & lanx. Post hæc pinea. Inde abietina.  
Strobilina verò vehementer est acris. Pityna, feruida,  
quâ propriè physma vocant, pinguitudinis ex-  
pura, exccat admodum. Hæc igitur fugere, Chia  
verò & abietina vri oportet, non ipsis per se, sed  
cum cerâ, & aliquo aliorum, q. cōducere affectu

videtur. Bruta pax & ipsa eadem obinet vim,  
nōnihil pinguis & tenax. Pax alia nō est miscida,  
sicut nec bitumē, vt pote iusto sicciora. Exsiccantia  
quippe, mollientibus sunt cōtraria. Quoniam  
verò & picea, & phrycten resina, & colophonis  
appellare cōsueuerit, sciendû est & aliâ colopho-  
niam quandam haberi, Chæc mastiche similem,

quæ nonnihil molliens fortitur, quemadmodû  
ipsa mastiche & thus. Ad hæc Aegyptia mastiche  
nōnihil emollit. Thus enam quandam mollien-  
tis vim obinet: verum hoc quidem coctum ex  
vfu est, veluti & farnigraci semen: hoc etenim  
probe coctum emollit, ac magis adhuc, si adipi  
temperetur. Quæ citra coctiōem liquari, diluigi,  
ob consistentiæ siccitatē, nō possunt, oleoso alio-  
quo indigent, cuiusmodi sunt, tum oleû ipsum,  
cui nihil astringēs inest: tum balneorû frigmen-  
ta, & quod vocatur Sufinû, & hoc multò magis  
Comagenû. Huius generis est butyrû, altheæq.  
& farnigraci decoctû. Porro inter ea quæ sic e-  
molliunt, & ea quæ validissimè (cuiusmodi existit  
styrax, & bdellû) ammoniacû thymiamata idem  
poteest quod propolis. Cæterum Scythiû bdellium  
Arabico est multò ad emolliendû præstantius.  
Chalcabanû & opopanax, præterq. quod dige-  
runt, eni aliquandò molliens fortitur. Opopanax  
tamen digerendo, chalcabanû molliendo, co-  
quendôq. præcellit. Ex his igitur quæ produxi-  
mus, valida validis, imbecilla imbecillis fini ad  
hibenda affectibus. At vii post primâ pharmaci

impositiōe, denuo ipsum applicas, oleo pingui  
partē affectam fouere conuenit. Ex his autē quæ  
hæc sunt (quod tenacius hærent) vocantur, nul-  
lum auferendû est prius, q. sua sponte abscedat:  
sed vt adhæreant semper sinenda sunt, etiam si  
ægotantes lauerur. Vitanda autem omnino sunt

medica-  
menta nō  
si amara  
sint, quæ  
sua sponte  
abscedunt.

*Phlegmone qui  
hæc medicantia  
inducit.*

*Paryggon Heræ*

*Styracis des-  
criptio.*

*Medicamentum  
quod ducuntur*

*Resinæ des-  
criptio.*

*Colophonis de-  
scriptio.*

*Mastiche  
descriptio.*

*Farnigraci  
descriptio.*

*Adipem  
descriptio.*

*Chalcabanum  
descriptio.*

*Opopanax  
descriptio.*

*Trachia  
descriptio.*

medicamentofarū aquarum lauacra: præfertim quæ chalcanthom, alumeo, & iolthur referunt. Cū igitur malactiorum sint varij gradus, & differētæ, ceræ malactica primi ordinis ad exiguas dnrictes, atq; in mollibus vtreum corporibus: vt secundi, ad fortiores tum affectus, tum corporum habitus: ad similes tum tertij, tum quartij, nimirum pro illorum ratione.

Malactica primi ordinis.

Butyram, vel resina colophonina, & cera candida non vetusta, singula poodere æqualia, inuicem liquata, primi ordinis malactica sunt. Liquidem similiter medicamen, quod Parygron vocant, primi ordinis est. Emollentiū imbecillimū est ceræ cum butyro soluta, aut ex fusino, aut eomageno. Atque imbecillius ceræ con dictum. Iam ex ouis cerata facta, exiguum quandam relaxanda vim possidēt. Valentiora his, verū imbecilla adhuc & ipsa, cerata ex cæpyro, resino, & cera pari pondere liquefacta.

Malactica secundi ordinis.

Emplastū quod ad Anacardij refertur, rectissimū secundo malactico ordini ascripseris: nimirum constans ex oleo veteri, argenti spuma, & foillo adipe. Cæterum si omnia illa fuerint recentia, imbecillimū pharmacum fiet. Validius autem, oleo quidem existente veteri: adipe autem recente. At validius adhuc, ex vetusta ambobus constitit. Quocirca secundum veteritatem quidem olei & adipis, pondus autē singulorū quæ indentur, variis differētis ipsum medicamentum suscipiet. Copiosa siquidem argenti spuma iniecta, medicamen potestate mollius evadeti pauciore, validius: ac magis emolliet, si plus ad ipa immittamus: digerit fortis, si augemus oleū.

Amythæonis malagma ab Asclepiade scriptum.

Ammoniaci rhymiamata vnc. xxxvj. ceræ tēbundem: terebinthinae vnc. viij. bdellij tantundem: chalbani, thuris, myrris, sing. vnc. iij. Cyprini heminas iij. Conficito. Discunt omne duritiem. Valet contra præcordiorū tensiones, impediētq; articuloꝝ motus.

Malagma Dioscoridis, ad eadem.

Ceræ minā vnam: resine phrycæ, chalbani, iridis silyricæ, sing. minæ dimidium: irini feculq; quod sana est. Vini quantū volueris. Conficito.

Malagma Luchō omne duritiem digerens, articulorū impediēta relaxans.

Bdellij, seu vitalis, ammoniaci rhymiamatis ierdia silyricæ, sing. drach. xvj. opopanax, chalbani, cachryos, styracia, thuris, sing. drach. viij. pipēris grana clx. irinæ feculæ quod sit satia: ceræ, resine terebinthine, sing. seclibram. Vini quod sana esse videatur. Conficito. Est enim extremi emollientium ordinis, vt quo nullum durescētia magis emollire perqueat.

Malagma Neapoli: ab Asclepiade scriptū, eō tra omnes durities: qd etiā pleurinis auxiliat. Vni pisiq; sextario sex: ceræ lib. vj. ammoniaci rhymiamatis, phrycæ, vtriusq; vnc. iij. terebinthinae, thuris, myrris, aloës, apironi, lapidis Asij floris, gentianæ radicis succi, sing. vnc. vj. fagapeni, sulfuris viui, propolis, sing. vnc. iij. panacis rad. samopychi, pipēris albi, sing. vnc. iij. Conficito, & vitur.

Malagma Andromachi.

Picis lib. iij. ceræ lib. ij. resine libram: chalbani vnc. ij. ammoniaci rhymiamatis tantundem: man næ vnc. iij. aceti sextarius iij.

Malagma Andromachi ex meliloto.

Nardi Gallicæ drach. x. cyperi, cardamomi, iereosillyricæ, myrris, sing. drach. viij. croci drach. iij. meliloti drach. xxv. ammoniaci rhymiamatis drach. viij. terebinthinae drach. l. ceræ recentis drach. c. cyprini heminæ dimidiū: aceti quod sit satia. Conficito.

Malagma ex baccis lauri, Andromachi.

Ceræ, picis brutæ, baccarū lauri, nutri, resine phrycæ, sing. drach. lxxv. challani, ammoniaci rhymiamatis, cachryos, ameois, sing. drach. xij. pipēris albi drach. xvj. cyprini hem. vj. Conficito.

Ad istud iudicis generosum.

Rutæ agrætiæ feminis, silphij, baccarū lauri, aphroni, abrosini, colocynthidis, cardamomi, ameois, sing. drach. iij. Rutæ viridis, picis, terebinthinae, ammoniaci thym. ceræ, sing. minæ partem octauā: chalbani drach. vj. opopanax drach. iij. sulfuris viui tantundem. Conficito.

Ad hienosos.

Ceræ minam: ammoniaci rhymiamatis minæ dimidiū: aluminis liquida drach. l. strigentiæ heminam. Capparia rad. calamintis rad. myrobalani facia, quod magna vocat, sing. drach. l. acetio aridis, oleo adiecto liquidis, vitur.

Malagma ad hepaticos.

Ammoniaci rhymiamatis, bdellij, sing. drach. xliij. croci, myrris, sing. drach. xij. ceræ drach. xliij. aceti quartam partē heminæ: cyprini heminam. Conficito.

Malagma ad rheumatismum stomachi & intestinorum.

Oenanthis vnciam: omphacis vnc. iij. plicni cobalani carnia vnc. ij. acacis, rosarii, aloës, sing. gal. vnciam: gallicæ, aluminis, picis, sing. vnc. iij. ceræ vnc. iij. Vinum ardia adhibetur.

Ad hydropicos & flatuosos.

Picis liquida, ceræ, vtriusq; librā: nitri, sulfuris viui, aluminis fissi, sing. vnc. vj. Pennitico.

Malagma Anupari ad colicos.

Silphij drach. ij. elcisi phaci, casis, melantij, staphidia agnæ, chalbani, struthij, sulfuris viui, sing. drach. iij. panacis, propolis, pyrethri, ammoniaci rhymiamatis, nutri, sing. drach. vj. Asij floris drach. xxv. ceræ drach. cl. resine tantundem, olei heminam. Conficito.

Aodynon Nicostati ad podagram.

Ceræ libram: ammoniaci rhymiamatis vnc. iij. opopanax vnc. iij. amecorij vnc. iij. cyprini tantundem ad confusio nem corum adhibetur.

Aureum malagma ad arthritico.

Resine strobilinae lib. ij. chalbani drach. xij. xungis porcine tantundem: ceræ drach. xliij. baccarum lauri drach. xij. Incoquito vt decet.

Aliud ad laterum dolores.

Cyper, cardamomi, mannae, ammoniaci rhymiamatis, terebinthinae, ceræ, iriois, sing. libram. Misceito. Porro phlegmonica, scirrhiq; cadē quodammodo generatio & curatio est. Nascitur enim ex confluxu humorum vterq; affectus: curatur iisdem vacuans: quoniam & vacuatio ois mor

DD ij

Malagma Andromachi.

Emplastum ex meliloto.

Malagma ex baccis lauri.

Ubi dicitur cataplasma.

Ubi dicitur opopanax.

Hepaticis rheumatismis malagma.

Rheumatismis vtriusq; et intestinum, malagma.

Hydropicis con veniens malagma.

Celcus malagma Anupari.

Ubi dicitur Asij floris.

Ubi dicitur Aodynon.

Arthritico an xungis porcine tantundem.

Ubi dicitur malagma.

Ubi dicitur malagma.

Ubi dicitur malagma.

Ubi dicitur malagma.

*Inflammationis curatio.*

*Scirrhi curatio.*

*Scirrhi incurabiles, ab eis qui possunt curari mem. scilicet, quemodo dicitur auctor.*

*Phlegmona quando in scirrhus digeratur.*

*Pori quemodo generantur. Calidus, ut pinguior sit res.*  
*Refrigerantia quida scirrhus producant.*

*Inflammationibus quae mediantibus in venis videntur.*

*Acopa medicamina quomodo esse debent.*

*Refinerio diffinitiones.*

*Adipem diffinitio.*

*Dura corpora valentiora medicamenta possunt, quoniam multa carnis sunt prodia.*

dua utrobique idem non est. Quippe inflammationis quidam particula tum repulsoria medicamentorum qualitas, morbi in initio, tum diffusoria, semper ex usu est. Scirrhus autem sola diffusoria, sine repellente. Itaque summè indurata scirrhus, prorsus insanabilia sunt. Dignosce autem ipsa hinc, quod nullus sensus partibus affectis superest. At in quibus sensus quidam est, sed obcurus, hinc curantur pharmacia digerentibus in crassum humorem: tum tamen validè, ac vniuersim hoc agentibus: quod epistastica solent. Quocirca minimè sanè oportet mirari, si partes nullamque scirrhum inter dum contrahant, dum videlicet humor quidam influxus est simul crassus & viscidus: curatio autem medicamentis valde exacerantibus administratur. Nam quemadmodum in externis rebus, permulta corpora quae igne contingunt, ab igne torrentur, atque rursus ab aqua emolliuntur: ita in particula inflammationis, ex humore ipso, à calfacientibus & exacerantibus acerrimè desiccatur, relinquuntur quippe crassum & viscidum, nimirum omni tenui diffusio. Atque hac sanè ratione in morbis articularibus porriguntur: nec secus per neplendas calcoli. At si fluxio, quae phlegmonem gignit, tenui substantia sit, curatioque eius per siccantia & calfacientia pharmacia administratur, nihil scirrhusum relinquatur: modo refrigerantia vellementer, astringentiaque, scirrhus procreare tunc solent. Vnde multis per erysipelata vehementer refrigerantia, occallere solent humores. Igitur optimus usus in dolentibus inflammationibus est, quod medicamentis abvnde humidis simul & modice calfacientibus administratur. Alter paulo crassioribus & siccantioribus constat. Tertius relaxantibus, nominatim, quae nonnulli inter malagmata collocant. Sunt autem inter ea, maximè emollientia quidem, quae cōsistentiam cerati referunt, cum ex butyro, cera, adipibus, oleis relaxante consistant. Temperatur ipsis ac cypri, resinae, & picis, modicè: sic ut & thus & chalbanum, & nonnulli irea & lilyrice.

De acopis, sive laboribus lenientibus.

Acopa medicamenta omnia, liquidè cōsistentia necessario esse debent. Inter quae sanè oleum per se, eo labores qui summam cutem infestant, per sanat: altius autem ingruentes, vehementioris, alitum relaxant, & medicocriter calfacientia cōmixta: ut chalbanum, resina terebinthina, colorumque phryctae appellatur. Quibus calidiores sunt abietina, & strobilina. Terebinthina vero laxa non nihil calore superat. Ceterum id genus omnia relaxantibus oleis miscuntur, quale est Sabinum, iniecta interdum & cera. Iam verò duntaxat vnguen est, ubi dolor altius infestatur, medicamentum ex semine abietis, chamemeli, anethi, & floris populi: pyretrae sissimum, gleucinum, & comagenum, & quae tam ex medulla, tum adipe componuntur: sissulo quidem, moderatissimè relaxant: gallinaceo autem, his vehementius: & hoc adhuc magia anserino. At adepe leonina, & pardi, validior est, ut iam vehementer calfaciat, eoque discutiat insigniter. In medio huius, bubulig & caprilis, consistit vulpiū atque hyemae adepe. Meminisse autem oportet, dura corpora requirere valentiora pharmacia: mollia verò & humida, minimè ta-

lia medicamenta perferre posse. Nec ignoratur, quae dicuntur myracopa medicamenta, ex acoporum cum vnguentis temperatura fieri, nihil cetera praestantiora, nisi odoris fragrantia.

Acopon Themisonia ab Asclepiade scripta.

Sampfuchi, rorismarini soliorum, succagraci, sing. sextaria vna: cardamomi, brachyos, sing. sextaria dimidium: vini dulcis sextarios tres: olei venefrani trepodo: ceræ lib. ii. Cōficio ut decet.

Acopon ex melle.

Mellis, irini, rosacei, cypri, gleucini, ceræ, terebinthinae, sing. vnc. ii. Cōficio.

Acopon Aphrodisiense, hoc est, sextidum appellatur.

Ceræ, terebinthinae, sing. drach. viij. chalbanum drach. vj. olei veteris heminas duas: medullae ceruinæ drach. viij. Cōficio.

Aliud ad omnem nervorum dolorem.

Resinae terebinthinae drach. lvi. ceræ drach. xxviij. ammoniaci thymiamatis drac. xxxij. chalbanum tantundem: medullae ceruinæ drach. xxxij. olei veteris heminas duas. Cōficio.

Aliud ad sciaticum, hoc est, ex castoreo: quod solent, & omni diurno malo auxiliatur.

Oxypti vnc. ii. medullae ceruinæ vncias iij. terebinthinae vncias iij. ammoniaci thymiamatis, chalbanum, castorei, piperis albi, euphorbiae, adarces, nieri spumæ, opopanaxia, sing. vnc. ii. olei styraeis vnc. j. olei irini vnc. ij. olei veteris hemina vna: ceræ felibram. Cōficio.

Vnguentum dolores articularum discutit.

Thuris, piperis albi, sing. drach. x. aphronitri drach. viij. myrrhæ drach. iij. ammoniaci thymiamatis drach. vj. aceti quod sit satis: olei Cypri hemina vna.

Medicamentum ex populo.

Populi nigri succulorum minam: cucumeris agrestis rad. lib. iij. calis fistulae lib. ij. vnguenti crocini lib. ij. croci vnc. ii. vini odorati sextarios x. olei Sabini sextarios x. sampfuchi, ceræ, sing. lib. iij. Surculos populi diligenter cōfusus in vase duplici vnguentario cōnertor: quibus sampfidum, cucumeris radices cōficias adicio. His vinum superfunditur. Omnia diebus nonem macerari sinito. Sequenti die oleum adiciatur, & rursus accuratè rursus, igne non acri incoquitur. Postea liquor expressio ceram subleuat, & medullam lixuem factam indiro. Igne imposta coquitur. Vbi liqnata fuerint, ab igne tollenda, crocinum adiungitur, moueturque continuè. Crocinum verò lixae factum, terrestris testudinis sanguine excipitur, ut olei veteris crassitudinē habeat. Liqnata croco iniecta rursus tūdito, atque exceptis vitior. Arthritide & ischiade liberat.

Aliud Flauij Clementis, cuius usum nouimus homines toto distorto corpore, conuulsisse à podagra, chiragraque. Olei Sabini lib. xij. cucumeris agrestis rad. lib. x. ceræ, terebinthinae, medullae ceruinæ, chalbanum, sing. lib. j. Olei diuidimus, & scorium in co ranas, scorium item radices incoquimus. Dein liquore percolato, ad pharmacia confectio nem vniuntur.

Acopon viride Hallii.

Ceræ, terebinthinae, olei veteris, sing. felibri: aphronitri vnc. iij. chalbanum, grugunis rase, sing. vnc.

*Acopa Themisonia.*

*Acopa melle.*

*Acopa Aphrodisiense.*

*Acopa ad sciaticum.*

*Acopa ex castoreo.*

*Acopa ad omni nervorum dolorem.*

*Medicamentum ex populo ad sciaticum dolorem.*

*Podagrici medicamentum Flauij.*

*Acopa Hallii.*

vnc.ij. opopanaci vnc. vj. ammoniaci thymia-  
mana, manna, sing. vnc.ij. acetii, melini, cyprini,  
irini, sing. vnc. ij. seu capilli vnciam. Conficito.  
Cauti Acopon, ad diuturnos affectus  
& convulsionos.

Acopon Capiti.

Pysylli, Syriaci vnguenti, viriulq; sextarium  
ireos Illyrice parem modum: terebintine lib.  
axungie tantundē. R. Aſure nau alia vnciam. In-  
coquitoruta viridi mouens.

Gleuci confic-  
tio.

Gleucini confectio Andromachi:

i. Myrrha, nardi Indici, cuiusq; lib. ij. costi lib.  
ij. Myrris libram: bdelli, ſemplici, xylo balsa-  
mi iunci odorati, cardamomi, ſp. at. h. i. creos Illy-  
rice, miſyos, aſari, ſing. lib. ij. meliori, nardi Gal-  
lice, ſing. libram: aſpalathi, calami, ſing. ſclibelli  
ariſtolochie longe tantundem: rorimarini ſe-  
mini ſextario duos: thuris, caſie, ſing. lib. iij.  
ſemiviri ſextario duos: ſph. g. ii. amomi, ſing.  
lib. ij. corticis thuris libram: oſari ſiccari lib. ij.  
carpob. aſami tantundem: croci vnc. iij. bacchari  
lauri libram: piperis albi tantundem: opobalsa-  
mi vaſcula tria: malabathi foliorum lib. ij. nu-  
cleos pineos virides duos: rure viridia vnc. ij. ſa-  
lis ammoniaci, niri, cuiusq; vnc. iij. vini veteris  
ſextario duos: muſti boni vaſcula duos. olei ve-  
teris lib. v. præparato diebus quinquaginta. Ad  
dolorem laſitudinemq; tollendam, medicamē  
eſt longe accommodandiſimum.

Acopon Hære.

Acopon Hære, ad diuturnos dolores coxen-  
dicis, articulos impeditos, & paralyſin, admo-  
dum efficaciæ. Olei veteris, irini, laurini, pyraci-  
ni, cere, ſing. lib. vj. terebintine, piperis, eu-  
phorbi, ſing. vnc. iij. ammoniaci thymiamatis  
vnc. ij. caſtorij, opopanaci, chabani, medullæ  
ceruinæ, ſing. vnc. ij. Liq. abſilla liquata ſiccis aſ-  
fendito, & vnita vitior.

### GAL. DE COMP. MED. SEC. LOC. LIB. I.

Videtur non modò affectus ipſi, ſed et-  
iam ægræ temperies, naturæq; par-  
tia affecta, ipſam curationem com-  
monſtrant, alibi & nobis eſt demon-  
ſtratum. In hiſce aut commentariis,  
de compoſitione pharmacorū ad ſingulas cor-  
poris partes cōgruente, diſcere eſt animus: ad  
quod iam negotium accingimur, à vitiiſ capil-  
lorum exorſi. Porro generatio pilorum, eadem  
eſt quæ plantarum. Nam quemadmodū ex iſta  
quædam arte & arbitrio agricolæ, quædam iux-  
ta naturales cauſas proveniunt: eodem modo  
& in animalis corporibus, auro quidem alicui  
minu, aut hordei, aut aliud quoddam cerea-  
lium ſeminū in ſe ſiſta habenti, caput aſſimila-  
tionalis verd herbiæ quæ in aridioreſibus creſcit  
regionibus, reliqui totius corporis pilum ſimilem  
generationem ſortiuntur. Si quidem non ſecun-  
dum primam rationem, ſed per accidens quod-  
dam natura ipſa conſuevit gignere. Igitur af-  
fectus pilorum ſunt, rure perdidit omnimoda:  
tum coloris mutatio, qualis in virilgine alba,  
quæ leuē vocat, ſiſt conſuevit. In id genus autē  
affectibus, ſiue in aliis omnibus, ſumme curan-  
dum eſt, vt quæ præſidia adhibebimus, aut iu-

Curatione qua  
medicant.Pilorum gene-  
ratio eadem eſt  
quæ plantarū.

Pilorum affectus.

uent, aut certe non noceant. At qui vſus phar-  
ma-  
corum amethodos, non modò non prodeſt, ſed  
etiam obeſt frequenter.

De alopecia, caluitie, & ophialia.

Quem admodū ex plantis ipſiſ, nōnulli qui-  
dem ob humorum inopiam reſciſcunt extrah-  
ſcant: nonnullæ autem, quod humoribus à ſua  
natura aliena imbuantur: eodem etiā modo ca-  
pilli, aut propter penuriam humorum à quibus  
conſueverunt nutiri, aut propter prauitatem, cor-  
rum piſſolent: Ac propter inopiam quidem, cal-  
uities accidunt: propter vitium autē ſuccorū, alo-  
pecia, & ophialia. Etenim hiſſi capitis pars ſeſa  
penſa ſimilis in ophiali apparet. Alopecia autē  
ob ſeſa appellari ſet ſit, quod vulpibus frequen-  
ter accidit. Iam verò quales tunc ſint ipſi  
corrupti humores, ex colore cutis in capite faci-  
le hincbit tibi diſcernere. Aliis namq; albidior ap-  
paret, alia nigrior, atq; pallidior aliis. Quare in  
iſta primū totius corporis purgationem molie-  
ris, aut pharmaco pituitū ducente exhibito, aut  
quod bilem pallidam, aut nigram eliciat: conſe-  
cutura redvndante humoris, ex colore cutis iſta.  
Ego verò hiera exhibita ſemper ipſos purgauri  
aliquādo nigro veratū adiecto, vbi melanco-  
licum ſuūcum vacuare erat animus: aliquandō  
ſcimonio, ſi amara bilis purganda eſſet. Vbi ve-  
rò pituitioſiorem exuperare humorē conieci, ni-  
hil admiſiſi. Tales ſiquidem, præſertim ex capiti-  
te, hiera ex colocynthide purgare humores con-  
ſuevit: ſimulq; cum iis alios quosdā, etiā ſcama-  
moniū, aut veratū nigrum, aut epiſthymū, non  
addatur. Carapona etiam ex aloē, quæ tum ſcam-  
moniū, tum colocynthidem admixtam habet,  
cōmodius ita affectos purgare ſolent. Poſt ho-  
ius autem corporis purgationē, apophlegmati-  
ſmiſi pituitam ē capite detrahare præſtat, ac dein  
localibus vii auxiliis. Cæterum incipiente ophia-  
ſia & alopecia, per aſtringentia & refrigerantia  
præſidia cohibere cōuenit: aduſe autē, digeren-  
tibus diſcutiende ſunt. Ego verò quēdā adole-  
ſcentē in principio affectionis curauit ſola purga-  
tione ex hiera diacolocynthido. Prius tamē ca-  
raporia ex aloē vndecim eſt edubueram, cicerū  
magnitudiſe. Habent autē cataporia hæc, colo-  
cynthidia partem vnam: aloē & ſcammōn, v-  
triuſq; partes duas: quibus partem vnam ſucci  
abſinthij addito. Antea verò etiam maſticheum  
Chiam, & bdelliū immiſcebat. Porro pharmacū  
extrinſecus adhibendū, ſi præter hoc quod vſu  
roa humores diſcutiat, etiam idoneū ſit ad pro-  
bum ſanguinem attrahendū, veluti eſt thapia,  
conſendū ſunt eſt optimū medicamen. At ve-  
rò cū thapia longē calidior ſit, quā affectus  
poſtulet, merito eiaſ per ſe vſum vitamus. Exvi-  
cerationes quippe excitare conſuevit, ac omni-  
no quosdam inflammatoſes tumores. Quamob-  
rem quædā quæ illius vehementiā mitigent, ne-  
ceſſariā admiſcemus: id quod ceratum ex oleo  
aliquo tenuium partium (cuiusmodi Sabinum  
eſt) præſtare cōmodē poterit. Vſus quidē ſum  
etiam ſola thapia, ſed vehemēt illa ſcaturale,  
larga quæ aſſuſione exoluta. Porro ex phar-  
ma-  
cis prædicto affectus conſuetibus, vehementer  
qdem calcaſt euphorbiū ſufficiet aut laurū,

Medicamentum  
ſit ſemper co-  
ſta, vt ſi non  
proſit, non la-  
dant.Capiti à qui-  
bus cauſis cor-  
rum piſolent.Capiti à qui-  
bus cauſis cor-  
rum piſolent.Capiti à qui-  
bus cauſis cor-  
rum piſolent.Capiti à qui-  
bus cauſis cor-  
rum piſolent.Hiera ex colo-  
cynthide.Cataporia  
ex aloē compo-  
ſita.Thapia ſcal-  
la.Euphorbiū.  
Laurum.

siue oleum, siue vaguen. Licet igitur ipsi per se  
viti, euphorbio quidem, olco introito, ac laeuiga-  
to: lanimo vero solo, citra altenus admissio-  
nem illi. Si tamen nimis fluidum appareat, pa-  
rum certe ipsi addatur. Cum vero nullo cali-  
dus sit recēs euphorbium, si quidem bimo, aut  
trimo ipso vitare, ad libram vnam Romanā o-  
lei, euphorbiū vnciam vnam iniicias: recenti au-  
tem euphorbio, sicuri & thapsia, & omnibus for-  
tibus pharmacis, parcius vitendum est. Peccatū

*Peccata infra  
mulum nō ad-  
ferre detrimen-  
tum.*

*Varyia phar-  
maca suas fa-  
cultates amittit  
re.*

*Vigor medica-  
mentorum ex  
quō, non ex-  
pendi possit.  
Alopecia con-  
gruente medi-  
camentis simpli-  
cia.  
Lanimo.  
Adactum.*

siquidem infra modum, nullum detrimentum  
adfert: supra verō, aliquando exasperat, exvicer-  
atq; cūrem, atq; inflammationē excitat. Simili-  
ter enā fugienda sunt omnia valde vetusta phar-  
maca: quandoquidem vel metallica ipsi, vbi ul-  
tis aūqua sunt, suas facultates amittūt. Vniū  
cuiusq; autem medicamenti vigorem, itē qm̄ si-  
pe ea conspexerunt, licet cognoscere, tum ex o-  
dore, tum ex gustu, atque adeo interdū ex colo-  
re consistennāq. Est itaq; inter ea quę alopecius  
conferunt, calidissimum medicamen euphor-  
bium: eo autem minus calidum est thapsia: post  
hanc, sinapi nāsturtiūq. Juxta alium autē mo-  
dum limuris (quę adargū & adarce vocantur)  
nulli horum secundum est. Post hec succedunt  
sulfur, & niri spuma, ipsiusq; nitrū molle, v-  
strum, & quod Berenicaiū vocant quemadmo-  
dum & aphroditon albū, lreuz, atq; laxū. Dein-  
de veratrum vitruūq; & eryx semen, & laurini  
vnguentum, aut oleum: adhuc alcyoniū vitru-  
que, vitum, & non vitum: calamig; tum radices,  
tum cortex, ambo vna. Qm̄ & pūx liquida, &  
cedrinum, quod cedriam vocat, & muniū ste-  
cus, vtriusq; adeps. Hyenæ etiam, leopis, pardal-  
lis, anserisq; adipēs congruunt: & quicunq;  
tenuium partū substantiam sortiuntur. Amygda-  
le etiam amaræ torce vtriusq; cōmōdū sunt: & thus  
aceto acerrimo maceratum. Ita itq; omnibus  
pharmacis licet vtriusq; fortibus quidem, ceratū  
liquidum temperans: debilibus verd, laurinum  
oleum immiscens. Rursus in veteratas quidem,  
ac difficulter curabiles, cum fortibus persana-  
re conaberis: incipientes autem & paruas, cum  
imbecillis.

#### Ad Alopecias composita.

Euphorbiū, thapsia, laurini, sing. drach. ij. sul-  
furis viui, veratri, vtriusq; drach. i. cere drach. vj.  
Misceto, vitrodq; hoc, ceu fortissimū pharmaco,  
ad inveteratas, xgrēque curabiles alopecias. Si  
thapsia non addit, pro ipsa licet tantundem adii-  
cere seminis nasturtij, aut eruce, aut ipsiusmet  
nasturtij. At loco laurini, picē liquidam pones.  
Admiscui etiam aliquando mel, nec deterius e-  
vasit pharmacum. Porro quę ex adipibus, ac  
modica irem thapsia constant, similiter profunt,  
præsertim si euphorbium & adactum addatur.  
Sit autem adipis leonini, pardalli, & hyenæ, cu-  
iusque pars vna, quibus miscere anserinum atq;  
vtriusq; poteris: ita vt ad duodecim adipum  
vncias, thapsiæ aut euphorbiū vnciam vnam ini-  
cias: quamquam ambo etiam potes adicere, si  
efficer fortius pharmacum velis. Aspicari au-  
tem semper à leuioribus cōvenit, & respectu ef-  
fectus, quem pharmacum primū admodum pro-  
duxerit, sic facultatem eius aut lenire, aut auge-

*Alopecim inue-  
neratū optimū  
medicamen.*

*Laurinū me-  
dicamentū esse  
in primo vtru-  
dū, quādo alo-  
peciam medetur.*

re. In alopecia igitur, primū quidem capillos no-  
uacula tollere expedit: dein affectam cūrem per  
linetolū nec alperum, nec molle nimis, confri-  
care: ac videre ad quantum ruborem per huius-  
modi mononem pervenit. Magnā namq; spem  
succesuræ curationis tibi inieci, si per modi-  
cas defrictiones rubescat: quę moderate affe-  
ctionis significatio exiit. Si verō per multas fri-  
ctiones tandem succedat rubor, grauiorem tum  
affectionem, tum curationem indicat: præser-  
tim si quedam cuticula, etiam si multum confri-  
ces, non rubescant. Præ omnibus autem cauē-  
dum est, ne in fortium pharmacorum admotio-  
ne, cute vitā quā par sit, concalcēcat: quod  
tum ex colore ipsius, tum tactū deprehendes.  
Colore nāque thapior apparebit, & digitorum  
contactu satis calidam agnosces. Quare tunc ad  
molliora transiendum: aut eodem vitendum quid-  
dem, sed ceratū, aut adipia, aut liquoris cuiuspiū  
olei, vi ipsius exoluta. Vitendum est & olei ca-  
lidi dulcis irrigatione, & cataplasmate ex pane,  
fomentisq; & scarificationibus: nec non cucur-  
bitis, & cerati invectionibus. Ceterim perse-  
uerante affectione, vitendum est astricta rasura,  
& rubificatione ex sinapi, præscriptisq; frictioni-  
bus: sequentibus autem diebus, illa pice, aut o-  
leo cedrino, & post frictionem, scarificari. Qui-  
dam verō acicularū aceruo affectam cutim com-  
pungunt. Post hæc omnia, pharmacis quę ex al-  
to evocare, & meatus transmutare possint, ven-  
dum. Curandum autē perpetuū est, vtrā aīre ca-  
lido, insolatōq; (si id fieri possit) omne pharmā-  
cum appliciter. Hyemis vero tempore, præfere-  
rir in balneo lris pharmacis vti. Porro alcyoniū  
vitum, alarimq; ex lucernarum olco, mediocres  
discutit alopecias, pharmacum mediocres cum  
sit. Est autem lucernarum oleum communi ma-  
gis tenuium partium.

*Alopecia scilicet  
curabitur argu-  
mentum.*

*Alopecia rubi-  
la curatur.*

*Alopecim.*

*Lucernarum  
oleū quādo  
commune.*

Aliud Herz, ad molli carne preditos.  
Sem. eruce, & nasturtij, niri, sing. partē vni:  
contritis affundito picem liquidam, vitrodq;.

Aliud à Crione descriptum.

Eriaceorum cinere permixto vtrino adipi,  
vitior. Aliud. Calami radices vitas, adipēq; vi-  
fino exceptas, impone.

Aliud ad inveteratas.

Muscerdæ, thuris, cuiusque drach. ij. aceto a-  
cerrimo dissolutis vitior. Aliud. Cancrum ran-  
narum minimarum in ollula vitarum, muscerdæ,  
veratri albi, radices calami vitæ, pipeni al-  
bi, singulorum æquis portionibus aceto exce-  
ptas, fricato.

Aliud ex libris Cleopatæ.

Sandarachā tritam, largōq; visco querno ex-  
ceptam, loco per nitrū prius preparato, imponi-  
to. Aliud. Scillæ, veratri albi, vtriusq; drach. j.  
ex aceto trita, prærasis & nitro confrictis, im-  
posito. Aliud. Muscarum capita contrita affrica.

Aliud præcellens. Murum domesticorū vfo-  
rum, panniculi ampelini vtri, dennum equinorū  
vitiorum, adipis vtrini, medullæ ceruicæ, corti-  
cis calami, singulorum æquis portionibus simul  
exceptis melle, vitior.

Aliud Archigenis, ad alopecias in alrum  
progressas. Cum aceto, niri gleba, aut sicci fo-  
lia,

*Alapicis alium  
propolis reme-  
dia Archigeni.*

ilis, vique ad delatiationem defrica: deinde de-  
perio sanguine, betam ex vino coctam impone.  
Aut carcas vřas, cum vino, aut leuis farinũ ex  
vino, pro cataplasmate adhibe. Aut cantharidas  
vřas, pice liquida exceptas, ad ceratũ liquidi  
formam redactas, impone. Aut testudinis ma-  
rine sanguinem illine. Aut thapsiũ succum ce-  
rato exceptum illine.

Alud Asclepiadis Bithyni.

Spumę niri partes duas: salis ammoniac par-  
tem vnũ: quibus rum vřis, tum vřitis, acerrimũ  
aceto dalatis, přyscipitũ leuiter alopeciã illinito.

Alud Sorani.

Stercoris felis aut croci. lili drach. viij. fna-  
pis drach. iij. ex acri aceto læuigatas imposito.

Alud. Fici folia cũ aceto, donec laugo prodie-  
rit, affrica: dein sterbes succũ illine. Alud. Locũ  
p pumicę proritato, & sulfuris, spumę niri, ařio  
mazi, sing. equas partes mixtas cũ aceto illinito.

Ad calucentes partes præter ætatem, & ad men-  
ti pilos nõ nascentes, remedium.

Adipis taurini infolati lib. j. adarces vnc. j. suc-  
ci thapsi vnc. j. s. myrrhę vnc. j. polytrichũ, cal-  
litrichi, sing. lib. s. membri asinini, splenis asini-  
ni, ladanũ, sing. lib. j. Ladanum in modico vmo  
conterito: adipem ad aquę vaporem liquefac-  
to: dein asininum membrum asinarum, donec in-  
sumatur, radito: splenem vřum cum polytrichũ  
& callitrichũ in noua olla torrefacio: omnia de  
nũq. contusa gřecino, aut fabino excipito, & an-  
te balneum in vitor. Sciendum autem est, lada-  
num sordes esse ab hircorũ barbis desumpas,  
quas illi sibi ex cistili maiore contrahunt.

De capillorum defluio.

Est & alia pilorum affectio, quę ad raritatem  
cutis, inopiamq; subtilitatis pilos gignentis, con-  
sequitur, maxime superveniens a morbo conva-  
lescentibus. Quapropter curatio etiam hoc mo-  
do læsa: non eundem scopum, quem alopecie,  
habet. In alopecis siquidem, vt vitiatum humor  
consumatur, primariũ scopum habemus: in his  
verũ, vt capitis habitum roboremus, & alimen-  
tum boni succi attrahamus, cutiq; densitatem &  
raritatem moderatę restituamus. Quamobrem  
ad pharmaca humectantia aliquid moderatę a-  
stringens admiscere oportet, quale est ladanum,  
quod vtraque in se moderatę complectitur, quę  
ad hoc symptoma conveniunt: caliditatem nem-  
pe mediocrem, & astringendi vim moderatam.  
Quare si capiti prius raro, perfricatũq; aliquo  
mediocriter astringenti oleo (cuiusmodi Hispũ-  
nũ, & lenticinum est) illinatur, maxime ex vřis  
est. Nam quę vehementer astringunt, omnia et-  
iam refrigerant, & alimenti influxũ reprimunt:  
propter cuius inopiam capilli defluũt. Atqui in-  
tentio nostra est sanguinem affluentem non mo-  
do non præpedire, sed etiam proleſtare: cogere  
autem sensim, & astringere rarefactam cutem.  
Quare ad defluosus capillos omnĩ præstan-  
tissimum medicamentum est, quod ex ladanũ, & lenti-  
cino oleo conficitur. Quod si large defluũt ca-  
pilli, maiors videatur esse raritas cutis, pro leni-  
tissimo, myrte vřendum. Licebit aliquando va-  
guentum adhibere nardium, in ætate frigida,  
& hyemali tempore: sicut in diuinibus solariũ,

& spicatũ. Debet autem ladanũ liquari in da-  
plici vase, ac reliqua postea illi misceri. Atq; hæc  
sanę medicamenta mihi iusscerunt, vnũ cum re-  
sectoria, salubriq; victus ratione, quę in plenisq;  
etiam sola iusscit.

Arclugenis remedium contra de-  
fluosus capillos.

Ladanũ & abstinũq; æuales partes, & iunipe-  
ri baccas x. tritas, in linteolũ illigato, & in oleo  
per dies quinq; macerato, ex eoq; caput illinito,  
& neq; capilli decident, neq; gignentur surfures.

Alud Cleopatre, capillos augens citũ,  
densũsq; & denigrans.

Ladanum ex oleo, vniũq; dulci læuigatũ in-  
crassarũq; præfrictis illinito.

Comptonia ab exornatoria medicina par-  
te, quomodo diserat.

Comptoniæ quidem scopus est, inducere pul-  
chritudinẽ. Exornatoria medicina partis, quic-  
quid secundum naturam est, id omne in corpo-  
re custodire: ad quod etiam naturalis pulchritu-  
do cõsequitur. Indecore enim aspectũ est caput  
alopecia vitiarum: si vni oculi alius & su-  
percius nudati. Non solũ verũ ad pulchritudi-  
nem, sed multũ prius ad ipsam partium sanita-  
tem, pilũ conducunt. At faciei colorem per pha-  
rmaca nřidorem, aut rubicundiores reddere,  
aut pilos capitis crispas, aut flosos, aut nigros,  
aut auctos: hæc inquam comptoniæ prauitatis,  
nou medicę artis sunt opera.

De tincturis capillorum.

Quandoquidem tamen iam consuetudo hæc  
invaluit, vt vetulę quidem passim capillos de-  
tingent, tanquam turpe sit canos habere: mari-  
ti autem id probent, spectaculum permoleſum  
censentes, vxorem anculam cano capite habere  
sanę quęcunq; præ deliciis seipsas ornant, ea-  
rum nulli tale quippiam a me petenti, exhibui:  
quęcũq; verũ honestiores, tum vi norę culpam  
effugerent, tum vt molestias maritorũ vitarent,  
capillos luos nigros reddere optarunt, his certę,  
ne ex astringentia vi nigrorem inferentũ oblate-  
rentur, consuevit, vt cedri liquore vterentur, ita  
vt tribus aut quatuor horis ante balneum illine-  
rent, & postea deiergerent: idq; per quatuor aut  
quinq; dies facere pergerent. Cedria siquidem  
non modũ nihil ledit, sed etiam cõmoda est eis  
quę facili offenduntur a frigore, abinde videli-  
cet calfaciens. Ad hæc, defluentes capillos corri-  
git, & non defluentes, auctiores reddit. Contrũ  
verũ, quę ex austis & acerbis composita sunt,  
magnopere lædunt. Ceterũ materia ex qua  
constant hæc, etiam quippiam tenuium parti-  
um habeat oportet, quũ non in superficie tan-  
tũ, sed in profundo etiam cutem permutant,  
progrediũdo vsq; ad capillorum radices. Non  
solum autem in periculo versatas sepe scio fe-  
minas, sed & mortuas, ex perfrigeratione capi-  
tis ab huiusmodi medicamentis inducta. Offen-  
duntur tamen citius, quę frigidius capitis tem-  
peramentum sortiuntur. Frigidę namque parti-  
cule frigidis affectionibus, calidę calidius con-  
spiciuntur faciles. Verũ minus periculum  
subeunt, vapore cũ a minori causa igrantur,  
quę frigidius habent temperamentũ. At calidę,

*Comptonia ex  
ornatoria at-  
tu pars quomo-  
do differant.*

*Pili ad quid es-  
serent.*

*Animæ ex ca-  
no capite vno-  
rem habere. Et  
locum in capite  
distingui.*

*Capitis densi-  
gram eadem in-  
quere.*

*Sinibilibus affe-  
ctionibus in facie  
lucis facula cap-  
ripa, minus ra-  
tione periculosa*



propterea quod ægræ & vix tandem lædi à frigidis causis possunt, si quando à magnis fuerint exuperatæ causis, maiorem lationem incurrun.

*Periculatissimi in morbis siquidem minus periculatissimi illi, quorum naturæ, ætati, habitui, ac temporis, ipsa ægritudo congruit.*

Tingentia capillos, ab Archigenæ prodita.

*Capillos tingentia, ab Archigenæ prodita.*

Raditem capparis cum muliebri lacte vel aſſinino ad tertias cōcoquito, & ad noctem pro captaſtimate imponito. Aut vrina canis in quinque aut ſex dies aſſeruata lauato. Aut corticis ſalicis ſuccum ex oleo affricato. Summè nanque denigrat. Denigrant barbam ſuber aridum & plumbum vſtum, cum betæ crudæ ſucco mellis ſimilitudine illita. Fuluos autem reddunt capillos lupini crudi cum aqua & nitro illiti.

Criſpos reddes capillos, ſi ſpuma ſalis cum myrrha confricaueris.

De pharmacis corruptentibus pilos.

Ex pharmacis corruptentibus pilos, quædam propriè pſilloſa nominantur: quædam capillorum attenuatoria: quædam penitus extirpantia. Atq; hæc ſanè vltimò nominantur, periculoſiſſime vſus. Ex liquidis igitur eſt luxurium tali vi præditum. Ex aridis autè & metallicis, aſſenicū, & ſandarcia, & calx non exincta. Maniſeſtum itaq; eſt, vehemētē ipſorum vim, per admiſſionem imbecilliorum pharmacorum frangi: quorum congruentem miſcèllem modum conſueti primò, qui ipſorum vires cognorit. Dein verò per experimentum defectum corriget, aut etiam ad det.

Pſilloſa Cronia.

Calcis viuz partes duas: auripigmenti partē vnā. Hęc in mortariū plumbeū coniecta, aqua aut priſanq; ſucco aſſuſo terito: atq; vbi nigra red dētur, calcſacta illiti, maxime in balneo, iubeto.

Aliud. Amyli, calcis viuz, auripigmenti, ſing. vnc. j. contritis vtriusq; ex aqua diluta.

Quæ pilos diſperdant.

Diſperdentia pilos componunt ex lepore marino, hepate thuruni putreſcēto, cedria, ranarum cruore, maris teſtudinis ſanguine, lachryma vitis albæ, lachryma liederæ, ſimilitèq; bryonix, atq; oleo inſuſo. Ex mariis item ſcolopendrix, vtriusq; marina, & ſtellis marinis, nitro, & amurca, ad hæc admiſtis. Quin & fortiora liis ex erinaceis & ſalamandra cōponunt, in oleo coctis. Admiſcent autè ipſis alcyonia, & ſandarachen.

Quæ pilos attenuant.

Attenuantia pilos, deterſoria ſunt facultatis. Igitur hordei, fabarū, atq; erui farina, ſpuma nitri, atq; ipſum nitrum, familiaria pharmaca ſunt, omnibus ad tollēdas ſordes vſurpata. Aſſiduus autem eorum vſus etiam pilos attenuat. Quæcumq; verò fortius detergent, in iis qui valde duros & magnos pilos habent, adhibere oportet. At talia ſanè ſunt, nitrum vſtum, nitri ſpuma, & aphroditrum ſpumofum, pumex, teſtæ viſæ, oſ ſepiæ, vtrunq; veratrum, ſtruthium, bryonia & dracunculi radix, ariſtoſchia vtrag; canchry, radix panacis, atq; eidem genus alia. Quod ſi hæc ipſa odorata facere viſ, pyperum, meliſſotum, roſas ſiccæ, iuncti odorati ſtorem, indem illyricæ, meliſſophyllum, & cydoniam herbam eis admi-

ſcebis. Si verò pro dinitibus pharmacum præpareſ, ſpicam nardū Indicam, Celticām, & montanam inlicēs: necnò Eretria terra, ſolum malabathri, amomum, myrrham, crocum, coſtum, & hedyſtironum.

De furfuribus.

Quibuldam ſe ſcalpentibus, furfuribus ſimilis ex capitis cutē dēdūt: ob idq; medici hoc ſymptoma furfures vocant, à vitioſis iuſdemq; ſeroſis ſuccis provenientes: quos abſumere propoſitū eſt, iis qui ſuiſe malo mederi volūt. Maniſeſtum igitur eſt, diſcuſſoria & exteſoria pharmaca adhibenda eſſe, præparato prius vniuerſo corpore, ſi vitioſis ſuccis redvndet. Admiſcuere quidam huiusmodi pharmacis etiam aſtringētia nōnulla, quibus partē læſam ita corroborarent, vt non facilè influentes humores ſuſciperet.

Remedium Archigenis contra furfures.

Nitri ſpuma, & aramentū ſutoriū æquis partibus, cum vino tundito, vntorq; ter aut quater in menſe. Aut vini Rhodij ſiccum, & pumicis, & nitri, pares porſiones, cum lapinis aſſrica.

De phthiriaſi, hoc eſt, morbo pediculari.

Pediculi nōnullis in capite æruatim gignuntur, ex multis humoribus calidis quidem, ſed nō ad tantam caliditatem progreſſis, ad quantam perveniūt acres atq; ſeroſi humores. Quare maniſeſtum eſt, in profundo cutis, pedicularis morbi affectionem fieri, vbi etiam animalcula huiusmodi gigni poſſibile eſt: nō in ſuperficie, in qua ipſi conſiſtunt furfures. Pharmaca itaq; ipſorum neceſſariò exiccantia ſunt, & quæ ex alto trahere & evacuare poſſunt, magis vique quàm ea, q̄ conveniunt furfuribus.

Remedia Archigenis contra morbum pedicularem.

ſtaphidis ſylueſtris partes ij. ſandarachæ & nitri, vtriusq; partem j. cum aceto & oleo capini illine. Aut oxyſtaphidis radicem cum oleo.

Aut veratrū album, & ſtaphidem ſylueſtrem, & nitrū, pari pondere cum oleo in balneo adhibe.

De achoribus, hoc eſt, vlcerebus capitis manantibus.

Inter affectus invadentes capitis cutē, achor annumeratur, ex genere tumorum præter naturam exiſtens: quo affectu infeſtata particula, foraminibus quibuldam tenuibus oroditur, tenui humore modicèq; viſcido redvndantibus. Ad ſi multitudine verò eius proximè accedit alia cum affectu, quæ Cerion Græcis, Latinis ſuaſus vocatur, habēs maiora foramina, in quibus humor hymettio meli ſimilis continet. Generatio ipſis ex humore mixto eſt, qui partim tenuem, ſeroſumq; at mordacē, partim craſſum ſuccū in ſe habet. Tenuis itaq; humor, vtpote mordax, primū quidem ad ſcalpēdum ipſos impellit: progreſſu verò temporis, ad ſcalpturam tum tumor augetur, tum foramina circa ipſum erumpunt. Maniſeſtum igitur eſt, humores qui affectionem gignunt, debere vacuari. Qui ſi etiam ſuaſus amplius, prohibendus in primis eſt ipſorū influxus per capitis atq; vniuerſi corporis evacuationē.

At verò ſi ſiſſectio ipſa ſit parva, ſola remedia localia ſufficiūt, vel ſi miniſe totū corpus vacuet. Ea igitur pharmaca idonea erunt, quæ craſſum humorem

*Furfur capitis à ſeroſis ſuccis eruoſus.*

*Furfur capitis eruoſus.*

*Pediculi in capite a quibus cum ſit eruoſus.*

*Pediculus morbi randoſus.*

*Achor.*

*Cerion.*

*Achorum, ſuaſus randoſus eruoſus.*

humorem incidant, quæq; facultate sua necessario disculant repellantq;. Atqui acetum ex iuculentum ordine existens, vltro hoc quod discutit, etiam teperrit, depellitq; id quod influit: cum nimirum secundum substantiam suam habeat eam quæ quid calidi plurimum autem frigidi, sed tenuum partium. Effe autem debet acetum exquisitè acutum, in quo nulla penitus vini qualitas perueniat. Actali profecto pharmaca metallica imbues, achoribûsq; ex ipsis medeberia. Incipere autè ab imbecillioribus præstat, præsertim si simul dolor infestet. Apra igitur ad hanc rem sunt, Cimolia, Cretica, Lemnia, Samiaq; terra: præterea pompholyx, spodiû, lithargyros, & cadmia tenella. Quod si his remediis malum non cedat, pharmacû ex charra ficû, aceto dilutû illi nito. Prius tamen capillos abradas. Quod si quid in vlcus manans inflammatum simul & afflictum dolore incidas, lenies primû dolorem ipsum per humectum concoctoriûmq; & emolliens pharmacû, & quod acrimoniâ arcere possit: cuiusmodi sunt tum vocatâ Parygron, tum quæ sedes vlcis erub, & cancris opitulatur.

Remedia Archigenis ad achoras.

Cadmia cum oleo veteri illinito. Aut cannabini similiter miti imposito. Aut chalcidem cû myrteo oleo, vel faullo felle liquido inungito.

Remedia Apollonis ad achoras.

Caput succo betæ illinito, aut laurino oleo, aut crocino vngueto, aut taurina, aut camelina vint. Vel fursurû chemicum dimidium in aquæ heminis duabus madefacito, posteaq; terito, cremorèq; excolato, cumq; dimidia acetî homina ad lini spissitudinē coquito, & ex eo caput fricato. Vel cucumeris agrestis radicû coctum succû partē lesam illinito. Vel argenti spumę drach. vii. foliorû rutæ tenerorû drac. v. olei drach. vii. acetî quartam partem heminis, simul trita capiti illinito.

Quæ Crito ad achoras prodidit.

Ficulnæ furculos, aut folia tenera trita cum aqua imposito. Aut rectemenn ferri, & rosarû par pondus cum vino tundito, impositûq;. Vel lithargyri drach. l. foliorû rutæ tenerorû drach. xiv. aceto diluito: & rosaceo, aut myrteo exceptum, cum penna illinito. Vel, si affectus fuerit inveteratus, ladani, cerussæ, sing. drach. vii. sulfuris viui draculm iij. vino & myrteo oleo subactis vtrius.

Ex libris Cleopatæ ad achoras.

Feno græco tenui cocto, & in betæ nigri succo macerato, caput eluatur. Post ablutionē verò myrto cum vino & oleo trita, illinit: supernèq; betæ folia imponant. Vel cerussæ, thuris, sing. drach. i. sulfuris drach. j. trita ex oleo illinito.

Remedia Sorani contra achoras.

Plumbaginis, sulfuris viui æ qualēs partes terito, & affuso rosaceo, aut myrteo, aut leuiscino, illinito. Vel sulfuris viui, lithargyri, cerussæ sing. æquas portiones, croci dimidiâ, trita cum passo Cretico illinito.

Ad pydracis & achoras, pustulâsq; vlcerosas, & eruptiones in capite.

Ad affectiones præscriptas, convenienti vii oportet victus ratione: corporisq; atq; caput pur-

gare, cataposis ex aloë, colocythide, & scissomonio, succo brasiacæ cosctis. Deni localia remediis adhibenda sunt: cuiusmodi existit adiantum ex rosaceo illitum: aut fumigri decoctum affictum: aut malua cum farina hordeacea pro cata plasmare imposita: aut mellitû cum farina fumigri, cicerumq; decocto impositum: aut ipsum met cicer decoctum, impositumq;: aut amarû nûces cômause & illitæ. Discunt autè maximè & lithargia afficta: & tius cum vino & aqua, & lupinorum amarorû decoctû, & balbi cum nutro afficti: tius præterea ex aceto illitum, potius mali punici cum laurino illitum, & anchusæ radix vltâ, tritâq; cum oleo, & per pinnâ inuncta.

## GALENI PERGAMENI de compositione medicamentorû secundum loca, lib. II.

Vi circa distinctionem scripserû auxilia doloris capitis, maius detrimentum q; emolumentum attulerit us, q; eis fidè adhibuerunt. Nec. n. omnes ob viâ affectionē caput dolent: sed tum ipsæ affectiones plures sunt, tum curatio ipsarum singulatim propria existit. Vna etenim affectio est iuxta intemperiem simplicē circa humores affluxum: alia iuxta humorû qualitatem versatur: tertia secundum eorum solam multitudinem accidit: quibus accedit quarta, cum transitus liquorum atque vaporum ipsi humores obturât: ac præterea quinta, dum in quibusdam capitis partibus, propter imbecillitatē spiritus stauosus innascitur. Est eûm ob causam aliquam procatartica (cuiusmodi sunt ardor extrinsecus, aut refrigeratio, aut ebrietas, aut ictus) dolor capitis accidit. Vehementissimi igitur capitis dolores sunt iuxta caliditatē & frigiditatem, maximè cum inæquales fuerint: moderati autè iuxta siccitatē ad humiditatē verò nullus consequitur dolor. Eodem modo cum ob redundantes humores capitis dolor oritur, vehementior quidem ob calidos & frigidos accidit: moderatior autè, ob exiccantes citis calorē aut frigus. Humectantes verò, penitus nullû dolorē inferût, quantum ad qualitatem quidem ipsorû attinet: nam ob multitudinē sanè, innumeralium partium morbos efficiût, non tñ simalarium particularû vltum aliquē: cum nimirum earû morbi in pura intemperie consistant. Ad hæc affectiones ob copiam humorû ortæ, circa quidē obturationē caput grauius obturatione verò, si quidē ea moderata fuerit, moderatè dolorificæ sunt: sin fortes, vehementer affligunt. Quod si etiâ mordacem qualitatem multitudinis humorû sortiantur, etiam iuxta hanc dolorē augebit. Quod verò ad naturam affectarû particularû pertinet, interdû quidem extra caluriam affectio fit, aliquando intra: & interdum quidem omnes externas, aut internas partes infestat: interdû autem non omnes, sed vnâ tantû speciem corporis, arteriam nempe, aut venam, aut neruum, aut membranâ, aut cutem, aut ipsam deniq; cerebrû. In vniuersum igit, singulari affectionû curationis scopû rano nos docet: materiq; verò facultates experientia cômoustrat. Porro aliquando sola intemperie

Capitis doloris  
differencia, &  
generatorem  
naturæ.

Dolor capitis  
nulli est humo-  
rum affec-  
tus.

Similariâ par-  
ticulari morbi  
in parte in-  
tra transigitur.

Capitis doloris  
differencia, in-  
concordia diffi-  
rentiam affec-  
tionum partium  
colorum.

Ante familiat.

Particulari appi  
tu medicatio.

calida ex infolatu laborat caput: aliquando cum ipsa intemperie accedit etiam humoris affluxus, præcipue cum vniuersum corpus laborat plethia, quæ sit ipsa quatuor humoribus ex æquo au-

*Plethorâ ferri-  
quatuor ex æ-  
quo humoribus  
autem, aut etiâ  
fanguine sola.  
Doloris capitis  
ab ardore con-  
tracti indicio,  
et ceteris.*

ctus: aut etiâ sanguine solo. Nam cum alius quip-  
piâ humor redvdantur in corpore, nō plethorâ,  
nec simpliciter plenitudinem, sed pituitâ, aut bi-  
lis fluxus, aut atræ, tunc plenitudinem dicimus.  
Igitur eius q. ex ardore caput dolent, ceteris tactui  
tactui indicio, aridior ad primū contactum apparet: oculorū  
rubros habent, ac frigidis tum perfusionibus, tum  
illationibus, oblectantur. Principio itaq. re-  
pulsoria curatione est vitendum, ex refrigeranti-  
bus, adtingentibusq. cōstante. Postea verō miti-  
gatoria & concoctioa pharmaca, ad repulsoria  
miscere oportet. Deinde etiâ ex discussoriis q. p-  
piam addendum, paulatim detractus pharmacia  
quæ repellunt. Optima sunt autem cōfenda, quæ  
substantia tenuiū partiuū sunt prædita. Quapropter  
in principio quidē melius est frigidissimū  
rosaceū perfundere, iuxta frontē nēpe, & tempora,  
& occiput: nō tamē longē inferius. Neq. enim fa-  
cile exvritur ea pars: neq. etiâ circa noxam, re-  
frigerantia sustinet, propterea quod isthic prin-  
cipium medullæ spinalis existat, ad stipis modū  
in ramulos obpurescens, videlicet in sexaginta  
(ut existimo) nervos. At verō regio capitis iuxta  
sinuū sinciput, propter laxitatem coartulationia  
ad coronalem iuncturâ, & ob osium tenuitatē &  
varietatem, facile tum caliditatem, tum frigidita-  
tem omnium quæ adhibentur pharmacorū, in-  
trō distribuit. Quare siue refrigerare oporteat  
ex caliditate ardorē, siue calfacere frigiditatē, a-  
ppropinquemus est capitis luxta sinciput loca. Rosaceū  
autem ipsum, quo in exvitis utemur, ex oleo cru-  
do (quod omnia cōtinuā repellunt) citra salia admi-  
stione, cōfici debet: nempe rosæ plurimis in eo  
maceratis. Sit autem rosaceum nō vetus, sed eo  
ipso anno cōfectum. Proximū à rosaceo chame-  
melinum existit, quo vtendum in iis corporibus 40  
est, quibus inducere vehementem frigiditatem  
veremur: qualia sunt scæminarum, eunuchorū,  
puerorūmq., ac breviter eorum omnū, qui mol-  
li carne sunt præditi, albūmq. colorem sortuntur.  
Refrigerantia autem quæcunque adhibere  
voles, in aqua vehementer frigida collocata: quæ  
si non adsit, niuem vasculo circumpones. Etenim  
frigidiorum fontium & niuis maxima Romæ  
est vberitas, quemadmodū apud nos in Perga-  
mo. In regionibus autem calidiss, qualis Aegy-  
ptus est, vbi maxima fontū frigidorū atq. niuis  
penuria, sub dio rosacæ per integrā noctem ex-  
poni debet: eiq. sempervivū, aut portulacæ, aut  
laetucæ, aut psyllij, aut polygoni succum iniicere  
oportet: sicut & solani aliquando paululum, &  
pampinorū vitis, & vuarum immistaturâ. A pa-  
paveris verō & mandragoræ succo abstinendū,  
cum non citra damnum refrigerent. Vitanda etiâ  
sunt, quæ cum refrigeratione manifestē astrin-  
gunt: aut perexiguū quid ad refrigerantia miscē-  
dum, si quando necessitas postulet: propterea sa-  
næ & solani succū aut nunq. penitus, aut modicē  
certē admiscemus: sic etiam & mali punici, & mali  
cydonij, & mespili. Ad hanc tamen rem malorū  
punicorum acidorum succus præstantior est: ma-

gis enim refrigerat. Equidem aliquando cucur-  
bitæ cremorem permiscui omphacino. Poterit e-  
tiam quæ similiter seridis succo vti, necnon tum  
hortensia, tum sylvestris lactuca. Quin & moro-  
rum non admodū maturorum succus est aptus ad  
refrigerandum. Si igitur calvus sit, gerat aut bre-  
ues habeat capillos, vberimē refrigerari pore-  
rit, tum per iam dicta, tum per omnia illa quæ e-  
rysipelati auxiliant. Qui ex frigore caput do-  
lent, iis facies decolor, minimeq. arefacta cōspi-  
citur: & frigidis neq. gaudent, neq. item iuvant.  
Si igitur frigiditas ipsa sit recens, solum rutaceū  
oleum, si calidum affundatur sinicipiti, perfectē  
hominē liberat. Si verō vehementiori calore sit  
opis, euphorbiū oleo indat, & pharmaca quæ-  
cumq. constant ex pipere. In vtenda autē est fa-  
cies, actum aures, tum nates, præcipue lino, a-  
maricino, & nardino vnguentis: necnō foliatia  
spicatiq. vocant. At opobalsamū sepe experti  
sumus ad nullā affectionē calore indigentē, evi-  
denter opitulari. Sampsuciū autem, lauriniū,  
& serpyllitū cōmendo. Propinquandum præterea  
iis est vinum tenulum partiuū: & motus corporis  
præcipiendus, laua crōq. calida: & quandoq. a ra-  
phano vomitus. In capitis autem inveteratis  
affectibus necessariō pilos radimus, aut præce-  
camus ad cutim usq.: ac rasis quidem admove-  
mus pharmaca emplastica: liquida verō iis, qui  
breuissimē habet capillos præfectos. Ac si nē  
dicamenta refrigerantia, ex iis quæ erysipelata cu-  
rant, sunt transferenda: calfacientia verō, ex phar-  
macis calfacientibus conficienda: quoniam simpli-  
cissimū est ex euphorbio compositū. Sufficit autē  
vincem euphorbiū vnam, ad tres ceræ liquē  
factæ in olei libra vna, cōficere. Atq. vtendū qui-  
dem astrigentibus oleo, ad affectiones quæ indige-  
nt calore, non cōfice aliquo tenuiū partiuū, cū  
nisi modi Sabinū existit. Quibus autem ob po-  
tionem calidiorū vinorum, caput repletum va-  
poribus aut humoribus calidus (solerit enim li-  
vel absq. vini potu, suapte natura ad caput attol-  
li) dolore affigitur, lebendi si sunt, si crudū ad-  
hiuc in eis vinū permaneat, vt hūista aqua tepida  
vomant. Quod si etiam post concoctionē ca-  
put doleant, refrigerantibus ac repellentibus est  
vtendum: quale est rosaceum per se, & cum ace-  
to, aut hederæ & brassicæ cremore. Quin & ipsa  
brassicæ folia calida macerata, capitiq. circū po-  
sita, ac obligata, naturaliter ebrietas resistunt.  
Cæterū somni quietisq. cura in primis habenda  
est: vbi verō per totū diem quieserint, ad vespere-  
ram loti, citis boni succi nutriti di sunt, non tamē  
calfacientibus. Sūt autē tales, prisanæ suc-  
cus, & sorbitio ex alica, & panis ex aqua, & oua  
sorbitia absq. garo. Admiscatur autē eis ex mel-  
le, vel ex sole condimentis aromatū præparato,  
quantum sit satis ad suavitatē saporis. Ex olei-  
bus congruit illis lactuca, vrpote boni succi atq.  
refrigeratoria: necnon brassica, vitæ quæ vapores  
resiccit: & ex leguminibus lentis. Potu verō om-  
nino aqua vtendū est. At quia nōnullis ventri-  
culus à frigiditæ potu subvertitur, malum punici  
ipsa superedendū est, aut solū per se, aut cum ali-  
ta staccida calida, probēq. cōcta. Quin & mala  
Cestiana appellata in vrbe Roma, citra cōstitutū  
quidem

*Quidam nos fa-  
ciliorem, ut  
contra nervi re-  
frigerantia, quæ  
capitum spualis  
medulla cōstitit,  
spinalis me-  
dullam in se  
guta nervos  
distribuit.  
Siniciput regio  
neq. apta  
nec ad trans-  
mittendā vtrius  
applicandorum  
medicamentorum*

*Rosaceum ex  
seu comodo,  
quod est aspi-  
ci debet.  
Chamemelinum  
vero in quibus  
se vtriusq. cor-  
porum.*

*Refrigerandi  
medicamenta  
sunt.  
Perpauis Gal-  
lem patris*

*Superfusiōne,  
et quæ vberimē  
ter astrigentia  
sunt, vitanda, su-  
stine in capitis  
dolorum est.  
Refrigerantia  
sunt, quæ  
ut in capitis  
doloribus pos-  
sunt.*

*Doloris capitis  
ab ardore  
contracti,  
et ceteris.*

*Opobalsamum  
ad affluens  
indolens cal-  
re, non magis  
perit apertum.*

*Dolorum capi-  
tis inveterato-  
rum curatio.*

*Dolorum capi-  
tis ab ebrietate  
curatio.*

*Cestiana mala*

quidem sunt auctera: post cocturâ verò, stomacho evadunt comesta. Coquenda aut sunt ad vaporem aquæ suspensa. Abstinendum verò a pal-

*Palmas ex propriis ex- citare dolores sapient.*

*Albi inia com- plicata.*

*Balneo concu- las sanant.*

*Capitis dolor ob plagâ ortus, quo medendo supra largian- tur.*

*Dolor capitis ex ictu obor- tus, quo facit ex- citare parvas vesiculas capite.*

*Capitis dolor ex plaga, quon- da ex oculis peri- culosus.*

mulus est, vt quod ex proprietate doloris capitis excident. Quod si moderate iam habeant, & aquam libere nequeant, permittendus est eis potus alicuius vini diluti & aquosi, quale est in Italia Sabinum, in Asia Tiracaszemum. Quin & moderate habentibus, gallorum testiculi & alae, & saxatiles pisces, mollisq, exhibendi sunt: necnon columbari pulli. Hæc vero omnia, citra garum & vinum, in albis simplicibus coquantur iuribus, quæ ex aqua, oleo, anetho, ac modico porri confiant: ad cocturâ finit, salis pauillulo adiecto. Cæterum ante cibum quidem pluribus deambulationibus est vitandum: post acceptum verò cibum, breuibz ac lennis. Oportet tamen oec multa edidisse, nec itam post cibum sumptum inambulare, sed post duas, aut tres, aut plures liotas. Quod si quando a vaporibus aut humoribus in caput subleatis, reliquis quædam supersint, in poris ipsis, mentibus angustis impactæ, & ob id etiâ per seueret capitis dolor, non rosaceo, sed vitendum primû chamæmelino est, moderate calido: postea verò inno. In balneo verò caput calida perfundatur, non modo vt aliquod eorum quæ circa ipsum consistunt, dissolvatur, sed somni etiam conciliandi gratia. Quapropter secundû etiam, aut tertium, ad vesperam, balneum apparatus est: post quod exhibenda lætuxæ ex aceto, cui pauillulum, aut omnino nihil gari additum sit: verum aqua affusa multa, ita vt acerû exaquet: nisi acutum sit planè aquosum, quale vique illi desiderant: quando quidem quod a cernimû est, aliquem calorem sortitur. Post hæc verò postea die, quæ magis caput calcifiant, administranda sunt: ita vt ad innu, aliquando a marianum vnguentum, aliquando oë ordinum addamus.

At capitis dolor ob plagam confusum ortus, cuius est aliud quàm inflammatio, quæ non ex plaga solum aut casu, sed abq, manifesta eni causâ, iuxta omnes partes fieri ob affluxum humorum consuevit. Si igitur plaga vulneris aut contusionis exiit causa, plures scopi erunt ad inveniendâ præsidia. Vnus qui circa vulnus versatur, quod, posteaquàm fuerit constitutum fibulia, glutinâtia & acientia phlegmonem medicamenta postulat. Secûdus contusioni est intentus. Tertius totus in doloribus est: qui interdum quidem in ipsâ solis percussis partibus sunt, plurimum autem ad vicinas etiam partes se extendunt. Etenim pericranium, & eius cutis exterior, propinam continuamque substantiam habent, per totum caput extensam: ob idque facili contingit vulnerum caput dolore affici, præsertim si ad perissuam membranam, quæ cranio est adhiærens, plaga ipsa penetret: cui medicabimur diuidentes pericranium membrânâ, subditamq, illi os radentes, vtiq, illic rursus conerescat caro, curantes. Quod si ob commercium illud quod per futuras periosion habet cum duro cerebri involuero, etiam intra caluariam distribuatur phlegmone, non absque periculo talis dolor contingit. Contingit autem non raro, vbi quis ex sublimi cecidit, vt aliquid circa cere-

brum, aut membranas eius, rumpat: quod vbi cõigit, adhuc amplius iuualeat ipse capitis dolor, affectuq, tota ægre curabilis redditur, & periculum maius, magisq, præceps imminet. Opimum itaq, fuerit in his, nisi ætas prohibeat, vitæ læue facultas appareat debilis, curanone m a venæ sectione suspicari: & cõuentibus capitis irrigationibus subinde vri, oleo dulci imbuctes lanqam, capitiq, illam circumponentes. Quod si aut per ætatem, aut vires, non liceat sanguinem ipsum detrahere, descendenda alius per clystum est, tum vt eius excrementa vacuentur, tum multo magis vt reuelantur humores q, qui consueuerunt ferri ad affectus particulas. Postea verò auxiliis vtetur ad inflammationes congruentibus. Si igitur membranas cerebri vulnerata fuerit, egregiè ipsam conglunnat (vt ait Archigenes) calamitæ succus infusus, & farina miliaria inspersa: deinde butyrum & rosaceum, ac adeps suillus insulsus, vtriusq, omnia in vnu cõmixta, tepescatq, & infusa. Hoc modo affectus, a vino & cibis crassioribus abstinere oportet, maxime si correpti sint febri. Etenim affectio ipsa nobis auxilia indicat: quantitate autem singulari, particularitèq, materies differentiam, tum affectu parricula, tum ægri temperamentum cõmonstrat: necnon vitalis facultas, deinde ætas, ambiensq, eos æres temperies, iuxta regiones, anniq, tempora, & prædominantem anni constitutionè euanas. Porro ad plures nifcos, quando quidem omnia, quæ extra caluariam circa cutem atq, ipsum pericranium consistunt, immunia ab affectu sunt, restet, mea quidem sententia, aliis pharmacis acetum miscuerunt veteres. Si quidem ad affectuosos in profundo delitescētes, pharmaca diuersa ab iis, quæ affectibus in superficie hærentibus congruunt, debent administrari. Exoluitur namq, omnium ipsam vis in transitu per profundum: & ob id ad propria affectioni auxilia, aliquando contraria, & nocens facultate pharmaca temperamus. Quippe acetum ex se, cum nec mitigandi, nec laxandi vim habeat, præter rationem miscetur auxiliis iis, quæ ad dolentem inflammationem admi- stantur. Quia verò per simplicium pharmacû penetrare volumus, ob id sanè aliquod eorû, quæ in profundum deducunt, miscemus: interdum quidem frigida facultate, sed tenuium partium, prædurâ, cuiusmodi acetum existit: interdum verò calida, quale est euphorbiû. Quocirca, dum crassâ membranz cerebri nudæ infillamus rosaceum (quod fieri solet, vbi osiculum aliquod est exemptum) solum ipsum leniter tepescitum infundimus. Cùm verò circa denudatum, in- integra existente caluaria, rosaceum cupimus vi per simplicium ad membrânâ cerebri penetrare, acetum illi, vt ipsum perducatur eò, temperamus: cuius veliemus facultas, tum per viarum transitum, tum per rosacæ miscellam, exoluitur. Iam verò inflammationes quæ in capitis cute, etiam in pericranio consistunt, si quidem circa vehementem dolorem accidunt, per modici aceti ad rosacæ mifionem iuuari possunt: hæden- tur autem, si & magnæ fuerint, & dolorè vehementè induxerint. Ad hæc, rosacæ cum aceto,

*Menipem ceri- bra vulnerata digestissima.*

*Affectuosus sit- us profundus, di- uersa pharmaca ab iis quæ heret in super- ficie, desit derant.*

*Acutum cap mē- sionat rosaceo ad phlegmone.*

*Prælio crenis, cum modo infil- latis rosacæ tem- pli in crassam mifionem.*

*Acutum quon- da sit rosacæ mifionem ad af- fectuosum capitis.*

*Acetum rosacæ mifionem, quibus præstatur quibz affectuosum mifionem.*

incipientibus in vigore verò consistentibus, ro-  
faceum solli administramus: quemadmodum etiã  
in induratis, abinthium ei atq; pulegium misce-  
mus: nam quæ ab his duritie iam decreverunt in-  
flammationes, pharmaca laxantia desiderant.  
Porro ad dolores capitis, in quibus exicare est  
animus, como dissimili cataplasma ex lolij fari-  
na & adipe asserino conficitur. Sciedum autem  
est, myrrhæ odorem plurimis etiã sanis dolo-  
re capitis conciliare: unde eos ipsos qui iam  
caput dolet, non parum offendit. Opiò autem  
eo tantum tempore vti cogimur, dum præ do-  
loris vehementia æger de vita periclitatur. Ex-  
tinguit siquidem sensus, maximè solidas par-  
tes offendit, adeò vt postea correctione sit o-  
pus. Cum autem difficile sit, vt qui homo est nõ  
in multis hallucinetur, quædam videlicet peni-  
tes ignorando, quædam malè iudican- do, quæ-  
dam negligentiùs scriptis tradendo: mirũ cui-  
quam esse non debet, si aliquando deliquisse cõ-  
periatur Archigenes, in iis quæ de auranone ca-  
pitis doloris conscripserit.

De capitis dolore à ventriculo exorti.

Nonnulli autè vel si modicus humor in eorũ  
ventriculo colligatur, & præsertim circa os eius,  
statim caput dolet: atq; ob id, si diutius à cibo  
abstineant, offendantur. Angetur quippe efu-  
rientibus eiusmodi humorum malitia. Cum igitur  
huiusmodi affectus capiti proprij non sunt,  
sed ab humorum noxijs vaporibus à ventriculo  
volitantibus exoriantur: quemadmodum etiam  
ob id genus succos, alijs suffusorum sym-  
ptomata eveniunt: capiti adhibenda remedia  
nõ sunt, sed quæcellerimè qui in ventre cõsistant  
succo, vacuandi. Vacuantur autem in iis qui ad  
vomitus sunt proclives, faciliè ab aquæ potu:  
ægrè verò vomennibus, difficilior. His igitur co-  
nabimur q̃primùm cibum boni succi, ac ventri-  
culo commodum exalibere, si res ita ferat, à bal-  
neo: si non, ante balneum tantum cibi offere-  
mus, vt non lædantur inde postea lauantes. A-  
cena autem modicum abstinentia in potu dabi-  
mus: postmodò verò, in posterumq; similem vi-  
ctus rationem illis instituemus, donec ex acutissi-  
mè concoquant. Quo tempore iam licet illis  
modicum panis prætere circa tertiam aut quar-  
tam horam, aut citius, aut tardius: sic tamen, vt  
satis amplum spacium ad consueta balnei lo-  
ram intersit. Quod si qui panem absque obfo-  
nio edere nequeant. his oliuas, aut palmulas,  
aut uvas, aut tale pippiam addemus, iuxta na-  
turæ cuiusq; proprietatem. Cæterum ad prauo-  
rum in ventre colligendam succorum copiam,  
plurimũ conducit rum imbecillitas cõcoctricis  
potentior, rum oris ventriculi infirmitas: quem-  
admodum etiam ad capitis hinc dolores gigen-  
dos, tum facilitas sensus, tum caput ad eiusmo-  
di humorum vapores suscipiendos promptum:  
sic vti etiã & in nõnullis oculi. Qui igitur pro-  
pter acres humores caput dolent, mordacem

dolorem, non sensuum, percipiunt: at fames in  
tensionibus commoda est: contraria autem iis,  
qui mordaces humores collegerunt in ore ven-  
triculi. Quum itaque hic mordax humor fue-  
rit amarus, pallida & staua bilis vocatur: quæ

ob leuitatè insitam sursum fertur, ad os ventri-  
culi: cùm verò pituitosus, aut acidus, aut salisus  
fuerit, magis in totius ventris spacio cõdinetur:  
ac fuerit sanè optimũ, si in fundo ventris in co-  
ntineatur. Omnium autem est pessima constitutio,  
dum vinosi humores, ventris tunicis inelutabili-  
ter sunt defixi, & imbibiti: quibus educẽdis opi-  
um remediũ est hiera picta, cuius talis sit co-  
positio: Aloës drach. c. cinnaomol, spicæ nar-  
di, xylobalsami, cliax masticeus, asari, & croci,  
sing. drach. vj. Præstantius autem est pharmacũ,  
vbi minus de aloë additur, minùsq; etiã ex cro-  
co: quandoquidem nonnulli ex vsu ipsius obole-  
duntur capite, id quod sèpe ex solo eius odore  
perpetimur. Quare optima erit ea compositio,  
quæ aloës drach. sc. croci quinas receperit: qua  
sanè ipse vtor. Præstat etiam pro asaro carpesiũ  
conicere. Propinatur ad summũ ex pharmaco  
drachma vna cum aquæ calidæ cyathis tribus:

minimũ verò, dimidiũ eius præbetur. Cõfert au-  
tem hoc pharmacum iis qui suffusorũ afflicti sunt  
symptomatis, & mulieribus quæ nõ pro digni-  
tate purgãtur. Quemadmodum autem in ventris  
& intestinorũ regionibus ob caloris quidẽ mor-  
piam, interdum ex cibo ac potu vapor statulen-  
tus productur: propter imbecillitatẽ verò facul-  
tatis comprehendit, adeò insistant atq; replen-  
tur ea organa, vt ipsius quidem repletionis ra-  
tione tendantur: ob tensionem autè impensè do-  
leant: sic etiam in partibus quæ ad caput perti-  
nent, possunt hæc eadem cõtingere. Etenim ob  
dissolutionẽ continuatam partium dissimilariũ  
dolor oritur. Dissoluant autem ipsam, et denta-  
tia, dissecantia, dissidentia, vehementer calfa-  
centia, atq; refrigerantia. Si igitur erosiones, aut  
punctionis sensum percipiunt ægri, accredo vel  
humorũ, vel starus, causa putanda est. Si verò ci-  
tra mortem tendantur, sensio ipsa vel ab spiritu  
statulento, vel ab humoris colluue, obortur:

quod in genere phlegmone erysipelatis consistit  
phlegmone quidem, vbi plurimũ sanguinis affe-  
ctam particulam occupat: erysipelas verò, vbi  
biliosus fuerit is humor. Quod si ab vtriusque re-  
dundantibus aliqua pars repleatur, aut inflam-  
matio erysipelatoisa, aut erysipelas iustitiamũ ra-  
lis affectio erit. Maxime itaq; artis curandis coti-  
lectura in affectionũ cognitione consistit: quæ  
vbi in ventrẽ fuerint, curantur nõ cõnecturali-  
ter, sed scientificè indicant: cum hoc quod etiam  
cognoscere datur, q̃ ægrè aliquæ affectiones me-  
delis cedant in quibus vt vitam semper reme-  
dis ab indicatione profectis, rationi est cõson-  
num, tamet si nihil iuuare in principio videan-  
tur. Aliquando enim adeò vehementer in angu-  
stia meatũ statim vaporosus, atq; eo ad lucma-  
gis viscidus crassiusve humor impingitur, vt mul-  
to tempore ad curationẽ sit opus. Ac sanè quæ  
sic infarsa sunt, attenuare oportet, dilatareque  
meatus per quos excernant, habita simul provi-  
dentia, ne quid aliud amplius insuat: vtrũq; pars  
affecta corroboret, ne ipsa etiam statulento gi-  
gnat spiritũ. Qui igitur primi ad eiusmodi affe-  
ctiones pharmaca cõposuerit, meritò habuerũt  
opis materia variã: quidem in insuetè subtili-  
tatem, siue humor, siue vapor ea sit, repellere ne-  
cessarium.

Myrrha odorẽ  
conciliare dolo-  
rem capitis.

Opiò quando  
ad caput dolo-  
rem vti debet-  
mus.

Hemiasm in  
multis hallica-  
nari.

Capitis doloris  
ab ventriculo  
consensu exor-  
ti. & indicia,  
& curatio.

Vitiosus succus  
in ventriculo  
colligendus, quæ  
conservant.

Fames ad ver-  
sari in qui mor-  
daces humores  
colligunt in ore  
ventriculi.

Hiera picta  
potius meliora-  
tionem ad expul-  
sionẽ humoris  
statim veniat  
in inferos do-  
lores.

Hiera picta  
quibus cõgruat  
afflictibus

Dolor ventris  
naturæ.  
Cicuta autem  
quæ pinguet.

Phlegmonis à  
sanguine,  
Erysipelas en-  
sur à staua bile  
Tumoris cõpõ-  
si.

Cicuta autem  
ita modica in  
affectibus inges-  
tione consistit.

Profectus opia-  
mæ ex ipe in  
præcipuo nihil  
iuvare videtur.

impulsio efficitur  
quidam, ut cum  
in ditionibus

cessariū existit: impactū verd cōcoquere & attenuare, eandēq; ipsā discutere: ac nihilominus, imō longē magis, affectū parti robur inducere, ne videlicet qd inluit, suscipiat: vtiq; attenuatam excernat, impactūque concoquat, atque subtilius reddat. Ergo in propostā dispositione, si dolorificus calor vnā cum spiritu flauetū prepolleat, in principio quidem repulsoria curatione est vtendū, quæ ex facultate refrigerante consistat. Quod vbi factum moderatē est, ex mitigatoriis & cōcoctoriis quippiam ad repulsoria misce oportet: dein discussoria addenda, ita vt paulatim repulsoria detrahamus, donec pharmacum ipsum plurimum quidem digerēs attenuatoriumq; reddatur, minus autem concoctorium & mitigatorium, minimum verò repulsorium. Portulacā igitur refrigerans & aquosē subministrat: minus ea polygonū: in solano tantum crassē & terretē est admissum, quantū attractionis. Acetum repulsoriam simul & attenuatam, imō & discussoriam facultatē sortitur: vt pote quod secundū temperiem, frigiditate quadam tenuium partū præpollat, nō secus q̄ exquisitē serenū boreas. Rosaceum porrō, repulsoriæ, cōcoctricis, mitigatricis, ac deniq; discussoriæ facultatis est particeps. Vt ergo sermonem iam habitū repetam: neq; in biliosis causis iniungenda est inedia: neq; vtendum venæ sectione, si puer aut senex sit rger, aut virū imbecillitas adsit. Ligebit autem vti valides dysimī, quōd maxime hi possint reuellerē & capere, vacuareq; non modo quæ circa ventrem & mesenterium consistunt, sed etiā quæ in sinu hepatis hærent. Commendat autem Archigenes irrigationes ex ruta, oleo, & aceto intrita, ad dolores capitis: sicuti & succum baccarum lauri cum aceto & ruta. Scien dum verō est, aridam rutam effe multo acriorē, & calidiorem viridi. Qui caput ob humorem biliosum dolent, iis signa similia sunt eis quæ ab ardore proficiuntur. Accedit his maior morbus, & facies pallor, & nonnumquā oris amaritudo. Aetari autem vigoris, & temperatura calidioribus, & vix follicitæ, & iis qui itauam bilem accumulānt, hæc affectu præcipuē contingere solet. Itaq; balnea temperata, & vnctiones, & potus dilutus, eis exhibenda sunt, omnisq; victus ratio tum humidior, tum boni succi, cōstituen da. Evacuandus item biliosus humor per absinthii cremorem est, aut per aloē, & per ipsam picram anodonum, perfere datam, aut modico scammoni adiecto: vel per cataponia ex aloē confecta. Illinenda frons pastillo croceo, aut appellato Trigono, aut aliquo alio his simili. Si cum vniuerso corpore caput confortij lege afficiatur, prospiciendum illi est. Igitur si plenitudo humorum, ac maxime circa venas consistit, tunde mus venam. Si verō magis qualitas invaluerit, vtetur purganti pharmaco. Si caput vni tantū parti condoleat, vt hepatis, ventri, aut ipsius ori, illis in primis opitulabimur: nempe calida in ipsa præpollente intemperie, panem ex diluto vino exhibentes, sorbitio nescij ex alca: ac fortis etiam vntes irrigationibus, quæ tum refrigerant, tum firmitudinē addant. At si ob viscidos & crassos in vetriculo cōtētos humores caput

quis doleat, etiā hos exturbabimus, acetū multum in potu præbendo. Ex hyssopo etiam originos ponionibus, & quæ his adhuc valentiores sunt, magisq; incidendi vi prædixi, vtetur: nec non à radiculis vomitū, irrigationibusq; cataplasmatis calidioribus. In doloribus autē capitis qui ab initio invaluerūt cū febris, venā secanda est, post primū aut secundam remissionē, nisi quid impediat: & præsertim in corporibus bonæ habitudinis, & multo sanguine repleti duntaxat. Quod si senus post septimā diē dolor ipse præterierit, alio prius ab vnde per chyliferam solura, cucurbitulæ ad occiput, aut ceruicem, sunt assignandæ: capiteq; irrigationibus ex oleo foetidum: rosaceo quidem, & cum modico aceto, in calidioribus, & tempore æstiuo: chamæmelino verò, in frigidioribus habitudinibus, ac hyeme, quinta parte acetū illi adiecta. Illinenda frons in frigidioribus quidem est, ex cyphi: ex crocomagmate autē, in calidioribus. Porro virandæ sunt in omnibus capitis affectionibus. ea quæ subduntur: nepe vinici semē, absinthij succus, iacin potu, glandes quærcin in cibo, oliuæ nigre, arbuti fructus, erua, quod etiā exoluit articulos: emplus autem offendunt myrtha, thus, hederæ cū cumina. Mentē etiā perturbant lennisci fructus, crocus, peucedanū, ciclamini sicca cum vino epta. Syrtax modicus quidē potatus, tristitiam vulnus discutit: multus verò, somnos turbulentos conciliat.

#### De Cephalæa.

Cephalæa, in veteratū & agrē cedens capitis dolor vocat, qui ex leui occasione maximas exacerbationes habet, adeo vt neq; strepitū, neq; voces vehementiores, neq; lumen splendens, neq; vini potum, neq; odoramenta caput replentia, agrī perferre possint, neq; itē mori: sed in quiete & tenebris decumbere ob doloris magnitudinem velant. Etenim tanquā à malleo percussū sibi videntur. Sicut qui veluti contusū ac distendū sibi ea quæ circa caput sunt, sentiant: non paucis verò vix ad oculorum radices ipse dolor progreditur. Habet autē hæc affectio aliquāto quidem continuos dolores, aliquando verò exacerbationes, & intervalla. Manifestū igitur est, hanc affectionē consimilē aptitudinē capitis, vt obliedatur faciliē, habere, quemadmodū in cephalalgia. Verū ad maiorem imbecillitatē deveniūt in hac affectū particulæ capitis. Ac sanē quidā ex his affectus, cerebri involucria dolitant: quidā pericranij duntaxat. Dolores igitur cum grauitate, multitudinem humorū significant: cum mordacitate verò, obortā inflammationē: at cum tensione, si quidē circa grauitatē & pulsū accidat, spiritus tenuis ac flauellē multitudinē indicant: cum pulsu verò, membranosi corporis inflammationem: at si cum grauitate distentio accidat, humorū multitudinē intra membranas contentam arguit. Rursus, dolores quidē in superficie hærentes, pericranij affectionem significāt: qui verò in pfundū sunt, cerebri involucrium. Quibuscumq; autē affectibus intra caluaria est, iis vix ad oculorum radices dolor extenditur, propterea quod oculorum nuncij ex cerebri involucriis suam

Capitis dolorū  
si febri ab  
natio affligitur  
curatio.

Cucurbitula  
quidē affligit  
de occipite.

Capitis in  
omni dolore  
quæ  
sunt vitanda.

Crocus per  
horum mentem  
Syrtax facili  
est.

Cephalæa de  
sorptione.

Cephalæa mag  
is dicitur facili  
tari, quam ce  
phalalgia.

Cephalæa va  
ria symptoma  
ta à causis di  
uersis prodita

Dolor capitis  
sæpe caluaria  
firm, curatio  
datur ad ocula  
rū vix radice.

Aut faciliat.

Aut frigiditas  
transmissa remou  
peritum.

Aut faciliat.  
Aut non esse  
revelat. ut cau  
si bilis sit.  
Vena ut quib.  
ni sit facienda.  
Chylus fortis  
vnde reuelat  
in capite.  
Capitis dolores  
remouet.

Capitis doloris  
si bilis vntendi  
ne curatio.

Aut quibus  
si bilis vntendi  
ne curatio.



ducunt originē. Si verō putrefactus humor calidior fiat, cum febris capitis dolor invadat. Febricitant autē omnino, & qui dolent propter inflammationem. Si igitur totius corporis plenitudo sit in causa doloris, sanabis ipsum, corpore universo vacuato. Si verō imbecillū exiens caput, sublatos ad se humores ac vapores susceperit, materiā revellere oportet in totū corpus, atq; ita mederi particulæ. Revellemus itaq; & clysmis, & vinculis extremos, & plumbis infernariū partium fri-

Revolvendi a capite medi d'nerbi.

Venam refrigeram in nuchâ, convertere ad dolorem capitis.

Eritima.

Caput esse vacuandum post totum corpus vacuationem. Repellentia.

Digerentia.

Verbenaca rella facilius.

A telli. Papaveris capiti cibum quid sit nolite revocare.

Sal est ad capiti fomenta saporum.

Persea fructum in Persis letali est, in Aegypto autē innocuū.

Cucurbitula in affectibus capitis quid sit revocanda.

Culicidia spiritus.

vocāt) florem quidem, olfactu auxiliari dolenti capiti, aut Archigenes: folia autem nocere.

Sternutatorii ab Asclepiade scriptum.

Veratri albi, rad. cucumeris sylvestris, struthii, sing. partes ij. castorei, acori, natri rubci, euphorbiæ, cumini Aethiopici, sing. partē j. trita misculata. Medicamentum ab eodem traditū, quod manum caput purgat.

Sternutatorii ab Asclepiade scriptum.

Piperis albi, origani, staphidis sylvestris, castæ, sing. drach. ij. excipiantur passularum exacinararū, aut caricarū carne, & mandenda exhibeant. Ceterum nō statim a principio efficacissima adhibere cōvenit, sed a debilioribus auspicari. Porro forma pharmacia, quibus ad movenda sternutamenta viturur, mitigatorio admixtione lenita, moderata sunt. Ob id quædā ipsorū muliebri late rectū & aqua diluo: post hoc oleo dulci: dein betæ succo: & anagallis quæ florē cæruleū habet, indem succo: atq; ita sensim in vſu eorū progredior, donec postremū etiā per opoballam rala dissoluo. Ego autē melancholico soleo infundere naribus: aliquando quidem acetum acri præmaceratū, aliquando oleo veteri intritū. Internum verō dum æger erithinis viturur, habeat os aqua plenum. De hemierania.

Apoplegia: sicut Asclepiades.

Eritima quid sit, levis debilis quæritur.

Os aqua replendum est, dum quis erithinis viturur.

Hemierania de scriptum.

Hemierania verō affectio dolorifica est, dimidiā tantū capitis partē infestans, interdū quidem dextram, interdum autē sinistram: quæ futura extensa secundum illius longitudinē, terminatur. Vt plurimū autē per circuitus exacerbat, influxu vaporū, aut humorū, causā dolori fuggerente. Quidā igitur ipsorū circa temporū musculos vehementer doliant: quidam dolorē longē vterius progredientē habent. Sunt qui adeo ve hementer crucient, vt ne manus quidē contactū facili ferant, au quibus palam est, pericranii affe ctum esse, neq; eius cutē o m n i o immūne ab af f e c t i o n e existere. Rationi igitur cōsentaneū est, vaporū aut humorū, aut vtriusq; influxū, aut a cerebro & illius involucri, aut ab universo corpore illuc trāsmitti. Quapropter ubi quis hemieraniam curare aggreditur, prius quali purga tione, aut venæ sectione æger indigeat, conside ret: atq; ita deinde ad capitis auxilia progredien do, tum per digitos fux manūs, tum per lente, dimidiā frontis partē, & eam maxime quæ circa temporis musculū est, confricando exalfaciati: id quod ante exacerbationis tempus faciūdm est. Post exacerbationē verō, pharmacia hemiera n i c i s d i c t i s v t e n d u m : si quidem multa caliditas in doloribus percipiā, iis quæ refrigerant quipiam habent: citra verd hanc, eis quæ sufficite exalfaciūt. Vtriusq; tamen aliquid ex iis quæ ro bur & firmitudinē addunt, in iſceā, quod astrin gentem videlicet facultatē sortiā. Porro ex meis præceptoribus quidam ad hemieranias inveteratas vtebat piperis albi, & crocomagmati, sin guliorum drachmis duabus, misſis cum euphorbiæ drachma dimidia. Cū autē citō facultas eu phorbiæ exolatur, in luviuscemodi sanē medica mentis nō est vten dū veteri. Est autē candidius, quod rectū est: nam qd in veteranū existit, sanio rem aut palidiorē sibi colorē cōferat. Similit er etiā & columbarū turricolarū, sibiq; viciū que rentium, stercorea, & atramenti scriptorū, licebit addere

Hemierania causa.

Hemierania curatio.

Hemierania inveterata remedia.

Euphorbiæ rones quid sit cōferre, palidius autem inveteratum.

addere vtrinſq; dimidiam drachmam, ex ipſiſq; omnibus aceto acerrimo diluam, cōficere medicamen hemicranicæ ſanāde donec. Ad hanc autem rem, Pergamentū noſtrum atamētum multo eſt præſtantius. Aliud pharmacū, ad hemicraniā, & omnē inveteratam capitis affectionē ſummē vtile. Croci drach. xv. chalcanti drach. x. aluminis ſuſcili drach. xij. myrrhæ, opij, omphacq; ſing. dra. li. an. gummi drach. xv. omnibus triſus viuum Falernum adice, & ruſus tanquam collyrium tere, deindeq; in paſtillos redige. Poſtea verò ex poſca dilutus vttere. Sæpe ſimpliciter euphorbij illitione miſti cum oleo & cera, ſum vus. Sufficit autem ad libram olei cuiuſpiam te nuiſ, cere quæ drantem iniciere, & euphorbij vn ciam vnā: quo quidem medicamine vtendum in ex tantum hemicrania eſt, quæ à frigidiſ cauſis oriſtur. Inuat etiam hoſ, ſi oleum tepidum in ſuſtulerit in aurem, euphorbij vniā, cum libra olei prius temperata.

# **GALENI PERGAMENTI**

de compoſitione medicamentorū ſecundu loco, lib. III.

De affectionibus aurium.

**A**urium dolores nonnulli quidem ſunt ex frigidiſ: nonnulli ob inflammationem, vel cutis meatū auris amictū, vel etiam n erui auditorij. Quæ verò ratione inflammatione ipſa partes inflammatas diſtendens, dolorē exci tat, eadem ſtutulentus ſpiritus, tranſiit non habens, dolore cruciat. Conſimilis etiam ſit dolor à ſeroſis humoribus & in toto corpore genitis, ei qui ex mordacitū humorū fornicibus aduenerunt illapſu cōtingit. Dolores igitur à ſola orto ſus frigidiſ, calſcicentia quæ celerim exur rant. In quem vium ſolent nonnulli ruſtici cineritatis cepas oleo replere, & in ſeruenti cinere modicē calſcicare, atque ita auribus ipſum inſun dere. Alij nō cepas modicę, fed alium etiam oleo frigentes poſtea ipſum inſtillāt auribus. Ego verò euphorbio omnino modico, ad multū vetus oleum admiſto vtor, velvtri etiam pipere exquiliſſimē trito. Prodeſt etiā amaraciniū oleum iſpiſ inſundi, & optimū nardū. Quod ſi aliquod oleum tenuiū partiū, in quo ruſi præcoxerit, au ri inſundas, magno opere tueris. Magnificē autē ois mitigat ovis candidū: quo etiā ad lippitudi nes vium uritēmq; lac muliebre. Plurimū iuvant item ex adipe aſinerio, vulpinog; inſundi tamē omnia debeat medio criter calida. At ſi inſtā matio adieſ, nardiniū vnguētū, cum pharmaco appellato Baſilico, cōmodiſſimē inſundi. Porro medicamen Baſilicon, alio non mine dicitur te trapharmacū. Eſt etiā & Comagenum pervtile, & ad ſpibus pharmacū. Cogēte verò dolore, neceſſum eſt etiā ſis quæ ſenſum ſtupefaſcit, vti Miſcet autē opij muliebris lacti, & ovi candido: que ipſa per ſe, ſiſpe auris inflammationibus con ſulerunt. Miſcet etiam & caſtoreo opium: ve rum multo ante vſum tempore, præparatū id eſ ſe oportet & miſcet quidē, in vehemētſſimis doloribus, parti in minoribus autem, duplo. Li quor quo hæc diſtinetur, ſit ſapa ex multo: multo nōq; magis hęc, q̄ dulcia vina, dolorē ſedat. Verū

ego nullum pharmacū dolore vexatis in fundo, neq; enā per lanam inſtillo: nimirum experientiā edoctus, quod præſtet neq; omnino contingere doloris tempore auditorij meatum. At remiſſo dolore, per auriculare ſpecillum, obvoluū lana molliſſima, partē dolentē foueo, pharmacūq; in iucio modicē tepedaſtum in aurifuforio ſpecillo: poſtea verò fornicibus tum oriſcio auditorij meatus, tum vniuerſi auris, mollem lanam impo no. Iam quæ ex fomentis craſſa & ſpiſſa fuerint, cuiuſmodi ſunt ſpicata & ſoliſata vnguēta, diſſolu da ſunt vnguēto nardini: vel ſi æſtis ſit, & caloris ſenſus & gram in aure inſiſtama inſerit: roſa ceo, vel amygdalino. Conſicitur bonū roſacē ex oleo immaturo, ſaliſq; experte, in quo pluri mæ roſæ ſint macerate. Si verò ſtutentiū ſpi ritū, aut humorē craſſum & viſcidū, qui tranſiit non habet, incluſum eſſe conicere, enam ex pharmacis liberantibus ab obſtuctione, quipiam admiſce. Porro frigidiſate antegreſſa, ſpiri tus ſtutentus colligitur, granitate verò capitis, eiſiq; pituitroſis & mali ſucci, frigidi & craſſi hu mores: quibus ſi accedat frigidiſ, dolores con tingunt. In his igitur ſpuma nitri, & nitri ipſum molle, cuiuſmodi q; aphorū, & oleum amygdalini, rationabiliter in pharmaca auricularia mi ſcentur. Ex hoc genere eſt vtrunq; veratrum, & ſtruthium, & amygdalæ amara, & ex tribus ari ſtoloſus, quęcunq; fuerint ad manū, & iris illy rica. Initices autem & cinnamomū ſi habueris aut, ſi id non habetur, caſiam, tum eam quæ Zi caſia duplex, gir, tum quæ Moros vocatur, ac præterea Carpe ſium. Aurium etiam meatas ab obſtuctione li berant, quæ lapides in renibus atterunt: atq; omnia breuiter, quæ tenuium partiū ſubſtantiam abſq; mordacitate ſortiuntur. Ex quorū nume ro eſt etiam cucumeris ſylveſtris radix, itēque bryonię, & ari, & dracunculī, & centaureę, & pō li, & omnino amarorū omniū. Ruſus, modera te aurium inflammationes, & nō pulſantes, ro ſaceo & aceto ſimul temperans, tepedaſtiq; at que inſuſis curantur. Glaciū etiam ex aceto in cote medica tritū, doloribus à modica inſtā matione ortis opitulatur. Præſtat autē paſtillum ex glaciū, multa ſanē vtilitatis pharmacum, prius præparatū habere: quiſ ex glaciū probē cum aqua pluviali trito, deinq; in paſtillū coactū, ex icarog;. Lucebit verò decimāſſimē gumi ad glaciū portionē addere, vt melius compingit in paſtillū poſſit. Quin & collyria ex glaciū codē modo cum aceto trita, eis proſunt, aurib. inſtil lata: atq; his nihil minus collyria ex croco. Vi cera auris recentia, tum glaciū ſolum cum aceto tritum curat, tum collyria ex eo omnia, & col lyria ex croco & ex roſis cōfecta: quemadmodū etiā quod Nili dicitur. Curat itē ea Damocratis collyriū ex myrrha. Quæ verò pure manāt citra dolorē, atq; id moderate pariuntur, iſſe medica mentiſ curant. At q̄ foritit aſſiguntur, per cuiuſ modi qualis eſt paſtillū Andronis, & q̄ ad Mu ſam referat, ſapa, modicog; aceto dilutus. Quod ſi hæc ab ipſo morbo vincant, ſcoria ſerri ad plu rimos dies in ſole ex acerrimo aceto cōtrita, le uigariq; eſt intrepidē vtendū. Huiuſcemodi etiā vlcera paſtillū meo ex charta combuſta, ipſe ali

Dolore affigen te, præſtat om nino non tam gere auditorij meatum.

Roſæ optimiſ compoſiti. Dolore auris à ſtutentia ſpiti ſ, aut à craſſiſ humoribus exci tat, curat.

Ariſtoloſchia triplex.

Aurii meatas obſtuctiſ quæ referant.

Aurium modera te inflammationeſ itenſeſ roſaceo & aceto ſimul temperato cur rantur. Paſtillū ex glaciū co, ad inſtā mationeſ auris.

Aurium vlcera ſanē remedia.

Aurii partium ſanā remedia.

Paſtillū ex char ta combuſta.

*Papaveris succum aurium dolores mitigat, affectionem autem non sanat, nisi ex accidenti quodam.*

quando curauit. Porro per papaueris succum mitigantur aurium dolores: haud item affectiones iuuantur: nisi forte ex accidenti quis eas iuuari dixerit, quod nimirum sedato dolore, atque inde somno sequuto, natura ipsa affectus dolorem gignentes concoquat. Per aurium autem inflammationes, gallinaceus atque anserinus adeps, si quidem euacuatum corpus inueniant, & humores, qui inflammationem excitant, non amplius influentem, dolorem leniunt, affectionique auxiliantur.

Si vero humore adhuc fluente adhibeantur, affectioni quidem nihil opitulantur, leniunt tamen doloris symptoma: ut si ob humoris acredinem aliquis morius contingat. At pharmacum ex papaueris succo omnia, sensum stupefaciunt: & ob id sane tunc solum illis cogimur uti, ubi nullum aliud mitigatum doloris contulit. Miscetur autem castorium papaueris succo, ut vehementem eius frigiditatem retundat: quo nomine etiam me conium ipsum, & quidem recte, nonnulli torret: quanquam fatius mihi videtur uti illo minime torrefacto, in veterato tamen, & cum castorio permixto. Porro galbanum sulfureo vnguento dilutum, mellis & rosaceo comixtum, discunt citra molestiam aurium inflammationes, in quas nihil fuit iam amplius, doloribusque a frigore opitulatur.

Ad vehementes aurium dolores medicamentum ab Andromacho scriptum.

Castorei drach. ij. succi papaueris drach. iij. opopanax drach. ij. spumæ lynci drach. j. passio excipito, & tepescit vitior.

Aliud eiusdem ad purulentas anrium & veteres affectiones.

Fabæ Aegyptiæ intermixtæ amaræ, aluminis scissæ, piperis albi, spumæ nitræ, croci, opii, malicori, myrrhæ, thuris, nardi, sing. drach. q. castorei drachmam j. aceti & mellis quod sit satis. Conficito.

Aliud eiusdem, ad dolores stantulos, & aurium sonitum congruens.

Nitri, myrrhæ, sing. drach. j. rosacei cyathi j. 40 aceti tantundem: simul tritis vitior.

Aliud ad aurium sonitum.

Veratri albi drach. j. castorei obolum j. spumæ nitræ sciquioboli: tritis cum aceto optimo vtere

Aliud ad purulentas aures.

Alumen scissum vitum, & myrrham cum melle terito, & præloræ auriculæ pharmacum lana exceptum imponito.

Auricularis compositio probata, ex Apollonii libris.

Myrrhæ, thuris, sing. drach. ij. nucum amaram drach. j. spumæ nitræ drach. q. aluminis scissæ, malicori, sing. drach. j. spicæ nardi drach. ij. aloës drach. ij. vini mulsi veteris cyathos ij. Arida trita vino mulso admisceto, & cocta in stanno vase reponito, ac tepido vitior.

Ad carnem excrecentem in auditorio meatu, quo usus est Heracles Tarentinus.

Aeruginis rase drac. viij. squamæ eris drach. iij. mellis heminx dimidium. Arida trita, ac melle 60 excepta, donec rubescat, coqto, & ablatis vitior.

Aliud ad sanguinis ex auribus eruptiones, Heraclide Tarentini.

Marrubii succum exprimito, & aceto dilutum infundito. Aut mali punici in aceto cocti

succum exprimito, infunditoty. Aut polygoni succum cum modico aceto. Ad vermes iunctos auribus, veratrum album cum melle immittite, aut aridum infusa: aut rubi succum infunde.

De sonitu aurium.

Ex sonitibus aurium, alij quidem, spiritus stant leni sunt foboles: alij vero ob exquisitam sensus audiendi subtilitatem sunt: quemadmodum etiam in oculis oriri solent suffusorum imagines, ob vapores exhalantes ab ore ventriculi. Ceterum neutrius affectionis exacta cognitio haberi in principio potest. Porro si in febribus sonitus sit, minime interturbandi sunt: ut plurimum namque statim sedantur. Si vero ob stantulenti spiritum, cui non pateat exitus, sonitus fieri suspicatus quis fuerit, & ob hanc rem dissecantibus, attenuatorius, ac discussorius admotus pharmacum, nihil commiserit: similisq. apoplethmatis usus sit, & vniuerso prospexerit capiti: huic mentio in hac suspicio nem inclinatus animus erit, videlicet sensus audiendi exquisitam facilitatem, causam eius rumoris existere, præteritum si acuto audiendi sensu præditus esse æger appareat. In talibus igitur, ex sensum stupefacientibus quippiam soleo admiscere: cuiusmodi est mædragora, & papaueris succus.

Ad sonitum remedia ab Archigene prodita.

In sonitibus repentinis aceti cum rosaceo infusa. Aut cuminum, & olum, crassitudine mellis. Aut radicis sylvestris cucumeris succi. Si vero protrahat, omnibus amaris, acerbis, attenuatorius & discussorius, quibus vitior ad dolorem ex crassis humoribus ortum, vitioris, singulis in aceto coctis, admittitque melle. Aut reclinato ægry, & nigro trito in aurem inspersio, ac aceti infunde tepidum, ac postquam feruere desierit, exterge lana, & nucum amaratæ succo infunde, lanam obtura. Ceterum quibus ob maximam audiendum facilitatem id genus sonitus fiunt, castorium & cicute semen cum aceto trita infusa.

Ad auditus granitatem.

In surditatibus, qui exiguas quidem voces omnino non audiunt, magnas autem vix percipiunt, hoc ipsum symptoma valde suspectum habere oportet: paulatim namque temporis progressu augescens, perfectum surditatem in ducit. Quapropter per lieram purgandi sunt, & per catapona ex colocynthide: pinuræq. eis per apoplethmatis detrahenda, & caput effricandum est, eiq. vitior addatur, omni studio curandum. Vtendum etiam attenuatoria victus ratione. At in ipsam arem pharmaca iniicienda sunt, quæ crassos viscidisq. humores commuant, & dissecant. Cuiusmodi existunt hæc, quæ Apollonius prodidit: Caprarum succo & resina oleo dilutis, vitior. Aut oleo nucum & resina mistis pariter vitior. Vel adipem anserinum, & fel bubulum, ac laurinum, ex æquo mista infundito. Porro surditatis cõtrariis præsidiis habent opus, iia qui aurium doloribus infestantur. Quippe in doloribus affectæ partes exquisitam quietem desiderant: surdatis vero, vehementem motum postulat, transmutationemq. in contrariam ei, quæ iam adest, dispositionem.

Fomenta ad aurium dolorem ab

Apollonio scripta.

Fomentis porro vtendum est per spõgias aqua calida

*Stupefacientium quando cognatur uti medicamentum.*

*Aurii vermes interueniunt.*

*Sonitus in eorum causa.*

*Sonitus autem per liam, non efficitur.*

*Sonitus autem de capitis foveis, non per liam, non efficitur.*

*Sonitus autem remedia sunt ab Archigene prodita.*

*Auribus pinuræ additur.*

*Aurium excrecentiam vteri medicamentum.*

*Aurii sanguinem effundendum remedium.*

*Aurium idem foveat.*

calidis imbutas, ac sufficienter expressas: itemq; per cucurbitas siffizas. Amplius verò & per vaporem ex strundibus perforatis allatū. Oportet autem steram arundinis otam, auriculari caluitati & daperi: alteram verò in ollam perforatam habentem operculum, & vndiq; obstratū, incumere. Si sit ut in olla abstinuum in aqua feruefactum, quò vapor inde sublatu perfector ad auditoriū meatum. Cōfert etenim hoc fomentum etiam ad auditu graui.

Archigenis ad surditatem remedia.

Chalbanū cum aceto & melle feruefactum in stilla. Aut collyrio ex nitro, sicu, & sinapi immisso, per triduum id non extrahimus. Postea verò assiduū acutissq; vocibus, & vicissim grauibz inclamamus: & per tubam sonitu incusso, conamur malum depellere. Post hæc & sphodeli radices oleo veteri incoctas, commodè infundimus, caprinūq; assiduè eluimus vrins.

Eiusdē de corporculis quæ auribus illabunt.

Quòd si aqua illabatur surē, auxiliatur acetiū, & cum stero pede, qui respondet affectu suri, exilire, aliquoties se ipsum inclinatū: hoc enim modo facile excernitur. Quin & exvilio simplex per os, aut etiā per stipulā, egregiè aquam extrahit. Si verò calculus, aut fabz, aut consimile quid in auditoriū meatum illapsum fuerit, eluito: aut lans circa auriculariū specillum obvoluta, & resina nicta, extrahito. Idem & per glutinosum aliquod pharscum fieri potest. Quòd si neque sic sequatur, sternutatorio in nares iniectū, os acutius obstruatur. Facta namque spiritus inclusi extensione, id quod est illapsum, efflabitur: idq; assiduè, donec excidat, facito. Nam si intus manserit, aut inflāta convulsiones inducet. Optime etiam confert ad eorum quæ illapsa sunt eiectionem, cōcussio. Si itaq; puer fuerit, conprehensum, & in caput sublatum, conciens ipsum, vibrabis. Si verò perfectè ætatis quispiam ita fuerit affectus, ipsum in tabulam secundum affectam aurem redinatum, caput ad tabulam firmare iubero: dein leuata tabulæ iuxta caput parte, deferri sinio, idq; sæpius facito. Mouebit enim sic quod incidit, & ad expeditiores meatua partes progreditur. Atque ita angustis & concauis specilli parte immissa, scitè extrahito. Si verò faba, aut cōsimile quicquid in aurem illapsum, in ea hæreat, mosefactūmq; tumefactum dolores inferat, impossibile quidem est integrum ipsum eximere. Quare per specilli concavum diuidere id industriè expedit, atq; ita particulatim extrahere: deinde spām, aut vinum dulce calidum infundere, ac lenire meatum ex lanciactione oblatum. At verò si animal aliquod sit illapsum, sciamonīū aceto dilutum, aut oblinthiū, aut pucedanū succum, nitrumq; ac sulfur, cum radicali succo instillato.

De parotidibus.

Parotides & genitæ quidem inflammationum existunt. Fiant autem, glandulis secundum aures affectis. Cæterū primis parte curationis partem inflammationū in eis minimè vrimus. In illis siquidè plurimum curatione reprimente, repulsoriatq; vti conuenit, præcipuè cum nec malignum sit, nec malum quod influit: nec vniuer-

sum corpus plethoricum. Sic namq; spongia sola ex posca imposita, incipientes inflammationes respicit. Verum in parotidibus contrariam curationē molimur, nè per pharמע attritoria adhibētes: & si hæc nihil memorabile efficiant, etiā cucurbitulas affigentes, aut fomenta assidua adhibentes, contrariisq; vtiuestant humores ad cutim ipsam transire, præsertim si affectio in capite hæreat. Similiter tūm natura per acutas febres, redvndantes humores ex vltis ad regionē inter cutem & subiecta corpora pellit, quandoquidem illis etiam glandulæ imbuntur, male sariis videtur tunc opulari nstare, febres per abcessus curanti. Verū si vehemētī impetu influant humores, nihil nōs curiosius agētes, omnia permittemus nature. Nam siue cucurbitā, siue aliud pharמע humores ex stlo eliciet, & demouerimus, vehemēte dolor hominē apprehendit, vnde & vigilie & febres oriuntur, atq; exoluantur vires. Mingere itaq; tunc, & non infusum provehere, oportet, per cataplasmatū maximè lenientiū vsum: cuiusmodi est quod ex frumenti, aut hordei, aut seminis lini farinis, cum mulla, aut fenigreci, aut altheæ, aut chamæmelorum decocto conficitur: & quæcumq; nō modò humectam habent caliditate, per quam mitigare dolores vident, sed etiam influentes succos possunt cōcōquere, suppurareq;. Quòd si etiam sanguis redvndare videtur, per venā ipsūm sectionē vsusvibus, præsertim si liceat per vires.

Ergo si humor non discutitur, suppurantibus pharمعis est vrendū: cuiusmodi est frumenti farina cum oleo & caricarū decocto: item quod ex polline & fermento conficitur pharמעum. At si suppurata fuerint parotides, tunc aut per sectionem pus elicere oportet, aut per pharמעū abscissionem rumpere, quale est Smilii vocatū, & qd ex aliis constat: aut tentare, vt ipsum per attritoria & tenuissima medicamēta discutiamus, his in die iisdē ablatis, & fomentis admotis, donec dolores remiserint. Vbi verò iam plurimū puris discussum fuerit, tunc iam primū semel solvere ea medicamenta, & fomenta adhibere oportet: dein verò neque ex re est id facere, sed ipsa pharمعis permittere, vt si quid reliqui in profundo hæreat, ipsum discutiant. Quòd si durities adsit, ea ipsa quoq; mollienda est, emollientibus medicamentis ad attractoria admittis.

Archigenis ad parotidas.

Rumicis radices in vino tenuium partium coctas, applicabis parotidibus citra vehementem dolorem oris. Aut buccina marina, aut purpura vitas, melle aut xungia exceptas imponito. Aut sicut aqua marinis murie incoctā, admove: aut lanā etiā butyro imbutā. Cōmendat etiā vsum plātaginis, tameris ex mistis facularitibus, discussoria nempe & repulsoria conficit. Ego verò nunquam pharמעis ad parotidas destinatis repulsoria admisceri opere precium existimo, nisi forte aliquando paucillū repulsorij multo discussorio addatur: idq; vbi citra vehementē dolorem ipse irruunt parotides.

Aliud Archigenia ad discutiedas parotidas.

Lupinon amarorū farinam cum melle coctā, modica calce viua addita, pro cataplasmate im-

Parotidis medicatio.

Natura impetu quando miore fit vna dui.

Cataplasma dulci lenius.

Suppuratio quida ex quibus medicamentis molenda. Vni suppuratorem parotidis quibz modo vti cōueniat.

Parotidis vna remedia ab Archigene prædicta.

Platago conficit ex facularitibus discussoria si malis repulsoria.

Repulsoria quando mōdo da medicamentis parotidibus.

ponito. Aliud. Picis brutæ, mannx thuris, vtriusq; drach. ij. terebinthine, palmularū Syriacarum non verustarū, pinguium, carnis puræ, vtriusq; drach. ij. omnibus simul vntis vntor.

Aliud. Caricarū, chalbant, nuri, sing. drach. j. sulfuris tertiam vntis drachmæ partē: terebinthinz, opoponacisq; vtriusq; pauxillum: simul vntis vntor. Quod si medicamentis parotis nō cedat, Archigenes consulit esse confugiendū ad cucurbitulam, adhibita scarificatione. Porro simplices parontidas curant, emplastrū Musæx, & quod ex succis cōstat, & quod ex ptisana. His molliora adliunt sunt, cerati forma, tum ex butyro, tum ex ælypo consistata, ostreis, aut buccinis, aut purpuri vntis additis, adpēq; porcino salis experte, singulis quadrantis pondere. Sic ipsum etiam licet cōficere. Butyri vnc. j. ceræ vnc. ij. s. ostreorū vntorū, redactiorūq; in pollinē, vnc. ij. Cōficito & vntor: efficacissimū namq; est ad parontidas. De affectibus narium.

#### Polypodes.

Ex genere tumorū præter naturā polypodes in nariibus generantur, vt oxæne ex genere vlcerrum. Secundū genus aut excretionum præter naturam, sanguinis effusione contingunt in morbis acutis. Primū itaq; de oxænis sermone faciam, quæ ex humorum acrimia, putrilaginolorūq; influxu gignuntur: nam si q̄ duntaxat sint acres, ægrè curabilia vlcera inducūt, graueolentia verò non item. Ceterū cura cōmunis tum his ambobus, tum etiam polypo est, primū ca put siccare, corroboratēq; cum palim sit ob redundantiam viscosiorū humorum, fieri ab eo in ipsas nares deluxum. Capite roborato, nariibus adhibenda curatio est, scopo in oxænis propoli, vt affecta pars per mixtæ facultatis pharmaca tum repellentia, tum discutientia, excitet. Repellent itaq; tum austerā, tum acerbā, quæ cōmune autringētiū appellamōt formantur. Discutunt calidam & siccā vim obtinentia.

Archigenis remedia ad oxænas.

Obline eos chalcidide, vel aramento sutorio, vel psorico, ex melle tritis. Vel iidem & sandaracham cum melle illinito.

De polypo narium.

Polypus tumor est qui præter naturā in nariibus generatur, polypodis carni assimilis. Quæ affectio ex crasnis & viscidis humoribus gignitur: ob idq; mista medicamentorū materia indiget, quæ partim astringat, partim secet & teneat, partim enā discutiat, cōdensetq;.

Asclepiadis ad oxænas remedium.

Aluminis scissi drach. ij. myrrhæ, sandarachæ sing. drach. iij. gallæ drach. j. æris vnti tantundē. Tritis vtere, nariibus prius vino odorato elota, & pharmaco per specilli extremum admoto.

Lamponis ad oxænas, ægilopas, polypos, & quæcumq; velis citra sectionem, vntione mve extirpare, remedium. Scobis æris rubri vnc. j. salis ammoniaci sextantē: ammoniaci thymiamanis tantundē: aluminis rotūdi quadrantē: aceti acerimi heminas sex. Arida terito, & affuso aceto, omnia in vas æris rubri cōlloctio, in eōq; ad solem sub ardore Canicule cum rubri æris radio agitata, donec exarescat pharmaca: quod postea in mortariū translaturū, diligēter terito, in sicilliq;

recōdito. Vsu verò exigente, aquam forbendam dato, quæ vt ore continet, precipitō: dein phar macum per fistulam infusillato, vel etiam melle exceptum infundito. Ceterū post huiusmodi pharmacorū adhibitionem, etiam sternutatio ris vntimur, quod videlicet testioria vlceri obdacta excunamus, quæ tribus aut quatuor diebus ferè excidere consueuerūt. Vbi verò exderint, adipe asferino, ac butyro cum cerato curantur.

Porro ipse in oxænis polypisq; præstantissimū pharmacū repertū succū ex melle punicis tum phal cibis, tum austeris, acidisq; & maturis & integris, pariq; magnitudinis & numero maceratis, expressum. Ceterū si humectior esse polypus videatur, plus ex austeris melle est cōsundendum. At ex aridis pharmacis, diaphryge citra mordacitatem aliquando per multū tempus consumptū polypum noui. Probatū etiam predictū ex melle lorū succū collyrium, si vbi exaruerit, redigatur in pollinem, indeq; exviletur, aut etiam per specilli nucleum indatur. Omnia autē hæc asse dū facere oportet, vt nunq; ab affecta parte ab sis pharmaciū, cum facile ab humiditate eluatur.

Iam verò rosæ siccæ cōmū, inditēq; in iis qui molli carne sunt predicti, citra noxam curare ali quando solent polypos. Nam plerūq; eorū quæ polypodas extirpuit, eos exacerbant, si quando ab scopo aberrant. Ceterum vlcera in narium meatibus semper per pistillos curauit, Androniū videlicet, & Passionis, & Polyde, & Bithynum, & per eum quem ipse composui. In diuise verò quopiam, qui odoratum pharmacum exige bat, hedychrot vsum excogetui, ipsūq; Falerno veteri dilui, & mirum quā breui affectio ipsa est curata.

Heraclide ad sanguinis & nariibus eruptiones remedia.

Vbi grumos sanguinis exuderis, lanam specillo obvoluto, eimq; in lyco aqua diluto imbui to, & sanguine manantē locum illinito. Aut linea mentū ex ellychnio contorto, madidatimq; aqua, & chalcididis poline inspersū inferito. Aut mentū tritam indito. Luat etiam frontē spongie refrigerare, extremūq; vinculo excipere, qua parte magis cōtracta videntur: obtruracq; aures, & os pluniali aqua & frigida opplere.

Asclepiadis remedia ad sanguinis effusionem & natiū.

Spongiā crudā pice imbutā, & linamento exo cepā indito. Aliud. Putaminis oui, & gallæ omphacitidis, vtriusq; partē vnam. Trita linamēto intorto, aqua aut aceto madefacta, excipito, inditōq;.

Andromachi ischammon.

Chalcididis drac. c. chalcithi drac. c. misyos asfati drac. xxv. æria vnti drach. xij. & s. tritis vtere, **GALeni PERGEMI** de compositione medicamentorū secundum loca, lib. iiii.

De oculorū affectibus, ocularitq; medicamentis, agere in præsentī cōmentario est cōsiliū. Pompholyx igit lota nulli pharmacorū mordacitate expertū inferior est: atq; ob id ea vntimur ad reuocē & acres oculorū fluxiones, sed vacuato prius capite & vniuerso cor pore,

Et hanc appo sita nariū, emulsiōe pō antartica est.

Pompholyx facit ad melle polypū, melle gignit, aut Galeni.

Reserū polio ita quibus cura re polypū solent.

Narū vlcera quibus vlcera munda curant.

Sanguis in nariū eruptione munda.

Pompholyx oprimi et medi tati oculorū fluxiones.

pore. At vacuumus quidem corpus venę sectione, purgationeq; caput autem per apopleghmatismo vindicamus a putredine. Potest tamen pompholyx lota, quemadmodum etiam spodium, atq; amyllum, simul & moderate resiccare humores: simulq; ne per tuniculas evacuetur ea que in magnis oculorum venis superflua humiditas continet, prohibere. Quare si quia prius q̃ caput ab humonibus ad oculos delinibus purget, vitatur obturantibus pharmacis, vehementer dolores ob tunicas diftentes in ducet, & ob multitudinē influentiu humoru, aliquando ipsaru rupturam aut erosionē pariet. Eiusdē generis cum prædictis pharmacis subtenus oorum liquor existit, abvnde valena humiditate oculoru abluere, & exasperata lenire: obturandi autem tenues meatus non parē illis facultatē fortis, sicut nec similē vim reliquenda. At fenugreci succus, qd ad viscositate artit et, similis est uorum albugini: diffusoriam tamen possidet facultatem, & moderate calfaciōniam: ob idq; multos dolores mitigare cōsuevit. Maximē prædictis cōmarij secundum genus existunt liquores acres, vt Cyrenaisca, Medicus, ac tuus sagapenū, tum euphorbium, omnēq; breuiter, qui citra exasperationē calfaciunt vehementer. Forn autē facultate sunt prædicta extergentia medicamēta, cuiusmodi est eria squama, chalcitis vltis, vltis, floa xis, misy, fori, atq; stibium. Hia adhu aliusd genus adiacet, erodentium videlicet, siue punefacientium: quale est auripigmentum, & sandaracha, & Aliz petra floa: cuius facultatis maly etiam paululum particeps est. Est & aliud genus pharmacorum, quod in oculares cōpositiones inuicetur, eorum videlicet que natura astringunt. Quę igitur medicorū hanc vim habent, influxua repellunt que verō vehementer, ampliores dolore infingunt, tunicas exasperando, q̃ ruent influxionū impetū repellēdo. Porro quę medicorū astringunt, lippitudinibus cōmodissima existunt: conserunt autem & reliquis ferē omnibus affectionibus vicerum, pustularū atq; fluxionum. Sunt verō huiusmodi, folia rosarum, & flores, & succus: erice fructus, spica nardi, malabathri foliū, crocus, lycium, & hypocistis. Vehementiorē his astringendi vim acacia & omphiacum habent, quę & ipsa in saccorum genere numerantur. Balaustiu etiam, & cyrini, & gallę omphracundę, ex genere eorum sunt quę multum astringunt, inflammationes & alias affectiones concoquunt, myrris, crocus, castoreum, thus, & cremor fenugreci decocti: quę etiam diffusoria facultate sunt prædicta, & præsertim ex ipsis myrris. Hęc itaq; sylula ocularium medicamentorū existunt. Porro quę medicamēta substantia terrestri sunt, citra manifestū calorem aut frigus, ea emplastica nominantur, habentia contrariam his, quę ab obstruptione liberant: quali facultate insigniunt famia atq; pompholyx lota, cuiusq; cinis elotus, atq; etiam cadmia tum vltis, tum lota, cui deterfor etia nōnihil inest. Pompholygi verō & spodio parū quid inest astringenā, quemadmodum etiam plumbo post exstionē. Nam & hoc pharmacum omnis mordacitatis est expers, parum tamen quid adstrictionis sortitur.

Amyllum etiam exacte lotum, q̃ mitissimū est, & medium, vt nec astringentem nec accedentem habeat: hoc est, nec calorem, nec frigus. Quin & ce ruffa lota, proximē accedit ad facultatē plumbi vlti atq; eloti: manifestē tamē astringit amyllum autem & famia alter, quatenus ex gustu & odore licet colligere, sunt penitus qualitrates experites. Igitur vniuersum huiusmodi pharmacorum genus, siue modicū in gustu aut odore qualitatē exhibeat, siue penitus nullū ostendat, veluti atq; purissimū, expers qualitatē vocat, modera tēq; solā terrestre substantiā secundū propriā naturā siccā. Ac sanē sola hęc medicamēta cōueniunt in erosionibus cornę tunicę, ipsidq; rhagoidis prolapsibus, ob influxū tenuiū atq; mordacium humorum ortia: cum mirum astringentia cohibeat effluentes humores, atq; ob id dolorem ex mordacitate ipsorum ortum intendunt: acia verō astringentem simul adaugeant. In vniuersum tamen ipsi particule affectu, quod facilius curationem recipiat, propiciamus, tum vniuersi corporis purgationibus, tum reuulsionibus: primum quidem ad infernam corporis partem: dein etiam ad occiput, & ad caput autem. Vniuersi scilicet sectionibus arteriarum, interdu quidem incidentes ea que retro caput iuxta aures sunt exporretq; interdu autē earum partem, quę temporibus inest idque vt me deauris disposioni, quę tunicas oculorum est genitiora, ob quā etiā optimus sanguis ad tunicas ipsas delatus corrumpitur. Ad hāc igitur solā dispositiones conuenire videtur prædictorū medicamentorū genus, citra mordacitatem exicans in affecta parte cacochymia, & quā id quod in fluxu corrumpitur. Vocant autē collyria quę ex eiusmodi medicamentis cōstant, tum Libiani, tum Cygnienēpe ob candorem, qualem cygni possident. Pręvalet quippe in ipsa amyllum, & terra Samia, & cerussa Rhodia, quę præstantior est & candidior. Sunt quę collyria id genus in cotibus terant, lacte boni succi ex nutricis vberibus infillato: vt astringentiam vim quę onilio inest, effugiant. Etenim cum in lacte serosa quidam exteriorisq; facultas inest, eius vltis congruens est ad propositam curationē: quippe vlcera explendi, extergentibus citra acrimonia habent opus medicamēta. Quod si huiusmodi haberi lac nequeat, per fenugreci decoctū terere collyria præstiterit, vt pote quod exterioriā quandā vim habet, quā onia omnino sunt destituta.

#### De aspritudinibus palpebrarum.

Cūm agrę curabiles prædictę dispositiones existant, adhuc earum difficultatē adaugent palpebrarum asperitates: a quibus etiam in lippitudinibus, tunicę oculorū commorise, asilguntur dolore. In illis tamen audemus ad pharmacā in inflammationi cōgruentia, nonnihil ex detergentibus immittere: veluti est collyriū ex vino, aspritudinibus accommodatū, quod primum ea quę ad palpebras succurrere, deprimantur. Nam vbi oculi tuncus insistantur inflammationē, ea quę aspritudinē expurgare possunt, administramus. At dum cornę exasperata est cum mordacitā fluxione, impossibile est tali aliquo vti pharmaco, Cornę siquidem ipsa amplia exasperabi-

Amylum,

Aqua puriss-

ma sunt qualita-

tates experiti.

Cornę tunicę

erofia, quę medi-

camentis con-

gruat.

Arteria form

autē, et tempo-

ri, quādo in-

cidenda sunt,

Collyria Libia-

na &amp; Cygni.

Collyria lenis

genis modus.

Lactis malie-

bru vltis cōm-

positum vlcera-

bus curare val-

de.

Fenugreci deco-

ctum,

Collyrium ex

vino.



tur: vixit verò impensius prociat, hominemq; vehementer dolor corripit, angustiarq; ipsius fluxionis malignitas. In huiusmodi itaq; affectione miscella, solent medici, præ inopia consilij, palpebras ipsas revertere, atq; abisq; medicamentis purgare, idq; tum specilli concavo, tum molli spongia. Quidam ex præceptionibus meis, ex pumice lavigato, cum tragacantha aut gummi, collyrium faciebat, eiq; ab extemis atq; reuersis palpebris, aspritudines deradebat. Vbi verò tethi 10 poris progressu per prædicta collyria fluxio fuerit sedata, audemus tunc iam ea quæ palpebras extergit, paulatim adhibere medicamenta: quæ admodum vbi fluxus omnino fuerit iam resicca rus, & palpebræ moderate habuerint, caua vlcera sunt collyrio ex thure complenda.

De lippitudine, siue ophthalmia.

Ophthalmia est inflammatio periosæ membranæ, quam etiam agnatarum vocant, quod aliis, quæ oculum ipsum constituunt, tunicis forniculæ 20 agnoscitur, ligamentum existens toti oculo, ad circumscripta ossa. Ob id enim omnia quæ circa oculos sita sunt, vsq; ad malas quandoque simul per vehementem lippitudinem intumescunt. Igitur pharmaca omnia huiusmodi affectionem curantia, ex genere eorū sunt quæ medentur inflammationibus: assumunt tamen necessariū nonnihil, pro ipsius partis natura, quæ excedit lentem molliem, atque eximiam quandam supra omnē totius corporis cutem, ad patiendum 30 faciliorem est nata, ob sensus subtilitatem, ac raritatem substantiæ. Adhibenda itaq; sunt pharmaca repellentia, minimè tamen exasperantia, hoc est, non vehementem astrictionem sortita: sed quæ tum propria sua substantia moderata sint, tum leuissimi liquoris admixtione adhuc magis talia reddantur. Voco autem leuissimos liquores, oui candidum, & sanigræci decoctum, magisq; adhuc ipsum lac. Vt plurimum verò albumen oui cum accommodatis pharmacis lippitudines curare sufficit, per collyria videlicet vocata monohemera, hoc est, diaria. Sæpe siquidem magnas inflammationes, hæc adeo mitigauerunt, vt in vesperam quidem homo balneo 40 veteretur, in sequenti verò die, nardino collyrio ad instauracionem & corroboracionem iningeretur. Admiscere autem ei circa primā inuactionem minimum quiddam acrum & sitentium medicamento oportet: vt circa secundam paulo amplius quiddam priore. Sufficit namq; hæc duæ pharmaci adhibiciones, & deambulaculo aliqua nō multa ante balnē. Foveri tamen oculi per spongiam debent ex melliori & sanigræci decocto, semel el quidē aut bis in die, si medicis sit dolor: sæpius autem, si vehementior.

De vlcibus oculorum.

Oculorū vlcera tandem secundum genus curationē requirunt, quæ reliquæ omnia: ob ipsius tamen partis naturam, glenissima eis adhibenda sunt, quale est, quod ex lota pompholyge cō- 50 stat. Admiscuntur ipsi etiam succi quiddam. Nō solum mordacitatis expertes, sed qui etiam vehementissimos mitigare dolores possint, velviti mandragoræ succus. Quidam etiam polygoni succum miscuerunt, vt alij ipsorum vltorum

candidum. Quæ omnia, dum tempus vtendi instat, miscenda sunt, propterea quod facile accescunt: quo tempore etiam rosarum additur succus. Eorum autem omnium esse debet scopus, vt vlcus mundum seruetur: vt ipse partium natura ipsum replente, atq; ad cicatricem ducente. Si itaq; inflammatio adhuc oculis vtgeat, aut quispiam etiam dolor, collyria ex thure, & metallis lotis, & succis mordacitans expertibus, adhibenda sunt. Vbi verò fordida reddita ob eorū vltum vlcera fuerint, ac repurgantibus quippiam miscendum est: quale existit Paccianum crocūm, ex vino: quod etiam aspritudines extertit, præter- 60 giq; attenuat. At verò vlcera quæ per erosionē tunice cornæ sunt, ita vt aliquid ex ipsa rhagoidē procidat, repellentibus & asprigentibus pharmacis opus habent. Discussoria autem potulant tum pustulæ, tum pus intra rhagoidem contentum. Recensia igitur & adhuc inflammata, pharmacia ex myrrha, thure, & croco sedantur: vetustiora autem, nōnihil ex discussoris desiderant, quæ admodum etiam indurate tunicarum inflammationes:

De oculiarum pharmacorum viribus.

Igitur omnimodæ acrimoniæ sunt expertes hi tres liquores, sanigræci decoctum, lac, & candidum oui: ex quorum genere existimat oportet tum gummi, tum tragacantham. Quippe nisi prædicta illa tria, tum copia, tum vltu, prompta & expedita essent, possemus vtiq; parum gummi, aut tragacanthæ in multa aqua maceratum, in eundem vltum velviti illa assumere: & per ipsa etiam in medica cote collyria terere: & per sola infusa, serofos in affectis oculis generatos humores eluere. Oculariū itaq; pharmacum vnum genus in illis tribus liquoribus, atq; etiam in tragacantha, gummi, metallisq; elotis consistit. Alterum verò genus eorum sit, quæ modicam mordacitatem sortiantur, propterea quod quidam eis sunt admissi, quæ parum asprunt de- 70 terguntq; qualia sunt, rosæ, & thus: illæ quidem, pusculam astrictionem: thus verò modicam extergendi vim possidentes. Habet tamen ob moderatum calorem thus etiam & concoctiorum quid, ac doloris mitigatorium. Ex eodem genere cum ipso, quantū ad concoctionem & discussionem attinet, censendus est crocus & myrrha: quæ inter se in eo differunt, quod crocus quidem moderate asprunt: myrrha verò citra astrictionem non insistentem discutiunt, & resiccat humiditates. Sūntq; hæc viribus præstantiora thure, & ob id etiam maiorem discutiendi vim habent: eū autem careant vi detergendi, ad vlcisurationem tunc inferiora existunt. Huius generis medicamentorū, cōcoctiorū inquam & discussorij, lycium quoq; est, & castorium. Sarco- 80 colla etiam concoctiorū & discussorij medicamentum existit: ac inagis quam ipsa, chalbanū. Melliori verò decoctum ad concoctiorum facultatem assumpsit etiam quid aspriorū, eundem ferè generis cum croco existens. Iniciunt etiam in oculares compositiones lapis hæmatites vocatus, humores resiccandi vim habens, velviti & cadmia. Minus tamen pharmacum lapis ille quā cadmia existit, vt ipse ex humidā sub-

Paccianum ad lippitiam.

Oculariū meli cammarum vlti.

Gummi Tragacanthæ.

Ocularium nō deconcoctum generis vlti.

Thus doloris lenis, concoctior.

Crocus moderate asprunt, Myrrha citra astrictionem discutiunt, resiccat.

Lycium, Castorium, Sarcocolla, Chalbanum, Meliiori decoctum.

Lapis hæmatites.

Cadmia, stantia.

Aspritudine palpebrarum curatio.

Lippitudo. Ophthalmia est inflammatio periosæ tunice, quæ barbares conuulsi appellatur.

Ophthalmia cōgrota modicam quæ ha esse debet.

Leuissimæ liquoris.

Quæ sunt & asprunt.

Quæ sunt & asprunt.

Quæ sunt & asprunt.

Quæ sunt & asprunt.

Quæ sunt & asprunt.

Quæ sunt & asprunt.

Quæ sunt & asprunt.

Quæ sunt & asprunt.

Quæ sunt & asprunt.

Quæ sunt & asprunt.

Quæ sunt & asprunt.

Quæ sunt & asprunt.

Quæ sunt & asprunt.

Quæ sunt & asprunt.

Quæ sunt & asprunt.

*Schilus lapis  
sclerum.*

stantia, non terrestri, vel uti cadmia generationē indeprus. Huic similis est lapis Schilus dictus, sed fortiores obtinet facultates. Quod verū stibium vocatur, illotū quidem, fortem astringens, sed facultatem ostentat: lotum autem, exoluitur, ut prope ad vim mordacitatis expertum accedat.

*As solum.  
As squama,  
Asp.  
Chalcitis vlla.  
Lala e- adete  
univellura.*

At as vitum vehementem extergēda possidet facultatem, itēq; squama eius, & flos. Nec minus efficac, sed minus mordacitatis expert, chalcitis vlla est. Quod si lauentur talia pharmaca, exterioria quidem adhuc manent: tantō ramen imbecilliora, quantum amiserunt mordacitatis. Huius generis sunt etiam misy, & xrugeo, fortissima pharmaca, iuxta quae sycosi & calli conveniunt, admittunt. Sunt quoque etiam gallas convescant, velēnter astringens pharmacum: sunt qui etiam chalcaneum, quod vna cum acredine vehementissimē astringit. Moderatius tamē redduntur vitum, & lotum. Ad hanc sylviam pertinet & stomomana squama. At thuria cortex, astringit quidem & ipse admodum, praedictis ramen est longē inferior. Porro māna thuris à thure ipso distet, quod exiguum quid astrictionis forniatur, ratione corticis thuris, culos non nihil contrahit. Quaecunque igitur ex astrigentibus multam terram compagem habent, alpritudinea, & sycoses, & callos consumunt. Ceterum quoque ex succorum genere sunt, vel uti omphaciū, & hypocistis, eluoni facile in substitutionibus, dissoluta simul cum lachrymis. Ex hoc genere est glaucium, & acacia. Citra mordacitatem verō extergit ceruicornium vitum, vel uti etiam caprinū: non tamen dolo rem sedant, nec concoctoria facultate sunt praedita, ut thus, frigidū nimirum & sicci temperamenti existentia. Mixtae facultatis est aloē, quemadmodū rosa. Habet enim quod extergere est natum, aliquid in se amarum, sicuti & astrictionum quippiam, ut & cōmitrat, & ad cicatricem perducit.

*Asp.  
Asp.  
Asp.*

*Chalcaneum.*

*Stomomana  
squama.  
Thuru cortex  
& māna.*

*Omphaciū  
hypocistis.*

*Glaucium.  
Acacia.  
Cervicornium  
vitum.*

*Aloē facultas.*

*Scleris palpebrae  
qua epi-  
fili medicantur.*

*Induratio trui  
oculorum  
qua  
conferat.*

*Suffusum  
medicam.*

*Oculi rubendi  
pharmacum.*

Quae ad scabras affectiones conveniunt.

Ex ista quae ad scabras palpebrarum affectiones conveniunt, sunt sales ammoniaci, & lapis Asius, rum ipse, rum eius flos: & quod plicorū appellatur, nō simplex, neq; sponte natum, sed praeparationis modum indeprum. Admiserunt eis & misy vitum, & sandarachā, & arsenicum. Ex medicamentis verō aromaticis, calia, malabathri folium, & amomum, clunamomūq;.

Quae induratis auxiliuntur.

Compositiones quae ad induratas oculorum tunicas congruunt, ex succis constāt, & ammoniaci rhymiamate. Miscentur autē eis myrrha, thus, chalcaneum, & consimilia.

Quae suffusis medeantur.

Ad suffulos habetur compositum medicamentum, ex foveo furniculi, hyantē felle, ac melle Artico constans: cui nōnulli caprillum fel addiderunt. Nunc autē in precio habetur pharmacum ex felle scarorū compositū: sicuti & quod ex myrrha stacte conficitur: quorum omniū promissa magna, effectus autem interdum nullus.

Pharmacum aridum ad ruendam oculorum valetudinem à me compositum.

Lapis phrygiter viti, tonēq; extincti: sed prima quidem extinctione, butyro secunda, vi-

no odorato: tertia Artico melle, ad ipsum extingendum, iniecto lib. j. aris viti, pipenis albi, fo liū malabathi, sing. vnc. j. stibij drach. xij. Postquam verō omnia fuerint laxuigata, & reponere medicamentum velis, adice opobalsami Syriaci vnc. j. Porro vīus ipsius ad solas palpebras comperit cum specillo inducū, citra tunicarum ipsius oculi contactum.

Aridum ad circumforos oculorū angulos ab Aclepiade scriptum.

Spodij Cyprij drach. iij. omphacij aridi drach. dimas ij. nardi obolos tres piperis fricti grana xv. tritis vtere.

Pharmacū calliblepharon, ex mordandis palpebris accōmodari. Facit & ad lippitudines inveteratas. Stibij viti ac vino exmisti drach. xv. plumbi viti & loti drach. viij. fuliginis thuris, spicis nardi, myrrhē torrefactae, croci, squame aris, sing. drach. j. omnibus tritis ac repositis vitior.

Aridum Philoxeni ad pringinosos & circumforos angulos. Facit & ad obstruū visum. Cadmiz drach. iij. salis ammoniaci drach. ij. piperis albi drach. j. mris & lauginis vitior.

Liquidū oculares compositiones ad omne exuberantiam carnis tollendam, & ad incipientem lippitudinem.

Cōpositio quae vīus Philippus est in Caesaria. Misys assati drach. viij. myrrhē drach. iij. cadmiz drach. viij. croci drach. ij. salis ammoniaci tantundem: nardi Indici, piperis albi, vitriusque drach. j. mellis Artici cyathum vnum. Misce.

Panchreos Erasistrati ad lippitudines omnes, & ad purulentas aures.

Aris viti, myrrhē, sing. drach. j. piperis obolos ij. misy rosti drach. j. croci obolos ij. vīa Chij heminam j. passī cretici heminae dimidiū. Coquantur ad lenum ignem, ut decet.

Philoxeni liquida exacens visum, ac cicatricea & callos extergens.

Ammoniaci thym. drach. iij. xruigins drach. ij. visio diluta, & contrita, melle Artico excipio. Cōpositio Largi exacena visum.

Succi radices furniculi partē vna: mella tantūdem. Misce. Alia. Succi radices furniculi, succi chelydoarū, mellis Artici, sing. drach. j. Misce.

Ad tingendas albugines.

Gallam tritam per specilli nucleū calfactā impono: dein chalcaneū aqua dilutū admoerō.

Ad glaucos oculos, quō pupillae nigrae redduntur.

Malicorū dulcia succum infundito: dein post temporis intervallū liyofcyanū sorem cum vīo tritum instillato.

Ad parvos instat hordei oblongos circa pupila palpebrarum abfessos.

Chalbani partem vnam cum modico nitro mixtam imponito.

Cataplasma Heraclidis Tarentinali ad vehementes oculorum dolores.

Rosarum viridorū, aut siccarū drach. iij. etō ci drach. j. opij tantundem: excipio meliori decocto, aut passo, vitiorū. Aliud. Rosarū, violarum albarum, meliori, caprū papaveris, sing. drach. ij. croci, opij, myrrhē, sing. drach. j. oolastū vitellum, Trinis & passo subactis vitior.

*Oculi modica vna,  
à medicis variis  
conscripta.*

*ad lippitudines*

*ad lippitudines*

*ad lippitudines*

*ad lippitudines*

*ad lippitudines*

*ad lippitudines*

*ad lippitudines*

*ad lippitudines*

*ad lippitudines*

*Oculi rubendi  
dolores  
solentur cataplasma.*

Agglutinatorium ad repellendas fluxiones ab oculis.

Oculorum fluxiones repellens agglutinans terribilissimum.

Pollinis, myrrhæ, mannæ thuris, singulorum drach. j. candido oui excipito, temporibusque & fronti admoeto.

Collyrium Moschionia, ad epiphloram, dolores, atque fluxiones congruens.

Glaucij drach. vj. sarcocollæ drach. viij. croci drach. iij. gummi drach. ij. tragacanthæ, succi mandragoræ, singul. drach. ij. opij drach. j. Aqua pluvialis excipito, vitæroq.

Paccij sphragis.

Cadmix vitæ & lacte caprillo, siue muliebri, extingit ac lotæ, assucatur in umbra, drach. x. xris viti ac loti, acaciz, vtriusq; drachmæ x. opij drach. vj. croci tantundem: gummi drach. xv. aqua pluvialis excipiantur.

Collyriū ad acerbissimos oculorū dolores.

Cadmix vitæ & lotæ, acaciz, stibij viti & loti, aloes Indicæ, sing. drach. viij. croci, myrrhæ, opij, sing. drach. iij. gummi drach. viij. aqua excipit, vterq; ex ovo. Ego etiam pompholygis & thuris, vtriusq; drach. iij. adici.

Malabathrinum nostrum ad vexationes dolorum.

Malabathrinum medicamentum vehementius oculorum doloribus.

Cadmix drach. xvj. acaciz drach. xl. xris viti & loti drach. xij. opij, lycij Indicæ, malabathri, nardi Indicæ, castorei, croci, aloes, sing. drach. ij. myrrhæ drach. iij. cerussæ drach. viij. stibij loti tantundem: gummi drach. xl. aqua excipito, & vitæro ex ovo in principio affusionū, & enā in declinatione, ubi panchrestum ab ipsa parte removeria.

Collyriū albū tryphera dictum, ad modū lenē, ad epiphoræ maximè congruens.

Collyrium tryphera nominatum.

Cadmix lotæ drach. xvj. cerussæ drach. viij. amyli, gummi, tragacanthæ, sing. drach. iij. opij drach. ij. aqua excipito, & cum ovo vitæro.

Cygnus inscriptus Regine, ad maximos oculorum dolores.

Cadmix drach. xvj. cerussæ lotæ drach. viij. amyli, tragacanthæ, acaciz, opij, sing. drach. ij. gumi drach. xij. excipe aqua pluviali, & dum vti voles, adice candida oorum quatuor recentium.

Aeriani pharmacū ad veteres ac recentes affectiones accommodatum.

Aeriani pharmacū efficacious oculorū accommodatum.

Cerussæ drach. xij. cadmix vitæ & lotæ, stibij viti & loti, thuris, singul. drach. x. squamæ xris drach. v. opij drach. iij. myrrhæ tantundem: gummi drach. xij. aqua pluviali exceptis, vtere ex ovo.

Collyriū ex cornu ceruino, ad vlcera & pustulas, quod citatrics exterit.

Cornu ceruini viti & loti, thuris, plumbi viti, sing. drach. iij. squamæ xris lotæ drach. ij. opij drach. j. gummi drach. iij. excipe ex aqua pluviali. Collyriū diathodon, ad fluxiones atque dolores oculorum congruens.

Rosarū drach. c. croci drach. j. opij, myrrhæ, sing. drach. viij. gnm m drach. l. viuo odorato excipito, vitæroq; ex ovo. Ego verò pro foliis rosarum, tantum dem earundem florum inteci, felicitèq; succedat.

Lyncus, ad affectiones callosas, exacuens visum.

Cadmix, xris viti & loti, ammoniaci thymiamatæ, sing. drach. xij. myrrhæ drach. xvj. lapidis

hermatice drach. vj. opij tantundem: aloes, fellis taurini, chalbani, sing. drach. iij. fruginis drach. j. opopanax drach. iij. salis ammoniaci drach. ij. gummi drach. vj. Aqua omnia pluviali excipito.

Melini Lucij præceptoris, ad scabros & corrosivos angulos, intus pruritus, oculos humectos, omniūq; hebetudinē visus, cicatrices enā & callosos exteros. Cerussæ, croci, sing. drach. xij. ammoniaci thymiamatæ, salis ammoniaci, nardi Indicæ, opij, myrrhæ, omplacij, sing. drach. vj. gummi drach. xij. Excipiantur aqua pluviali.

Quæ Archigenes ad oculos affectos scripsit.

In fluxionibus oculorum primo cōvenit cibi rei portio parca, aquæ potus, ac maxime res venereæ abstinentia. Subducatur alius, & facies assidue primū multa frigida, dein oxycrato abluatur. Fugiant odorea acres, & pulueres, fumūq; & tum solis, tum lucernæ splendorem. Si augeat fluxio, dolorq; accedat, cōfert etiam phlebotomia. Circa frontem porro & tempora conveniunt medicamēta astringentia. At super oculos lana pura oui candido madafacta imponatur: aut oui assis luteum, aut mellisiorum in passu coctum. Omnia enim ex astringentium genere in principis conferunt. Ad plagas illatas oculis facit columbinus sanguis instillatus, & præsertim in qui ex teneria penne exprimitur. Candidum etiam oui eodem modo in oculum instillatum, ac præterea lana exceptum, & superne imposuit. Prodest etiam mellisiorum coctum cum vino, imposuimq;.

Ad tumores ex plaga in oculis ortos valde cōvenit fomentum per mollem spongiam aceto diluto madentem.

Ad palpebrarum defluxia, argutina præterea vnam, ammoniaci thymiamatis tantundem, tertia imposito. Ad inviles atque pungentes palpebrarū pilos. Vbi avulsū fuerint, instillato sanguinem cicuticum, & non renascenti: aut chameleonem albam & tritam, cui viridum ranarum sanguis sit mistus, inungito. Offuscationē omnem, insipientemq; suffusionē, sanat felomne, cum martuba succo ac melle Attico. Ad prærygia, Chalcantia, & salis ammoniaci æquales partes: gummi dimidium, cum aceto in collyria formato, instillatq;.

## GALENI PERGAMENI

de compositione medicamentorū secundum loca, lib. V.

De suggillatione, quam Græci hypopion nominant.

**H**ypopion ex genere effusionum existit, estq; affectio cutis ipsi oculo subditi, ubi cōtus venis quæ in ea sunt, sanguis per fissurā effunditur: qui quidem nisi ducatur citò, interdum progressu temporis luescit & denigratur. Quare merito ad cura rationem statim festinant medici. Ceterum quum tunica venarum, ex quibus sanguis exilit, rumpatur, parum quiddam ex astringentibus ad ducendum admiſcent. Vbi verò ad propriam naturam redierint venæ, tunc discoloris solis vti admodum opportunū videtur: ex quibus tamē imbec-

Oculorum aff. (lib. v. tractatus ab Archig. scriptus).

Oculorum pl. (ex qua quædam sunt).

Hypopion. Suggillatio quæ sit.

Suggillatio curatio.

imbecilliora quidem in primis sunt adhibenda, fortiora verò inveteratis & denigratis conveniunt. Ego igitur Nili collyrio diatridon, in oculo aratorū codicula ex aqua trito, partē sūgillatā illano, servulz campanz ac fenigræci decocto prius pro fomento vſus: quo ipſo decocto, poſtea enā collyriū diſſoluo: ac dein enā ex ſoliis fenigræci decocto. Quod ſi quæpiā affectionis reliquæ reſiſtūt, in fenigræci decocto collyria ex myrrha diſſoluo, illanoq. Vbi verò affectus huius remediis nō cedit, collyriū ex ſandyce eſt cōmodo. Archigenis pharmaca ad ſūgillata.

Summe facit ad recentia & liuida ſūgillata, ſpōgia maris intincta, & aſſidue impoſita, ſublatay: poſtquam, fomentū ex aqua calida prodeſt. Cataplaſmate autē vere faba freſca cōtrita, abſinthio, hyſſopo, origano, raphani cortice, vna paſſa exacinata, vnoquoq. per ſe cum melle, aut aceto, aut aqua. Minime tamē rectē mihi videtur præcipere, vi diſſenterent vno aut alio vſamur. Aqua quippe acrimoniz omnis expertiſſima eſt. Mel autē viceribus mordax, cutē haudquāq. offendi: acetum verò vtrūq. mordax eſtiſt. Aliud. Aut fabam freſcam cōmanſam, cum melle impoſito. Etenim fabæ lomentū, etiam citra manducationē cum melle ſubactū, liuida diſcutit. Ex manducatione autē, ſummē diſcuſſorius efficiū, nimirū vitibus & ſaliua aſſumptis.

Aut crasſe & lithargyri partes æquas cum melle terito, atq. admiſta faba freſca, ad ceram ſmam reduco, vtrūq. At hordeaceā ſarſam cum aceto niſſo coctā impoſito. Aut tilius & thapſia æquis portionibus cum roſaceo cerato. Hæc Archigenes. Ductū autē & nobis eſt, quod ex diſcuſſorius medicamētis in principio præſtā tiora ſunt, quæ modicū aſtringēdi vim poſſident: qualia ſunt roſæ, magnū & crocus. Apollonius autē ad inveterata ſūgillata, ari radicē raſam, mellēq. ſubactā impoſitōq. cōmendat. At Crito bryoniæ radicē tritam cum melle, aut roſaceo cerato exceptā, inter remedia ſūgillatorū recēſcit.

Medicamē Heræ conſcriptū ad ſūgillata. Succu cicutz obolo ſq. croci drach. ſq. myrrhæ, acaciz, ſing. drach. j. opq. drach. ſq. ſucci thapſiæ, gummi tragacanthæ, ſing. drach. j. cū aqua cogito. Tribus enim horis (vtrūq. Heras) ſūgillata diſpongit. Ego verò nucē per ſtatē iam oleaginōſam effictam expertus ſum aliquando ad cruentatos facientes.

De ægilope. Inter naſi os & magnū oculi angulū, paruum quoddam exiguo abiceſſu perſimile tuberculū naſcitur: quod ſanē ſæpe in ipſum angulū rumpitur, ægrōq. curationē admittit, ni maturē illi occurratur. Igitur mederi ipſi oportet medicamentis quæ abſq. mordacitate diſcutiūt. Quippe coſtituitur ab acrobis oculus, ac ſic inflammatione particulæ auctur.

Heræ ad ægilopas. Malū ſolia cum ſale & melle trita impoſito. Alica enā in aceto cocta, incipit ægilopi opitu latu. Archigenis redia ad ægilopas.

Ægilopas eruo cum melle integimus, aut cinere viticæ cum aceto ſubactū. Probē facit & thus cum recentū columbino ſtercore impoſitū,

In nondum foratis, ſtaphideum ſylueſtreſtem, & ammoniacū thymiamā cū melle veluti ſplenū, impoſito: aut alūmē ſciſſile cum terebinthina. Si morbus huius remediis nō cedit, diuſio angulo, oſſeq. nudato, cauteriū admove: ſic ſiquidem decedunt ſquamulæ, atq. ipſum malum curatur.

De variis. Tumor parvus & durus in faciei cute oboritur, varus Lanius, Græcis ionthos dictus, & craſſo cōcretus ſucco, offendiſq. merito diſſipius curationē futurā per emolliētia & diſcuſſoria pliar maca. De ſiccoſis tumoribus.

Vna quedā hæc affectio eſt ex iis quæ in mento evaſcunt, diſſerens a variis in eo, quod nō ſolum craſſius ſit qui hoſ tumores excitat humor, ſed ſerola enā tenuitate participet, ob quā exſiccantur cito, ſi nō, vt decet, curent. & ob id magis exſiccantibus pharmaciis q. vari opus habet.

De liſiemoſis in mento tumoribus. Er hæc affectio ex mixto quopā generalī humore, ſerōſis nimirū tenuibūſq. & acrobis ſucis cum craſſis mixtis: quapropter facili enā in pſoram ac lepram tranſit: indigetque etiam ipſa pharmaciis fortiter exiccantib. Vbi verò in pſora aut lepram tranſierit, vitra hoc quod reſiccantibus indiget, etiam repurgantiā & exorſoria deſiderat.

De nienti eruptionibus. Hoc eruptionum, ſive exanthematū nomen, quidam in cōmuni vſupant de affectionibus vlceroſis & aſperis in mento ſua ſponte oborientibus. Indiget verò & hæc ipſa affectio reſiccantibus medicamentis.

De furunculis. Furunculi, Dothiēnes Græcis vocati, ex ſimilibus humoribus, veluti vari, gignuntur, per vniuerſum corpus duplices exiſtentes: nomen illi quidem varoſi, duri, & ægrē concoctiles: aliqui verò inflammatione in quibus alioquando febres cōſiſtunt, & tumor excreſcit in magnitudinē, & in pus tranſmutatur. Vnde curatio ipſorum vt plurimum eadem quæ inflammationum eſtiſt.

Critonis ad varos remedia. Mellis Atici, & acerrimi aceti, ſing. tyathum vnum miſceito, ipſiſq. varos illinito, cum digito perfricando. Vel amaras amygdalas aceto inſectas, faciei illine. Aut alumen ſciſſile probē laxigatum terebinthina exſcripto, impoſitōq.

Ad varos calloſos. Saponis gallici drac. ſq. ammoniaci thymiamatis drach. j. thuris drach. j. aqua diſſoluta, & cerā ſpīſſitudine facito, eōſq. illinito, & poſt horz interitum calida ablucere iubeto.

Ad affectiones emmentiores, ac principium elephantiaſis.

Gummi albi, ſpumę nītri, thuris, ſulſuris vliū, ſing. æquales partes aceto dilutas ac probē tritas, in paſtillis redige, eōſq. in vmbra exicca: vſu verò expetite, aceto dilutos illine: atq. vbi reſiccati fuerint, ſubſcripta compoſitione deterge. Saponis gallici ſi. j. ammoniaci thym. rānundē thuris, maſtiche, ſpumę nītri, ſing. vnc. iii. Saponem & ammoniacū in ſiſtile vna cōſecta, & aquę ſextantis duobus aſſuſa, coquitur atq. vbi diſſoluta fuerint, arida contuſa atq. cribraia adſiecta: deinde in mortariū trāſuſa, & pbe conſquarta

Vari deſcriptio & curatio.

ſiccuſ tumor a vari quomodo diſſerit, & quādo medicata poſſit.

Lichen a quibus gignitur & quādo medica mēſa deſiderit.

Exanthemata reſiccantib. medicamentis ſuo digent. Dothiēnes.

Furunculoſi ſpūm.

Vari remedia ſcripta a Crito.

Elephantiaſis incipit medicamentis ægrōſis.

Sūgillatū pharmaca ab Archigene poſita.

Lomentum fabæ.

Sūgillatū medicamētū ab Heræ ſcriptum.

Ægilopi deſcriptio a Crito.

in vase vitreo reponito. Vſu verò poſtulanſe, faciem ex eo ſmegmāte inquinatū, et poſt modicū rēporis larga aqua molliter perfricōdo abluito. Eluſidē ad ſcificas menti popularū eruptiones.

Spumę argenti, miſyos crudi, æquas partes tritas inſperge. Aliud. Atramenti ſutorij, ſulfuris viui, ſing. drac. ij. æruginis drach. j. aſtri ru bri drach. ij. trita inſperge.

Andronis pharmacū ad idem accōmodatū.

Chalcithi, myrrhę, ſing. deac. ij. thuris, alumi nis ſciſi, ſin. drac. ij. malicorij, gallarij, ariſtolo chi, ſing. drac. viij. vino auſtero exceptis vtitor.

Citronis remedia ad lichenas.

Tritici grana multa imponito in incudem: de inde laminā æria candentē tritico ſuperponito: & reſolutā ab eo liquore, calidū illuc, auſerto, illinitōg. Aut portulacę ſuccum aſidue illini to. Quod ſi inuenerit ſint lichenes, capparis folia trita cū aceto imponito. Aut corticē eadēis hortēſis rumicis, ſimiliter ex aceto tritam.

Pañſili lichenici.

Glutinis fabrilis, chamelæonia, ſing. drach. iij. ſulfuris viui, thuris, ſing. deach. ij. aceti hemi nę dimidium. Glutinum aceto diſſoluitur, dein aridis aſſunditur. Vſus tepore, quantū ſatis eſt, aceto diluo, calidūmꝑo impono.

Humida ad impēginofos affectus.

Miſyos peregrini, thuris, myrrhę, aluminis ſciſi, ſing. drac. viij. alois, ſulfuris viui, vtriuſq; drach. iij. Pañſio excipito, ad ſpiſſitudinem ſtri gmenti, & bis aut ter in die perfrictis illine.

Emplaſtrum lichenicū.

Cerę, picis coctę, terebinthinę, ſulfuris viui, ſing. librę dimidium: liquida cōmittito aridis.

Excoriatorium lichenum.

Squamę æris drach. vj. auripigmenti, ſanda racinę, vtriuſq; drach. iij. æris viij, veratri albi, ſing. ſeq̃uidrachmā: ventrum cantharidū tan tundem. Singula per ſe terito: dein ſimul miſta, cedria excipito, & ad ſtrigmenti ſpiſſitudinē ce ducta, pyxide æris cyprij reponito. Cæteriū antequā excoriatoria imponantur, circumſitas & vicinas licheni partes pharmacū aliquo inflam mationem arcente in ſplenio excepto, integere ætneri opoet. Poſt excoriatoriorū vſum em plaſtra viridia & alba ſunt imponenda.

Emplaſtrū vinde Pamphilī ad lichenas.

Cerę librā: æruginis rafę quadrantē: eſing phrycę lib. ij. olei cyathos iij. aceti acerimi qđ ſit ſatis. Conſcico vt decet.

Viride Herophilī.

Aeruginis drach. ij. mannę dcach. iij. adipis vitulini drach. xij. chalbani drach. iij. cerę drac. lxxx. refinę drach. xx. aceti quod ſit ſatis.

Emplaſtrū album, quo Magnus circulator eſt vſus ad excoriatos lichenas.

Lithargyri, cerę Tyrrhenicę, ſing. lib. j. olei ſex trariū j. ceruſę lib. j. aquę ſextariū j. Conſcico. Aliud. Lithargyri, ceruſę, plumbaginis lotę, ſing. drach. xxv. cerę, terebinthinę, ſing. drach. xvj. olei hem. j. aquę tantundem. Conſcico.

Compoſitio Menecratis ſquamās decidere faciens, & corpora atenuans.

Picis brutiæ pellucidę, ſiccę, & clecchę, drach. ij. a. refinę pinus pellucidę lib. j. & quadrantē ce

erę ponticę tantundem: chalbani quadrantē: ac ti heminam vnam. Conſcico diligenter.

Hæradicę Tarturini ad capitis & men ti ſcificos tumores.

Elaterij ſaliſię pars portiones cōſundito vti tōtg.

De dentium affectibus.

Equidem in meipſo manifeſtē aliquādo per cepti, nō dolentē modō, ſed etiā pulſantē dentē: quemadmodū carnoſę partes inflammatione vexatę conſueuerūt. Quare mirabar ſanē, quōd in dente oriri inflammationē poſſet. Atqui cūm etiam alio tempore dentem dolerem, perſpicuē ſenſi, nō ipſius dentis, ſed gingiuarū inflammationem, eum dolorem exiſtere. ita vt etiam citra coarctā tionem dolerent, ob vicinitatē tamen durorum dentium illis inaugetet dolor. Vtriuſq; itaq; dolo ris ſenſum expertus, aliū quidem in gingiuz, alium in ipſius dentis ſubſtantia eſſe, clare ſcio.

At verō, & quōd neruus quidē ad radicē ad dentis ſubſtratus, aliquando etiam dolcat: im ponat autē nobis, vt credamus ipſum dentē dolere, conſentaneū rationi eſt. Etenim quōd den te exempto remaneat adhuc exigua quædā por tio doloris, id ob netui inflammationē contin gite: cūm nimirū tunc dolor nerui leuior tantum reddatur, quōd nō amplius ab oſſe, cui cohæ rebat, tendatur: & quōd iam liberius perſpiret, fruſtrūq; medicamentis quo illi adhihent. Neg enim per contractū, neq; per diſtributionē poſſi bile fuerit inflammatio nerui mederi, vtrinq; dē tium locellis coarctato, & ab anteriori parte ab ipſo dente. «Iam verō cūm liuidi tora ſubſtantia ſua interdū reddant nerui, nihil mirū ſit, ſi phle gmone ſimile quid patitur. Cui rei hinc maior accedet fides, quōd tum nutriani, tum augęſtus per torū ſerē ipſius vitę curculū: id qđ euiden ter ſæpenumero in iis dentibus liquet, qui ſunt exemptis oppoſiti, vt pote qui ſemper augęſcit.

Siquidē quantū augmentę dētes, tantū in ciborū largigatione atteritur. Cūm igitur illis abſq; na trimento augeri nō liceat, vñq; duabus affectio nibus, & his contrariis, obnoxij erūt, inopię ſci licet & redvndantię alimētū, qđ ipſis ſuppeditat. Inopia ergo, aridiores & rabidiores, atq; ob id tenuiores eos efficit: redvndantię verō, conſi milē in eis excitare affectionē poteſt, qualis eſt circa carnoſas partes phlegmone: ac proinde cu randū eſt, vt redvndantiā evacuet, partim diſcu tiendo, partim cam repellēdo. At tenuitatis den tium ob alimentī inopiā, nullū remediū eſt, cūm tunc neceſſariō laxent moucanturq;: nempe cō page ipſorū laxiori redditā, ob tenuitatē nō mo dō dentiū, ſed lorellorū etiā eos amplectentiū. Hęc itaque affectio ſenibus accidit citius aut ſe uenior, vel vñ etiam magis aut minus. Quę verō phlegmonē reſert, magis iuuenes corripit. Aux iliani tamē etiā oportet ſenibus, auxilio gingiuis adhibito. Eaſ autē aſtringētib; medicamētis ro buſtiores, & magis circa dentem aſtētias facere cōuenit: tanq̃ ipſę ad ſtabilitatem & firmitudi nem dentiū, aliquid etiam conducant. Porro ſo rantur dentes ab humorū acrimia & erodētium influxu: quemadmodum etiam cutis circa exte riōrē cauſam ſolet exulcerari. Verū cutis exulce ratur aſidue & multis: oſſa aut rarius, quōd ob duriētiā

Papuli in mu ta exemplibus medicamina cō gruentia.

Lichenus re media ſcripta d Cretæ.

Impetigini co gruentia reme dia.

Lichenus exu matus.

Lichenus cura matus ſanādo medicamenta.

Dentes dolent & pulſant.

Dentes inuolū tati ſunt inflama tione perſpeti. Dentes aſperi et multum ſpud ligunt ex in qui ſunt exiguę q; papuli.

Dentes dudum ſunt obnoxij of fitionibus.

Dentes trini tati ob alimen ti inopiam eſſe macer dolent.

Dentes a quib; ſeruantur humo ribus.

duritiem ægrius quam cutis ipsa patiantur. Igitur corporum eroforū medela, erit reficacior vianti influentis humoris: qui si paucus fuerit, per localia exsiccantiæ auxilia abluetur. Si verò multus, vniuersi capitis providentia est habenda: quod quidem si ob vniuersum corpus affectum sit, huic etiam est prospiciendum. Etenim erofa ob molliuinem dentes, duriores impatientioribus per austerā & acerbā medicamentā redduntur. At limidos redditos, per siccantiā curare oportet, ut qui ex viscosorum humorum influentia pariantur: unde similem cum foratis curationem desiderant.

#### De gingivarum medela.

Gingivis ex inflammatione dolentibus, optimū pharumæ est oleum lentiscinum recens, calfa ælium in duplici vase, atq; ore retentū. Repellit enim curā molesta, discutitq; absq; mordacitate, cuius rei insinuationis præcipuus est vñus.

Quæ Archigenes ad dentium dolores conscripsit.

Dolētes dentes colluant acri aceto calido cū galla. Aut pinguib; redis in aceto feruēfactis. Aut myrti ramulis cum pice in aceto tepēfactis. Aut hyosciami cum aceto. Aut agrestis cucumeris radice, vel mærubio, singulis cū aceto, pipere, & nitro. Aut pulegij decocto. Minscē facit dens caninus vñus & trisus, deinde cum aceto coctus, & ore retentus. Aut scillam, aut radicem hyosciami in aceto coctā colluato. Aut pyrethrum cum hyssopo, & colocynthidis medulla similiter coquito, liquorēq; ex eis longo temporis spacio in ore teneto. Hæc Archigenes. Porro solani stupefaciēdo sensum duntaxat, auxiliatur dentium doloribus.

Ad foratos atq; dolentes dentes remedia ex Archigene.

Sory Aegyptium resina terēbinthia exceptell obline, indeq; intra dentis cauernulā. Aut senecath anguis dentib; apprimito, & exidens. Aut vermes terenos totos cauernulæ præmandatq; inpergit. Aut piper, vel rorismarini semen opio exceptum, in cauernulam inde. Aut in autem denti vicinā oleum sesamini, in quo vermes terrestres concocti fuerint, instilla. Ipso autem dolente dente hyosciamam cōterant. Erofi etiam atq; dolentibus dentibus; candens admouetur cauterium. Præstat ad efficiendam pituitam, staphidem agrestem per se, & cum pulegio mandere.

Fomenta ad dentium dolores extrinsecus sunt ex sale & milio, simul & torrefactis, & coniectis in scecalos. Dolenti autē denti affricetur origanisramulus, oleo feruido insinatus. Aut opopanaxem & peucedani succū vnita, linteolo illata, & intra oleum feruēfacta, denti dolenti apprimo. Aut bene coniecto, & hinc iussu, hyosciamisemina in suffumigium adhibe.

Ad eximendos absq; dolore dentes.

Pyrethrum acerrimo aceto ad dies quadraginta condito, terito, & reponito. Visu verò exigente, reliquis cera obduratis, dolentē ipso pharmaco integito. Deinde horā interposita, digitis extrahere, aut scalpello exigito. Dentes educunt fortiter nictymali succo, & forti, cum chalbauo imposita. Apollonius autem radices hęc succo per

se iubet instillari in nāres, ad soluendum dentium dolorem.

Eiusdem, ne erofi dentes vacillent, néve fectorem edant, remedium.

Veratrum nigrū erui magnitudine, mellē cocto exceptum, cauernis inde.

Eiusdem ad dentes denigratos optimū dentificium.

Alabastrine vñi drach. viij. pumicis vñi drach. iij. salis torrefacti drach. iij. tritis vitron. Ab horum visu collusione vitendū est, ex vino odorato, in quo ad multū tempus iris sicca fuit macerata. Aselepiadis remedium ad dentes moros.

Cornu ceras vñi drach. viij. Rhois vñi drach. iij. omphacij drach. iij. balauitij drach. iij. corticis pinus, myrrhæ, sing. drach. j. misia vitron.

Consilium eiusdem ad molarium dolores.

Radices symyij cum aceto multo coquito, & excolatum liquorem ore tenendum dat.

Ad erofos dentes præseruarium.

Zingiber cum aceto multo coquito, ac pbe ærio, indeq; in cauernā indiro, forisq; dentem ex eo integio. Aut hederæ lachrymam chalbano misceat: aut tithymall, vel ficus syluestris succo dissoluit, ac vitron.

De mobilitatib; & prominentibus dentibus.

Vbi dentes absq; ictu præcedente mouent, vñ simile est neruosi radicibus eorū adnatis, præ nimia humiditate laxatos esse: ob idq; siccantib; medicamentis eis esse opus. Quam autem emoci dentes prominentiores sint reliquis, præcipue vbi ex plaga mouentur: sanē semper optimū iudicium fore, si sic affecti, in tantum atq; crentur illima, quantum super reliquos prominent: idq; ne oppositos sibi offenderēt, in loquendo, mandendo: quod consilium semper mihi sanis feliciter cessit. Oportet autem gingivis linteolum molle vñq; ad radices dentium arcundare: dein digitis finistrey manua leniter amplecti, simidq; rurē, & citra compressionem, ne cōcutiatur, cui limulam adhibemus, chirurgij ipsam aggredi: eamq; nō vnā vice absoluerē, sed pluribus. Imperitūm etiam est vñq; ut nec loquatur, nec durum aliquid cibum accipiat: vitatur autem alimēto succo pisanæ, & forbitione ex alica, & pane mado, atq; aliis id genus mollioribus.

Ad firmandos dentes, ex Archigene.

Myrrhæ, pompholygis, aluminis scissi, amyli, & quælibet singulorum partes tritas admoue. Postea asinum lac colluant calidum, aut acrum, aut vinum, in quo malicorinū & galla sint coctæ. Ad dentium autem stuporem portulacā manducet.

De dentitione puellorum, eiusdem.

Dentitioni infantulo, si doluerit, canino lacte gingivis obline. Aut si leporino cerebello gingivis eius illenctis, citō dentes proventient. Mulcet gingivās dolētes aceti cui hyosciami radix incoctā fuerit. Quod si enascēs denti vñq; erumpat, & cōpungat ginginam, cyperum ex butyro & vnguentū suffuso iuxta exortum illinito.

Præseruatiua dentium ab Archigene prodita.

Alumine scisso & modica myrrhā confricato, nec erodent vñq;. Aut tridem Ilyricū manducare.





qui virides nuces decorticant. Atqui nisi in profundum manu illa facultas descenderet, non cer-  
te ægre diuisibilis esset. Quam autem descendat, in-  
dicat planè substantiam succi, tenuium partium  
esse. At rationi est consonum, astringendi vim es-  
se maximè ex vîs, ubi in eiusmodi cõstineal sub-  
stantia: ineptam autem existere, quæ crassam par-  
tium substantiam est cõsumpta. Optimum itaq; ac  
simil suauem esse nucum succum mihi persuadens,  
eum in quatuor partes diuidi: & ad primam ita-  
tim aliquid ex astringentibus misceo: ad secun-  
dam, ex croco & myrrha: ad tertiam, sulfuris & ni-  
tri nonnihil. Quartam verò solam synceram ser-  
uo, ob dulcorè futuram vîlem pueris, mulieribusq;  
& viris effeminatis. Est aut quod ex suc-  
co rubi cõstat, fortius eo quod ex moris confici-  
tur: quæmodum hoc eo, quod ex musto paratur:  
omnib. ramen prestat quod ex succo sit nucum.  
Porro in pharmacis quæ deglutiuntur, maxi-  
mè coniectare oportet naturam eorum qui ipsa  
sument. Nam qd cum molestia aut fastidio-  
sè accipitur, os ventriculi evertit. In stomacis  
autem medicamentis, eiusmodi synceritatem in-  
terdum contemnere licet. Si quis igitur medium  
aliquid medicamentum cõficere omnibus aptu ve-  
lit, vt (exempli gratia) quod cõstat ex succo mo-  
rorum, ad quinq; libras succi, vnam mellis adiu-  
ci: croci autem & myrræ, vtriusq; drach. j. s.  
Vini item austri liemini vnam: opliachi, drac.  
j. Quod si non adit, pro ipso rhois succum inieci-  
es: & si volueris par pòdus vtriusq; imponere,  
nihil peccaueris. At Hera drachmam vnam scissi-  
lis aluminis addit. Quod verò ad coquendū mo-  
dum spectat, ego sanè censeo succum ipsum so-  
lum esse per se præcoquendū vîque ad crassitu-  
dinem strigendū: dein verò adiciendū meli:  
arq; vbi iam cacabum ab igne velis auferre, re-  
liqua imponenda esse. Etenim vt spuma argenti,  
& plumbago, aliq; multa metallica, per coctura-  
m meliora evadunt, sic vis cõplurum aromati-  
corum exoluitur. Ceterum ad induratas infla-  
mationes, quum iam præterit vigor, nec am-  
plius insuat quicquam, prædicto pharmaco dis-  
cussoria miscere oportet: cuiusmodi sunt, spuma  
nitri, nitri, petræ aliæ dios, sulfurisq; viuum. Ac sus-  
ficat sanè nitri vniūcū semis, sulfuris vniūcū duas,  
si addideris. Quod si nihil horum sit præstito, in sa-  
pa aut malsa origanum seruescit, & gargarizare iube-  
to. Nihil autem refert, etiam si hyssopum conici-  
as pro origano, aut pulegium, aut thymū, aut  
rhythram, aut calaminthem, aut hedyosmū. In  
vigore autem inflammationē collutionibus &  
gargarismis concoquere inflammationē opor-  
tet, pinguium caricarum decocto, lētiscinoq; o-  
leo tepescito in duplici vase. Quin & ipsum sto-  
maticum pharmacum in vigoribus gargarizare  
conuenit mulsæ dilutioni permittit, aut calidè  
sapæ, aut etiam aquæ calenti. At meum ex succo  
nucum medicamentū, aliorum omnium est va-  
lidissimum, vtilissimūq;. Quum aut tres sint  
Punicorum málorum species, a quibus nempe,  
dulciū, & acidiora, quas singulorū partes, vna cū  
corticib. soleo ipse enā cõtundere, expressusq; suc-  
cus cum melle coquere, ac sic cõficere medicamē-  
tū solum stomachicū, sed ad multa alia vile. Con-

tunditur etiā cum illis & rubi fructus: cuius suc-  
cus similiter preparatus succo mororum, melius il-  
lo pharmacum redditur, sed minus validum eo,  
quod ex nucum succo paratur. Quin & málorū  
coroneorū, & pisorum syluestrium, ac me-  
spilorum succus, similiter præparatus, stomachi-  
cum pharmacū redditur, aptiusq; etiā vt devo-  
reretur: quum hoc qd ex nucibus cõstat, devorare  
nō liceat. Verū quod ex punicis cõstat pharmacū  
cum, aptū est exoluto & cibos fatidicū ventricu-  
lo: deficit ramen ab eo qd ex mális cõstat. Inno-  
cuius est etiā cubi mororū succus voratus, veluti  
& ipisorū mororū: sed succus rubi mororū habet  
quid quod stomachū roborat: quod ipsum, mo-  
rorum eremor non habet. Iam verò succus nu-  
cum plurimo melle opus habet: & post eū, rubi  
mororum: modico autem, málorum & punicorū,  
& pisorum syluestrium. Medius inter hos  
est mespilorum succus. Ex cornis etiam, brabylisq;  
& prunis, ita antea præparantur. Ceterū si cras-  
sus esse videatur succus, statim mel admiscere o-  
portet: sin liquidior, præcoquatur. Suscipit au-  
tem pisorum atq; málorum succus parum men-  
suram mellis. Succus verò eorū quæ nimis acer-  
ba sunt, veluti est corni fructus, aliquando du-  
plum, aliquando triplum mellis desiderat. Porro  
si argumentum futurius admittim sit, non ad-  
modum deglutire oportet confectum pharmacū,  
præterquā si iuxta stomachum aut alium  
vicerofam affectionē fieri veremur. Quin & si  
in ipso ore maligna vlcera fiant, præstant ex atra-  
mento furorio medicamenta. Sufficit aut drachm.  
ad prædictam compositionē admitti, in qua vniūcū  
mellis librā coniici dicebamus. Iam verò quum  
rhus sit duplex (alter enim obsonus inspergitur,  
stomacho commodus: altero coriorū nñctores  
vntur) vterq; sanè musto incoctus, stomachicū  
efficitur medicamen. Mustum etiam solum, citra  
mellis mixturam in mellis consagum redactū,  
bonum sit pharmacum in principis, augmentis,  
atq; vigoribus. Ad declinationem autem præsti-  
tent, si in ipso die integram tedas pingues par-  
maceraueris. Quod si precioso efficere pharmacū  
vis, iniicias etiam casie corticem, aut nardū  
Indicam, aut malabathi solum, singulorū nem-  
pe vnam drachmam. Ad induratas autem infla-  
mationes cõiiciuntur quæ generosius discutere  
possunt, rufa videlicet, & cribrata: idque vbi olla  
ab igne est exēpra. Ac talia sanè sunt, costus, amo-  
mū, macer, Cyrenæicus succus, Medicisq;. Pau-  
peribus ramen pro sumptuosius discussorius phar-  
macis, aut dictamniū, aut acron, aut meon, aut  
pyreturum, aut cardamomū, aut sinapi inicien-  
dū censeo, pari pondere: ita vt ad triū drachma-  
rum pondus, eorum mischorum moles perveniat  
ad prædictā symmetriā, in qua mellis libra habe-  
batur. Verū pro cõstructionis affectuū propoe-  
tione augeri ac minui pharmacorum vehemen-  
tia oportet. Ergo pharmacū cõficientes ex mi-  
sto, ad decē musti heminas, tres iniciemus hemi-  
nas rhois coriariorū, aut eius q obsonus insper-  
gitur. Si verò vtrūq; iniciamus, vtriusq; vna &  
dimidia inicienda est. Iuxta proportionē etiam,  
ex discussoriis, quodcumq; tandē in promptu ha-  
beamus. Quod si vnum tantum suppetat nobis  
astringendū vim habēs, quod in principio iniicia-

Stomacicum ex  
amib. devoran-  
dam non esse.

Rubi mororum  
succus si vtri-  
culi roborat, ad  
quod succo mo-  
rorū non suffi-  
ciat. Quod si  
saccharū quidā  
plur, qd qui mi-  
nus requirant  
mellis.

Calcanthem  
quando stom-  
acum miscere ex  
pediat medica-  
mentis,  
Nō duplex.

Musto quando  
et qualiter præ-  
parato vntū  
in ore inflama-  
tionibus.

Discussoria  
pharmacica quæ  
non sint.

Stomacis ex  
musto compo-  
sitio.

Inflammationi  
incipiens, an-  
teriora: ruganti,  
moderata:  
insulans, ma-  
gis digerens  
conveniens.  
Alimentum po-  
tius facilius.  
Digerens me-  
diocriter.

Digerens ve-  
lenter.

Stomatium An-  
dromachi ex  
multo.

Stomatium ex  
befala Andro-  
machi.

Colomella la-  
xata remedia.

Stomatium ad  
omnes vias e-  
rit.

Stomatium  
Asclepiadis.

mus: aut vnicū discussorium, quod iuxta finem:  
ex illo totum pondus explebimus, qđ ex omni-  
bus alioqui fuisset cōstāndum. In vniuersum au-  
tem, austeriora quidē, in principis, & vehemen-  
tibus inflūxionibus congruunt: moderatiora in  
vigoribus: vt magis discussoria in declinanti-  
bus. Porro ex astringentibus facilia parata sunt,  
rosę, bacę myrti, myrtus, lēricus, rubus, canru-  
bus, galla omphacis, fructus Aegyptie spinę,  
oīa aluminis genera, vñus & alter rhus, glauciū,  
omphaciū, cyrtini, & balaustia. Ex discunentibus  
moderatē, faciliē paratur caricarum fursurūq;  
decoctum: aut mulsā, in qua origanum, aut hy-  
fopii, aut thymus, aut calamintā, aut pulegiū,  
aut hedyōisum cōcoctā sint: quę si diutius co-  
quantur, fortiora redduntur: amplius autem &  
nitri spuma, aut ipsum nitrum vitum. Fortius ve-  
rō his est salus vitum. Rectē autem Androma-  
chus medicamini ex succo moros confectio ad-  
didit glycyrrhizam, vt exasperata leniret, asperi-  
tatemq; astringentium mitiorē redderet.

Stomacum Andromachi ex multo,  
quo vtor.

Gallas xxx. Rhōis coriarij sex. ij. musti sex. vj.  
Gallas contractas per diem & noctem in multo  
macerato: dein cogito, donec ex roto quarta su-  
perstet portio: quam per lintheolū colaram, ex pres-  
samq; in olla ad mellis crassitudinē spūato: de-  
in trita addito, aluminis scissai, croci, myrrhę, sin-  
gul. drac. j. permixta reponito, tandēque eis vi-  
tor. Iam verō, quod ex dulci cōfectum est mu-  
sto, magis mitigatorius & moderatum erit, sed  
minus efficacius: autem quod ex acerbis fit visus,  
vehementius quidem astringit, leniendi vim ta-  
men non habet: ex medio vino paratum, mediū  
facileter fortitur.

Stomacum ex befala, anginis congruū,  
ad Andromachio scriptum.

Sem. anisi, apę, ammi, floris iunci odorati rot.  
aluminis scissai, irisidis illyricę, befala (hoc est, fimo  
is tute syluestri) cinnamonomi, myrrhę, Troglody-  
trey, aristolochię longe, casę, rosarū, siccarū,  
crocomagmatis, sing. vnc. j. croci, cineris hiru-  
dinū, tenellarū, vtriūsq; quadrantē: croci sesqui-  
vnciam: nardi Indicę, amomi, vtriūsq; vnc. s. gal-  
las viij. tritis cum melle vitior.

Stomacum Asclepiadis.

Hirudinū syluestriū vitarū cineris drac. iij.  
croci, nardi Indicę, vtriūsq; drac. j. melle excipito.  
Aliud Andromachi, ad collumellam laxatā.

Aluminis liquidi lib. j. florum rosarum lib. s.  
succu hypocistidos quadrantem. Alumen in mel-  
le coquito, dein sicca in spergito, vti tōq;

Aliud eiusdem ad omnia viia oris.

Crocomagmatis drach. ij. irisidis drac. iij. san-  
darach drach. s. terebinthine drach. ij. lyci  
Indici drach. j. vix paxi drach. viij. aloę, ompha-  
ci, singul. drach. j. nucum pinearum totarum  
drac. viij. succu glycyrrhizę, aluminis scissai, ba-  
laustii, singul. drach. j. floris rosarum drac. ij. mel-  
lis bem. ij. s. Conficito.

Stomacum Asclepiadis.

Succi hypocistidos drac. s. balaustii, lyci, aca-  
cię, sing. drach. j. excipio oliuę immaturę succo,  
& posita melle subactis vitior.

Si verō pger stomatica id genus fastidiat, in mo-

deratis quidem inflammationibus sufficere suc-  
ci soli fructuum iam dictorum, vt rubi, & moro-  
rum, puniceorūq; malos, & cotoneorū. Quin  
& succus nucum vbi cum solo melle paratur, gu-  
stui suauis existit: itēq; multū ex visis acerbior-  
ibus pressum, si rhus in id cōciatur, optimum  
pharmacum redditur. Ad eā verū inflamma-  
tiones quę multa astrictione indigent, austerum  
puniceum, aut cotoneorū, aut vtrorūq; succus,  
melli admixtus, sępe mihi fuit satis. Singula aut  
horū succos licet omphaciū adicere. Vehemen-  
tissimū medicamen reddet, si punica integra tun-  
da s vñ cum corticibus, indeq; succū exprimas:  
atq; hoc magis si acerbū fuerit. Acerbissimum  
etiam fiet, si ad puniceorum austerum ita toso-  
rum succū, omphacium superaddatur: cum mo-  
derato melle. Prestantius adhuc reddes pharma-  
cum, si tota cōstia punica mēla, passio cocta ex-  
colaueris. Ne verō valde exasperet, glycyrrhizę  
succum admiscens, conficies optimū pharmaciū.  
Si quid verō indurātū appareat, iis succis q; me-  
dias facultates fortuntur, iucius aliquid, dum  
coquantur, ex pulegio, aut thymo, aut onгато,  
hyfopo, mētha, aut calamintā: dein colabis, &  
habebis optimū medicamē. Quod si calidius ef-  
ficere velis, piper adde. Omnib. tamen si glycy-  
rrhizę succus addatur, melius pharmaciū efficiet.

De crustis.

In calidis & humidis corpora partibus, qualis  
est os, ex quacūq; tandem causā fuerit exulcera-  
tum, citō putredo oboritur. Ad cuius vlcera for-  
tissimū sępe vti cogimur medicamentis. Atqui  
fortissima sunt, quę escharam instar cautēri ex-  
citant. In externis igitur corporis partibus, vbi  
parti curandę crusta fuerit inducta, ā fortib. su-  
perfedemus pharmacia, trāsgredientes ad deter-  
soria, quę escharas tollunt. In eis verō quę in ore  
excitantur sunt escharis, tutius mihi videt esse ad-  
miscere ad exteriora pharmacia, alia quędā for-  
tiora, & quę per se ad mota, crustas etiā inuēret.  
Melli itaq; maximā extergēda vii pedito, crustifi-  
ca medicamēta immiscemus: quęmadmodū ad  
sordida quę in corporis cuticula orunt, misce-  
re illi leuiter extergētia solemus, vt thus, eruo-  
inidem, aristolochiā, & alia id genus. Porro An-  
dromachus, ad oris crustas, ex nucib. pinerū, a-  
mylo, alumine scisso, flore rosę, croco, & mel-  
le, composuit optimū stomacum.

Critonis ad oris crustas medicamentum.

Misyos torrefacti drac. iij. mellis optimi cy-  
athos sex. misceto & vitior. Idem etiam præstat  
diacutis affatus cum melle.

Archigenia ad crustas oris remedia.

Commodissimū est stercus canum, altorum  
osibus, ex melle illinum: quod etiā in angina au-  
xiliat. Autrhus Syriacus ex melle. Aut hirudi-  
num vitarū & stercoris humani par modus cum  
melle illitus. Aut hepans luparidi cochlearia  
duo trita bibenda dato. Ego verō medicamē ex  
rhoē damno, quod astringētis fit facultatis, quę  
minimē crustis cōuenit. At hepar lupinū eupato-  
rio mistum, ad hepaticas etiā bibiti affectiones.  
Sorani stomacum ad crustas, ferentētię gin-  
giuę & humore pręgnantes.

Misyos vii drachmas vii. irisidis illyricę drach-  
mas iij. croci drach. j. Trita in pyxide lignea  
reponi.

Acerbissima stu-  
matis visceris  
de rate.

Indem in illi  
maturis apia  
pomeris.

Glycyrrhizę  
stomatium addi-  
ta, ipse melle  
radice.  
Puerile oboritur  
cui in calid-  
da & humida  
partibus.

Oris passio in  
stomatium in illi  
de crustis  
effi. vbi melle  
fimo pharmacia  
et, quę per se  
ad mota, crustas  
et, p. p. p. p. p. p.

Oris crustis de-  
lente rursus  
vita.

Crusta in com-  
mune stru-  
ta.  
Hepar lupinū  
conferit hepato-  
m.

Stomatium  
Sorani.

reponito, & rum per se, tum ex melle vitior.

Aliud nomine Anthera.

Iridis Ilyricæ, sandarachæ, cyperi, sing. drac. iij. aluminis scissi, croci, crocomagmati, sing. drach. ij. tritis & mistis vitior.

Stomacicum Heracidides Tarentini ad vehementes putredines oris atq; reliqui corporis.

Chalcidinis partem j. calcis viuz tantundem: auripigmenti partem dimidiam : tritis & mixtis vitior. Aliud. Florum rosarum drach. iij. aluminis scissi, galix, sing. drach. ij. myrrhæ drach. j. trita melli misceto, vitiorq; Quidam sale macerato in aceto, reficcatq; vtunt. Si hæc remedia putredo in aceto respuat, vtendū cauterio est: postea vero colluendū vlcus prædictis, imponendūq; anthera, donec crustæ abscedant.

De columella.

Caruncula illa quæ ad extremum oris pendens cernitur, à veteribus quidem gargareo, & cion, hoc est, gurgulio & colūta: à neotericis autem cionis, hoc est, columella, vocat: cuius sanæ affectionem quandam, staphylen, hoc est, vuā, dicimus. Raro tamen affectio hæc circa columellam contingit, licet ea sæpe inflammetur. Et sanæ quemadmodū in aliis omnibus, in quib. ex humorum influxu contingit morbus, sic etiam hic prima auxilia debet fluxionem ipsam repellere: quare astringens sicut facultatis oportet: verū si quidē influxus sit moderatus, moderate astringens, quam prius iam austerā vocā: si vero vehementior, acerbæ. Ambæ q̃que facultates astringunt, sed debilius austerā, vehementius acerbæ. Porro moderate collutiones rubi ex palmulæ, rosarum, pampinorum vitis, rubi, canirubi, aspalathi, cyperi, cymorum, siliquarum, radicū mori, hypocistidis, mīlorum austero, pīrorum acerbiorū, ac sorborū decocto. His formiora sunt myrrin & baccarum eius decoctum, & ex acerbis cotoneis malis, & virgulorum tenerorū ilicis, arbuti, simlacis, fagi, & ipsarum glandium: mespilorum item, & cornorum, & fructus memphæ. Generosissimū autem est decoctum gallarū, & rīoris culinarij, & coriarij, fructūsq; myricæ, & Aegyptij spinæ. Ex his singula rū per se, tum etiam mixtum cocta ex aqua, gargareare oportet. Mixtū. n. quā mixturæ ipsorum vībores sēpe sūt ipso simplici vīa. Quā & arida etiam columellæ in sparguntur. Iam verō moderate astringē etiam lapis Ageratus, aloë, cyperus, & stoei iūci odorati, radix nardi Indici. Eximie astringūt omnia aluminis genera: scissū verō inter ea tenuior est purtium, & ob id vīlius. At atramentū fortiorē vehementem astringendū vim possidet. nō est tamē expers calfacto: ne ob id iij. putilaginosi vitioribus cōvenit. Carterū gurgulionem exasperat, etiam si illi scirrhi contraxerit. Corruptuntur autē fucci omnino, si absq; melle reponantur, aut reficantur, si plurimū fuerint cocti. Nōnulli tantam ariditatem asseclunt, vt conteri queant. Tales sunt hypocistides, vix acerbæ, glycyri hiez, & cēraurij succus. Radicem autē eū quætere, inter duo eiusdē genus pharmaca, vtrū sit ipsorū præfatus. Omnia siquidē medicamēta respiciūt ad aliquod tum vīliū, tum noxia dicunt. Quocirca si prouidaueris pharmaca nihil esse sola per se,

recte dixeris: nihil enim sunt, nisi nacta fuerint ventē recte. Si verō cōtrā, pharmaca deorū esse manus fatearis, similiter recte dices. Iuuant quippe maximē, si is q̃ eis vīit, in rationali methodo fuerit exercitatus, atq; natura prudē. Porro mixtura pharmacorū eiusdē generis, mediocriter pharmacorū vīus sit gratia: ob idq; semper duo contraria medicamēta in vnoquoq; affectu vos habere oportet: precium duco: quæ quidē permiscendo, multis pharmacis abvndabis. Quā autem raro quis affectuē inveniat, quæ (exempli gratia) solis discussorius, aut repulsorius indicat, cogimur etiam sæpe diversī generis medicamēta miscere: quemadmodum vbi cum repellentibus aut a nodynis discussoria cōsumimus: vt si gurgulione inflāmato, ad alūmē iridem miscemus Ilyricam, aut farinam erumē, aut thus, aut myrrham. Etenim quā discussoria sint multa, est semper à minoribus suspicandum: quam doquidem inflammata exasperantur ab acerbis.

Quæ Archigenes scripserat ad gurgulionem inflāmatam.

Vix laxata, succum Cyrenaicū dissolutū illine: aut gallam tritā cum sale: aut ipsum sal dissolutum: aut lyci radicē tritam: aut omphaciū cū melle. Si fortius medicamētum vis, atramentū sit torij, squamæ aris, aluminis scissi, misyos, myrrhæ, galix, quas partes tritas, ac vino exceptas iline in principio tamen sale non est priuatim vtendū, sicut nec Cyrenica lachryma: sed vbi colūmellæ inflāmatio indurata est fuerit. De gurgulionis aut inflāmatōe sic Hippocrates dicit: Gurguliones cum periculo excindunt, vrunť, ac reficant, quādiū rubri fuerint & magni: q̃ tempore alius aris, graciles sint reddēdi. Quē verō totū id quod appellant vū, abscessent, extremum autē gurgulionis mātis, luidāmq; redditum finiet, superior verō pars tenuior, tunc sanē intrepide curationi admodicē suū manūs.

Quæ scripserit Archigenes ad vīgentē inflāmatōnem gurgulionis & tonsillarū.

Si verō in vigorē affectio pervenerit, subducatur alius, aut calidam lorion em fursum gargarizer, aut prifanæ succum, aut passum tepidū, aut radicis dulcis decoctum cum passō & hyssopo: aut ficus vino incoctas: aut succum prifanæ, in quo vūc sint passū incoctæ. Magnopere iuvantur, si amygdalinum oleum in aures infundens, formico spōgiis expressis leniter foueris. Quin & omelys ex cruda hordeacea farina imponenda: aut ex farina senilis lini aut farnigrici. Quod si iam apud suppuratōnem accedere non sille videtur, coadiuuare assidue per ficū decoctū oportet, p̃modū in cellatū id gargarisma exlubere, simulitēq; aquā mulsam calidā. At si nihil tale apparuerit, augeat autē malum ita, vt ægri vix transigunt sine possint, ac sanificationis principij sit nobis suspectum, alius fori chyster, aut glandē subducenda est, & secunda cubiti vena, cucurbitrix q̃ scarificatione collo ac mento affigenda. Fomentis etiā & caraplasmatibus robustioribus est frequentius vtendum, gargarismisq; assiduis. Quod si nec his qdē remediis mīrescat morbus, sed augeatur indies, vena sub lingua secet, aut iuxta angulos oculorū, atq; illa q̃ in fronte consistit. Ulinatur autē assidue tel rad-

Pharmaca nihil sunt sola. Pharmaca esse dicitur manus.

Discussorius mihi: ne cor sit in principio vtendū, vbi di generis est opus.

Gurgulionem inflāmatam emendat, vnde dicitur ad obsequium.

Gurgulionis affectio carere secundum Hippocratem.

Gurgulionis inflāmatam cura sit secundum Archigenem.

Tonsillarum inflāmatarū cura sit secundum Archigenem.

Vena sub lingua, vel iuxta angulos oculorū, inflāmatōem vīliū qdē demouenda.

ri, & elaterium cum melle: aut sal cum oleo vete-  
ri, mellisq. & aceto: aut centaurea cum melle: aut  
abfinthium cum nitro & melle.

Hæc medicamen ad columellam laxatam.

Galizæ omphacindis, aluminis scissi, salis am-  
moniaci, sing. partes portiones contento, insper-  
gitog. Vel ageratum lapidem derafum in pol-  
linem similiter columellæ imponito. Porro He-  
raclides Tarentinus recte sanè post vsum medi-  
caminum exacerbatum, iubet colluamur fau-  
ces lentum decocto, ad tollendam vehementem  
illam astrigentium aspredinem.

Ab Asclepiade prodita.

Rosarum ficcarum sextarium j. nardi Celtici  
vini cū radicibus, & adherente terra, fasciculum  
j. nardi hirundinis sylvestris auri drach. ij. myr-  
rhæ drach. viij. gallas omphacindas iuniorum xv.  
cōfusa & tertia digitis apprimat. Est enim hoc mi-  
stix potentissimum pharmacu. Aliud. Piperis albi, myr-  
rhæ, sing. drach. i. aluminis scissi drach. η. galizæ  
omphacindis tantundem. tria admoue. Hoc ra-  
men vitendum non est in gurgulione vehemēter  
rubente. Aliud eiusdē facultatis, quo & nos su-  
mus vsi. Lapidis agerati, Afizæ petræ, terræ famiz,  
singul. drach. iij. aluminis scissi, croci totrefacti,  
gallarū omphacindū, sing. drach. ij. tritis vutor.

Cruentia medicamentum digerens.

Osum palmularum, nucū tenerarum immat-  
urarum, siccatū, vitærunq. drach. unj. Vritō, at-  
que in puluillum terito, vitōrū arido admoio.

Aliud Sorani, maxime ingratiorū, ac proin-  
de convenientissimum ad vigentes inflamma-  
tiones. Glycyrrhizam contundito, & mel & a-  
quam pari mensura affundito: dein coquito, &  
liquorem ipsūm gargarizandum præbeto.

De pharmacis ad vlcera oris  
aphthas appellatas.

Vlcera oris in suspensorio oris obortæ, aphthas  
appellant, habentes quippam igneæ caliditatis.  
Fruunt aut plurimū pueris lactentibus, quum aut  
vitiolum fuerit lac nutritio, aut nō probe ipsūm  
cōco xerit infans. Curant facili, vitpote quæ vel à  
moderate astringētibz compescitur. Quando-  
que tamē diuturnæ sūt, egregiè solubiles, & pro-  
gressu rēpons nonnihil putrilaginosum acqui-  
rūt: atq. hæc sanè fortiora medicamēta postulat.

Andromachi medicamē ad aphthas malignas.  
Alumina scissi, viti, drac. η. fructus ericæ drac.  
i. oleo excipito, & per digitum loca apprimito.

Eiusdem ad aphthas leuiora.

Lycium Indicū vino tritum, circumlitū, & eri-  
cæ fructus tritū, aut rosæ siccæ cum melle, auxi-  
liantur. At Crito, adipem suillum, & mel, simul  
liquefacta, commēdat: cum collationem etiam ex  
asinino lacte mādicationemq. portulacæ intin-  
ctæ melle: quæ omnia & simplicissima sunt, &  
pueris maxime idonea.

Quæ scripserit Apollonia ad aphthas.

Ad aphthas albas, chalcidū oleo triti penna  
illinito. Postquam verò puræ factæ fuerint, myr-  
rhæ fructū tritum, aut aqua multa, aut vino di-  
lutum, illinito, maxime in infantibus. Ad nigras a-  
phthas, vnam passam exacinatam, & anilum, tri-  
ta cum melle illinito. Vel amento sutoio tri-  
to cum melle vutor. Vel zruginis vermicula-  
te obolos tres in vini quartæ hemina parte gar-

garizandos præbe. Vel muriam oliuarum & a-  
cerum pari mēfura mista, colluenda dabo. Man-  
dende sunt enim oliuæ maris condite. Hæc A-  
pollonia. Etenim oliuæ sic asseruat, discutiūt,  
atq. vehementer astringunt.

Quæ Archigenes ad aphthas scripserit.

Ad aphthas faciunt collutiones ex decocto fo-  
liorum oleæ, aut myrræ albæ. Facit & amurca, &  
marrubij succus, aut lentis decoctū. Aut spx vini  
dulcia cum melle illita. Sūmē facit ad depascen-  
tes, fœniculi radice vitæ cinis. Porro ex colore  
ipsō facile lucebit colligere, qui nam humores ip-  
sas aphthas produxerint. Rubicandiores liqui-  
dem, sanguinem præcellere indicant: flauiores,  
amarū bilem: albescētes, pituitosum humorem:  
quemadmodum nigrescētes, melancholicū suc-  
cum. Qui autem hæc rite discreuerint, non eritq. fa-  
cultates singulorū medicamentorū simpliciū, is  
vnicuiq. aphthæ speciei, propriū sciet administrā-  
re remediū. Expēdet aut simul ipsas naturas cor-  
porū. Fortioribus quippe corporibus fortiora  
medicamenta adhibēda sunt: debilioribus imbe-  
cilliora. Ego porrō insensitibus qui adhuc à nutri-  
cibus aluntur, lentem cum modico pane, & me-  
dulla cerni, aut vituli esubore. Admisco etiā ci-  
bis nonnullū ex astringētibz fructibus. Quan-  
doq. etiā de lacte, feride, solano, & portulaca  
cōducto aliquid, si aphthæ sit inflammata. Quod  
si cibum assumere nequeant, nutriticm eiusmodi  
victū alo, vitq. cōcoquat rectē, prospicio. Verum  
tamen etiā infantem illino, si quidē fœbrilis vi-  
dero aphthas: in principio quidē, his quæ mode-  
ratissime astringunt, & frigefaciūt: dein verò, eis  
quæ citra mordacitatē discuntur. Si verò substa-  
nas videro, ipsē vror, sed magis refrigerātibz bus.

At si pituitosiores, astringētibz, vt si nigrescētes,  
dificultioris generosisoribz. Ceterū in maioribus  
pueris, eiusdē generia facultatibus pharmacorū  
vror, auctis tantū ipsorū vinibus: quemadmo-  
dū etiā in perfectis & durs corporibus, singulis  
relatis facultatibus fortissimis vror. Sufficit au-  
tem mihi in his per omnia misyos vīus cū vino  
astringēte, quod rum intendit, rem remittit vim  
suam, pro vt magis aut minus vini fuerit astrin-  
gens: & pro vt crassius aut liquidius efficit phar-  
macum ex misyos ac vini mistura. Quod si sordi-  
da appareat aphthæ, misy cum vino multo tero.  
His verò qui fortiora quā misy, medicamenta  
postulat, zrugio similiter dissoluta, est vtilis. Cō-  
modum est etiam pharmacū ad hanc rem, chal-  
cidis oleo trita. Atq. hæc quidem efficaciora. Mo-  
derata verò, & maxime ad incipientes affectus,  
omphacium cum vino & ænoemelite: similiter  
enam thus. In pueris sufficit rosarū floz, & ipse  
etiā rosæ siccæ. In summa verò, moderate aphthæ,  
maximè in corporibz teneris, moderatis phar-  
macis opus habet: fortes verò & maxime in du-  
ria corporibus, curantur à validioribus. Fortia  
pharmaca intelligo, tum quæ astringunt vhe-  
menter, tū quæ etiam mordiciti: sicuti moderata,  
quæ prorsus sunt mordacitatis expertia, nonni-  
hilq. astringūt. Porro oleū per se, infensissimū est  
aphthæ affectū: vel vni etiam chalcitis: quando-  
quidē alterum quidem humefcat, & fordes gi-  
gnit: mordet autem vehementer chalcitis. Ve-  
rū moderata mistura ipsorū, optimū phar-

Olia mura  
credita dicitur  
et vno  
mura affi-  
guat.

Aphthæ cau-  
sæ ex colore de  
gustando scito.

Fortiora opus  
est validioribus  
opis mō-  
da. acuta, vt  
mordicioribus  
mordicioribus  
aphthæ quæ  
infensissimæ  
sunt, curant.

Aphthæ sunt  
vulnosa, præ-  
cipue in infa-  
ntibus.

Aphthæ cau-  
sæ ex modo  
vari astrin-  
gentibus.

Aphthæ vari-  
remedia à va-  
riis descripta.

Aphthæ moder-  
atissime moderatis  
describunt: vt  
mordicioribus  
fortiora.

Aphthæ si opus  
est mordicioribus  
ex chalcitis et  
oleo moderat  
curantur.

macium

macum efficit. Nam quemadmodum ex cerato & argente in carnem efficitur pharmacum solet, tamen li ambo per se sint contraria carni gignenda: ea dem ratione ex oleo & chalcide aptum medicamentum conficitur.

# GALENI PERGAMENI de compositione medicamentorum secundum partes, lib. VII.

De affectionibus contingentibus circa  
respirationis organa.

**A**speritas arteriarum pharmacis, mos est appellare arteriam. Vocatur enim arteria asperam, vis illam quod ducit ad laryngem ad pulmones, ex cartilagineis corpusculis, brachis dictis, constitutam: unde etiam tota arteria, interdum dicitur bronchia. Videntur autem ipsam intrinsecus quoddam crassa membrana, quod ob crassitudinem nonnullam tunicam nominant. Scripserunt porro veteres multa & diversa medicamenta ad asperitatem organorum respirationis: ad vocemque tum interceptam, tum rancidam. Etenim ubi instrumenta vocis ab humiditate vehementius atque tenacius impacta fuerint imbuta, vox non eripitur: quod vero moderatius lumen est, sunt, oboritur rauco. Organum vocis quod dico, intellige arteriam, et laryngem, & pharyngem, siue epiglottida. Qui igitur ex vehementi clamore vocis auspicus obstitit habet, is similis quoddam affectu coniungit in illa tunica asperitatem arteria, et quod manibus, et rumbis, & musculis, ubi plurimum laboratur. Ceterum curationis genus evadit. Siquidem cura & manus conficere per oleum licet, quod per cutem in adiacentes musculos penetrare ipsius possit facultas. Luxta asperam vero arteriam cartilagineis post cutem sita, prohibent in subiecta pellucula transitum facultatis vnguentorum mollium. Itaque auxiliorum materia congruenti respirationis organum, quod ab aliis peteda est, tum etiam a balneis dulcium aquarum, cibis, & lenibus, & laxantibus. Si qua vero asperitas fuerit, cibis vitandus est: qui diuina hunc paritibus quod cum loco affectu commercium habet. Est enim vna, eademque sibi continua & collicrens tunica, quod pharyngem, laryngem, galiam, & interna ipsius asperitatem arterie vestit, obducitque. Quare cibi congruentes tunc erunt, qui ex lacte, amylo, alica, ovis, & libis dulcibus consistant. Si vero per hanc non curetur affectus ipsa, inveterata sunt a medicis pharmacorum sub lingua tenenda, ob idem hypoglossi dem appellata, quod eadem facultate cum arteria eius vocatus predicta, ex vino Theriaco, gummi, tragacanthia, & glycyrrhiza consistant: quod lenigat quidem teperrimam oes asperitates, quicquid vero reliqui est ex inflammatione, eoquequunt, & citoperveniunt. Qui autem pharmacorum lingue subdet, patientis sit laboris oportet, ut ipsum paulatim liquescens, in laryngem excipiat, remittens interius tunc, si qua excitata videatur. Impossibile tamen est, ut illa clara vocem elidat, citra vium pharmacorum absque acrimonia extergentium: qualia sunt faba flos elixa, prunella, ac semine lini torrefactum. His magis detergentur resina ter ebullientia, thuris, ac despumatum mel, & amygdala amara: quemadmodum istis rursus fortiora sunt farina erui, semine hominis, radix uridis, panacis. Certe

rum his omnibus, vina mollia, & passum Creticum, & Theriacum, & Scybalites, & sapia, & decoctum caricarum, conveniunt. Est autem ad affectionis principium, visum ad finem eiusdem, paulatim progredendum a levisimis tunc cibis, tum medicamentis, ad ea quod defecit detergentes vehementius. Igitur primi ordinis sunt tragacanthia, gummi, famus aiter, amyli, sorbitio ex alica & trago, lac, panes dulcissimi, quod sorbilia, sesama, & nuxes pinex, quas strobilos vocant. Ab his autem deinceps est beryllus, & glycyrrhiza decoctum: id quod praevalent ad sapia ex musto, vel ad Creticum passum miscere, rursusque coquere. Hec itaque in affectionibus inflammationis circa arteriam atque laryngem ortis commoda in principio sunt, donec moderata inflammatio fiat: ac prae omnibus, si vini potu hoc tempore abstinendum est. Quum vero moderatior facta inflammatio fuerit, vinum dulce Theriacum, aut Scybalites bibere licet: quo tempore etiam beryllus est aptum, & sorbitio ex amygdalis, necnon ex lacte & melle dulcius coctus, amyli infectio, aut filigine. Quia sane victus ratione inflammationis quod deinde ipsa ledatur: relinquitur tunc humiditas multa, ob quam impossibile est clara vocem proferri. Quare transire tunc convenit ad his edulius, ad omnia ex melle cocta, & ad faba flosam elixam, & pistam, & brasica, & porrum probe coctum. Si militer etiam pharmacorum visum idoneus est, quo tempore inflammationis aut asperitatis praecellunt, eorum quoque detinentur sub lingua: post hanc magis detergentia & resiccantia exhibemus: idem gradum facimus, donec ad ea quod acedunt nonnullum fortuitum, perveniamus. Deinceps igitur ex arteriis quod a veteribus prodita sunt eligens praestantiora, hunc methodo adiacis: quod quidem necdiscernere, nec illis probe uti poterit, qui in commentariis simplicium medicamentorum accuratè non fuerit exercitatus.

De arteriacis ab Andromacho scriptis.

Thuris, myrrhae, croci sing. drac. j. scilicet drac. ij. passu Cretico sear. ij. Scilla in passu coquit, donec inspissetur passum: deinde scilla abiecta, in sparguntur reliqua. scilicet electis, hoc est, delingibile pharmacum.

Alia arteriaca confectio.

Aloes sextem: croci vnc. j. mastiches tunc dem. Conficito. Soluit enim alium, eoquequunt (croci ratione) ex, quorum gratia exhibetur.

Alia lenis exasperata, concoquuntur & extergens.

Thuris, succi glycyrrhizae, sing. vnc. j. tragacanthia drac. vj. nardi drachma j. myrrhae, amomi, croci, sing. drac. iij. mellis Arici quod sit satis. Conficito.

Alia arteriaca, optima ad tabidos, & oes inveteratos pulmonis & thoracis affectus. Cinnamomi, thuris, vni sing. vnc. j. succi glycyrrhizae, myrrhae, tragacanthiae, nardi Indici, amomi, sing. drach. iij. croci drach. j. Melle Arico excipio.

Alia ad arteriam affectam, viciaria pulmonis, puris & sanguinis reiectiones, fluxionesque in thorace efficit. Resine terribinthe, croci Cilicis, thuris, myrrhae Troglodyticae, cinnamomi, amomi, nuxis pinex, & glycyrrhizae absque medulla, aseteris semine, chalbanis, costis, singul. drach. iij. nardi Sy-

FF iij

Voci autem impedita, aut rancida, ob inflammationem aut affectum arteriarum laryngis, aut asperitatem arteriarum, quod visum est modicum ratio commendatur.

Arteriaca pharyngis, quod dicitur, aspera arteria, ex quibus constat particula.

Vox quando interceptatur, rancido quod dicitur, vna organa quod.

Respirationis organum male affectu rancido, vnde patet de.

Tunica eadem vestit gulam, pharyngem, laryngem, & interna aspera arteria.

Hypoglossi dem, quod dicitur, constat.

Hypoglossi dem, quod dicitur, constat. Extergentia ad vocem portant faucibus, quod sunt.

Arteriaca, hoc est, ad affectum organum, vna est respirationis organum, pharyngis, laryngis, & interna aspera arteria.

Tabida arteriaca optima.

Flamboyis arteriaca vna scilicet.



riace drach.ij.s. casie nigre drach.ij. tragacanthæ, palmularum Syriacorum carnis, sing. drac. iij. Mellis Attici heminas iij. Conficito.

Hypo glottides, hoc est, orbiculi sub lingua te nēdi, ad alipredines gutturis, interceptā vocem, & sanguinem reiectantes. Tragacanthæ drac.vj. gummi drach.v. thuris drach.j. obol.j. myrrhæ drach.j. obol.ij. croci tantundem: succi glycyrrhizæ drach.j. obol.ij. aut rad. drach.ij.s. piperis albi grana xxv. palmularum pinguium carnis drach. iij. Tragacantham passio macerata & tri tam reliquis tritis cōmixto, singulotq; catapota magnitudine fabæ.

Arteriacæ delingibilis, ad tabescētes, purulen tos, atq; hydropas incipientes, & tussis in vetera tas cōgruens. Datur per diem & noctē cochlea rij mētura. Succi scillæ sex. iij. passii Cretici sex. iij. vini Falerni sex. viij. mellis Attici sex. iij. myr rhæ trientē: croci, thuris, vtriusq; sextantē: aristo lochis oblongæ minam j.s. glycyrrhizæ minam vnam: radices eryngij sextantē: casie, nardi Celti cæ, singul. vnc.j. xylo balsami besseni. Lignosa il la confusa in vino macerato per triidui, dein ad lentū ignem ad ternas coquito, atq; ira exprimi to, & retinēntes abiectas, passum, mel, & scillæ succum cōiuncto, & ad mellis crassitudinem coq to. Crocum verō, thius, & myrrham, cum vino terito, atq; vbi optimē habuerit pharmacū, addi to: postquā verō fuerint modicē fusa, ab igne tol lito, & reponito ad vsum.

Alia arteriaca media, mediis congruens arteriæ affectibus.

Croci, vix passie exacinate, vtriusq; drach.j. amygd. dulcium drac. viij. myrrhæ obolos iij. tragacanthæ drach. iij. piperis albi obolos iij. melle cocto excipiantur.

Critonis Arteriacæ, ad vocem in interceptam.

Ficum & eryngium probè coquito, & ad decoctum ipsorū gummi addito, vt melle durior confectio fiat: exhibetorq; ad noctem.

Alia euulsē, faciens ad affectus arteriæ, & vl cera tum aurium, tum etiam pudendi. Thuris o bbolos iij. myrrhæ drach. ij. passii cyathos iij. Pas sum ad mellis spissitudinem coquito: dein myr rham & thius cū passio semicocto ablato, misce ro. Facit etiam ad dysentericos & cæliacos. Re cūsissimē autem fecerit, qui arteriacas concoquē tes atq; lenientes, in duplici vase coxerit: nempe vasculum quod coquendum pharmacum cōti net, in aliud plenum aquæ feruentis imponens.

Confectio Critonis, ex capitibus papaueris, diacodyon dicta, ad affectus organorum respi rationis conducent. Capita papaueris agrestis o ctingēta: aque festuoris lxxx. Coquito ad tertias, hoc est, donec flaccida appareat: atq; expres sa addito mellis lb. x. Si verō variā efficere vis, adde croci, myrrhæ, succi hypositidis, singul. drach. xij. thuris drach. vj. acacie drach. xij. O pima tamen est simplicissima.

De vsu confectiōnis ex papaueris capitibus.

Vsus eius est in is qui somno opus habēt: quibus etiam ex opio confecta sepe exhibere cogimur. Opus habent maximē huiusmodi pharma cia ij. quib. tenuis fluxus i capite ad asperā arteriā desillat, nō permittens dormire ob cōsequen

tē tussim. In talib. ego etiā ex fapa, hoc est, hepse mate, siue musto cocto, quod etiā fixum vocit, pharmaci cōpositiōnem parare soleo. Quin & per passum aut Theriā Crenū melius est q̄ per mel cocturū fieri, vbi fluxus valde tenuis exite rit. Mel siquidem fugiendum tunc est, quum re nues fluxiones augeat, facultate tenuandi præ dium. Admiscetur etiam huiusmodi pharma co glycyrrhiza, ira vt simul cū ipso coquatur. Si verō in pulmone consistat copia humoris dela pti i capite, cōfectio ex melle est præstantior. Da tur cōmodata mētura duorum cochleariorū satur magnorum copia. Augebis autē & minues hanc copiam, respiciens ad magnitudinē corpo ris cui exhibiturus es, necnon ætatem, anni tem pus, atq; regionē. In omnibus enim his, frigidio ribus minimū dabis, calidioribus amplius.

Arteriacæ ab Aсклеpiade scriptæ.

Brasice succum melle coctum lingendū ex hibe. Alia. Cremoris eryngij in aqua cocti, le minas ij. Cremoris caricæ similiter cocturum, tantundē. His addo gummi subtilissimē dissolu ti drac. viij. coquito diligenter ad arteriacæ spissitudinem, & inde cubitum iteris ad cyathi mēsuram lingendum dato. Alia. Chalcidni drach. vj. piperis drach. j. nutri tantundem, mellis Attici cyathos vj. Chalcidni & mel coquito, densa rāq; adducto cæteris, vtriq; Alia insignis. Cro ci, myrrhæ, succi glycyrrhizæ, thuris, casie, sing. drach. j. piperis grana xxij. passii Cretici sex. iij. mellis Attici cyathos vj. vtere.

Hypoglossis Dioscoridæ.

Croci, myrrhæ, tragacanthæ, succi glycyrrhizæ, sing. drac. j. nucis pineas repurgatas, contras sūq; numero. lx. a mygdalas mundas toridem. Excipiantur melle decocto. Datur nucis pon tri cæ magnitudine sub lingua tenenda.

Alia Mithridatis.

Myrrhæ, croci, vtriusq; drac. iij. nardi Indicæ, terebintinæ, vtriusq; drach. iij. thuris, casie, cin namomi, sing. drach. j. passii Cretici heminas iij. Passium & terebintinā ad perfectā compagem coquito, & cum ficcis cōmixto: indeq; ad nucis ponticæ magnitudinē sub lingua tenendū dato.

Alia mirificæ faciens ad affectiones thoracis.

Farinæ fabacæ tostæ hem j. indis Illyricæ qua drantē, nucum pinearū tostatarum sextantē, pule gh aridi cōtusi sesquidrachmā: seminis vrticæ drac. j. piperis vnc. s. Mellis boni sex. ij. Farinā cum melle ad densitatem coquito. Seminis lini etiā tusti, tostī & cribrati heminam vñ in prom ptu habeto, cum cæterisq; adducto.

Alia ad tussim & spiritus prolationem, valde probè expurgans.

Hyssopi, pulegij, vtriusq; sextantē: trididis, sem. sinapis, nasturtij, anisi, piperis, sing. vnc. j. rufæ & cribrata, melle cocto excipito. Datur cochlearis boni mētura.

Confectio ex marrubio Platonis.

Myrrhæ, styracis, opij, succi marrubij, chalcidni, croci, quales partes Vtere melle cocto exceptis.

Pharmacum Harmonia dictū, ad desillatio nes, insuperabilēq; defluxum conducent. Sty racis, castoreij, piperis, cardamomi, singulorum drach. iij. opij, myrrhæ, seminis hyoscyami albi, sing. drach. iij. passio ex cepto in catapota redu

Melle rium se quendum esse, vbi tenuis fluxus i capite ad asperam arteriam desillat: excipere datur autem dno crassum.

Diacodyon me dicamentum vno du medietate.

Arteriacæ me dicamenta ab Aсклеpiade scripta.

Hypoglossis, hoc est, ambrosia melle in lingua tenenda. Dioscoridæ.

Hypoglossis diacodyon.

Hypoglossis vtriq; vñ.

Hydropi recri ti opus non me dicamus.

Vni intercep ta arteriaca Critonis.

Vtriq; au rium puden diq; medica mentum.

Coquenda esse arteriaca leni entia in dupli ci vase, & quo modo. Diacodyon Cri tonis.

1242

Diacodyon, hoc est, ex capi tibus papaueris confectum medicamentum, quibus conser uat.

Marrubio con flati medicamen tum. Harmonia di fluxum medica mentum desillati ad pelum con flatum.

cito,

cito, datōq; ciccris magnitudine ad somnum.

Medicamen Andromachi, Ambrosia dictū, ad phthysica & febres repentes per circuitus, Nardi, croci, myrrhæ, costi, calix, cinnamomi, iunci rotundi odorati, piperis nigri & albi, castorei, chalban, terrebintinæ, styracis, succi papaueris, seminis hyoscyami, sing. drach. j. tragacanthæ drach. vj. anisi, sem. lini, sing. drach. j. melba qd sit sapor vini Falerni heminam. Tragacanthiam vino sufficienti macerato, & rebus simul cum melle cōmittito. Datur febrientibus scilicet drachma ex aqua multa: febre carentibus vncia dimidia cum melle & aceti cochleario vno, & vini Falerni cyathis duobus.

Aliud ad omnem tussim.

Anisi drach. ij. costi obolo ij. myrrhæ, castorei, chalban, piperis albi, sem. hyoscyami, opii, succi glycyrrhizæ, sing. drach. j. passio excipito, redigitoq; in catapota, ciccris magnitudine.

Aliud ad omnem tussim, & fluxionem, & abscessus internos.

Sagapeni, gēuana, myrrhæ, opopanis, piperis albi, sing. drach. ij. baccharū lauri mund. drach. iij. trita, & aqua excepta, exhibeo ad græcæ magnitudinem fabæ: schuadici tamen paulo plus, ex vini diluti cyathis tribus.

De reiectione sanguinis.

In reiectione nō sanguinis primū periculū est, ne immoderata eius vacuatio fiat. Vbi verō superfluous est, curatio eius quidē, quæ ex referandē osculi alcius vasa contigit, p oburationē sit obsequi dilatori: eius verō quæ ex vasis ruptura, p cōglutinationem eiusdem, quemadmodū eius quæ ex erosione, p erosorū reuolutionem. Obaturatur igitur osculum referatur, per astringentia: cōglutinator autem ruptum, per eadem, & quæcūq; ipsa in compositione miscentur, citra mordacitatem resicantia, & glutinosum quiddam habentia, velut est Lemna terra, & Samius asser. Reuoluitur corrodā per cibos boni succi, & pharmaca ceterum gignētia. Igitur iuxta primā rationem, ex tabulis pharmaca cōponuntur congruentia ad curandū sanguinis reiectionem: iuxta secundā verō, in iis qui ex pulmone, aut thorace, aut arteria, aut larynge reieciūt sanguinem, miscentur prædicta cōgruenti mēsurā calida & tenui p partū medicamenta, quæ infestissima sunt tribus illis affectionibus dictis: mi scentur in quā grata distributionis, vt videbet astringentibus medicamentis præparatē, ac veluti sternū viam. At quum ex locis circa stomachū, aut alnū, aut abquod intestinū, sanguis educit, huiusmodi pharmacorum mīstura nō est opus. In festissimū ramē huius est id genus pharmacorum, quod in tantū refrigerat, vt affectū stupefaciat: quamvis & hæc misceatur medicamentis ad sanguinis reiectiones cōgruentibus: quū aliorē somnum conciliant, & cōmōdisima sunt iis qui tussis lenciantur, sistētia nimirū sanguinē qui ad vas affectum deferunt: atq; hoc per suū frigiditatem. Atq; hī sanē sunt cōmōsinos scopi.

Quæ Andromachio ad sanguinis reiectionem scripta sunt.

Acaciæ drach. iij. rosarum siccatum, balaustrū, sing. drach. viij. gummi drach. ij. tragacanthæ, drach. j. cum aqua pastillos facio, quorū singuli

pendeant drachmā vnam. Dato ex aqua pluuiæ: habet enim vim astringendā. Aliud sistens sanguinē. Croci Calicæ, myrrhæ, iridis, nardi Indice, thuris, acaciæ, sing. vnc. j. succi papaueris, costi, piperis, sing. vnc. i. rosarū siccatū mientē. Mel le excipito. Datur fabæ Egyptiæ magnitudo.

Aliud. Succu hypocistidos, balaustrū, acaciæ, gallæ, cythroni, sing. drach. xij. succi papaueris drach. vj. croci tantundem. Redigito in triobola res pastilloa. Aliud egrēgium Balaustrū, acaciæ, opii, myrrhæ, sing. drach. ij. tragacanthæ, succi hypocistidos, florum rosarum, seminis hyoscyami, singul. drach. iij. thuris drach. iij. excipito succo polygoni.

Aliud ad hæmopticos & dysentericos.

Floria rosarū, opii, acaciæ, gummi, balaustrū, hypocistidos, sing. quadrante: gallæ vnc. j. seminis planraginis, eiusdemq; succi, vtriusq; sextantem: lycopodii succi rosarum, vtriusq; vnc. j. redigito in pastillos drachmales.

Quæ Asclepiades ad sanguinis reiectionem scripsit.

Radici polygoni manipulū: rad. symphyti tantundem: rois rubri acrabulorum: aquæ sextarips iij. coquito ad tertias, & expressi liquoris cyathū vnum dato, cum gummi tenuissimē triti & dissoluti drachma vna. Aliud. Mororū rubrorum nodum maturorū lib. xvj. aquæ pluriū sextarior xvj. coquito ad tertias, & expressum li quorem reponito. Idē licet facere etiā de corni fructu. Aliud. Balaustrū, terræ Samiæ, corticis thuris, gummi, singulorū æquale pondus. Trita & cribrata exhibe cochlearis mēsurā in aquæ frigide cyathis vno. Aliud. Succu hypocistidos, succi acaciæ, succi rois Syriaci, balaustrū, opii, gummi sing. drach. iij. Vini myrtini quod fatis est. Confectio, & vitior.

Pastillus ex succino, hæmopticoia, diuturnæ & recentis tussis, phthysicis, sanguinē reiectionibus, purulentis, cocticiacis, dysentericis, & inflatiā cōferentia. Psylli mundi drach. xlv. india Ilyricæ, mastiches, ramentorū succini, croci, sing. drach. xxx. opii drach. xv. Psyllium in aquam calidā cōiectum macerari finito. Vbi verō suo glutine & mucilage ipsam aquam infecerit, liquorē expimito, & cum eo pharmacum in pastilloa cogito: ex quibus obolo tres ad somnū dato. Sint autem aquæ sextarii terni.

Pastillus ex corallio.

Coralli, terræ Samiæ, vtriusq; drach. viij. Balaustrorum, amybi, terræ Lemni, sing. drach. iij. seminis hyoscyami albi, opii, hypocistidos, singul. drach. ij. Excipe succo arnoglossæ, cogēq; in pastillos, & exhibe.

Cōfectiones sedantes dolorē, tabescentib. & sanguinē reiectionibus, interiorumq; affectibus cōmodæ, ab Andromachio scriptæ. Radici panacis, semina dauci, castorei, sem. hyoscyami, opii, sing. drach. iij. Mellis quod sit satura. Danur obol quatuor, cum squæ cyathis tribus.

Alia sedans dolorē, valena ad tormina, & dysenterias.

Sem. apii drach. ij. anisi drach. j. piperis albi tantundē: myrrhæ, castorei, vtriusq; obolos iij. opii, croci, sing. obolos ij. gentianæ drach. ij. Pastillos triobolares conficito, variēq; vitior.

Ambrosia Andromachi, febres repentes per circuitus perferunt.

Hæmopticos curatio.

Oburatio vasorum à quibus fiat. Glutinosum repletorum vasculū à quibus fiat. Reuoluitur vas ferum à quibus fiat.

Distributionum ratione mulier astringentibus medicamentis contraria distributione habet.

Stupefacientia medicamenta quæ ratione pharmaci astringentibus ad sanguinis reiectionem misceantur.

Hæmopticos remedia ab Andromachio scripta.

Dysenteria remedium.

Hæmopticos remedia ab Asclepiade scripta.

Pastillum ex succino Conficito, quæ barbari confectus de Charabæ opellati.

Pastillum ex corallio.

Andryna Andromachi, ad astringentem repletorum vasculū, astringentibus ad sanguinis reiectionem misceantur.

## Alia iucunda appellata.

Iridis Illyricæ, succini, croci, mastiches Chiræ, sing. drach. xxx. pſyllij drach. xlv. succi papaveris drach. xv. cum aqua pluuiæ pastillos, quorū singuli pendeant drach. j. conficito, & exhibeto. Pſyllium tamen per diem ac noctē aqua pluuiæ macerato: dein coqueto, & exprimito, cremoremq; cum aliis misceto.

Alia dolorem sedans ad oēs internos affectus & sanguinis reiectiones, vnde cūq; erumpat. Facit & ad nephriticos & hepaticos. Hæc ne prius dederis, quā mercedē accipias. Cinnamomi, casie, vtriusq; drach. ij. myrrhæ, piperis vtriusq; chalbanij, sing. drach. j. opij drach. ij. Trita cū melle paucō, in cataportia redigito, partim magnitudine fabæ, partim quāritate araci. Dato iuxta cuiusq; vires cum aqua, aut pro iudicio tuo.

## Alia ad eadem, Myſterium dicta.

Croci, costi, castoreij, asari, sem. hyoscyami, opij, styracis, sing. drach. j. Excipito melle, vtitorq;.

Anodyna ad easdem affectiones ab

## Asclepiade scripta.

Seminis cucumeris hortēsis decorticati drac. viij. amyli drac. iij. sem. lini, sem. papaveris albi, vtriusq; drach. ij. Tusa & cibrata exerce tragacanthæ cremore, & in dracinales pastillos redige. Dantur oboli iij. nō febrientibus quidem, ex vino: febrientibus verō, ex succo rhois. Faciunt ad fluxiones thoracis.

Cōfectio Panthæstus dicta, hoc est, multi vici, ad tussim antiquā, purulētos, orthopnoicos, tabescentes, ad omnesq; inflamationes. Pellit se cundas & menses, medeturq; vesicis affectibus. Te rebinthinij drach. viij. styracis drach. vj. myrrhæ, drac. v. croci, iridis, chalbanij, sing. drach. iij. Seminis hyoscyami, corticis mandragoræ, irionis torrefacti, opoponacis, sing. drach. ij. piperis, spumæ nitrī, vtriusq; drach. j. passō excipito.

Antidotus Aristarchi admirāda, confertēs ad affectiones prædictas, renitēsq; venenis, extermināsq; febres repetētēs p̄ circums, vna hora ante exacerbationē exhibita. Cinnamomi, costi, chalbanij, castoreij, succi papaveris, piperis nigri & longi, styracis, sing. vnc. j. mellis sextariū vnū. Arida teruntur & cribantur. Chalbanū coquirit cū melle: excolatis verō reliqua addunt, reponūtq; in vitreā pyxidē, argenteā v. Datur fabæ Aegyptiæ magnitudine, cum aquæ mulsi cyathis duobus, inſillularis digito guttis aceti nouē.

## De orthopnoia.

Qui citra febrem densē respirant, ob symptomā id dicuntur asthmaici, hoc est, anhelosi. Eodē etiā ob symptomā aliud orthopnoicos appellant, quod thoracē recto spirare cōgūt, me tu suffocationē. Munus est autem quod hi inspirant, quā pro viū respiratiōis, etiā si thorax ipsius plurimū dilatet. Ex quo manifestū sit, inter nā capacitatē coarctatā ipsi esse præter naturā: id quod ægri etiā laud obſcuro sensu perceptūt. Fit etiā & parulenti locorū coarctatio, ob collectū inter thoracē & pulmones humorē. Fit etiā peripneumonici, ob pulmonis inflamationē. Restant autem adhuc affectiones duæ, quæ angustiam locorū faciunt in viis per quas aer inspiratur: quā aut humorū crassiorum & viscidiorū multitudine pulmonis brōchis fuerit impacta, aut tu

mor abſcessus similis in ipſo cōstitit. Cæterū curatio ambarū affectionū aliquid cōmune habet, aliquid priuati, & alteri tantū propriū. Cōmune quidem vtriusq; est, vt abſumat redvndāria humoris affectiones gignētis: propriū, affectioni quidem viscidiorū humorum, vt per attenuantia & extergentia pharmaca disſipentur: ei verō quæ propter tumorem accidunt, vt per attenuantia & exciccantia eadē consumptio fiat: quæ curatio rursus omnibus in profundo abſcessibus cōmunis existit. Vni itaq; potus ambabus competit. Omnis autē potus modicus fit in iis qui alibi abſcessum habēt: multus cōtra, in illis quibus viscidis & crassis succis sunt obturata bronchia. Quippe pharmaca eiusmodi repurgantia humores, nullē necessariū excitant: uō verō facile per spūm reicitur, quod exurgatum est, nimium ob crassitudinē: quæ propter humectationē multa opus habet, quō effluat facili.

## Quæ scripterit Asclepiades ad dyspnoicos.

Scillæ crudæ succū exprimito, eiq; parem Attici mellis mensurā addito, & ad prunas admodos cogro. Dato inde & ante & post cibū myrrini mensurā. Aliud. Origani drach. viij. comæ thymij, iridis Illyricæ, calaminthij sicce, piperis albi, anisi torrefacti, sing. tantundem. Cnibrata melle cōcto excipito. Dato nucis ponticæ magnitudinem. Aliud. Vux passif Rhodij, exciccata, acerbullū: scenigraci loti tantundem: aquæ pluuiæ sextariū j. Coquito donec dissoluantur, & liquorem excolatum reponito. Ex hoc præbeto assiduū, & iuxta singulas irritationes, cyathij mēsuram calascit. Aliud. Anisi, fulsuriæ viui, vtriusq; quadrantem: ammoniaci thymiamatis, castorei, melanthij, singul. drach. iij. aqua diluta in cataportia cogito, vnūq; in aceti mulsi cyathis tribus appinato. Hæc omnia sunt ab Asclepiade scripta illis, quibus pulmonis bronchia crasis & viscidis humorib. sunt reſerta. At verō abſcessus qui attenuantibus & resiccantibus opus habet, maxime gaudent aromatum facultatibus, quæ & renuium partium sunt, & resiccatoriæ, præter hoc quod calasciūt. Porro iis qui propriē orthopnoici & asthmaici nominantur, pharmaca conueniunt secantia citra calfactionem: ob idq; iuuantur maxime ab scillitico aceto, necuō ab scilla, & ab aceto mulſo, eodēq; scillitico. Quæmadmodum autem in hac affectionē vehemētē cauendum est, ne calfactio, propterea quod viscidis & crasis succi non modō nō iuuantur, sed offenduntur etiā viū calfactiūti: eodē modo quæ valde refrigerant sunt omnino vitanda.

## Quæ pharmaca scripserit ad eiusmodi affectiones Andromachus.

Ad dyspnoia. Sulsuriæ viui drach. j. Sem. rutæ syluestriſ tantundem: aristoloclij, abſinthij, ammoniaci thymiamatis, abrotoni, sing. drach. iij. trita cum aceto in cataportia fabarum instar redigito. Dato mane tria, & vespertī totidem. Aliud. Ammoniaci thymiamatis, abrotoni, sing. drach. ij. sulsuriæ viui drach. j. formato cum aqua pastillos, & cum aquæ mulsi cyathis tribus præbeto.

Aliud. Scillæ, sulsuriæ viui, bituminis, sing. partem vnā. Dantur oboli. iij. in aceto mulſo.

GALE-

Anodyna ad  
internos affe-  
ctus ab Ascle-  
piade scripta.

Panthæstus  
dicta, multi  
vici ad tussim  
antiquā, purulē-  
tos, orthopnoicos,  
tabescentes, ad  
omnesq; inflama-  
tiones.

Antidotus Ari-  
starchi admirā-  
da.

Asthmatici  
cui sic dicuntur,  
Orthopnoici  
cui sic dicuntur.

Orthopnoia  
causa.

Parulenti.

Peripneumoni-  
ci.  
Respiratiōis  
angustiam an-  
gustia quæ effe-  
citur posuit.

Potus est de-  
bere modicus in  
quibus vici  
respiratiōis  
ab aliquo tumo-  
re angustia-  
tur: cetera multū di-  
la, quibus bron-  
chia & crasis et  
viscidiorum  
obſtinent.

Dyspnoia vna  
du ab Androm-  
acho.

Scillitico aceto  
tum orthopno-  
ici & asthma-  
tici maxime  
opuntur.

Dyspnoia vna  
du ab Androm-  
acho.



dum ledi, ab eductis, potionibus, & pharmacis atringentibus. Ceterum verò, vbi humores nō qua-  
litate, sed copia de ventriculi affluerint, vtilissi-  
mus atringentis est vſus, nimis languida tunc  
existerent ipſa particula affecta, inſtar laxarum, ar-  
ticulorum, quorum etiam per atringentia affec-  
tio corrigit. Porro polychreſta, ſive multi vſus  
medicamenta appaſſantur, quò vnum habere vi-  
ginti affectionibus congruum malumus; quin  
rot numero alia: quum tñ ad ſingulas affectiones  
vnum aliquod deſtinatum, co quod ad plu-  
res paratum eſt, melius exiſtat.

Ad ſtomachicam hiera Antipatri.

Alōes cleſt drach. iij. maſtices drac. ij. aſari  
drach. iij. roſarum ſiccatarum, iunci odorati, met,  
pſu, calix, ſing. ſemenciū. Tris vntor.

Stomachica Galli, affectionibus que calidit  
& ſiccari poſſulant, vtilia.

Corticis radices ſeneculi lib. s. aceri ſcria ſexta-  
rium vnum s. alōes quadrarium. Mellia An-  
tid lib. j. Radices loraz ad triduum aceto macera-  
to, deinde coquuto: atq; vbi coſtq; fuerint expreſ-  
ſas proſtrito, & aſuſo ad acetum melle, ſimul co-  
quito. Den aliquo inſpergito, & coſciana vna  
cum aqua dato. Etenim vbi per profundum ven-  
triculi, hoc eſt, altius, copioſa, ſed non praua, fue-  
rit deſixa humiditas craſſa ſimul & viſcida, opua  
eſt miſtura pharmaci attenuatori, perſoſinque,  
quale eſt tñ aceti, tñ oxymeli. Si verò nec talis ſit  
humiditas, nec alius imbibita, ſola ad curatio-  
nem atringentia ſufficient. Eſt aut ſufficiens ſi-  
gnum frigidi affectionis ventriculi, ſi æger ſe nō  
ſitire percipiat.

Alclepiadis ſtomachica, ad roborandū vētri-  
culū, exprimentisq; illius aduentinas  
humiditates cōgruentia.

Ad ſtomachi ſubverſiones. Nuculorum māſi  
punci tuſorū ſucci ſextarii iñ, ſucci mentha ſex-  
tarij. mellis Amici tantundē. Coquito in ſictili  
vaſe, aliudq; agitando: & vbi deſata fuerint, ab  
igne ablata reponito: porrigitōq; myſtaz vnum,  
aut duo, ante cibum.

Cōſectio ex fructibus, ad ſtomachi ſubverſio-  
nem, catilacos, & dyſentericā facientia.

Mila coronca numero s. forba numero t. me  
ſpila rotidem. Rhois rubri ſextarii vnum. Aquę  
congios viij. fructus tuſos & in aqua cōiectos,  
diligēter coquito: & vbi diſſoluti fuerint, liquo-  
rem exprimito, ac ruſus coquito. Quā verò ter-  
tia pars liquoris ſuperfuerit, addito mellia At-  
tici lib. iij. & ad prunas aliudq; agitando coquito,  
ac ipſiſſata reponito.

Caraponia ad ſubverſionē ventriculi.

Roſarum rectum deſectia vnguibus, drac.  
viij. ſem. papaueris albi drach. iij. ſem. hyoſcya-  
mi drach. ij. alōes oboloa iñ. aſari tantundem.  
Cū aqua dulcis in pilulas redigito, præbetōq; di-  
ceria magnitudinem.

Ad ardorem ſtomachi cataportium re-  
ſtinguena ſicim.

Seminis ſatiui cucumeris drac. viij. ſem. porru-  
lace tantundē: tragacanthę drach. iij. Tragaca-  
ntam ouorum crudo recentium candido diſſo-  
lutam, pbe tritina reliqua addito, & ex eis miſtis  
ſingito cataportia, quorū aſiccatorū in vmbra,  
ſub lingua vnum tenēdum dato. Hæc Alclepia-

des. In vniuerſum aut fugienda ea pharmacata ſunt  
in ventriculi affectionibus, quæ chalcationem, man-  
dragorā ve, aut alia id genus recipiunt.

Ad voluuloſas ſtomachi ſubverſiones paſſi-  
lus Amazonum ab Alclepiade ſcriptus. Seminia  
apn, & anifiſytriusq; drach. vj. ab ſineth drac. iij.  
pipereis, myrthę, opij, caſtorij, ſing. drac. ij. cinna-  
moni drac. vj. cū aqua paſtilloſo ſingito, & ſum-  
mum drachmā vnā dato, ſtomachicis cum pro-  
tropiſ diluti cyathus iij. choleſticis & vomentibus  
cibum, cum frigida: catilacis & dyſentericis cum  
baccarū myrti decocto: ſpleneticis, cum hydro-  
meltoſis cyathis tribus. Ego verò, quidd myrthæ  
aliquid medicamentuſum cōtineat, ſine illa miſtu-  
ra ſeſaturatę gratiæ hoc pharmacum preparare  
conſueui, piperea quantitate adaugens. Porro  
per cuiuſmodi voluuloſa diſpoſitiones, aliquan-  
do æterus per vomitū reddit: vbi videlicet par-  
ticulę affectę, a ſeroſia medicatiſq; humoribus af-  
liguntur magnopere. Quidd ſi etiā imbecillio-  
res ſint, geminat malum. Erit itaq; in iia curatio-  
nis ſcopus, vt ad affectas partes odorata admo-  
ueamus, cuiuſmodi ſunt, anifiū, apij, daucus,  
eluminiū, & ſefeli. Nam quemadmodum graue  
olemta omnia ſtomachi ſub vertere ſolēt, ſic o-  
dorata corroborare. Ad abſinthii miſcet in præ-  
ſcripto pharmaco, quod habeat vim extergēdi,  
repurgādi, & ſubducendi vicioſa ſtomachi hu-  
mores: quodq; contringat, & deſet, robāq; affe-  
ctę particulę addat. Cinnamomū autem ſertitū  
omnibus, putridaginoſiq; humoribus aduerſat-  
ur. Ceterum ſi cinnamomū uou addit, licetbit ea  
ſim proliſſo aſumere.

Alia ſtomachica Alclepiadis compoſitio, vtilia  
ardorē ſentientibus, & ad intenſos ſingultus, &  
ſtomachi voluuloſas diſpoſitiones. Coſti, ſpi-  
ce nardi, chryſobalanos, roſarum viridū, maſ-  
tiſches, ſing. drac. iij. alōes, aſari, vtriuſq; drachi  
ij. opij drac. j. ſucco pſyllij excipito, atq; ad paſtil-  
lorum formā reducito, oboloſq; tres exhibeto:

Diſtū mihi tamē iam eſt, impoſſibile eſſe vt  
inueniamus pharmacum, ad affectiones multas  
optimum: multoq; præſtantia eſſe, quod ſingulis  
earū deſignatur. Porro Hippocrates fieri con-  
uulſionē prodidit ex repletionē ſimul & eva-  
cuationē: quemadmodum etiam ſingultum. Quan-  
quam hic aliquando exiari citra plenitudinem  
aut inanitionē ſolet, vbi ventriculus ab acerbis,  
ſeroſis, medicamentuſiq; humoribus mordica-  
tur: quoa vbi quia vomitu eiecerit, ſingultu ſubi-  
tō liberatur. Multi etiā devorato pharmaco daz-  
tiorū pepereon, ſi vini inſuper bibant, omnino  
ſingultum. Similiter ex cibo in mordacē quali-  
tatem corrupto, nōnulli ſingultū, conſenſimq;  
ad vomitū liberantur: vt aliq; ex rigore oris ventri-  
culi corripitur ſingultu. Verū pueros maxime  
ſingultire contingit, tum ob alimentī corrup-  
tionem in ventre, tum ob partē frigidatę. In  
vniuerſum autem, vomitus eſt ſufficiens medela  
eorum, qui ob copię, aut mordicationē ſingul-  
tiant: vt caliditas, corum qui ob frigiditatē. Ex  
mediramētis quæ pharmacum illud cōſtituunt,  
opium, roſe, & pſyllij ſuccus, refrigerant. Spica  
nardi & chryſobalanus, digerit & corroborat.  
Aſarum per vrinās deducit vicioſos ſuccos Alōe  
granos humores purgat. Crocus concoquit, &  
partes

Polychreſta, hoc  
eſt, multi vſus  
medicamenta,  
reſequo ab in-  
que ad ſingulas  
affectiones  
parantur.

Hiera Antipa-  
tri ſacti ad ſto-  
machicam.

Stomachica  
Galli.

Ventriculi tunc  
ca. humores  
craſſi altius im-  
bibet. quæ  
medicamina de-  
ſiderant.

Ventriculi frigidi  
aſuſo ſufficient  
ſignum frigidi  
affectionis ventriculi,  
ſi æger ſe nō  
ſitire percipiat.

Stomachica ab  
aliquo de ſer-  
pta.

Conſectio ex fru-  
ctibus Alclepia-  
dis, ſubverſionē  
ventriculi, cau-  
ſam ex dyſen-  
terica ſancim.

Caraponia ad  
ſubverſionē  
ventriculi.

Caraportia ad  
ardorē ventri-  
culi diſtincta,  
ſi ſub lingua te-  
neantur.

Ventriculo aſu-  
ſo ſignificat ef-  
ſe ea pharma-  
ca, quæ chalcia-  
tionem, mandra-  
goram ve, recipi-  
unt.

Myrthæ vltimū  
adnotatum.

Voluuloſa vbi  
reſ diſpoſita  
non eſt, per oſa  
tata excludat.

Cinnamomū ſer-  
uare ſub verſum ſto-  
machicam.

Abſinthij ſacul-  
tat.

Cinnamomū ſer-  
uare. Caſia ſim vbi  
pro cinnamo-  
mo.

Pharmacū v-  
num multo  
ſolū optimū  
reperiri nō p-  
ſe.

Cōuulſio ſi  
repletio ſimul  
aut ex inanitione  
ſolet.

Singultus a qu-  
bus ſunt cauſe

medicantur

partes corroborat. Costus calfacit abvnde, astringitq; mediocriter. Stapefacientib. miscetur calfacientia, vt eorum malignitatem corrigant, eisq; sint instar vehiculi. Quippe viuens corpus mortificationi simile quid perperitur ab eorū medicaminum vīu, quæ ex opio, hyoscyamo, & mandragora constāti, ita vt insectantes causas nō sentiant. Quare multi qui talibus affligētur vīuntur, particulas ad immedicabilem frigiditatem perducant.

Descriptis etiā Asclepiades Hiere composi-  
tionem, in hoc ab Andromacho disidēs, quod ille quidem aloēs drach. c. ac reliquorū singul. in dederit drach. vj. hic autē octo drachmas scripserit, florēq; tunc odorati omiserit, quē aliis miscuit Andromachus: quodq; non xylo balsamo (vt Andromachus) sed pro illo sit carpo balsamo vīus. Confert autem huiusmodi pharmacū iis qui ob vīciosos humores, & præcipue biliosos, tardē concoquunt. Si quidē quibus bilis alius tunicas ventriculi infestat, hī præstantius pharmacum non inuenient. Cuius modē rā exhibito ad quatuor vsq; drachmas extēditur. Similiter auxiliatur vīscerū iam cōcoctis inflammationibus. Rectē autē hoc pharmacū tardē concoquentibus, aut bilem vomētibus propinatur ex aqua cytharis quatenus: vt ex aqua mulsā, ad vīscerum inclinantēs inflammationē ac deniq; ex vino mullo, dum aut vīnas ciere, aut promouere menses est animus. Adverte autem nos appellare drachmā, quod Romani vocant decarium.

Stomachicum dictum Asclepiades inexpressibile, ab Asclepiade proditum, sedans dolorem, inducens somnū, ac varios affectus sanans. Myrrh, styracis, nardi Indici, casie fistulæ, terre Lemniæ, corticis mandragoræ, piperis, singulorum drach. iij. Croci, fucci papaueris, singul. drach. vj. seminis dauici Cretici, anisi, fœteli, seminis apii, sing. drachmas octo. Myrrh, styracis, & opium, vino dissoluantur odorato, & teruntur: arida verō crēbrata miscētur, subigunturq; atq; in pastillos coguntur, quorum singuli drachmā dimidiam pendeant.

Quæ scripserit Archigenes ad affectus ventriculi.

Vbi rictus acidus edatur, coriandrum cochlearij mensura edendum ante reliquū cibum dato: insuperq; merum bibendum. Ad exolutū vītriculum absque febrē, menthæ ramulū contritum bibendum dato. Aut oenanthen similiter tritam cum nardo Indico bibendam dato. Aut marubij succū cum melle: & vbi paulū quietuerint, vinum cum polenta exhibeto. Aut Chig mastiches cochlearium ex aqua frigida dato. Aut glaciē ieiunis quoridie porrigito. Dolores oris ventriculi lenit, ac maxime iis quibus tristitia aut desperatio accedunt, lætissimā, aut mullebre, aut bubulum, silicibus in coctis, potatum. Si vñ cum humectatione ventriculi etiā inflammatio addit, oenanthen cum melioro, aut rosā siccam cum cerato rosaceo, parum resing vitæ habente, imponito. Quibus autem ob atram bilem, quam gignunt, stomachus inflatur ne tentatur, spongia acetō acerrimo calido imbuta ad stomachum ipsam imponito. Quod si

tensio adhuc perseveret, alumen liquidum cum atramento iutorio tito, melle exceptum imponas. Aut hæc & aloēm pari portione mista, & myrteo cerato excepta. Aut armentariæ bouis sterus andum vino incoctum. Aut polysacculum coquiro, & bibendum dato. Aut calamithæ decoctū per noctem sub dio expositū, modico melle & piperis drachma admixtus, porrigito. Solut autē dolores cuminum apiiq; roita, si modica portione cum aqua bibantur.

Aut aloēs obolos duos, cū vino mullo, aut vino, aut aqua, bibendos dato. Aut abrotoni & thymi, vtriusq; obolos duos, ex vino præbe bibendos. Ligaturas insuper extremorū fortiter adhibe, & circa ipsum stomachū cucurbitulis & fomentis variis vīs. Quod si vellemens sit dūctio, etiā venter sectio efficax erit auxilium, & alui solutio per glaciē suppositum. Porro eos qui ex ingēti tamen iniquitatur animo, reuocabimus odoramentis aceti aut pulegij, aut malis, aut piris. Excitantur etiā ad carnē suillam affatam, & ad omnia quæ multum alunt, præsertim ea quæ nidiosum odorem exhibent. In istauris autem ipsos iis quæ cōferunt vires rescicere possunt: cuiusmodi sunt oua sorbilis, bulbi, cochleæ.

At singulientibus rutam cum vino dato, aut nitrum in aqua mulsā, aut opium, aut castoriū, aut abrotonum, aut anisochitam.

Medicamen ex cydoniorum succo, sanans mediocres oris ventriculi affectus.

Succi cydoniorum malorum sextarios ij. mellis Attici tantundem: aceti sesquifextarium, vel sextarium vñ. Zingiberis quadrans: pipris albi vñ. Arida insperges, vbi malorum succus cum melle & aceto coctus ad mellis crassitudinem fuerit.

Quæ pharmacā Asclepiades scripserit ad affectus oris ventriculi.

Emplastrum ad subversiones oris ventriculi, dolorēq; atq; etiā inflammationes. Oenanthes drach. vj. croci, myrrhæ, floris rosarū, meliloti, mastiches, aloēs, corticis mandragoræ, singul. drach. iij. Carnis palmularij quadrans. Omnia cerato ex rosaceo confecto excipito, ad mouēdoque.

Aliud Nicerari, coeliaci, dysentericisq; admodum generosum.

Oenanthes vñ. ij. rosarū siccarum, mastiches, aloēs, gallarum omphacitidum, aluminis rotundi, acaciz, sing. vñ. j. ceri lib. j. picis brutæ quadrans: olei myrtei lib. j. Arida cōmituto liquida. Aliud ad eadē insigne. Oenanthes, omphacis, gallæ omphacitidis, aluminis scissi, acaciz, cinnorū mali punici, balsamij, mastiches, sing. vñ. j. Vini myrtilis, quantum satis est his subigēdis. Carnis phenicobalano rum fescuncē, exceptis lēntico cerato vitior. Et enim in his, q; sint stomachica, mentio astrictoria vix dominatur. Ar in medicamentis hepaticis relaxantia miscēnt astringentibus debent: quemadmodum sit in his quæ iam subdij, etiā ab Asclepiade prodata.

Malagma Nido inscriptum, sciens ad præcordiorum dolores, dissoluentē omnem duritiem, splenicis atq; hepaticis maxime salutare. Cere, ammoniaci, thymazatis, olei cypni, sing.

GG

Supra dictum  
necesse est  
causa, vt  
si malignitas  
non corrigatur,  
vires vīscerū  
debent.

Hic quibus  
anemias.

Hic modē  
exhibito ad  
quatuor drach-  
mas extēditur.

Drachma Cy-  
doniorum Ro-  
manis est octo.  
Andromachus  
Asclepiades di-  
ctum Asclepiades  
inexpressibile.

Ventriculi affe-  
ctus congru-  
ta medicamē-  
ta ab Archige-  
ne prodata.

Cucurbitulis  
admoventes,  
effici dicitur vt  
ritro, movent  
Anthrax.  
Deligium a-  
nime parientes  
ex aqua mulsā,  
quomodo  
sunt remanēda.

Singulientibus  
qua optima  
sunt.

Diarydionis  
medicamen.

Oris ventriculi  
dolorēq; phar-  
maca ab Ascle-  
piade scripta.

Stomachica me-  
dicamenta de-  
bit habere ad  
pessum vñ  
proprietatem.  
Hepatica me-  
dicamenta mi-  
no esse debent  
ex astringentibus  
et astringentibus.



lib. j. croci semivnciā: aceti quod sit satis. Ammoni-  
um macum dissoluitur, deinde arida aducitur.

Aliud Nili Crocerum, prædictis affectionibus  
admodum accommodum, faciens etiam  
ad cecylipetata.

Nili Crocerum.

Ammoniaci thymiamatis, ceræ, rosacei, sing.

lib. j. croci yucc. j. aceti quod sit satis. Confectio.

Malagma Hier-  
aticum ex me-  
lilotis, refrigerans  
doloribus acci-  
medatum.

Malagma ex melliloto, Hieraticò dictum, ad  
viscerum dolores accommodatum. Nardi Cel-  
tice, cyperi, myrrhæ, sing. drachmas x. cardamo-  
mi drach. viij. meliloti drac. xl. croci, amomi, v-  
triusq. drach. viij. cythreos sacrificulorum drac.  
xvj. ammoniaci thymiamatis drach. xl. refinæ re-  
tebinthinæ drach. octo: ceræ minam vnam: olei  
cyprini drac. cxx. Vini odorati Italici heminam  
vnam: præparat, & vetere.

Malagma Poly-  
archicum.

Malagma Polyarchidū, peripneumonici, sto-  
machici, lienosis, hydropsicis maxime ex vñs:  
faciens etiā ad affectiones circa vesicam aut vte-  
rum, ad omnemq. nervorū per consensum affec-  
tionē. Ceræ, terebinthinæ, bdelli, ammoniaci  
thymiamatis, cardamomi, cyperi, sing. minā v-  
nam: meliloti, amomi, nardi Indici, croci, myr-  
rhæ, rhuris, xylocinnamomi, sing. drac. xxv. olei  
cyprini heminam j. Vini Italici quod sit satis. Cō-  
ficio & vitior.

Malagma Andromachi ex melliloto.

Malagma An-  
dromachi ex  
melilotis.

Nardi Celtice, cyperi, indici, llyncæ, myrrhæ,  
sing. drac. viij. croci drac. iij. meliloti drac. xxv.  
ammoniaci thymiamatis drac. l. terebinthinæ  
tantundem: ceræ drac. c. Cyprini heminæ dimi-  
dium. Aceti quod sit satis.

De hepatis affectibus & facultatibus.

Pleriq. idiotæ quemadmodū stomachicas, sic  
hepaticas affectiones, vocant cōplices disposi-  
tiones iecinoris, tamen si maxime inter se contra-  
rias, hoc est, sub eodem genere plurimū inter se  
distantes. Non peccant autem quispiam di-  
cens, quemadmodum omnia contraria eidem esse  
generi subdita. Cæterum contrariorū notio cō-  
tingit, vbi plurimum inter se distant. Atqui plu-  
rimum in quoque genere vtrinq. distat a me-  
diis extremis. Porro ipsius imbecillitatis iecinoris  
lucet nobis vicinā assignare dispositionē,  
cui causam, nōpe intemperiem: quæ quædā quā  
in octo intemperantiis distribuatur, rursus nō  
malè dixerō, intemperiem ipsam non vnam, sed  
octo dispositiones existere. Ad hæc iuxta aliā se-  
cūonem duæ intemperierum differentię sūt, ac  
iuxta aliam tres: dum videlicet aut secundū qua-  
lirates tantū alterantur partes affectę: aut accen-  
dente etiā humorum affluxu, qui aut spacia tē-  
tū occupant in particulis affectis cōtenta: aut  
etiā substantiam ipsarū imbuat. Igitur circa  
ventrem & intestina quidem, vna in singulis ca-  
uis est, quæ possit vnosam humiditatem susci-  
pere: circa hepatis autē tot numero sunt, quot ha-  
bentur arteriæ & venæ. Et enim quā hæc omnes  
oscula angusta possideat, qua parte huius visce-  
ris sima cum gibbis coeunt, obstructions ab il-  
lis viscosis succis aliquādo oboruntur, breui in  
frigidis intemperantur, vtp̄ioris progressu in  
calidis: ad quas tandem oburationes putrefac-  
tio consequitur. Quam autē hoc viscus tot fa-  
cultates fornat, quod actionum species, con-  
tingit sepe vnam ipsarū præcipue lardi, sepe

Contraria esse  
qua sub eodem  
genere plurimū  
inter se  
distant.  
Extrema pluri-  
mum vtrinq.  
distat a me-  
diis quoque  
generis.  
Hepatis imbe-  
cillitas iecinoris  
per se est causa.  
Intemperies est  
cōplexa.

Hepatis obstru-  
ctio fieri  
qua parte rim  
simā cum gib-  
bis coeunt.

duas & tres, atq. omnes quatuor simul. Est itaq.  
actio ipsius vna quidem, ad se cibum & alimen-  
tū attrahere: altera verò, ambire, cōtinerēq., do-  
nec alterans ipsum, snūpius illud partē efficiat.  
Atq. hæc sanē dicitur alteratix facultas, inter a-  
lias principalissimā existens, & cui ferē primēpe  
bentur partes. Quæ verò iuxta hanc alterationē  
remanent excrementa, ea per excreticē facultate  
tem exterminantur. Ostensum autē est hanc qua-  
tuor facultates, vniuersis, quādiu viuunt, inesse  
corporis partibus. Vocatur autē alteratio ipsa,  
donec alimentū parti quæ nutritur assimiletur,  
concoctio. Vbi verò iam partē apponitur, nutri-  
tio. Quam igitur hepatis præimbecillitate ex ven-  
tre & intestinis alimentum trahere nō potest, li-  
quida per sedem, & nondum exquirere exaccata  
excrementa: simulq. cruda, si etiam cum hoc vi-  
scere ventriculus imbecillus existat. Si verò tra-  
xerit quidem alimentum hepatis ex ventre simul  
& intestinis: in sanguinem autē ipsum nequeat  
convertere, ob facultatis languorē: quemadmo-  
dum in ventre multiformis corruptio cōtingit,  
eorum quæ cruda remanent, sic etiam circa he-  
par. Est enim prior transmutatio in peregrinā  
qualitatem, iuxta cruditatem facta: moderatior  
verò, in qua alimentum dum propriam naturam  
retinet, nullam dum alterationem indeptum. At  
qui & tertia præter has, species frustrare conco-  
ctionis existit, vbi semicōctum alimentum relin-  
quitur. Ac per hanc sanē dispositionem, quæ ab  
hepate deiciuntur, referuntur prorsus aquam, in  
qua victimæ recens maciata carnes ablurę fue-  
runt. Verū autē affectū, nihil tale amplius ex-  
cernatur, sed multiformes aliæ qualitates con-  
sistentiz expurgantur, veluti a ventre dum cru-  
ditate laborat. Calida igitur intemperies si vi-  
scus affligat, colluquationes accidunt, primū  
quidem humorē, dein carnis ipsius hepatis: de-  
iētiq. bilis crassa, graueolens, atq. admodum  
colorata: quemadmodum contingit in pestilen-  
tibus febribus. Si verò frigida intemperies præ-  
pollat, neque assidue excretiones, neq. multæ  
sunt: durat tō affectus diutius, & per aliquos di-  
es profluit ipsius venter conferent magis: neque  
sætor excrementorum similis est iis quæ ex calo-  
re sunt liquefacta: neque color aut consistentia  
similis: verū minus graueolentia ab his excer-  
nantur, speciem putrefacti sanguinis, non colli-  
quæ carnis, habentia. Aliquando verò id qd  
delicatur, nigrum sanguinem refert: diligēter ta-  
men consideranti, nec sanguis niger est, nec gru-  
mus, sed veluti limus quidam sanguinis crassus,  
qui propē ad atram bilē accedit: in summa, plu-  
res, ægręq. iudicabiles colores circa huiusmodi  
affectionē cernuntur in alui excrementis. Sico-  
p̄ vs igitur curationis in huiusmodi affecti-  
bus, communis quidem sit iuxta cōtrarietatem  
intemperantię: peculiaris autem vnicuique, per  
cuiusq. contrarietatem. In vniuersum autem,  
affectio hepatica peculiariter appellata, veluti  
etiā celsata, stomachicę, circa tumorem præ-  
ter naturam circa ipsas partes otiorum, conningit.  
Signidem quam citra manifestū aliquid in vi-  
scere malum, in actionibus propriis langue-  
scit hepatis, rum ægrum vocant  
hepaticum,

Hepatis facul-  
tates.

Alteratix fa-  
cultas hepatis  
est inter alias  
principalissimā.

Facultates qua-  
tuor naturales  
esse vniuersis,  
si, dum vñs  
corpora parti-  
bus.

Hepatis languor  
de ab usque  
trahitur sym-  
ptomata.

Mutationem ci-  
bū in perco-  
ctionem super-  
gram quali-  
tatem, est alia  
rem amorem  
de cernunt.

Hepatis imbe-  
cillitas autē  
cōplexa in sa-  
nguine, quæ  
hæc excrementa  
auternant.

Hepatis intem-  
periem calidā  
qua siq. autem  
symptomata.

Hepatis frigi-  
da intemperies  
signa & sym-  
ptomata.

Hepatis intem-  
perantię, per  
contrarietatem  
sanandæ est.

Hepatis qui  
dicuntur.

Quæ

Quae pharmaca ad hepaticos ab Andromacho sint conscripta.

Antidotis cyphoides, ad hepaticos & omnia thoracis vitia. Vuae passae carnis drach. xzv. croci drachj. calami drach. iij. s. bdclij tantumdem: casie fcljquadrachmani: cinnamomi obolos iij. spice nardi drach. iij. floris iunci odorati drach. iij. myrrhe, terebintine, sing. drach. iij. ramē orū aīgalathi drachmani duas: mellis drachmas xvj. vini quod fit fatis. Conficito. Etenim cinnamomum omnes putrilaginosas, virulentasq; corrigit faculrates, quemadmodū casia, & postea omne aromatum genus. Crocus astringens, & cōcoctiorum pharmaca, etiam putrefactis corrigit. Vuae passā astringit quidem quantum requirit affectum viscus: habetne vim aliquam cōcoquendi crudos humores, & coercēdi maligna, existens etiam secundum totam substantiam iecori familiaris. Quippe ad intemperantias viscerum ea pharmaca optima sunt, quæ præterquam q̃ intemperiam corrigit, etiā aliam rem largiuntur. Quo nomine viuum cōueniensissimum est, circa inflammationem, aut emendandā, subhibendā, vñ intemperiem, aut

Alia ad hepaticos & ictericos.

Amygdalarum amararum drach. ꝑ. anisi, ab-  
sinthij, cumini, feminis apij, ling. drach. j. cor-  
nerui obolos ij. Trita cum aqua in pastillos tri-  
bolares redigito, ex eisꝫ vñ mané ac vesp̃er  
cum vino multo dato.

**Hepatica Athanasia**, ad nephriticos &  
ictericos, copiose sudorem  
promouens.

Croci drach. ij. nardi rotundem: cinnamom-  
caſie, myrrhæ, junci odorati, ſing. drach. j. Mel  
Attico excipito: datur fabæ Aegyptiæ magnitu-  
dine febricitantibus ex aqua mulſa.

Potio ad hepaticos, splenicos, nephriticos, hydropicos, stomachicosq. Auxiliatur etiā in letalia ex partu, & cōvulsis. Prodest & cōvalefcētibz: necnō ad humores vinosos, ictericos, tuſſientes, pleuritics, atque ad letalia venena, & ferarum ictus. Nardi Indici, coſti, veriusq; drac. ij. caſiz, croci, veriusq; drach. j. piperis albi oboli v. feminis apij drach. j. oboli ij. iridis Illyricæ tantundē facori drac. j. oboli j. opobalfami drac.

j. fucciari masculi drach. tres: vix passie exacina  
te drach. vi. Territo cū passio, aut mellie excipiro,  
ac drachmā vñ cum vino dulci dato, aut cum  
aquā mulie cyathis iij. Nullum tamen horum  
medicamentorum calidis intemperaturis cōve  
nit, sed aut humidis, aut frigidis, aut ex vtrifque  
compositis.

Confectiones hepaticæ ab Asclepiade proditæ.

Succi ciciorij cyathum vnum cum aque cali  
dx cyathis tribus, et melis Antici coctilem vno,  
porrigito. Aut fillicis, aut feridis succi cyathum  
vnum, cum aque mulse cyathis trib. dato. Por  
ro chicorij & feris ex genere cibariorū exsistit.  
Facillius autē ipsorum subfrigida & subamarā  
est, moderate astringens: quarum qualitatū ra  
tione, calidis hepatis intemperantiis summē cō  
veniunt. Nam vitra hoc q̄ moderate refrigerat,  
visceri firmitudinē addunt. Sed nec frigidas in  
temperies magnopere ledunt, quemadmodū &  
frigidū humiditatem absq̄ astrictione aut a  
maritudine possident, facere solent. Iam, ob miscel  
lā melis, humores per vrinās eliciunt. Quare si  
siccatā & rufa q̄s potioni interspergat, indēm iu  
uat. Ad visceris autem expurgationem, apertio  
nēq̄ meatuum, citra manifestā calfactionem  
aut refrigerationē, siliq̄ optimum pharmacum  
est, amarā qualitatem habens predominantem.

Cataplexis, hepatic,

Radiciſ chamæpityſ drac. viij. rad. eliorij  
drach. iij. contunde, & excipe melle coſto, præ-  
bebe nucis ponticæ magnitudinem: & aquæ cali-  
dæ cyathos iij. inſuper bibendos dato.

*Paullus hepaticus.*

Anifi, sem. apn, afari, amygd. amar. mūd. abfin  
thū, ling. drac. iij. macerata ex aqua in pastillos  
redigito, exhibetōq; drachmā vñā cū vini diluri  
cvarius iij. febricitib. tamen cum hydromelite.

*Eclegma hepaticum* Paulin, auxiliatur  
confectum.

*Chamaepitys* sicce lib. j. myrrhae vnc. j. pasci  
protopi sextarios inq. *Chamaepytyn* & vinū dul-  
ce coquit ad tertias. Postea liquorem expremito,  
eisq. mellis Attici librā dimidiā adiecto, ac rursus  
cocto. Dein velor myrrha addito aspidule agri-  
tādo: quae vbi dissoluta fuerit, ab igne ablata re-  
ponito, & ante cibum mystrum propinato. Ad  
haec cochlearium carum carne probē tritū, & cū  
vini nigri cyathis calicem propino. Hæc

so  
Cōfectio ciens vrinās. Facit ad mēduras he-  
patis affēctionē, ad splēnecōm, et ggrē scā mo-  
bo recuperātes : necnō ad hydropicos. In vin-  
nerum, probam colorem cōciliat. Croci, nar-  
di cāssī, sing. drach. ij. cōstī flōris iunci odorati,  
cinnamōmī, myrrhæ stactē, sing. drach. j. meli-  
so  
cōcti drac. xxvj. datur fabe Aegypti magnitudi-  
nē, cōm vini multū evasit im.

GG 司

ficæ, aristolochiæ lōgræ, piperis albi, spice nardi, costi, sem. erugæ, eryngij, baccharij iuniperi, sē. fra xini, chamædryos, dictamni Cretici, feminis ce stri, sem. dauci, sing. vnc. j. mellis Arctici qđ sit fa- tis. Cōficio. Datur nucus pōtice magnitudo, ex passi Cretici cyathis duob. Hæc Asclepiades ad indurata viscera. Miscenda in hiisce affectib. sunt cum discumenjib. etiam mollienna pharma ca, quæ præparēt indurata corpora, aptaq; præ- dictis medicamentis excipiendis efficiāt. Si qui- dem citra præmollitionem diffundūtur quodā- modo ea ipsa corpora, et evestigio manifestā im- minutionem habentes id quod reliquum ex affe- ctu est, vbi excauātū improbe fuerit, immedicabi- le pmanet. Cæterum quū hepatis corpus sit cō- sistentia humidū, moderatis emolliēbus eget.

Quæ Archigenes scripsit ad hepaticos. Vnguenti nardini cochlearia iij. quon die bi- bēda dato, & maxime in induratis. Aut aristolo- chem citra præmollitionem diffundūtur quodā- modo ea ipsa corpora, et evestigio manifestā im- minutionem habentes id quod reliquum ex affe- ctu est, vbi excauātū improbe fuerit, immedicabi- le pmanet. Cæterum quū hepatis corpus sit cō- sistentia humidū, moderatis emolliēbus eget.

Quæ Archigenes scripsit ad hepaticos. Vnguenti nardini cochlearia iij. quon die bi- bēda dato, & maxime in induratis. Aut aristolo- chem citra præmollitionem diffundūtur quodā- modo ea ipsa corpora, et evestigio manifestā im- minutionem habentes id quod reliquum ex affe- ctu est, vbi excauātū improbe fuerit, immedicabi- le pmanet. Cæterum quū hepatis corpus sit cō- sistentia humidū, moderatis emolliēbus eget.

Quæ Archigenes scripsit ad hepaticos. Vnguenti nardini cochlearia iij. quon die bi- bēda dato, & maxime in induratis. Aut aristolo- chem citra præmollitionem diffundūtur quodā- modo ea ipsa corpora, et evestigio manifestā im- minutionem habentes id quod reliquum ex affe- ctu est, vbi excauātū improbe fuerit, immedicabi- le pmanet. Cæterum quū hepatis corpus sit cō- sistentia humidū, moderatis emolliēbus eget.

Quæ Archigenes scripsit ad hepaticos. Vnguenti nardini cochlearia iij. quon die bi- bēda dato, & maxime in induratis. Aut aristolo- chem citra præmollitionem diffundūtur quodā- modo ea ipsa corpora, et evestigio manifestā im- minutionem habentes id quod reliquum ex affe- ctu est, vbi excauātū improbe fuerit, immedicabi- le pmanet. Cæterum quū hepatis corpus sit cō- sistentia humidū, moderatis emolliēbus eget.

Quæ Archigenes scripsit ad hepaticos. Vnguenti nardini cochlearia iij. quon die bi- bēda dato, & maxime in induratis. Aut aristolo- chem citra præmollitionem diffundūtur quodā- modo ea ipsa corpora, et evestigio manifestā im- minutionem habentes id quod reliquum ex affe- ctu est, vbi excauātū improbe fuerit, immedicabi- le pmanet. Cæterum quū hepatis corpus sit cō- sistentia humidū, moderatis emolliēbus eget.

Quæ Archigenes scripsit ad hepaticos. Vnguenti nardini cochlearia iij. quon die bi- bēda dato, & maxime in induratis. Aut aristolo- chem citra præmollitionem diffundūtur quodā- modo ea ipsa corpora, et evestigio manifestā im- minutionem habentes id quod reliquum ex affe- ctu est, vbi excauātū improbe fuerit, immedicabi- le pmanet. Cæterum quū hepatis corpus sit cō- sistentia humidū, moderatis emolliēbus eget.

Quæ Archigenes scripsit ad hepaticos. Vnguenti nardini cochlearia iij. quon die bi- bēda dato, & maxime in induratis. Aut aristolo- chem citra præmollitionem diffundūtur quodā- modo ea ipsa corpora, et evestigio manifestā im- minutionem habentes id quod reliquum ex affe- ctu est, vbi excauātū improbe fuerit, immedicabi- le pmanet. Cæterum quū hepatis corpus sit cō- sistentia humidū, moderatis emolliēbus eget.

Quæ Archigenes scripsit ad hepaticos. Vnguenti nardini cochlearia iij. quon die bi- bēda dato, & maxime in induratis. Aut aristolo- chem citra præmollitionem diffundūtur quodā- modo ea ipsa corpora, et evestigio manifestā im- minutionem habentes id quod reliquum ex affe- ctu est, vbi excauātū improbe fuerit, immedicabi- le pmanet. Cæterum quū hepatis corpus sit cō- sistentia humidū, moderatis emolliēbus eget.

Quæ Archigenes scripsit ad hepaticos. Vnguenti nardini cochlearia iij. quon die bi- bēda dato, & maxime in induratis. Aut aristolo- chem citra præmollitionem diffundūtur quodā- modo ea ipsa corpora, et evestigio manifestā im- minutionem habentes id quod reliquum ex affe- ctu est, vbi excauātū improbe fuerit, immedicabi- le pmanet. Cæterum quū hepatis corpus sit cō- sistentia humidū, moderatis emolliēbus eget.

Quæ Archigenes scripsit ad hepaticos. Vnguenti nardini cochlearia iij. quon die bi- bēda dato, & maxime in induratis. Aut aristolo- chem citra præmollitionem diffundūtur quodā- modo ea ipsa corpora, et evestigio manifestā im- minutionem habentes id quod reliquum ex affe- ctu est, vbi excauātū improbe fuerit, immedicabi- le pmanet. Cæterum quū hepatis corpus sit cō- sistentia humidū, moderatis emolliēbus eget.

Quæ Archigenes scripsit ad hepaticos. Vnguenti nardini cochlearia iij. quon die bi- bēda dato, & maxime in induratis. Aut aristolo- chem citra præmollitionem diffundūtur quodā- modo ea ipsa corpora, et evestigio manifestā im- minutionem habentes id quod reliquum ex affe- ctu est, vbi excauātū improbe fuerit, immedicabi- le pmanet. Cæterum quū hepatis corpus sit cō- sistentia humidū, moderatis emolliēbus eget.

Quæ Archigenes scripsit ad hepaticos. Vnguenti nardini cochlearia iij. quon die bi- bēda dato, & maxime in induratis. Aut aristolo- chem citra præmollitionem diffundūtur quodā- modo ea ipsa corpora, et evestigio manifestā im- minutionem habentes id quod reliquum ex affe- ctu est, vbi excauātū improbe fuerit, immedicabi- le pmanet. Cæterum quū hepatis corpus sit cō- sistentia humidū, moderatis emolliēbus eget.

Quæ Archigenes scripsit ad hepaticos. Vnguenti nardini cochlearia iij. quon die bi- bēda dato, & maxime in induratis. Aut aristolo- chem citra præmollitionem diffundūtur quodā- modo ea ipsa corpora, et evestigio manifestā im- minutionem habentes id quod reliquum ex affe- ctu est, vbi excauātū improbe fuerit, immedicabi- le pmanet. Cæterum quū hepatis corpus sit cō- sistentia humidū, moderatis emolliēbus eget.

Quæ Archigenes scripsit ad hepaticos. Vnguenti nardini cochlearia iij. quon die bi- bēda dato, & maxime in induratis. Aut aristolo- chem citra præmollitionem diffundūtur quodā- modo ea ipsa corpora, et evestigio manifestā im- minutionem habentes id quod reliquum ex affe- ctu est, vbi excauātū improbe fuerit, immedicabi- le pmanet. Cæterum quū hepatis corpus sit cō- sistentia humidū, moderatis emolliēbus eget.

Quæ Archigenes scripsit ad hepaticos. Vnguenti nardini cochlearia iij. quon die bi- bēda dato, & maxime in induratis. Aut aristolo- chem citra præmollitionem diffundūtur quodā- modo ea ipsa corpora, et evestigio manifestā im- minutionem habentes id quod reliquum ex affe- ctu est, vbi excauātū improbe fuerit, immedicabi- le pmanet. Cæterum quū hepatis corpus sit cō- sistentia humidū, moderatis emolliēbus eget.

Quæ Archigenes scripsit ad hepaticos. Vnguenti nardini cochlearia iij. quon die bi- bēda dato, & maxime in induratis. Aut aristolo- chem citra præmollitionem diffundūtur quodā- modo ea ipsa corpora, et evestigio manifestā im- minutionem habentes id quod reliquum ex affe- ctu est, vbi excauātū improbe fuerit, immedicabi- le pmanet. Cæterum quū hepatis corpus sit cō- sistentia humidū, moderatis emolliēbus eget.

Quæ Archigenes scripsit ad hepaticos. Vnguenti nardini cochlearia iij. quon die bi- bēda dato, & maxime in induratis. Aut aristolo- chem citra præmollitionem diffundūtur quodā- modo ea ipsa corpora, et evestigio manifestā im- minutionem habentes id quod reliquum ex affe- ctu est, vbi excauātū improbe fuerit, immedicabi- le pmanet. Cæterum quū hepatis corpus sit cō- sistentia humidū, moderatis emolliēbus eget.

Quæ Archigenes scripsit ad hepaticos. Vnguenti nardini cochlearia iij. quon die bi- bēda dato, & maxime in induratis. Aut aristolo- chem citra præmollitionem diffundūtur quodā- modo ea ipsa corpora, et evestigio manifestā im- minutionem habentes id quod reliquum ex affe- ctu est, vbi excauātū improbe fuerit, immedicabi- le pmanet. Cæterum quū hepatis corpus sit cō- sistentia humidū, moderatis emolliēbus eget.

Quæ Archigenes scripsit ad hepaticos. Vnguenti nardini cochlearia iij. quon die bi- bēda dato, & maxime in induratis. Aut aristolo- chem citra præmollitionem diffundūtur quodā- modo ea ipsa corpora, et evestigio manifestā im- minutionem habentes id quod reliquum ex affe- ctu est, vbi excauātū improbe fuerit, immedicabi- le pmanet. Cæterum quū hepatis corpus sit cō- sistentia humidū, moderatis emolliēbus eget.

Quæ Archigenes scripsit ad hepaticos. Vnguenti nardini cochlearia iij. quon die bi- bēda dato, & maxime in induratis. Aut aristolo- chem citra præmollitionem diffundūtur quodā- modo ea ipsa corpora, et evestigio manifestā im- minutionem habentes id quod reliquum ex affe- ctu est, vbi excauātū improbe fuerit, immedicabi- le pmanet. Cæterum quū hepatis corpus sit cō- sistentia humidū, moderatis emolliēbus eget.

inflammato hiegar, quæcunq; santr inflammatione: quemadmodū etiā iis qui ex obstructione, omnia q̄ ærenæ extergēt, etiā si medicamen- tam substantiā, calidit̄ faculratem cōtineant. Si verō obstructio simul & inflammatio coeant, laxi- tibus simulq; extergentibus opus erit.

Ad ictericos abiq; febri, medicamen- Andromachi.

In colocynthis calicem vinum fundito, cal- facirōq; & bibendū dato: subducit enim alium. Aliud. Adiant obolos iij. nardi obolos ij. ab- sinthij, drach. j. myrrhæ obol. iij. Passio excipio, instāq; auellane nucis ex aque cyathis duobus porrigito.

Asclepiadis remedia ad ictericos.

Cichorii succi cyathos vj. febriētib. per se da- to: febre verō carentibus, cū vini cyathis tribus.

Aliud. Anchuse tenuissimæ trix cochlearia ij. cum aqua portabilis exhibe. Aliud Niceran, vini- ciens. Cicerum ficcorum sextariū j. roris marini manipulum: aque sextarios vj. fenniculi mani- pulum j. rad. asparagorj palustriū manipulū j.

Decoctū excolatum porrigito assidue, febriētib. quidem simpliciter, febti aut carentib. ex vi- no diluto. Aliud. Asari, ab sinthij, vtriusq; drach. viij. feminis anisi, fenniculi, apij, amygdalarū a- mararū repurgatarū, sing. drac. iij. Aqua subigi- ro, atq; pastillos formato, ex quib. drac. j. cū vini mulsi cyathis tribus nō febriētib. exhibeto.

Eerhion trahens bilem per nares.

Nasturtij & roris marini viridū succum, aut elaterium cum lacte muliebris tritum, infundito- naribus, atq; attrahere iubeto.

Archigenis remedia ad ictericos.

Chelidoni herbar succum cū vino aut aqua mulsa propina. Vel adisi, vel rubij radici ob- los tres, cū aqua mulsa exhibe. Aut fellis vrini cyathum bibendū dato. Aut stercoreis canini al- bi sextantem, cum mellis quadrate ad triduum bibendū dato. Aut adiani, & menthræ, & rubre parē mensuram in aqua seruafacio, & heminā iode bibendam exhibeto, diutius ad solē inso- lato, sitientij & anheloso, quō post acceptum po- tum exudet: quippe statim transmutat colorem.

De splenis affectibus.

Quum autem omnes corporis partes famili- rem sibiipfis ex venis humore trahāt, lien certū id qđ veluti fix sanguinis est, ex qua gignit̄ atra bilis, ad sui alimoniam asciscit: vnde hoc vi- scus minimo negotio cōtrahere sibi scirrhū est- narum, sanguine nimirū in venis ipsius obura- to, & ob crassitudinē nec externi, nec discuti- facile potente. Attenuatib. igitur opus habet phar- macis, citra manifestā caliditatem, ne impactus in ipso succus impingatur vehemētius. Propri- incolumitatis gratia, certas quidam facultates possideant, attracticem videlicet familiarium, ac tum allentorum expultricem, tunc a sumisari- cem eorum quæ sibi attraxerunt: aliquibus ip- sarum insuper inest, vt ex accidenti sine vniuer- so corpori ex vū. Ex horū itaq; est genere lien, qui ex hepate ad se veluti limū sanguinis trahit, quēadmodū fellis vesica bilē, atq; renes vrinā.

Chelidoni herbar succum cū vino aut aqua mulsa propina. Vel adisi, vel rubij radici ob- los tres, cū aqua mulsa exhibe. Aut fellis vrini cyathum bibendū dato. Aut stercoreis canini al- bi sextantem, cum mellis quadrate ad triduum bibendū dato. Aut adiani, & menthræ, & rubre parē mensuram in aqua seruafacio, & heminā iode bibendam exhibeto, diutius ad solē inso- lato, sitientij & anheloso, quō post acceptum po- tum exudet: quippe statim transmutat colorem.

Chelidoni herbar succum cū vino aut aqua mulsa propina. Vel adisi, vel rubij radici ob- los tres, cū aqua mulsa exhibe. Aut fellis vrini cyathum bibendū dato. Aut stercoreis canini al- bi sextantem, cum mellis quadrate ad triduum bibendū dato. Aut adiani, & menthræ, & rubre parē mensuram in aqua seruafacio, & heminā iode bibendam exhibeto, diutius ad solē inso- lato, sitientij & anheloso, quō post acceptum po- tum exudet: quippe statim transmutat colorem.

Chelidoni herbar succum cū vino aut aqua mulsa propina. Vel adisi, vel rubij radici ob- los tres, cū aqua mulsa exhibe. Aut fellis vrini cyathum bibendū dato. Aut stercoreis canini al- bi sextantem, cum mellis quadrate ad triduum bibendū dato. Aut adiani, & menthræ, & rubre parē mensuram in aqua seruafacio, & heminā iode bibendam exhibeto, diutius ad solē inso- lato, sitientij & anheloso, quō post acceptum po- tum exudet: quippe statim transmutat colorem.

Chelidoni herbar succum cū vino aut aqua mulsa propina. Vel adisi, vel rubij radici ob- los tres, cū aqua mulsa exhibe. Aut fellis vrini cyathum bibendū dato. Aut stercoreis canini al- bi sextantem, cum mellis quadrate ad triduum bibendū dato. Aut adiani, & menthræ, & rubre parē mensuram in aqua seruafacio, & heminā iode bibendam exhibeto, diutius ad solē inso- lato, sitientij & anheloso, quō post acceptum po- tum exudet: quippe statim transmutat colorem.

Chelidoni herbar succum cū vino aut aqua mulsa propina. Vel adisi, vel rubij radici ob- los tres, cū aqua mulsa exhibe. Aut fellis vrini cyathum bibendū dato. Aut stercoreis canini al- bi sextantem, cum mellis quadrate ad triduum bibendū dato. Aut adiani, & menthræ, & rubre parē mensuram in aqua seruafacio, & heminā iode bibendam exhibeto, diutius ad solē inso- lato, sitientij & anheloso, quō post acceptum po- tum exudet: quippe statim transmutat colorem.

Chelidoni herbar succum cū vino aut aqua mulsa propina. Vel adisi, vel rubij radici ob- los tres, cū aqua mulsa exhibe. Aut fellis vrini cyathum bibendū dato. Aut stercoreis canini al- bi sextantem, cum mellis quadrate ad triduum bibendū dato. Aut adiani, & menthræ, & rubre parē mensuram in aqua seruafacio, & heminā iode bibendam exhibeto, diutius ad solē inso- lato, sitientij & anheloso, quō post acceptum po- tum exudet: quippe statim transmutat colorem.

Chelidoni herbar succum cū vino aut aqua mulsa propina. Vel adisi, vel rubij radici ob- los tres, cū aqua mulsa exhibe. Aut fellis vrini cyathum bibendū dato. Aut stercoreis canini al- bi sextantem, cum mellis quadrate ad triduum bibendū dato. Aut adiani, & menthræ, & rubre parē mensuram in aqua seruafacio, & heminā iode bibendam exhibeto, diutius ad solē inso- lato, sitientij & anheloso, quō post acceptum po- tum exudet: quippe statim transmutat colorem.

Chelidoni herbar succum cū vino aut aqua mulsa propina. Vel adisi, vel rubij radici ob- los tres, cū aqua mulsa exhibe. Aut fellis vrini cyathum bibendū dato. Aut stercoreis canini al- bi sextantem, cum mellis quadrate ad triduum bibendū dato. Aut adiani, & menthræ, & rubre parē mensuram in aqua seruafacio, & heminā iode bibendam exhibeto, diutius ad solē inso- lato, sitientij & anheloso, quō post acceptum po- tum exudet: quippe statim transmutat colorem.

Chelidoni herbar succum cū vino aut aqua mulsa propina. Vel adisi, vel rubij radici ob- los tres, cū aqua mulsa exhibe. Aut fellis vrini cyathum bibendū dato. Aut stercoreis canini al- bi sextantem, cum mellis quadrate ad triduum bibendū dato. Aut adiani, & menthræ, & rubre parē mensuram in aqua seruafacio, & heminā iode bibendam exhibeto, diutius ad solē inso- lato, sitientij & anheloso, quō post acceptum po- tum exudet: quippe statim transmutat colorem.

Chelidoni herbar succum cū vino aut aqua mulsa propina. Vel adisi, vel rubij radici ob- los tres, cū aqua mulsa exhibe. Aut fellis vrini cyathum bibendū dato. Aut stercoreis canini al- bi sextantem, cum mellis quadrate ad triduum bibendū dato. Aut adiani, & menthræ, & rubre parē mensuram in aqua seruafacio, & heminā iode bibendam exhibeto, diutius ad solē inso- lato, sitientij & anheloso, quō post acceptum po- tum exudet: quippe statim transmutat colorem.

Chelidoni herbar succum cū vino aut aqua mulsa propina. Vel adisi, vel rubij radici ob- los tres, cū aqua mulsa exhibe. Aut fellis vrini cyathum bibendū dato. Aut stercoreis canini al- bi sextantem, cum mellis quadrate ad triduum bibendū dato. Aut adiani, & menthræ, & rubre parē mensuram in aqua seruafacio, & heminā iode bibendam exhibeto, diutius ad solē inso- lato, sitientij & anheloso, quō post acceptum po- tum exudet: quippe statim transmutat colorem.

Chelidoni herbar succum cū vino aut aqua mulsa propina. Vel adisi, vel rubij radici ob- los tres, cū aqua mulsa exhibe. Aut fellis vrini cyathum bibendū dato. Aut stercoreis canini al- bi sextantem, cum mellis quadrate ad triduum bibendū dato. Aut adiani, & menthræ, & rubre parē mensuram in aqua seruafacio, & heminā iode bibendam exhibeto, diutius ad solē inso- lato, sitientij & anheloso, quō post acceptum po- tum exudet: quippe statim transmutat colorem.

Chelidoni herbar succum cū vino aut aqua mulsa propina. Vel adisi, vel rubij radici ob- los tres, cū aqua mulsa exhibe. Aut fellis vrini cyathum bibendū dato. Aut stercoreis canini al- bi sextantem, cum mellis quadrate ad triduum bibendū dato. Aut adiani, & menthræ, & rubre parē mensuram in aqua seruafacio, & heminā iode bibendam exhibeto, diutius ad solē inso- lato, sitientij & anheloso, quō post acceptum po- tum exudet: quippe statim transmutat colorem.

Difficiliētib. medicamentis quæ ad indura- ta viscera pro- pmanant, ut miscenda emol- lientia.

Hepatis corpus moderata emol- lientibus eget. Hepatica medi- camenta ab Ar- chigenes scripta.

Hepatica cata- plasmas ex quibus confici- unt.

177

Hepatica ma- ligna.

Ictericus per morbum iudi- caturus erit, curatus.

Ictericus ex ob- structione erit, abiq; febre per- manet: quod non contrariū e- st quæ obstruc- tione ducit originem.

Ictericus quæ medicamenta conueniunt.

Ictericus n- melis vnc. j. diversis casib. p.

Eerhion sup- huius bini per- nare.

Pene supple- tum huius sit- abstruere nō- huius iudicium e- huius sequenti d- dicitur. Lien ex ob- structione supple- Lien affectu- quibus con- tractis medic- mentis.

*Lien trahente  
linguam, facu-  
lentis san-  
guine per vasa  
corpi depen-  
dit.*

*Lien cur ama-  
ra, quod affra-  
gentia sunt mi-  
stra, medicamen-  
ta conueniant.*

*Lien conueni-  
tis pharma-  
cis scriptis.*

*Lien pharma-  
cis ab Asclepiade  
scriptis.*

*Lien episteme-  
na cataplasma-  
tis ab Ascle-  
pade scriptis.*

Si igitur prae imbecillitate eiusmodi sanguinem ad se attrahere sit minime potes, p. vtiuersu corpus vitiosus humor dispergit. Ob id itaque natura ipsius firmitudinem custodire oportet, quod conueniens sibi alimentum alliciat: per quod actiorem vniuerso corpori ad humorum bonitatem conducit, & excrementa genita in ipso demittere in ventrem potest, ut vni cuius excrementis alui excernantur. Igitur hac ratione ipsi valde amara medica menta exhibemus: quibus visum est etiam ex 10 austeris nonnulla: sicuti & alia quaedam, cum materia congruentem ad vnguentorum & cataplasmatum compositionem: cuiusmodi sunt cera, resina, pix, & bitumen. Nam primaria ratio acetum & oxy meli, visceri comoda existit, vitiose secare & attenuare crassos humores valentia, citra caliditatem. Deinceps itaque eorum pharmacorum mentionem faciam, quae lieni indurato auxiliantur. Pharmaca portabilia ab Andromacho ad spleneticos conscripta. Potio Antipatri.

Carnis myrobalani drach. iij. scolopendry drach. vj. cort. rad. cap. costi, sing. drach. iij. chamædrys drach. vj. polij drach. ij. rad. coryledonis drach. ij. corymboli hederæ nigrae grana xxv. ammoniaci thymiamatis drach. iij. sem. hyperici drach. ij. chabiani tantundem: sem. periclymeni drach. j. aut rad. drach. iij. cardamomi nigri sesquidrach. succi scillæ drach. xvj. Dantur oboli duo in aceto mulso. Aliud fromachicum, spleneticumque. Myrrhæ, tardi Indice, cort. rad. capparis, radice p. naci, rad. peucedani, dictamni, cort. rad. periclymeni, sing. drach. iij. costi drach. v. polij drach. ij. ru biae drach. iij. ammoniaci thymiamatis drach. iij. a. iridis tantundem. Excipio aceto mulso, datoq. obolos η. cum oxymelite.

Pharmaca portabilia ab Asclepiade ad splenetum conscripta.

Cytoglossi manipulum cum vini cyathis iij. tento, & expressum liquorem ante cibum bibendum dato. Colligere tamen oportet herbam sitis- 40 tra manu ante foetum exortum. Aliud. Trixaginis manipulum cum vini sextario vno coquiro, & expressum liquorẽ reponito: atq. ex eo cyathos η. ante cibum dato. Catapotij splenetici, Myricæ fructum tusum & cribratum chalbano excipe, in catapotijque redige, q. exhibebis pro viribus. Pastil- lus spleneticus. Fructus erice drach. iij. piperis albi, nardi Syriaci, ammoniaci thymiamatis, sing. drach. η. arida tantum datur & cribratur. Ammoniacum dissoluitur aceto scillitico, & aridis additum in pastillos cogitur, quorum singuli pendunt drachm. i. Daturq. drach. j. ex oxymelini cyathis trib. Epithemata & emplastrum eiusdem Asclepiade.

Foliorum tenerrimorum sambuci arboris lib. iij. aloes lib. j. cum aceto subigro, & linteolo infarcta admovent. Vel: Cera, resina pinus, & frictæ, sing. lib. η. arsenici, aluminis scissi, calcis viug, singulorum sextantem: aceti, olei, vniusc. cyathos viij. Conficito & admovent.

Malagma Anthochidia, ad spleneticos, hydro- 60 picos, ischiadicos, arthriticosq. conueniens. Cera lib. iij. resinae terebinthinæ tantum dem: retri- mentorum ad expressa myrobaloano reliquorum, spumæ nitri, floris lapidis Asiæ, ammoniaci thymiamatis, sing. lib. j. olei Cyprini lib. iij. aceti qd. sit

fatia ad ammoniacum dissoluen dum.

Malagma auri coloris.

Auripigmenti vnc. j. aluminis scissi, calcis viug, sing. sextantem. Cera, resina frictæ, & pinus sing. lib. η. myrrhæ sextantem. Arida in creta, spumæ atq. per affusionem aceti cyathorum viij. liquidus excipiantur.

Pharmaca ad spleneticos ab Archige- ne scripta.

Potus sit aqua quæ ferrum cõdes exingerit: sola quidẽ, febrientibus: vino aut immixta, iis q. febre 10 carent. Aut corticis radicis periclymeni, & seminis eius, quantum trib. digitis apprehendi possit, in vino albo meraco calido, ieiunio curriculo x. L. diebus bibendum dato. Aut vulpis hepatis sicci ex oxymelite pignatur. Aut solia capparis arida et trita exhibito. Cataplasmata aut eadẽ spleneticis & hepaticis admoventur, ampliusq. cinerem ex ferraria officina cui aceto. Aut osurtiũ & fer- 20 numgræci, & calcis viug, & nitri, cum melle emollita imponito. Aut faccẽ acris aceti, aut capparis radicem cum aceto imponito. Persecuerant malo cucurbitas sc. scarificatis asfigito. Ar- venam retro sinistram aurem secat, et detractio sanguine confricato affectum lienem.

Remedia ad hydropẽ ab Asclepiade scripta. Malagma aut poterit, reforesc. humiditates ab alto, simulq. duritias discutere. Cera, picis aride, vtriusc. lib. j. aluminis liquidi, sulfuris viui, mænæ, nitri rubri, sing. lib. j. resinae frictæ lib. an. olei veteris heminam. j. Arida liquidis permisceto. Malagma ex bacis lauri ad eadem.

Cera, resina pinus, picis brutæ, bacarũ lau- 30 ri siccatũ, nitri rubri, ammoniaci thymiamatis, adipis vinulini subacti, sing. lib. j. Liquefribilia li- quentur, & frige facta misceantur aridis redactis in tenuissimum pollinem.

Malagma ex bacis lauri ad eadem.

Cera, resina pinus, picis brutæ, bacarũ lau- 40 ri siccatũ, nitri rubri, ammoniaci thymiamatis, adipis vinulini subacti, sing. lib. j. Liquefribilia li- quentur, & frige facta misceantur aridis redactis in tenuissimum pollinem.

Emplastrum Tonforis, ad spleneticos & hydropi- cos, quo etiam ischiadicis liberauit.

Picis aride lib. iij. cera, resina pinus, ammoniaci thymiamatis, nitri rubri, bacarũ lauri arida- 40 rum, sing. lib. η. adipis taurini lib. j. indos lib. η. canchrysos vnc. xviij. farinæ fœnigræci, pollinis, radice chamæleontis nigrae tenuissimè trite, sin- gul. sextantiũ vtiũ: cumini tenuissimè triti sesqui sextantiũ: passij sextar. j. Conficito & vtiuo.

Cleophanti cataplasma ad hydropicos. Cera, resina, spumæ nitri, sing. drach. c. chalba- 50 ni, ppolis, ammoniaci thymiamatis, sing. drach. xij. s. cyprini cyathos η. aceti tantundem. Cõfici- to cataplasma.

Archigenis remedia ad hydropicos.

Stercus bouis armætariæ triui, coctũ in po- 60 sca, inpersp. sulfuris viui quarta portione, redi- gito in cataplasma, idq. toti ventri admovent. Aut elaterij, staplidas syluestris, hyssopi, fellis taurini, æquales omnium partes sicub. cotus ex- cipiantur, mullisq. in uisq. similitur applicato. Aut veratrũ tigris, sel. taurinũ, nitri, piperis ex equo 60 mista, mellisq. excepta, per semiliorũ tẽpascũ ventri imponito. Per omne aut curationis tẽ- pus coryledonis, scillæ aride, sing. drach. j. in vi- no mulso diluto quotidie exhibe. Aut corticis rad. ari, similiter drach. j. Aut radicum calamita- tis coctũ propina. Ad hæc hydropicos diutius ad solẽ, sed cõte clo capite, inuagito ex oleo, cui

GG iij

*Lien pharma-  
cis apocima ab  
Archigene scri-  
pta.*

*Lienosis eadem  
cataplasmata  
apocima, qua  
hepaticis.*

*Lien si malum  
sit perueniat, et  
cucurbitas asfigi-  
tando eff. et  
fracturari.*

*Hydropicis con-  
ueniens malum  
gnatum ab Ascle-  
pade scriptis.*

*Hydropicis re-  
media ab Ar-  
chigene scripta.*

*Hydropicis effi-  
cacia ardenti so-  
le fricandi o-  
leo sel. ar. in vi-  
no, profundius dis-  
solui necesse  
est, sed ista fric-  
tione.*



Portio Apollonij ad fluxum mulie-  
brem sistendum.

Coralli, balauſtæ, vtriuſq; obol. iij. gummi o-  
bol. j. Excepe oui crudi candido, & dimidiū to-  
tius cum aque cyathis quatuor propina.

Infuſa dyſentericis cōmoda. Infuſum A-  
theuri ad recti interni vlcera.

Omphachij, aluminis ſciſulis, calcis viuz, ſqua-  
mæ æris, ſing. drach. vi. auripigmenti drach. viij.  
ſandarachæ drach. iij. chartæ viſc. drach. xv. cum  
vino myrteo paſtillos drach. iij. aur triū, forma-  
to. Inſuade autem cum vini diluti cyathis iij. &  
aque tepidæ cyathis duobus.

Infuſum Heræ.

Chartæ viſc. cadmæ, auripigmenti, ſingulo-  
rum vnc. j. calcis viuz extinctæ ſucco plantagi-  
nis, vnc. s. Omnia redigito in pollinē, & cochlea-  
ria duo, cum decocto baccarum myrti, aut vi-  
no myrteo, inſundito.

Infuſum Nicotſtrati.

Calcis viuz drach. j. gyphi drach. viij. acacie  
drach. ij. omphachij drach. j. ſibij drach. ij. thuris  
drach. j. gallæ drach. iij. tragacanthæ drach. ij.  
cum vino myrteo in paſtillos redigito.

Aſclepiadis ad dyſentericos remedia.

Rhois Syriaci, farinæ polætz, vuz paſſæ, ſing.  
drach. ij. malicorij ruſi & cribrati drach. j. Exci-  
pito melle coſto, atq; myſtrum vñū aut cibum  
porrigito. Aliud probatum. Gallarum redacta  
rum in pollinem coſcolare vnum: piperis albi,  
rhois rubri, malicorij tenuiſſimæ trini, ſingulo-  
rum tantundem. Omnia oui luteo excipito, & in  
vacuum mālī punici teſtam conſicito, atque obi-  
turato cum farina oſculo ipſius, ad prunas tor-  
re: depurgata mālī punici teſta, cochlearium v-  
num edendum dato.

Paſtilus Philippi ad dyſentericos inuetera-  
tos, dolore ſedans, qui bibitū & inſunditur.  
Balauſtij, acacie, ſucci hypociſtidis, rhois, apij,  
thuris, myrthæ, baccarum myrti nigrarū, croci,  
gallarum, lycij, aloë, rhei pōnici, malicorij, ſing.  
drach. iij. Excipito vino Italico, cogitōq; paſtil-  
los pondere obol. iij. ac porrigito non ſebrienti-  
bus quidē, ex vino: ſebrientibus verd, ex mulſā.

Epilema cœliacis dyſentericisq;.

Seminis lyſocſyami albi, apij, vtriuſq; trientē:  
aniſi, ſloris roſarū, ſucci hypociſtidis, balauſtij,  
rhois Syriaci, ſing. ſextantem. ſucci papaueris,  
croci, vtriuſq; vnc. j. Singula cum vino myrteo  
terito: dein miſta in paſtillos redigito, quos in  
vmbra aſſiccato. Inde verd quāntū ſufficit tan-  
dens & cribrans, palmulis paſtis excipito, ac rē-  
dem linteolo impoſita, ventri ad mouero.

De affectibus ſedis.

Sedis vitia, ob ipſius partem ſenſum exquiſitiſ-  
ſimam, & ob crebrum per ipſam excrementorum  
decurſum, ægrē curationem recipiunt. Apriſti-  
ma autem ipſis pharmaca ſunt, quæ abſq; apre-  
ſſæ aſtringunt: qualia maxime ſunt, quæ ex me-  
tallicis neq; actia, neq; acerbis exiſtunt. Hæc ſi-  
quidem lora, citra mordacitatem (id quod rē-  
quiritur) operantur.

Medicamenta ſedis ab Androma-  
cho ſcripta.

Ceruffæ, lithargyri, vtriuſq; drach. v. thuris æ-  
ſuinis ſciſi, vtriuſq; drach. iij. croci obol. iij.

Vini & roſacei quod ſit ſatis. Conſicito. Aliud.  
Butyri, ceræ, vtriuſq; ſeſcunciatum: medullæ cerul-  
næ, cryſpi, thuris, ſingul. vnc. j. aluminis ſciſul  
quadrantem: lycij ſextantem: vini & roſacei quod  
ſit ſatis. Miſceto. Aliud. Adipis anferini curatū,  
ceræ, thuris, medullæ cerulæ, ſorum roſarū, pom-  
pholygis, cadmæ, plūbi lotij, ſing. drach. iij. ce-  
ruſſæ drach. viij. cerebri gruis drach. ij. ſucci papa-  
ueris ſeſquidraculum: croci drach. v. ſucci ſeri-  
dis heminam j. roſacei heminam s. Conſundito.

Plinguis compoſitio ad achoras & pſoras.

Spumæ argenti, ceruffæ, vtriuſq; drach. xxxij. Pſoris velle  
atramenti ſutorij drach. xvj. ſulphuris viui drach.  
viij. Olei myrti & aceti quod ſit ſatis. Miſceto.

Ad prolabantem ſedem.

Recrementi plumbi drach. viij. Rhois Syriaci  
tantūdem: ſloris roſarum drach. iij. myrthæ Min-  
næ drach. ij. Inſperge ſiccum, ubi prælueris vi-  
no aſtero, aut vini decocto. Aliud. Gallæ om-  
phacitidis, rhois coriarij, ſing. drach. ij. plumbi  
viſi draculas iij. ſpumæ argenti draculas viij.  
trita inſpergito.

Hammoni holdibus extrahendis pharma-  
ca ab Aſclepiade ſcripta.

Piperis, nitri, vtriuſq; drach. j. terito ad moue-  
tōq; Aliud. Spumæ nitri, ſellis tauri, ſtaphidis  
ſylueſtris, ſing. drach. j. Trita, exceptaq; modico  
melle, adhibeto. Poſtea verd quā emolientes  
fuerint, atq; in propatulo, accipe ceruffæ vnc. j.  
ſpumæ argenti quincuncē: pompholygis vnc. j.  
olei myrti beſsem: vini boni tantūdem: butyri  
vnc. j. Conſunditoq; & applicato. Cæterum ad  
ardentes ſedis dolores, oui aſſati vitellum vino  
albo terito, & cerato myrteo exceptum illinito.

Ad pudentorū affectus.

Exvicerati pudendi cogitio, ex maniſeſto cir-  
ca ipſum dolore paratur: vñā cū hoc, quod etiā  
circa mictiones excernitur quid ex corpore ſcilicet  
viceri ipſi inſiſtibilibus. Deſcendunt autē hæc ab  
illis quæ ex vefica ſerūtur, quod ſtatim in ipſo  
primō loſij exitu appareant: quæ verd à vefica ex-  
cernuntur, deſcendunt cū vrinis permixta. Cæterum  
vlcera pudentorū, & circa ſedē circa inſiſtenti-  
nem cōſiſtentia, reſiſtibilibus valde indigēt phar-  
macis: qualia ſunt quod ex charta combuſta cō-  
ſtat, & aneiliū vitū, & cucurbita vita. Verū ſic-  
cis & reſiſtibilibus vlcibus, etiam aloë bonum eſt  
medicamen. Omnium autem maximē dolorem ſe-  
dat, nec villo minus efficaci eſt pompholyx. Si ve-  
rō humectiora ſint vlcera, pinus cortex per ſe, &  
ſapiſſæ mēſures: vt ſi profunda, māiū etiā præ-  
dictis addatur. Porro quæ circa vtrūq; aut veficæ  
conſiſtunt vlcera, eſſe medicamentis indigent,  
ſed instrumentis inſuper opus habent, quæ ipſa  
intromittant, vt ſunt metrenchyſtæ, & catheteres  
vocati. Apnora itaq; ſunt arida, qualis eſt cro-  
cus, pōpholyx, & aloë, quæ facile plūtaginis, aut  
alteri tali ſucco miſcētur. Ad ſcroti & pudēdi do-  
lores. Butyri & ſeſinæ pari mēſura vtire. Aut ſe-  
men lini cū aqua roſacea, & admiſta myrthæ ſec-  
me decima parte, & reſinæ tantundē, impoſito.

Ad pudentorū inſuſcitens.

Foliorum vini tenerorū drach. j. ceruffæ drach.  
v. trita cataplaſmatis vice impone. Aut ſeniſculū  
in aqua coquito, & cum mālī punici cortice tri-  
tam impoſito. Si verd è ſudoribus vlcera in

GG iij

Visum mulie-  
bris sistendo po-  
tio Apollonij.

Clyſmi dyſente-  
ricæ apti.

Dyſentericis de  
medicab. ab Aſcle-  
piade ſcriptis.

Dyſentericis a-  
piſtina etiam  
modum.

Sedis vlcera cur-  
ari curatioſiſ-  
ſimam, & ob  
crebrum per ipſam  
excrementorum  
decurſum, ægrē  
curationem recipiunt.

Sedis medicab.  
mēſura ab Andro-  
macho ſcripta.

Sedis prolapsū  
remedia.

Hammoni holdi-  
bus ab Aſcle-  
piade ſcriptis  
remedia.

Pudentorū  
vlcera digna  
ſeſendi ratio.

Pudentorū vlc-  
era valde re-  
ſiſtibilibus phar-  
macis indigent.

Pudentorū vlcibus  
ſicca & reſiſtibilibus,  
quæ pharmaca  
opiniuntur.

Vlcera reſiſta-  
rentia, videri  
quibus pudentorū  
vlcera medicamen-  
tis indigent.

Pudentorū  
ſeniſculū  
ſeſendi remedia.



*Podrudi fissa  
in tuberculis  
qua sanant.*

*Podendorum  
inflammationi  
bus que spul-  
lentur.*

*Priapismus  
est autem colo  
permanens in  
longitudine  
tra rei venere  
appetitum.  
Priapismus tra  
tis.*

*Mingentibus  
inter formidam  
remedia.*

*Vteri suffoca-  
tione qua se  
quantur sym-  
ptomata.*

*Vteri suffoca-  
tione affligit  
per arterias  
tam fieri per  
arterias.  
Vteri suffoca-  
tione causa.*

*Vteri suffoca-  
tione remedia.*

*Nephriticorum  
in locum  
diffinitio.*

seroto fiant, gallâ trita cum alumine inspergito. Ad tubercula in pudendis nascetia, piri semen inspergito, & fel hircinum oblitino. Fusuras & rimas iuuat rosaceum, amylin, & illius, paribus portionibus mista. Aut foliorum liederæ arido- rum vitiorumq; cinis, cum oleo in plumbeo mor- tario triti. Ad pudendorum inflammationes, fa- rinam hordeaceâ hydromelyre incoquito, & vi- tis folia tenera cû polenta terito, simulq; omnia imponito. Excrefcentem testiculorum carnem cinis sarmenitius cum nitro & aqua subactus sa- nat, cataplasmatibus vice impositus.

#### De Priapismo.

Priapismus est auctio colis permanens, in lon- gitudine atq; orbem tumefactu, contra rei venereæ appetitum. Cuius affectionis est causa, statutus spiritus ex humoribus crasis & viscidis ge- nitus per moderatâ caliditatem. Debent igitur refrigerari leniter partes per ceratum rosacû in aqua maceratum, itémq; per clammamelanum ce- ratum, tum pudendo ipsi, nû lumibus impositum. Victus & pharmaca esse debent attenuatoria, ci- tra manifestam calfactionem. Præterea nymphæa in potu est danda, & viticis semen: necnon ruta vinds obfoniis miscetur, post aliorum tenuan- tum vsum. Quod si evacuatione vniubeat, ad- mittitur per vomitum. Ad eos qui se in som- no permittunt, vesicam caprillâ, aut ouillam vi- tam, ex polca bibendam dato: & ad vesperâ siti- culosis inire somnum iubeto. Facit & testiculosis leporis in vino odorato feruefactus, atq; ita pos- tus. Aut calamintum & myrrhâ in vino ante cenam bibendam dato. Oblinatur autê puden- dum omnia terra cum perdisq; succo.

#### Ad vteri affectus.

In vteri suffocatione contingit sensus ac mo- tus priuatus, & pulsus obscurus, & parvus, & pe- nitus interceptus. In aliquibus verò nimis sensus, tum motus adest, ratioq; cõstat, ceterum vix re- spirant. Atquibus etiam vox interceptur. Aliis contrahuntur artus. Fiant igitur viduis sensus & motus & respiratiõnis interceptiones, ob fri- giditatē: per spirantibus ipsis tunc per arterias to- tius corporis, nec vrēbus illa quæ per os fit re- spiratione. Etenim quæ prius probe repurgaren- tur, conciperent, atq; coirent viris, verisimile est, postea quâ omnibus his priuatur, humidum & frigidum in ipsis semen totum corpus perfrige- rare. Ad vulvæ itaq; strangulatus convenit agri- cici drach. j. in potu accepta cum vino: & plaora- ginis semen & succus cum vino: necnon acetum scillinum absorbptum. Olfactu excitant strangu- latus, bitumen, cassiorum, chalbanum, pix liqui- da, eedria, pili vâri, ruta, allium, cepa. Eandem in rem & cornu cerui sufficit: & ruta cum melle la- na excepta in anum inditur.

#### GALeni PERGAMENI DE compositione medicamentorum secundum loca, lib. X.

**E**X nephriticis antidothis, hoc est, renalibus quædam calculosus renes tuant: quædam verò inflammatos & vlcerosos, quæ etiam ad vesicam affectû conveniunt. Maxime autem contrariæ inter se sunt prædictorum pharmaco-

rum facultates. Siquidem quæ ad inflamas & exulceratas affectiones componuntur, mingato- rius medicamentis indigent. Cæterum quoniam im- possibile sit hæc cû penetrare ad regionem re- num, ob id ipsis miscemus diuretica. At quæ cal- culosis opululantur, vnicam facultatē postulant, quæ secare & extergere est nata, cum conspicua caliditate. Sunt autem talia ferè omnia amara.

Confectiones Andromachi ad renem & vesicæ affectiones. Potio ad vesicam exulceratam, & vrinæ emittendæ difficultatem. Seminis lini, sem. papaveris albi, sem. cucumeris, tragacanthæ, sing. drach. ij. amyli drach. iij. Cum aqua in pa- stillus redigito, exhibetor.

Alia ad eadem, & vesicæ dolores.

Croci, seminis rute sylvestris, seminis malux sylvestris, sing. drach. vi. sem. hyoscyami drach. xij. opij drach. vi. sem. apij drach. xij. nucis auel- lanes xij. amygdalas xij. sem. cucumeris drach. xij. mellis Attici quod sit satis. Darur magnitu- do ponticæ nucis cum vini multis cyathis iij.

Alia ad profluuiâ sanguinis ex vesica.

Aluminis drach. j. tragacanthæ drach. ij. gum- mi obolum j. Dato ex passo quidodg obolum j. quandoq; duos.

Alia calculos frangēs, ita vt nō renascantur.

Cassæ, piperis albi, sem. pastinacæ, anisi, sem. pa- pauentis albi, spicis nardi, sem. fmyrni, cyperi, sin. drach. ij. seminis apij, thuris, styracis, iridis illyri- cæ, amygd. amar. alari, sin. drach. iij. myrris min- næ drach. iij. mellis Attici quod sit satis. Cõfice- ro, & quotidie exhibeto nucis poticæ magnitudi- nē ex aquæ cyathis tribus, idq; sciuno stomacho.

Nephriticæ compositiones ab

Astlepiade conscriptæ.

Seminis sativi cucumeris tosti drach. iij. semi- nis malux drach. v. nucum pinearum drach. vi. sem. apij drach. vii. seminis lini drach. i. amygd. amararum mund. drach. ix. Excipe passo, & ex- hibenucia ponticæ magnitudinē cum protropi cyatho i. & aquæ calidæ cyathis duobus. Alia. Malux sylvestris, & rute sylvestris, & apij mon- tani radices in vino coquito, & expressi liquo- res cyathos ij. cum pari aquæ portione exhibe- ro. Alia. Seminis balsami, lapidis qui spongus inest, pulegi aridi, seminis malux sylvestris, o cy- mi aridi, sing. pares portiones rundito, in cerni- tōq; reponito. Propioaro autem co cileare vnu- cum cum vini diluti cyathis duobus.

Pastillus ciens vrinas, atq; expel- lens lapillos.

Asari, petroselin. plu, mei, sing. drach. iij. aco- ri, sem. anisi, sem. dauci, apij moorani, carpobal- sami, tragacanthæ, singulorum drach. ij. Traga- cantham passo dissolutam aridis addicio, & pa- stillos formato, indēq; obolos iij. cum passu dila- ti cyathis ij. exhibeto.

De ischiade, podagra, & arthritide.

Ex genere arthritidis est tum ischiadis, tum po- dagra. Quod enim in omnibus articulis est ar- thritis, hoc in vno iuxta coxæ dīcem quidē, ischia- da, iuxta pedē verò, appellât podagram. Incipit igitur plerumq; podagre generatio ex vno arti- culo, tēporēq; in omnes progreditur. Cōmunē habent hi tres affectus redundantiâ humoris. Ceterum aliquando irruens humor sanguinis est, vt

*Renem infla-  
matum, qua  
lis medicamen-  
ta contrahit.*

*Calculosi con-  
grua medica-  
menta, minus se-  
ri esse amara.*

*Vesica vteri,  
ex vrina dif-  
ficultate re-  
medium.*

*Scrupulum ē  
vesica finem  
remedium  
proponit.  
Calculi fran-  
genti medica-  
mentum.*

*Nephriticæ  
potio cum  
Astlepiade.*

*Arthritis.  
Ischiad.  
Podagra.*

*Arthritis  
morbus com-  
munis est, vt  
est, vt*

est, ut plurimum autē pituitosus, aut ex pituitoso & bilioso mixtus: quibus etiam interdum miscetur sanguis. Porro ubi pituitosus humor, qui propriē appellatur crudus, in articulis delinquent diutius, crassior atque viscosior efficitur, tuncque aut callis dictus præbet generationem. Qui quidem postquā producti fuerint, non est quod spes illos posse etatē dissolui. Differētia autem generum humorū facili ex colore dignoscitur. Præterea biliosus sanguis multæ caliditatis sensū exhibet ægotis, à calorificisq; remedijs exacerbatur, quemadmodū remittitur rursus à frigidis.

Curatio autē ipsa exordietur est ab evacuatione assidua humoris: si quidē ex quo humoribus redundare corpus, venæ sectione primò omnium administrata: dein purgatione: quibus accedat pharacorum dicendorū cōueniens atq; opportuna vīsa, ita ut in manibus pedibusque pharacis repellentibus fluxionē vram: rursus coxendicem verò, ea minimè administremus. Quū enim iunctura ea in profundo sit sita, sanguis ex vicinis & ambientibus vasīs à musculis ad illā protrudit. Mitigatoris igitur in principio medicamētā vtendū est ad dolores coxendicū, & quæ nec refrigerent multum, nec fortiter calfaciant. Exacerbantur enim per ipsa fluxiones, caliditate nimium plas attrahente ipsas, quā impediente. Rarō itaq; sit coxendicem dolor ex sanguinis multitudine: cuiusimodī curatur, venis circa poplū aut malleolos percutis. Quemadmodū autem sola fæpe sanguinis evacuatio sufficiens auxilij existit, sic contrā in omni dolore coxendicū, & præsertim eo, qui ex humorū copia est exortus, si quis ante evacuationē totius corporis acribus pharacis circa affectam partem vtatur, affectū vgrē curabilē reddet, copia videlicet indissolubili ibidem condensata. Ob idq; ab evacuatione incipiendum est, non solum à cruribus, sed à cubito etiā sanguinis detractio hec facta. Auxiliatur etiam vomitus ipse ischiadicis, magis vrig quā evacuationes per vtrūq; vt qui reuellant humorem repentem deorsum. Mouendi itaq; sunt vomitus in principio ab accepto cibo: postea verò, etiā per vomitoria medicamētā, initio à mediocribus facta. In quibus autem vehemens humorum densatio, quæ vgrē dissolui possit, à medicis intempēstue vtrēbus acribus pharacis facta est, iis maximè cucurbita affixa auxiliatur, & purgatio per clysmos efficacior, qualis est qui ex colocynthide constat.

Compositiones ab Andromachio scriptæ ad ischiadicos. Emplastrum ē profundò extrahens humores assidua coxendicem. Seminis rutæ syluestris, siphij, spumę niri, baccharum lauri, abrotani, colocynthidis medullæ, cardamomi, ammi, singul. drach. iij. rutæ viridis minx octa uam partem. Quodam horum singulorū drach. xx. accipiunt: necnon picis, adipis taurini, terebinthinæ, myrti, ceræ sing. tantundem: chalbani, ammoniaci thymiamatis, vtriusq; drach. vj. opopanax, sulfuris viui, sing. drach. iij. Conficito, & admovent.

Aliud ad coxendicem, capitisq; dolores, atq; ad alios omnes antiquos.

Ceræ drach. xliij. ammoniaci thymiamatis drach. vij. terebinthinæ tantūdem: succi thapsiæ

drach. viij. olei cyathum vnum. Aliud. Ceræ drach. c. visci quercini drach. xvj. myrrhæ drach. vj. terebinthinæ drach. xxv. chalbani drach. vj. iris illyricæ tantundem: ceræ heminam s. cyprini tantundem.

#### Aficlepiadis malagmarum ad ischiadicos.

Myrrhæ fractæ, bdellij ouychie, medullæ ceruinæ, ammoniaci thymiamatis, iris illyricæ, sing. lib. ij. opopanax, chalbani, styracis, mastiches, floris lapidis Asij, succi scymororum, canchrys, pipere albi, sing. lib. j. ceræ, terebinthinæ, vtriusq; lib. v. Tundendum est pharmacum ita, vt qui rursus, forcem vnguētis irini adhibeat, quò mollius redatur.

Aliud miræ iuauis ischiadicis, discutientisq; omnem duritiem.

Ceræ, visci quercini, terebinthinæ, iris siccæ, myrrhæ, chalbani, sing. drach. xliij. Olei cyprini, aut vnguētis Aegyptiaci quod sit sans. Cōficito.

Aliud. Picis liquide brunæ lib. iij. facis aridæ vtræ lib. ij. niri rubri lib. j. resinæ pinæ, ceræ, staphidis syluestris, sulfuris viui, sing. lib. j. pyrethri lib. a. cardamomi sextarii vnum. Picem, ceram, atq; resinam, soluit: arida mundito, cribratq; & liquefactis cōmittito. Porro Damocrates, Atchigenetiq; plurimum ad ischiadicos commendat malagma ex iberide herba (quā nasturtium syluestre vocant) cum adipē porcello tussis confectum: quod sanè imponi iubent ad horantes, indēq; ad balneum accedere.

#### De podagricis & arthriticis affectionibus.

Scopus in hisce affectionibus est, si quidem adhuc suant humores, ipsos per astringētia repellere: si verò amplius non influant, discutere qui sunt iam impacti.

#### EPITHEMA Aficlepiadis, ad arthriticis, miræ dolore sedans.

Succi papaueris drach. iij. croci drach. j. cum lacte bubulo, caprillōve, & panis medulla contundito, læuigatq; ac demig ex rosaceo emolliēs, cōficito cataplasma. Aliud. Stryacis drach. ij. opij drach. j. Confice, vterq; Aliud rosos & duritias discutiens. Farinæ tonigræci, floris lapidis Asij, lomenti fabæ nigræ, farinæ lupinorū, singulorū sext. j. Omnia mixta & aqua subacta calida, imposito. Pastillus podagricus. Aloës lib. j. succi citrauri sesquicenturiæ, thuris masculi orientis: myrrhæ tantundem: floris lapidis Asij, opij, succi mandragoræ, aluminis trisuli, singulorum sextantē: passio excepta in pastillos redigito. Vsa expetente, lacte dissolutos cum pēna illic, & stupra illationem lineolā passio imbutū impone.

Aliud, quod auxiliatur confestim. Visci, terebinthinæ, vtriusq; lib. j. adipis taurini, floris lapidis Asij, calcis viuz, mannæ, singulorum quadrante: cyprini lib. j. Conficito, vtrōq;.

#### F I N I S.

Ex industria omnibus libellum de facilijs para in remedijs, quod omnia que in illo habentur, reperitur in hysce commentarijs longè cunctatioris.

Arthritica cum  
genua ipsa  
libana ab  
Aficlepiadis  
scripta.

Arthritica cum  
genua ipsa  
libana ab  
Aficlepiadis  
scripta.

Arthritica cum  
genua ipsa  
libana ab  
Aficlepiadis  
scripta.

Arthritica cum  
genua ipsa  
libana ab  
Aficlepiadis  
scripta.

Arthritica cum  
genua ipsa  
libana ab  
Aficlepiadis  
scripta.



*Galeni commentarios de Theriaca & de antidotis, hoc nomine dicere tuus Dignationi sta-  
tui, Vir citra controuersiam splendidissime, & generosum istum animū tuum, ex tam  
longe uite & controuersia defatigatum, varia eorum lectione, dulcissimāq; oblecta-  
rem: contra indicariisq; molestias, atq; inueneris difficultates: quæ optimorum ingenio-  
rum veluti deleteria & excruciantia venena existunt salutari alexipharmaco cōmunire, atq; corro-  
borarem. Quoniam hercle adeo inuicta, insuperabilisq; tua ista est animi magnitudo, ut nullus tor-  
mentis successu posset inquam enerti, aut quoquo modo labefactari. Nam tamen si varij fortuna fla-  
tus, acerbissimāq; procella, & qua vel fortissimū queng, prosternere minimo negotio potuissent,  
iam ante multos annos in te maximū impetum fecerint, adeo tamē fortiter sustinuisse omnes eius in-  
sultus, tam heroice resistisse afflictionibus indig, tua mentia circumvallantibus, vt ob nullam tem-  
pestatem inuenientem, vultum inquam, aut colorem, mutaueris. Quam sanē tam insignem consti-  
tutam, animiq; raram serenitatem, non aliunde quā a philosophia comparasti cuius nimirum ama-  
tor longē indulgentissimus es. Siquidē prater alias virtutes quibus te exornauit Deus Opt. Max. e-  
tiam in seipso tibi ardentissimū quendam omnium disciplinarum amorē: quo accensus, adeo illis per-  
petuū indulges, ut ab ipsis renouari non possis. Id quod ipse exploratum habens, non posse me Diua-  
tioni tue rem illam pratorē facere exultanti, quā si ad eam mitterem hosce cōmentarios Gal-  
leni, ut mole exiguos, sic penos eruditione, varijsq; naturæ mysterijs auctos. Tuum igitur fuerit, Vir  
Clarissime, hoc nostrum quantumcūq; munusculum, illius seruentissimi amoris, quo optimus pa-  
ter meus prosequeretur olim totam familiam vestram, officijq; mei in tuam Amplitudinem, futu-  
rum veluti monumentū quoddam perenne, aequi bonisq; consulere. Vale. Venetijs, Calend. April.  
M. D. XLVIII.*

1270

**GALENI PERGAMENTI DE  
Theriaca ad Pisonem, lib. vnus.**



*Edicamentum ex viperis meritis est  
apud homines inter alia omnia cele-  
bratissimū, Opem Pifo, & q vim  
habeat efficacissimam, & q neminē  
promissis frustraretur. Siquidem nul-  
lum a feris conmorsum, hac statim epota anti-  
doto, perussis, memorie proditū est. Nullus etiā  
eadē præsumptra, vel si paulo post imperaretur,  
morsu interit: id quod in dies experiuntur pē-  
tores, in hominib; capitali supplicio damnatis.  
Cæterum si epota theriaca nō purgetur qui hau-  
sit medicamentum purgās, id tibi erit indicium,  
antidotum præstantissimam esse, quæ sapissimē  
solet adulterari. Porro Diuus Marcus Aurelius,  
qui legitimē aliquod gēnsi habenas Imperij,  
assatum, & veluti alimento quodam hoc vtebat  
medicamento: primumq; fuit, qui ipsius existima-  
tionem fidemq; auxit. Verum illius quidē prin-  
cipis tempore, ad familiarium tantum notitiā,  
theriacis perueniebat opus: sub hæc autē mo-  
narchis maximis, vsus eius prodixit in publicū.  
Siquidem nobis omnib; licet eorum bonis pro-  
bē vti, liberalitēq; alia mederi, aūo ab alio me-  
dicamentum capiente: quum nō solum hoc no-  
mine cæteris omnibus antecellant, quod Impe-  
rium a Diis sint adepti, sed quod etiam vniuersa  
bona cunctis libenter impartiantur, ac non secus  
quā Dñ ipsi, tantū ex æquo gaudiū concipiat,  
quantum illi qui ab ipsis seruantur: quum ni-*

*mirum censeant maximā regni esse partem, cō-  
munem omnium salutem. Quo sanē regio cādo-  
re præditi, adeo exquirit & diligenter theriacē  
præparāt, vt ipsi quidem nihil prius omittit:  
antidotos autem, admiranda opera exhibeat. Igi-  
tur morbi cuiusq; naturā cōperta, differentiāq;  
simplicem pharmacorū penes temperamentū,  
cognita singulis morbis quod congruū sit medi-  
camentū cōpositum præparabimus. At simplicia  
medicaminū vires sensu & experientia cogno-  
scimus: quibus postea rationem iungentes, eāq;  
cū ducem sequentes, hallucinari nō possumus.  
Etenim quum cernamus liquidū, sciamonidā bi-  
lem sicut educere: epirhymum, atram bilem : ac-  
dentisq; coccum gnidium, pituitā : nec credamus  
medicamenta ipsa purgātia, in suam naturā hu-  
mores transmutare & conuertere (id quod As-  
clepiades somniauerat) sanē persuasum habemus,  
quem admodum magnes trahit ferrum, sic medi-  
camenta singula, sua in ista facultate cōuenientē  
sibi succum attrahere: nimirum id ratione com-  
prehendentes, quod proprietatem facultatis na-  
turę cuiusq; pharmaci verē attestari atq; expri-  
me re possent. Medicamentorū itaq; alia p totā sub-  
stantia agunt: alia in substantia sua miscellaneā  
facultate sortiuntur, adeo vt sæpe in corpore ef-  
fectus maximē contrarios producant. Siquidē  
lapathi folia comesta subducunt alium, quam  
sumptum eius semen astringit. Similiter & fucus  
brasilicæ, & vetulorum gallorū ius, & coch-  
learum marinarum tremores, ventrem commo-  
uent: olus surem ipsum, atque illarū carnes com-  
metit,*

1271

*Regni maximā  
esse partē, cō-  
munem omnium  
salutem.*

*Simplicium vi-  
res cognosci, sen-  
su experientia  
que, quibus ad  
nihil sit ratio.*

*Sciamonidam  
trahit siccum  
bilem.*

*Epirhymum  
atram bilem  
expugnat.*

*Coccum quibus  
solat pituitā,  
Medicamentū a  
singula propriā  
sibi succum at-  
trahere.*

*Medicamenta  
plura, seruandū  
diuersis suis op-  
eribus partē,  
verum effectus  
producent.*

*Theriacem com-  
mendat.*

*Theriacem per-  
fusa purgantis  
pharmacorum  
epitratem  
suscipimus.  
Marcus Aure-  
lius imp. acri-  
ssimū Theria-  
cis.*

*Suorum et Lu-  
civ cunctis im-  
perij modera-  
tori collegijsq;  
magnifice com-  
menda Gale-  
nus.*

metit, eundem comprimūt. Aloē, squamāq; æris, excrecentes vicerum carnes affingunt: assumpta verō por, vniuersum corpus expurgāt. Lac vbi à nobis diuiditur, contrarias facultates ostendit. Nā ferum ipsius bibitur, ventrē resoluit. Caseus ingestus, ipsum cohibet exactē. Trifoliū herba decocta, impositaq;, ferarū morib; auxiliatur: quæ si sanæ parti affricetur, nō secus quāz ferarum morbus eam affligit. Cicuta sturnos quidem alit, nos autem ē medio tollit. Vera

trum coturnicib; cibis, homines malē perimit. Nōnulla præterea partes quasdam certas corporis vitant. Nam lepūs marinus pulmonē exvicerat. Cantilariis, vesicam peculiariter afficit. E cōtrario, affecto iecinori sæpe fuit herba eupatoria ex vīn. Myrobalanus lienem adiuvat. Saxi fragon & Betonica, renes optimē afficiūt. Quā igitur veteres illi Medici reputarent secū, in vitabiles esse noxiarum ferarum morsus: necnon deleteriorum pharmacorū symptomata esse omnino letalia: quāq; etiā perpendent, hominū naturas differre inter se plurimū, aliūq; aliq; medicamentū idoneū esse, meritō ipsius theriacis accuratē, exquisitē, & variā, sunt moliri præparationē: vt hoc nōmine ipsa in omnibus suū finem assequeretur, & ob vias necessitatem magno studio eam mortales omnes expectarent. Nihil siquidem inter vias incōmoda distīculis mihi videtur deleterius medicamentū, ac feris noxiū. Primus autem qui annidoto cōtra ferarū morsus immiscuit feras, fuisse perhibetur Andromachus, vir merchule memorabilis, nec multo antea natus: quippe qui Neroni (cuius affeciafili) ipsius vires atq; compositionē dicarit. Summa autem descriptioem habet in hunc modum.

Andromachū senioris, Neronis archiatrī Theriacē ex viperis, cui nomen est Galenē, maximē salutaris ad serpentium atq; omnium ferarum ictus, pharmaca deleteria, affectuonū vēticulī, anhelationes, dolores colicos, morbū arcuarū, hydroper, plitūsim, omnimodā convulsionē, pleuritidem, vesicē vlcera, suppressiones vring, cruciatūs renū, pestiferos morbos, ac deniq; canis rabidi moriūs, si pondere fabæ Aegypti sumatur, cū teruis aquæ calidæ cyathis. Igitur captas vere ineunte viperā, cervicē illius atq; caudas precipito, quantū arctā Pygmæi manus extenditur: nam utraq; parte venenū gerunt. Postea verō excoriatas evisceratasq;, ad ipsius omni adipe amoto, in fistile vas cōicito, affundēs aque quod satis esse videatur, addēsq; germē anethi, ac pauxillū salis recētis, & finito coq; donec faciliē à carne ipse spinæ amoueāt. Tūc itaq; carnes ipsas exemptas, cum sufficiens ad pastillos fingendos medulla panis purissimā, cōtinuando & laugigato, assuūsq; iusculū quod satis esse videatur, manib; opobalsamo intinctis, conficito orbiculos, eosq; in vmbra reposito ad totius annidoti compositionem. Dein sermento illine scillam recentē, non admo dum magnā, cūq; in furno vel in patina coque, vt torreatur omnes eius partes ex aquo. Id vbi factū fuerit, partes eius internæ & tennerrimæ cum pari portione optimæ farinæ crunæ contundantur & laugigetur, atq; in orbiculos digeratur. Verūm Andromachus duplicem portionē crunæ farinæ adu-

ciendam censet, quā ramen æqualis modus fingendus pastillis sit optimus. Hæc vbi facta fuerint, accipies pastillorum Theriacorū drachmas xxiii. pastillorum scillinorum drachmas xlviii. piperis longi, succi papaueris, magnatis, hedychei, singulorū drachm. xxiii. rosarū siccarū, Jarris Illyricæ, glycyrrhizæ, seminis napi syluestris, quæ bunias appellant, scordii, opobalsami, cinnamomi, agancē, sing. drach. xii. myrrhæ, costi, croci, casie, nardi, schenē, id est, iūc, Jaron floris, thuris, piperis albi & nigri, dictamni, prasilij, rheu, stecados, petroselinī Macedonici, esalaminthæ, terebuthinæ, zingiberis, quinquesfolij radici, singulorū drachmas vj. polij, chamæpityos, styracis, amomi vuz, menī nardi Gallicæ, Lemnii splragidis, phu pontici, chamedrysos Creticę, foliorū malabathi, chalcidionis toitz, gentianę, anisi, hypocistidis succi, carpobalsami, gōmī, marathi seminis, cardamomi, fefelis, acaciæ, thlaspi, hyperici, fagapen, ameos, sing. drach. iiii. castorei, aristoloclij tenuis, dauci seminis, bituminis ludici, opoponacis, cētauri tenuis, chalban, sing. drac. x. medīs lib. x. Vini Falerni quod sit satis. Conueniebat tū prius hedycheorum vniuentum describere, cuius apud Magnū talis est præparatio. Aspalathi radicū corticis, calamī aromatici, schenī floris, phu, costi, asari, xylobalsami, sing. drach. vj. cinnamomi drac. xxiii. amomi tantandem amaraci drac. xx. nardi Indi

ce drac. xvj. foliorū malabathi drach. vj. myrrhæ drach. xxiii. mastiches drach. vj. croci drach. xix. Excipiuntur vino Falerno, manib; opobalsamo intinctis in pastillos coeuntur, & assiccantur. Elegit porro Andromachus ex aliis feris solas vipers ad huius præparationē antidoto, quod hæ minus alii talibus vim obtineant. Nam basiliscus, & belua subdāua, & triplis frōna apice manita, vel si cernatur ranis, aut sibilis eius audiatur, actūm hominē perimit. Quod si ex ceteris animalib; aliquid attingeret animal à basilisco extinctū, subitō etiam examinatur. Dryinus serpens tam esse perniciosus proditur, vt si qui ipsum per imprudentiam calcarit, vti pedum plantæ exorientur, totiq; crura intumescent, periclitenturq; etiam illorum manus, qui ipsi auxilium tulerint. Hamorrhus, & hamorrhos, adeo inimici sunt homini, vt qui ab ipsis percussus fuerit, sanguine per os & nares, ac per vniuersum corpus effuso, vita fungat. Cōmorsī id dispade, cōficiuntur causonide. Nam & inextinguibili sin, & actu vehemētē cruciat, interdū & disrupit, diē obeunt. Aconnias serpens, vbi se multum extendit, ceu iaculum quoddam infilis corporibus, ita perimit. Inter aspidē nō nominata Pryas, ceruicē exporrigens, longitudinē intervallū mentra, venenum corporibus inquir. Etenim harum ferarum vna (tres quippe aspidū sunt species, hæc videlicet, & chersia, necnō chidonia) perhibent reginam Cleopatrá, quā vel letare custodes, citra suspitionem sibi mori subire cōfiscunt. Nam quib; Augustus devictō Antonio eam capere incolumem vellet, ac viue re studiofissimę (sic vt erat) seruare, vt Romanis tam insignem mulierem in triumpho ostenderet, hæc re intellectū, opauit regina adhuc ex humanis potius decore, quā priuata Ro-

Hedychei vniuentum præparatio.

Viperæ aliis feris vniuentum obtinere talia facultates, vbi ad antidoto tum ab Andromacho delicta. Basiliscus confectus antidoto, hominē perimit.

Hamorrhus. Hamorrhos.

Dispas sein in feri inextinguibilis. Aconnias serps vt perimit.

Pryas venenū corporibus inquir. Aspidum tres species.

Cleopatra post victum Antoni non, ne vna da erretur Romā à Cesare, aspidē sibi maritum conficere.

Latissimissimie diversis. Trifolium affligi ferarum partibus. Cicuta sturnos alit, nos perimit. Veratrum alit coturnicib; cibis, homines male perimit. Nōnulla præterea partes quasdam certas corporis vitant. Nam lepūs marinus pulmonē exvicerat. Cantilariis, vesicam peculiariter afficit. E cōtrario, affecto iecinori sæpe fuit herba eupatoria ex vīn. Myrobalanus lienem adiuvat. Saxi fragon & Betonica, renes optimē afficiūt. Quā igitur veteres illi Medici reputarent secū, in vitabiles esse noxiarum ferarum morsus: necnon deleteriorum pharmacorū symptomata esse omnino letalia: quāq; etiā perpendent, hominū naturas differre inter se plurimū, aliūq; aliq; medicamentū idoneū esse, meritō ipsius theriacis accuratē, exquisitē, & variā, sunt moliri præparationē: vt hoc nōmine ipsa in omnibus suū finem assequeretur, & ob vias necessitatem magno studio eam mortales omnes expectarent. Nihil siquidem inter vias incōmoda distīculis mihi videtur deleterius medicamentū, ac feris noxiū. Primus autem qui annidoto cōtra ferarū morsus immiscuit feras, fuisse perhibetur Andromachus, vir merchule memorabilis, nec multo antea natus: quippe qui Neroni (cuius affeciafili) ipsius vires atq; compositionē dicarit. Summa autem descriptioem habet in hunc modum.

Difficilis in nota nihil repertum, posse delectare in medicina. Trifolij, verum maculatum. Andromachū commendat.

Theriacē quib; commendat affligit.

Aspidum duo macrorū præparatio.

Pastillorum sibi inuicem præparatio.

Theriacē anti doto secundum Andromachū compositione.

manis cōspici. Quo cōsilio duas mulieres fidissimas, Naëra nempe & Carmione, quas ad pulchritudinē corporis mundo subministrādo habebat, ad se vocauit, eisq; iussit vt ferā vuis sicubiq; rectam importaret, quōd(vt dixi)custodes falleret, prius factura periculum in ipsis mulieribus, an subito perire possent. Quæ quidē quā acturū perissent, serunt ipsam postea sibi exitum pariter cōsiliisq; suisq; tan dem inuentū, manu dextra capiti admoda, et diadema, sicut est consentaneum, tenente, vt vel eoisq; ipse citiori bus videretur esse regina: quem admodum Polyxena scribit Tragicus, quæ & ipsa moriens, accutate tamen dedit operā, vt cum decore caderet. Quæ ex re Augustum vehementer fuisse argenti moni memorant, partim ob ancillarum erga reginā amorem, vt cum ea mori nō dubitarent partim q; illa generosam potius mortem mulieris optetere, quā viuere in seruitute. Retraui hanc historiam, vt ex ipsa intelligeremus, q; substat id genus feræ nobis pernitiem concilient.

*Polyxenam de digne operā, vt cum decore moribunda caderet.*

*Viperam ore capere geniturā à mare, rorq; caput abscondere post semem europæum.*

*Viperam prolem intra pēternā vindictæ matris ventrē periculis, atque sic uis.*

*Muris capia.*

*Muris capia.*

*Cameli cerebri, Hirundinis et cerebrum.*

*Corui taurini.*

*Corui ceruini.*

*Callicionum, Stercoris bubuli.*

*Maferda.*

*Lac varicellum dyfenterici saluati.*

*Vipera, pellicula miri pilos regerent.*

*Cancer flammula.*

la & furculos exalabit. Citharis similiter liguata, cū bryonis radice pota, educit vermes. Scorpius alius, atq; ex pane comestus, veficæ lapides cōtenit. Ternæ interitū ex vino assumptum, idē molitur, Tritum & ex melicrato bibitur, arcuatū morbū explodit. Ex rosaceo ceraro impostum, podagricis inflammationibus cōuenit. Accipiter in sulino vngueto decoctus, hebetudini oculorū medetur. Scarabeus in oleo frictus, aurigū instillat, dolorē ipsius auxiliatur. Alauda vltā si edatur, misticē colicos iuuat. Multa etiam vel cōspecta duntaxat, vim suā ostendunt. Sredlio quippe vifus à scorpionibus, substringit ipsos & perimit. Amphibendā si q; m alier grauidā supergrediatur, facit abortum. Itaq; nō est mirabile, si viperarum corpora, amputatis partibus, illis, auxiliandi etiā robur ob tineant: imō nec si morbis ab ipsis factis solē viperæ succurrere possint, vel si nobis inimicissimæ sint. Tracturū siquidē nonnulla animalia, si sanguinem qdem humanum ex vulnere manātem cōnnant, cōmoros occiderē vt vō vorem tur, nec sanguinē degustarint, vulnere feruare incolumē posse, quem admodum et de Helenio etiā proditum possit: quum ab ipsis rā citra vltā noxā edatur, ceruicū à sagittarum per cōtactum eius enectū, tu tō etiā eo medi possint. Itā verō à crocodilo oblati, ipsius adipem vulnere imposuit, summo esse presidio nouimus: murisq; arānt moriūsq; aequales, ab ipso redacti in puluerem, siq; positūq; citra dolorem iuari. Similiter qui à vipera sunt percussī, effugiunt periculum, si trita ipsarum corpora vulnerebus imponantur. Etenim si qd veneni in viperea carne est relictum, id multiplex ex preparato deieplurimum aut illi facularis auxiliatricis largitur. Cantharis nāq; sola exhibita, veficā exulcerat, & inimicum est ipsi medicamentum, sæpenumeroq; sua facultate velenū, hominem iugulat: mista verō qbusdā aliis, salutari veficæ redditur, vniūq; vehementer provocat. Succus etiam papaueris, q; potus per se admodum perniciosus existit, latere neminem arbitror: sin autem cum nōnullis aliis sit preparatus, egros ita subinde iuuat, vt maxime salutariterum esse ipsa medicamentū videatur. Itaq; phreniticorū deliria sæpe generose curauit: deliratosq; robore, ob diuturnas vigilias, cōcilians illis somnū, manificē restituit.

Quinetiā ab araneis cōmoros ipsi aranei triti, & cum vino poti, malo lib erant. Si igitur solū vinum feris mistum, à periculo reddt securum, nimirum theriaca maxime salutarē medicamentū esset, vipore ex tot talibus cōfecta pharmaciis, quorū qualitates totæ per totas miscerent, & alterantur, cōspirantesiq; in vnam eandem naturalem temperiem, cōmune quandam facultatem atque naturā acquirunt, ab ea diuersam, quæ antea singulis inerat. Eligenda tamen sunt, explorandūq; singula medicamenta, prius quā antidoto indantur: solent quippe à fraudulentis hominibus quam creberrime adulterari. Vnus autem cuiuspiam vinum, subinde vniuersa con taminat. Porro quū varij variæ hanc antidotum

10  
20  
30  
40  
50

10  
20  
30  
40  
50

10  
20  
30  
40  
50

*Cantharis.*

*Terra interitua.*

*Alauda.*

*Scorpius vifus à scorpionibus, ut potius.*

*Vipera sola moribunda ab ipsis facta opotulanur.*

*Heleniū ferro infectus sagittarū esse letalis.*

*Muris aranei pulvis facit ab ipso mori.*

*Cantharis per se velenum oculorū, alio cit admodū salubri viliū reddi- tur medicamēto. Papaueris succus facillim.*

*Aranei triti potius ex vino, morbos ab ipsis afferunt.*

*Theriacum est vniuersum pharmacorum quodlibet, totū per totū in vnam naturā conuersum, quodammodo commune, quodammodo commune.*

prepa-

*Theriacis Andromachi præparatur. Viperæ quando venanda.*

præparent, nos compositione Andromachi, seu omnium præstantissima vnum, in regiõis vsus eam præparamus. Venari autè oportet viperas inino veris, cum latebris relictis, foras in apricũ produnt, & non adhuc verus tam exiiale retinent. Intus oamq; delitescens, cum nulla ex parte disilentur, magis sunt perniciose. At egressæ, exuium, crassum tegumentũ solent fleponere. Quare non statim ipsas capere oportet, sed permittite vt aëre aliquandiu fruantur, consuetudine

*Viperæ quales sint deligenda.*

*Viperæ feminæ masculinæq; diuersimoda.*

*Theriacem consuetudine ratio.*

*Theriacem reponenda ratio.*

*Theriacis duodecim annis ad perficiendum conuenit, efficitur veludam vsq; ad annos triginta, immaturoq; etia sequebantur.*

*Theriacis probanda ratio.*

*Theriacis quib; opus est afflicto.*

coctâ, dilutimq; ex aqua exhibuerit. Insuper intestinorũ vermes exterminat, hepaticos & lienos reituit, dysenterias, lenterias, voluulõs, præsertim cum intestina vacant inflammatione, persanant. Præterea cum corpus multis & copiosis sudoribus disitit, ipsidq; robur est exolutũ, nec morbus vini potione admittit, theriacis epota sudore sistit, & collapsas vires corroborat. Iã verò in mulieribus etiam menses educit, & veri sedisq; suppreffas hæmorrhoides subinde aperit. Nam cum varia multaq; faculrate sit prædicta, ideo alia diffundens extenuansq;, cogit vt excernantur: alia ob virtutis imbecillitatẽ præter modum fluencia, solet, vires instaurans, cohibere. Quinetiam vniuersis articularibus morbis auxili

Prodest Theriace & sanis, si crebro ipsam assumant. Hoc auxilio vsi sepe succurrimus elephantiacis. Nec verò corporis tantũ, sed animi quoq; affectibus auxiliat. Quippe melancholicis vitii, si sepe exhibeat, mœdetur, ipsam atram bilem ex hauriens : quare pulchrè ad febrem etiam quartanam conuenit, quandoquidem ab atra bile trahit ortum. Ego igitur multos laborantes quartana, hoc præsidio facili liberaui. Nam vomitu prius secundũ cibum ipsos euacuans, deinde insequenti die succũ abũstintũ exhibens, ita hore duas ante accessione propino antidotum, protinusq; rger frequenter liberafab accessione. Aque etia pauore, omnũ morborũ pessimũ, qui morsos a cane rabido sepe invadere solet, tollere hoc medicamentũ consuevit. Quo quidẽ morbo correpti, aquã timent, ac propter malitã ariditatem, humidi desiderio tenentur, ceterũ a potu abstinere, quia mente alienant, id quod auxiliari possint, non considerant. Proinde sit, vt aquã fugientes, ioculentur, & convellantur, ob febrem qua intus vrant: miserrimõq; tandem mortis genere intereant. Canẽ porro furentẽ & rabidũ, ab eo qui nihil tale perpessus sit, facili dignoscere liceat. Si quidẽ si audieris gracile corpore, siccũ, oculis inflammatũ, cauda demissa, fumante ore, lingua exerta, eadẽ bilis colore infecta, ob vium queoq; insulisse, citatq; rationẽ cucurrisse: deinde rursus subito volentẽ cõsistere, furore quodã insano percitũ, momordisse nõ sibi antea prævisos: hæc inquit si in eo sic habere intellexeris, statim rabidũ esse canẽ intelliges. Quate volnus ab ipso illatũ longẽ vastius efficit, carne multo iocervallo orbicularim præcisa, ne facili ad cicatricem perveniat: sed foramen diũ, quadraginta vi minimũ diebor, patet, ac vt per ipsum canis virus emanet. Cauteris igitur admodũ candentibus locũ solemus ad vrere, & alia vi medicamentis, quẽ extrahendi vim obtrinent. Ego verò antidotum ipsam rosacea mistam aliquando in vulnõs indidĩ, vt cucurbitulæ instat exurgeret, ab aliorq; virus ipsum extraheret: vt quorũ nõ modo eportet, sed etia admoda extrinsecus rabidos morbos præferantũ remediũ existat. Sed neq; ad pestilentẽ luem (quorũ & ipsa veluti fera quædam existens, ab aëris putredine exorta, per inspira-

*Theriacis corpora exanimis afflicto amantur.*

*Quartana febri curatio.*

*Aque pauore omni morborũ pessima de serpsio.*

*Cane rabidũ nota.*

*Morsus a rabido cane contra fieri curatio.*

*Theriacis rabido cane efflicto: necesse est, vt venenũ quadraginta die.*

*Theriacis etia admodũ volens reponantur: canis rabidus morbi.*

*Pestilentẽ luem efflicto: veluti fera quædam, ab aëre putredine exorta, eadẽ bilis effluens.*



tiones insiliunt, haud vnum aut alterū hominē, sed plures quoque ciuitates depaſcit, vaſtat, & populatur) repetere eſt aliud efficacius remedium. Nam quemadmodum cōſtat diuū illum Hippocratem, per ſolam alterationē aëris, diſcuſſiſſe olim ab Athenis peſtilentē eius conſtitutionē, nimirū per totam urbem ex aromaticis lignis, & ſuauiſſimis floribus, variis pyris extractis, vt aër purum hoc modo redditū, inſpirarent homines in mali ſubſidium : ſimili ratione theriace, ceu ipſa

*Peſtilentia ab Athenis abſeque Hippocrati p tota urbem vaſtat, pyris ac materia aromatica extrahit*

*Theriaca, ceu ignis purgatorius conſtit.*

quoque ignis quidam purgatorius exiſtat, præiudicantes quidē ipſam in peſtilenti aëris ſtatu, ne tūc malo corripſi ſiniſt: correptis autem mederi poterit, malini inſpirati aëris inalteratū, nec ipſi amplius graſſari permittens. Quare in proſpera quoque valetudine, vt crebrō vtiar hac annodato, cōſulo, ſed præcipue dum per horridam hyemē iter facturus es. Iam verō antidotus hæc ſenſus omnes cōſſumat, acuit mentē, adeoque ob varietatē miſcelæ, ab iniuriis corpus ſecurū facit, vt ne à deleteris quidem eviniri poſſint: vt fertur de Mithridate, qui nō theriace (vt quæ nondum erat) ſed alia antidoto, quā Mithridas non appellavit ſuo nomine, præmitatus, nō potuit veneno interire. Cū enim à Pompeio victus, in extremis cogeretur ſibi ſano per venenū mortē cōſciſcere, medicamēto copioſo epoto, ipſe quidē ob præſumptū antidotū deſungens vitā nō poſuit: ſilix autē, quæ ob eximiū erga patrem amorem,

*Mithridatem præmitatus antidoto, veneno non potuit, ac provida opus medicamenti præſeſſe ſervo.*

*Theriace verū deſſe poſſit abſolūtū cūthano Theriace præparanda quæritur.*

*Theriace vſu quod aſtat in temporibus cōgruis, & quib. maxime.*

*Theriace corpora puriora diſſolvit.*

appetere cum eo mortē volentes, idem medicamentū haulerūt, ſubito animū exhilaratū. Quod Mithridates ſentens, Pytho ſuo familiari inunxit, vt ipſum iugularet: q pharmacii opus abſolvens ferro, cum mori violenter cōegit. At verō theriace vrendum eſt poſt abſolutā coctionem, interdum quidem inſtat Aegyptiæ fabæ, cum binis aquæ cyathis, vbi exiguum ad concoctionē ipſius intervallū erit interitum verō avellane nūcia magnitudine, ex tribus aquæ cyathis, cūm plus temporis ad pharmacii diſtributionē es habiturus. Cæteri per æſtatē neunq id pharmacū capere conſulueram. Similiter ætate florentibus, calidiſſimisq naturis, nec multū, nec ſæpe id exulandum cenſeo: ſis verō qui iam inclinant, & plurimum, & crebrō, nō ex aqua, ſed ex vino, vt propinē, ſuaſdeo. In pueris omnino vitandū id medicamēn eſt, vt quod facile corpora eorū diſſolvat. Memini ſiquidem aliquando puellum ex intempeſtuo vſu antidoti diſſolutum fuiſſe.

De ſalubritate theriacis.

Salēs theriaci ad prædictos enī affectus faciūt, modicē tamē ac longo tempore. Neq enim evaneſcit ipſorū ſaculitas, tametſi ex cōbuſtis viſperis conficiant. Multa ſiquidem evadunt ignis cōmercio meliora, aut latentē naturā edunt. Aurum quippe iudicamus per ignē: adulteranīq igne coarguitur: ac ſtamina exactē purgat, eſſe probum apparet. Ferrū igne molleſcit, flexatūq nobis ad multos vires vſus eſt aptum. Nunquid enī plurima quæ ingerunt in corpus, nutritis diſ nobis ignis beneficiō idonea reddunt? Etenim (vt alia præterea) vinū ſtatim ab vſu preſuſum, eſt crudum: à ſolis autē igne cōcoctū, ſua uſumū & maximē potabile redditur. Chalcitis etiam cruda quodē corpora exurit: cocta verō

elatricē inducit corporib. Lapis Phrygius crudus acerrimus eſt: ignitus & cum aliis quibuſdā tritus, ſit colorū præſentaneū remedium. Spongiæ combuſtæ cinis, ſanguinis fluxionem portēter inſublet. Vipera itaq ſimul omnes integræq combuſtæ, inſit præuacuat deponunt, ab igne ſalutares redduntur. Peculiariter autē ſalēs medentur maxime affectibus per ſummam cutem obortis, leuris dico, lepræ, atq agreſti impetigine: abiguntq pedunculos, propne ex corruptone enaſcentes. Præterea dentes optime abſtergunt, erodiq non permittunt, ac ſtaccidas gingivas condenſant, earūq ſuorem atq purulū gientem reprimunt. Præparatio autem eorū eſt talis: Vipere prædictæ ſimiles, & eodem tempore capte, numero quatuor, non plus biديو poſt venationem ſumantur. Præſterit tamen ſi eodem die quo ſunt capte, iis vtiar Deini ſalis ammoniaci, vel cōmūis, colore albi, & leniter ſplendentis, modius Italicus. Cum quo runderunt minutim, gentianæ Creticæ lib. ſ. ariſtolochei rorū dæ tantundē. Centauri tenuis comē lib. i. cardamomi, Armeniaci præſij, ſing. vnc. vi. Scordij mōrani, ſelinī, chamædyos Creticæ, ſing. lib. i. rutæ ſanæ feminis tantundem. Mellē Attico hæc vniuntur, & ſeliſta ipſorum in ollam ſiſtilem vacuam conſicitur. Poſtea quatuor ſerpentes viuæ: mox ſuſtine tenent, ad modūq recentēs, quinq numero, contriduntur minutim: ita reliqua aliorū pars dimidia adiunt: atq vbi cooperueris ollam, lutōq diligenter obſtuleris, quatuor foraminibus ipſam pertendes, vt per eam vapor coctionis menſurā indicet. Nam primū ſumas copioſius, obſcurus, turbidūq expirare videbitur, noris ignem iam in vaſe deficiſſe: quæ quodē ne inſpires ipſe, ubi ſummē caueidū eſt. Poſtea vbi vapor ceſſauerit, & tenuē quandam ſtammam per foramina exhibere conſpexeris, tunc ipſa exquirit eſſe cocta cenſeto: atq ita ollam ab igne tollito, tota eam de ac nocte refrigerans. Deinde exmproſ carbonēs, diligēter eos rundero, & cum his quæ ſubdam, in cenſito. Rutæ agreſtis feminis, hyſſopi Creni, ſing. vnc. ix. agreſtis ſterniculi feminis, nardi Cedricæ, ſtaphylos Scythicæ, ſing. vnc. vi. petroſelinī Macedoniri vnc. iij. amomi vnc. v. origani heracleotici ſummamit vnc. ix. hormini feminis teraſſati vnc. iij. thymi Artici ſummamit vnc. ix. Malabathri Indici ſol. vnc. iij. baccarū iuniperi Laconiri carnis lib. h. coriandri ſanui ſem. vnc. vi. piperis albi & nigri, ſing. vnc. ij. ſilphij rad. vnc. x. zingiberis lib. ij. ſatyrij ſem. vel rad. pulegij montani, ſeliſta Maſſaliotici ruſi, tortilli mōrani feminis, menthæ, ſing. vnc. vi. calicæ optime vnc. ij. cinnamomi vnc. ij. Rarſus omnia cōtundito, cōcernitōq, & reponito in vitreis vaſis: nec vtiar ipſis niſi poſt dies ſerē denos. Porro ego ſalēs ipſos aliis præparauī, non viperas, ſed earum loco tantundem theriacorū paſtiliorū, vni cum aliis medicamentis combvres: qua in diſtina ipſos longē præſtantīſimos feci.

*Viperæ rubra ſunt, ſeleſta ab igne nō ſolū. Salis Theriaci quod aſtat in ſtatu.*

*Salis Theriaci præparatio non ſit.*

*Quæ habentur in libello de Theriaca ad Porphiriū, ea omnia huius quæ ad Piſum inſcribitur, inſunt longē conuoluto, & quæ ſunt ex indiſtina rēpauit.*

GALE.

*Aurum iudicatur per ignem. Ferrū igne molleſcit.*

# GALENI PERGAMENTI de antidotis, lib. I.



Edicamenta quæ non extrinsecus corpori imposita, sed intra ipsum assumpta, affectibus auxiliant, antidotos Medici appellant. Tres autem in vniuersum differentiz ipsarum existunt. Nonnullæ siquidem lætalem medicamentorū gratia offerunt: quædam cōtra vi-  
10  
15  
20  
25  
30  
35  
40  
45  
50  
55  
60  
65  
70  
75  
80  
85  
90  
95  
100  
105  
110  
115  
120  
125  
130  
135  
140  
145  
150  
155  
160  
165  
170  
175  
180  
185  
190  
195  
200  
205  
210  
215  
220  
225  
230  
235  
240  
245  
250  
255  
260  
265  
270  
275  
280  
285  
290  
295  
300  
305  
310  
315  
320  
325  
330  
335  
340  
345  
350  
355  
360  
365  
370  
375  
380  
385  
390  
395  
400  
405  
410  
415  
420  
425  
430  
435  
440  
445  
450  
455  
460  
465  
470  
475  
480  
485  
490  
495  
500  
505  
510  
515  
520  
525  
530  
535  
540  
545  
550  
555  
560  
565  
570  
575  
580  
585  
590  
595  
600  
605  
610  
615  
620  
625  
630  
635  
640  
645  
650  
655  
660  
665  
670  
675  
680  
685  
690  
695  
700  
705  
710  
715  
720  
725  
730  
735  
740  
745  
750  
755  
760  
765  
770  
775  
780  
785  
790  
795  
800  
805  
810  
815  
820  
825  
830  
835  
840  
845  
850  
855  
860  
865  
870  
875  
880  
885  
890  
895  
900  
905  
910  
915  
920  
925  
930  
935  
940  
945  
950  
955  
960  
965  
970  
975  
980  
985  
990  
995

lulentas feras oportulant: aliæ affectibus ex praua victus ratione obortis succurrūt. Sunt quæ tres hosce polliceant vñs, vt theriace ab Andromacho præparata, quæ Mithridatō dictam ab vñs hominū relegauit. Si quidē cūm theriace haud exigua viperarū carnē cōtineat, hoc nomine ad viperarū morsus præstidior q̄ Mithridatō existit. Ad alia verō Mithridatō nihil minus valet. Imō est etiā in quibus præstidior se exhibeat. At nō easdem vires obinēt ipse antidoti, & post  
10  
15  
20  
25  
30  
35  
40  
45  
50  
55  
60  
65  
70  
75  
80  
85  
90  
95  
100  
105  
110  
115  
120  
125  
130  
135  
140  
145  
150  
155  
160  
165  
170  
175  
180  
185  
190  
195  
200  
205  
210  
215  
220  
225  
230  
235  
240  
245  
250  
255  
260  
265  
270  
275  
280  
285  
290  
295  
300  
305  
310  
315  
320  
325  
330  
335  
340  
345  
350  
355  
360  
365  
370  
375  
380  
385  
390  
395  
400  
405  
410  
415  
420  
425  
430  
435  
440  
445  
450  
455  
460  
465  
470  
475  
480  
485  
490  
495  
500  
505  
510  
515  
520  
525  
530  
535  
540  
545  
550  
555  
560  
565  
570  
575  
580  
585  
590  
595  
600  
605  
610  
615  
620  
625  
630  
635  
640  
645  
650  
655  
660  
665  
670  
675  
680  
685  
690  
695  
700  
705  
710  
715  
720  
725  
730  
735  
740  
745  
750  
755  
760  
765  
770  
775  
780  
785  
790  
795  
800  
805  
810  
815  
820  
825  
830  
835  
840  
845  
850  
855  
860  
865  
870  
875  
880  
885  
890  
895  
900  
905  
910  
915  
920  
925  
930  
935  
940  
945  
950  
955  
960  
965  
970  
975  
980  
985  
990  
995

noxia medicamenta, & ante eadē ssumptæ. Nam quæ ipsarū quantitas, cūm præsumunt, sufficit vt hominē illiusiū custodiat, ea quadruplo, aut quincuplo aucta, cūm post venenū datur, auxili-  
10  
15  
20  
25  
30  
35  
40  
45  
50  
55  
60  
65  
70  
75  
80  
85  
90  
95  
100  
105  
110  
115  
120  
125  
130  
135  
140  
145  
150  
155  
160  
165  
170  
175  
180  
185  
190  
195  
200  
205  
210  
215  
220  
225  
230  
235  
240  
245  
250  
255  
260  
265  
270  
275  
280  
285  
290  
295  
300  
305  
310  
315  
320  
325  
330  
335  
340  
345  
350  
355  
360  
365  
370  
375  
380  
385  
390  
395  
400  
405  
410  
415  
420  
425  
430  
435  
440  
445  
450  
455  
460  
465  
470  
475  
480  
485  
490  
495  
500  
505  
510  
515  
520  
525  
530  
535  
540  
545  
550  
555  
560  
565  
570  
575  
580  
585  
590  
595  
600  
605  
610  
615  
620  
625  
630  
635  
640  
645  
650  
655  
660  
665  
670  
675  
680  
685  
690  
695  
700  
705  
710  
715  
720  
725  
730  
735  
740  
745  
750  
755  
760  
765  
770  
775  
780  
785  
790  
795  
800  
805  
810  
815  
820  
825  
830  
835  
840  
845  
850  
855  
860  
865  
870  
875  
880  
885  
890  
895  
900  
905  
910  
915  
920  
925  
930  
935  
940  
945  
950  
955  
960  
965  
970  
975  
980  
985  
990  
995

est: idē non semel quodidie, sed bis. Quod si quis etiā singulis diebus, quemadmodū nostro seculo Imperator Aurelius Antoninus, vel vt ipse Mithridates, medicamentū capiat, omnino ad deleteriis venenis erit securus. Vt Mithridatē ferunt, cūm exitiali haustu medicamento, potius  
10  
15  
20  
25  
30  
35  
40  
45  
50  
55  
60  
65  
70  
75  
80  
85  
90  
95  
100  
105  
110  
115  
120  
125  
130  
135  
140  
145  
150  
155  
160  
165  
170  
175  
180  
185  
190  
195  
200  
205  
210  
215  
220  
225  
230  
235  
240  
245  
250  
255  
260  
265  
270  
275  
280  
285  
290  
295  
300  
305  
310  
315  
320  
325  
330  
335  
340  
345  
350  
355  
360  
365  
370  
375  
380  
385  
390  
395  
400  
405  
410  
415  
420  
425  
430  
435  
440  
445  
450  
455  
460  
465  
470  
475  
480  
485  
490  
495  
500  
505  
510  
515  
520  
525  
530  
535  
540  
545  
550  
555  
560  
565  
570  
575  
580  
585  
590  
595  
600  
605  
610  
615  
620  
625  
630  
635  
640  
645  
650  
655  
660  
665  
670  
675  
680  
685  
690  
695  
700  
705  
710  
715  
720  
725  
730  
735  
740  
745  
750  
755  
760  
765  
770  
775  
780  
785  
790  
795  
800  
805  
810  
815  
820  
825  
830  
835  
840  
845  
850  
855  
860  
865  
870  
875  
880  
885  
890  
895  
900  
905  
910  
915  
920  
925  
930  
935  
940  
945  
950  
955  
960  
965  
970  
975  
980  
985  
990  
995

mortē oppetere, q̄ subitici Romano Imperio, ele-  
10  
15  
20  
25  
30  
35  
40  
45  
50  
55  
60  
65  
70  
75  
80  
85  
90  
95  
100  
105  
110  
115  
120  
125  
130  
135  
140  
145  
150  
155  
160  
165  
170  
175  
180  
185  
190  
195  
200  
205  
210  
215  
220  
225  
230  
235  
240  
245  
250  
255  
260  
265  
270  
275  
280  
285  
290  
295  
300  
305  
310  
315  
320  
325  
330  
335  
340  
345  
350  
355  
360  
365  
370  
375  
380  
385  
390  
395  
400  
405  
410  
415  
420  
425  
430  
435  
440  
445  
450  
455  
460  
465  
470  
475  
480  
485  
490  
495  
500  
505  
510  
515  
520  
525  
530  
535  
540  
545  
550  
555  
560  
565  
570  
575  
580  
585  
590  
595  
600  
605  
610  
615  
620  
625  
630  
635  
640  
645  
650  
655  
660  
665  
670  
675  
680  
685  
690  
695  
700  
705  
710  
715  
720  
725  
730  
735  
740  
745  
750  
755  
760  
765  
770  
775  
780  
785  
790  
795  
800  
805  
810  
815  
820  
825  
830  
835  
840  
845  
850  
855  
860  
865  
870  
875  
880  
885  
890  
895  
900  
905  
910  
915  
920  
925  
930  
935  
940  
945  
950  
955  
960  
965  
970  
975  
980  
985  
990  
995

promptē in veterascētum qualitatē mutuari quæ qualitas, acrimonia est cūm perspicuo calo-  
10  
15  
20  
25  
30  
35  
40  
45  
50  
55  
60  
65  
70  
75  
80  
85  
90  
95  
100  
105  
110  
115  
120  
125  
130  
135  
140  
145  
150  
155  
160  
165  
170  
175  
180  
185  
190  
195  
200  
205  
210  
215  
220  
225  
230  
235  
240  
245  
250  
255  
260  
265  
270  
275  
280  
285  
290  
295  
300  
305  
310  
315  
320  
325  
330  
335  
340  
345  
350  
355  
360  
365  
370  
375  
380  
385  
390  
395  
400  
405  
410  
415  
420  
425  
430  
435  
440  
445  
450  
455  
460  
465  
470  
475  
480  
485  
490  
495  
500  
505  
510  
515  
520  
525  
530  
535  
540  
545  
550  
555  
560  
565  
570  
575  
580  
585  
590  
595  
600  
605  
610  
615  
620  
625  
630  
635  
640  
645  
650  
655  
660  
665  
670  
675  
680  
685  
690  
695  
700  
705  
710  
715  
720  
725  
730  
735  
740  
745  
750  
755  
760  
765  
770  
775  
780  
785  
790  
795  
800  
805  
810  
815  
820  
825  
830  
835  
840  
845  
850  
855  
860  
865  
870  
875  
880  
885  
890  
895  
900  
905  
910  
915  
920  
925  
930  
935  
940  
945  
950  
955  
960  
965  
970  
975  
980  
985  
990  
995

Hinc recitat Galenus carmina Andromachi, ac de-  
10  
15  
20  
25  
30  
35  
40  
45  
50  
55  
60  
65  
70  
75  
80  
85  
90  
95  
100  
105  
110  
115  
120  
125  
130  
135  
140  
145  
150  
155  
160  
165  
170  
175  
180  
185  
190  
195  
200  
205  
210  
215  
220  
225  
230  
235  
240  
245  
250  
255  
260  
265  
270  
275  
280  
285  
290  
295  
300  
305  
310  
315  
320  
325  
330  
335  
340  
345  
350  
355  
360  
365  
370  
375  
380  
385  
390  
395  
400  
405  
410  
415  
420  
425  
430  
435  
440  
445  
450  
455  
460  
465  
470  
475  
480  
485  
490  
495  
500  
505  
510  
515  
520  
525  
530  
535  
540  
545  
550  
555  
560  
565  
570  
575  
580  
585  
590  
595  
600  
605  
610  
615  
620  
625  
630  
635  
640  
645  
650  
655  
660  
665  
670  
675  
680  
685  
690  
695  
700  
705  
710  
715  
720  
725  
730  
735  
740  
745  
750  
755  
760  
765  
770  
775  
780  
785  
790  
795  
800  
805  
810  
815  
820  
825  
830  
835  
840  
845  
850  
855  
860  
865  
870  
875  
880  
885  
890  
895  
900  
905  
910  
915  
920  
925  
930  
935  
940  
945  
950  
955  
960  
965  
970  
975  
980  
985  
990  
995

## GALENI.

Quod pertinet ad viperarū capturas, neq̄ iux-  
10  
15  
20  
25  
30  
35  
40  
45  
50  
55  
60  
65  
70  
75  
80  
85  
90  
95  
100  
105  
110  
115  
120  
125  
130  
135  
140  
145  
150  
155  
160  
165  
170  
175  
180  
185  
190  
195  
200  
205  
210  
215  
220  
225  
230  
235  
240  
245  
250  
255  
260  
265  
270  
275  
280  
285  
290  
295  
300  
305  
310  
315  
320  
325  
330  
335  
340  
345  
350  
355  
360  
365  
370  
375  
380  
385  
390  
395  
400  
405  
410  
415  
420  
425  
430  
435  
440  
445  
450  
455  
460  
465  
470  
475  
480  
485  
490  
495  
500  
505  
510  
515  
520  
525  
530  
535  
540  
545  
550  
555  
560  
565  
570  
575  
580  
585  
590  
595  
600  
605  
610  
615  
620  
625  
630  
635  
640  
645  
650  
655  
660  
665  
670  
675  
680  
685  
690  
695  
700  
705  
710  
715  
720  
725  
730  
735  
740  
745  
750  
755  
760  
765  
770  
775  
780  
785  
790  
795  
800  
805  
810  
815  
820  
825  
830  
835  
840  
845  
850  
855  
860  
865  
870  
875  
880  
885  
890  
895  
900  
905  
910  
915  
920  
925  
930  
935  
940  
945  
950  
955  
960  
965  
970  
975  
980  
985  
990  
995

Veterascitium  
veterum qua-  
litas est acrimo-  
nia cum perspi-  
cua calore, co-  
piosa in cordis  
amaritudo.  
Vina repen-  
di ratio.  
Topicalis loca  
vina in acuti-  
tudine.  
Scabro conda-  
re ad colorem  
concoloratum  
veterum.

Vina quæma-  
triorum præ-  
stidiorum capi-  
tis dolorem cau-  
tiant.  
Vina antidota  
emplastris ad  
modum, quæ  
esse debent.

Mel vetustum  
ex coctione a-  
maricæ, et  
quod tempore  
vel citra coctio-  
nem paratur.

Compofitura  
vitis, viret  
simplicium so-  
lutione.  
Scorpionis dispo-  
sitione qua fiat.

Viperæ venas  
di ratio.

Antifon Theri-  
aciis confusa  
di ratio.

gere, quàm si etiam brodium viperarum affundat. Reponi aut debent ubi assuicati fuerint, in vase stanneo, vitreove, aut aureo. Cæterum vitreū quidem & aureum, nullum dolum admittit: stanneum verò adulterat plumbi mistura. Tale igitur vitare cōvenit in vniuersis annidosis: veluti & quod argento nō purgato confectū est. Celer timē uanq; & huic frugo oboritur. Durat vigor ipsorū orbiculorū, si curiosē sint reficcati, & repositi, tribus & quatuor annis. At scillius trochisci, & tribus scillæ optimæ rosæ paribus, & duob. tenuissimq; farina; erui, similiter cōficiunt.

Post hæc subdidit Galenus descriptionem magnæ tæ Hedychroi, quam habes in commentario de Theriaca ad Pisonem.

## G A L E N U S .

Ex medicamentis quæ thienacem cōstituant, longum pipet soler adulterari. Cæterum adulteratum quidem, affusa aqua soluitur: quod verò adulterio caret, insolubile permanet. Contrā autem, verum sagapenum statim aqua rigatum soluitur: quod nō tale est, eliquefit minime. Sciendum autem est, chalbani partem in sagapenum degenerare. Similiter etiam optima calia in cinnamomum transit. Nec fecus in optima myrrha opocalpasō reperitur, a bipia myrrha diuersum. At opocalpasō est latal: multatq; ob inficiam myrrhæ, quæ opocalpasō continebat, cōcilia uit exitum. Nam de industria nonnulli antidotum præparantium, ipsam vt laudatissimam iniecerunt: quod colliris inditam, optimū esse medicamentum vident. Quemadmodū igitur in puernis gemellis inuicē similibus, qui quidem non eis assueuerunt, alterum ab altero nequeūt discernere: ita autem qui viua vixerunt, facillima est ipsorū dignotio: ita qui inter singula medicamenta est versatus, facile vel minimis eorū differentias cognoscit: quæ latent illos, qui ipsa semel tantū aut bis cōspexerint. Rosæ ad thienacem eligēde sunt alis omnibus rubentiores, atq; odoratæ magis. Vnūquodq; siquidem præstantissimū est, quod proprium generis sui odorem valentissimum possidet. Præstant etiam in quolibet genere, nō rugosa, neq; exilita, sed quæ probe nutritam, solidamq; cōstituentiam sortiuntur. Scordium optimum, ex Creta nobis advenit: quod quidem caduera supra ipsum iactata, diutissimè tueri à putredine prodit. Opobalsamū adulteratur plurimis modis, quos premono, ne q; forte doctrina mea abutatur. Quare neq; eos probō, qui scripturas latalium medicamentorū invulgant. Porro cinnamomū optimū debet odoratissimū esse, gustanti calidū: colore autē rale, vt si quis lactis colore fusco admiscuerit, cum cœruleo pauxillo. At agaricū (quod sanè adulterū nullū admittit) laudatissimū est, quod leuissimū: vt densum, graue, & lignosum, deterimum. Crocus optimus est, qui lauisimus, odoratissimūq; existens, longo tempore in vigore perdurat. Iam verò in cinnamomi penuria, duplicata casie portio iniiciēda est. Carpesio etiam sæpe loco pui vtitur: est enim similis generi cum eo facultatis, sed valēioris, nōnihilq; odoratum refert. Sunt enim tenues festucae, fur-

culis cinnamomi persimiles. Nardus Indica, quæ radix quidem est (licet ob similitudinē formæ quā cū spicis habet, spica nardi vocetur) non est emenda clora. Vnguentarū quippe, coquētes prius eam, vt ad alia ipsius decocto vtantur, potius inuilem vendūt. Rheon quoq; ipsum adulteratur. Quandoquidē statim in regionibus ubi gignitur, recens nōnulli capientes ipsam, decoquant, donec totum cremorē reddat: quem postea cremorē, ubi accuratius percusserint, ceu purum, atq; ab aquæ mistura alienū, ad nos transmittunt. Licet & rheon ipsum siccātū, tanq; neq; id prius cocturam fuerit expertū. Cognoscitur tamē facile dolas: nam eiusmodi rheon nec densam, cōpacitāme substantiam possidet, vt quod integrū est, sed rarius apparet, astrictionēq; aut obicurat, aut planē nullam gustanti exhibet: quæ tamen rheon vigena validissimam possidet.

Deinceps Galenus modum præparande Theriacis tradit, qui quidem iam expositus est in cōmentario ad Pisonem. Subiungit etiam compositiones eiusdem antidoti, à Damocrate, atq; etiam Critone productas: quas quidem (quia descriptionem Andromachi vnicē commendat Galenus, eiq; esse inherendam censet) studio brevitatē omittimus.

G A L E N I P E R G A M E N I  
de antidotis, lib. II.

Vando quidem de Theriace toro priorē libro tractauimus, in præsentē de cæteris antidotis differamus, ab iis quæ Andromachus descripsit, exorfi.

Antidotus Mithridatica, ad latalia peculiariter efficax, ad omnesq; internos affectus. Dulcis radialis drach. vñ. obolos iij. opij drach. vñ. obol. ij. castorei drach. vi. polij drach. v. obol. ij. costi tantundē: spicæ nardi drach. vi. obol. ij. castis drach. v. obol. ij. thuris drach. vi. sefeleos drach. v. obol. ij. hypocistidis succi drach. vi. acori drach. ij. scordij drach. vi. obol. ij. folij drach. iij. salis drach. vi. cypleos drach. vi. obolos ij. myrrhæ drach. vi. croci drach. vñ. obol. ij. cinnamomi tantundē. styracis drach. v. obol. iij. dauci seminis drach. vi. obol. iij. zingiberis drach. vi. obol. ij. pluri Pontici drach. ij. petroselinij drach. iij. obol. iij. nardi Gallicæ, fœniculi seminis, nardi Indicæ, singul. drach. iij. hyperici, acaciz, vtriusq; drach. ij. gennanæ drach. iij. anisi drach. iij. Thlaspi drach. vi. obol. iij. meu athamaticij drach. iij. rosarum siccarum, cardamomi, singul. drach. iij. gummi drach. ij. iunci odorati rotundi drach. vi. obol. ij. opopanax tantundē: opobalsami drach. vi. obol. iij. chalbani drach. vñ. scinci drach. ij. obol. ij. refinæ terebinthinæ drach. vi. obol. ij. vini Chij quod sit satis: mellis Attici coctū quantum fat esse videatur. Conficito.

Antidotus Asclij Gaii, ad latalia & virulenta omnia: quæ, si inaspergatur ubi frequentat serpen-tes, eos fugat. Facit ad omnē oculorū fluxū, & reliquarū partium. Discutit omnes molestias animi, febresq; longas & circuitu repetētes persan- at. Ad hæc, mentis, fortisq; abq; difficultate educit, auxiliumq; phthisicis, auellanz nuci in-  
stat epo-

Vasa vitrea  
vel aurea vel  
stanneo dolum ad  
muttere, flom-  
nea autem a-  
dulterari plom-  
bi mistura, ac  
proinde abie-  
cenda ab anti-  
doto.  
Scillonorū cre-  
folia.

Piper longum  
adulterari af-  
fusa aqua sol-  
uitur.  
Sagapenum a-  
qua rigatum sol-  
uitur.  
Chalbani parti-  
em in sagape-  
num.  
Calia in cin-  
namomum cōde-  
gitur.  
Opocalpasō  
est latal, repre-  
sentatq; in myr-  
rha.

Præstantissimū  
esse medicamē-  
tum quod pro-  
pria generis sui  
odori valentis-  
simū possidet.  
Scordium cada-  
uera inuicē  
discernit.

Latalia medi-  
camentorū in-  
uulgant inuol-  
gendum nō est.  
Cinnamomi o-  
ptimo nota.  
Agarici optimi  
nota.  
Crocij optimi  
nota.

Carpesij facili-  
tas.

Spica nardi re-  
dit est, sed ab  
similitudine  
quam cum ju-  
ci habet sic ap-  
pellatur.  
Rheon adul-  
terat modis.

Rheon est re-  
bentior etiam  
geni gigni.

Antidotus Mi-  
thridatica de-  
scripsit.

Antidotus As-  
clij fugat ser-  
pentes ad om-  
nesque affec-  
tus paruos.

star epota, cum aqua cyathis quaternis. Ad vil-  
peros tamen moriū, ex vino exhibetur. Myr-  
rhæ drach. xij. croci, nardi, vtriusq; drach. xij. iun-  
ci odorati rotundi drach. xij. cinnamomi drach.  
ij. amomi drach. iij. chalbanī drach. ix. refinæ te-  
rebinthinæ drach. v. piperis albi drach. x. longi  
drach. xxxij. costi drach. viij. stænis drach. xij. la-  
chrymæ papaueris raurundē, scordij drach. i. pō-  
lij drach. iij. hypocistidis succi drach. xij. petro-  
selini drach. viij. scellis drach. xij. dauci seminis  
drach. xvj. opobalsami drach. xij. opopanis tan-  
tundē: caitorei drach. viij. mellis Atrici sextar. ij.  
Conficito.

**Damocratis Antidotus ex sanguini-  
bus ad venena.**

Sanguinis asferini, & marinæ testudinis, &  
anatis, & herodi, siccorū omniū, sing. drach. ij.  
Myrrhæ stillatiz, spicis nardi, sing. drach. x. cin-  
namomi drach. vj. rosæ fol. sic. drach. viij. iun-  
ci rotundi, thuris, costi, sing. drach. j. amomi, pi-  
peris albi, vtriusq; drach. ij. piperis longi drach.  
j. croci drach. xij. casie drach. viij. trifolij radi-  
cis drach. v. polij tantundē: opobalsami drach.  
ij. petroselini drach. iij. baccharū iuniperi, acori,  
rheū pontici, mead, dictamnī, phū, ammoniaci thy-  
miamaris, fœniculi, sing. dra. c. j. agarici drach. ij. s.  
faxatilis rutæ drach. ij. dauci drach. ij. anisi, asari,  
ameos, cumini, sing. drach. j. s. fem. napi sylue-  
stris drach. iij. scordij Cretensis drach. v. mellis  
optimi dupl. omnium. Detrita omnia, costiq;  
melle excepta, vasis induro.

Rosacæ pastilli confectio ex Damocrate.  
Rosæ virentis foliorum lib. ij. iunici rotundi  
drach. xx. myrrhæ drach. xij. croci drach. viij. Cō-  
tatis rosas atq; per lacteum transmissas, addan-  
tur reliqua cōminuta: ac postea rursus simul run-  
dantur; rediganturq; in prægrandes orbiculos.

**Crocemagmaris preparatio.**  
Croci Cilicij drach. c. myrrhæ pinguis, rosarū  
siccarū, amyli, gummi, sing. drach. i. Omnia vino  
odorato, marinæ aquæ experte, excipiuntur &  
læuigentur, ac deniq; in trochiscos singantur.

**Antidotus Prasagiensis nomine:** qua ebibita,  
venenū cum cibo sumptum, prorsus reddet vom-  
itu. Lemnis terræ drach. j. obol. ij. baccharum  
iuniperi drach. ij. læuigentur exacte cum olei dul-  
cis pauillū. Propinquetur ex mulsā, nucis ponti-  
cæ magnitudo.

**Asclepiadis, ad eos qui letalia bi-  
berunt, remedia.**

Papaueris lachrymæ epota, cōfert mouere vo-  
mitū, ex hydreleæ calente, vel ex oxycrato cali-  
do, alimūq; clystis subducere. Opio epoto, me-  
rum copiosius stamini bibitū iuuat: aut piper cū  
vino. Conducit etiā lac asininū haustum: atq;  
clystini mitiores. Sumpto aconito, iuuat mani-  
pulum rutæ, læuigatū vino meraciori, ebibere.

Si aliter cum uocauit, lac asininū, vel quodvis a-  
liud, cū mulsā calida opitulat. Si viride corian-  
drium, auxilia iū vinū meracū potū, & pingue ius  
galinatum. Lepore marino assumpto prodest  
lac asininū bibere: si minus, vaccinū, aut capril-  
lum. Si toxicū potum sit, vinum dulce adiuuat,  
oleum rosacæ, sanguis caprillus, semēq; napi  
cotritum ex vino. Quibus fungi obfunt, dari

debet raphani crudi quamplurimi: itē vinū me-  
racū, & cineris fermentarij lixinium prætereā ni-  
trum aceto dilutum, aut fæx vini cōbuita, tritūq;  
cum aqua: aut abstinuini ex aceto, aut denique  
ruta ex aceto trita exhibetur. Si iuxta fuerit inge-  
sta, succurrit abstinuini potum cum vino, caito-  
reo, & ruta. Proderit & oxymeli potare, & vomit-  
iones dēre. Buprestis assumpto, passī plurimi  
porus, ac dein vomitus opitulatur: necnō lac ca-  
lidum bibitum, & costiq; siccum in potu da-  
tum. Si cantharides haustæ sint, conducit pas-  
sum ex oleo bibere, plurimūq; etiā lactis hau-  
rire, & plarēs nū deos pini esse: aut citharidum  
alas, pedesq; cum melle detritos linctu assu-  
mere. Philothro hausto, prodest caleris olei portio,  
& vomitus excitata: necnō lac caprillū, & maluz  
costæ succus, si cum oleo hauriatur. Spuma ar-  
genti pota, auxiliatur, piper, apiū, myrrhā, cum  
vino læuigata, bibitūq; Cypso ingesto, dari de-  
bet potui, cineris fermentarij lixiuū, & thymus  
ex aqua tritus. Lactē in grumos coactū, iuuat  
aceti portio. Item coagulatum ex aqua fontana bi-  
bitum. Vel sulfuris, sulphurq; æqualis portio, læu-  
gata ex postea, bibitūq; Hirudinē deuorati, iux-  
ta; aliq; nius, alij aceti potu expellere tentit.

Asclepiades spongiā tenerā frigida imbu-  
tam faucibus dēmittere iubet, vrirudū spōgiz  
infusa extrahat. Qui cerussam hauerint, his con-  
fecti olei calidi potus, vomitusq;: necnon lactis  
asinini haustus. Cum autē ignoraī species dele-  
teriorū quæ aut comesta, aut bibita sunt, aquam  
astatim calidā cum oleo propinare conuenit, ad  
vomitusq; incitare. Vnde etiam fuerit, & circun-  
cidere somnum, subscrispiti cōfectionibus vti.

**Apollonis pharmacum præferua-  
tium Veneni.**

Rutæ folia xx. nuces iuglides ij. lalis grumus  
vnius, carlez dux. Offeritur simul ieiunio stoma-  
cho: noxæ quippe ad letalibus prohibet. Aliud.  
Baccharū iuniperi drach. ij. lemnij sigillū drach. ij.  
& obol. ij. trita exceptaq; oleo reposito. Porrigi-  
tur ex hydromelē instat auriang nucis. Hæc an-  
tidoto Nicomedes rex utebatur, si quando eorū  
qui inuitalent ipsum, habebat fidem insipitū.

**Antidotus Mithridatis, Athanasia dicta, ad le-  
talia medicamētū,** & cuiuslibet virulentī ic-  
tum. Auxiliatur etiā ventriculo, in quo cibū ace-  
scit: necnon sanguinē spuentis, diuturna rufi  
infestus, ac breuiter iccoratis & lienosis, vesti-  
celis & vteri affectibus. Piperis albi grana xl.  
costi, mead, asari, Indici, dauci Cretici seminis, pe-  
troselini, nardi Indici, lapidis Nestoris, pe-  
trocelini, croci, myrrhæ, sing. drach. viij. cinnā-  
momi, casie, sing. drach. xij. mellis Atrici costi  
quod sit satis. Darur nucis auellanz magnitudi-  
ne, ex mulsio temperato.

**Antidotus Zopyria vocata, ad prædicta o-  
mnia, ad alioq; affectus efficacissimū.**

Opobalsami drach. iij. nardi Indici, myrrhæ  
Troglodytes, iunici rotundi stocis, cinnamomi,  
characij, costi recentis, piperis longi, hypocisti-  
dis, polij, piperis Perzani, scordij, mead Cretici,  
cardamomi, sing. drach. iij. thuris masculi, car-  
pobalsami, dictamnī, sing. drach. vj. petroselini,  
casie rubentis, singul. drach. viij. croci Corycij  
HH ij

*Antidotus ex  
sanguinibus a  
Damocrate scri-  
pta.*

*Refacerit pa-  
stillerum anse-  
the ex Damo-  
crate.*

*Crocemagmaris  
preparatio.*

*Antidotus quo  
Prasagiensis no-  
minatur.*

*Remedia ab  
Asclepiade scri-  
pta ad eos qui  
letalia bibe-  
runt.*

*Antidotus A-  
pollonis a vena-  
no præparatum.*

*Athanasia Mi-  
thridatis.*

*Antidotus  
Zopyria.*

drach. viij. mellis Artici quod sit satia. Datur nucis auellanz instar, si febris absit, ex vino. febrilibus, ex hydromelite.

Mithridatis Theriace, quæ rex Mithridates utebatur perpetuò; vt se à letali veneno assereret. Cùm itaq; à Romanis captus esset, nec his epoto veneno mori posset, gladio sub ipsi mortē inruit. Confectio ipsius secundū Andromachum habet in hunc modum. Pastillorū scilicet drach. xlvij. pastillorū theriacorū, piperis nigri, hedychoi magmatia, lachrymæ papaueris nigri, sing. drach. xxiij. rosarum siccarum, iuncti rotundi odorati florib; polij, scordij, seminis napi, iris Illyricæ, agarici, cinnamomi, dulcis radicis succi, opobalsami, sing. drach. xij. roris marini drac. viij. myrrhæ, croci, zingiberis, rhei pontici, quinquæfolij radicis, nepitæ montanæ, marrubij, petroselinij, stachados, costi, piperis albi, thuris, sing. drach. j. obol. ij. casij nigri drac. iij. piperis nigri drach. j. longi tantundem: meui, asari, acori, dauci seminis, anserini sanguinis siccij, anaris sanguinis, sing. drach. iij. Excipiatur mel le Attico, & cocto.

Theriaca Aelij admodum efficax.

Bryoniz radicis drac. xvj. trifolij seminis, opopanax, sing. drac. viij. aristolochiz tenuis drac. xij. roris marini radicis, iris Illyricæ, zingiberis, opij, sing. drach. viij. rutæ syluestris seminis drac. xij. cumini Aethiopici drac. xvj. myrrhæ, casij, cæstoræ, fefelis, eryngij radicis, serpylli, lachrymæ Cyrenaicæ, sing. drach. vj. Medicæ drach. xij. fagapeni drach. vj. croci drach. v. erui farinæ drac. xxiij. Finguntur pastilli ex aqua triobolares, danturq; cum vino.

Theriaca Euclydis, ad internos dolores, aspidum morsus, pleuritidēq; & quartanā febrem, si post vomitum, instar auellanz nucis sumatur. Castorei drach. vj. opopanax, fagapeni, fefelis, cacherios, clameædryos, clameæpyros, marrubij, sing. drach. xvj. styracis, bituminis Iudaici, myrrhæ, singul. drach. vj. lachrymæ papaueris drach. viij. mellis lib. j. Confectio.

Alia ad febres omnes repetentes per circuitus, Harpalo autore.

Myrrhæ drach. iij. piperis longi vel albi, opij, sing. drach. ij. castorei obol. ij. s. cardamomi drac. iij. fagapeni drach. ij. Trita cum aqua in pastillos cogitur, qui obolos duos pendeant. Propinentur singuli cum cyathis duobus Adriani vini, & aquæ fontanæ coctæ, quater die. Si febris vrgeat, cum hydromelite.

Potio Cranippi ad morsus rabidi canis.

Cancrorum vitiorum drac. xx. myrrhæ drac. ij. croci drach. j. gentianæ drach. j. piperis albi grana x. vini quod ad excipiendū sit satia. Datur drachma vna, cū vini cyathis tribus tēperati.

Album emplastrum Baphulli, quod rabidorum morsibus cōmodissime extrinsecus admouetur: daturq; etiam catapotij ex eo nucis auellanz instar, ad dies xl. Est autem alternis diebus amouendū à vulnere, ac rursus, vbi elueris sordes, imponendū. Certe ponticæ lib. ij. spumæ argenti, cerussæ, sing. lib. olei veteris sextariū: myrrhæ, medullæ ceruinæ, vtriusq; drach. ij. thuris drachma. Argenti spuma oleo coquitur, & cūm

mutata fuerit, cerussa inspergitur, ac cetera miscetur. Vbi tam ipsissimum euaserit, vt manus non inficiat, ab igne sublato, medullam, myrrham, & thus iniicit.

Diophrasii medicamentū ad scorpionum ictus, & phalangiorum morsus.

Aristolochiz drach. iij. piperis drach. ij. opij drach. i. pyreturi drach. iij. Finguntur pastilli fabbz Aegyptiæ magnitudine, danturq; duo deglutienti, & vini meraci cyathi duo.

Aliud ad periculosos scorpionum & phalangiorum ictus.

Rutæ syluestris seminis, erucæ seminis, pyreturi, styracis, sulfuris vini, sing. drach. vi. castorei drach. ij. Excipito testudinis sanguine, ac ternos obolos ex meraco vino calabero.

Aliud ad eadem optimum, conserens etiam parturitibus ægræ.

Myrrhæ, castorei, styracis, singule drachma. Opj drach. ij. chalbani drach. iij. Apj seminis acerbulli. Anisi ritudē. Piperis grana xxx. Fingitur ex vino, daturq; drach. vna, ex vini hemina.

Epithema ad psalangiōrū ictus, & omnis serpentis: quod etiā in potu auxiliatur. Sulfuris viul, chalbani, vtriusq; denarij in Liqueoris Libij, nucū auellanarū purgatarū sing. drac. ij. vino dissoluta, & melle excepta imponitur.

Ad viperarum morsus optimum pharmacū ab Apollodoro compositū. Cumini syluestris seminis acerbulli, testudinis matris sanguinis drac. iij. coaguli hinnuli, vel leporini, drach. iij. hardini sanguinis drach. iij. Omnia mista, vinoq; optimo excepta, reponito: atq; oliuæ magnitudinē, ex vini optimi cyatho dimidio, dum vltus postulat, pergitur.

Heræ antidotus, quæ Marcus Cathegetes est vltus. Trifolij bituminosi seminis, aristolochiz rotundæ, rutæ syluestris, erui insolati, sing. drach. vi. Vino excipiuntur, hantq; pastilli drach. iij. daturq; vnus ex vino & oleo.

Alia ad letalia, ictericosos, inflationes ventris, & incipientes aqz subter cutē suffusiones efficacissima. Myrrhæ drach. v. nardi Syriacæ drach. v. s. iuncti rotundi florib; drach. ij. a casis drac. iij. cinnamomi drac. iij. piperis albi sesquidrach. thuris drachma & obolus: costi drachma. Excipiuntur Atticō melle, fingunturq; nucis auellanz instar, ac dantur ex mullo vel aqua.

## FINIS.

Complura alia ad eosdem affectus, ex diuersis autoribus congruè Galeni remedia. Nos verò ex omnibus ea in tuam gratiam, Cādis Lectori, elegimus, quæ præstantissima videbantur, & facilius parari possunt. Habes itaq; omnes commentarios Galeni, in compendij emendationē, redactos, excepto fortē vno vel altero, ex quibus nihil succi exprimi potuit. Nā quod pertinet ad commentaria in Hippocratem, quicquid in eis cōspicitur cremoris (nisi sit alia decreta consiliū nostrum hoc intercepti) hoc est, vniuersas sententias, instar indicis atq; alphabeti digressi, breui in lucem edemus. Tuum igitur est, illis bene precari, qui in hoc sunt toti, vt tuis commodis scrulati, recteq; tuis studiis consulant.

Mithridatis regis theriace, quæ premixta veneno ceteris non posset, sed gladio peremisset.

Theriaca Aelij.

Theriaca Euclydis.

Morsus rabidi canis potio Cranippi.

Candidum album emplastrum Baphulli.

Diophrasii antidotum ad scorpionum & phalangiorum ictus.

Parturitibus ægræ, melle commixtum.

Viperarum morsus optimum pharmacum.

Apollodori pharmacum.

AD ORNATISSIMUM VIRVM, D. D. GASPAREM DE LA-  
MOZ, CANONICVM SECOBIENSEM, SCRIPTOREM APOSTOLICVM,  
ac bonarum literarum cultorem maximum, ANDREAS LACVNAE Secobiensis, Militi  
S. Petri, de ponderibus & mensuris medicinalibus commentarius.



Etus proverbum, & quamvis simum est, mi Gaspar, Vir ornatissime, optima esse, mensura in rebus omnibus: cum nimirum omnia quae in Vita & sunt & geruntur, ab ea sua absolutectionem, suam lucē, suumq; ornamentū sortiantur: nihilq; iustum, rectū, aut inculpabile sit, quod mensurae quae sola virtus inest omnib; rebus destituatur. Quamobrē si exquisitē expendamus singula, quae celestis illa machina ambiuntur, quaeq; supra caelos consistunt, omnia certē inueniemus exactā quandam mensurā, cōmoderationemq; a suo conditore accepisse, quam perpetuō tuerentur, dum naturae leges non transgrediuntur. Quippe uniformes illae orbium celestium lationes, perennes astrorum cursus, ordinatae vicissitudines tēporū, conspirationes elementorū, generationes deniq; omnium quae supra terram & subter illā sunt, non aliunde quā a Symmetria quadā, quae in accurata partium mensura consistit, proficiuntur. Iam Verō, quod sanitas quidē corporum, aliud sit nihil, quā debita & absoluta mensura eorum ex quibus conflatur: morbus autē, ab hac Symmetria recessus quidā & lapsus, quis ambiat? Nemini etiā est dubium, decreta & leges Reip. mensuras quādam existere, quae singulis suum ius dispensant. Vi autem ipsius mensurae summam efficaciam & vim, exemplo familiarissimo exponam, poemata optimis documentis & sententiis excultasi metro claudicent, hoc est, mensura non consent, confestim stomachum movent, nauseamq; & fastidium gignunt. Contra Verō, quae Symmetria existunt, etiā si pudicitia offendant, moresq; iuuentutis corrumpāt, magnificē ab omnibus celebrantur: tantum auctoritatis vendicare sibi videtur emmetron. Caterum cum in aliis omnibus humanis actionibus, si rectē perfici debeant, mensura quadā exquisita desideretur, tum Vel maximē in arte Medica ea ipsa requiritur: ut in qua, Vel minima a pondere ac mensura aberratio soleat semper aegri perniciosa & piaculari existere. Nam cum generatio nostra, incolumitasq; miscellae quatuor elementorū debeatur, certa quadā mensura confluentium & conspirantium in una candēq; temperie sanē si quā do rhythmus huius solatur, necessum est ad recuperandum habitum pristinum, reducamur eo, iusta etiā, exploratissimāq; mensura eius, quod lapsum corrigere possit, administrata. Quae neglecta, si quispiam admoluitur praesidia corpori, morbi seminarium auerbit, aut affectum alium maligniorem inducet: ita ut non minus cauendum a tali medico sit, quā a morbo ipso. Cum igitur inter alia Galeni opera, redeissem nuper in succinctam periochen cōmentarios illos de cōpositione medicamentorum rectā & rectā tōtē, distissimos naturae humanae thesauros, persuasumq; habere, nētiq; ex eorum lectione percepturos aliquid frugis, qui in ratione ponderū & mensurarū nō essent admodum exercitati: sed potius occasione capturos, quae sub iis nominibus notam, aegri conciliarent summam intermicionem: precium opere me facturū existimari, si quae Veteribus, ac praecipue Galeno, circa pondera & mensuras medicinales conscripta sunt, aegerans, ea omnia paucis exposita, sub praesatione nominis tui, in publicam studiosorū cōmoditatem ederem: ut Vel ex hoc argumento, amicitia nostra, & nunquam peritura necessitudo, omnibus innotesceret: tibi autem si qui hinc fractus ab aliquo hauriendus esset, prorsus acceptus ferretur. Nec Verō colleclanea haec de mensuris cuiquā aptius quā tibi nuncupari potuissent, qui ut ceteras ingenuissimae tui animi dotes impraeclarā subtriceam) diu uolūq; astronomici studii indulgens, in eisq; felices tuas horulas haud osciter collocans, non modō plagas has inferiores, sed caelos etiā ipsos metiri, mentēq; supra illos euertere: cōtrā quā faciunt plerūq; alij, qui tibi semel quae pertinent ad cutem curandā sunt nacti, adeo ingenuarū artium, bonorūq; omnium institutorū infelices obliuiscuntur, ut ne inesse quidem sibi animū recordentur: ac proinde obruti, demersiq; cano suarū cupiditatū, corporisq; mole depressi, eam quocūq; tandem irruat, sequantur: tantum abest ut exemplo tui) caelum inquam suspēctent, aut in mediatione rerū pulcherrimarū afininas suas cogitationes exerceant. Hi tamen mancipia Umbilici sunt: a quorum ingenio tam abes ipse, quā qui longissime. Quippe ita Vteris fortuna bonis, quae tuo Marte acquisita, tibi quā largissime suppetunt, ut eorū quidē quae ex Vtu sunt, nihil desit corporisculo, amicisq; omnia communia fiant: animus autē ipse minimē ab eis praepediatur, sed ad aliora aspirans, excolatur atq; locupletur aliis ornamentis & opibus, quae tanto illis splendiores & augustiores sunt, quantō mens nostra corpori dignitate antecellit. Quo sanē tam admirabili amore sapientiae



tribus obolia superat. Ab hac vncia Veneta (quæ experiundi grata, nuper in officina quodam libraui) propemodum sesquidrachma relinquit. Si quid Veneta libra medicinalis, Romanæ libræ vncias x. cum dimidia, plus minus, pendet. Pro ratione Itaq; harû differentiarû possem ipse iam in singulis horû locorû, num et drachmarû intrepide & augere, & detrachere: id quod mihi nõ perinde liceret absq; summæ ægrotantiû dade, si proportionem ponderum quam habent inter se mutuo, accuratè prius nõ explorassem. Quam cum haberem perspectam, cuidam adolescenti, quem in ædibus illustrissimæ D.D. Ioannis à Mendoza, Cæsarei apud Venetos, Oratoris splendidiss. suscepì curandum, vnciam vnam soluentis pharmaci exhibuiculus in vrbe Roma propina te drach. vii. aulus non fuisse.

De notis ponderum quibus Medici in officinis vtuntur.

Vt autem Græcorû charactères, quibus pondera expriment, impræfensarû præteream, cum nihil ad nos pertinêres: Medici recentiores pro vncia, hanc notam  $\text{℥}$  vsurpant: quemadmodum hanc,  $\text{℥}$  pro drachma: similiterq; illam  $\text{℥}$  pro scriptulo: subdentes postea numerû quem expedit arbitrantur. Vt si ori ventriculi confirmando huiusmodi vnguen instituerimus:  $\text{℥}$  olei absinthij, & cydoniorû, ana.  $\text{℥}$ . ij. nardini vnc. i. ceræ elotæ drach. v. pul. corallij, & menthæ, ana.  $\text{℥}$ . i. perinde sonant ac si scribamus: Olei absinthij & cydoniorû, sing. vnc. ij. Nardini vnciam dimidiam: ceræ elotæ drach. v. pulueris corallij & menthæ, singulorum scriptulum vnum, &c. Quippe vox, ana, quæ aliquando etiam in Gale ni cõmentariis occurrit, cuiusq; partes æquas significat. Præstaret autem medicamẽta ipsa, quæ in se humani generis vitam, necemq; gerunt, minimè quidem notis aut numeris, sed literis extensis exprimere. Quandoquidẽ nota vnum sub latem aut additum, imò verò etiam apiculus vnius, sive ægros ipsos in exitû anq; interuencionẽ adëgit. Porro vt floræ solẽ dispensari pugillis, sic manipulis herbæ. Cõmuniter autem volunt esse pugillû, quantum tribus digitis apprehendi possit: manipulum verò, quantû tota manu. Ac pugillum quidem hac nota, P. manipulû autem hac, M. nostri Medici expriment.

Græcæ liquidorum mensuræ (quæ maximè sunt in vsu etiam apud Latinos Medicos) partim ex Galeno, partim ex cõmentariis Iacobi Syluij, Medici hac nostra ætate clarissimi, excerptæ.

Cadus, sive Ceraunium, capit choas, hoc est, Romanos cõgios xq. vel libras mēsurales cyas.

Choa sive Cõgia, sextariû sex capit, seu Atticas corylas xij. seu libras ix.

Sextarius corylas ij. seu libram vnam & dimidiam, seu cyathos xij. continet.

Coryla, quàm nonnulli heminam appellant, quartarios ij. seu vncias mēsurales ix.

Semicoryla recipit acetabula duo, vel vncias iij. cum dimidia, existens quarta sextarij para.

Acetabulû (Græci *απολας* vocant) sesquicyathum, seu vncias ij. & drach. ij. pendet.

Cyathus conchus ij. seu myitra iij. seu chemas v. seu cochlearia x. seu secunciam.

Concha mytra ij. seu chemas ij. cum dimidia, seu drachmas sex.

Mystrû chemen vnam, & quartam eius partem, seu cochlearia ij. cum dimidio, seu drach. iij.

Cheme cochlearia ij. seu drach. ij. script. j. & grana iij. & quatuor quintas grani.

Cochlearium drach. j. scriptulum dimidium, grana ij. & duas quintas grani.

Porro vinum nona parte pondus olei excedit. Mellis autem ad vinum proportio est sesquipla: hoc est, tertia parte mel ipso vino est grauius, vt liquet ex tabella subdita.

Cerauniû talcû habet	OLIV. lib. xc.	VINI lib. c.	MELLIS lib. cl.
Congius	lib. vii. & semissem	lib. viij. vnc. iij.	lib. xij. & semissem.
Sextarius	vnc. xv.	vnc. xvi. drach. v. script. i.	lib. ij. vnc. ciam vna.
Coryla	vnc. vii. drach. iij.	vnc. viij. drach. ij. script. ij.	lib. j. drach. iij.
Oxybaphû	secuncia drach. iij.	vnc. ij. script. ij.	vnc. iij. drach. j.
Cyathus	drach. x.	vnciam j. drach. iij. script. ij.	vnc. ij. script. ij.

Mensuræ aridorum quibus Medici maximè vtuntur.

Medimnus capit chœnicas xlvij.

Chœnix corylas iij. vel sesquixtrarium, seu li bras ij. & quadrantem vnum, & vnc. iij.

Sextarius corylas ij. seu vnc. xij.

Coryle oxybapha iij. seu vnc. ix.

Oxybaphum, sesquicyathum, seu vnc. ij. & drach. ij.

Cyathus cochlearia x. seu secunciam.

Cochleariû drach. i. script. s. grana ij. & duas quintas grani.

Crebrò autem vsurpat Galenus hanc vocem Besslem, quæ quoniscunque occurrerit, pro vncio octo accipiat.

Hæc sunt itaq; Vir Ornatisime, quæ sub tuo nomne volui ut omnibus fierent communis studio: si qua re pro tua feceris dignitate. Sæc cõtra viriligatorum morsu defendens. Vale feliciter, plurimumq; saluta meo nomine commanes viriq; nostram amicos, atque intergerimos viros, D. Berrocalem, Scriptorum Apostolicum: necnon D. Falconem à Guenard, iuris prædentie licentiatum absolutissimum.

Venetis, III. Idus Aprilis, M. D. XLVIII.

HH v.

## CLARISSIMO ET SAPIENTISSIMO VIRO, D. D.

IOANNI AQUILARIO, MEDICO PONTIFICIO, BONARVM  
literarum fautori maximo, ANDREAS LACYNIA Secobiensis,  
Doctor Medicus, Miles S. Petri  
S. P. D.



Vod accidere vniuersis parturientibus solet, vt dum in labore quidem versantur, se  
iurent amplius non parituras: postea vero extra discrimen posite, rursus & con-  
cipiant, & pariant: id nunc mihi plane contigisse videtur, Vir clariss. Nam cum haud  
ita pridem Epitomen omnium Galeni operum, verè laboriosissimum partum, ex-  
arandam in publicam studiosorum commoditatem curare: ac partim quidem im-  
mensis laboribus fractus, partim praeli difficultates ac molestias summas pertasus, consituissem, ac  
propemodum apud me deierassem, non futuram mihi amplius rem cum typographis: posteaquam  
factus iam editus est in lucem, volare iusiurandum compellor, Galenique Pergameni vitam toti Ope-  
ri, cum colophonem quendam, apponere. Renocavit siquidem me ad iusiurandum, cum illius Viri di-  
gnitas, amplitudoque, tum mea in eum obseruantia, adeoque ipsius utilitas operis. Sciebam quippe Ga-  
lenum, ius qui vitam illius, mores, atque instituta praelegerent, incredibilem quendam amorem sui ex-  
citaturum, vt multo ardentius, maioriq. cum voluptate, in Epitome sese nostra exercerent. Quocir-  
ca illum quidem ad vitam formam exprimere, expressimq. vna cum operibus suis edere, statui.  
Ceterum quia verendum erat, ne Galenus noster, hospes & peregrinus cum suis, si in quempiam ne-  
bulonem incideret, contumelia aliqua afficeretur, (sunt enim exteri maxime iniuriis obnoxij) haud  
perperam me facturum exilimaui, si ductorem illi & protectorem aliquem iungerem, qui eum co-  
tra insultus Arabum, ac Barbarorum insidias, tueretur. Cui muneri subeundo, dum quoque uersus  
dispicerem, neminem te aptiorem inueni, Vir ornatissime, qui adeo illius semper fuisti studiosus, vt  
vel me ipsum etiam impuleris, ad condendam illam omnium operum eius perorchem: quam provin-  
ciam, nisi victus instigatione tua (id quod ingenuè fateor) nequaquam suscepissem. Nam cum de nul-  
la re sis aequè sollicitus, ac de salute publica (qua tua summa bonitas, atque animi integritas est) semper  
aliquid meditaris, quod in communem omnium vsum reducat. Quo nomine vniuersi tibi debemus  
plurimum. Taceo singulares tuas istas animi dotes, prudentiam, temperantiam, lenitatem morum,  
constantiam, multumq. omnium disciplinarum peritiam, qua nos adducit, vt non minori ad-  
miracione, quam amore, te prosequamur. Merito igitur ob hasce tam insignes virtutes, quibus con-  
spicuas eras, reuerendiss. & illustriss. in Christo Pater D. D. Ioannes à Toletò, Cardinalis Burgen-  
sis (iudicio cuius exquisitissimo non solent placere nisi optima) ex Salmanticensi Academia, in qua  
olim cum maxima laude & gloria profectus artem Medicam, simul & Astronomiam, te alle-  
ctum, nec vulgari conditione honestatum, vna secum abduxit Romam. Qua in Vrbe, quanta cum  
dexteritate, studio & pietate, artem Medicam exerceret, abundè exploratum habens Paulus III.  
P. M. Vltro accessit te, ascriptisq. inter primarios Medicos suos, summisq. tandem vitæ ornamē-  
ti auxit, atque locupletauit. Qui quidem non secus tua dicta amplexatur, ac quiescit, consilium tuum, ac  
si illa ab Apolline acceperit. Vt igitur eò inde digressa est, nostra reuocetur oratio, En mittimus ti-  
bi cum strenulam quandam, Galeni Pergameni vitam, per quem ipse tantum honoris & dignitatis  
es consequutus. Quam quidem vbi diligenter perleperis, non modo non penitebit te propensionis,  
qua in illum hæcenus indulgentissimus fuisti, sed etiam multo ardentius posthac amore illum  
inflamaberis. Vale Vir ornatiss. peregrin. vt cepisti, de ingenij tui artibus  
ac disciplinis mereri optime. Venetus, quarto nonas Aprilis,

M. D. XLVIII.

GALENI PERGAMENI VITA, CVM EX  
IPSO GALENO, TVM EX HIERONYMO GEMVSÆO,  
aliisque variis autoribus, per ANDREAM LACVNAM  
Medicum, militem S. Petri, summo studio collecta.



ON possum non excedere in viros quosdam novarum opinionum autores, qui Galenum, Pergamenum fuisse inficiantur. Cuius rei non modò apud varios histori-  
cos, sed etiam apud ipsum Galenum, innumera testimonia extant. Nam vi coplura  
alia omittam, certè libro primo de Compositione medicamentorum secundum gene-  
ra, apertissimè patriam suà Pergamum esse testatur, hunc in modum pronuncians. Hoc  
medicamentum nò ex eorum numero est, quæ à me primò còposita sunt: sed iam annis multo antè, à re-  
ge nostro, Pergamenisibus imperante, Attalo, viro omnigenorum medicaminum studioso, etc. Simili-  
ter libro secundo de Pharmacorù còpositione secundum partes, sic ait: Nam & frigidiorum fontium et  
minis, multa Romæ est vberitas, quemadmodum apud nos in Pergamo. Eodém libro sic rursus subdit:  
Atq; ad hanc rem nostrum Pergamenum atramentum scriptorium præcellit, etc. Fuit autè Pergamus  
Asiæ ciuitas nobilissima, ingeniorumq; optimorum alitrix: quæ diu quidem sub regib; Attalica fami-  
liæ florescens, postea Romanorum legib; paruit. Quare Galenus meritiò ab illa oriundus gloriatur, cò-  
trà quàm faciunt Normani, qui declinaturi in nomina notà, passim nomen patrie còmutant. Porro  
patrem habuit diuitem, Niconem nomine, geometram & architetum insignem, studiisq; philoso-  
phicis deditum: qui ob modestiam suam & equitatè, probis omnibus erat semper admirationi. Ma-  
ter eius fuit pudicissima, admodumq; circa augendam rem familiarem sollicita: adeò tamen iracun-  
da & impetiva, vi vel ex leui occasione, mordicus ancillas impeteret: nec minus còumeliosè cù Ni-  
cone viro suo contenderet, quàm X antippe, nequissima quidem illa, cum Socrate: quemadmodum  
ipsemet Galenus testatur libro de Cognoscendis curandisq; animi affectibus. Fuit autem Galenus  
vsq; ad annu decimum quintu, arithmeticus, gràmaticus, logicusq; discipulus sub Nicone patre institu-  
tus: at quas quidem capeffendus, adeò erat natura promptus, vi vel ex primis illis auspicijs, de se ma-  
ximam exhiberet expectationem. Dein verò ad philosophiam, severioraq; promotus mathematica,  
audire philosophos optimos quosq; cepit, qui haberentur Pergami: quorum omnium doctrinam &  
mores, vi rectè consuleretur filio, explorabat pater, assidue ad illos vna cum eo veniens. At verò  
ubi iam annu decimum septimu attingit, evidenti patris infomio admonitus, studij Medicinæ se de-  
didit, eiq; adeò strenuam nauauit operam, vi pauculis quidè annis, facillè còsultationes omnes, postea  
verò etiam præceptoris suos superauit. Quem feruorem augebat summa liberalitas patris, largè illi  
omnia suppetitans, quæ ad studia eius videbantur ex vsu fore. Sæpe siquidem ob inopiam & egesta-  
tem optima quæq; ingenia elanguescunt, & collabuntur. Nam, vi rectè ille monuit Poeta,

Haud facillè emergunt, quorum virtutibus obstat

Res angusta domus, etc.

Præceptores habuit in philosophicis & medicis musis, primò quidem, Satyrum: dein Pelopem, apud  
Smyrnam. Post quos Numeisio Corinthi sedulam operam dedit. Ceterum quamuis eorum omniu  
amantissimus esset, eosq; ceu parentes quosdam summa reuerentia obseruaret, noluit tamen eorum  
cuiquam addicior esse, quàm veritati ipsius studiosior. Quocirca nec scilicet illi se addixit: & ob id  
sæpe hominù rusticorum iudicium in plurimum esse sequendum monuit, quòd incorruptum esset, ac li-  
berum, vi pote ab heresi nulla occupatum. Postquam verò in Græcia neminem iam haberet, ex quo  
discere quicquid posset: maximèq; expedire Medico exstularet, varias orbis oras ac regiones lustra-  
re, omnimodisq; hominum temperaturas, ac vires medicamentorù cognoscere, incredibilis tandem  
incessu illum peregrinandi cupiditas. Quare primò quidem ad Alexandriam se contulit. Quam vr-  
be cum aliquandiu hæsisset, totumq; Aegyptum illi adiacentem lustrasset, ad Palestinâ Syriæ, expor-  
tandi opobalsami gratia, contendit. Navigauit etiam in Lemnù insulam, necnon in Cyprum, vi ex  
illa quidem, sphaeriadem terram: ex hac autem, cadmiâ, pompholygem, diphyrgem, aliâq; metalli-  
ca innumera, in vsum Pergamensium aduheret. A quibus peragrationibus iam annos octio & vi-  
ginti natus, in patriam rediens, omnia medicamèta quæ attulerat, amicis est impertitus, vi de illis pe-  
riculum facerent. Postea verò ex omni natione curabat sibi asportari pharmaca exquisitissima, ha-  
bens suspecta ea omnia, quæ ab insuloribus venderentur. Cognita igitur summa peritia illius,

atque in curandis ægris rara quadam dexteritate, pontifex Pergamæus provinciam gladiatores curandi soli ipsi credidit, quum vix annum vigesimum nonum attingeret: quod senè munus antea in tantum delegabatur, qui ætate, ac longo rerum usu prouecti essent. Ceterum non diu illic commoratus, quod sedatio quædam esset inter Pergamenses oborta, Romam profectus est: ubi ob incomparabilem doctrinam suam et probitatem fuit statim notus et familiaris totius civitatis triplici, ob pessum administratam theriacem ab aliis Medicis, iamque iuvenescens ætate, ac media hyeme, restituit, tempestivo usu eiusdem antidoti adhibito: prædixitque omnia quæ euentura essent: id quod nomen illius, ex estimationeque, per totam urbem plurimum auxit, sic tamen ut invidus pari etiã gradu cresceret. Postea ad Iusti uxorem vocatus, quæ absque manifesta occasione consumebatur, ex pulsu eam non modò amare, sed quem deperiret etiam, miro quodam artificio deprehendit. Simili etiam industria diuitis cuiusdam servum, non ex morbo, sed metu, quòdeorum quæ administrare rat, pro dignitate reddere rationem non poterat, contabescere agnovit. Restituit etiam Boethii uxorem, diutino fluore muliebri, et quem alij Medici non potuerant colibere, laborantem. Ob quam quidem sollicitudinem, aureos quadringentos, æquipollentes mille coronati solaribus, Boethius ad illum misit, ipsi quoque, per totam urbem summis laudibus extulit.

At vero annum iam tricesimumseptimum agens, ubi audiuit patriæ seditionem sedatam, partim quidem ut suos necessarios inuideret, partim ut Romanorum Medicorum declinaret odia et insidias, simulans se proficisci in Campaniam (ne forè ab amicis detineretur) reuersus Pergamum est. Sed non multò interiecto tempore, à Marco Aurelio et Lucio, Romanis Imperatoribus, reuocatus, eo nomine ut sequeretur expeditionem, quam instituerant aduersus Germanos, Romam inuitus rediit. Quò dum peruenit, multum tandem precibus impetrauit à Marco Aurelio Antonino (qui equus, pius, facili, et clementissimus erat) ut liceret sibi manere Roma, expectareque, illic reditum ipsius Antonini à bello: intelligens nimirum quòtopere abhorrerent Muses ab strepitu armorum. Memor autem prauitatis Medicorum atque philosophorum Rome deperitum, quando dixit Marcus Aurelius absuit, apud Commodum, filium illius primogenitum, sese continuit, qui extra urbem educabatur sub Pitholao: cui etiam fuerat ab Imperatore iniunctum, ut si quando puer ægrotaret, Galenum accerseret, quò illi ferret manus auxiliatrices. Eo igitur tempore plurimùm ocij nactus, varios commentarios conscripsit, ad philosophiam Medicinamque spectantes. Quum autem interim febre corripereetur Commodus, ex pulsu agnovit faucium inflammationem causam alius extitisse: ac prouide congruius remediis usus, à phlegmone et febre confestim eum liberauit. Qua ex re Faustina matrimonio Imperatori coniuncta, cepit Galenum ipsum laudibus usque ad sidera euehere, aliisque omnibus antepone: quæ tamen commendatio, apud præcipuos Medicos illum magis exorsum reddidit. Sexto etiam, alteri ipsius Imperatoris filio, quum similiter in febriculam incidisset, prædixit crism, ac tum horam, tum solutionis modum, tum recidivam.

Postea autem, quum reuersus ex bello Marcus Aurelius, crederet se aliquando febre, nec minus Medici qui peregrinationis suæ comites fuerant, initium febrilis accessionis illi adesse putarent: ascitus Galenus, iussu, arteriam contingere, dixisse nihil tale percipere, sed potius à cibo assumpto eius Ventriculum opprimi. Quam agnitionem quanti fecerit Imperator, significauit ter repetens, Ita est ut dicis, Profectò id ipsum, ut dixisti res habet. Ventriculum igitur fouens nardina, bibensque Sabinum Vinum cum pipere, quemadmodum Galenus suaserat, minimo negotio fuit restitutus, Galenique postea magnopere commendare non desistebat, eum Medicum præstantissimum esse, ac tum virum ingenuum, tum summum philosophum prædicans. Nec vero argumentum vulgare Galenianæ doctrinæ, atque morum integritatis est, quòd à Marco Imperatore, omnium qui illum præcesserant, iustissimo simul et sapientissimo, quique ob singularem sapientiam suam est nomen Philosophi indeptus, celebratus encomiis fuerit, æstusque in suorum Medicorum clientelam. Taceo eundem ipsum Imperatorem, quum singulis diebus videretur theriace, quam summa fide preparabat illi Demetrius, primarius Medicus, postea Vita Demetrio functo, soli credidisse Galeno antidoti ipsius compositionem. Antonino è viuis sublato, successit ei filius Commodus, certè incommodus Romanorum reipub. Npore iuuenis omni polutus libidine, omniq. flagitiorum genere obsessus atque contaminatus. Quo quidem imperante cessauit

cessavit compositio atque usus theriacet, et aliorum omnium optimorum institutorum: donec postea Imperator Severus institit Galeno (quem diligebat vnicè) et antidotorum rursus ipsam in communem omnium usum conficeret. Quod autem ad Galeni salubritatem pertinet, usq; ad annos quidem vicesimum octauum sapius correptus est morbus: reliquum verò etatis, saluberrima vicièlus ratione usus sese conseruauit sanissimum, ita et nullum morbum contraxerit, præter febrem epheueram, in qua em aliquando ob labores immodicos incidit.

Fuit autem perpetuo iam inde à pueritia sua, moribus innocentiissimè præditus, adeoq; blandus et mitis, et nunquam propria manu famulos verberauit, ne lapsos quidem: sed tum minus, tum paterne admonitionibus, peccata semper eorum correxit: inascenti impetui nihil differre ab insania et furorè prædicans. In disputando tamen adeo grani atque seuerus exiit, et nunquam non suis antagonistis pudorem, sibi gloriam maximam conciliari. Prætereo admirandam illam docendi facilitatem, puritatem atque elegantiam sermonis, sententiarum pondus et altitudinem, creberrimum historiarum atque exemplorum copiam, summum denique diuidendi, demonstrandi, artificium: quibus nimirum omnibus adeo accuratè Naturam rerum expressit, adeo illam oratione exornauit, et verus interpret eius solus ipse dici mereatur. Fuit porro adeo cõlens aique inconcussus animo, et ob nullam fuerit vniquam rerum vicissitudinem consternatus: sed fortunam et infortunium, honorem et contumeliàm, sanitatem et morbum, pari semper alacritate exceperit. Gloriam et popularem auram sic perpetuò neglexit, et ne libris quidem suis præscribi suum nomen sit passus. Quippe multitudinis laudem, commodum instrumentum nonnullis viciètibz aliquando esse dicebat: mortuus autem, nihil omnino prodesse: imò verò nec viuentium quibzdam: quum eis qui plurimum philosophiæ indulgerent, non paruo impedimento esset apud vulgus fama, ipsos videlicet à rebus pulcherrimis plus iusto transuersos auferens. Quocirca, cum diuino quodam afflatus numine, vulgarem illam gloriam contempsit, veritatizq; solo studio flagrauit, nullam esse nec honestiorem, nec diuiniorem possessionem existans. Tam studiosus autem fuit humane salutis, et quum vel maximè oparet insignem illam sapientiam atque doctrinam suam sacre vniuersitatis communem, veritus tamen fuerit exprimere, describereq; pharmaca delectria, ne qui forte pestis hunc scyophanta in perniciem nostram illis abuteretur. Quo etiam nomine varios modos aduiterandi medicamenta, sibi notos suppressit, ne videlicet ansam et occasionem circumueniendi nos impositurus, daret flagitiosis et fraudulentis hominibus: si qui id genus artem in lucro ponerent. Extant eius pietatis amorisq; argumenta complura, in deos, in parentes, in patriam, in artem ipsam, in vniuersum denique humanum genus. Dei quippe iustitiam, vim, et providentiam agnoscat, suspicit, maximèq; cum reuerentia admiratur, quum aliàs, tum præcipue in commentariis de usu particularum humani corporis, quos tanquam hymnos quosdam, Deo consecrauit: hoc esse sacrificium illi acceptissimum censens, non si ei hecatombas, veltumq; offerret quispiam cruciatu, aut casum et thura accenderet, sed si mysteria illius, operaque, primum quidem ipse cognosceret, expendereq; posset, verò aliis communicaret: in quorum ignoratione profitebatur summam impietatem consistere. Iam verò parentis sui cum in aliis plerisque locis mentionem honorificentissimam faciat, tum vel maxime in commentario de cognoscendis, curandisq; animi affectibus, illam commendat vnicè: quod sanè opus, veluti encomiasticum paternarum virtutum est. Patriam autem, concinèsq; suos, tanto est profectus amore, et quò eorum usui inferret, fauores Imperatorum, amplissimæque stipendia neglexerit: idq; merito. Nam quum maiori ex parte nemo sit patriæ acceptus (sic siquidem natura comparatum hominibus est, et peregrina quidem et aduentitia ingenia admirentur: sua verò, domesticæque, ob familiarem usum, desipiant) Galenum certe Pergamenses tam studiose colebant, et obseruabant, et ipsum et seruatorem suum, et Patrem patriæ, omnes communi ore vocarent: neque id iniuria. Si quidem non modò curabaz sedulo, et suo ruium cunius rectè valerent corpora, sed quemadmodum legislator atq; philosophus summus, enèrat sollicitus, et eorum animi optimi documentis instituerentur. Quocirca varios commentarios conscripsit, ad excolenda iuuentutis ingenia admodum salutare. Conciliauit autem sibi maxime plebis animos, quòd medicamentis simplicibus, vulgaribusque, et quæ minimo negotio parari apud quemuis possent, plurimum vtens, eorum quos suscipiebat curandos, minime facultates operimeret: contra quàm faciunt hac nostra etate plurimi pharmacorum aggeratores eximij, qui

re admirandam suam illam sapientiam ostentent, adeo miscere sacra profanis assolent, ut quoniam morbum facile depellere posset interdum radícula unica commode administrata, cum sepe numero varia indigesta, ac longè petita medicamentorum congerie, alant, foucant, adaugeant. Quod si eger fortè bona quadam fortuna sua, vel Dei potius, quam pharmaci, beneficio, aliquando ab effectu recuperetur, necessum haud dubiè est, si tenuioris fortuna is sit, in alium rursus morbum, priorilongè grauiorem, incidat: videlicet egestatem extremam: quum nimirum pro tot gemmis et margaritis, vel quod plerumque contingit scalcis ex fluento aliquo allatis, satisfacere pharmacopola videnti non possit: ac proinde si quid reliquum illi suppellectilis fuit, totum id exponatur sub hasta, cogaturque tandem miser, exosam habens vitam, medicinam, et medicos, in angustiam maximam rei familiaris adactus, una cum uxore et liberis, fame acerbissima contabescere: cui quidem praestitisset longè, si seruatus non fuisset. At Galenus noster, id genus aromatarum, institutoribusque, non indigebat: quippe qui propria manu singula medicamenta conficeret, confecta quae officiosissimè semper aegris administraret: in egenos interim non exiguum suarum facultatum portionem erogans artemque ipsam, non avaritia ductus, aut quapiam cupiditate, sed propter solam virtutem, pie simul et religiose exercens. Fuit autem erga aegros semper moribus placidissimis praeclusus, quibus adeo illos exhilarabat, ut vel solo sermone videretur eos restituere. Quae sane gratia et venustas maximè desideratur in Medicis. Sunt quippe nonnulli etiam in aula Principum, adeo tetrico aspectu fastidiosoque, ut ex quartana simplici duplicem suo accessu reddant, soloque visu, basiscorum instar, interimant. Nec verò cuiquam pharmacum admonuit aut propinauit Galenus, cuius prius in seipso non fecisset periculum. Quae omnia reddiderunt illum semper adeo inculpabilem, ut calumniam in ipsum moliri nihil unquam potuerit. Scripsit autem Attico sermone et purissimo permulta opera et varia, non ad artem Medicam tantum, sed etiam ad Philosophiam, grammaticam, rhetoricam, mathematicam, atque geometriam pertinentia: quorum non contemnenda pars, dum templum Pacis, simulque omnes Bibliotheca Palatii, olim conflagrarunt incendio (ò iacturam irreparabilem) nobis intercidere. Quae verò extant, atque inter eruatorum manus versantur, non secus suspiciuntur ab vniuersis, quibus mens falsis dogmatibus corrupta et deprauata non est, ac si planè diuina oracula sint, ex tripode pronuntiata. Nam qui in sophistarum scholis sunt alii, nugisque et paralogismis referri, is certe nec placet, nec prodesse vera Galeni doctrina potest. Siquidem quemadmodum corpora impura, quod magis quispiam solido alimento nutrierit eò magis laeserit: sic animum opinionibus prauis imbutum, nisi prius ab eis expurgetur, ne Musae quidem ipse rectè docere possint: id quod fuisse in causa videtur, ut Galenus semper in operibus suis, primò quidem exterminaret iniqua dogmata, postea verò ipsam virtutem tradiderit: optimi agricola exemplum, qui prius quàm terra sua semina mandet, spinas, herbas, sentes, radicesque omnes euellat, omniaque breuiter, quae possint tritici germinationem extinguere. Fuit autem tam acris et vehemens in refellendis aliorum tam Medicorum, quàm philosophorum erratibus, tantumque valuit suadela, ut eorum quos persequutus est, vniuersa scripta perierint. Hippocratem verò ita semper et reueretur et colit, ut passim eum et prudentissimum, et sapientissimum senem, summumque Medicinae parentem, autoremque et laetitorem bonorum omnium institutorum, praedicet. Ceterum quemadmodum Traianus olim omnes Italiae vias inaccessas, praeruptasque, aut rupibus iniuas, refecit, instaurauitque, quò facilius peruadi possent: sic etiam satetur se non quidem artem condere (quam laudem tamen iurè sibi vendicare potuisset) sed iam ab Hippocrate inuentam, incultam tamen et asperam, explanare, ut ab omnibus intelligi ac percipi queat. Vixit sub Marco Aurelio Antonino, Commodò, Lucio, et Severo, Caesaribus. Praecipuè tamen Marco Aurelio Antonino fuit summa familiaritatis coniunctus. Quo extincto, tamen si postea esset Severo Imperatori acceptissimus, detineri tamen diu apud urbem Romam non potuit, quo minus in dulcissimam sibi patriam reuerceretur. In qua quidem iam factus septuagenarius, imperantemque eodem Severo, requieuit, magnam apud homines gloriam consecutus: maiorem etiam apud Deum habiturus, si CHRISTUS institutus, cuius semel, atque iterum meminit, credere atque obsecundare voluisset.

Sunt tamen qui Galenum tradant vixisse annos CXL. Siquidem Ludovicus Celius, lectissimum antiquarum lib. xvi. sic ait: Galenum Philosophum et Medicum singularem, cuius scientissimae et plurimae extant ingenij monumenta, quae geminam sapientem eruditionem, memoriam proditum



à nonnullis est, CXL. vixisse annos, tantâq. in cibo & potu abstinemia usus, ut ad satietatem nunquam comederit, biberit ne, nec crudum quicquam gustarit. Unde sit scitum, ut odoriferum semper anhelatum spiraret; sed, quod longe apud me mirabilius est, citra ullam omnino affectionem, sola defecent senectute, quod est in humanis rarissimum.

Magis tamen testimonio Suidæ acquiescendum est, qui sic de Galeno pronunciat: Γαλῆνος ὁ ὀφθαλμιάτης ἰατρός παρὰ Ἀλεξάνδρῳ γέγονεν, ὅθεν Μάρκος ὁ Καμπόδης, ὁ Περτινὰξ, ὁ Τῆ Κασσαρίου καὶ Ρώμης, ὅς τε Νικάνω γυναικί, καὶ ἑξ ἑταίρου, πολλὰ σπουδὰς ἔχει ἰατρικῇ τε καὶ φιλοσοφίᾳ, ἵνα τι γράμματα καὶ καὶ φιλοσοφίᾳ, ἵνα τοῦ πᾶσι τοῦ γένους, κατὰ τὴν ἑκάστην ἡλικίαν, καὶ τὴν φύσιν, ἵνα ἡ σπουδὴ ἡ τοῦ σώματος. Quæ sonant: Galenus Medicus celeberrimus, Pergamæ natus, Marci, Commodi, & Pertinacis temporibus, vixit Romæ. Patrem habuit Niconem, geometram, architectumq. Plurima non in arte Medica tantum, sed in philosophia etiam, conduda: imò verò & in grammaticis, rhetoricisq. Quæ quidem quod omnibus obvis & notissima sint, non videtur mihi operæ precium ut recitentur impresentiarum. Vixit annos LXX. Porro hæc vox Galenus, tranquillum, serenūq. significat.

VITAE GALENI FINIS.



ANNOTATIONES IN GALENI INTER-  
PRETES: QUIBUS VARIIS LOCI, IN QUOS HACTENUS  
impegerunt lectores, & explicantur, & summa fide restituntur:

Andrea Lacuna Secobiensi, Doctore Medico, mili-  
te sancti Petri, auctore.

ILLVSTRISSIMO ET SAPIENTISSIMO VIRO, D. D. DI-  
daco, Furtado à Mendoza, apud Paulum 111. P. M. Oratori Cæsareo, longè vigilan-  
tissimo, Andreas Lacuna Secobiensis, Doctor Medicus, miles  
S. Petri, S. P. D.



VOD non perinde nostros lapsus cernamus, ac errata aliorum perspicimus, in  
causa est quidem à galauria. Vir illuſtriſſ. Nam cum unusquisq; cecidit er-  
ga eam rem quam amat (ut ſenſiſſe diuini ille Plati videtur) cuncti autem ſe  
omnium maximè diligant: optima ratione contingit, ut de ſe nemo rectè iudiciū  
ferat. Idcirco pulchrè, mea quidem ſententia, doctum eſt illud, Geſtare nos dupli-  
cem manticam è collo ſuſpenſam: vnam quidem antè, alienorum: alteram verò poſt, noſtrorum  
errorum plenà: ac proinde nos, peccatis propriis relictis, ad aliena, quæ obiecta ſemper oculis ſunt,  
examinanda inclinari. Quamquam ſanè qui ſtudio veritatis inueſtiganda, non autè ledendi quæ-  
piam, id faciunt, adhibitaq; omni moderatione: ij certè non venia modò, ſed ſumma etiam laude  
ſunt digni. Non deſunt tamen nonnulli malè ſeriat, qui ex alienis contumelias gloriam ſibi aucupā-  
tes, in viros eruditos & candidos, quiq; nihil inquam tam habuerunt in votis, quàm ut reipub. li-  
terarie prodeſſent, vel uti in proditores patriæ, in contemptores diuorum, communèq; humani ge-  
neris hoſtes, acerbè ſimul & impudenter, vel leuiſſima ex occasione inuehiunt: cum deberent po-  
rius illis bene precari, ob egregie in communem vſum nauitatam operam. Inhumanum quippe, ma-  
ximèq; ſeruum eſt, eos qui ut communia ſtudia inuarent, ſe obiecerunt ſycophantarum calum-  
niis, ob multa quidem ac varia, quæ ex Græca in Latinam linguam fideliffimè tranſtulerunt, non  
cumulare ſuis iuſtis laudibus: ob paucula verò in quibus ſunt lapſi humanitas, probris & conui-  
ciis opprimere. Ut autem reliquos omnes præteream, qui ſua induſtria artem Apollineam locuple-  
tarunt, certè Ioannes Guinterius Andernacus, in quem plurimi præter meritum debacchātur, v-  
nus ex primis fuit, qui Galenum introduxerunt nobis latine, purè, atq; ornate loquentem. Quòd ſi  
ex iis quæ iam pridem vertit, nonnulla offendant aures delicatiores, id cuiquam mirum eſſe non de-  
bet: quandoquidè ſuperioribus annis, cum Lutetia Parthiſſorum politiores diſcapuli inciperent id  
renasſci & floreſcere: primūq; ipſe ad transferenda Græca ſe accingeret: tum ut tyronū votis ob-  
ſecundaret, qui ſitiendiſſimi Galeniane doctrinæ, quemadmodum ſamelici pueri, qui ſemicrudas  
carnes deuorant, priuſquam accuratè coquantur, inconfectos commentarios illi extorquebantur è  
manibus: tum ut ſatiſaceret importunū typographorum precibus, coactū ſuit tantū ſingulis die-  
bus vertere (id quod ipſe teſtari poſſum) quantum premi duplici torculari poterat: atq; ita ſuas tra-  
lationes, nondum integre elaboratas, præcipitare. Quare (ut idem repetam) perperam mihi viden-  
tur ſacere, qui virum in vtrāq; literaturæ abſolutum, exquisitiſſimū inq; Medicum & Philoſophū  
(cuius ſtudio omnes debemus plurimum) tam insolenter inſeſtant: cum nullus extiterit hætenus  
adeò fidus Galeni interpres, qui interdum hallucinatus non fuerit: ac proinde ad veritatē ipſam in-  
ueſtigandam, præſertim in rebus arduis & maximis, cuiusmodi ars Medicæ exiſtit, neceſſario inge-  
nia plurimum deſiderentur: ut videlicet quæ hunc fuerint, ille cernat exactè. Sunt enim difficilis  
ſemper, quæ optima. Cum igitur ſuperioribus diebus vniuerſa Galeni opera in methodum longè bre-  
uiorem, ac faciliorem contrahens, obiter reperiſſem complura, hætenus anima, tuerſa à nemine, in  
quæ lector facile impingere poterat: rem haud inutilem me facturū exiſtimauī, i omnia loca præ-  
cipua, quæ iudicio meo, aliam requirebant expoſitionem, pauculis annotarem, arbitriūq; ſtudio-  
ſis relinquere, aut ſequendi verſionem noſtram, aut conſulendi Græca exemplaria. Neq; enim  
tantum mihi ipſi tribuo, ut velim illis ita meam ſententiam probari, ac ſi Lycurgi, aut Soloni decre-  
tum eſſet. Nam & inſitam mihi fragilitatem aſenoſco, & iudicio omni ex parte diffide, ut qui ho-  
mo ſi, paſſum non decipiatur: id quod Galenus ſecundo libro de Compoſitione phar macorum ſe-

EPISTOLA NVNCVPATORIA.

candam partem, non minus Verè quam Eleganter confirmat, dicens: χαλεπὸν γὰρ αὐδ' αὖτις ἔτα  
 μὴ δὲ μὲν τῶν ἰσχυρῶν πῶς αὖτε, τὰ μὲν αὖτε ἀπορροατο, τὰ δὲ καὶ ἐπὶ πῶς αὖτε, τὰ δὲ ἐπὶ πῶς αὖτε  
 χαλεπὸν γὰρ αὖτις ἔτα: quemadmodum certe aliquando mihi accidisse fateor, qui iuuenis pruriens olim scri-  
 bendi libidine, nonnulla paulo maturius edidi, quæ optarem nunquam produxisse in lucem. Quan-  
 quam animus haud dubie est, ubi oculum fuerimus nacti, quæcumq; à nobis conscripta citra perfe-  
 ctum iudiciū sunt, ea omnia recoquere, renovatq; ad limam accuratorem: idq; patrū transimo-  
 ram exemplo, qui vel in sacris literis, in quibus maiori cū periculo erratur, retractare propria scri-  
 pta non dubitant. Quod si quis interim vir doctus iuxta & sincerus, vel in hysce nostris annoa-  
 tionibus, vel in alijs omnibus, quæ alijs à nobis sunt exarata, meliora in medium produxerit, ego  
 primus omnium illa amplexabor, etq; immortales gratias habebō, nec minores, quam si mihi labo-  
 ranti grani ophthalmia, oculorum aciem restituisset: modo eo utatur candore & modestia, quæ vi-  
 ros philosophos decet, veritatēq; amantissimos. Semper namq; à moribus Erasistratorum ablor-  
 reri: qui adeo pertinaciter suam tuebantur heresim, ut censerent patriam potius prodendam esse,  
 quam proprium dogma. Quod verò hic præfens labor mihi institutus non fuerit, ut ostentarem inge-  
 nium, aut Virgiliū hominū doctissimorum detraherem, sed ut publice militati consulerem, rati-  
 onemq; redderem diligentē præstare in condenda Galeni Epitome, non quidem ille, qui animo-  
 rum est scrutator, Deus opt. max. Porro ut idipsum lucubratiōnū quod est, sub splendore nominis  
 tui publicarem, me occasiones varis impulerunt, Vir clarissime. Vna & potissima, ut amor ille  
 ardentissimus, qui inter Excellentium tuam, & illustriū atq; reuerendiss. D. D. Franciscum  
 à Bouadella & Mendozza, Cardinalem Caurien, patronū meū, meum nō vulgarem, indes magisq;  
 consolidescit, ex hoc argumento innotesceret cunctis, simulq; observatū meam Virginiā. Secunda,  
 ut Virilgatorum calumnias ianuam detrectandi observarem, tumq; à rabidorum me canum mor-  
 fibus redderem. Quippe Verisimile est, quæ tibi semel sunt consecrata, tuāq; protectiōni se credide-  
 runt, ea vel uti in asilo quodam intemerato iam esse: cum nemo futurus sit adeo temerarius aut  
 impudens, ut istam Amplitudinem tuam, auctoritatēq; summam, non reuereatur. Tertia quæ me  
 illexit causa est, quæ ductū studiosi omnes, te vnicū protectorem illustrium, doctōrum hominū  
 patrem, promotōrēq; ingenuorum omnium disciplinarum, nunquā non consuevit: nempe mul-  
 tūq; ista eruditio tua, seruenissimūq; sapientiæ amor, claritudinē generis, prudentiæ, humanita-  
 tēq; coniunctus: ut interius singularem ad omnia ingenij tui promptitudinem, admirandāq; in  
 agendis rebus dexteritatem præteream. Quas insēnes virtutes (quæ rarō in vnum conspiciant)  
 in te cumulat sentiens CAROLVS V. Caesar, indes cōcredit tibi maxima molimina rerum:  
 quæ adeo felicitate consilio & sapientiā tuā illi confecta & expedita reddis, ut diuino planē inge-  
 nio præditus esse videaris: id quod etiamnum prædicare de te illustrius hic Venetorum senatus  
 non desinit: qui & lugeret hodie recessum tuum, nisi illustri. Vir D. D. Ioannes à Mendozza,  
 aureum quoddam tuarum virtutum exemplar, dolorem ipsum foveret, leniret, ac mitigaret. Siqui-  
 dem in eo præsentis (cui eadem me nō, idem candor, prudentia eadem, ut cognomen eundem) desi-  
 derium tui absentis exatiant: in eo suos oculos pascunt: qui tanta cum erantate, sapientiā, fide, stu-  
 dio, atq; sedulitate, fungitur Oratorum munere, ut minime iam ipse hinc abesse videaris. Ne igitur  
 diutius quā par est suspensam tuam Amplitudinem teneam, en offerimus tibi, Vir illustri, in Ga-  
 leni interpretes hysce nostras annotationes. Quas quidem si tuo patrocinio diuinas fueris, ipsæ qui-  
 dem omnes insulsus atq; incursiones respiciunt: ego verò tuam semper Excellentiam suspiciam, quā  
 in multis annos Christus nobis seruet incolumen. Venetijs ex adibus illustrijs. Viri, D. D. Ioan-  
 nis Furtadi à Mendozza, apud Venetos Casarei Oratoris splendissimi. Decimo Calen. De-  
 cemb. M. D. XLVIII.

AD LECTOREM.

ADVERTAS Candide Lector, numerum illum qui passim occurrit tibi in nostris annotationi-  
 bus, referret, aginas eorum Galeni commentariorum, qui in octo classis digesti, repurgatiq; ab inno-  
 meris mendis, anno 1541. sub formula octavis fuerunt Venetijs excus: idq; industria clarissimi &  
 eruditissimi viri, Victorii Trincavelij, Doct. Med. necnon diligentis Augustini Ricci, Medici etiam  
 abstinētissimi. Quod sanè minime amittere dū esse censuimus, quin tibi indicarem: ne & illi, qui-  
 bus talium exemplariorum copia esset, suā commoditate fraudarentur: & illi, quibus etiam hæc nō  
 esset, aliquam tamen & in suis inquirendi occasionem sibi præbitam esse, cereretur.



Libro de optima secta.

Pag. 57.

**I**nuius Paulus vertit: Et agrotantes non multo in conficiendis cibis labore indigere. Græcè habetur. *αγαθόν τι καὶ ὁ ἀσθενὴς ἀναγκαῖον ἔχει καὶ ὁ ἀσθενὴς μακρὸν χρόνον*. Hoc est: Et quod agri egentibus, qui non admodum difficulter coquantur: vel qui longam elaborationem non postulent.

Pag. 58.

Ab huiusmodi præceptum nascitur: liquidi cibi omnes febricitantibus bene faciunt. Græcè legimus: *ὅτι τὸν πυρετὸν καὶ τὴν ἰσχυρίαν καὶ τὸν πυρετὸν καὶ τὴν ἰσχυρίαν καὶ τὸν πυρετὸν καὶ τὴν ἰσχυρίαν*. Quod est: Ex his tale oritur rheorema: Cibi humidi omnibus febricitantibus conferunt.

Pag. 61.

Aliunt enim, antequam adhibendorum remedium vires quas didiceris, nihil aliud vtile ab experientia provenire. Græcè legitur: *ὅτι τὸν πυρετὸν καὶ τὴν ἰσχυρίαν καὶ τὸν πυρετὸν καὶ τὴν ἰσχυρίαν*. Quod est: Alii enim, præter hoc quod facultates exhibendorum per eam cognoscuntur, nihil aliud vtile ab ipsa experientia accedere, etc. Fessellit autem interpretem vocularum *ὡς ἡ ἰσχυρία*, affinitas atque similitudo.

Pag. 86.

Quandoquidem non ab effectibus, sed ab efficientibus (quemadmodum & ipsi profiteantur) indicationes accipiendæ sunt. Græcè legitur: *ὅτι τὸν πυρετὸν καὶ τὴν ἰσχυρίαν καὶ τὸν πυρετὸν καὶ τὴν ἰσχυρίαν*. Quæ cōtrario modo vertenda erūt: sic scilicet. Nō enim ab efficientibus, sed ab effectibus (quemadmodum & ipsi faciunt) indicationes sumendæ sunt.

Pag. 95.

*ὡς ἡ ἰσχυρία* semper cōmunia vertit, nō communitas: vt sanè vertendum est, si velimus veram Galeni phrasim atque sententiam exprimere.

Lib. de constitutione artis medicæ.

Ad eadem libri.

**B**artholomæus Syllianus vertit: quod labefa-  
tari. Aldinus codex habet: *ἵνα διαφθαίῃ*. Hoc est, quia corrumpitur: Basilienus autem: *ἵνα διαφθαίῃ*. & rectè quidem: quod vertendum est: quia digeritur & resoluitur.

Lib. I. de elementis.

Pag. 190.

**L**eoniceus: Vel secundum substantiis quibus cōgigit esse elementa. Cui versioni suffragatur etiam interpretes. Græcè namè legitur: *ὅτι τὸν πυρετὸν καὶ τὴν ἰσχυρίαν καὶ τὸν πυρετὸν καὶ τὴν ἰσχυρίαν*. Hoc est: An secundum substantias, quarum ratione cōgigit ipsa esse elementis. Cæterū loco *ἀλλ'* crediderim esse legendum *ἀν'*. nisi quis fortè dicat Galenū vti latine phrasi, utpote diu in vrbe Roma versatum.

Lib. III. Pag. 185.

**L**inacer: Vti carnosus quis iuuenis in frigida lauanone corpus eius ex accidenti, nō ex propria potestate, calfacere dicat. Græcè *ἀλλ' ὅτι τὸν πυρετὸν καὶ τὴν ἰσχυρίαν καὶ τὸν πυρετὸν καὶ τὴν ἰσχυρίαν*. Quod sonat: Vt si quis dicat frigidam lauanonē calfacere corpus carnosū iu-

uenis ex accidenti, non facultate propria.

Lib. de inæquali intemperie.

Pag. 314.

**L**inacer: Calist quidem sanguis aliquando vniuersus, quicunque non naturalem illum calorem, qui ex humoris putredine est obortus, recipit. Græcè legitur: *ὅτι τὸν πυρετὸν καὶ τὴν ἰσχυρίαν καὶ τὸν πυρετὸν καὶ τὴν ἰσχυρίαν*. Quod vertimus: Calist quidem sanguis quandoque vniuersus, recipit illum calorem præter naturam, qui ab humorum putredine proficiscitur.

Pagina 318.

In qua alterum sit comprehensum. Græcè habetur: *ὅτι τὸν πυρετὸν καὶ τὴν ἰσχυρίαν*. Hoc est, in quo etiam non addit alterum.

Lib. de animæ morum, & corporeæ temperatæ mutis consecutione.

Cap. III.

**B**artholomæus Syllianus: At incorporeæ substantiæ, cum per se ipsa esse possint, neque qualitas aut species corporis sit, differentiam nullam intelligo. Cui versioni aliqui subscribunt interpretes. Græcus tamen codex habet id hunc modum: *ὅτι τὸν πυρετὸν καὶ τὴν ἰσχυρίαν καὶ τὸν πυρετὸν καὶ τὴν ἰσχυρίαν*. Quod sic sanè vertendum est: Incorporeæ verò substantiæ, quæ ipsa quidem per se consistere valeant, nec corporis qualitas aut species sit, eundem nullam differentiam inuenio, etc. Quibus nimirum verbis conuellsens oponebat Platonis, qui animam cōstituebat incorpoream quādam substantiam, & quæ posset per se subsistere, conatur Galenus ostendere, illam esse aut qualitatem, aut aliquam speciem corporis: cum alioqui, si esset quid alienum & abstractum à corpore, neunquam illam diuisionem admitteret, quæ iotres species, seu differentias, vel à Platone ipso distinguuntur.

Lib. III. de naturalibus facultatibus.

Pag. 444.

**L**inacer: Siquidē interna arteriæ tunica. Græcè legitur: *ὅτι τὸν πυρετὸν καὶ τὴν ἰσχυρίαν*. Quod est: Et enim interna ventriculi tunica.

Lib. I. de motu musculorum.

Pag. 504.

Codices latini sunt deprauati: in quibus habetur: At reliquum, & quarum, & motum transgressi, consideremus, etc. Græcè namque habetur: *ὅτι τὸν πυρετὸν καὶ τὴν ἰσχυρίαν καὶ τὸν πυρετὸν καὶ τὴν ἰσχυρίαν*. Hoc est: Ad reliquum autem & quarum motum transgressi, modum ipsius expendamus.

Libro secundo. Pag. 521.

**L**eoniceus: In quacunque autem talium constituens membrum, musculis circa ipsum tonicis agentibus commissis, figuram sic seruât, adeo vt sedentes quidam dormiuerint, etc. Græcè legimus: *ὅτι τὸν πυρετὸν καὶ τὴν ἰσχυρίαν καὶ τὸν πυρετὸν καὶ τὴν ἰσχυρίαν*. Quod sic vertimus: In quacunque enim talium constituens membrum, si musculis



sculis circa ipsum tonicis agentibus commiseris figuræ custodiam, ad eam illam rueretur, ut sedentes sepe quidam dormuerint.

Pag. 322.

Itaq; & supinum iacere, & hiare, stertoria, aut exolatoria, aut ebrietatis, aut ignavia sunt signa. Græcè *ἀπὸ τοῦ κοινοῦ καὶ ἀπὸ τοῦ πύονος*. Quod est & hiare cum stertore.

Pag. 324.

At (dicit forte quispiam) non assequimur mentis fieri: nam nec palpebrarum motum semper, etc. Quo in loco Galenus respondet ad obiectum nem tacitam. Ac proinde ita debemus legere, & (dicit forte quispiam) non assequimur mentis fieri. Neque etiam (supple. dicemus) palpebrarum motu semper nobis obesse mentem, etc. Ad sic sane sententia illa exordii perspicua. Tamen nunc consule græcum exemplar.

*Lib. I. de semine.*

Pag. 337.

ANUS Cornarius. Attractoria quidem familiarium, per quam attractur, & alteraturum, alimentumq; sibi succurrit: erat: expulsivam autem alienorum & superfluatorum. Sic autem habet græcus vetustus codex: nam imprecis sunt depravata. *ἡ ἀτtractὴ καὶ ἀλλοιωτικὴ καὶ ἐκβαλτικὴ τῶν ἑαυτοῦ καὶ προσλαμβανόμενων*. Quod est vertendum: Attractivam quidem, familiarium, & qua etiam retenturum erat, quæq; alteraturum, & sibi nutrimentum futurum: ac deniq; alienorum, superfluatorumq; excreticem. Galenus siquidem impræsentiarum quatuor illas facultates, maxime inter se distinctas, ascribit semini: nec vult ipsum per attracticem, aut alterare, aut sibi alimentum conficere: id quod dictum esset planè ridiculum: cum nimirum singulis eorum facultatum sit suum munus proprium, nulliq; alterius operatione usus. Attractivæ quippe, est attrahere: retentivæ & conservare: alterativæ, alterare & concoquere: expulsivæ deniq; aliena & superflua expellere: id quod sans superfluo Galeno demonstratum videtur, quoniam in aliis locis, nam vel maximè in commentariis de naturalibus facultatibus.

Pag. 367.

Vertit in hunc modum: cui ceteri interpretes fassragantur: Et ob id sanguini facillimè est carnem fieri: difficillimum verò membram, & nervum, & venam, & arteriam, & tunicam. Græcè legitur: *ἐκ τοῦ αἵματος καὶ τοῦ πύονος καὶ τοῦ χυμοῦ καὶ τοῦ σπέρματος*. Quod est vertendum: Idcirco facillimum quidem est sanguini, fieri carnem. difficilium autem membram, & nervum, & venam, & arteriam, & tunicam. Docet quippe eo in loco Galenus, ipsas particulas solidas vix posse confici ex sanguine, carnem autem facillimè: cum nimirum illæ quidem, à semine: hæc autem à sanguine, originem participantur.

Pag. 382.

Continetur autem in testibus seminario humor. Et paulo post: Trahunt igitur etiam testes seminario luumorem. Vtrobique autem græca

exemplaria habent: *ἐκ τοῦ αἵματος*. Hoc est: humor serosus: qualis certe generatur ipsa cunctis, & propriè quæ in sinistram descendit testem: cum vi debet finitum vas seminario oritur ab emulgenti vena, quæ serosissimè sanguinem vehit ad renem sinistram, ut illic expurgetur.

Lib. II. de semine. Pag. 390.

Corn. Possit autem Hippocratis etiam opinatus est, & verisimè permittit vasa perfectum semen fieri, etià si hoc ita esse impossibile sit. Græcè legitur: *ἡ δὲ φύσις τοῦ σπέρματος καὶ τοῦ πύονος καὶ τοῦ χυμοῦ καὶ τοῦ σπέρματος*. Quod nos vertimus: Potest autem (quæ admodum existimavit Hippocratis) & ambobus testibus, etiam vtrumq; semen perfectum fieri. Et quæ obsecro possibilia essent, si lætalia non forent? Itaq; non recessit opinio Hippocratis, sed illam potius (quod solet semper) seu Dei oraculum, & recipit, & amplectatur.

Pag. 601.

Non tamen impossibile est animo concipere tale temperamentum animalis corporis, ut perfectum animal generet absq; alterius cōmissione. Græcè autem legitur: *ἡ φύσις τοῦ σπέρματος*. Hoc est: ut imperfectum generet. Quam lectionem probandum esse indicat sequens dictio, quæ ita habet: Animal tamen perfectum in seipso concipere, verè difficile est. Advertat item candidus Lector, pascim in commentariis de semine, Cornarium id hæc, quod est in Græco, quoddam formined significat, vertere nobis mallebre.

Pag. 620.

Apparet ex his quatuor vas, quæ appellari vmbilicū, siveq; meatum iuxta vragon constitunt, etc. Græcè legitur: *ἡ φύσις τοῦ σπέρματος καὶ τοῦ πύονος καὶ τοῦ χυμοῦ καὶ τοῦ σπέρματος*. Quæ sonant: Apparet enim ex his quatuor vas, quæ iuxta appellatum vmbilicū, vna cum meatu, qui ad vrinaculum est, cōiunt.

*Lib. de instrumentis odoratis.*

Pag. 654.

Vdovicius Bellisarius. Eaq; quæ de foraminibus dixit apertis solis, quæq; non intelligentiā fugiunt, etc. Græcus codex habet: *ἡ φύσις τοῦ σπέρματος καὶ τοῦ πύονος καὶ τοῦ χυμοῦ καὶ τοῦ σπέρματος*. Quæ ita vertenda sunt. Ceterum qd. ab eo dictum est de refrigeratione meatuum, impossibile quidem non est.

SECTIONIS PRIMÆ PAR.

*Lib. I. de anatomicis administrationibus.*

Pag. 64.

Andernacus: Quod vngues igitur ex prædictis omnibus coalescant. Græcè: *ἡ φύσις τοῦ σπέρματος καὶ τοῦ πύονος καὶ τοῦ χυμοῦ καὶ τοῦ σπέρματος*. Hoc est: Quod igitur prædictis omnibus ipsi vngues accrescant.

Lib. III. Pag. 76.

Andernacus: Amplex magnitudinis porrigi.

neruos diximus. Græcè: *ἡ ψυχὴ τῶν μυηδίων ὅτι νῆμα*  
*εἶναι.* Hoc est; magni feruntur nervi.

Page 78

De rectis enim plurimis iam brachij partibus,  
reliquos duos in curua, propter internam ipsius  
regionem, conspicis: in quam etiam predicti  
tres paulo inferiores, quam tertius nervus est, in-  
feruntur. Graece legitur: *ἡ δὲ ἐν τῇ  
κατωτέρᾳ μέρει τῆς ἐκείνης ἀρτηρίας, ἀπὸ  
ἐκείνης ἀπὸ τῆς ὑπὲρ αὐτὴν ὄντος (ἡ δὲ ἐν τῇ  
κατωτέρᾳ μέρει τῆς ἐκείνης ἀρτηρίας, ἀπὸ  
ἐκείνης ἀπὸ τῆς ὑπὲρ αὐτὴν ὄντος)*. Quod est: Nudatus enim iam plurimae  
brachij partibus, reliquos duos nervos iuxta  
ipsius regionē internam (in quam etiam prae-  
dicti tres inferuntur) expendit paulo inferiores, *ἢ*  
fitus sit tertius nervus.

Pag. 88.

Manu autem impetula, intercipienda est. Graecè: ἀντιλαμβάνειν τὴν χεῖρα, ἢ ἀντιλαμβάνομαι. Hoc, p[er] Demetrium autem manum, intercipis. Estque subaudiendum, oportet. Vult siquidem, ut, manum liberè demittamus, ac sic pendulus excipiamus vinculo, ad hoc ut veniat exactè promittentia quod hodie etiam in quorundam est vita.

Pag. 193

Omnia latina exemplaria ob typographorum  
inadvertentiam sunt depravata. Habent enim:  
Mox alia penitus grandis: cum penitus legen-  
dum sit: quandoquidem græcè legitur, *Αὐτὸ*  
*ἵστιν ἔργον.*

Lib. vL. Pag. 176

Andernacus: Quam possibile est solius peritonæi facere. Græcè: *ἂν ἑλπίσῃ τὸ ἀποκόψαι τὴν περιτονίαν*. Quod equidem verterem: Quam possibile est à solo peritonæo fieri. Constat namque eam, sicut ab abdominis, à nervis illius peritonæi filamentis consisti.

Pagina 186

Gulosis verò & timidus ineſt magnum iecur  
& mulſitidum, aliter quidem affectus. Græcus  
codex excuſus habet: *vici pūm rēpōm, vici dūm*  
*pūm rēpōm, vici dūm rēpōm, vici dūm rēpōm,*  
*vici dūm rēpōm, vici dūm rēpōm.* Sed in quodam antiquiſimo legimus:  
*inſipide dū vici inſipide.* Hoc eſt: Diuerſum autem  
contrariis. Argi ita legendum eſſe, nemo tam ob-  
ruſo ingenio eſt vt non videat.

Pag. 13-

Hoc autem sub tenui tunica aperiri eviden-  
ter apparet. Græcè: *καὶ γὰρ ἐκ τῆς τῆς ἀποκ-  
λύψεως τοῦ ἀποκάλυψτος*. Quæ sit verterem: Per-  
spiciat autem hoc sub tenui comprehensum tu-  
nica apparet.

Lib. VII. Pag. 107.

Andernacus: Non ramen ipſi cordis corpo-  
ri pericardio hæc tunica connexa eſt, verum in  
aliis omnibus hand parua quædam regio inter-  
media eſt, motui cordis accommodata, ad baſim  
ipſius, quæ, vt eſt expoſitum, orbicularis eſt,  
productibus ex ea valis connexa. Græce legi-  
mus: *ὁ περιαντρίον γὰρ τῷ σπέρματι ἐπὶ ἀμφότεροις ἐπιβάλλεται*  
*καὶ ἀπὸ τῆς χύτης περιαντρίον, ἀπὸ δὲ τοῦ πύλου τοῦ ἐκτετα-*  
*μένου ἐστὶ περιαντρίον τῶν ὀφθαλμῶν γύρω, καὶ ἀπὸ τῆς ἀντι-*  
*μεταπύλου ἀντιμεταπύλου καὶ ἐκ τῆς ἐκτετατῆς βαλάνου, ὁ πύλος (ὁ περι-*  
*αντρίον) ἀπὸ τῶν γύρω τοῦ περιαντρίου καὶ ἀπὸ τῶν ἀπὸ τῆς ἐκτετα-*  
*της.* Id quod veritatem: Non ramen ipſi cor-

dispositi pericardios hæc tunica connexa est:  
verum circa alias quidem omnes illius partes;  
haud parua quædam regio intermedia est, me-  
tui cordis accommodata: ad basim verò sui-  
pioris, quæ sanè (vt iam exposuimus) est circulus,  
exiit ab illo vas æmulus annexitur.

Lab. VIII.      Pag.      881.

**A**n d e m a z u s : Quom admodum etiam si in  
contractione thoracis per sectiones insit, ære  
extinctus illapso, eas obturaueris, respira-  
bit confestim animal. Graecè ἀνεψυγὶ καὶ ἰατρικῇ  
ἐστὶν ὁμοίον τὸ διπλόν· λαμβάνει· & ἀπὸ τοῦ αἵματος τοῦ  
διπλοῦ πάλιν ἐκέρχεται· ἡ δὲ αἱμία ἐξέρχεται· ἀλλὰ οὐδὲν  
ἀπολείπει· ἀλλὰ ἡ αἱμία ἐκέρχεται· ἀλλὰ οὐδὲν ἀπολείπει·  
καὶ οὕτως ποιεῖται ὁμοίον τὸ διπλόν.

Page 141.

Nam intercostalibus musculis vehementer hoc tempore procussis. Græcè autem legitur: *intercostales musculi*. Hoc est: Contractis, aut, concludentibus. Pag. 348.

Page 440

Quae manifestam sui inspectionē efficit. Gynec. legimus *apud nos ita ut uterum appropinquet*. Hoc est: Manifestam per se inspectionem faciens. Quibus verbis Galenus significat, ubi per anatomen, costis iugcingens membrana, sola & simplex relicta fuerit, nempe liberata à costis & musculis facile nos per ipsum, seu per cornu quoddam aut vitrum, inspecturos internis viscera.

Ibid.

At manifestior adhuc speculario fit, quum in diaphragmate nudato, peritonæi vertex avellitur. Græcè: *anepirpa di ter vidi spherothia nuda et diaphragma nudum, manifestior est anepirpa non nuda vidi.* Nempe: Manifestior autem adhuc fit speculario per diaphragma nudatū, ubi peritonæi vertex avulsus fuerit.

Lib. 12. Pag. 101.

Andernacus: Dum igitur membranz cerebri plexus ofisbus quz ambianz detegit, subind quippiam abrumptur. Græcuz codex habet: *το επιπλεον της γυναικος της αναμνησης της ανδρικής της πληρωσης, καθότι διαφόρων τοις ανδράσι. Quod est: Interim enim dum exuuntur a citumectis ofisbus, ipsius meningis plexus, sepe numero quippiam abrumptur, drelivitur.*

Pag. 253.

*Antypisus* vsum simul inspiciendo nudabis. Græcè legitur: *ἀντίπιστος αὐτίς ἀπὸ τοῦ ὁμοῦ γινώσκου*; qui locus est deprauatus: planèq; constat, nō *γινώσκου* esse, sed *γινώσκον*, legendum esse: vt reddatur ita Galeni sententia: Atque ipsius vsum simul inspiciendo exploraueris.

*Lib. II. de usu particularum.*

Page 404

Nicolaus Regius: Cum autē nulla iam super-  
sit. *Græcè: τινος δ' ἀπείρου.* Quod est: Nulla adhuc  
iam superfit. Quam lectionem si non recipiam,  
tota Galeni sententia abrupturitur, vixque intelligi  
poterit. Pag. 414.

Pag. 43

Adilia. Græcè legitur: ἀδελφὰς τὰς ἀδελφὰς: quod est: per illum regionem.

Pag.

Page 418.

Et paulò minus alba. Græcè habetur: *ἐστὶν ὀλίγον ἧκεν*. Hoc est: Et parum abest, quin alba.

Page 401.

Cum tamen neq. intestinum quodvis co-  
quendi alimentum, neq. venae sanguinis pingendi  
gratia existerint. Gracè legitur: *πιστον δὲ τῶν ἐν  
ἐντομίς τῶν ἰσχυρῶν, ἐν πύλιν διακρίνεται*. Quod  
est verendum : Neq. verū vllum intestinum  
gratia concoctionis est condūū: neq. gratia san-  
guificationis, vlla venarum.

Page 414

In transversos & rotundos villos dissoluen-  
dam. Vbi græcè legitur: *αἰατοειδὲς*. Hoc est iri-  
surum.

Lib. v. Pag. 447.

Omnes Latini codices sunt mendosi, in quibus legitur: Ne quod inferiorem intestino externo aliquando indigeret auxilio. Est siquidem legendum, intestinorum.

Lib. v4. Pag. 477.

Quod verò deinceps est: Simul cum particulis que ipso thore coramener, agemus: fatius esse iherarborari, in hunc labrum distulimus. Grece legitur: *ὅτι, ἀνὰ τὴν ἐξ ὧν τὸ ὑπερὸν περὶ, ὑπερὸν συναντῶνται διὰ τὸ ἐν τῷ περὶ, ὅτι τὸ περὶ ὑπερὸν ἀνὰ τὴν*. Quod sic sane vertendum est: Quod verò ei quum erat, fatius esse putantes, si id inter eas partes conficeretur, que in thore ambiunt, ipsum in præsentem cōmentarium distulimus.

Page 470.

Concentum esse respirationis. Græce habetur:  
*de circulo insulae*. Hoc est: Eundem concentum.

Pag. 481.

Molles enim quam sint liui, ac tenuēs, longoque intervallo secundum rectitudinem tendantur, maximamque præterea particulam à seipsis pendentem, ventriculum scilicet, habeāt, quem cibo compleri subinde oportebat ab ipsius tum mole, tum pondere tensi assidue, facile disrumprentur. Græcè habetur *μυαλαὶ γὰρ ἴσταν τῆς ἀνδρίας, καὶ δὲ πλεονεχέουσι τοῖς τροφίμοις, καὶ οὐκ ἐπὶ μακροῦ χρόνου δύναται διατείνειν*. Quæ si licet non transferenda videntur. In enim molles ac tenuēs quōdā sunt, si etiam longo intervallo secundum rectitudinem tenderentur, maximam præterea particulam à seipsis pendentem habentes, ventriculum scilicet, quem subinde compleri cibo oportebat: terre ab ipsius tum mole, tum pondere assidue tensi, facili disrumpuntur, etc. Nam quod iherusalimense secundum rectitudinem producantur, indicat sermo superior, ubi Galenus sic ait: Adde huc, quod neruis qui à cerebro in ventriculum iuxta stomachum deferuntur, obliqua vi rurius motū erat futura. quām recta.

Pag. 491.

Quem sanguinem appellant. Græcè habetur:  
*ὁ ἀπορροῶν τὸ αἷμα*. Hoc est: quem sanguificum  
vocant.

Pag. 511.

Post autem idipsum, Græci *αἰσῶν* *αἰνῶν*. Cate-

rum cum *et* nihil aliud quam spiritum refes-  
rat, nos certè (quem postea) vertimus.

Pag. 111.

Per anastomofin applicuiffet. Græcè legitur:  
*anastomofin*. Hoc est: apertuiffet.

Lib. vtt. Pag. 545.

Nicolaus Reg. Si omni natura cartilago fuisset nudata. Græcè habetur; *ἡ φανερὰ ζυγαρὶς τῆς ἐξωδερῆς*. Sed legendū est *φανερῶν*, vt vertamus: Si cartilago naturaliter esset nudata.

Lib. 15. Pgs. 611.

Nicolaus Reg. Quærit in ea est membranam pericranium. Græcè: *τὸ περιανθράκινον* est pericranium. Quod utiq; vertendum erat: Quærit ex ea oritur pericranion membranam. Nemo liquidem nescit ex crasso cerebri involucre, per cranij suturas elapso, pericranium ducere originem.

Pag. 617.

Atq; ita rursus superius parte diuisa vnitionis ipsorum. Græcè: *ἐν τῷ ὑπερὺν ὑψηλοτέρῳ, ἀπὸ τοῦ ὑποτέρου πρὸς τὸ ὑψηλόν.* Quod nos verniusus. Atque ita rursus diuisis post eam, ante vnitionem quidem ipsorum, etc. Galeni quippe sententia est, nervos illos vntificos, priusquam crassa meningē excidant, conspirare in vnum: diuaticari autem, vbi illam fuerint elapsi: præterea, ante cōiunctionem ipsorum, pleuiam quandam consistere.

Pag. 547.

In omnibus animalibus primi hi nervi omnium sunt iam durissimi. Graece legimus: *Αὐτοὶ τοῦτο τὸν νῆρον τὸν πρῶτον, ἰσχυροὺς ὄντας ἐκαστοί.* Hoc est: In vniuersum autem, ex nervis ipsis, hi existunt primi, qui iam exquisiti sunt duri, etc. Nam dicere nervos septime coniugationis esse nervorum omnium durissimos, hominis plane est in anatomico minimè exercitati: cum liquidò constet, nervos omnes, qui ab spinali oriuntur medulla, eis longe diutiores existere.

Pag. 650.

Neque perforatum. Græcè: *ἀνεύρηκτος*. Sed *ἀνεύρηκτος* est legendum, verèdumq; : Et quod communi non posuit.

Pag. 652.

Qui vero ad ossa maxillæ inferioris magnos  
dentes scilicet penetrant, etc. Græcè habetur: *δι-  
ατρύειν τὴν τὴν κάτω γνάθιν τὴν μακροτέραν τὴν ἐκτε-  
ραὴν τὴν πρῶτην*. Quæ sonant: Quantum verò ex  
ipsis ad ossa maxillæ inferioris magnos præter-  
greduntur dentes. Quæ lectio ex lectionis sub-  
dita etiam colligi poterit.

Ibidem.

[illegible]

conspicuas: omnes tamen tenues, obscurasque, tum gingivæ, tum reliqui dentes.

Pag. 658.

Tres enim sunt omnino capitū figuræ. Græcè: *τρία ἢ γὰρ οὐκ ἔστιν ἄλλωθεν ἐξήματα*. Quod est: Ipsorum autem vniuersæ figuræ sunt tres, &c. Agebat autem de capitibus fastigiatis, quorum figuras alii esse tres: nempe vnam, vbi vtrique eminentia, anterior videlicet & posterior abest: secunda, vbi anterior tantum: tertia denique, vbi posterior duntaxat est exoluta. Quod si de vniuersis capitū figuris Galenus impræsentiarum egisset, præter has tres, annumerasset etiam naturalem figuram, atque ad eā complures alias se præter naturam habentes.

Lib. x. Pag. 664.

Nicolaus Reg. Quocirca medius is vehitur ad ipsum crystallinū. Græcè habetur: *ὅπου διὰ τοῦ πνεύματος ἰσχυροῦ ἀνὰ τὴν τὴν ἀπὸ τοῦ αἵματος*. Quod nos veritimus: Ac proinde medius in ipso vehitur crystallinus humor, &c. At itaque non vitreum humorem in crystallino, sed crystallinū in vitreo, veluti semisectam sphaerā in aqua (hac enim videtur Galenus analogiā) natat: id quod licet videre manifestissimè. Siquidem crystallinus humor insit glaciæ est cōpactus: vitreus autem humidior est, ipsāque aquam refert. Ob idq. in eo crystallinus velatur, veluti globus semisectus in aqua.

Ibidem.

Atq. etiam ophthalmia laborantes lux quidē offendit, eōsq. deprehendit. Græcè: *ἀλλὰ τοῦ τοῦ ὀφθαλμοῦ ἀπὸ τοῦ πνεύματος ἰσχυροῦ ἀνὰ τὴν τὴν ἀπὸ τοῦ αἵματος*. Quod clarius vertitur: Quin & lippitudine laborantes redarguit quidem splendor, ac lædit.

Pag. 671.

Cū igitur opifex nostri providere vellet, vt qua est foramen hoc, tunica cornea humorem crystallinum aliquando non contingeret. Græcè legitur: *ὅπου ἡ τὴν τὴν ἀπὸ τοῦ αἵματος ἰσχυροῦ ἀνὰ τὴν τὴν ἀπὸ τοῦ αἵματος*. Quod est vertendum: Vt igitur necper hoc foramen cornea tunica aliquando crystallinum humorem rangeret, cū prospexisset conditor noster, &c. Non prospexit siquidem vt aliquando uon tangeret, sed vt nunquā crystallinum cornea contingeret: quemadmodum revera non tangit, nisi dum ipsius oculi fabrica omnino labefactatur.

Pag. 679.

Aceruati hi omnes suis aponemrosibus. Græcè: *ἀνακαταρτίζονται ἀπὸ τῶν αἰμάτων*. Quod est: Dissolui autem omnes in filamenta nervosa.

Lib. xi. Pag. 711.

Nicolaus Reg. Quod si magni sint. Græcè: *ὅπου ἡ τὴν τὴν ἀπὸ τοῦ αἵματος ἰσχυροῦ ἀνὰ τὴν τὴν ἀπὸ τοῦ αἵματος*. Hoc est: Quoniam magni existunt.

Pagina 724.

Omnia Lanna exemplaria habent, ad palatū columnam. Græcè legitur: *ἀνὰ τὴν τὴν ἀπὸ τοῦ αἵματος ἰσχυροῦ ἀνὰ τὴν τὴν ἀπὸ τοῦ αἵματος*. Quod est: iuxta palatum atq. columnā.

Pag. 743.

Qui igitur hic quoque enatura contraria vni-ri inter se posse depauiant? Græcè: *ὅπου ἡ τὴν τὴν ἀπὸ τοῦ αἵματος ἰσχυροῦ ἀνὰ τὴν τὴν ἀπὸ τοῦ αἵματος*. Quod ego sanè verterem: Quo pacto igitur

hic quoque natura contraria inter se mutuō vni re constituit?

Pag. 746.

Tum quod ex basi capitis est, quæ dura esse oportet. Græcè: *ὅπου ἡ τὴν τὴν ἀπὸ τοῦ αἵματος ἰσχυροῦ ἀνὰ τὴν τὴν ἀπὸ τοῦ αἵματος*. Quæ sonant: Quodq. ex us sit, quæ basi capitis insunt, quæq. dura esse expediebat.

Pag. 747.

Ante hos verō tertium. Vbi legendum est: antehæc verō tertium: cū ille articulus referat duo nasi ossa. Simuliter paululo inferius, vbi vertit Nicolaus Regius: supra quos alij sunt duo: legendum est: supra quæ alia sunt duo: cū nimirum etiā illi articuli manifestè referantur ad ossa.

Lib. xxi. Pag. 767.

Nicolaus Regius: Ob idq. erat necesse quosdam ei parte anteriore apponere. Græcus codex habet: *ὅπου ἡ τὴν τὴν ἀπὸ τοῦ αἵματος ἰσχυροῦ ἀνὰ τὴν τὴν ἀπὸ τοῦ αἵματος*. Quod veritimus: Ac proinde necesseum erat quosdam ipsi parte anteriori opponere musculos.

Pag. 773.

Motus enim & sensus omnium partium infernarum læduntur læso spondylo. Græcè clarius habetur: *ἀνὰ τὴν τὴν ἀπὸ τοῦ αἵματος ἰσχυροῦ ἀνὰ τὴν τὴν ἀπὸ τοῦ αἵματος*. Hoc est: Motus enim & sensus omnium particularū, quæ sub læso spondylo consistunt, vitiantur.

Pag. 778.

Via autem omnis, quæ est inter primam productionem, & finem ultimæ. Græcè habetur: *ὅπου ἡ τὴν τὴν ἀπὸ τοῦ αἵματος ἰσχυροῦ ἀνὰ τὴν τὴν ἀπὸ τοῦ αἵματος*. Quod nos veritimus: Via autem quæ est inter primam productionem, & insertionem ultimam, &c. Quandoquidem eo in loco Galenus summam viæ securitatem commendat, quæ ducit nervos a prima productione ipsorum, quæ sit ab spinali medulla, vsque ad particulas in quas inferuntur.

Ibidem.

Ad postiores siquidem partes spinæ os ætinet: quo loco cartilago quāmplurima ei circumiacet. Græcè legitur: *ὅπου ἡ τὴν τὴν ἀπὸ τοῦ αἵματος ἰσχυροῦ ἀνὰ τὴν τὴν ἀπὸ τοῦ αἵματος*. Quod sic potius verterem: Quætenus autem ad posteriores fines vergit os quod acantiam vocat, catenus ei cartilago plurima circunducitur.

Pag. 783.

Nisi quod in thorace quum costæ non solum eis sint, &c. Græcè: *ὅπου ἡ τὴν τὴν ἀπὸ τοῦ αἵματος ἰσχυροῦ ἀνὰ τὴν τὴν ἀπὸ τοῦ αἵματος*. Quod est: An quod in thorace, quum costæ non solum eis essent articulatae, &c.

Lib. xxi. Pag. 795.

Nicolaus Regius: Apparet enim perspicuè, quod nō præstiterit ab vitro ipsius sine nervos quovis producere, ob id fuisse petrusum. Græcè habetur: *ὅπου ἡ τὴν τὴν ἀπὸ τοῦ αἵματος ἰσχυροῦ ἀνὰ τὴν τὴν ἀπὸ τοῦ αἵματος*. Quæ sonant: Apparet enim perspicuè, quod nō præstiterit per vtrūq. ipsius finem aliquem nervum.

neruū producere: ob idq; ipsam fuisse pertusam.

Pag. 797.

Quemadmodum & aliis omnibus eius sicut spondylis propagines quasdam exiguas mittit, quomodo & reliquis coniugationibus neruorū qui sunt in collo. Græcè: *ὡς ἐν τοῖς ἀλλοῖς ἀνθρώποις, οὕτως ἐν τῇ σπονδυλικῇ στήνῃ, ὡς ἐν τοῖς ἄλλοις σπονδύλοις, οὕτως ἐν τῇ σπονδυλικῇ στήνῃ, ὡς ἐν τοῖς ἄλλοις σπονδύλοις.* Quod est vertendum: Quemadmodum & aliis omnibus eius loci spondylis propagines quasdam exiguas mittit, quo modo & relique coniugationes neruorum qui sunt in collo.

Pag. 800.

Quas à spinali medulla neruos recipere præstiterat. Græcè legitur: *ὡς ἐν τῇ σπονδυλικῇ στήνῃ, ὡς ἐν τῇ σπονδυλικῇ στήνῃ.* Hoc est: Quas à spinali medulla colli præstiterat neruos recipere.

Pag. 813.

Porro à scapulæ processibus superna quidē, quæ est ad summam humeri (quam quidem à cornu rostri forma *ὡς κωνοειδὴς* nominant) interna verò, etc. Codex quidam verius habet: *ὡς ἐν τῇ σπονδυλικῇ στήνῃ, ὡς ἐν τῇ σπονδυλικῇ στήνῃ.* Quæ sonant: Porro ab scapulæ processibus superioribus, eo quidem, qui est ad summam humeri (quem illi cornuiformem appellat) externo verò, etc.

Pag. 814.

Qui ortus maxima ex parte costæ intæ scapulae. Græcè: *ὡς ἐν τῇ σπονδυλικῇ στήνῃ, ὡς ἐν τῇ σπονδυλικῇ στήνῃ.* Quod nos vertimus: Qui ortus à maxima parte inferioris, quod in scapula est, lateris.

Ibidem paulò inferius.

Qui ex inferiore fine costæ intæ scapulæ proficiscitur. Græcè: *ὡς ἐν τῇ σπονδυλικῇ στήνῃ, ὡς ἐν τῇ σπονδυλικῇ στήνῃ.* Quod est vertendum: Qui ex inferiori ora lateris humilioris, quod in scapula est, proficiscitur.

Pag. 816.

Fertur ad humerum. Græcè legitur *ὡς ἐν τῇ σπονδυλικῇ στήνῃ*. hoc est, dorsum. Et paulò inferius, Nicolaus Regius vertit: hoc quidem maximè trahit: cum vertendum fuisset: hunc, scilicet humerum, maximè trahit.

Lib. xi. 111. Pag. 821.

Nicolaus Regius: Quæ propter corporis imbecillitatem, aut vitam omnino breuissimam. Græcè legitur: *ὡς ἐν τῇ σπονδυλικῇ στήνῃ, ὡς ἐν τῇ σπονδυλικῇ στήνῃ.* sed legendum nō *ὡς*, sed *ὡς*, ut veritatem: Quæ ob corporis imbecillitatem vitam exquisitè breuem fortitur. Quippe sententia Galeni est: quæ ob corporis imbecillitatem, admodum breuis vitæ futura erant, aut præda etiam fortioribus animabus remedium asidui interitus excogitasse naturam, nempe fecunditatem generationis.

Pag. 828.

Verum (quod nuper diximus) femina in modo est imperfectior, mas verò perfectior. Græcè: *ὡς ἐν τῇ σπονδυλικῇ στήνῃ, ὡς ἐν τῇ σπονδυλικῇ στήνῃ.* Quod est: Cæterum (quemadmodum est nuper dictum) quod imper-

fectius mouetur semen, sit femina: quod verò perfectius, mas.

Pag. 829.

Habet enim is dextro plures flexus variciformes. Græcus codex antiquus: *ὡς ἐν τῇ σπονδυλικῇ στήνῃ, ὡς ἐν τῇ σπονδυλικῇ στήνῃ.* Quod est: Etenim finitè dextro est frigidior.

Pag. 833.

Siquidem fieri potest, vt etiam si initium à femina sit profectum. Græcè: *ὡς ἐν τῇ σπονδυλικῇ στήνῃ, ὡς ἐν τῇ σπονδυλικῇ στήνῃ.* Hoc est: Procedente enim principio à femina, fieri aliquando potest, etc.

Pag. 836.

Propagines quædam ad matricem rectè fertur. Græcè: *ὡς ἐν τῇ σπονδυλικῇ στήνῃ, ὡς ἐν τῇ σπονδυλικῇ στήνῃ.* Hoc est: ad matricem quæ è directo est sita.

Pag. 838.

Fieri non potuit quin naturæ artem admiretur. Græcè: *ὡς ἐν τῇ σπονδυλικῇ στήνῃ, ὡς ἐν τῇ σπονδυλικῇ στήνῃ.* Hoc est: Impossibile est, quin ibidem artē naturæ admiretur.

Pag. 841.

Infant autem matrici & corpora musculosæ. Græcè: *ὡς ἐν τῇ σπονδυλικῇ στήνῃ, ὡς ἐν τῇ σπονδυλικῇ στήνῃ.* Quod est vertendum: Infant autem ei vasi musculosæ corpora. Quandoquidem articulus ille, non matrici, sed spermaticum vas, de quo nimirum Galenus agebat, refert.

Lib. xvi. Pag. 857.

Nicolaus Regius: Hæc membrana omnibus matricis partibus, quæ sunt intra ostificia, subiacet. Græcè: *ὡς ἐν τῇ σπονδυλικῇ στήνῃ, ὡς ἐν τῇ σπονδυλικῇ στήνῃ.* Quod est: Atq; omnibus matricis partibus, quæ inter ostificia consistunt, duplex subiacet.

Eadem pagina.

Eg verò paululum progressæ. Græcè: *ὡς ἐν τῇ σπονδυλικῇ στήνῃ, ὡς ἐν τῇ σπονδυλικῇ στήνῃ.* Quod est: progressæ autem parum: vt sensus sit, matricis vasa (non radices arboris, quemadmodum arbitrat̃ur interpres) paululū progredienna, per coniugationem coalescere.

Pag. 868.

Ac si ter aut quater non cōcinnè excidens nō suffocaretur, eo certè modo accideret ex quadringentis, verbi grātia, fœtibus centum impediri. Græcè legitur: *ὡς ἐν τῇ σπονδυλικῇ στήνῃ, ὡς ἐν τῇ σπονδυλικῇ στήνῃ.* Quod est: Quod videtur esse corrupta. Ego verò sic illam verterem: Cæterum si ex tribus aut quatuor nō cōmodè excidentibus fœtibus, vnus impeditur, conngeret vtiq; sic, ex quadringentis, verbi grātia, centum prius exingui.

Lib. xvi. Pag. 879.

Nicolaus Reg. Añsa autem siccis corporibus actenibus, vtiptia perpetuò pinguedine natua humescit, quæ celeriter in diuturnis inediis, ac vehemētib. laboribus, & caloribus immo diis exiccatur, atq; induriscit, etc. Quo in lo eo interpres id pinguedini tribuit, qd de corporib. tenuibus & siccis intelligendū est. At nā quæ Galenus: quandoquidem talia corpora facile per labores & exccitacōes induriscunt (id qd verba illa, *ἐν τῇ σπονδυλικῇ στήνῃ*, planè nobis

declarant) naturam illis seu remedium quoddam, pinguitudinem adiunxiffe.

Pag. 904.

Quocirca & arteriæ productio, quæ in dextrâ renem prorumpit, producitur ab arteria superiore ea quæ ad finitimum it. Græcè habetur: *αὐτὸ δὲ τὸ ἀριστερὸν καὶ τὸ δεξιὸν ἀρτηρίαι εἰς ἀρτηρίας, αἰσθητικὰς καὶ κινητικὰς, ἵνα αὐτὰς ἀρτηρίαις ἵαται.* Quod veriti debet: Atq; arteriæ productio, quæ in dextrâ renem fertur, superiorem habet exortum, quàm illa quæ ad finitimum tendit.

Pag. 912.

Tum à parte posteriore in anteriore. Græcè: *ἡ ἀριστερὴ τέρμα.* Hoc est, ab anteriore ad posteriora.

Lib. XVII. Pag. 918.

Nicolaus Reg. Quod si ipsum primū mouēs (quod est princeps animæ facultas) respexeris, musculi rationem instrumenti habebunt: sin ad os quod ab ipsis mouetur, non, sed hanc effectorem habebunt rationem. Græca dictio accuratius mentem Galeni exprimit: *ὅπου δὲ ἂν τὸ πρῶτον αὐτοῦ (αὐτοῦ τῆς ἀναισθησίας) ἀρτηρίας αὐτοῦ εἰς τοὺς ὀφθαλμοὺς ἵαται, καὶ τὸν αὐτοῦ ἀρτηρίαν εἰς τὸν ὀφθαλμὸν ἵαται, καὶ τὸν αὐτοῦ ἀρτηρίαν εἰς τὸν ὀφθαλμὸν ἵαται.* Hoc est: Ad primū igitur mouens (quæ princeps animæ facultas existit) musculi comparari, instrumenti rationem obtinēt: ad os autē, quod ab ipsis mouetur, & illā, & rationē eius opificis.

Pag. 919.

Quoniam autem nonnulli corporū elementa ea substantiis omnino posuerunt, vt naturæ artificio coniungi nequeant, Græcè habetur: *ἡ δὲ ἰσχυρία τοῦτο ποιεῖται, καὶ τὸν αὐτοῦ ἀρτηρίαν εἰς τὸν ὀφθαλμὸν ἵαται, καὶ τὸν αὐτοῦ ἀρτηρίαν εἰς τὸν ὀφθαλμὸν ἵαται.* Hoc est: Quandoquidem nonnulli elementa corporum talia substantiis iniōo constituerunt, vt coalescere naturæ artificio non possent.

Pagina 924.

Licet autem ipsam periclasiam naturam vel ex ipsis hominibus, Græcè: *ἡ δὲ τῆς αὐτοῦ φύσεως ἀνθρώπου ἡ φύσις αὐτοῦ εἶναι αἰσθητικὴ.* Quod est: Cernere autē non licet quandam rationatricem naturam, vel in ipsis etiam hominibus.

Pag. 925.

Neq; (quod dixi) contraria de ipsis vniuersi elementis opinio, quam temerē quidam posuerunt, inhiæseris. Quæ oratio aures grammaticorum offendit. Græcè autem legitur: *ὡς δὲ δὲ τῆς αὐτοῦ φύσεως ἀνθρώπου ἡ φύσις αὐτοῦ εἶναι αἰσθητικὴ.* etc. Hoc est: Nisi (quemadmodum dixi) refragetur aliqua opinio, de elementis vniuersi concepta, etc. *αἰσθητικὴ* siquidem est resistere, refragari, reluctari.

Eadem pagina.

Non igitur soli medico opus de Vsu partium est vtile, sed multo certē magis medico philosopho, qui totius naturæ scientiā studeat sibi comparare, eūmq; oportet his sacris initiari. Græcè legitur, *ἡ αὐτὴ φύσις αὐτοῦ εἶναι αἰσθητικὴ.* Quod oīs vertimus: luxta cuius indagatiōē nos conseruare oportet. Licet etiam ad verbum reddere: In cuius quidem indagatiōe oportet oīs diem vltimam claudere.

Pag. 928.

Omnia latina exemplaria habent, vel iaculis infixæ: fortē ob inadvententiam typographi. Le-

gendūmq; est, infixis.

Lib. III. de placitis Hippocrati &

Platonis. Pag. 970.

Andernacus. Cōmuniter reliqui huc ferri videntur. Felicianus: Pleriq; omnes verō in hac sententiam propendere ac ferri mihi videntur. Græci codices impressi habent: *αὐτοῦ δὲ πρὸς ἀνθρώπου αἰσθητικὴ φύσις αὐτοῦ εἶναι.* Cæterū verus quidam habet nō *αὐτοῦ*, sed *αὐτοῦ*. Hoc est: Cōmuniter autem mihi videntur isomores. Atq; ita legendum esse, in primis docet illa Galeni præcedens dictio, *αὐτοῦ δὲ πρὸς ἀνθρώπου αἰσθητικὴ φύσις αὐτοῦ εἶναι.* Hoc est, Cōmunem impræsentiarum in clunanonē appellauit Chrysippus, cōmune hominum opinione.

Pag. 977.

Nisi clarē Homerus in lus percenset. Felicianus: Nisi his carminib; Homerus exprimit. Græcè: *δὲ πρὸς ἀνθρώπου αἰσθητικὴ φύσις αὐτοῦ εἶναι.* Sed corruptè legitur *δὲ πρὸς ἀνθρώπου αἰσθητικὴ φύσις αὐτοῦ εἶναι.* Itaq; verendum est: Clarē Homerus (vt arbitror) in lus percenset.

Lib. VI. Pag. 1090.

Andernacus. Sed temporis spacio animal offenditur, iecore in totius corporis tabern (quam atrophiam vocant) & pallorem elanguescente. Felicianus: Iecore. n. debilitato, sensus animal, moriq; temporis, laxatione in alimento & colore contrahit. Græcè: *αὐτοῦ δὲ πρὸς ἀνθρώπου αἰσθητικὴ φύσις αὐτοῦ εἶναι.* Hoc est: Quæ nos vertimus: Sed temporis spacio animal læditur, nutrimentūq; vtu non promouetur, ac pallidū contrahit colorem, iecore malè affecto.

Pag. 1099.

Maxima autem fide, iecur nullum humorem in animalis particulārum nutrimentū cordi præparare, sed ipsum vniuersam eius speciem absolueret, quod vna sit vena quæ ex iecore aut corde procedat, altera verō nō item contrā enascatur ex alia ipsorum parte, quæ elaboratū humorem in totum corpus deducat. Felicianus: Iecur verō nullum humore in alimentū membrorū animalis cordi præparare, sed ipsum totū humore formam perficere, inde argumentū maximū habere possumus, quod vna tantū vena cernitur à iecore seu à corde exoriri: neq; alia quæ plū ex alia parte seu iecoris seu cordis extat, quæ humorem ipsum & succum iā cōcoctum in totum corpus semel traducat. Vterq; autē ipsorum coactus est cum mendofo codice hallucinari. Legitur autem in vetustissimo quodā, *τὸ πρῶτον δὲ τῆς αὐτοῦ φύσεως ἀνθρώπου ἡ φύσις αὐτοῦ εἶναι αἰσθητικὴ.* etc. Quæ nos conuertimus: Quod cum vna sit vena quæ ex iecore in cor præcedit, nulla alia enascatur ab altera ipsius cordis parte, quæ elaboratū humore in totum corpus deducat.

Lib. VI. Pag. 1136.

Andernacus. Merito igitur generatur hic spiritus in cerebri ventriculo. Felicianus: Verisimilius igitur est spiritum hunc in cerebri ventriculo oriri. Græcè legitur: *αὐτοῦ δὲ πρὸς ἀνθρώπου αἰσθητικὴ φύσις αὐτοῦ εἶναι.* Hoc est: ratiōi autē est consonum, hunc spiritū gigni iuxta ventriculos cerebri, etc. Etenim animalis spiritus,

non

nō in ventriculis cerebri, sed in plexu reniformi, qui iuxta illos est, gignitur: unde in ventriculos eructatur, ut illinc, veluti ex quibusdam fonticulis emanans per nervos, uniuersis animalis particulis motum atque sensum largiatur.

Pag. 1146.

Quemadmodū gustus humores. Felicianus: Sicuti succos gustatus. Græcè legitur: *haldiaipis yfira y xynis*. Hoc est: Quemadmodum gustus sapores. Aut enim visum colores sentire, perinde ut gustus sapores percipit.

Ibidem.

At coloratum corpus simul cum eo cognoscit, quemadmodum gustus quod humores obstat. Felicianus: Cum illis verò posita. coloratum corpus, sicuti gustus, id quod succos in se habet, Græcè *haldiaipis yfira y xynis yfira*. Quod est: Quemadmodum gustus id quod sapores continet: *xynis* liquidum, non modo humorem, sed saporem etiam cerebri significat.

Pag. 1151.

Quemadmodū & tactilis sensus instrumenta sensus renixa. Felicianus: Quemadmodū verò sensus tactus sensibiles per eō cursum. Græcè, *haldiaipis yfira y xynis yfira y xynis*. Quod est: Quemadmodum tangendi sensus sensibiles, per renixum.

Ibidem.

Humorum dignatio corripitur. Felicianus: Succorum dignatio etiam interit. Græcè: *haldiaipis yfira y xynis yfira y xynis*. Quod est: Corripitur saporum dignatio.

Pag. 1166.

Qui clarius manifesti sunt quemadmodū & alijs complures, quasi non habita illius duntaxat ratione, qui à me illum accepturus erat, sed tanquā aliorum quos imperitoriorū illo manus esset peruenturus, à me esset scriptus. Cui etiam suffragatur Feliciani tralatio. At græcus codex habet in hunc modum: *haldiaipis yfira y xynis yfira y xynis*. Quod est: Qui clarius manifesti sunt quemadmodū & alijs complures, quasi non habita illius duntaxat ratione, qui à me illum accepturus erat, sed aliorum etiam imperitoriorum eo, quibus debebat item communicari.

Lib. ix. Pag. 1138.

Andemacus: Itaque scopi secundum quos singula hæc recte alijs aggrediaris, omnino pauciflua: nempe in ipsis exercitatio, quæ non parum temporis requirit. Felicianus: Fines igitur quibus singula hæc recte aliqui tractare possent, prorsus pauci sunt: exercitatio scilicet, quæ tamen non paruo tempore videtur indigere. Græcè legitur: *haldiaipis yfira y xynis yfira y xynis*. Quod sic verterem: Scopii igitur secundum quos singula horum recte tractare quis possit, omnino sunt pauci. In ipsis autem exercitatio, haud exiguum tempus desiderat.

## SECTIONE SECUNDA.

*Lib. Num. ar. tuenda seniatu ad medicinalem artem spectet.*

Pag. 4.

I Vnius Paulus: Ad nervorum sutorem. Græcè: *haldiaipis yfira y xynis*. Hoc est: ad illum qui nervis cōsūt.

Pag. 11.

Sic veritas, aut perveritas potius carne flosseri: Dignior est cunctis medicis mortalibus artem. In alijs tamen exemplaribus legitur, doctiori. Vnōque autem sententia potest est corrupta. Græcè siquidem legitur:

*haldiaipis yfira y xynis yfira y xynis*.

Cuius sententia est:

Vnius existens, recte tamen omnia callens.

Pag. 44.

Duabzque artibus præpositis hæc singula deservit. Græcus antiquus habet: *haldiaipis yfira y xynis yfira y xynis*. Hoc est: Duabzque artibus separatim harum singula inserviant.

*Lib. i. de alimentorum facultatibus.*

Pag. 19.

Martinus Gregorius: Deinde affligent. Græcè: *haldiaipis yfira y xynis yfira y xynis*. Hoc est: Ac deinde circūlinentes. Monet siquidem ille Galenus, ut posteaquam cavitatem cydonij melli repleverimus scammotio, malum ipsum obducamus, at que circūlinamus, luto videlicet, aut fermento: ac dein afflemus. Qui modus observatur hodie in preparando scammotio.

Pag. 61.

Et omnium maxime per alium subfidet. Græcè: *haldiaipis yfira y xynis yfira y xynis*. Quod verterem: Inter ceterosq. maxime per alium descendit.

Lib. ii. Cap. de fugacibus fructibus.

Pag. 102.

Martinus Gregorius: Vtuntur autem omnes ipsa cucurbita foliis et magis quam alio quovis fructuum esculentorum: quod ceteris fructibus sunt aridiores ac sicciore. Hoc tamen non reperitur in græco exemplari: nec videtur esse rationi cōsonum: cum cucurbitæ, nulli aut certe paucis aliorum fructuum, humiditate cedant.

Pag. 118.

Læditur autem maxime ab ipsorum esu, quod aut inflammetur, aut scirrhus obducitur. Græcè: *haldiaipis yfira y xynis yfira y xynis*. Quod est: Extreme autem ab ipsarum (palmarū videlicet) esu læduntur, si obsecum phlegmone, aut scirrhus fuerit. Neq. enim tam perniciosum aut esse fructum palmarū Gale nus, ut ex solo ipsarum esu possit hepar aut inflammationem, aut scirrhum contrahere: at iam inflammatur aut scirrhus induratur hepar, ab usu phœnicum maxime ob id pronunciat.

Lib. iii. Pag. 169.

Martinus Gregorius: Quoniam non temere in ventriculo cuiusquā coagulatur. Græcè: *haldiaipis yfira y xynis yfira y xynis*. Quod est: Ac



proinde rarò alicui fuit coagulatum in ventre.

*Lib. de euehymia & cacochymia.*

Page 107.

**F**erdinandus Bslamius: Haud sanè exquisitis  
admodum cibus vtatur. Græcè: *ὀλίγον ἀκριβέως  
κατασκευασμένον*. Hoc est: Nec cibus admodum  
exquisitus indigit;

*Lib. de cognoscendis curandisq; ani-  
mi affectibus. Pag. 275.*

**B**ernardinus Donatus: Nec tamen illud dixerim melius esse, etc. Est tñ codex corruptus, qui sic instaurari debet: *in pñ alijs apñlijs à pñsarijs alijs*, etc. Quod nos vertimus: Nisi forte melius esse videatur, in iñio, etc.

Page 181.

Magnum quippe fuerit credo, si nullus eorū  
moderatur in cibo & potu sumendo sit visus.  
Quodd si templum hoc honore afficere decreuit,  
etc. Græce habetur: *μῆναι γὰρ εἰς τὴν ἑορτήν ὡς εἰς  
ἀντικείμενον τῆς ἐκείνης τοῦ ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ  
ἐκείνου τοῦ ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ τοῦ ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ*  
Quod est: Magnum quippe non fuerit in cibo  
& potu illi temperantur videaria. Sed si te hoc  
honore afficere decreuit, etc. Vult namq; in  
loco Galenus (id quod paulo pōt fubd) vñ d  
ceteros modō, sed nos etiā ipfos vincamus,  
modestus nempe, & continentius viuentes hodie,  
quā heri.

Page. 293.

Ac per hoc ipsum præceptum singulis diebus  
in singulis huiusce operis partibus, nos ipsos ex-  
erceamus. Quod quidem cum cæteris ex puerili  
disciplinis cōtingat, aliis illis, quibus in hoc for-  
tuna non fuerit, ferò tandem ea ratione quam  
exposui, continet. Græcè habetur: *ὅτι οἱ μαθηταὶ*  
*οὐκ ἔμελλον ἀπολείπειν τὰς ἐργασίας αὐτῶν καὶ πορεύεσθαι εἰς ἄλλον τόπον.*  
*ἀλλ' ὡς ἐπὶ τοῦτο ἕστησαν, οὕτως καὶ ὑμεῖς ἵστασθε τὰς ψυχὰς ὑμᾶς ἐπὶ τὴν ἐργασίαν ταύτην, ὥστε μὴ ἀπολείπετε αὐτήν· ὅτι ὁ καιρὸς οὗτος ὀρθρινός ἐστιν.*  
Quod est vertendum: Cæterum si operis  
particularibus circa hæc præcepta singulis  
diebus se exerceant, quod quidem ex prima ed-  
icatione contingit cæteris, id infelicibus illis po-  
stea tandem cōtinget ex quo exposui, ratione,  
pag. 396.

Etenim exiis in quibus ipsa se exercuerit, multo existit generosior. Quo in loco reddendo, interpretis est græcæ pluralim securus, quæ habet: *ἡ δὲ ὑπερσφαιρα*: id quod præstiterit vertere: Eo quod se exercuerit.

*Lib. I. de sanitate tuenda.*

Pag. 348

**L**inacres: Nempe per nares genalique Græcè; κατὰ τὴν ἰστίαν, καὶ κατὰ τὴν χιπάραν. Hoc est: iuxta nares & palpebras. Aut namq̃ Galenus, oculum explo-  
dere quicquid in eo extremè gignitur, nō per  
nares, sed per foramen quoddam, quod in angu-  
lo interiori oculi, iuxta nares, intra palpebrarū  
confistit: id quod in oculoꝝ anatome satis su-  
perius iam demonstrauerat.

Lib. 12. Pag. 356.

Linactr: Ar procedēte tempore, vbi iam adoleuit. Græcè: *ἔτι ὅτε παρέρχεται ἐπὶ τῆς ἡλικίας*. Quid est: Vbi iam adoleuit.

Page 443

Frigidi nauci fucci marcor em. Græc: *ναιμα*

Hoc est: Frigidi enim, sopores ac proluxiores somnos inducunt.

Lib. v.      Pag. 476.

Linacer: Hæc facies, ubi naturalem planè habi-  
tibus crura receperunt. Græcè: *ἰσχυρὸν καὶ οὐκ ὀρθόν*  
*ὑποφέρει, κατὰ φύσιν ἀναστρέφεται καὶ οὐκ ἄλλως*. Hoc est: Hæc  
ibi perficiendi, si exactè secundum naturam se  
habeant crura.

*Lib. I. de simplicium med. facultatib.*

Page 474

**T**heodoricus Gerardus. Verū ē q uodd sensu  
cōmunicat, licet suggerere. Græcē : *αἰσθητικὴ  
ἐκφορά* est *αἰσθητικὴ ἐκφορά* *αἰσθητικὴ ἐκφορά*. Hoc est: Re-  
cordari autē eū, cui talis sensus fuerit cōmuni-  
catus, possibile est. Galenus itaq ait, impossi-  
bile quidē esse, ut exatē quis interpretetur di-  
fferentias astrigentis, autēris, atq acerbis saporis:  
fieri autem posse, ut recordetur illorum, vbi ta-  
lis semel gustarit.

Lib. 111. Pag. 64

Theod. Quod si ad id nōnihil faciat ipſius raritas. Græcè: *οὐτενὸν μὲν ἔστιν ὅτι ἡ ποσὶς αἰσθάνεται*. Hoc eſt: Cōducit itaq; ad hoc etiā ipſius raritas.

Lib. 1117. Pag. 6

Theod. Diversis tamē haecenus viribus omphacis acenij succus constant. Græcè habetur: *διφρακς πικρὸς τῶν ῥιζῶν ἀνὰ πλάτῃς αὐτοῦ ἡ ὑπόκρισις*. Quod est: Earenus autē facultate differt ab aceto omphacium. Pag. 690.

Etenim ad hypochondria ardens, praestantior est succus omphacis, quam scen. Graece: *ἰσχυρὸν*. Hoc est: Praestantior est ipso aceto. Nam acetum succus non datur praeter ipsum acetum. Exprimatur autem ex vva immatura, cuius cremor appellatur omphacis.

Pag. 70

Ac partim in hac coniugatione. Græcè: ὁμοίωμα  
*polemia spoliū nō expugnāti et apertius.* Hoc est: Atque hæc  
 quidem, in hac temperamenti coniugatione,

Page 78

Omnia saltem cuti nostrae imposita. Græcè  
*παντα ἐπὶ τῆς ἀνθρώπου*. Quod est: Omnia igitur, etc.

b. v. Pag. 7

Theod. Tantôq; siccius, quanto vincit sicci-  
tas. Gracè habetur in *rebus d' Egypte, q' longè  
superat, etc.* Quod est: Etenim autem humidius,  
quatenus siccitas superat.

Página 73

Ex familiari animantis natura fit alteratio.  
Græcè: *ἡ συνήκης ἡ φύσις τοῦ ζώου μεταβάλλεται.*  
Quæ sonant: Ex propria animali materia ipsam  
alterationem fieri.

Page 714

Alia verò ex putrescente arefcenteq; genera-  
tionem fortita. Græcè: *ἐκ τῆς σαπνύσης ἀναγεν-  
νῆσιν*. Quod est: Hæc autem, à putredine ex-  
asperata nte ducit originem.

Lib. vt. Pag.

Theod. Idcirco mihi videntur veteres coronis ex eo plexis vti solere. Græcè additur: *κατὰ τὴν συνήθειαν*. Hoc est in conviviis.

Page 80

Equidem vidi puerum, quandoq; octo rotis  
mensi.

mensibus morbo comitiali liberum. In græco ex emplari additur: *ἡ δὲ πύλη ἰσχυρὴ*. Hoc est: Ex quo tempore, vel quandiu radicem ipsam gestaust.

Page. 819.

Ceterum licet zingiber & piper album, Græcè legatur: *ἡ δὲ πύλη ἰσχυρὴ*. Hoc est: Et piper longum. Page. 820.

Cui accedit & ea quæ ex falis est farinæ natura. Græcè: *ἡ δὲ πύλη ἰσχυρὴ*. Hoc est: Et ea quæ ex falis est, & ea quæ ex farinæ natura.

Page. 824.

Sicvri sanè etiam coitus semen pudendo cuncta. Græcè legatur: *ἡ δὲ πύλη ἰσχυρὴ*. Hoc est: Cuius tempore.

Page. 825.

Sed quæ illi amaritudinis dū potatur adfunt opera. Græcè: *ἡ δὲ πύλη ἰσχυρὴ*. Hoc est: Sed quæcumque amarissimo pharmaco, dum bibitur, adfunt opera, etc.

Page. 826.

Quinq; partibus succipus erat. Græcè: *ἡ δὲ πύλη ἰσχυρὴ*. Quod magis appositè venitur. Ad vtrumq; aut succi porpio erat quin cupia. Page. 866.

In femine quidem viuente habens qualitatē acidam. Græcè habetur: *ἡ δὲ πύλη ἰσχυρὴ*. Hoc est: Iuxta semen, vel circum semen. At quippe Gale nus id qd res est: nempe quicquid in mīlo Medico, siue citrio, iuxta semē adhæret, & vnde exprimitur succus, cum acore quodā siccare. Quis dū quidem semen citri minime talem facultatē sortiri, vel ex gustu intelligi poterit.

Lib. viii. Page. 873.

Theod. Piri quidē syluestris prorsum atq; ab solute amarua est: sicut fistus. Græcè habetur: *ἡ δὲ πύλη ἰσχυρὴ*. Hoc est: Acerbua.

Page. 875.

Veltri & chartæ combustæ cinia, nisi quatenus infirmior est, papyri. Græcè: *ἡ δὲ πύλη ἰσχυρὴ*. Quod est. Nisi quatenus cinis papyri est infirmior. Cui lectioni suffragatur Paulus, cuius verba sunt hæc: Ad singula tamen papyri cinia multo inferior est.

Page. 884.

Non tamen nec reficere, nec refrigerare manifestò potest. Græcè: *ἡ δὲ πύλη ἰσχυρὴ*. Quæ sonant: Ceterum nec reficere, nec humectare manifestò potest.

Page. 887.

Caries lignorū, & maximè quæ particeps est astrictionis. Græcè: *ἡ δὲ πύλη ἰσχυρὴ*. Quæ sonat: Caries lignorum, eorum maximè, quæ astrictione sunt prædita.

Page. 889.

Nonnulla item amara qualitatē obtinet. Græcè: *ἡ δὲ πύλη ἰσχυρὴ*. Quod est: Nonnullam item acrem qualitatem.

Page. 899.

Sion quantum gustu odoratum est. Græcè: *ἡ δὲ πύλη ἰσχυρὴ*. Quæ sonat: Sion quatenus gustui vtrumq; aromaticum est, etc. Nihil siquidem est odoratum gustui, sed ipsi tantū olfactui. At quæ aromatica sunt, ea simul mouent olfactum & gustum.

Page. 905.

Erimium habet humiditatis. Græcè habetur oppositum: *ἡ δὲ πύλη ἰσχυρὴ*. Hoc est: Erimium habens humiditatis.

Page. 906.

Phorbij femine ad leucomata cum melle applicant. Græcè legatur: *ἡ δὲ πύλη ἰσχυρὴ*. Hoc est: Vtrumq;.

Page. 926.

Ceterū vtriusq; in medio est spuma litri. Græcè habetur: *ἡ δὲ πύλη ἰσχυρὴ*. Hoc est: In medio autem amborum est nitri sapōr. Nam cum paulo superius disputasset de sapore tum a phronitri, tum falis, postea subdidit, inter illos mediam nitri saporem consistere.

Page. 928.

Dictum tamen paulo antè est, aphrolitum in medio consistentem habere facultatē aphronitri & falis. Corrigiti codex græcus mendosus debet, qui habet: *ἡ δὲ πύλη ἰσχυρὴ*. Quandoquidē esse legē dum *ἡ δὲ πύλη ἰσχυρὴ*, hoc est, nitri, ex capite de sale liquido cōstat.

Page. 942.

Quæ in editionibus domorū, in quibus fornaces extructæ sunt, partibus colligitur. Græcè: *ἡ δὲ πύλη ἰσχυρὴ*. (sed legendum *ἡ δὲ πύλη ἰσχυρὴ*) *ἡ δὲ πύλη ἰσχυρὴ*. Hoc est: Quæ in editionibus partibus parietū ipsius fornacia colligitur.

Page. 981.

Quod patientis inguinibus. Græcè legatur: *ἡ δὲ πύλη ἰσχυρὴ*. Hoc est: Iliis.

Page. 1000.

Capitibus maxime sale in veteratarum, ad sedis fissuræ vrebatur quidam. Græcè additur: *ἡ δὲ πύλη ἰσχυρὴ*. Hoc est: Vitis.

Page. 1004.

Novi autē nostratū quoddam ossa poni exhibuisse. Græcè legimus: *ἡ δὲ πύλη ἰσχυρὴ*. Quod est: Novi e quidem nostratū quoddā, propinantes humanā ossa cōbusta. Page. 1006.

Porro si laueria ea, vlietisq; ignea in aqua nata deposita, ipsam efficiunt cum renuente calescentem, adeo vt & putrefaciat. Sed nonnunquam reliquum terrenum est, moriua expers: id quod maximè implendus, cicatriceq; claudendus vlcibus humidus est vnie. Græcæ codex manu scriptus habet in hūc modum: *ἡ δὲ πύλη ἰσχυρὴ*. Quæ sic nos vertimus: Quod si ea, vbi exvita fuerint, laueris, quicquid habebant igneum, id totum in aqua ponunt. Ac proinde aqua quidem ipsa, excalescens cū tenuitate redditur, adeo vt putrefaciat interdum. Reliquum verò terrosissimum, moriua expers efficitur, maximèq; implendus, & cicatrice claudendus vlcibus humidis sanatur.

## SECTIONE TERTIA.

### Libro de causis respirationis.

Page. 25.

Ornarius: Sic etiā circa costas musculi, quorū in medus ipsius regionibus duo et viginti

KK

numerantur, duo quidem primarum costarum. Graeci codices antiquissimi habent in hunc modum: *ἑνὸς δὲ τῆς αὐτῆς τῆς αὐτῆς πᾶσι, αὐτῆς τῆς αὐτῆς πᾶσι*. Quae in hunc modum nos vertimus: Sic etiam costarum musculi, qui quidem in mediis regionibus ipsarum cōstitant, numerantur vigintiduo: ac praeterea duo alij primarum costarum, &c.

Ibidem.

Ex dictis verò circa spinam musculis. Graeci: *ἐν τῇ ἀσπίδι τῇ αὐτῇ τῇ ἀσπίδι*. Quod est: Ex rectis vero, qui iuxta collum cōstitunt.

Ibidem.

Qui demum circa superiorem ventrem sunt musculi. Graeci: *αὐτῆς τῆς αὐτῆς πᾶσι*. Hoc est: Qui verò in abdomine, siue epigastrio sunt musculi. Etenim superiorē ventris Galenus sēper vocat ventriculum: Epigastriū autem, est tota illa membrana carnosa, quae molem intestinorum continens, ex cute, pilgustidine, quatuor obliquis, duobus transversis, non dūcque rectis musculis cōstat.

Ibidem.

Violentæ verò, tum sima humerorum, tum interna mediarum costarum pars. Graeci leguntur: *ἡ ἐν τῇ ἀσπίδι τῇ αὐτῇ τῇ ἀσπίδι*. Quae sonant: Violentæ verò, tum sima si apularum, tum musculorum intercostalium interna pars.

Ibidem.

Similiter autem & expirationis, inviolentæ quidem, musculi circa superiorem ventrem: violentæ verò, externa mediarum costarum pars. Graeci habetur: *ἡ ἐν τῇ ἀσπίδι τῇ αὐτῇ τῇ ἀσπίδι*. Quod est: Similiter etiam & expirationis, an violentæ quidem, musculi abdominis: violentæ verò, musculorum intercostalium exterior pars.

### Lib. I. de difficili respiratione.

Pag. 28.

Cornarius: Iuxta quas, aut veloces, aut tardæ appellātur. Graeci: *αὐτῆς τῆς αὐτῆς πᾶσι*. Quod nos vertimus: Iuxta quas, veloces aut tardi dicuntur motus. Quippe voces illae, *αὐτῆς τῆς αὐτῆς πᾶσι*, referuntur apud nos *veloces*, hoc est, ad motus de quibus Galenus paulo superius egerat.

Similiter vbi paulo inferius Cornarius vertit.

Secundum quas aut magnas, aut parvas appellant. Vertendum erat: Aut magni, aut parvi appellantur.

Pag. 35.

Viriliter multum virgente. Graeci habetur: *αὐτῆς τῆς αὐτῆς πᾶσι*. Quod est: Sufficenter virgente.

Pag. 35.

Sed si viriles multum sit exoluta. Graeci: *αὐτῆς τῆς αὐτῆς πᾶσι*. Quod est: Ceterum si quæ ad vsum pertinent, exoluta sufficienter fuerint.

Ibidem.

Eius videlicet: quæ circa expirationem con-

sistit Graeci: *αὐτῆς τῆς αὐτῆς πᾶσι*. Quod est: Earum videlicet, quæ circa inspirationem cōsistunt.

Ibidem consequenter.

Quare immodestia. Graeci: *αὐτῆς τῆς αὐτῆς πᾶσι*. Quae sonant: Quemadmodum etiam immoderatio.

Ibidem.

Atque ita sanè esse, rano ipsa poscit: repugnat autem quippiam eorum, quæ evidentè apparent. Graeci leguntur: *αὐτῆς τῆς αὐτῆς πᾶσι*. Quod est: An igitur sic ratio poscit, repugnat autem quippiam eorum quæ evidentè apparent? Sic autem esse legendum, atque vertendum, indicat oratio subdita, vbi Galenus ait: Ego quidem omnia hæc cōsentientia reperio.

Pag. 43.

Nulla est autem differentia, quod ad id quod coarctatum est aminet, ut pulmo nō possit, &c. Graeci: *αὐτῆς τῆς αὐτῆς πᾶσι*. Quae sonant: Perinde autem est, ad hoc ut pulmo compressus non possit, &c.

Pag. 49.

Contractiones itaque istos facis circa horum concitationem, nonnunquam magnam inspirationem facere possunt. Graeci habetur: *αὐτῆς τῆς αὐτῆς πᾶσι*. Quae sonant: Contractiones sanè thoracis circa horum concitationem, nunquam magnam expirationem facere possunt.

Pag. 54.

Quantum & adhuc eximium quiddam ad Inaequalitatis erat generationem respiratio habebit, præter pulsuum rationem. Graeci: *αὐτῆς τῆς αὐτῆς πᾶσι*. Quod est: Quinens abundans quid, ac veluti auctarium, ad inaequalitatis generationem respiratio habebit, præter pulsuum rationem.

Pag. 55.

Nimirū quod & vix aliquid plus, aliquando minus, rationem ab eo quod, secundū naturam est, amoveant. Ego verò, non vix, sed cum græco potius phantasmata verterem.

Lib. III. Pag. 105.

Cornarius: Pro præter quod per distantia organon respiratio fit motus. Graeci magis perspicua est sententia: *αὐτῆς τῆς αὐτῆς πᾶσι*. Quod vertimus: Quia per distantia organa respiratio nis moveatur.

Pag. 112.

Densus & magnus fit spiritus. Graeci: *αὐτῆς τῆς αὐτῆς πᾶσι*. Hoc est: Densus & parvus fit spiritus.

Pag. 112.

Densum autem & magnū eum, qui inflammationem respiratoriorū organorū indicat, haud quaquā quis dixerit, nisi etis calidus esset. Graeci legimus: *αὐτῆς τῆς αὐτῆς πᾶσι*. Quod vertimus: Densum autem & magnū, indicare incendium organorum respiratoris, nemo rectè dicere possit, &c.

Lib.



Lib. II. de dignotione puluum.

Pag. 181.

Herm. Quæ cum ita sint, optimam rationē dā  
bimus operam vt monitremus dignoscendārum  
singularum dimensionum: ac de primo dicemus  
longitudinem. Græcè habetur: *ἡ μήκος τῆς ὀφθαλμοῦ*  
*ἢ ἡ μήκος τῆς ὀφθαλμοῦ* ἢ ἡ μήκος τῆς ὀφθαλμοῦ  
ἢ ἡ μήκος τῆς ὀφθαλμοῦ. ἢ ἡ μήκος τῆς ὀφθαλμοῦ  
ἢ ἡ μήκος τῆς ὀφθαλμοῦ. Hoc est: Quandoquidem igitur hæc ita  
habent, danda opera est, vt dem ostendamus mo-  
dum optimæ dignotionis in dimensionibus sin-  
gulis. Ac primo iam de illa dicamus, quæ versat̃  
circa longitudinem.

*Lib. I. de causis pulsuum.*

Page 418.

**H**æc. Causæ quæ pulsus variant, partim genericæ, partim speciales sunt, partim tantum alterationis, Græcè habetur: *τῶν τῶν ἐκ γενεῆς ὄντων αἰτίων, καὶ τῶν ἐκ τοῦ σώματος αἰτίων, καὶ τῶν ἐκ τοῦ περιβάλλοντος αἰτίων.* Quæ sic multo aptius veniuntur: Causarum quæ immutant pulsus, hæc quidem generationis ipsorum sunt causæ, hæc vero tantum alterationis.

Pag. 419.

Et quæ his succedunt externæ. Græcè: *αγαθά  
καὶ κακά ἐξ ἑξωτερικῶν*. Hoc est: Et præterea  
quæ harū sunt procatactica, præcipientive.

Ibidem.

Ac quæ nunc commemoravimus, externæ ap-  
pellantur. Græcè: *τὰ ἐξ ὧν τὸ διπλοῦν, ὑπερ-  
καταναίξιον*. Quod est: Hæ igitur, quas nunc  
recitavimus, procataceticæ causæ appellantur.

Ibidem.

Quæ hæc etiam præcedūt, quæ quidem in humoribus sunt, præcedentes, Græci: τὰς ἐν τοῖς ὑποκρίμασι καὶ τὰς ἐν τοῖς χυμοῖς. Quod est: Quas verò ante has, illæ nempe quæ circa humores verfantur, antecedentes, &c. Multo autem clarius aliequins Galeni sentiamus, si hanc orationem cum superiori coniunxeris, in hunc modum: Hæc igitur quas nunc recitavimus, pro catarrhice causæ appellantur. Quas verò ante has, scilicet exposuimus, antecedentes, &c. Nam putare quod præcedentes vocatz, pro catarrhicas vñquam præcedant, hominis planè fuerit in Galeni dogmatis minimè exercitati. Si quidem ut præcedentes causæ vocatz coniunguntur signis, sic ipsæ giuntur à pro catarrhici.

Ibidem.

Breuitate habebat : Quæcumque extra corpus posita quicquam in corpore alterât, externe vocatur. Quæ has enim antecedunt, præcedentes causæ corporis affectum. Hi affectus ubi continentes moueant, euadunt præcedentes illarum causæ. Græcè : *uettior γὰρ αἰτία, τὴν πρὶν εἶναι τὴν ποτ' ἐκείνην*, ἀδύναμις δὲ τὴν κατὰ τὸν αἰσιν, μετατρέφεται λήγουσα, ὡς τὸν ἀποφθίνοντα διὰ τοῦ τοι οὐκ ἐστὶν ἀλλοιοῦνται αἰσιν διὰ τὴν ἀπώλειαν, τὴν δὲ συνιστάσαντα δύναμιν, ὡς τὸν περὶ τὴν ἀπώλειαν αἰσιν αἰσιν.

Quæ solum in vniuersum autem, quæcumq; extra corpus posita, aliquid in corpore immutant, procatartice causæ, siue præincipientes vocantur: vt pote incipientes prius quam ipsæ dispositiones corporum. Quæ quidem dispositiones, si quando exciderint continentes, ipsarum an-

recedentes cauză redundantă.

Pag. 411.

Quum ex his causis pulsus proficiantur, omnes illorum variationes, casuarum necesse est comites sint alterationum. *Græcè: ἀπὸ τῶν αἰτιῶν τῶν παθῶν ἀδυνατῶν, τῶν σφοδρῶν καὶ ἐλαφίων, καὶ ἀπὸ τῶν αἰτιῶν τῶν ἀσθενῶν καὶ τῶν ἀσθενῶν καὶ τῶν ἀσθενῶν.* Quæ clarius interpres in hunc modum potuisset reddere: Cum autem secundum has causas fiat pulsus, necessum est ut omnes mutationes ipsorum, consequantur ad alterationes casuarum.

Pag. 411.

Sed de his qui ambigunt, perinde ac Archigenes errant, qui in Magnum disputat de pulsus celeritate. Nam à robore nō potius quàm ab imbecillitate proficiunt facultatis. Græce: *αὐτὸ τὸ ἐν τῷ ἀρρυθρῷ, ἰσχυρὸν ἀρρυθρῶς ἀρρυθρῶς, πρὸς μακρὸν ἀρρυθρῶς πρὸς ταχὺν ἀρρυθρῶς, οὐ τὸ ἐν τῷ ἰσχυρῷ πύλλω, ἀ ἀρρυθρῶς γίγνεται τὸ ἀναισθητόν.* Hoc est: Ceterum qui de his dubitant, in eundem cum Archigene errorem incidunt, qui in Magnum disputat de pulsus velocitate, quod scilicet nō à robore potius, quàm à languore facultatis proficiatur. Sic autē esse verendū, colligit Candidus lector ex alia castigatione quā subdam.

Ibidem consequenter.

Nam neutrum sequitur necessario, utrumque  
peculiaris celeritas roboris facultatis est. Vbi le-  
gitur Graece: *πῶταρ πῶτ' ὕψος εἰσέρχεται καὶ οὐρανὸν  
καὶ ἀνθρώπων, καὶ τὰ πάντα ἐξιστοῦσιν*, &c. Quod est:  
Magis tamen est familiaris celeritas quidem ro-  
boris facultatis, atque caloris copiae. Itaque Ga-  
lenus Arctigeum impraesentiarum causans,  
quod contenderet pulvisum velocitatem non  
magis à robore, quàm ab imbecillitate vinum  
procedere: quum ipsa pulsus celeritas facultati  
vegete, quàm imbecilli, magis sit familiaris at-  
que genuina.

Pag. 419.

Celeres dicimus pulvis, itemque tardos esse, non ægrotis modo, verum etiam valentibus nonnullis. Quod naturaliter quidem illis confirmamus suppediret. Clarior tamen precipitur sententia Galeni ex græco exemplari: *ταχὺς γὰρ ἐστὶν ὁ πύλινος τὸν πύλινον ἀνθρώπον, ἀσθενὴ δὲ ἄνθρωπον, ἐν τῷ πύλινῳ αὐτοῦ, καθὰ τὸν πύλινον ἀνθρώπον ὅτις, ἐν τῷ πύλινῳ αὐτοῦ τὸν πύλινον πύλινον.* Hoc est: Celeres itaque, ac similes tardos pulvis, non ægris modo, sed inter sanos etiam, naturaliter nonnullis a se esse dicimus.

Pag. 410.

Semel quidem certe tardi, vel parui, si valida facultas sit, vt multum sit vfus remissus, nunquam. Græcè: *εὐμενὲς ἡδὺν ἡδὺν, ἡδὺν ἡδὺν, ἡδὺν ἡδὺν*. Quod est: Absolutè enim tardi, vel parui, haud vnquam existerit pulsus, facillimè vegera existente, vel si quæ ad vsum pertinet, admodum exoluta fuerint.

Pag. 414.

\* Paulus enim celerior pulsus est, ex mollitudine perfectus instrumentorum. Legendum tamen est iuxta græcam veritatem, non perfectus, sed profectus. Quippe ob in advertentiam ty-



Græcè: *κατὰ τὴν ἀναιρίαν* *ῥαγίζετο* *ἐν τῇ στήνῃ*. Quod est: Penuria enim ipse nutrimenti extinguitur, etc. Non autem omnis difficultas nutrimenti, eundem penuria existit: quum alimentum vitiosum, difficultatem quidem importet, penuriam verò non item.

Ibidem.

Quem marcorem Philippus vocat ex morbo senium: quem ferè habent senescentes, & interm iuvenes etiam. Græcè: *κατὰ τὴν γῆρας* *ῥαγίζετο* *ἐν τῇ στήνῃ*. Hoc est: Philippus hunc marasum vocat ex morbo senium. Atque invadit præcipue quidem, iam senescentes. Interdum autem, & consistentes ætate.

Pag. 351.

Iam verò etiam magis inæquales eos meritis esse, ne hoc quidem est obscurum. Græcè additur: *κατὰ τὴν γῆρας* *ῥαγίζετο* *ἐν τῇ στήνῃ*. Quod est: Ob viciniam.

Ibidem.

Longè enim frigidior, & ut ita dicam, letalior peripneumonia est morbus lethargicus. Græcè: *κατὰ τὴν ψυχρότητα* *ῥαγίζετο* *ἐν τῇ στήνῃ*. Hoc est: Si quidem, quantum se ipso homo crassior sit redditus, tantò etiam pulsus minor videatur.

Pag. 349.

Habes primas & simplicissimas pulsuum mutationes in celeritatè & tarditate: harum causas præcedentes & externas eadem invenitur ratione atque illæ, etc. Græcè: *κατὰ τὴν ψυχρότητα* *ῥαγίζετο* *ἐν τῇ στήνῃ*. Hoc est: Si quidem, quantum se ipso homo crassior sit redditus, tantò etiam pulsus minor videatur.

Pag. 351.

Ac quo sit vehementior. Græcè: *κατὰ τὴν ψυχρότητα* *ῥαγίζετο* *ἐν τῇ στήνῃ*. Hoc est: Et quantum vehementior fuerit, Ibidem paulò inferius (ubi legitur: Quò sit languidior) Quantum sit languidior, legendum est.

Ibidem.

Alterationes pulsuum, quædam in remissionem & vehementiam, & solæ sunt frequenter, & ab una causa. Græcè habetur: *κατὰ τὴν ψυχρότητα* *ῥαγίζετο* *ἐν τῇ στήνῃ*. Hoc est: Si quidem, quantum se ipso homo crassior sit redditus, tantò etiam pulsus minor videatur.

Lib. II. de præcognitione ex pulsibus.

Pag. 356.

Herm. Magna enim copia ex putrescentibus humoribus accretur. Græcè habetur: *κατὰ τὴν ψυχρότητα* *ῥαγίζετο* *ἐν τῇ στήνῃ*. Hoc est: In humorum putrefactionibus.

Ibidem paulò antè.

Fuliginosorum excrementorum ingentè colligi numerum. Græcè legitur: *κατὰ τὴν ψυχρότητα* *ῥαγίζετο* *ἐν τῇ στήνῃ*. Quod rectè vertitur: multitudinem. Numerus quippe nò de còtinua, sed dicitur de quætitate discreta.

Pag. 362.

Robur validior, omnè excipit causam parvè. Græcè: *κατὰ τὴν ψυχρότητα* *ῥαγίζετο* *ἐν τῇ στήνῃ*. Quod est: Validorum robur, relictatur omni affectui exiguo.

Pag.

Ibidem. Si item hoc tenas, lethargum ex ipso potius cerebro, phrenitium præcipue gigni ex tenui meningè, & ex sepro transverso. Græcè habetur: *κατὰ τὴν ψυχρότητα* *ῥαγίζετο* *ἐν τῇ στήνῃ*. Quod est: Si noris autem, quod lethargus quidem gignitur potius in cerebro: phrenitis verò, præcipue in eius tenui meningè, atque etiam in diaphragmate. Lethargus iraque non ex cerebro, sed ex pituitoso humore collecto in cerebro: ut phrenitis non ex tenui meningè, sed ex bile in illa accretua, suam ducit originem.

Pag. 351.

Conniunt ferè oculis. Græcè: *κατὰ τὴν ψυχρότητα* *ῥαγίζετο* *ἐν τῇ στήνῃ*. Quod est: Ut plurimum conniunt oculis.

Pag. 358.

Vteri suffocati pulsus. Græcè: *κατὰ τὴν ψυχρότητα* *ῥαγίζετο* *ἐν τῇ στήνῃ*. Hoc est: Suffocationis indultus ab vtero, pulsus. Vterus quippe minime suffocatur, sed ubi ex plenitudine vel inanitione convellitur, respiratio- nis organum plurimum facit negotij, animalique in maximam anxietatem perducit.

Lib. I. de præcognitione ex pulsibus.

Pag. 323.

Hermannus: Non esse venientium tantum præscientiam. Græcè legitur: *κατὰ τὴν ψυχρότητα* *ῥαγίζετο* *ἐν τῇ στήνῃ*. Quod futurorum, quàm venientium, a prius interpreta- bimus.

Pag. 325.

Postea in corporibus quæ ægrotant tantum. Græcè legitur: *κατὰ τὴν ψυχρότητα* *ῥαγίζετο* *ἐν τῇ στήνῃ*. Hoc est: Quæ ægrotant simpliciter.

Ibidem.

Nec aliter in ægrotantibus, si quidem ægro-



Pag. 564.

Est autem eorum pulsuum ingens frigiditas causa generandorum, quæ occupet vel corpus cordis, vel spiritum & sanguinem, quem continent eius sinus: vel partem aliquam vicinam. Græcè legimus *Top. apud Galienum*. Hoc est: Consentientium particularum, vel aliquod commercium habentium. At multa consensuum mutua, atque in unum conspirant, quæ minime sibi vicina existunt. Quemadmodum cor & cerebrum, quæ nec uorum, & arteriarum ratione iunguntur tanta necessitudine, ut affectus unus, alteri consortij legi communicetur.

Pag. 565.

Siquidem generatur hi producta raritate: ac quum procurantur, reuertunt per raritatem ad pristinum statum. Græcè: *ἡ γὰρ ἡ γένεσις αἰσίου ἐστὶν, ὅταν πλεονέξῃ τῆς ἀσθενείας*. Quod nos vertimus: Siquidem generatio ipsorum fit raritate producta: solutio autem est redditus quidam per raritatem ad commodationem pristinam.

Pag. 571.

Quem primò equidem unum ferire iterum putari. Clavio tamen est in græco hæc sententia: *ἡ δὲ τοῦ πάλιν ἡ γένεσις ἐστὶν ὅταν πλεονέξῃ τῆς ἀσθενείας*. Hoc est: Quem solum primò sanè putauerat bis ferire.

Pag. 580.

Reciprocantur modò ex vltima pulsus abolitione: modò ex paruo pulsû & languido. Quorum quidem vocantur etiam reciproci utriusque: sed hoc intererit inter, quòd illi decurtari sint reciproci, hi deficientes reciproci. Græcè legitur, *ἡ γὰρ ἡ γένεσις αἰσίου ἐστὶν ὅταν πλεονέξῃ τῆς ἀσθενείας*. Quæ sic nos vertimus: Reuertitur autem motus arteriarum interduum quidem, ab vltima pulsus abolitione ad quam pervenerat: interduum autem, à paruo pulsû & languido. Quorum sanè utriusque pulsus, recurrentes dicuntur: hoc tamen intericèdo discrimine, quòd illi quidem, deficientes recurrentes existunt: hi autem, imminuti recurrentes, seu decurtari.

Lib. III. de præcognitione ex pulsibus.

Pag. 589.

Hermianus: Cordis calor, pulsus (ut diximus) variat. Verum quia duorum generum est, aut à putribus genitus humoribus, cuius acris qualitas & fumosa est: aut cum humiditatis defectu, à natura remotus sola quantitate: ille prior constans & obfirmatus est, etc. Græcè legitur: *ἡ γὰρ ἡ γένεσις αἰσίου ἐστὶν ὅταν πλεονέξῃ τῆς ἀσθενείας*. Quæ sic nos vertimus: Quod est: Cordis calor, pulsus (quare nunc dictum est) immutat. Cæterum quandoquidem duplex est secundum speciem est: unus quidem, sibioboles putredinis humorum existit, cuius nimirum qualitas acris est, & fuliginosa: al-

ter autem, cum benigna humiditate & cõiunctus, sola quantitate à naturæ modo recedit. Est autem constans & ægrè solubilis, quem primo diximus loco.

Ibidem.

Verecundia etiam atq; iræ comitatur. Græcè: *ἡ γὰρ ἡ γένεσις αἰσίου ἐστὶν ὅταν πλεονέξῃ τῆς ἀσθενείας*. Quod mallem equidè vetererè Timorè atq; iracundiam concomitatur. Quàdò quidem pudor, laud quidè tanti mō mētē est affectus, ut pulsus visque adeo immutata possit, ad id quicquid pudorè, nam etiam metū significat.

Pag. 591.

Nec si pestilentem animā. Græcè: *ἡ γὰρ ἡ γένεσις αἰσίου ἐστὶν ὅταν πλεονέξῃ τῆς ἀσθενείας*. Hoc est: Nec quia pestilenter respiracionem, etc. Nam rametis per translationem interitum anima sumatur pro spiritu, ac præsertim apud poetas: Medica tamen ars admodum seueram sit, minime oblectatur metaphoris.

Pagina 599.

Iam os etiam attendunt. Græcè: *ἡ γὰρ ἡ γένεσις αἰσίου ἐστὶν ὅταν πλεονέξῃ τῆς ἀσθενείας*. Hoc est: Contemplantur simul etiam partes ori adiacentes.

Pag. 601.

Qui putredini humorū comitatur, etiam par est perpetuū huius magnitudo, nō tamen venarum, neq; aliorū generū, verū cum de natura parum deficiat, etc. Græcè: *ἡ γὰρ ἡ γένεσις αἰσίου ἐστὶν ὅταν πλεονέξῃ τῆς ἀσθενείας*. Hoc est: Elus autem febris quæ humorū putredinem sequitur (scilicet proprium indicium erit) par semper magnitudo in pulsu: non tamē ut in his quæ pro naturæ modò se habent, neque ut in aliis generibus. Cæterum vbi exigui quid à naturæ modo recedit, etc.

Pag. 603.

Tardi nō perit, sed si vicinis sibi frigidus sit corpus cordis. Græcè: *ἡ γὰρ ἡ γένεσις αἰσίου ἐστὶν ὅταν πλεονέξῃ τῆς ἀσθενείας*. Hoc est: Tardi autē nō visque adeo conspicuè, sed pro ratione excessus, quo vicinis partibus est cordis corpus frigidus.

Pag. 604.

Neq; scilicet alij sensui tribuunt album, nigrū, flauum, rufum, pallidum, fuscum: cæruleum, reliquaq; colorum nomina, præter oculos obiecta. Græcè legimus: *ἡ γὰρ ἡ γένεσις αἰσίου ἐστὶν ὅταν πλεονέξῃ τῆς ἀσθενείας*. Quod est: Neq; igitur ad alium referunt sensum, album, nigrum, flauum, rufum, pallidum, fuscū, cæruleum, & quæcūq; alia colorū nomina, præterquam ad visibilibus sensum.

Ibidem consequenter.

Neq; etiam aliis austerū, dulce, amarum, acerbum, astringens, falsum, saliginosum, præterq; quæ gustantur. Græcè: *ἡ γὰρ ἡ γένεσις αἰσίου ἐστὶν ὅταν πλεονέξῃ τῆς ἀσθενείας*. Quæ sic sunt vertenda: Neque rursus ad alios sensus, austerum, dulce, amarum, astringens, acerbum, falsum, & saliginosum, præterquam ad gustum.

Ibidem.

Neque iam vllis aliis calidum, frigidum, siccum, humidum, molle, durum, verū his quæ

KK un

tanguntur, omnes attribuunt. Græcè legitur: *ἡ πύξις δ' ἐν τῷ στήθει τῶν πυλῶν ὡς ἡ πυλῶν, ὡς ἡ πυλῶν, ὡς ἡ πυλῶν*. Hoc est: Quod est. Sed neq. in aliis sensibus collocat calidum, frigidum, siccum, humidum, molle & durum, præterquam in tactuum sensu.

Pag. 605.

A propriis ad impropria. Græcè legitur: *ἀπὸ τῶν ἐν τῷ στήθει*. Hoc est: Ab impropriis ad propria.

Pag. 610.

At febris hæctica, rarissima a primo existit. Græcè: *ἐν τῷ στήθει τῶν πυλῶν ὡς ἡ πυλῶν, ὡς ἡ πυλῶν, ὡς ἡ πυλῶν*. Quæ vertimus: Rarissime igitur statim ab initio oritur hæctica febris.

Pag. 611.

Si adiecerimus sermoni quandam distentionem. Græcè habetur: *ἀπὸ τῶν πυλῶν*. Hoc est: Distentionem quandam.

Pag. 614.

Cor ipsum ad intemperiem inducit victus, si diutius siccio vitaris. Græcè: *ἡ πυλῶν ὡς ἡ πυλῶν, ὡς ἡ πυλῶν, ὡς ἡ πυλῶν*. Quod est: In ipso autē corde siccā intemperiem producit etiam victus ratio siccior, si diu fuerit administrata.

Pag. 615.

Durorum pulsuum antè demonstrauimus esse paruitatem, mollium magnitudinem. Græcè habetur: *ἡ πυλῶν ὡς ἡ πυλῶν, ὡς ἡ πυλῶν, ὡς ἡ πυλῶν*. Nempe: Duris igitur pulsibus demonstrauimus antea esse paruitatem comitem, quemadmodum mollibus magnitudinem.

Lib. 111. de præcognitione ex pulsibus.

Pag. 619.

Herm. Genus igitur respirandi, omnes fluxiones idem habet: at non eadem omnib. suffocatio, sed omnib. calidioribus comitatur potius. Græcè habetur: *ἡ πυλῶν ὡς ἡ πυλῶν, ὡς ἡ πυλῶν, ὡς ἡ πυλῶν*. Quæ sic sunt vertenda: Igitur species respirationis, similis omnibus fluxionibus adest. Suffocatio autem ipsa, non similiter omnibus, sed magis calidas omnes fluxiones sequitur.

Ibidem.

Alia præterea varietas erit, quod interim affecta pars thoracis sit, interim succingens costas tunica. Codex græcus vetustus habet: *ἀπὸ τῶν πυλῶν*. Quæ sic sunt vertenda: Variabitur etiam vel hæc ratio, quod interdum quidem pars affecta thoracis sit musculus: interdum autem, costas succingens membrana.

Pag. 610.

Ac si ab solis excrementis citra febres intendatur. Græcè: *ἡ πυλῶν ὡς ἡ πυλῶν, ὡς ἡ πυλῶν, ὡς ἡ πυλῶν*. Quod est: Si igitur a solis excrementis in ipso genitis distendatur.

Pag. 614.

In statu arterie sunt moderati. Græcè: *ἡ πυλῶν ὡς ἡ πυλῶν, ὡς ἡ πυλῶν, ὡς ἡ πυλῶν*. Quod est: In consentientia quidē arterie.

Pag. 615.

Qui ex multa bilē seruente ob putredinem,

hoc patiuntur. Græcè habetur: *ἡ πυλῶν ὡς ἡ πυλῶν, ὡς ἡ πυλῶν, ὡς ἡ πυλῶν*. Hoc est: Quicumq. autem ob atram bilem effervescentē ratione putredinis, tale quid perpetuantur.

Pag. 616.

Siti frigiditas morbofa cerebrū afficiat, cum illi cor consentiat, tardiores atq. rariores æquo pulsus erunt. Græcè: *ἡ πυλῶν ὡς ἡ πυλῶν, ὡς ἡ πυλῶν, ὡς ἡ πυλῶν*. Quæ sonant: Frigiditate autē morbofa in cerebro genita, si cor etiam consoriti lege afficiatur, minores, tardiores, atq. rariores us, qui pro modo naturæ habebant, gignuntur pulsus.

Pag. 617.

Subtilis meninx, quæ cerebrum amplectitur. Græcè legitur: *ἡ πυλῶν ὡς ἡ πυλῶν, ὡς ἡ πυλῶν, ὡς ἡ πυλῶν*. Hoc est: Quæ disungit cerebrum. Etenim liquet ex consuetudinibus, per illam tenuem membranam, quæ mista arteriis & venis totum cerebrum permeat, distinguī planē dextrā à sinistra ipsius cerebri partem, atque adeo ab vitæq. cerebellum, quam vocant parencephalida.

Pag. 619.

Vnum etiam reliquum est, de testibus vt dicamus. Nam hæ partes etī intra inguina sunt, ita tū febres propter vasorum vicinitatem accendunt. Græcus vetustissimus habet: *ἡ πυλῶν ὡς ἡ πυλῶν, ὡς ἡ πυλῶν, ὡς ἡ πυλῶν*. Quod est: Quamvis enim extra inguina sint, subitō febres accendit ubi inflammata fuerint.

Ibidem.

Nam venientium sumi præfagia ex presentibus. Græcè legitur: *ἡ πυλῶν ὡς ἡ πυλῶν, ὡς ἡ πυλῶν, ὡς ἡ πυλῶν*. Quod sic rectius interpretabitur: Quod autem futurorum etiam prænotio ex presentibus conciliatur.

Ibidem.

Hæc omnia ex affectibus præfagiūt. Græcè habetur: *ἡ πυλῶν ὡς ἡ πυλῶν, ὡς ἡ πυλῶν, ὡς ἡ πυλῶν*. Ex dispositionibus.

Pag. 610.

Morbus enim cognoscitur ex loco affecto, eiusq. affectu. Græcè: *ἡ πυλῶν ὡς ἡ πυλῶν, ὡς ἡ πυλῶν, ὡς ἡ πυλῶν*. Hoc est: Et eius dispositione.

Ibidem.

Cū morbum semel superatura est natura. Græcè: *ἡ πυλῶν ὡς ἡ πυλῶν, ὡς ἡ πυλῶν, ὡς ἡ πυλῶν*. Hoc est: Quo tempore natura superauerit absolutissimē morbosā dispositionem.

Ibidem.

Propter quos cibum non sentiant. Græcè: *ἡ πυλῶν ὡς ἡ πυλῶν, ὡς ἡ πυλῶν, ὡς ἡ πυλῶν*. Quod est: Ob quos ciborum vīu non promouentur.

Ibidem.

Iam verō etiam animalis facultatis imbecillitates, cerebri ingenti intemperiei committuntur, euisdem quasi suffocationis impletionibus eius ventricularum, & obstructionibus meatuum qui in eos penetrant. Græcè habetur: *ἡ πυλῶν ὡς ἡ πυλῶν, ὡς ἡ πυλῶν, ὡς ἡ πυλῶν*. Quæ sic nos vertimus: Similiter autem animalis facultatis imbecillitates, magnas cerebri in

brei intemperies sequitur. Quæ verò veluti satisfactiones sunt, succedunt tum repletionibus ventriculorū ipsius, tum obstructionibus meatuum qui ad eos pertinent.

Pag. 633.

Alterius quàm vitalis. Græcè: *ἀλλήλῃ τῇ ἐν σφίσι* *πνεύματι*. Quod est: Quæ admodū alterius vitalis.

### Lib. I. de diebus decretoriis.

Pag. 646.

Andernacus: Cum bonus signis accidit, quæ à contemplatione prius indicata est. Græcè: *ἀνδερνακίαν*, *ἢ τὴν ἐν πρὸς τὴν ἀνδρῶν*. Quod equidem malitiam sic vertere: Insignem autē, quæ ab indice præostensa fuerit. Fieri siquidem potest, vt crisis aliqua prius indicata iam fuerit ab indicatorio die, quæ tamen cum bonis signis nō accidat. Crisis quippe, quæ septima die in exitū delinquit, omnia secum habet signa exualia, tamēti fuerit à quarto die præostensa.

Pag. 651.

Fertida multa tum deiciunt. Græcè: *ἐν τῇ ἐν τῇ* *κατὰ τὴν φύσιν*. Hoc est: Et fertida vt plurimum deiciuntur.

Ibidem consequenter.

Sudores rari quidem æquales toto manātes corpore, & calidiores si quando oboriuntur, plurimum afficiunt ægros. Græcè: *ἰσχυροὶ* *ἢ ἐν τῇ* *κατὰ τὴν φύσιν*. Hoc est: Sudores autem, rari quidem, & per vniuersum corpus, & calidi existūt. Quod si tales aliquando exoriantur, vt plurimum intercipiuntur.

Pag. 654.

Prope hos verò tertiusdecimus. Græcè: *ἐν τῇ* *κατὰ τὴν φύσιν*. Hoc est: Decimusseptimus.

Pag. 671.

Hæc igitur quatuor genera, quorū partes etiā sunt duæ, dum naturæ motibus incidunt, sub inde circuituum ordinem destruant. Græcè habetur: *ἡ δὲ τῇ ἐν τῇ* *κατὰ τὴν φύσιν*. Hoc est: Hæc igitur quatuor genera, quæ varias habent species particulares, si naturæ motus præpediant, sæpenumero circuituum ordinem destruant.

Ibidem.

Septimo die necessarii futura est. Græcè: *ἐν τῇ* *κατὰ τὴν φύσιν*. Hoc est: Crisis.

Pag. 674.

Quippe cū secundus, excepti gratia, & quartus, velicemmensumque accessionem asserat, vel primus, tertius & quintus, ad sextū diem mora prædicetur. Græcus antiquus habet: *ἡ δὲ τῇ* *κατὰ τὴν φύσιν*. Quæ sic videtur esse vertenda: Si enim secunda dies (si sic coniungat) & quarta vehementiorem accessionem inducat, quàm prima, tertia & quinta, haud dubie ad sextū diē ipsa mora prænuñciatur.

Pag. 677.

Et iudicia. Græcè: *ἐν τῇ* *κατὰ τὴν φύσιν*. Hoc est: Et iudicia.

Ibidem.

Decimusoctauus autem, vigesimiprimi. Græcè: *ἐν τῇ* *κατὰ τὴν φύσιν*. Nemp̄ decimus octauus autē, solius vigesimiprimi.

Lib. v. Pag. 693.

Andernacus: Hac ratione omnes acuti particulares fiunt. Postq̄ verò omnes conueriunt, diuturni. Græcè habetur: *ἐν τῇ* *κατὰ τὴν φύσιν*. Quæ iudicio meo sic sunt vertenda: Atq̄ ita sanē omnes ipsius morbi partes, acutæ redduntur: totus autē morbus, diuturnus, etc. Agitur quippe de morbis imperfecte solutis, & quorū recidit in diebus decretoriis tum incipiūt, tum iudicantur. Ad quarum sanē oris, solutionē sc̄p̄, si respexerimus, vnaqueque ipsarū videbitur esse nobis morbus quidā acutus, cū tñ pars vnius morbi diuturni existat.

Pag. 694.

Igitur accessiones ipse ex acutissimis morbis per quatuor in viginti autē finiantur. Græcè: *ἐν τῇ* *κατὰ τὴν φύσιν*. Hoc est: Igitur tam copulati per quaternariū, multiplicanti, ad affectionis ratione perveniunt vsq̄ ad vigesimum.

Pag. 711.

Obscuratur omnino, cū solis lumen circa eam emergit. Græcè legitur: *ἐν τῇ* *κατὰ τὴν φύσιν*. Hoc est: Obscuratur omnino, vbi sub illo hoc est, sub Sole, illustratur.

Pag. 711.

Item comitialiū circuitus custodit, inde quod solis plus, vel minus participat. Græcè legitur: *ἐν τῇ* *κατὰ τὴν φύσιν*. Hoc est: Quatenus plus vel minus ex ipso Sole participat.

Ibidem.

Capitis dolorem conciliat. Græcè: *ἐν τῇ* *κατὰ τὴν φύσιν*. Quod est: Capitis grauitatem cōciliat: vel grauedinofos reddit.

### Lib. I. de crisiibus.

Pag. 711.

Leonicenus: Stant in tēpore accessionis hominem occidunt. Græcè: *ἐν τῇ* *κατὰ τὴν φύσιν*. Hoc est: Augmentū tempore.

Pag. 756.

Quæ verò extra conturbatur, debet incipere concoqui, quare & longiori tempore, & virtute forti indiget ad cōsolutionē. Græcè: *ἐν τῇ* *κατὰ τὴν φύσιν*. Quod est: Quæ verò extra conturbatur, nondum incipit concoqui. Quare merito hoc est deteriora. Etenim vt coquatur, prolixi tempus, roburq̄ facultatis desiderat.

Ibidem.

Hæc venosæ naturæ passionē significat. Græcè: *ἐν τῇ* *κατὰ τὴν φύσιν*. Quod est: Talis enim vena, venosi generis affectus existit: sc̄p̄ et exalta cruditas, ventris.

Ibidem.

Cū verò etiā statim mungit in vasa vrinarū. Græcè: *ἐν τῇ* *κατὰ τὴν φύσιν*. Hoc est: Cū autē etiā celeriter diffundit, vocat affectus is à quodā in manū

hyderos, etc. Agitur namque impersentiarum Galenus de diabete, seu de stillicidio vixit praeter voluntatem effluens. Qui affectus altercatia & retentio facultralis, veluti extinctio est: ut ibidem idem Galenus testatur: Quare per talem fluxum, improprie sane dicemus vinam mingi, cum contra imperium voluntatis, atque in vivo homine de laboratur: quod explicat *ut vixit de diffinitione*.

Pag. 760.

Color vero vicidius fit in transitu ad nigrum, & quoddam veluti principium nigri. Graece legitur: *αὐτὸς δὲ αὖτις ἀπὸ τοῦ λευκοῦ γίνεται*. Quod sonat: Estque veluti quoddam principium nigri.

Pag. 771.

Quod si ab eo quod est nihil expuere, aut expuere, verum liquida, & omnino cruda fiat transmutatio. Graece: *ἢ ἢ αὐτὸ πᾶσι δὲ αὖτις ἀπὸ τοῦ λευκοῦ γίνεται*. Hoc est: Si vero ab eo quod est nihil prius expuere, ad expuere quidem, sed liquida & omnino incocta fiat transmutatio, etc. Fieri tamen potest, ut is error non a Leonicensio, sed a typographo sit commissus.

Pag. 777.

Si qua vero vniuersa fiat permutatio, & multo magis adhuc eam quae antecedit agitationem. Graece habetur: *ἢ αὐτὸς δὲ αὖτις ἀπὸ τοῦ λευκοῦ γίνεται*. Hoc est: Ac multo magis illam perturbationem, quae permutatio ipsam praecedat: scilicet crasim appellare consueui.

Pag. 786.

Tertianam itaque febrem fieri contingit absque rigore vehementi. Graece: *ἢ αὐτὸς δὲ αὖτις ἀπὸ τοῦ λευκοῦ γίνεται*. Quod est: Igitur exquisita tertiana haud licet fieri absque rigore vehementi, etc. Est enim Atticis familiare, ut pro vna, duabus negationibus saepe vrantur.

Pag. 799.

Sed nihilominus hoc, si multa quiete aegroti adueniente. Graece habetur: *ἢ αὐτὸς δὲ αὖτις ἀπὸ τοῦ λευκοῦ γίνεται*. Quod est: Nulla prius explicatio, siue absolutione a febre, in aegroti facta.

LIB. II. de cribus. Pag. 814.

Leonicensius: Si vero tantum febricitent, siue alicuius visceris passione, aut inflammatione hepatis, vel renum, vel vesicae, vel splenis, maxime vniuersa oportet animum adhibere. Graece: *ἢ αὐτὸς δὲ αὖτις ἀπὸ τοῦ λευκοῦ γίνεται*. Hoc est: Si vero tantum febricitent, absque alicuius visceris passione: aut si quae etiam inflammatio adsit in aliquo eorum quae ad hepar, vel renes, vel vesicam, vel splenem pertinent, vixit sunt spectandae. Quod autem ita legendum sit, indicant Galeni verba, quae statim subdit in hunc modum: Semper enim cum febris affuerit, vel ex sola humorum putredine accensa, vel ex membro inflammationem patiente: censeo praecipue esse inspicium das vrinam, atque in de agnoscendas coctiones.

Pag. 818.

Febris enim quae proprie synochus nominatur, longus est status. Magis autem tota haec febris status est. Graece: *ἢ αὐτὸς δὲ αὖτις ἀπὸ τοῦ λευκοῦ γίνεται*. Hoc est: Febris enim quae proprie synochus nominatur, longus est status. Magis autem tota haec febris status est.

Quod nos vertimus: Eius autem febris, quae proprie dicitur synochus, diuturnus status est. Imo vero tota eiusmodi febris, status quidam existit. Pag. 817.

Tres quidem hi sunt modi perturbationis morborum. Graece legitur: *ἢ αὐτὸς δὲ αὖτις ἀπὸ τοῦ λευκοῦ γίνεται*. Hoc est: Permutationis.

Pag. 831.

Tu itaque supponens aliquam esse vitalem potentiam, stude ut agnoscas eorum ita in robore, sicuti in imbecillitate dispositionem. Graece legitur: *ἢ αὐτὸς δὲ αὖτις ἀπὸ τοῦ λευκοῦ γίνεται*. Hoc est: Ipsius facultatis videlicet.

Pag. 831.

Moriturus autem, ad declinationis tempus pertingere minimè potest: non tamen necessario eum non ad statum. Graece habetur: *ἢ αὐτὸς δὲ αὖτις ἀπὸ τοῦ λευκοῦ γίνεται*. Hoc est: Sed nec necessario etiam ad tempus vigoris. Sic autem legendum esse, indicant verba Galeni sequentia, quae talia sunt: Contingit enim ipsum in augmenti & principii etiam tempore mori.

Pag. 843.

Si igitur praeter rationem alius comprimitur, vel vixit: iam prope crisi existente, rigorem sperare oportet. Si non, distinguendum est. Graece legitur: *ἢ αὐτὸς δὲ αὖτις ἀπὸ τοῦ λευκοῦ γίνεται*. Quod est: Qui si accidat, distinguendum, etc.

Ibidem.

Si enim multa, etc. Graece: *ἢ αὐτὸς δὲ αὖτις ἀπὸ τοῦ λευκοῦ γίνεται*. Hoc est: Si enim plura. Quae lectio illustratur a superiori, ubi Galenus ait: Considerare oportet nunquid alui excrementa plura quam priora, vel pauciora, ante crisin exierint. Cui orationi subdit: Si enim plura.

Pagina 846.

Si vero ad abscessum conuertantur, communia quidem omnia indicia sunt, ubi de aegri salute non desperatur, quoniam neque morbus soluitur, neque vrina multa & multum habens subsistentia, sed cruda & tenuis appareat: propria vero morbi non futuri valde diuturni sunt, subita difficultas anhelitus superveniens, moxque quiesces, quam grauitas capitis, ac dolor subsequitur, & grauis somnus, ac furditas, his in gladiolosis carnis. post aures, necessum est abscessum fieri. Graece legitur: *ἢ αὐτὸς δὲ αὖτις ἀπὸ τοῦ λευκοῦ γίνεται*. Hoc est: Si vero morbi ad abscessum conuerti videantur, communia quidem omnia indicia sunt, ubi aegri salus non est deplorata, quod nec morbus soluitur, nec vrina multa, & multam habens subsistentiam, sed cruda & tenuis appareat. Propria vero non admodum diuturnorum morborum, si eger in difficiliore respiratione repente in cideat, breui quidem liberetur a tali respirandi difficultate, sed excipiat ipsum statim dolor atque capitis grauitas: praeterea inexpugnabilis dormiendi necessitas, succedat. Huic autem, in gladiolosis post aures partibus, necessum est abscessum oriri.

Ibidem.

Ibidem.

Vel inflammatio. Græcè legitur: *ἡ φλεγμονή*. Quod nos, virandæ amphibologie studio, vertimus: Vel incendiū. Siquidem hæc vox Inflammatio, est vulgo medicorum recepta pro tumore quodam rubro, *ρενιτεντέῳ* & calido, vrpote orto à sanguine: *φλεγμονή* autem, siue effluencia caloris, aliquando potest accidere citra talem affluxum sanguinis.

*Lib. de præcognitione.*

Pag. 860.

**L**eonardus lachinus: Ego enim posthac sedulo cauebo, tum ipsis cedena, tum inscitis pare faciens. Græcus vetustiss habet: *καταπαύω τὴν διάνοιαν καὶ τὴν ὑπάρχουσαν*. Quod nos vertimus: Tum inscitiam eorum disimulās. Cui lectio ni subscribit sequens sententia, quæ est talis: Hæc cum facere decrevissem, inscitiam eorum & prauitatem redarguere desin. Habetur quippe in codice græco *ωῶντας*, quod non tam desicere, vt vertit interpres, quam redarguere significat.

*Lib. de præsignis ex insomniis.*

Pag. 889.

Iohannes Ficardus: Phlegmatis humidi plenus Iest. Græcè habetur: *φλέγμα ὑγρόν*. Quod est: Pluitre frigida.

SECTIONE  
QUARTA.*Libro III. de symptomatum causis.*

Pag. 152.

**C**Opus: At quoniam cōplures sunt intestinorum circūvoluciones, necesse est, vt alimenta per singulas, ex superioribus ad inferiora deferantur. Deinde, quod grauitatis præsidio fieri nō potest, nempe vt propellatur ea quæ per intestinorū circūvoluciones fixa continentur, id potentie haud difficile est. Quippe habet intentū in insitam vim, quæ expellunt ea quæ sibi molesta sunt. Cui versionis sufragatur enā & Linacri transitio. Græca tamen dictio sic habet: *ἡ ἀνάγκη τῆς κινήσεως τῶν ἐν αὐτοῖς ὑγρῶν, καὶ ὅτι οὗτοι οὐκ ἔχουσιν αὐτοὺς ἐν τῇ ἰσχυρότητι τῆς κινήσεως*. Quæ ita vertenda censeo: Cūm autem cōplura sint intestinorum volumina, per quæ à superioribus ad inferiora deferri alimēta est necesse: cibi sanē ipsi, ob grauitatem diu immorari nō possunt. Quod si eorum quippiam hæreat in spīna ipsis impactum, id ab actione intestinorum (quibus inest facultas quædam expellendi Insectantia) propellitur. Itaque sensus Galeni est, excrementa alui, quæ ex cibis reliqua sunt, tum suo pondere delabi, tum facultate expultrice ab intestinis exterminari.

*Lib. de morborum temporibus.*

Pag. 313.

**A**ndernacus: Etenim inflammationis affectus calidior quam prius evadit, cum tumore maior, item dolore simul & tensione. Græcè: *ἡ φλέ-*

*γμων πλεονάζει καὶ ὅταν πλεονάζῃ, ποτὶ δόλον καὶ πρὸς τὸν πόνο πλεονάζει*. Quod est: Calidior itaque se ipsa evadit cum tumore maiori, dolorēq; & tensione, pars phlegmone obfusa.

Pag. 354.

De complexis postea disseram. Græcè: *ἡ φλέγμων ὁμογενὴς ἢ ἁπλοῦς*. Quod est: De mistis autem dempces dicam.

*Lib. de totius morbi temporibus.*

Pag. 339.

**A**ndernacus: Vnum quidem & princeps generationis eorum attribuitur. Græcè legitur: *ἡ γενεὰ πρώτη*. Hoc est: Et primum. Agitur enim illic Galenus de ipsius morbi temporibus. Inter quæ vnū & primū ordinē, nō dignitate, tribuit ipsi generationi. At cū princeps aliquid dicimus, de ipso excellentiā quandam, prærogatiuāq; enūciamus.

Pag. 346.

Post quod rursus augmentū tempus est, non sequē manifestum ut in omnibus: neque illud quod à vigore sequitur tempus omnino sensibile. Græcè: *ἡ γὰρ ἐν αὐτῷ ἐστὶν αὐξησις, ἡ δὲ ἐκείνη οὐκ αἰσθητὴ ἐστὶν ἐκ τῆς αὐτῆς*. Hoc est: Post quod rursus augmētū tempus est, ne ipsum quidem similiter sensibile in omni bus. Post hæc vigoris sequitur tempus, idē omnino sensibile.

Pagina 348.

Velamentum vehementer. Græcè: *ἡ ἐν αὐτῷ ὑψηλὴ*. Hoc est: Aur fuluum vehementer. Disputat namq; illic de spūi coloribus.

*Lib. I. de locis affectis.*

Pag. 175.

**C**Opus: Itaque quot modis cōtingat vr̄ng mearum stipari. Græcè habetur: *κατὰ πόσους ἀνὰ πόσον τῶν ὑγρῶν ἐν αὐτοῖς ἐστὶν ἡ φλεγμονή*. Hoc est: Itaque quot modis cōtingat obstrui mearum colli vesicæ.

Pag. 180.

Essentia quidem nondum lãditur. Græcè: *ἡ οὐκ ἔτι ἐστὶν ἐν αὐτῷ*. Quod est: Substantia autem nondum est lãsa. Aliud quippe dictū est non lãdi, atq; aliud nō esse lãsam. Si quidem quod nōdum est lãsum, fieri potest vt iam lãdatur.

Pag. 381.

Quod si antequā vlcus induxerit, egredi desinat, affectus ipse nondum dysenteria dicitur: Græcè habetur: *ἡ γὰρ ἐν αὐτῷ ὁμογενὴς, καὶ ὁμογενὴς ἡ ἀφύγη*. Hoc est: Si verō priusquā exulceret, perulæ re desinat, etc.

Pag. 388.

Igitur si in ventriculo cibi non suapte natura in fumū transmutantur, efficientem causam calidam: si verō saporem acidum referunt, eam frigidam esse necesse est. Græcè legitur: *ἡ γὰρ ἐν αὐτῷ ἡ οὐσία κατὰ τὴν φύσιν, καὶ ἡ οὐσία κατὰ τὴν φύσιν*. Quod est: Si igitur in ventriculo cibi in fumum nidorosum vertantur, idē non ex sua ipsorū natura, efficientem causam calidam: si verō acelescant, frigidam esse necesse est.

Ibidem.

Quippe ubi igneo calore ventriculus infestatur, panem, aut chondrum, sine humore

deici videbis, perquam exigua in ipsis facta transmutatione. Græce legitur: *ἡ μεταβολὴ τῶν πρὸς τὴν ἀποκαταστάσεως τοῦ σώματος τοῦ ἀνθρώπου ἐστὶν μικρὰ καὶ ἀμετέωρη*. Quæ licet verissima: Est enim vbi igneo calore, intra humoris affluxum, ventriculum infestatur: videbis tum panem, tum chondrum dei, perquam exigua in ipsis facta transmutatione. Cui lectioni subscrisbi sequi in Galeno sententia, quam etiam interpretes pervertit.

Aut enim ibidem.

21. Quodd si humor quoq; deiciatur, qui cibum  
corrumperere possit, videntur cibi in huiusmodi  
humore submersi. Græce habent: *ἡ δὲ γὰρ τοῦ  
μαρμαί, ἡ δὲ γὰρ τοῦ μαρμαί, &c.* Quodd hos ita ven-  
teudam duximus: Quodd si humor quoq; in ven-  
tre prauum consistit, qui nimirum cibos cor-  
rumpat, &c.

Pag. 105.

<sup>19</sup> Quocirca coniecturam feci, ne uerū qui primi ab septima vertebra procedunt<sup>r</sup>, partē quamquam ob ictum fuisset inflatam. Graecè legimus: ἡναισθητοὶ τοῦ αὐτοῦ τῆς σπονδύλου καὶ τῆς ἐκείνης τοῦ ἀνωτέρου καὶ τοῦ κάτωτέρου σπονδυλίου, &c. Quid ita verendum est? Coniecturam feci, nec non post septimā vertebram exidentis, statim in primo exortu partem aliquam, ob ictum, fuisse inflatam.

Pag. 199.

Ergo neruorū qui ā ceruice prodeunt, vltimi  
exigua pars, ad minores pervenit digitos. Griecū:  
ἐκ τῆς ἐλάττωσιν τῆς κορυφῆς οὐλοῦ. Hoc est vltimi  
humilior pars. Ibidem.

...participa...

Illi præcipue spiritus parti, quæ in affecta particula principum obtinebat. Græcè: *πνεῦμα ἀφ' ἑαυτῆς* 29 *ἐκ τῆς αὐτῆς* *πνεύματος*. Quod est: Quæ principii affectus partis in se continebat.

112. 404

Verū animalibus instrumentis omnibus naturale quoque munus debetur. Græcè: *ἡ φυσικὴ λειτουργία τοῦ ζῴου*. Hoc est: Naturalis quoque dispensatio adeū.

Lib.	Page
------	------

Copus: Quippe ut dolor tristis sensus est, ita voluptas blandus est sensus. Græcè: *ἡ γὰρ ὡς πόνος, οὕτως ὡς ἀλγος, καὶ ὡς ἡδονὴ ὡς ἡδονή*. Hoc est: Dolor enim est tristis sensus, quemadmodum ipsa voluptas, blandus.

*Ibidem.*

Quod si rem accuratius inspexeris, haudquaquam doloris species dicendus est stupor. Græci: *ὁδὴ διακρίνεται ὁ πόνος ἐν στυπιδόσι πῶς*. Quod est: Ne differētia quidem inter dolores est, stupidus dolor. Pag. 408.

Fig. 408

Morbus verò lateralis, membranz costaz suc-  
 cingentur, est morbus. Quæ vbi costis quidem in-  
 cina est, necessarii cõprimitur. At media ipsius  
 pars, comprimi non potest. Græcè: *ἡ νόσος τῆς ἀν-  
 τὸς τοῖς πλευρῶν ἀντιπλευρῶν τῶν πνευμῶν ἀπὸ τοῦ ἀντιπλευ-  
 ρῶν τῶν πνευμῶν, &c.* Hoc est: Quæ vbi costis quidẽ ad-  
 hæret, necessarii cõprimitur. Quod verò ex ea  
 inter costas est situm, incompressum remanet.

Page 418

Alius, qui ob tensionem fit, non soli affectu  
parti proprius, vt qui vicinas partes incedu affi

ciat. Græcè legitur: *τοπος αἰ, διαστάσις τοῦ σώματος, ἡ δὲ*  
*ἰδέσθαι πρὸς τὸν ὀφθαλμὸν, ἀλλὰ τοπος ἐστὶν ὅπου δὲ τὰ κινούμενα*  
*γεννῶνται*. Illc. Quæ sic vertimus: Alius verò  
qui hic ob refectionē, non amplius soli affectat par-  
ti propriam, sed ob vicinas partes etiam inrerdā  
accidens. Pag. 411.

Page. 488.

Neg enim vt a tenui corpore, breui temporis  
spacio exire poterat, sed a profundo quodā. Gry  
cē: *da' a' i' in fader vnde.* Hoc est: Sed veluti ex pro-  
fundo quodam.

Pag. 432.

Quemadmodum in bene valentibus, qui libera videntur respiratione. *Græcè: καὶ δὲ ἡ τῆς αἵματος ἀναπνοῆς ἐστὶν ἐλεύθερη.* Hoc est: Quemadmodum in respirationibus haud violentè factis.

Page 436.

Ipsa enim omnes peli subiacentes partes, spissitudine superat. Græcè: *ἡ δὲ σπινθηρὶς ὑπερβαίνει τὴν ἐν ὑποκρίσει*. Hoc est: Quod nimirū cutis omnes sibi subiectas partes spissitudine superet.

Page 412

Quinetiam calidam sentiunt respirationem.  
Graecor legitur: *Ἀνασπαιρ*. Hoc est: Expirationem.

Page 416

Verum enim vero, quod principium sensus & motus ab impetu procedunt, sedem in cerebro habet, &c. Græcè. *ἡ δὲ ἀρχὴ τῆς αἰσθητικῆς καὶ τῆς κινήσεως ἐστὶν ἐν τῷ ἐγκεφάλῳ*, &c. Hoc est. Quod igitur æquifensum est, nempe ducem sensus & motus ab impetu procedunt, in cerebro collocari, &c. Dissert siquidem plurimum ipsos motus & sensus dux ab eorum operationum principio. Quippe omnium functionū animalium principium est cerebrū: dux est ipsa facultas, que in illo signatur, & ab ipso emanat, hoc est, animalis spiritus.

Pag. 455.

Copus: Præterea quamvis iam dictæ tempe-  
ries sit cōtrariæ. Græcè legitur: *Ανταρσις*. Hoc  
est: Intemperies.

Pag. 458

Si verò simul cum vniuerso corpore facies  
quoq; convulsa videatur, non solum eam partē,  
quę ex spina procedit, verumetiā cerebrū ipsum  
curamus. Græcè legitur: *ἐν πῶτι τοῦ σώματος ἐστὶν ἡ ψυχή*.  
Hoc est: Non modò spinalis medullæ exortum.

Page 461

Igitur quemadmodum phrenitici, febris vni quoddam accidens dispositioni cerebri censetur: sic conuersio in ardentium febrium dementia, multis elatis ad ipsum vaporibus. Græcè habetur: *ἡ μανία ἐκ τῆς πυρετικῆς ἐστὶν ἐκ τῆς ἀναισθητικῆς ἐκ τῆς ἐκπνεύσεως διακρίνεται*, *ἢ ἐκ τῆς διακρίσεως τοῦ ἐκ τῆς πυρετικῆς, καὶ ἐκ τῆς ἐκπνεύσεως ἀναισθητικῆς*. Quod est: quemadmodum igitur phreniticorum febris, vni quoddam est cerebri dispositionum symptoma: sic delirium, ardentium febrium symptoma existit, ad cerebrū elatis multis vaporibus calidis.

Page 465.

Firgi interdum ut rufo colore homines affati in melancholicis tenipnem decidunt. Græce legitur: *αἱ γὰρ ῥομφαίαι τῶν ῥομφαίων*. Hoc est: Admodum rubicundi. Ibid.

1000

Chippewas and Venetians languages combined with

11.41

stat, vel hoc argumento, quod alimentum corpori non distribuitur, sed in ventriculo manet incoctum, cum ipsum meatus antea suscipitur, magnam ipsius partem in imum ventris excernerent: tum quod postero die vomitu reiciantur, utpote non digestis per corpus cibis. Græcè habetur: *Ανατομή, διὰ τὴν ἰσχυρίαν τῆς τροφῆς τοῦ σώματος, καὶ τὴν ἀνατομήν τῆς τροφῆς τοῦ σώματος, καὶ τὴν ἀνατομήν τῆς τροφῆς τοῦ σώματος, καὶ τὴν ἀνατομήν τῆς τροφῆς τοῦ σώματος.* Hoc est: Obstructa autem esse eas venas, hunc constat, quod alimentum corpori minimè distribuitur, sed in ventriculo incoctum remaneat, cum ipsum hi pori antea susciperent, magnamque eius partem in imum ventrem excernerent: quodque postero die cibi vomitu reiciuntur, utpote non digesti per corpus.

Pag. 474.

Tamen sola spiratio, quæ musculorum pectus mouentium manus est, seruat. Græcè: *τὸ πνεῦμα τῆς τροφῆς.* Hoc est: Mouentium thoracem. Etenim pectus (quod Græci vocant *πῆκτα*) thoracis pars anterior existit.

Pag. 477.

Quemadmodum in ore stomachi accidit. Græcè: *ὡς ἐν τῷ στόματι.* Quod est: Quemadmodum in ore ventriculi. Nam stomachi semper accipi aut pro gula, aut pro ipsius ori ventriculi, apud omnes vi Græcos, tum Latinos, si tamen excipias barbaros, est in confesso.

Pag. 479.

Quemadmodum & reliquarum quoque partium interdum aliquæ. Græcè tantum legitur: *ὡς ἐν τῷ σώματι.* Hoc est: Quemadmodum pars aliqua ipsarum.

Lib. III. Pag. 481.

Copus: Cum enim nullo in oculo malo apparente, cernendi sensus deperditus est, demissus à cerebro nervus causam, vt vel inflammatione, vel duntaxat in se cōtinet, aut ex humorum defluxu, aut aliter quomodolibet foramen ipsius obturatur. Atque huiusmodi affectus oculo, vt instrumentali parti accidere necesse est. Græcè: *ὡς ἐν τῷ ὀφθαλμῷ.* Hoc est: Quemadmodum in oculo. Ut si in oculo nullo in oculo malo apparente, cernendi sensus deperditus est, demissus à cerebro nervus causam, vt vel inflammatione, vel duntaxat in se cōtinet, aut ex humorum defluxu, aut aliter quomodolibet foramen ipsius obturatur. Atque huiusmodi affectus oculo, vt instrumentali parti accidere necesse est. Græcè: *ὡς ἐν τῷ ὀφθαλμῷ.* Hoc est: Quemadmodum in oculo.

Pag. 491.

Quorum alij quidem communes sunt per cerebri nervorumque consensum. Græcè: *ὡς ἐν τῷ σώματι.* Hoc est: Ob cōmitem cum quod habet cum cerebro & nervis.

Pag. 493.

Proinde & tertix, & quartæ coniugationis ner-

ui. Græcè: *ὡς ἐν τῷ σώματι.* Hoc est: Proinde secundæ & primæ coniugationis nervi. Arbitror tamen legendum: Secundæ & quartæ: id quod colligo ex superiori sententia, vbi Galenus ait: Sanè affectio in vtraque parte, tam dextra quam sinistra, cerebro, in eo videlicet spacio, vnde tertia nervorum coniugatio prodit, omnes vicinæ partes simul affici consueuerit. Hæc Galenus. Atqui regiones ex, à quibus vnde tertia & quartæ nervorum copula, proximæ sunt origini tertix coniugationis. Ibidem.

Id autem per nervos non à tertia coniugatione, sed à cervice vertebra procedentes, efficitur. Nam hi per totam ferè faciem sparguntur, exigui ipsius parte excepta, quæ à quinta coniugatione procedentes nervos suscipit, in suprema vi delictet lani musculi parte. Græcè legitur: *ὡς ἐν τῷ σώματι.* Hoc est: Id autem per nervos non à tertia coniugatione, sed à cervice vertebra procedentes, in illum ferè totum disseminantur, exigui ipsius parte, sublimioris excepta, in quam deferuntur nervi à quinta coniugatione, etc. Sic autem esse vertenda hæc, colliges ex lib. x v. de Vsu partium, pag. 893.

Pag. 498.

Sed in lumbis totus nervus ex superiori exdit vertebra. Vbi si transversa eveniat vertebrae luxatio, eadem secum trahens & spinam & nervum, illæsum seruat ipsius secundum naturam ortum. Græcè legitur: *ὡς ἐν τῷ σώματι.* Hoc est: Sed in lumbis totus nervus ex superiori exdit vertebra. Quare in eis sanè, transversa spondylorum luxatio, vna secum abducens & spinalem medullam & nervum, illæsum seruat ipsius secundum naturam ortum.

Pag. 501.

Nam in iis magna ex parte totus thorax dilatari consuevit. Græcè: *ὡς ἐν τῷ σώματι.* Hoc est: Nam in plurimū dilatari consuevit thoracem.

Pag. 510.

Quinetiam vitari vocem haud obscure coniungit, cum vel acutior, vel maior redditur, ob id quod fauces à suis musculis nequeant distendi. Græcè: *ὡς ἐν τῷ σώματι.* Hoc est: Coniungit quoque haud obscure lædi vocem in acumen & magnitudinem, vbi etiam fauces à suis musculis contendere non possunt.

Pag. 514.

Quod si per inspirationem cuiusdam nazium pinnae manifestè cōtrahi videantur, id verò efficitur prostrati roboris indicium est. Græcè: *ὡς ἐν τῷ σώματι.* Hoc est: Quod si per inspirationem cuiusdam nazium pinnae manifestè cōtrahi videantur, id verò efficitur prostrati roboris indicium est.



perit, remanet ipsa tunc magna diuturnitas diffundens. Hoc est: Quæ nares, per inspirationes habent pinnas admodum dilatatas: id quod etiam magnū imbecillæ facultatis est signum.

Ibidem.

Ob spiritalium verò instrumentorum angustiam, totus quidem thorax magna ex parte & celeriter, & frequenter dilatat. Sed qui sic laborant, exvillare omnino nō cōsueverunt. Græcè: *ὅτι ἡ πνευματικὴ δύναμις ἐν τοῖς ἀσθενέσι ἐστὶν ὀλίγη, καὶ οὐκ ἔστιν ἐν αὐτοῖς ἐνδύναμις ἀποκαταστήσαι τὴν ἀσθενήσαντα πνευματικὴν δύναμιν.* Quæ loquunt: Ob spiritalium verò instrumentorum angustiam, totus quidem thorax plurimum dilatat, celeritèr & frequenter. Expirationē tamen, qui sic laborant, abigē cōsuetū perficiunt.

Pag. 515.

Ac licet continenter ispirare cogatur, non tamen exvillare solet: id enim aucti caloris proprium est. Græcè: *ἐπεὶ αὐτὸ τὸ θερμὸν αὐτῶν αὐτῶν ἀποκαταστήσαι τὴν ἀσθενήσαντα πνευματικὴν δύναμιν.* Idem quæ tunc huiusmodi videtur. Hoc est: Ac proinde continenter ispirare cogetur, abigē exillatione aliquand quod aucti caloris est proprium.

Lib. v. Pag. 518.

Copius: lam ex iccinoris quoque affectu mori accidit, sed alia ratione, usedia scilicet. Græcè legitur: *ἀπὸ γὰρ ἀσπασίας.* Hoc est: Ob atropisiam. Quo affectu detenti, edunt quidem, sed ciborū vñu non promouentur.

Ibidem.

Verum hæ consentiente corde eveniunt. Græcè: *ἀλλὰ ἐπεὶ αὐτὸ γινώσκει διακρίσει ἐκκαταστήσει ὅτι ἡ καρδία.* Quod est: Sed & ipsæ etiam sunt corde, lege coniortū affectu.

Pag. 540.

Respirationis tēpore. Græcè: *ἡνὰ τὴν ἀναπνοήν.* Hoc est: Expirationis tempore.

Pag. 544.

Ita rursus intendi præcordia. Græcè: *ἐκκαταστήσει πάλιν αὐτῶν τὴν ἐκκαταστήσαντα.* Hoc est: Quem admodum rursus reuelli quidem præcordia.

Ibidem.

Non incipiente videlicet affectu, sed cūm paratus iam fuerit. Græcè: *ἵνα ἡ καρδία ἀποκαταστήσει τὴν ἀσθενήσαντα.* Quod est: lam consentit affectu.

Pag. 549.

Nam ad propriam eius rationem pertinet, & appetentiam prohibere, & natantes cibos corrumpere, quemadmodum id laudat quāq̃ fieri solet, cūm cibi in ventriculi fundo firmantur. Græcè: *ἐπεὶ αὐτὸ τὸ θερμὸν αὐτῶν αὐτῶν ἀποκαταστήσει τὴν ἀσθενήσαντα πνευματικὴν δύναμιν.* Idem quæ tunc huiusmodi videtur. Hoc est: Quem admodum rursus reuelli quidem præcordia.

Pag. 549.

Torum enim ventrem purgat, virēque reparat. Græcè: *ἐπεὶ ἡ φύσις αὐτῶν τὴν ἀσθενήσαντα πνευματικὴν δύναμιν ἀποκαταστήσει.* Hoc est: Atq̃ ad proprias actiones corroborat.

Pag. 553.

Atque in pulmōnis inflammatione erysipela-

tis participat, ardentes febres excitantur: quem admodum vbi in vniuerso quoque corpore biliosi humores ad immoderatum feruorem perueniunt. Græcè: *ἐπεὶ αὐτὸ τὸ θερμὸν αὐτῶν αὐτῶν ἀποκαταστήσει τὴν ἀσθενήσαντα πνευματικὴν δύναμιν.* Hoc est: Quem admodum etiam per vniuersum corpus, ob putredinem biliosorum humorū immodicè effervescunt.

Pag. 568.

At fellis folliculus, vitpore cui nullum succurrit ab animali facultate præsidium, &c. Græcè: *ἐπεὶ αὐτὸ τὸ θερμὸν αὐτῶν αὐτῶν ἀποκαταστήσει τὴν ἀσθενήσαντα πνευματικὴν δύναμιν.* Hoc est: Cui nihil iuuetur ad excretionem à facultate animali.

Lib. vi. Pag. 570.

Copus. Neque aliarum partium vlla efficitur, in ius quā aqua frigida vinosa epota, mox aqua inter cutem cōspiciuntur. Græcè legitur: *ἐπεὶ αὐτὸ τὸ θερμὸν αὐτῶν αὐτῶν ἀποκαταστήσει τὴν ἀσθενήσαντα πνευματικὴν δύναμιν.* Hoc est: In iis qui cōferim, autem pethucq̃ aquam frigdam simul atq̃ vinofam bibunt.

Pag. 577.

Verūm cūm primū eos vidissem, curationem à medicamentis, quæ vñam cūere possent, tentavi, quā postea experientia comprobauit. Græcè: *ἐπεὶ αὐτὸ τὸ θερμὸν αὐτῶν αὐτῶν ἀποκαταστήσει τὴν ἀσθενήσαντα πνευματικὴν δύναμιν.* Hoc est: Ceterū curationem, vbi primū eos vidi, per dyretica medicamenta speravi futurā, Atque ita successit.

Pag. 584.

Paucis omnino intervallis vtrāq̃ excernuntur. Græcè: *ἐπεὶ αὐτὸ τὸ θερμὸν αὐτῶν αὐτῶν ἀποκαταστήσει τὴν ἀσθενήσαντα πνευματικὴν δύναμιν.* Quod est: Se d paulatim vtrāq̃ effluunt.

Pag. 589.

Quæ mulieribus ad pariendum à natura data est. Græcè legitur: *ἐπεὶ αὐτὸ τὸ θερμὸν αὐτῶν αὐτῶν ἀποκαταστήσει τὴν ἀσθενήσαντα πνευματικὴν δύναμιν.* Hoc est: Ad conceptionem.

Pag. 590.

Itaque pereunte ob vteri affectum spiratione, quoniam vniuersum corpus refrigeratur, id enim manifestè videtur, fieri potest, vt nulla prodeat ab ore spiratio, quamvis ea quæ in arteriis sit, nequaquam intercipiatur. Græcè: *ἐπεὶ αὐτὸ τὸ θερμὸν αὐτῶν αὐτῶν ἀποκαταστήσει τὴν ἀσθενήσαντα πνευματικὴν δύναμιν.* Quod sic ad verbum reddidimus: Fieri autem potest, vt pereunte ob vteri affectum spiratione, quandoquidem tūc totum corpus refrigeratur (id quod euidenter apparet) minimè quidem fiat per os respiratio: transpiratio autē, quæ sit per arterias, seruetur.

Pag. 593.

Ac sanorum modo educatus. Græcè: *ἐπεὶ αὐτὸ τὸ θερμὸν αὐτῶν αὐτῶν ἀποκαταστήσει τὴν ἀσθενήσαντα πνευματικὴν δύναμιν.* Hoc est: Salu brig se cundum omnia vsus victus ratione.

Pag. 594.

Ant præ marcore lardum, molestūque reddit odorem. Græcè: *ἐπεὶ αὐτὸ τὸ θερμὸν αὐτῶν αὐτῶν ἀποκαταστήσει τὴν ἀσθενήσαντα πνευματικὴν δύναμιν.* Quod est: Aut putredinis grauem odorem referens.

Pag. 597.

Eam esse censetur vasorū ad ipsūm pervenitum

tium & plenitudo & suspensio. Græcè legitur : *ἡ πλεονεξία τῆς καρδίας ἐστὶν ἐν τῇ σπλῆνι*, *ἡ πλεονεξία τῆς σπλῆνός ἐστιν ἐν τῇ καρδίᾳ*. Hoc est: Vaso rû ad ipsum pervenientium, appendicumq; eorum, plenitudo. Sic nanque legendum esse, indicat dictio sequens, quæ est talis: Itaq; multiplicatus sanguis in venis, eas extendit, atq; vicinas ipsis appendices. Nam vbi interpres convertit vincula, codex græcus habet, *ἀπὸ πλεονεξίας*.

Ibidem.

Igitur si æqualiter vndiq; trahitur, recta erit, & sine inclinatione ipsorum transmutatio. Si vero inæqualiter, ad partem vehementius trahentem intenduntur. Græcè: *καὶ ἢ ἂν τὴν ἐν τῇ σπλῆνι πλεονεξίαν, ἀπὸ τῆς ἐν τῇ καρδίᾳ πλεονεξίας, ἡ πλεονεξία τῆς σπλῆνός ἐστιν ἐν τῇ καρδίᾳ*. Quæ sonant: Si igitur inæqualiter vndiq; trahatur verus (apud Græcos, n. *αἰ* *μὴ* *πλ* in plurali significant vterû) recta erit ipsius transmutatio. Si vero inæqualiter, ad partem vehementius trahentem, intenditur.

Pag. 399.

Nonnullis parvis in extrema illius parte excidatur, veluti viris quoq; eodem in loco nonnumquam oriri solet. Qui vbi suppuratus aliquando fuerit, secari debet. Atque hanc partem siue membrû suppuratum dissectumq; vidimus, interdum ignorantibus medicis inexpertis quid incideret: interdum verò intelligentibus quoq;. Atq; omnia membra ita suppurata facili curantur. Græcè legitur: *ὡς ἂν ἡ ἐν τῇ σπλῆνι πλεονεξία, ἡ πλεονεξία τῆς σπλῆνός ἐστιν ἐν τῇ καρδίᾳ*. Hoc est: Quod est: Cum neg amplius vincantur. Ibidem.

Propterea autem, quicquid cibi glutinosi sunt ac crassi, sunt magis morbus obnoxii. Græcè: *καὶ ἡ ἐν τῇ σπλῆνι πλεονεξία, ἡ πλεονεξία τῆς σπλῆνός ἐστιν ἐν τῇ καρδίᾳ*. Hoc est: Idcirco quicunque ex cibo lentis & crassis sunt succi, si magis morbosici existunt, etc. Humana siquidem corpora dicuntur obnoxia morbis: cibi autem, vel morbosici, vel salubres.

Pag. 617.

Ex quibus omnibus simul cor affici est necessarium. Græcè: *ὡς ἂν ἡ ἐν τῇ σπλῆνι πλεονεξία, ἡ πλεονεξία τῆς σπλῆνός ἐστιν ἐν τῇ καρδίᾳ*. Hoc est: Cum quibus omnibus simul cor affici est necessarium.

Pag. 630.

Sicviti in his qui nō tempore frigidam bibūt. Græcè: *καὶ ἡ ἐν τῇ σπλῆνι πλεονεξία, ἡ πλεονεξία τῆς σπλῆνός ἐστιν ἐν τῇ καρδίᾳ*. Hoc est: Intemperantia.

Pag. 633.

Et quidem sæpius commouent, dormitantium more. Græcè legitur: *ὡς ἂν ἡ ἐν τῇ σπλῆνι πλεονεξία, ἡ πλεονεξία τῆς σπλῆνός ἐστιν ἐν τῇ καρδίᾳ*. Hoc est: Ac sæpe sæpius commouent.

Pag. 635.

Omnibus siquidem hæcticis febribus hoc inseparabile adest indicium, alio cibo quidem, febrem accendi. Græcè legitur: *ὡς ἂν ἡ ἐν τῇ σπλῆνι πλεονεξία, ἡ πλεονεξία τῆς σπλῆνός ἐστιν ἐν τῇ καρδίᾳ*. Hoc est: Caliditatem quidem accendi.

Pag. 636.

In omnibus siquidem febribus aliis, huiusmodi introitus etiam præter cibum assumptum, sunt in compressis. Græcè legitur: *ὡς ἂν ἡ ἐν τῇ σπλῆνι πλεονεξία, ἡ πλεονεξία τῆς σπλῆνός ἐστιν ἐν τῇ καρδίᾳ*. Hoc est: Inconculsi insultus.

Pag. 637.

Si enim aquam frigidissimam miscueris. Græcè legitur: *ὡς ἂν ἡ ἐν τῇ σπλῆνι πλεονεξία, ἡ πλεονεξία τῆς σπλῆνός ἐστιν ἐν τῇ καρδίᾳ*. Hoc est: Insudoris.

Lib. I. de differentiis febrium,

Pag. 644.

Leoniceus: At in tertianis quidē, causam à qua provenit, rei quodāmodo pungentis, ac ferientis sensum representat: in quartanis autē, refrigerantis. Græcè: *ὡς ἂν ἡ ἐν τῇ σπλῆνι πλεονεξία, ἡ πλεονεξία τῆς σπλῆνός ἐστιν ἐν τῇ καρδίᾳ*. Hoc est: Sed qui in tertianis accedit rigor, seu rei cuiusdam pungentis atque ferientis, sensum causat.

LL η

### Lib. I. de differentiis febrium.

Pag. 611.

Eonic. Ac nihilo minus in corde ipso, ut quæ ad idem cōflant cū omnibus ipsis. Græcè: *ὡς ἂν ἡ ἐν τῇ σπλῆνι πλεονεξία, ἡ πλεονεξία τῆς σπλῆνός ἐστιν ἐν τῇ καρδίᾳ*. Quod est: Cui confluxile & conspirabile cum vniuersis arteriis.

Pag. 613.

Ex quarū numero febris est vna, quoniam in

representat: qui in quartanis autem, tanquam refrigerantis.

Ibidem.

Atque in pluribus circuitibus continentur. Græcè additur. *τὰς κατὰ μέρος*. Hoc est: in pluribus particulis circuitibus.

Page. 646.

Ac secundæ accessionis festinat inuasio. Græcè *ἐκείνη δὲ δευτέρῃ καὶ τρίτῃ καὶ τεταρτῇ καὶ πέμπτῃ*. Hoc est: Multo magis festinat inuolutus: siue, anticipat.

Page. 647.

Quicquid optimum fieri contingerit. Græcè: *ὅτι οὐδὲν ὑγιεινὸν γινώσκοντες*. Hoc est: Quicquid potuit: ita corrigi.

Page. 657.

Sic & hemitritæus, dimidiam eius partem habet tertianam. Græcè habetur: *ὡς*. Hoc est: Sui ipsius.

Page. 661.

Etiam tardi ac difficilis morus, frigida ac lenta existens materia. Græcè legitur: *ἀργὴ καὶ δυσκίνητος, καὶ ψυχρὴ καὶ σκληρὰ καὶ βραδύτης*. Quod est: Quum iumum in humor piger, ægrè mobilis, inigidus, ac naturaliter tardè permeans existat.

Page. 663.

Nam ex his quæ de biliosa & pituitosa febre simul committis conscripsimus, licet & hæc ad atræ bilis humorem transierit, eius cum utraque illarum complexio nem ac confusione panter coniecturatur. Græcè legimus: *καὶ τὸ μίαν καὶ τὴν ἄλλην*. Hoc est: Ad melancholicam febrem.

Page. 665.

Externa autem corrumpere, quod est putrescere. Græcè: *καὶ τὴν ἐξωτερικὴν*. Hoc est: Quod est putrescere, etc.

Ibidem.

Calor autem extrinsecus, sanguinē opprimit. Græcè: *ὁ θερμὸς ἐκ τοῦ ὕδατος ἀποσπᾷ τὸν αἷμα*. Hoc est: Incalescit autem externo calore sanguis.

Page. 666.

Quod ex his humoribus, qui carbunculi appellantur, contingit. Græcè: *ὅτι οὗτοι καὶ τὸ καὶ τὸν αἷμα καὶ τὸν χυμὸν ἀποσπᾷ*, etc. Nempe: Quemadmodum in vocatis carbonibus.

Page. 668.

Inflatur. Græcè: *καὶ τὸν αἷμα*. Hoc est: Inflatur.

Page. 669.

Ita & in interioribus quæcumque non videntur eandem proportionis similitudinē seruare, fieri concipiendum. Græcè: *ὅτι καὶ ἐν τοῖς ἐντρίσις καὶ ἐν τοῖς ἐξωτρίσις*. Hoc est: Sic oportet imaginari etiam in interioribus, quæcumque, cum non sint obiecta visui, eandem tamen analogiam perpetuò seruare.

Ibid.

Et meatus, qui materiam in vtilem excernunt: Græcè legimus: *ὅτι οὗτοι αἱ ἐκ τοῦ αἵματος*. Hoc est: Deducentes. Si quidem non meatus, sed facultas ipsa expultrix excernit.

Page. 673.

Quia videlicet humor, quæ proprius calor non obtinet, nihil habet reliquū. Græcè: *ὅτι οὗτοι καὶ τὸν αἷμα καὶ τὸν χυμὸν ἀποσπᾷ*, etc. Hoc est: Ex quia humor qui a proprio calore non vincitur, nihil amplius superest, nisi etc.

Page. 677.

Neque etiā omnibus equaliter accendi aut dissolui cōtingit. Græcè legitur: *ὅτι οὐ πάντες*. Hoc est: Oportet.

Page. 678.

Vt febris accendatur. Græcè: *ὅτι οὐ πάντες*. Hoc est: Ac febris accendatur.

Page. 679.

Sed id solūm quod ita est extenuatum, & in subtilioris vaporis naturam transierit. Græcè: *ὅτι οὗτοι καὶ τὸν αἷμα καὶ τὸν χυμὸν ἀποσπᾷ*. Hoc est: Vt in tenuis vaporis naturam transierit.

Page. 680.

Quidam feruentium humorū diffusus. Græcè additur: *ὅτι*. Hoc est: Existens.

Page. 681.

Quod qui putrescere incipit humor, in aliquo membro consistit. Græcè legitur: *ὅτι οὗτοι καὶ τὸν αἷμα καὶ τὸν χυμὸν ἀποσπᾷ*. Hoc est: Alter, siue diuersus, existit.

## Libro de arte medicinali.

Page. 706.

Leonicenus: Et in alabrum. Græcè: *ὅτι οὗτοι*. Hoc est: Et morbidorum.

Page. 709.

In vno autem tempore, quod ita est neutrum, consistere nequit. Græcè additur: *ὅτι οὗτοι*. Hoc est: Accurate quidem nequit consistere.

Page. 713.

In hac enim necesse est: ut posteriores, priorēve partes. Græcè legitur: *ὅτι οὗτοι*. Hoc est: Posteriores priorēque partes.

Page. 715.

Mediæque sunt inter eos qui omnino sunt crispī, & simplices. Græcè corruptè legitur: *ὅτι οὗτοι*, pro *ἀπλῶς*. Hoc est: Lenes.

Page. 716.

Capilli quoque in lūis statim in lucem editis, habent in capite ortū. Græcè habetur: *ὅτι οὗτοι*. Hoc est: Celeriter generantur.

Page. 718.

Implentur verò atque aggrauantur eorum capita a calidis. At si humectentur, tunc multo magis excrementorum habent multitudinem. Græcè: *ὅτι οὗτοι καὶ τὸν αἷμα καὶ τὸν χυμὸν ἀποσπᾷ*. Hoc est: Quod si humectentur etiam, tunc multo magis, præcipue dum excrementorum copia redundant.

Page. 710.

Paruitas verò oculorū, adiuncta quidem cōcinnitate, ac virtutum operatione. Græcè: *ὅτι οὗτοι*. Hoc est: Et operationum virtute.

Page. 723.

Ad actiones autē prompti sunt, & iracundi, & impudentes. Græcè legitur: *ὅτι οὗτοι*. Hoc est: Celeres: non impudentes, quod interpretes vērunt.

Page. 725.

Sed de insitis vnicuique, ac naturalibus nos exposuisse. Legendū tamen est: sunt a nobis exposita. Alioquin non rectè fuit oratio, sic illic eam deducas, ubi Galenus ait: Quod quæcumque, etc.

Page. 735.

Dictum verò est in tertio de causis accidentium, quod cuiusque potentie virtus & visus, temperatura principalis existit. Græcè habetur: *ὅτι οὗτοι*. Hoc est: Quod quæcumque, etc.

liber

SECTIONE  
QVINTA.

Lib. II. de medendi methodo.

Pagina 736.

Ad imum ventriculi locum, quem Græci pyloron vocant. Græcè: ἀπὸ πύλων. Hoc est: Ad imum orificiū ventriculi, qui ianitor appellatur.

Pag. 746.

Horum autē singulorū, quæ dicta sunt, qualitas in ipsa corporis constitutione est eligenda. Græcè habetur. ἡ δὲ ἐν τῷ σώματι οὐκ ἐστὶν ὁμοία. Hoc est: In optima constitutione.

Ibidem.

Alteram verò eam quæ ad optimā transferūt. Græcè: ἡ δὲ ἐν τῷ σώματι οὐκ ἐστὶν ὁμοία. Hoc est: Alteram verò, earum quæ ad optimam ducunt.

Pag. 752.

Alias quidem esse salubres causas eius temperaturæ. Græcè legimus: ἀσθενείας. Hoc est: Intemperantiz.

Pag. 754.

Atq; ad illas impellemus, quæ nullum habent principatum. Græcè: ἀπὸ πύλων ἡ δὲ ἐν τῷ σώματι οὐκ ἐστὶν ὁμοία. Hoc est: Irritabimus autem illos, qui ad partes minimè principes, scilicet ducunt.

Pag. 757.

Intentio tamē, quoad fieri potest, curationē adhibere, ad cōtrarium evertitionis adducendo. Græcè habetur: ἡ δὲ ἐν τῷ σώματι οὐκ ἐστὶν ὁμοία. Hoc est: Quod est: Quæcumq; igitur in pulmone atq; thorace ambiuntur, cum tuis sanè expurgātur, sed à medicaminibus extennantibus.

Ibid.

Aut per vrinam, aut per ventriculum. Græcè: ἀπὸ πύλων. Hoc est: Aut per aluū. Nam ventriculū, siue à βέλτα, ventrem superiorem significat: quē admodum ἀπὸ πύλων, inferiorem.

Pag. 760.

Prus à parte repellēdum: mox dispergendū. Græcè: ἀπὸ πύλων. Hoc est: Prus debet repellere à parte, quā ag-grediari dīcutere.

Pag. 764.

Hæc igitur omnia sanare possibile est. Græcè legitur: ὅτι ἐν τῷ σώματι οὐκ ἐστὶν ὁμοία. Hoc est: Propēdum est possibile.

Pag. 765.

Quare & duplex sanandi modus. Alter quidē ad oppositā partē ei à qua facta est permutatio, impellendo atq; impellendo. Alter verò, id quod cōiunct, firmitus solidūq; reddendo. Græcè: ἀπὸ πύλων. Hoc est: Quare & curatio ipsa, in illa quidē (hoc est, in luxatione) fiet ad oppositā partem ei, ad quā facta fuit permutatio, impellēdum nobis. In altera verò (hoc est, in enterocelē) id quod continet, firmitus solidūq; reddentibus.

Lib. Quomodo simulantur morbum  
sint coarvendi. Pag. 771.

Ignardus: Quando ex indigestione. Græcè: ἀπὸ πύλων. Hoc est: Ex cruditatibus.

Pag. 45.

Linacer: Nyctilopa dicunt, Græcè legitur: νύκτα. Hoc est: nyctilopa. Dicitur autē nyctilops, qui noctū cæcus est, cum dare interdiu cer-nat. Plin. lib. 8. cap. 50. huius voculæ meminit, di-cens: Restituit vesperstinam aciem his, quos ny-ctilopas vocant.

Pag. 67.

Quippe ipsam sequentis siue agendi infusua-tionem, Græcè: ὅτι ἐν τῷ σώματι οὐκ ἐστὶν ὁμοία. Hoc est: Ipsam veluti consecutionis imaginem.

Lib. 111.

Pag. 115.

Linacer: Sin scicior debito particula tantō fue-rit, quantō corporis temperamentū iusto est hu-midius. Græcè habetur: ὅτι ἐν τῷ σώματι οὐκ ἐστὶν ὁμοία. Hoc est: At si particula fuerit scicior iusto, quā cor-poris temperamentum sit iusto humidius.

Lib. 1111.

Pag. 144.

Linacer: Exiguorum status mutatio. Græcè: μικρὰ μεταβολή. Hoc est: Transmutationis meatuū

Lib. v.

Pag. 171.

Linacer: Præsertim per angustias, vel princi-pes particulas. Græcè: ἀπὸ πύλων. Hoc est: Et præcipue per angustias quādam:

Lib. v 111.

Pag. 285.

Linacer: Itaq; si iā præsens febris est, etc. Græcè: ὅτι ἐν τῷ σώματι οὐκ ἐστὶν ὁμοία. Hoc est: Si igitur genitæ iam febres fuerint.

Pag. 317.

Alterā quæ ex ipsorū quæ indīcitur, dignitatib; censetur. Græcè: ἀπὸ πύλων. Hoc est: Alteram, quæ ex indicantū dignitatibus spectat. Huic versio-ni nostræ subscribit quod habetur lib. x. pag. 394. Perpensio scilicet indicitium scoporū tum magnitudine, tum dignitate.

Pag. 394.

Perpensio scilicet eorum quæ indicent Græcè additur: σκορία. Hoc est: Scoporum.

Lib. x 11.

Pag. 431.

Linacer: Quod ad dolores ex sensus torpore sedādos, nullo minus est celebrē. Græcè: ἀπὸ πύλων. Hoc est: Quod ad dolores sedādos stupefaciēdo sensum, nullo minus est celebrē.

Pag. 443.

Nam si imbecillum illi caput est, & quod faci-le calentibus vinis impleatur, etc. Græcè legitur: ὅτι ἐν τῷ σώματι οὐκ ἐστὶν ὁμοία. Hoc est: Et calidis vinis. At mul-ta frigida vina faciliē incallescere possunt, si vide-lucet igni admoveantur.

Lib. x 111.

Pag. 490.

Linacer: Imō posteaq; vniuersum corpus va-cuaneris, ac necessariū est, eorū quæ in inflāmata parte cōtinentur, aliquid educas. Græcè: ἀπὸ πύλων. Hoc est: Sed posteaq; vniuersum corpus vacuaueris, vitēq; fuerit, eo-rū quæ in inflāmata parte cōtinentur, aliquid etiā

LL in

educere.

Ibidem.

Genes andis autem adhuc vitilis. Græcè: γενεάς αὐτῆς ἔτι βελήεις. Hoc est: vbi verò affectus etiam in generatione constant.

Lib. x. tit. l. Pag. 319.

Linacæ: His verò etiam picari cōmodum est: id est: tertio aut quarto quoque die. Græcè: διὰ τριῶν ἢ τεσσάρων ἡμερῶν. Quod est: Curriculo triū, aut quatuor dierū. Cum quæ lectione in vnum conspirat sententia illa, quæ paulo post habet in hūe modum: Ergo neq; assidue id ægrotanti corpori admouere conveniet: nec cūm conveniet, sapē illinire: verū in hyeme bis, in æstate semel id fecisse, est satis. Vnde liquet ex sententia Galeni, minimè quidē tertio, aut quarto quoque die, illos ægros picandos esse, sed semel quidem cūta te, bis autē hyeme: sic tamen vt singulæ vices tri duum, aut quatrīdium occupent.

Pag. 321.

Membranulam mollem firmamq; cuti gummi illæ circumvolvens. Græcè additur: χάρυν. Hoc est: Ex charta membranulam.

Lib. l. de arte curatiua ad Glauconem.

Pag. 7.

Leonicenus: Et oculorū motus manifestus. In leucis exemplaribus græcis legitur: ὁκός. Vt rusticissimus autem nuanuicrius habet: ὁκός. Vt sit sensus: Oculorū etiam motus indicat, etc. Nā qui fieri potest, vt manifestus sit in eis oculorū motus, cūm vix possint (quod postea subditur) palpebras ipsas attollere.

Pag. 14.

Nam quæ velociter fiunt, ac celeriter ad statū veniunt, etc. Græcè legitur: τὰ βραχὺ ἴσθι. Hoc est: morbos acutos.

Pag. 17.

Non igitur nocte, minimèq; exquiritæ febres diuturnæ sunt, vt quodamque & quartanæ. Græcè: οὐ γὰρ ἐν τῇ νύκτι, καὶ οὐκ ἐν τῇ τετάρτῃ. Hoc est: Non igitur quemadmodū exquiritæ quotidianæ & quartanæ, sic etiam nō exquiritæ sunt longæ.

Pag. 19.

Atq; ideo vehementes evacuationes, quæ ex matricibus fiunt, cucurbitulæ mamillis appositæ statim sedant. Græcè: αὐτὰς τὰς μαστοὺς ἐν τῇ νύκτι καὶ ἐν τῇ τετάρτῃ. Hoc est: Iuxta māsas applicitæ. Debēt itaq; dum sic revellere est animus, nō ipsīs mamillis, sed radici earū, cucurbitulæ ipse applicari, si qua fides medicorum decretis sit adhibenda.

Pag. 37.

Ad calidæ sint, ad vrentes, Græcè: πρὸς ἀκαταί.

Hoc est: Atq; vrentes.

Ibidem.

Ac submersæ quodammodo. Græcè: ἀπὸ πυρρῆς. Quod est: Veluti fumigantes.

Pag. 38.

Sed ante crisi perturbationē. Græcè: ἀπὸ τῆς κρίσεως ταραχῆς. Hoc est: Sed in ipsa ante crisi perturbatione.

Ibidem.

Nam si quod in eo membrū agitur. Græcè: ἐν τῷ μέμβρῳ ὡς ἀγίται. Hoc est: Etiam si quæ in ipsa facie pars palpitet.

Lib. ii. Pag. 42.

Leonic. Nam ex duabus speciebus, quæ qui-

dem nuper dictæ sunt, altera, etc. Græcè legitur: καὶ τὰς δύο ἀπὸ τῶν ἀνωτέρω, ἢ τῶν ὑποκείμενων. Hoc est: Alarum verò specterum duarum, hæc quidem, cuius nuper mentionem fecimus.

Ibidem.

Sed minus calidæ & acri, q̄ sit prior. Græcè: καὶ ὡς ἂν ἦτορ. Hoc est: Quam illæ species priores.

Pag. 46.

Sufficit autem in huiusmodi affectibus, ve hementiam doloris mitigare, cum aliquo ex his quod ex vino dulci, & oleo rosaceo, & pauca cera, quæ in vitroque sit liquata, conficitur. Græcè legimus: ἵνα δὲ τὰς δύο τὰς ὑποκείμενων, ἢ τὰς ὑποκείμενων, ἢ τὰς ὑποκείμενων, ἢ τὰς ὑποκείμενων. Hoc est: Quæ ex passio, & oleo rosaceo, & pauca cera, quæ in vitro li- quata sit, constant.

Pag. 48.

Herpetes autem, quantum ad totius corporis evacuationem attinet, vt resipiscata curare oportet. Quantum verò ad ipsius particulæ patientis locum, etc. Græcè: τὰς ἐν τῷ σώματι καὶ ἐν τῇ θέσσει. Hoc est: Quantum verò ad eam, quæ patienti debetur particulæ.

Pag. 51.

Aut mamillis cucurbitas apposuerit. Græcè: καὶ ἐν τῇ θέσει. Quod est: Aut iuxta mamillas.

Ibidem.

Et cucurbitulas coxis applicueris. Græcè legitur: ἐν τῇ θέσει. Quod equidē mallem vertere, in gub- nibus, aut fœminibus.

Pag. 51.

A coniunctis evacuatio faciendæ est. Græcè: καὶ ἐν τῇ θέσει. Hoc est: a contugatis.

Pag. 54.

Iam verò, & qualitates quædam extraneæ. Græcè: ἑτέρας. Hoc est: Insolentes.

Pag. 71.

Igitur emplastica omnino medicamēta, quæle est Machæronis, & Epigoni, & quod līs cognominatur, vbi ad emmоторū vsum deducitur, ce- tari indigent admisione. Nempe hæc ad sinus vitilia sunt. Græcè legitur: ἐν τῷ σώματι καὶ ἐν τῇ θέσει. Hoc est: Quæcumq; igitur ex- quisitè emplastica medicamenta cūm sint, quæle existit quod ad Machæronem, Epigonemq; re- fertur, quodq; līs cognominatur, vbi deducun- tur ad emmоторū vsum, ceratā miscella indi- gent: ea enim ad sinus vitilia sunt.

Pag. 78.

Quæ a natura purgationem nō habent. Græcè: ἐν τῷ σώματι καὶ ἐν τῇ θέσει. Hoc est: Quæ naturali sua purgatione priuantur.

Pag. 80.

Passiones insequitur. Græcè: ἀκολουθεῖ. Hoc est: Per cōsensum afficiuntur cōiung partes.

Ibidem.

Cūm propē loca mortalia sit insignis ad vñtio. Græcè legitur: ἐν τῷ σώματι καὶ ἐν τῇ θέσει. Sed legendū est, ὡς ἔστιν. Hoc est: Prope principales particulas.

Pag. 81.

Hæc quidem ad te missa, qui longè peregrina- turus eras, medio crure se habere vñta sunt. Græcè: ἐν τῷ σώματι καὶ ἐν τῇ θέσει.



vim. Hoc est: Vt plurimum autē secundum reliqua viscera gignitur Ictēlica febris, infuso balneo humore in ventrem visceris male affecti.

# SECTIONE SEXTA

## LIBRO PRIMO, DE COMPOSITIONE PHARMACORUM secundum genera. Pag. 25.

Andern. Docti pariter etis primae curationis consiliū à morboſis dispositionibus suggeri. Græcè, *ἐν τῇ πρώτῃ ἐκ τῆς ἀσθενείας ἐκ τῆς πρώτης ἐκ τῆς ἀσθενείας*. Hoc est: Didicistis autē primum curationis scopum à morboſis proficisci dispositionibus. Pag. 35.

Non adhuc extremū frigus admoiemur. Græcè, *ἐν τῇ πρώτῃ ἐκ τῆς ἀσθενείας ἐκ τῆς πρώτης ἐκ τῆς ἀσθενείας*. Hoc est: Nō amplius egemus adventitia frigiditate. Lib. II. Pag. 79.

Andern. Hæc sanē sed & prius ostendimus, in tertio Therapeutice commentario, diximus, præſcipientes ea ex demonstratōne cōvenienti ad reliqua deduci. Græcè legitur: *ἐν τῇ πρώτῃ ἐκ τῆς ἀσθενείας ἐκ τῆς πρώτης ἐκ τῆς ἀσθενείας*. Hoc est: Hæc igitur dicta nobis iam antea sunt, expositiōis etiam in tertio lib. De medēdi methodo. Quare præſcipientes ipsa cū decēnti demonstratōne, ad reliqua promouebo, &c. Cæterū diminutē legitur in impressis codicibus, *ἐν τῇ πρώτῃ ἐκ τῆς ἀσθενείας*, id quod seſellat interpretem.

Lib. III. Pag. 145.

Andern. Huius generis est lixiua quæ stacte dicitur. Atq; hanc ipsam quæ ex materia subtili viſta est, cedrinū oleū virtute superat. Græcè: *ἐν τῇ πρώτῃ ἐκ τῆς ἀσθενείας ἐκ τῆς πρώτης ἐκ τῆς ἀσθενείας*. Hoc est: Eiusdem cum cedrino est generis lixiua stillatini vocata. Atq; inter species lixiuarū, illa est potentior oleo cedrino, quæ ex materia tenuiorū partium composita, confecta fuerit.

Pag. 155.

Iam aliis multis pharmacis potentia pauculis annis retinere cōtingit: attamen euphorbiū alio nullo sanē minus post thapsiā. Sed clarius in græco exemplari: *ἐν τῇ πρώτῃ ἐκ τῆς ἀσθενείας ἐκ τῆς πρώτης ἐκ τῆς ἀσθενείας*. Cæterū alius etiam compluribus pharmacis accēdit, vt pauculis annis eorū vis evanescit: id quod post thapsiam, nullo minus euphorbio contingit.

Pag. 172.

Tale igitur consecutus, & hanc ipsam cōmemoratam vñctiōē audenter puncturis imponi rō, vbi oris hīare metus est. Cuius contrariū habent priores codices Græci: *ἐν τῇ πρώτῃ ἐκ τῆς ἀσθενείας ἐκ τῆς πρώτης ἐκ τῆς ἀσθενείας*. Hoc est: In quibus ventris fueris ne conuiueant atq; occludatur oscula. Siquidem vt hīare Græcis est *χάσις*, sic *πύσις* claudī, & orificia obstrui: id quod in punctis neruis est summū malum. Ac proinde Galenus, vt omni ratione aperiantur, ducit esse magnū opere precium.

Pag. 180. Vbi agit de sumptuosius pharmacis.

Vbi enim quispiā pharmacorū medicorūq;

studiosus nō plura quingētis myriadibus haberet, nullo simpliciōri dignabatur vt multo magis vel diues aliquis vel monarcha odoratum simul, & quod multa cōſter pecunia videret habere pharmacū. Illa tamen sentētia prior clarius ex dictōne græca percipitur: *ἐν τῇ πρώτῃ ἐκ τῆς ἀσθενείας ἐκ τῆς πρώτης ἐκ τῆς ἀσθενείας*. Quæ sonant: Quandoquidem cum quidam pharmacorū & medicorū studiosus, ratiſſerū non haberet plures quinquaginta myriadibus, dignabatur tamen vt medicamentis vulgaribus: multo certē magis, &c.

Lib. III. Pag. 197.

Andern. Non tamen cum refrigerantī oleo liquare ipsum oportet. Græcè legitur: *ἐν τῇ πρώτῃ ἐκ τῆς ἀσθενείας ἐκ τῆς πρώτης ἐκ τῆς ἀσθενείας*. Quæ sunt verenda. Non tamen obvio quouis oleo ipsum liquare oportet. Quam lectiōnem confirmat ſequens sententia, quæ talis est: Sed si quidem rubor aut calor aliquis in circumſoſis viceri partibus præpollere videatur, ex quopliā astringentium simul & refrigerantium: cuiusmodi myrtinum atq; melinum est.

Lib. VI. Pag. 339.

Andern. Quodd auxiliōriū quædam ratio sola inuenit, quædam experientia, quæ & ipsa rationem requirit: nōnulla vtriusq; opem poſtulant, ſubinde nobis est declarata. Græcè habetur: *ἐν τῇ πρώτῃ ἐκ τῆς ἀσθενείας ἐκ τῆς πρώτης ἐκ τῆς ἀσθενείας*. Hoc est: Quodd auxiliolum quædam à ratione sola inueniantur: quædam ab experientia sola, nec deſiderante rationem, &c. Multa ſiquidem ſola experientia citra rationis opem inuenit.

Lib. VII. Pag. 380.

Andern. Porro ex iis quæ à glutinatione *ἐκ τῆς ἀσθενείας* nominantur, nullum auferendum est prius, quā ſua ſponte abſcedit. Atqui ſi lauentis, permittenda ſunt. Græcè legimus: *ἐν τῇ πρώτῃ ἐκ τῆς ἀσθενείας ἐκ τῆς πρώτης ἐκ τῆς ἀσθενείας*. Hoc est: Imo verō etiam ſi quiſpiam lauet, ſinenda ſunt vt adhaereant. Monet itaque tenacia medicamenta, quæ applicamus corporibus, ne in balneis quidem eſſe amouenda, donec vltro ipſa decidunt.

## Lib. I. de compositione pharmacorum secundum partes.

Pag. 435.

Ianus Cornarius: Aliis verō herbis quæ iuxta humiliores regiones proveniūt, reliqui tonus corporis pili ſimilem generationē habent. Græcè legitur: *ἐν τῇ πρώτῃ ἐκ τῆς ἀσθενείας ἐκ τῆς πρώτης ἐκ τῆς ἀσθενείας*. Hoc est: Reliquis autem herbis quæ in marcidis exvccisq; proveniunt regionibus, &c. Nempe, aliq; tonus corporis pili ſimilem generationem ſortiuntur. Comparauerat ſiquidem primō ipſos capins pilos tritico, aut hordeo creſcenti in aruo aliquo præpingui & ſecundo. Nunc verō languinem reliqui corporis, ſimilem iſis herbis habere generationē ait, quæ in aridis locis, ſterilibuſq; proveniūt. Confirmat hanc lectiōē noſtram Galenus lib. xj. de Vſu partū lūmani corporis, vbi agit de pilis ciliōrū. Cæterū codices qui excuſi habentur, nō *ἐν τῇ πρώτῃ*, ſed mutata *ἐν τῇ πρώτῃ*, hoc est, ſuperiores, habent: quan-



quamquam interpretes non superiores, sed inferiores vertit.

Page. 493. De aceto.

Vrpote quod substantia sua modice calidum est, plurimū verō frigidum, & partū tenuum. Græcē habetur: *ἡ δὲ ὑγρὸς ἢ ἡνὶοὺς τὴν ἰσχυρίαν* *δὲ τὴν ἰσχυρίαν δὲ τὴν ἰσχυρίαν δὲ τὴν ἰσχυρίαν*. Qux mallem hic reddere ad verbum: Vrpote quod substantia quidem sua obbeat paucillum calidi plurimum autem frigidi, atq; tenuium partium.

Lib. 11. Page. 516.

Corn. Qux Archigenes cōsequēter scripsit, in quibus est etiam Galeni censura. Græcē: *ἡ δὲ ἰσχυρίαν δὲ τὴν ἰσχυρίαν δὲ τὴν ἰσχυρίαν*. Hoc est: In quibus etiam habetur Galeni distinctio.

Page. 535.

Itaq; balnea tēperata, & vnctiones, & potus dilutus eis exhibenda sunt: omnisq; dextra liqui dior & boni succi cōstituenda Græcē habetur: *ἡ δὲ ὑγρὸς δὲ τὴν ἰσχυρίαν δὲ τὴν ἰσχυρίαν δὲ τὴν ἰσχυρίαν*. Hoc est: Omnisq; victus rano humidior, & boni succi eligenda. Atq; non omnis victus rano liquidus, est humidus: quā plurima sint cōstituentia fluida, quæ maximā tamen excēdi vim possidēt: vt, exempli gratia, tum mel, tum acetiū.

Page. 555.

Post exacerbationem verō pharmacis hēmi-crānicis est vtendum: si quidem multa caliditas percipiatur, his quæ refrigerans quippiam habet: citra verō hanc, his quæ multū exalfaciāt. Vbi Græcē legitur: *ἡ δὲ ὑγρὸς δὲ τὴν ἰσχυρίαν δὲ τὴν ἰσχυρίαν*. Hoc est: His quæ sufficiēter calfaciant.

Lib. 111. Page. 56.

Cornarius: At verō cōsimilis dolor est ex se rosis & saniosis humoribus in corpore aurium generatis, ei qui ex mordacium humorum illap- su forinsecus factō contingit. Græcē tamen nō habetur, in corpore aurii generatis: sed simpliciter: In corpore generis. Vt sensus sit, cōsimilem fieri dolorem humoribus ex toto corpore in au- res illapsis, ei qui ex mordacium humorū insul- tu forinsecus factō, contingit.

Lib. v. Page. 703.

Cornarius: Si verō liquida per omnē suam sub- stantiam facti appareant dentes, nihil mirū est, ipsos inflammationi aliquid simile pari. Græcē legimus, *ἡ δὲ ὑγρὸς δὲ τὴν ἰσχυρίαν δὲ τὴν ἰσχυρίαν*. Hoc est: Quia sonant: Cū au- tem liquida aliquando tota substantia videantur dentes, non est quod miremur, si perpeti etiam possint aliquid inflammationi simile.

Lib. vi. Page. 741.

Cornarius: Quando verō veluti induratum quiddam de inflammatione relinquatur, penitus non convenit, attingens ad discussorium misce- re, nisi prius totum corpus sit evacuatum. Con- trarium Græci codices dēstant: *ἡ δὲ ὑγρὸς δὲ τὴν ἰσχυρίαν δὲ τὴν ἰσχυρίαν*. Quod est: Cū verō ex inflammatione quippiā

veluti induratum relictum fuerit, penitus nihil attingens miscendum discutiētib; est, si vni- uersum corpus sit evacuatum. Galenus itaq; præd- pit, vt post totius evacuationē corpore, si phle- gmone in scitrum degenerauerit, solis digeren- tibus, discussorisi; viamur: quandoquē tunc verendum non est, ne humiores concitemus ad partes: nimirum corpore ab omni redundantia libero & immuni existente, ob præcedentem e- vacuationem.

Lib. de Theriaca ad Pisonem.

Page. 1041.

Andemacus: Quoniam non solum hoc nomi- ne ceteris omnibus præcellit, q̄ imperiū d- dis sint adepti, sed etiam quōd vniuersa bona, vniuersis libenter impartiunt: sicut & dñ ipsi tā- tum ex æquo gaudiū cōcipiunt, quantus eorum numerus existerit, qui ab ipsis reddūt incola- mes. Hac tamen posterior sententia videtur esse longe diuersa in græcis codicibus, qui sic habēt: *ἡ δὲ ὑγρὸς δὲ τὴν ἰσχυρίαν δὲ τὴν ἰσχυρίαν*. Quod est: Non secus quā dñ ipsi, tantū ex æquo gaudiū cōcipientes, quantū illi qui ab ipsis seruantur,

Page. 1049.

Nos verō cū hac videamus, sciāmūque id quod possit ratione vniuersiūq; medicaminū naturæ virtutis proprietatem verē agnoscere. Græcē legimus: *ἡ δὲ ὑγρὸς δὲ τὴν ἰσχυρίαν δὲ τὴν ἰσχυρίαν*. Hoc est: Quoniam manifestiores in corpore cō- uersiones, mutatōnēq; nō indicat. Græcē legit- *ἡ δὲ ὑγρὸς δὲ τὴν ἰσχυρίαν δὲ τὴν ἰσχυρίαν*. Hoc est: Quoniam manifestiores in cor- pore cōuersiones, mutatōnēq; indicare potuif- set.

Page. 1067.

Adhunc enim peculiariter verba potius ha- beo, quoniam manifestiores etiam in corpore cō- uersiones, mutatōnēq; nō indicat. Græcē legit- *ἡ δὲ ὑγρὸς δὲ τὴν ἰσχυρίαν δὲ τὴν ἰσχυρίαν*. Hoc est: Quoniam manifestiores in cor- pore cōuersiones, mutatōnēq; indicare potuif- set.

Page. 1074.

Potro erant animalia colore subflava, corpo- re robusta. Græcē habetur: *ἡ δὲ ὑγρὸς δὲ τὴν ἰσχυρίαν δὲ τὴν ἰσχυρίαν*. Hoc est: Eximia quadam agilitate mobiles: vipersi sci- licet.

Lib. 11. de antidotis.

Page. 1171.

Andemacus: Hac Nicomedes rex vtatur, si quando eos qui eum vocauerant, in suspitione haberet. Græcē legitur: *ἡ δὲ ὑγρὸς δὲ τὴν ἰσχυρίαν δὲ τὴν ἰσχυρίαν*. Qux sonant: Si quando eorum, qui inui- tassent ipsum, habebat sibi fidem suspectam. Si- quidem *ἡ δὲ ὑγρὸς*, tum vocare, tum invitare, ad conuiuiumque hortari significat.

ANNOTATIONVM ANO. LACYNAR  
IN GALENI INTERPRE-  
TES, FINIS.



# EPITOMES

## GALENI RERVM

MEMORABILIVM. QVAV  
in illa continentur omnium, Index  
petquam copiosus: cuius prior  
numerus columnam, posterior  
verò eisdem columnar  
verum denotat.

### A

**ABDOMEN** indurati  
cōfuetudo ratio 875.

**Abdomine** indurata,  
cur medicare forant

fit salutaris angustia 875,3

**Abdominis** descriptio 874,37

**abdominis** musculi duo obliqui 174,33

**abdominis** musculi octo, quatuor con  
gestionibus comprehendit 94,30.

174,35. 175,45. 210,9

322,9. 765,3

**abdominis** musculi obliqui quatuor

210, 16

**abdominis** recti musculi 175,21. 230

10

**abdominis** musculi transversi 175,30.

230, 14

**abdominis** muscularum usus 231,45.

230, 56

**abdominis** pars anterior cum indura  
to, & grus carum ut que consistit

ad latera 874,38

**abdominis** urinae

146,3

**Aberrationis** potentie alterativis duo

sunt genera 63,157

**Abiura** reddunt mordacitatem caprina

102,4, 61

**Aberius** quom constitutionem sequitur

300, 56

**Aberius** 86,11. quando accidit

297, 36

**Abrotani** cinis ex aliquo alio cado, har  
um lardus nascitur dicit 106,6,8

**abrotani** due sunt species 106,43

**abrotani** temperantia & essentia ibid.

ab seffum duplex genus 949,33

ab seffum modi diversi 63,1

**Abstrahy** duplex facultas 922,7

**abstrahy** naturam & species 410,

15. 1065,45. & 50. & 53.

1071, 17

**abstrahy** potie quibus fit adurfa, &

quibus congruit 480,49. 416,

26

**abstrahum** hepatis opotulatur 921,5

**abstrahum** unius repurgat meatus, feris

nequaquam 1057,12

**abstrahum** Pantheon digerendum ad seccu  
ris & unaris pbergones 922,11

**abstrahum** remedium summum contra bi  
lis molestias 961,27

**abstrahum** acritudine gratum 1065,

40

**Abstrahuntia** laetior, producit carni

sua idonea 1116,30

**Abstrahunt** ab omnibus mali fueri cibis

180, 19

**Abstrahunt** omnimoda indurati nascentia,

ac prout succum accumulati 451,

61

**Abstrahunt** finis, qui non intellectui per  
ficiat, que non effusione cognos  
cantur 10,35

**ACACIAE** facultas 1067,60.

1220, 30

**Academici** saltem dogma 34,6

**Acadypres** sine urinae facultas 359,26

**Acetia** morbi naturam continent

610, 7

**Acetione** febrili invadente, cur argu  
pore corrumpitur 737,4

**acceptionem** futuram cognoscere in febrili  
bus, maxime est utile 809,9

**acceptiones** febriles unde oriuntur 899,

6

**acceptiones** longiores aut breviores unde

contingunt 800,21. & 30.

& 35

**Acipitris** vires 1275,7

**Acidia** que sunt 1020,15

**acrida** valentius aspera cur asperant

383, 45

**acridi** & acidi discerni 1041,27

**Acritatis** in alio quatuor modis

1043, 2

**Acritum** corpus tripliciter excoluit

1042, 64

**acritum** frigidum est ibid. 12

**acritum** quod 861,47

**acritum** acido sapore magis terrens

1042, 17

**Acritum** in ventriculo est, ob causam fi  
gidam 726,14

**Acritula**

**acritula** sunt acritudines que 109,1

**acritulum** capiti sequebantur 192,2

**Acriti** facultas 412,35. 909,34.

921,65. 1018,35. 1044,49.

1099,8. 1162,10. 1182,2.

1196,2. 1204,20

**acriti** temperatura non laevi & media di  
stet 1017,13

**acriti** usus quando induratis confertur

945, 47

**acriti** quomodo utendum 909,19

**acritum** ardorem & ibi spissam excitationem, sua

refrigeratione restingit 1017,33

**acritum** vitiosis acritudinem, neque bolis

adurffissimum 1019,3

**acritum** cui sui revolvum sit 1017,52

**acritum** cui resacro misceatur ad pberu  
tatem 1201,45

**acritum** ex contrariis facultatibus constat

1040, 63

**acriti** frigidus est maior ex parte quam

calidus 1016,55. 1017,18

**acritum** magis refrigerat quam mel califi  
cat 1045,4

**acritum** mistum fortiter facultates 946,





adipis asus	310,4	arvis asu faciles	1220,9	fluctuatio cruentae, sicut quatuor	708,1
Admonens septem, ad uiriatem in re-		arv materia est respiratiois	425,41	Affectum uentris acquisitionem, ab-	1
bus abstractis inquirendam	33,29	arv materia frigidum elementum	701	ferente esse	43,73
Adnata formos	116,19	48		Affectus partis duplex	301,54
Adolescentes ad omnes uoluntarios adu-		arv purus ad colorem matur	347,47	Affectus ulceris unde	699,9
eris aspositi	431,17	arv subtilis denigrat pharmaca, syncerus		Affectu cognito facit ueneremur remedi	471,1
Adrianus imperator	809,14	conferit ad eorum eandem	1151,16	Affectui in summo calido, frigido in sum-	61,9
Adrianus rhetor	647,33	arv quide insus nobis sit instrumentum	347,1	mo parandum medicamentum	187,1
Adulteris medicamentorum, cur non sunt		347,1		affectus omnium maxime urgenti dirigat	411,18
docenda	1111,41	arv quando nos ledat	430,31	affectus altioris, medicamentum ne bene-	971,18
Adornata simul & astringentia que		arv quatenus in morbo sit praesidium,		affectus aequalis, quoniam si in superficie	719,61
sint	865,48	ut causa morbifica	903,31	conspiciat	410,9
¶ Aedes febrientibus quales esse co-		arv quatenus nos afficiat	119,39	affectus animi principalem facultatem,	411,16
ueniat	908,10	arv qui optimus	416,14	carissimam in cerebro	719,61
Aeger quando consulendus	117,34	arv reddens serenosus spiritum uere	689,1	affectus animalis nec inuicem, nec terri-	313,1
Aegleus quid sonet	1067,45	689,1		tionali amentum inuicem potest	47,1
Aegleus descriptio & curatio	112,41	arv solus efficit uocem	647,19	affectus animi qui	410,9
51		arv temperatus temperatis conuenit in-		affectus animi quinque	411,16
Aegleus in bardeis	178,17	temperatis contrarius	415,40	affectus ad tenum fluctuatio oris	411,11
Aegri exaltatione non opus habent		arv unde fuit mutationes sortitur		affectus calidi	713,15
161	16	914,1	10	affectus confusio non uideretur	12,17
Aegrotare quando caput dicatur	735,1	Aegrotus uis	350,4	16	10
51		117,1	1111,57	affectus corporis existit functionis causa	141,1
Aegyptia Andromachi	1180,40	117,1	1111,57	affectus diaboli similis quibus	712,1
Aegyptia Claudii Philonensi	1108,13	arugulis species & uires	112,1,18	11	11
Aequales inaequalitasque in uero pulsi et		Aerugo per se adhibita, respirationem &		affectus distinguere a uicis	110,15
in pluribus sit, ordo autem confusioque		phlegmonem excitat	115,1,43	affectus est motus animi, rationi inbe-	313,31
in pluribus tenetur	112,9	Aerugo crescit ubi pulsio, sed longue-		affectus & morbus quid differant	664,1
aequalitas quid	497,16	sit faciles	169,17	affectus & passio quid differant	110,15
Aequaliter mutari que dicuntur	511,35	aeris temperis	630,16	15	15
Aer accensum sit flamma	1040,19	Asthenibus uellus ratio conueniens	411,1	affectus fibre qui uacat	196,47
aer aliu est calidus, medicamenta poten-		411,1	1	affectus frigidi	713,19
tia	1037,61	Actus florent in medio extremorum	46,1	affectus bonitatis quid a molli differat	46,1
aer ambientis tale inter uidentium sit in-		46,1	15	affectus hypochondriacae quae sequen-	741,19
strumentum, quide aeris in corpore		actus omnis post aigorem frigida est &		affectus hypochondriacae	611,15
141,1	43	suca	805,14	affectus inmodicus sucus quid indicet	46,1
aer calidissimus quando refrigerandus	905,1	actus purus quatenus non habeat ad for-		46,1	39
44		mondos mores	424,19	affectus in aliis fuit, uerbentorem me-	110,15
aer frigide quando utendum	908,61	actus quae facit & diffusit et euacu-		110,15	811,60
909,1	30	tionis integritas ferat	964,18	affectus in itinere posuit	811,60
aerem ambientem esse uelluti cognatum		actus ferus frigidissima aliarum & si-		11	79,1
corpori	419,19	cissima	46,45	42	
aer uoluptatis calidior, quid in corpore		actus nigeris omnium beatissima	790,1	affectus libidinis & cataphorae fi-	118,1
nostra molitur	781,35	54		118,1	
aer impurus, omni aetate aduersatur		Artates numero amorem non circumscri-		118,1	
415,1	37	bitur	473,11	118,1	
aer in curandis morbis uel tuenda sani-		atatione calores quae methode dignoscitur		118,1	
tate, obiecti rationem cause sine qua		47,1	1	118,1	
non	901,30	Arthropes ob facilitatem cutis habent pi-		118,1	
aeris differentiae	415,14	lor paruos & incrementa nullas, cal-		118,1	
aeris frigidi effectus	908,13	idius uel tamen aegri	178,19	118,1	
aeris inspirati quantitas, in quibus respi-		Arthropes omnes crispi	31,1	118,1	
decui magnitudinis dilatationis thoraci-		¶ AFFECTIBVS cognoscendis ob-		118,1	
tu	756,61	ducit aetatis, consuetudinis, consuetu-		118,1	
aeris praesentem consuetudinem quae sit	713,1	procatu suarum, consideratio	471,1	118,1	
33		3		118,1	
aeris purus uis ad circumscriptionem ad pul-		Affectibus, latusque effectibus cognoscendis,		118,1	
mones illud	481,44	quae sunt necessaria	17,31	118,1	
aeris purus unde accidit	781,19	affectibus rheumaticis quid conseruat	1150,1	118,1	
aeris spume & floris faciles	1210,8	1150,1	56	118,1	
aeris subtilitatis transmissio	781,17	affectibus similibus facilius singula		118,1	
aeris temperata in ulceribus curandis		corripuntur, minus tamen pericula-		118,1	
expendenda	854,13	1191,61		118,1	
aeris trinitas unde uidetur	1017,46	Affectiois per consensum species duas		118,1	
aeris asu	1126,13	728,1	31	118,1	
		Affectiois quae ex humorum asidua		118,1	



# EPITOMES GALENI

283,	4.18,19	Alterare inualescentes qualitates fibriles quam macrare, magis conducit 961,	amara bonioribus et plantis sunt adam sa 1040, 44
283,	13	27 26	amara resurcit omnium petrificum ibid.
283,	1064,31	alterari corpus quodupliciter possit 438,	10
Alisma	1064,31	Alteratio citra consensum non fit 24,	17
Alisma citius fit siccitas aia	1076,5,7	16	Amarum ubi
Allium maculatur dolores colici 9	123,32	alteratio humorum à quibus fit 819,15	1969,18
allium cicutae, imbricatus quidem, deni- gratus tamen radice	193,64	alteratio in animalibus triplex 1033,59	amara odorata non sunt 1050,23
allium cicutae ut medicamentum. ibid.		Alterationes in genere sunt duplex	amara omnia sunt calida 1042,63
61		1029,	amara que dicuntur 1010,15
allium flatus dissolvit 931,14		alterationi naturalis, praeter naturam, et medicis, quae infusa 1053,83	amara quibus morbus sanantur 1048,
allium ibitricae rusticorum dicitur ibid.		654,17	17
16		alterationis error, consensum est sym- ptoma 683,43	amari facilius ibid 16,1176,11
allium utraque quam habeat aia 1907		alterationis differentia ubi 34,41	amaram calidam fit excessu 1043,19
12		alterationis quae in urinario fit, defici- pne 84,31	amaram dulci calidam 1044,28
Aloe	dispositiorem acutis optimum est medicamentum 149,60	alteratio per contrarietatem 30,17	Ambigua ubi effecti si omnia sub sen- sus caliditas 1031,12
aloe grata est uterico 1064,64		alteratio partium bonorum consensu est 813,	Amphio ubi aut amplex bonorum 425,
aloe succae citra utrosque succos 1249,		alteratio quae fit in ore 84,19	62
16		alteratio quid 842,15. 245,63.	Amphio ubi aut amplex bonorum 124,2,
aloe interperfa, salutaris est medicamen- tum sed et pudendum ulceribus		1258,	Amphio ubi aut amplex bonorum 1069,31
871,		alteratio quid motus 71-14	Ambulatio, carfus, statio quomodo fi- ant 105,14
1033		Alteratio facilius singulis inest anima- lis partibus 321,33	ambulationi qui musculi sunt necessarij 317,
aloe purgat humores in tunicis acutis indoluit 886,32		Alterum quam alij tenet 111,30	8
aloe quibus effectibus confiat 1063,		Alibet radice cum sero aserino usus 945,	ambulationi qui musculi sunt necessarij 1140,
66		Alia de his, naturalis et animalis fa- cultatis inferentia non perficitur 377,	15
aloe elixir facilius 886,33		19	ambulationi qui musculi sunt necessarij 1116,
1249,		Alia facilius in eruditibus animis re- medium est 372,57	42
aloe facilius 683,31. 1063,61.		Alumen ardens discretum 945,9	Amecia quid 666,13
1220,35.		Alumen solo car non fit ad ulceris men- dum 1170,20	Amegia: thymum autem uter 1183,32
aloe nullus est usus in phlegmone me- dicamentum 941,20		Aluminis differentia 312,33	amemiaci ubi 1070,14
aloe usus in febribus, improprie Galenus 470,		Aluminis omnia genera exiunt aserigis 1236,	amemiaci acie liquorem limi inde- rato conducit: idem quoque musculis inducit 945,54
aloe usus, improprie laborantes citra bonorum retardantur, dicitur in tabem 1149,44		Alia fuerit quae confrunt 591,43	amemiaci inter emollientia principa non obtinet 1180,33
Alopexia: alia: progressu remedia Ar- chigenis 1193,1		Alia solvenda et aliam quomodo ex be- te et lent parietur 370,40	Am et ubi facilius 1070,18
alopexiae causa 1199,12		Alia subducenda fructus idonei 369,	Amor in procreta 197,29
alopexiae: facili emollientis argumentum 1191,		33	Amphibian quae mulier gravis se- pergitur, facit abortum 1173,
alopexiae rebellis curatio ibid. 32		Alum quae leniter decidunt 477,63	14
alopexiae quando accidat 278,52		Alum quae subducunt 1108,13	Amecia quid 1016,51
alopexiarum curandarum scopus perma- nens quis 1193,40		Alum tardius decidere quae compellunt 688,	Amegia: carum, succi, pistacia, succi potiora, quod ad tenorem visum ratio nem conferunt 418,7
alopexiae quid inest 1074,34. 1091,		Alum tunc emollientia 941,27	Amegia: non multum nutritum 1185,
31. 1092,35. 1132,35. 1136,33.		Alia Longius decidentis qui in lassitu- dine ulcersa sanguinem sibi detrahi nolunt 458,31	37
1141,14.		Allyssum inest morfos à cane rabido, ru- bescensque ipsum sanat 1069,8	Amegidaron facilius 1185,51. 1070,3
alopexiae unde 954,8		Am et ubi facilius 1185,51	Amegidaron facilius 1185,51. 1070,3
alopexiae tractatus medicamentum o- ptimum 1190,46		Am et ubi facilius 1185,51	Amegidaron facilius 1185,51. 1070,3
alopexiae medicamentum simplicia quae co- gruant ibid. 10		Am et ubi facilius 1185,51	Amegidaron facilius 1185,51. 1070,3
Alphorum generatio 687,33		Am et ubi facilius 1185,51	Amegidaron facilius 1185,51. 1070,3
Cura 1093,24		Am et ubi facilius 1185,51	Amegidaron facilius 1185,51. 1070,3
Alterabile facili omne primum calidi 63,		Am et ubi facilius 1185,51	Amegidaron facilius 1185,51. 1070,3
Alterabile natura quae fit 1030,54		Am et ubi facilius 1185,51	Amegidaron facilius 1185,51. 1070,3

- Analeptici 30, 55. 62, 33  
 Analogismus su per transitionem ad similitudinem 12, 58  
 analogismus quid 11, 2  
 Analytica secunda 321, 40  
 Anatomia imbuta totum corporis habitum humanitatem 579, 20  
 Anastrophus arteriarum & uterinarum animalum duntaxat in toto corpore 216, 24  
 Anastrophus quid 856, 48  
 anastrophus uasorum unde accidit 863, 33  
 Anastrophus quae 1038, 59  
 Anatomem cur Galenus ab inferiori uentre ordiatur 174, 46  
 anatomem partem praecipua circa quae uersetur 156, 48  
 anatomem ueteribus familiarissima 156, 38  
 anatomia docet proprietatem essentiae uicissitudinis partis 723, 23  
 Anatomies disciplina chirurgiae meriti diu rationi necessaria 163, 59  
 Anatomia methodus 121, 24  
 Anatomia medicinalis quid significet 129, 1  
 Anaxagore diuini breuium 331, 40  
 Anaxagae quae species 1066, 34  
 Anaxagor quid 202, 64  
 Anaxagorae complurum, faciens ad carentiam uicem 1275, 1  
 Andromachus uixit Neronis tempore 1275, 33  
 Andronis trochisci 971, 38  
 Androsacae quoniam habent facultatem 1070, 44  
 Androsaceni facultas & species ibid. 16  
 Anemones uis ibid. 39  
 Anesthi facultas ibid. 64  
 Anthimum uergetum ante diuersa leuia die aperit 433, 31  
 Anxiosa quando accidit 998, 64  
 anxiosa, quae afflicta dicitur 708, 24  
 Angine genera quinq. 753, 36  
 angine quid profut 1106, 21  
 angina ob laxam uentriculorum accidit potest 752, 12  
 angina offendit uicem simul & respirationem 755, 16  
 angina praecedente, uicem sub lingua secunda sunt 974, 63  
 angina quando desinit in peripneumoniam aut spasmus 578, 39  
 angina quid 718, 59 56  
 Anguille nunquam boni sunt sicut 410, 39  
 anguilla uicem truci aduersatur 416, 39  
 Angulorum immutationes in oculis quomodo sunt curantur 912, 33  
 Angustiae instrumentorum spirituum quae portandae 753, 15  
 Angustia uasorum unde exoritur 417, 18  
 Anhelatio quid uocetur 305, 44  
 Aniceti Cretensi uicem & compositio 1179, 32  
 Ani & urticae muscoli motus est contrahere 1051, 13  
 Aniculum & caro capitis uicem habet reflexu oculum sustinendum crescit 1193, 36  
 Anima & corpore, seruante naturam constitutionem, non seueritur 90, 30  
 anima appetitoria quoniam et perit 69, 3  
 anima contraxit periculos 125, 17  
 anima dormientium non quiescit 100, 36  
 anima ex substantia quae species dicitur 70, 34  
 anima appetitoria sedes in icore 69, 12  
 anima appetitoriae uicem, temperantia 343, 8  
 anima constitutiones ex diuersis corporum temperamentis nascuntur 331, 53  
 anima facilius exercebatur uicem ac quoniam oculo languescit & minuitur 418, 11  
 anima facultatibus singulis, una uicem inest 141, 61  
 anima facultatum singulis quae sedes tribuuntur 718, 30  
 anima inaccessibilis sedes in corde 69, 13  
 341, 36 900, 60  
 anima inaccessibilis uicem, sortitudo uel uirtus 343, 35  
 anima irrationalis uicem comparatur corporis ponderi 129, 55  
 anima moribus corporis esse aptum 194, 33  
 anima naturalis sedes, est hepatis 900, 60  
 anima natura non omnibus eadem 68, 41  
 anima opera 673, 41  
 anima organum existit corpus 194, 10  
 anima pars appetitoria diuersa & ratiocinatrice est 355, 33  
 anima partes sunt, rationalis, inaccessibilis & appetitoria 333, 6  
 anima partium singulas quibus animalibus Plato comparari 317, 35  
 anima primam organum est animalis spiritus 740, 36  
 anima principes quid 348, 33  
 anima principi alio, ratiocinatio 323, 49  
 anima principi facultatis symptomata singula unde perficiuntur, & quomodo curanda 941, 43  
 anima principi sedes quomodo per se, & quomodo per consensum laedatur 736, 20  
 anima ratiocinatrix uicem, prudentia seu scientia est 343, 3  
 anima rationalis sedes in cerebro 69, 34. 329, 23. 343, 40. 900, 63. 941, 41  
 anime sedes in corde est, quibus organis uicem probatur 333, 6  
 anime sedes resistitur potius ex parte, quae prius dum amittitur, mouetur 321, 24  
 anime sedes in cerebro collocatur 740, 33  
 anime species mortalitatis, corporis temperies 70, 36  
 anime species, sedes & differentiae 336, 14  
 anime species tres 68, 60  
 anime substantia ad motum tempore datur 481, 10  
 anime substantiam nobis integram esse 484, 47. 331, 61. 612, 50  
 anime substantiam propriae sequitur uicem 69, 31  
 anime substantia quae sit 147, 18  
 anime substantia quodammodo qualitate temperis 69, 39  
 anima & ratio non idem, cum hoc in illa continetur 333, 26  
 anime uicem temperiem sequitur 69, 30. 718, 18  
 anima habet facultates quodam de se ipsius substantia ortus, non tam ex genere organo 191, 10  
 anima in somnis, corporis praesentiam in gressu, uidetur solas corporis diffusi-ones sentire 631, 14  
 anima inaccessibilis & appetitoria cum animalis interuenit 69, 10  
 anima inaccessibilis quoniam remanet libetque fugit ibid. 1  
 Animal castratum, reddatur simile famulo 1130, 6. 1113, 59  
 Animalculae interdu reperitur in abscissibus 706, 64  
 Animales facultates descendunt per uicem in cerebro usque ad propria instrumenta 346, 12  
 Animalia ab anima & natura gubernantur 718, 26  
 animalia absque commercio maris, omni gignuntur 299, 4  
 animalia & plantis quo differunt 218, 36  
 animalia cetera, natura magis quidem ratione aliquam artem excedit 193, 39  
 animalia carniorum mouent anterioribus pedibus uicem manuum 209, 41  
 animalia dicuntur collata & humida, non simpliciter, sed collata ad demor- tua 451, 32  
 animalia duobus incrementis crescant 169, 34  
 animalia exangia cur pariter & non-rosi interit tibiis 209, 44  
 animalia gignuntur omnia ex sanguine uicem & semine 115, 51  
 animalia gressu & inaccessibilia quibus uicem interuenit est reddunt 213, 59



animalia loti pedibus & calidiora, iracundiora sunt	331,60	do	759,9	90,	7
animalia montana compressibilia omnia sunt calidiora & succiora, atque ideo praerantiora	416,35	animal omne gigni ex materia & fardate	116,23	Animal afflictiore quibus novum effectum	759,16
animalia naturaliter ad ea pabula accedunt, quae illis magis sunt familiaria	437,5	animal d' omne bonum est	1049,16	Animal effectum quoniam corpus nunc habenda cura & cur	366,3
animalia non dicuntur calida in summo, sed per excellentiam	39,51	animal quodam modo & agroti	713,49	Animal effectus, corpus d' naturali statu immutat	830,57
animalia omnia, particulis utuntur simul ac nata sunt	377,35	animal quae ratione reddatur matore	183,47	Animal effectus, pellendi & conciliandi morbos habent sim	365,64
animalia omnium imperfectissima quae plantis simillima	398,14	animal sibi simili diuina nutritur	56,34	Animal effectus, tremulas functiones efficiunt, ac similitur corporis	677,47
animalia ore prona fontem cibum, nasus habent collum & maxillam inferiorem protrahent	272,44	animal suae animae facultates praesentit circa doliorem	195,35	Animal constitutio, corporis constitutionis similit	354,45
animalia plantis praeflunt sensu & motu voluntario	900,30	animal tribus facultatibus generibus emne gubernatur	900,52	Animal acustica praeferenda pulchritudini corporis	2,3
animalia pulmone carnis similitudinem tantum cordis habent ventriculum	336,56	animal triplex planta	210,51	Animal uti experti rationis, duplex est	483,3
animalia quae d' quibus animae facultatibus disponuntur	335,32	animal selecti parvus mordax	215,32	Animal seminis facilius	107,30
animalia quae similia dicuntur	377,30	Animalia appetitorum Plato in hepate collocat	312,3	Animal quid 631,14	650,17, 809,42
animalia quae sunt aptiora anatomicae demonstrantur	169,12	animam consistere corporum naturis	90,12	Animal quod tempore dicatur	117,1
animalia quo pacto ad uterum existunt omnia	775,13	animam deusere in corpore Chrysippus quibus rationibus probet	511,1	Animal quod dicitur consistit	126,55
animalia scilicet apta, si similia copia non datur	177,31	animam esse sanguinem qui putantur	314,63	Animalia ad internum effectus ab Asclepiade scripta	124,42, 5
animalia succioris temperamenti, omnia pariter abque masculis committuntur	177,31	animam habitare in ipso cerebri corpore, primum autem illius instrumentum esse animalium spiritum	344,6	Animalia Andromachi, ad effectus organorum respirantia, aliarumque internarum dispositiones congruentia	124,5, 55
animalia superius carentia dentibus non triculum habent gronum	178,31	animam totam sufficitur Calvus corpore	713,3	Animalia ubi debet ascriptionis interesse	124,42, 5
animalia uetula, recentiaq; ardua, esse sunt inopissima	890,55	anima naturalis quae qualitates non apprehendat	901,40	Animalia ubi quibus de causis sole omnia	1060,58
animalibus adeo arbitrorius motus	317,65	anima nostra consistit ex partibus omnino inter se differentibus	335,15	Animalia ubi quibus de causis sole omnia	1060,58
animalibus capere deficientis quodam insunt	351,1	anima nostra triplex	354,48	Animalia ubi quibus de causis sole omnia	1060,58
animalibus carnivoris quae insunt	209,34	animas omnes ab ipso arte indies fuerit	435,48	Animalia ubi quibus de causis sole omnia	1060,58
animalibus brevioris quae insunt Ibid.	55	animantibus universis insunt sunt ueris, deficientis ac desiderata appetentes	419,55	Animalia ubi quibus de causis sole omnia	1060,58
animalibus timidis quae insunt Ibid.	37	animantibus nocet auditu, indicari possit de ipsius instrumentis	177,43	Animalia ubi quibus de causis sole omnia	1060,58
animalis differentiae propriae	841,19	Animalia obnoxia effectibus in corde commprehenduntur	524,12	Animalia ubi quibus de causis sole omnia	1060,58
animalis principia tria cum inter se sunt concordia	212,16	anima per se mouetur in perturbationibus	929,62	Animalia ubi quibus de causis sole omnia	1060,58
animalis spiritus continetur quoque in toto cerebro	256,44	anima perficitur temperata commutatione redditor	70,55	Animalia ubi quibus de causis sole omnia	1060,58
animalis spiritus gignitur ex uisibilibus	259,33	anima placititia cum sit rationis et peris, non formatur	216,5	Animalia ubi quibus de causis sole omnia	1060,58
animalium corpora in perpetuo fluere uersantur	429,52	anima ratiocinatrix sola scientiae dicitur compos	545,15	Animalia ubi quibus de causis sole omnia	1060,58
animalium latetium calor, transpiratione formatur	774,10	anima rationalis, boniflorum desideratrix	68,62	Animalia ubi quibus de causis sole omnia	1060,58
animalium natura d' nullo doli	195,57	anima rationalis, immortalis, Platonis sententia	69,15	Animalia ubi quibus de causis sole omnia	1060,58
animalium propria	73,32	anima rationalis non formatur	116,35	Animalia ubi quibus de causis sole omnia	1060,58
animal dominans, sensus non formatur in legibus sentientes	150,46	animam cum corporibus comparationes diuise	312,50	Animalia ubi quibus de causis sole omnia	1060,58
animal non moritur, nisi prius com de effe		anima sui ne mortali, Calvus ambigit		Animalia ubi quibus de causis sole omnia	1060,58

anidotos praeficiens quae dicatur Ibid.	750,	23	agua distribuendo alimento per corpus per os conduct	881,61
anidotos xerpyria.	3285,57		agua dulcis calidissima, pro caloris quem suscipit, intermissione & remissione, uarias fortiter facultates	448,
Antigenes medicus	646,59		49	
Antichus qui usus ratione uisus frigidus & membris omnibus integris ad extremam durat	468,3		agua dulcis omnis refrigerat	1015,53
Antirrhoeus	1071,23		agua dulcis refrigerat sinu	1014,5
Axiphoebus	1124,55		aguae calidae perfusione quando urinae circa ista frigidat	877,60
Antoninus Imperator	809,33		aguae frigidae perfusio caliditatem accendit	60,57
Antoninus Imperator singulis diebus utebatur ibi erat infusa Argemone fabae	1380,13		aguae misce quae sint	1013,18
Astrucius car plus fletu passus, rectorum uero non licet	128,19		aguae natura propria	1014,35
ALORAE consideranda	141,11		aguae potus quae mala inserat	412,24
Aorta erit in corde	109,50		aguae potus ut deducit quae meummoda inserat	807,16
Aorta trunco omnium arteriarum	147,	16	aguae potus quibus conueniat	412,34
APARINES mis	1074,25		aguae potus amicum morbum efficit ut descriptio	1277,12
Aperientia quae dicatur	1058,19		aguae propria facultas	1113,0
Apbari & Vitae facultas	378,9		aguae succentis quae	473,18
1073,	33		aguae mixtae proueniunt ex eius frigiditate	882,56
Apbaria quid	676,53		aguae usus ueritas uulnerat inuicem	1161,10
Apbarian & salis discrimen	114,3		aguae succentis simul cum oleo, citius quidam uisus absterunt	1016,8
10			aguae frigida caliditatem ex accidenti, ut calida saepe refrigerat	1012,18
apbaritatis mis	1121,4		aguae frigida, quatenus stomacho male afflicti uisus	966,17
apbaritatem inuicem stomacho	1121,	35	aguae frigida propinanda in ardenti bus febribus cum primam caliditatem signa apparetur	963,50
Apbaritatis	1118,13		aguae glaciatae ferit infantes, aquae impenso refrigerat	449,14
Apbaria moderate moderatae medicamenta dissident	1239,55		aguae igni aduersissima	1011,64
apbaria sunt oris ulcera, praecipue infantes inuadentia	1238,18		aguae band uisus, sed deducit diuerentiam per corpus	118,23
apbarian causas ex colore dignoscendi ratio	1239,11		aguae in febribus non est propinanda, quia uisum non conseruent	891,
apbarian oris aetate per modum asstringenda	1238,42		58	
apbarian infestationem infantes curatio	1239,25		aguae inter ceterum laborantibus quid profut	1113,50
apbaria sit optimum medicamentum ex chalcide & oleo moderate commixtis	1121,	61	aguae inter ceterum quomodo cognoscenda & exploranda	551,43
1121,	61		aguae inter ceterum quomodo generetur	691,13
apbaria remedia uaria à uariis descripta	1238,	47	691,13	768,56
Apj, Hippocriti, & Symplicii facultates	389,2	1105,28	aguae limosa uisus apud Argemone	1013,
Apbaria causa	757,31		14	
apbaria quid	676,48	857,10	aguae induratae gustu, uisu, & alioquin	39
Apocymus	1071,39		1014,	16
Apollodori pharman	1287,27		aguae humidiorum esse humidissimum	1016,
Apocymum refrigerat	461,5		69	
Apocymus compositio	1121,17		aguae inter ceterum necessarii sunt credere uisum uulnerat	604,10
1121,17			aguae modice calidissima, per se humiditatem semper & caliditatem ex accidente aha fortiter urit	448,56
in Apoplexia calor cordis extinguitur	590,	16	aguae ueritas lesu est inimica	1164,
apoplexia causa	685,7	745,43	40	
			aguae uisus finit, est aha dicitur frim	M M

gida	1013,35	aristoteles præfator Platani	535,47	arterie à quibus sanguis interseca	590,	64
aqua optima distans colla saltem effa-		aristoteles & Pufidony sententia de ste-		arterie afferte compositio	121,16	
mit qualitatem	401,58	ribus anime	337,19	arterie afferte electricis qui retine re-		
aqua optima, omnis gustus qualitates ex-		aristotelis opinio de cerebro refulsit		dradum	161,62,869,56	
perts	379,10, 435,24, 1008,11,	351,	7	arterie afferte aspes	451,46	
1117,	11	aristotelis opinio improbatum	106,51	arterie etiam aboni dum dilatantur, expel-		
aqua per se frigida	58,5	aristotelis sententia de visalioris meati-	426,58	lunt dum contrahuntur	337,5	
aqua pinguis non asfringendi habet		bis confutatur	130,50	arterie aut acutæ volentes non est spandū	86,5,	62
124,5,	1	Arius Peripateticus, insitita modicorum		arterie carotides	16,115	
aqua potabilis frigida existit	1013,30	est exundans	426,58	arterie circa altimum spine spondylium		
aqua potabilis sola est buvida	1014,1	Artemias oron facultes	381,27,	subiacet una	313,4,2	
aqua potabilis cur apparet rigensibus		1110,	55	arterie circularis figura in pulsu depre-		
frigida	1030,64	Artemias oron calidum	392,62	ndendi potest	547,54	
aqua que sit leuissima	1008,23,	Aromatis oron plurimum vis per cocturam		arterie continent naturam quod inducit		
1016,	39	exoluitur	1212,40	324,	6	
aqua quomodo pulsus immutat	514,25	Aren quam habeat lenti	390,45,	arterie corpus quide	519,19	
aquam differtur	435,18	406,	58	arterie cubiti motus citius quod inducit		
aqua sicca esse nequit	1040,14	Arquato que mentibus	1093,17	343,	62	
aqua semini frigida in quibus calorem re-		Arquatus & ebolera eadem firmi ra-		arterie descendentes in intestina	124,	
uocet	1013,9	tione curantur	16,11	199,	19	
aqua aut frigida non feruere, calorem		Arquatus motus à hinc ortus, nigrior		arterie		
igitur ex claudit	452,10	10,	43			
aqua vino permixta quidem sola, cur effi-		Ars compitua nitrofa & adulatrix ex-				
ciatius situm respingunt	1018,37	sistit	359,63			
Aquidam coratē	954,44	ars conseruatix, secundum aut illorum				
¶ A R A B I I lapidis vis	319,35	materies est quadruplex	364,18			
Arabides deuca	268,17	ars correctrix, mediatrix & conserua-				
Aracerum facultes	376,62	trix	116,1			
Artem, scariuum, & aparine in lente		ars imitatrix nature opere	145,56			
178,	19	ars longa	534,43			
Aranei triti petiti, ex uno, morsus ab li-		ars pueroria	31,52			
pitu afferunt	1275,52	ars quilibet à finis notione suam habet				
Artemi & medinis facultes	1088,43	constituerunt	22,3			
Archibani opus conuoluitur	1012,	ars que sit paranda	26,3			
31,		ars sanitatis iucular quid præstet	465,			
Archigenis succellat Cad,	551,31	13,	4-53,31			
archigenis uoca essentia	738,3	ars unica, que circa corpus humanum ac-				
Archimedis industria	571,3	tuatur	360,29			
Archon quam habeat uini	107,25	Artemis utriusque facultes	1072,			
Archibio que dicatur	641,32	45				
Artem quomodo existeret inueniunt ab a-		Artem non consiliu ex euidensibus sen-				
qua inter ceterum carum	1212,	sus	1046,			
61		Arteria afferta	182,15, 311,55			
Argemones vis	1071,44	arteria afferta ex quibus cunctis partem				
Argentum uini vis	1115,19	liu	1240,16			
Aridi Cephalici Asclepiadi usus & cō		arteriæ Andromachi	1141,40			
pessimo	1178,48	arteriæ Asclepiadis	1241,19			
Ariditas in rebus duris ualdeq; succis in-		arteriæ leuissima, coquenda sunt in				
uiciorum	411,13	duplici uasi, & quomodo	124,47			
Arietum caro	427,3	arteriæ media	116,33			
Ari facultes	1072,40	arteria corpori longiore ab explorantibus				
Arisari facultas	1071,46	pulsus	165,55			
Aristolochia rotunda admiranda ope-		arteria duplici constat tunica	31,46,			
ra	116,60	181,19,	331,15			
aristoteles triplex	1071,49, 1209,	arterie absq; uenis	148,61			
27		arterie absq; uenis in perficulis animab-				
Aristotelem interpretatur Cædems		149,1				
106,	36	arterie ad uenas se aperientes, sub-				
Aristoteles calidæ & frigide eorum a-		tiliorum sanguinem hauriunt	82,			
stusum tribuit	71,62	39				
aristoteles negat istos facultatem habe-		arterie effectui uicinosiores promptius in				
re egrediendi sent	112,13	multitudinem aut duriciem transmitti				
aristoteles plures anime facultates dicit		604,	16			
fas in uno corde constitui	327,	arterie acutæ insonat tres membranas in				
48		tus, sicut uergentes	237,32			

## I N D E X.

- arterie magne inferior vasis, superio-  
ri m. aer. *et* car 233, 14  
arterie magne vasis 314, 36, 233,  
29, 318, 19  
arterie magne primæ partis distribu-  
tio 314, 35  
arterie magnitudo quomodo cognoscen-  
da 546, 11  
arterie motus principium habent à cor-  
de 505, 38  
arterie, nervi *et* vasa ipsi novitatem  
immutat, ubique sunt 341, 14  
arterie nusquam spirituum solon conti-  
nent 90, 62  
arterie nutriendi omnium spirituum ce-  
rebrum 315, 23  
arterie omnes à corde vim habent, qua  
dilatantur *et* contrahuntur 88,  
14  
arterie omnes in dorso arteriam confluen-  
tes 225, 3  
arterie omnes inter se *et* cor similem  
habent pulsum 310, 14  
arterie parum cordis frangunt 503,  
49  
arterie perpetuo sensibilem pulsum ede-  
re, que 310, 26  
arterie quando non pulsent 346, 3  
arterie quando secunde in capite  
475, 83  
arterie quæ sanguinem trahunt 238,  
27  
arterie receptionem spiritus 235, 53  
arterie sanguinem continent 227, 10  
arterie sicut aere *et* temporis, quæ  
de incidentia 1217, 15  
arterie spiritus movent, eadem quæ cor  
facilitate 508, 63  
arterie sese dilatantes attrahunt 5015,  
14  
arterie si non pulsent, malum extremum  
591, 37  
arterie sua contractione expellere sple-  
nis excrementa 221, 19  
arterie sunt distributæ cum venarum  
utris 215, 14  
arterie superficiales ubi errantur  
147, 26  
arterie sistole quando deprehenduntur  
370, 42  
arterie ubi sunt dum dilatantur, expel-  
lentibus contrahunt 508, 42  
arteria *et* vasa quid 341, 59  
arterie tunice differentie que 553, 13  
arterie tuniceam constitutio 862, 3  
arterie usque pulsantia 182, 14  
arterie vasa adhaesi m. aeris, dum  
fortissimè inclinantur 227, 16  
arterie vasa orificio cor. due latum  
membrum aliat 218, 12  
arterie vasa vasis *et* duratiora  
318, 25  
arterie ministrate ægri supprimuntur  
998, 58  
arteria in malleolo diffusa diuturnum  
tota dolorem soluit 999, 10  
arteria in omnia dimensionem r. tendi-  
tur 310, 34  
arteria inter indicem *et* pollicem in  
malleum sensibilibus movetur 168,  
58  
arteria magna spiritus incutit 287, 34  
arteriarum contrahendi modus 546, 13  
arteriarum inter indicem *et* pollicem  
cum frangit Calcem, liberatus est  
diuturno precordiorum dolore 999, 1  
arteriarum que mollem reddunt 587, 28  
arteria nulla reperitur sine vena con-  
iuge, *et* car 317, 16  
arteria prætergressa umbilicem in lon-  
gum arteriam infundit 303, 50  
arteriarum carotidem dactilo *et* pro-  
cessus 316, 30  
arteriarum contrahentes per sonum  
cor celeriter ipsi dilatantibus  
570, 34  
arteriarum cordis in pulmonem ostia  
242, 41  
arteriarum corpus annumeratur inter co-  
stantes pulsum generationis causas  
551, 26  
arteriarum dilatatione cordis color ven-  
tilatur, contractione purgatur 661,  
51  
arteriarum distensio *et* contractio quan-  
do sunt 553, 21  
arteriarum genus duplex 182, 12  
arteriarum interceptiones, cor vocem cri-  
piunt 661, 47  
arteriarum utrum in corpore esse oculis  
perceptibilem 556, 42  
arteriarum motus, venarum plenitudinem  
ostendit 700, 30  
arteriarum omnium *et* venarum m. aeris  
*et* sanguinis, numerus, formatio, et  
positio ead. 118, 11 (147, 12)  
arteriarum origo, sinister cordis utriusque  
arteriarum partes omnes dum se natura-  
liter habent, eodem tempore mouen-  
tur 363, 39  
arteriarum quibus discernendum ra-  
tio 342, 10  
arteriarum radicatione cor 342, 24  
arteriarum sanguis qualis sit 708, 10  
772, 30  
arteriarum secunde in solum progres-  
sus 221, 25  
arteriarum tunice inhiat pulviscula m. d.  
corde 346, 10  
arterias effundere spiritum in utriusque  
cerebri 259, 28  
arterias lateris inferioris esse cordis sin-  
istro ventriculo 241, 27  
arteria fortissimè tres dimensiones, ut alia  
corpora 319, 35  
arterias longandi ratio 591, 44  
arterias trahere à vasis, *et* in illas  
prætere per communia ostia 508,  
44  
arteria tarsi longenda, si corporis pulsat oc-  
culther 168, 13  
arteria vasa ferit in pulmones à sin-  
istro cordis ventriculo, vixit conflans  
venica 162, 62  
Arteria vasa iungit cordis pulmonem  
31, 55  
arteria vasa 147, 14, 183, 24  
arteria vasa totum maxillam propagatur  
164, 2, 265, 19  
arteria vasa se movetur uno eodem-  
tempore 914, 6  
arterias continentis inhiat 519, 40  
arterias *et* vasa pro ratione magnitudi-  
nis perperam vasis inhiat, nervis an-  
tem non semper 166, 3  
arterias inhiat sanguis 186, 15  
arterias singulas infundit fibra à nervis de-  
ductæ 564, 40  
arterias tunica cor duplex 239,  
4  
arterias vasa cor tunica vasa sunt  
242, 19  
arterias vasa inhiat *et* vasa 42  
319, 42  
Artes distinguende sunt scopus 161,  
20  
artes effluunt ab actibus qui differunt  
361, 36  
artes indicende ex fine 361, 35  
artes liberales alii præferenda *et* car  
3, 9  
artes liberales que Ibid. 12  
artes mechanice omnes, motus indicent  
ope 364, 62  
artes non distinguende per singulas  
divinas 361, 3  
artes non ex materiis distinguende Ibid.  
45  
artes omnes in subiectæ materie bono  
nervorum Ibid. 15  
artes præstat sibi ex indicio naturali  
discernendi organa 4115  
artes vasa ignoscit 10, 57  
Arbitrius epibemata Asclepiadis  
2269, 40  
arbitrari *et* ischiale quid libet  
1187, 54  
arbitrari in case 1267, 59  
arbitrari maligna artem 1188,  
56  
Arbitrari quid 1215, 57  
Arbitrari quid 1215, 52  
Arbitrari capitis confusio *et* severitas  
182, 31  
articuli omnes digitorum motum tri-  
ginta movet 2016, 61  
articuli primi et tertii motus vixit 153, 11  
articulus latus quid proficit 1112, 47  
articulo capitis osse incontinent musculi  
281, 68  
articulorum differentie due 231, 49  
articulorum musculorumque motus 660,  
49  
articulus capitis ne momento temporis  
pati potest locutionem 222, 35  
M. M. iiij

# EPITOMES GALENI

articulos quid	114,47	sint	390,3	astrella sepe si ignis humoris causa	661,
Artificum redat atomium pulchritudo		Astrea arteria, uacis simul et respira-		64	
artificij	215,20	tionis organum	241,64	astri o tenorem subtilissimum, maxi-	
Artifex nemo ex libris euasit	370,55	astragali quid dicatur	119,49	mi crepiti inflammationes	223,2,
artifus boni moris	277,7	astrea arteria quantum adionem sit in-		5	
Arti que tribuantur	355,16	strumentum	241,21	Astridoria hanc omnia congelant: nec	
artis conservatrici partes que	364,	astrea arteria cartilaginem sicut quare		glutinatione omnes astringunt	1019,
34, et 36. et 13		latis	242,1	20	
Artifices etheriacos conficiendi ratio		astrea arterie membrane interne usus		Astringens, commune genus est aerbi	
183,1,40.	128,1,59	libid.	14	et astringi	1020,18
Artis cuiusq; constructio a fove sentit in-		astrea arterie motus unde	241,15	astringens duplex	1035,21
telum	361,60	astrea arteria sicut inter unum et le-		astringens exposita omne, est frigidum	
artis cuiusq; finis, est sciapi conspectus		uon arteriam	242,2	1041,	52
160,11,	361,34	astrea arteria sicut bronchi constructio		astringens frigiditas crassum est par-	
artis cuiusq; selectionem qua ratione ac qua-		241,	2	tem	1041,16
ritatem	900,17	astrea arterie tunica interna, ut se-		astringens genus commune est astringi et	
artis curatio pars et ea que sanantem		mis, densa et medicatrix succa		astringi	1171,33
tuerit, que in re differant, et que ab		242,	15	astringens non est contrarium purganti	
uolent	901,6	astrea arterie tunica exterior	241,19	1034,	1
artis finis quis sit	360,38	in Astrea arteriam semper nihil po-		astringens omne terrestre est et frigi-	
artis reducat finis	libid.	tius illud	242,11	dum	1074,6
artis pari complicitate et exornatione que		astrea, quibus sunt leuiganda	216,23	astringentia hanc omnia refrigerant	
modo differant	219,118	astrea, quibus de causis sunt	816,32	1019,	27
artis pari curatio, primis omnibus est et		astrea, leuiganda, curatio, apta	105,18	astringentia omnia sunt omnia unanimo-	
finis	365,16	Astrodoli radices sanatas	390,62	lo	1065,42
artis principia uelut effluvia debent		1071,	16	astringentia parata facilia que sunt	
10,	36	Astus unum et refrigerat	70,8	1214,	7
artis salubris pars est gymnastica	163,	Astus tres species	1271,57	astringentia que	942,15
31		Astus uis	1072,66	astringentia quatuor uentris diffusi-	
artis salubris pars exercitatoria, minima		Astus uis palpebrarum curatio		nes leuiganda uel uacit	1249,66
est	364,45	1211,	3	astringentia siccant	437,26
artem altissimum finis, ipsa altio est		Astus uis, sicut quid dicitur de		astringentia uel uacit, siccant	884,47
361	36	lucum corpori	391,14	astringentia uel uacit, siccant	1216,
artem diuisio in libenter et sedenta-		Astus lapidis uires	1189,9	46	
rias	314	Astus uis que qualitate habet co-		astringentia uel uacit, siccant	1192,
artem salubrem duplex genus	21,	grationem	751,8	53	
11		Astus uis alteratio est	627,9	astringentibus in quorum partem asse-	
artem feres diuisi	119,	Astus uis que exquiratur	751,17	ribus non sit attendam	921,34
artem omnium infirmitas unde sit cura	645,	Astus uis que dicitur	751,23	astringentibus quando uel uacit	921,18
25		Astus uis non sunt materiam	471,	astringentibus quid uel uacit opera	379,35
artem omnium se opus	360,9	35		astringentibus sanatas	1114,17
artem opera, frequenter exercitatio abso-		Astus uis proprie substantiales		35,	1230,60
luerat	1120,13	321,	29	astringentibus natura	1041,62
Artis uis	923,18	Astus medicamen	1175,7	astringentibus opus	1019,44
Artibus inflammatis, a contagiosis san-		Astus Sanitas	1116,3	astringentibus simul et refrigerantem	
guis intendens est, nisi passus fuerit		Astus uis que dicitur	1246,52	asum, que ad supprimendum sangui-	
inactiuitas	974,59	Astus uis quid conferat	1081,41	nem applicatur extrinsecus, non u-	
artem cognitio requiritur ex illa in-		1091,40.	2101,41	biq; probat Galenus	867,1
rendis effectibus	161,44	Astus glandulosi	120,9,102,35	astringentibus asum in eis, qui es ueniri-	
artem motus duplex	94,23	Astus glandulosi, non seminale organum		culi habent uel uacit, ad alium de-	
artem natura ex quibus consistit	161,	120,	24	uicendum conducit	477,29
41		Astus glandulosi constructi ad leni-		astringentibus usu quando uel uacit	291,
Arytenoides cartilago	247,6	dum bonorem suo perit ariditatem		4	
ASARI facitas	1071,51	120,	50	ATHANASIAE hepaticae facit	
Astus curatio	950,17	Astus uarietati	302,16	115,6,54	
Astus	551,42,57,6	Astus quid uel uacit	1071,3	Astus uis	1235,10
Astus error	76,1	Astus	212,18	Astus Andromachi	2111,29
Astus opus opus refiliat circa medi-		Astus	217,	Astus quid	949,40
concentra purgantis	38,61	Astus		Astus quid	707,4
Astus uis	1206,40	Astus		Astus quid	259
Astus uis motus meliores	712,9	Astus		Astus quid	20
Astus uis quid uel uacit	1072,16	Astus		Astus quid	25
Astus uis diuersorum olorum	389,52	Astus		Astus quid	20
Astus uis perit uis que	1072,61	Astus		Astus quid	25
Astus uis uel uacit impotens quoniam		Astus		Astus quid	25

absteriorum crassa plenius videtur ratio,  
 non extrinsecus se periculosa 374  
 45  
 absteriorum genus inutile 367, 10  
 absteriorum grammatica interpretum ex-  
 cessum; molitur 365, 4, 1  
 absteriorum habitudo maximè periculosa  
 330, 67, 59. 359, 59  
 absteriorum habitus uiderendus 361  
 14  
 absteriorum morbi Ibid. 48  
 absteriorum propositio non confutanda  
 cum aribus bonae libere dignis  
 2, 13  
 absteriorum rebus inutile 354  
 Absteriorum exercitatio pulchritudinis pari  
 non obicit 34, 3  
 Absteriorum basè posse esse corporum ele-  
 menta 33, 44  
 Absteriorum scriptorij uis 313, 54  
 absteriorum scriptorij facultas 315, 4, 8  
 Absteriorum defectus qui referendus 687,  
 18  
 atrophia sequitur necessarij diuini de-  
 fectum 694, 20  
 Atrophia rex Pergoni, patrie Qilenti  
 1162, 84  
 Atrophia uisus ratio que dicitur  
 4, 5, 57  
 atrophiam uisus ratio quibus affectibus  
 conficit Ibid. 50  
 Atrophiam sunt substantiarum simili-  
 tudine 1018, 53  
 Atrophiam que dicitur 1019, 49  
 atrophiam digressionem; distinet  
 1111, 53  
 atrophiam essentia duplex 1059, 13  
 Atrophiam motu uisum relictum su-  
 334, 7  
 Atrophiam et uisus natura et facultas  
 312, 15, 1073, 23  
 ¶ AVARITIA uel uoluptas facio-  
 rum causa 515  
 auaritia, uerbicula uocatus compa-  
 rat 435, 8  
 Audis et diminutio, ex alteratione et  
 latione, compositi motus 71, 41,  
 78, 12  
 audis quod sit 45, 59, 74, 31  
 Audis facultas proprium 71, 11  
 Audis facultas quando uiget, et illius  
 similes que 71, 3  
 Audis motus utilitas 35, 4, 12  
 Audis bene uel male affectu, que uo-  
 ces confutunt 673, 11  
 audis que obdundant 672, 43  
 audis gratias curia 1211, 45  
 audis infirmitatem artem 128,  
 61  
 audis sensibile, sensus et uox 324, 11  
 audis promptata uide profuscular  
 670, 34, 750, 60  
 Aures admodum calida 374, 53,  
 3067, 44

Aures uolunda in contrarium 947,  
 37  
 Aures et piscis cetera sunt facit 410, 33  
 aures sunt bipedes 310, 3  
 Augmentum lantum uicaria 781, 6  
 Augere secundum trinum dimensionem/  
 solus natura opus 75, 15  
 Augmentum tempus quod 624, 38  
 augmentum fit quousq; esse conforma-  
 tor 673, 10  
 Aures maritima temerit uisum ac-  
 mole 416, 31  
 Aures cur castigatione 276, 49  
 aures cur hominibus inuolubiles Ibid.  
 63  
 aures cur prominent Ibid. 54  
 aures intrinsecus caue, extrinsecus uide  
 conuocant cur sunt 277, 1  
 Aures animal illeptus quomodo extra  
 beatum 1311, 34  
 aures pure fluctibus quid confut  
 1107, 64, 3150, 24, 3151, 10,  
 1209, 57, 1210, 32  
 Aures maris facultas 1069, 15,  
 1097, 16  
 Aurigae ab obstructione letitis orit  
 quid medicatur 311, 50  
 1117, 1  
 Aures inflammatae que confut 8;  
 14, 931, 36, 1208, 51, 1209, 39  
 3110, 53  
 Auripigmentum 3130, 83  
 Aures utraque cur flexuosa 277, 5  
 Aures dolores que cause eritire pos-  
 sunt 1205, 26  
 aurum doloribus flandensis remedium  
 2110, 40  
 aurum doloribus ptolemensis, quid co-  
 ducit 2079, 27  
 aurum doloribus quid medicatur 1143,  
 11, 1205, 35, 1209, 16,  
 1211, 60  
 aurum doloris uehementis remedi-  
 drum 2110, 17  
 aurum fluxu uentibus utroque quid opiate  
 tur 1087, 59  
 aurum meatus obstruere que referunt  
 1209, 35  
 aurum uentis 351, 14  
 aurum pulchritudinis; uicribus medicatur  
 1243, 43  
 aurum sanguinem effundentem tritu-  
 da 1210, 64  
 aurum sanibus remedium Ibid. 43  
 aurum uermes quid eruct 1083, 59,  
 3084, 42, 1211, 12  
 aurum uicribus et crescenti remedium  
 1219, 59  
 aurum uicribus quid medicatur 481, 12  
 362, 61, 1109, 32  
 aurum indicatur pro ignem 1278, 55  
 aurum reperitur in aenis 1116, 64  
 Aures uidebatur et pontica, sunt  
 uisus rationi aduersa 412, 3  
 Aures utraque uisus facultas maxime ad

uisus  
 Aures putrefecit omnia 4, 24  
 Aures, acrimonia, asperitas, qualitas  
 tem uisum significat 313, 43  
 aures quod 361, 46  
 aures, uisus  
 Antennae ad faciem declinat 4, 12  
 antennae quare sui meritis 40, 58  
 Antipio quod 856, 45  
 Auxilia citra natura administratione cau-  
 sa hanc extorpet 19, 10  
 auxilia effectus non aduersantur, sed ef-  
 ficacitatem 16, 59  
 auxilia inuicem modis natura indigent  
 19, 12  
 auxilia que uisus inuicem 1110, 18  
 auxilia cur prima et ultima facultas  
 causa dicitur 914, 1, 6  
 ¶ AXILLA concavitas ad duobus fit  
 musculos 174, 33  
 Axillaris uena 144, 5  
 axillaris uena, humeralis est maior 143,  
 21, 164, 14  
 Axis 274, 9

BALAVSTI: facultas 1074,  
 Balneae 404, 27 (5)  
 Balneae diuinae cur nos exuolunt  
 causa dicitur 426, 39  
 balneae dulcia calefaciunt nos et bene-  
 ficiant 417, 58  
 balneae dulcia cur febri tertiana excellen-  
 ter 961, 10 (127, 13)  
 balneum inmodica facultatem dissolu-  
 balneae calida ad solij frigidi usum cor-  
 pora preparant 911, 63  
 balneae quoniam reddunt respirationem  
 493, 45  
 balneae frigida quomodo pulsus inma-  
 unt 571, 14  
 balneae quibus conueniant 908, 1,  
 474, 42  
 balneae moderatè calentes usus 449, 2,  
 930, 35  
 balneae partes duaeque 910, 27, 911,  
 48  
 balneae partes singulae, quousq; proficit  
 911, 26  
 balneae utilitas 193, 19, 608, 45, 807,  
 41, 911, 17, 924, 41  
 Balnearum dulcium inmodicae usus, ba-  
 neae utilitas induit praeter naturam  
 661, 21  
 balnearum frigidorum uis 573, 23  
 balnearum moderatorem comoda  
 573, 5  
 balnearum scopos 961, 39  
 balnearum usus in cruditatibus 456,  
 35  
 balneae tempus opationem in febribus  
 interuenientibus quoniam sit 924,  
 19

balancum citius in optem habebis putrefa-  
 quare 434, 14  
 balancum frigidum quibus interpede, et  
 quibus causis administrandum 911,  
 46  
 balancum inhiare corpora febricitantia,  
 quomodo sint preparanda 893, 16  
 balancum intemperatissimum horrores, cau-  
 sis desinendum gignit 910,  
 42  
 balancum quando conducit 914, 39  
 balancum quando tabidis sit administran-  
 dum 808, 56  
 balancum quomodo administrandum  
 914,  
 31  
 balancum super otidum in accessum de-  
 clinatibus 910, 59  
 balancum somnum conciliat 1100, 14,  
 417, 41 718, 53  
 Balsami et opobalsami facultates  
 1073, 64  
 Barbari compositio Aulorombi 1161,  
 13  
 Barbarus Lucij Imperatoris asinus 4  
 6, 46  
 Bassili ut acymi ut 189, 49  
 Bassilofus conspectus auditus hominem  
 perit 1173, 39  
 Bassi instrumente 111, 30  
 Bassi ut brachij facultates 107, 48  
 Bassi ut brachij facultates 112, 48  
 Bassi ut brachij facultates 1074, 40,  
 1183, 51 1156, 33  
 BACHICA dicuntur bisaria  
 1061,  
 58  
 Bellaria abigenda a senibus 469, 18  
 Bessum qui significatone Galenus us-  
 pet 1193, 48  
 Betes facultates 117, 54 1109, 44  
 Betonica facultates 1086, 45  
 BIRENDVM illud a cornu quibus  
 non sit 883, 15  
 Bilem autem nullum animal gustare susti-  
 net 703, 18  
 Bilem autem piscibus nonnulli assidue us-  
 cant 826, 49  
 Bilem fluxum quid expurgat 1103, 41,  
 1104,  
 48  
 Bilem gignens 54, 23  
 Bile uteriusque reductiones, corrupti ci-  
 bus conuersa facies 180, 13  
 Bili stragiosa que 702, 64  
 Bili atra a liene in uterum mittitur  
 437,  
 35  
 Bili atra cum exeret corrodenda 703, 13  
 Bili atra cum timore concitetur 744, 7  
 Bili atra diffusi crassitie ab aere 703,  
 11  
 Bili atra afflicta 79, 116  
 Bili atra differente 741, 15  
 Bili atra generata et facies 94, 7,  
 47 68, 16 117, 1 708, 19  
 Bili atra purgatione qui affectus indi-  
 geant 1008, 15  
 Bili atra quando sistatur excrementum

457,  
 18  
 Bili atra est acida, terramque fermentat  
 703,  
 8  
 Bili atra ex fluxu immediat affata erit,  
 omnium perniciosissima 705, 13  
 Bili atra expurgatur a liene, quem alit  
 983,  
 37  
 Bili atra sex sanguinis 48, 44  
 Bili atra, fluxu acuto et maligno  
 80,  
 34  
 Bili atra frigida et fluxa Ibid. 33  
 Bili atra in autumno crescit 80, 33  
 Bili atra in quartanis qui ratione rige-  
 rem gignat 681, 40  
 Bili atra nasci utericali effluunt  
 117,  
 3  
 Bili atra nascitur ex sanguine immediat  
 affata, et frigida non tamen calo-  
 ris et peris 690, 6  
 Bili atra peraffata qualis fuit 80, 63  
 Bili atra, perniciosissima facies 17, 39  
 Bili atra post pituitam frigida 63, 33  
 Bili atra qualis 707, 11  
 Bili atra quando in cerebrum corpus, et  
 quando in animam repat 742,  
 19  
 Bili atra quid uenerit a uteribus medi-  
 cis 8, 18  
 Bili atra quae morbos parit 686, 63  
 983,  
 47  
 Bili atra quae tumores gignat 636, 18  
 Bili atra sanguine excreta est splendi-  
 dior 690, 4  
 Bili atra si excreta, semper porten-  
 dit perniciem 703, 17  
 Bili, crassus excrementis excrementis a-  
 prifera 116, 13  
 Bili differentie pro animalium diversifi-  
 catione 1130, 15  
 Bili fluxa ad uterum affata, si crassa  
 agros, et aridissima 80, 61  
 Bili fluxa et pallida difformis 1139,  
 56  
 Bili fluxa facies 1146, 19  
 Bili fluxa quibusdam in uterum ge-  
 minus mittit 53, 15  
 Bili fluxa species 702, 53  
 Bili fluxa in excrementum intestinum excre-  
 mitur 1181, 8 116, 5 436, 25  
 Bili fluxa in felle urisum expurgat  
 80,  
 56  
 Bili fluxa obtinet uim defluendi 579,  
 11  
 Bili fluxa qualis humor 961, 7  
 Bili fluxa quibus de causis retinetur  
 437,  
 11  
 Bili fluxa quibus in uterum influit  
 531,  
 63  
 Bili fluxa quos tumores gignat 656,  
 16  
 Bili fluxa, sanguine calidior existit 48,  
 46 80, 31 634, 9  
 Bili generata cum sanguine in ieremore  
 et uenis 79, 31  
 Bili in uterulo orta, quem calorem ha-  
 bent 702, 62

Bili in uterum non confusae, si ci-  
 bum citius exhibeas 479, 64  
 Bili nullam portionem demittit natura  
 in uterum 116, 33  
 Bili orta ab igne utericali calore, et  
 eius que confusae in ieremore, indicia  
 54,  
 16  
 Bili pallida per corpus fusa, quae mor-  
 bus gignat 116, 60  
 Bili plura in uterulo, causa sit per-  
 pene 80, 16  
 Bili profusa in quorum utero gignatur  
 54,  
 12  
 Bili quibus uenerit in ieremore influit  
 Ibid.  
 3  
 Bili quomodo sit molienda 474, 5  
 Bili quo pacto accommodatur oculis  
 1130,  
 18  
 Bili non pallida tamen fluxa in calidus et  
 siccis temperamentis abundat  
 474,  
 1  
 Bili uribentes mota, vigorem facit  
 64, 11  
 Bili ueniam copiosiores que prece-  
 dent 116, 41  
 Bili utriusque facultates 701, 15  
 Bili quomodo nato 1188, 12  
 Bili utriusque facultates 1176, 43  
 Bili utriusque in mari mortis prouocant fa-  
 cultas 1143, 61  
 BLAISIE ad graui qui sunt 113, 3  
 BLAISIE ad graui qui sunt 80, 10  
 BLISIA facies 1074, 58  
 BORTHIA uicem laborantem sus-  
 citatione utri, qui ratione refrenat  
 Galenus 649, 18  
 Bortia ob refutationem uicem quadra-  
 gentis aereis Galenus denotat  
 649,  
 57  
 Bortia facies 1191, 33 406, 63  
 Bortia facies descriptio 1117, 14  
 Bortia aere et corporis multiplex di-  
 ci 1160, 10  
 Bortia aere speciemque perfusissi-  
 mum 113, 3  
 Bortia species tres 7, 18  
 Bortia frigiditas est tenuis portio  
 1104,  
 11  
 Bortia facies impudica uicem 44, 13  
 BRACHIA gracilia, et picula,  
 et omni modo excreta 467, 53  
 Brachij capia 107, 54  
 Brachij descriptio 98, 45  
 Brachij epiphytes 107, 43  
 Brachij excreta et flexio a quibus me-  
 fecta fuit 99, 13  
 Brachij motus et musculi 94, 17 173,  
 39 1194, 61  
 Brachij musculi interior duo habet se-  
 sprasa capia 115, 60  
 Brachij ossis figura 107, 64  
 Brachia articuli duo 98, 47  
 Brachia uicem est et, atque id magnam  
 ac rotundum 98, 49  
 Brachium 102, 10  
 bra-



## I N D E X.

brachium attollens & circumagens  
masculi, robustissimi ceterum 295,  
34

brachia ut teras etiam facies, uterem  
solus: ipsa autem supprimit 1033,  
16

brachia facies 387, 69, 1080, 49

brachia sola calida moderate, et ceteris  
obspiciunt 1199, 47

brachia & latus usque debetant 335, 18

brachia melancholicum faciem sola ex  
albis pigra 743, 2

brachia superius reflectat 1199, 39

Bregmati ossa 128, 10

Brevis ut vis 1075, 16

Brevis dandi uteribus familiarissima  
110, 38

Brevis facies 1075, 31

Brevis actum expertis 1, 35

brevis ut regibus modis 694, 60

brevis latus & crassius regi 335, 10

brevis sicut excrementis post equum ad  
conceptum 106, 16

brevis superius dicit natura, medetur  
986, 59

Brevis inesse rationem recordum 21, 19

BVBO 709, 18, 974, 14

Buboni ut 1071, 7, 1074, 66

Buboni curas 934, 14, 1119, 13

Buboneque que dicuntur 709, 41

Buboni quam faciles pices ex non  
nulli facilius conficiunt 368, 19

Buccones sicut inferni sermone mystica  
coni 173, 16

Buccones & perparum testis ut  
quam non habent 1138, 51

Buglossis uti uti uti bilis uti pa  
rit 1075, 4

Bulbi sicut uti 1074, 18

Bulbi uti uti uti uti 1074, 18

Bulbi uti uti uti uti 1074, 18

Bulbi uti uti uti uti 1074, 18

Bulbi uti uti uti uti 1074, 18

Bulbi uti uti uti uti 1074, 18

Bulbi uti uti uti uti 1074, 18

Bulbi uti uti uti uti 1074, 18

calidus quomodo fiat 1101, 3, 1219, 64

Calidus caput cingens Romanus duode  
cim 1291, 53

Calidus intestini figura & usus 1144, 18

Calidus sermone 161, 41

Calidus instrumentum in plurimis autem du  
plex 114, 40

Calidus instrumentum quantum 180, 30

Calidus 115, 58

Carpe facies 1090, 60

Calidus flos uti uti 1083, 64

Calidus uti uti 1083, 12, 1083, 16

Calidus odorati uti 1083, 47

Calidus ceteris darsilona 111, 53

Calidus maximum esse uti, semiphi  
nich de articulatione 114, 24, 111, 47

Calidus subiecte ad perperam 1101, 3

Calidus uti uti 1101, 3

Calidus quomodo flammis uti uti 1101, 3

Calidus uti uti 1101, 3

Calidus uti uti 1101, 3

Calidus uti uti 1101, 3

Calidus uti uti 1101, 3

Calidus uti uti 1101, 3

Calidus uti uti 1101, 3

Calidus uti uti 1101, 3

Calidus uti uti 1101, 3

Calidus uti uti 1101, 3

Calidus uti uti 1101, 3

Calidus uti uti 1101, 3

Calidus uti uti 1101, 3

Calidus uti uti 1101, 3

Calidus uti uti 1101, 3

Calidus uti uti 1101, 3

Calidus uti uti 1101, 3

Calidus uti uti 1101, 3

Calidus uti uti 1101, 3

calidus frigidus, subiecti nostro corpori  
ut 1161, 38

calidus frigidus, etc. respectu nostri subiecti  
quomodo fieri debet exaltum 60,  
13

Calidus et si plethorica & phlegmatis  
sa, quomodo infuset 73, 10

calidus sicut malum densum, sicut  
tem recidit 501, 30

calidus humide uti uti habet excrementis  
111, 719, 16

calidus moderate uti uti corpori mai  
us uti uti 487, 15

calidus nostra crassa est essentia  
1014, 61

calidus sicut esse non possit sicut  
sperantia 487, 14, 1061, 43

calidus excrementum materiam est sicut  
gels 486, 3

Calidum uti uti, frigidum repedit  
1019, 53

calidum calido addit, efficit uti uti  
63, 796

calidum duplex 1042, 9

calidum ex uti uti refrigerat 60, 60

calidum & frigidum proximum uti uti  
solus 64, 11

calidum facilius & uti uti uti  
duplex uti uti 1017, 27

calidum frigidum magis uti uti  
61, 1042, 9

calidum frigidum, etc. quod modis dic  
tur 36, 17, 38, 31, 1011, 49

calidum uti uti, est uti uti, habet uti  
ut uti ex frigore & calore 711,  
40

calidum uti uti non est animalis gene  
ratione posterioris 717, 31

calidum uti uti quomodo intelligi  
don 1055, 19

calidum uti uti quomodo uti uti  
ut uti 711, 37

calidum natura quare uti uti uti  
mala calidus 614, 4

calidum partium uti uti uti uti  
ut uti 1059, 54

calidum potius est, quod facit uti uti  
ut uti 1014, 18

Calid generatio 814, 50, 178, 11

Callos in statu proprio servant  
878, 27

Callos inuentus quare 1101, 3, 1058, 8

callos quod medicamento promouent  
878, 23

Callus glutinatus obitus nescit ex  
affluente directo 876, 33

Calor de corde, nichil uti enim uti uti  
per uti 507, 16

calor aditus uti uti uti, naturae  
miser, hinc uti uti 51, 24

calor aditus uti, functiones reddit uti  
ut uti 509, 61

calor extra humiditatem non bene uti  
ut uti



## I N D E X.

- capitis dolor quoniam excretionem sit  
signum inseparabile 968, 59
- capitis dolorem ab ebrietate curatio  
1199, 18
- capitis dolorem cum febris ab initio affi-  
gentium curatio 1205, 56
- capitis dolorem inueterationem curatio  
1199, 25
- capitis dolorem species uariæ 968, 61  
1197, 23
- capitis figura concinna, semper bonæ di-  
spositionis indicium 817, 11
- capitis figura naturalis, quid esse debe-  
at 1121, 17-817, 16
- capitis fricturam curatio 878, 16
- capitis in omni dolore que sunt uisenda  
1205, 20
- capitis motionem securitas 171, 16
- capitis motus 170, 47
- capitis motus ad anteriora quibus sit  
musculus 171, 50
- capitis motus duplex 124, 55
- 123, 5
- capitis motus sursum deorsum, & in  
obliquum unde proficiuntur 123, 30
- capitis musculorum actiones uariæ  
124, 20
- capitis ossa sexdecim præter inferiorum  
maxillam 125, 10
- capitis ossis fracti simul & coniuncti cu-  
ratio 828, 61
- capitis præteritum motum que uerietate  
presistent 114, 57
- capitis refrigerandi ratio 891, 20
- capitis repetita semel conciliat 675, 56
- capitis secundum motum que uerietate  
efficiunt 123, 59
- capitis sanguis tres 123, 11
- capitis uerberamentis doloris & modo  
ubi quid 1197, 16
- capitulum acutorum figuræ tres 124, 10
- capitulum excretionis in quas partes de-  
comitur 124, 79, 1
- Caput uel summarie facultates 1084, 10
- Capparis epilepticus contrahit 1006, 50
- Cappari ex oremetice confort obstrudis  
in iecoris 951, 56
- Cappari ex oremetice facit ad cruditates  
461, 24
- Capparis facultates 1286, 10, 1084, 16
- Capræ temperamentum 592, 40
- Caprifolius quid, & que eius facultates  
1109, 43
- Caput factus in ipso parte primæ ad  
aliamque debet, hinc parienti figuræ  
contrariæ omnes periculosissime  
1071, 46
- Caput sagittatum dicitur 122, 12
- caput loquax quibus afflictiis conferet  
1116, 53
- caput maximum quibus conferat afflic-  
tus 124, 6
- caput megnum quando sit bonæ dispo-  
sitionis indicium 817, 3
- caput quadrupliciter affici potest 719, 12
- caput quibus oppletur facile 746, 49
- caput refrigerandum ubi sanguis fluit  
per uas 965, 6
- caput sanguinem quibus conferat 1236, 56
- caput uacandum est post lotum corpo-  
ris uacuationem 1206, 10
- caput uerberamentis afflicti, refectio re-  
creandum 479, 50
- Carbo est terra succensa 1045, 45
- Carbonibus quibus medicamentis conue-  
niunt 973, 55
- Carbonis curatio 948, 52
- carbonis, scarificandi post sanguinis  
effusionem 949, 10
- carbonis que competens 1091, 60
- 1179, 14
- carbonis unde existitur 707, 5
- 723, 10, 971, 11
- carbonis cataplasma idem 948, 61
- carbonis descriptio 707, 13
- 948, 41
- carbonis & phlegmonis ignis que  
sunt 1091, 10
- carbonis ad hunc alia ardet 703, 44
- 704, 31
- carbonis absq. febre non perierit  
948, 51
- carbonis semper cum ulcere inuadit  
660, 5
- Cardialgie causa 524, 15, 676, 4
- cardialis proprii quid sit 1248, 60
- Cardiaci uis 1206, 56
- Cardiaci facultates 1084, 14
- cardenorum lumbicis interficit 124, 57
- Carie cum reba nubicis præsumptæ  
aduriscunt uentris 450, 6
- carie & fons aduriscunt inflammam-  
tis pectori, & licet communis omnium  
dulcium ratione 120, 48
- carie largius sumpta, pedicularum gi-  
gnunt multitudine 1204, 44
- 409, 64
- Caricem decocti facultates 1130, 6
- carie lignorum cum sit facultas  
1105, 19
- carie quid 123, 59
- carie unde gignatur 663, 61
- Caricinis facultates 1084, 60
- Carion ex sanguine, autem ex seruire  
generatur 123, 11
- carion habet omne animal 1111, 64
- carion animalium cum cibis inuadit  
1214, 34
- carion animalium dicitur simul & ex-  
crementum, sunt conditæ apud  
contrariis autem modo se habentes,  
incipit 403, 1
- carion ascriptæ sunt dicitur & excre-  
mentose 409, 17
- carion ascriptæ & conditæ qui uisuntur  
171, 35
- carion asse, succores sunt dicitur 1135, 8
- carion castorum succores sunt & suc-  
calamantes 394, 17
- carion castorum sunt præstantiores,  
ut seron possint 391, 58
- carion prodi elixæ, optimi gignunt son-  
gionem 124, 16
- carion augenda inuadit, quibus fri-  
ctio perfusio desudat 823, 15
- carion differentia secundum aetatem  
392, 2
- carion elementum non imputabile 123, 54
- carion elementum non uicium 123, 43
- carion generanda materia est probus  
sanguis: epistola ipsa notata 120, 17
- carion generando ex subiecta carne, si sa-  
tis sit sit 855, 14
- carion dicitur & tribus facultatibus  
416, 65
- carion intemperies humida quomodo cor-  
rigenda 857, 16
- carion intemperies quomodo digestio-  
da 124, 44
- carion intemperies sicca, quomodo cor-  
rigenda 124, 50
- carion plures sunt species 47, 64
- carion productis, natura opus 878, 50
- carion quod multæ sunt differentie se-  
cundum præparationis modos, & lo-  
cos animalium 398, 13
- carion uiperæ facultas & conditæ  
de modis 1214, 12
- Carnosa omnia ex sanguine oritur 111, 33
- Carnosa regenerari possunt 121, 26
- Caro agnata humidissima 593, 51
- 417, 6
- caro animalium agnata uidentur ma-  
trix, & succum gignit melancoli-  
cum 121, 59
- caro ascriptæ & stridit carionem re-  
creantia est, & caro dicitur difficilis  
198, 15
- caro aridissima, si quæ sit hinc 192, 17
- caro bubula melancolicæ gignit san-  
guinem 124, 22
- caro canina & uulpina sicut imtempe-  
ratis 417, 19
- caro caprina præter succum uisum, di-  
criminationem ferit 592, 54
- caro crassa malum succum gignit, &  
siccum dicitur difficilis 124, 63
- caro dicitur subiecta interna digestum re-  
ligi, necesse autem externe  
25, 2
- caro equina, asinina, uulpa, & pardo-  
pina, uisum necesse tempore frigida  
NN

# EPITOMES GALENI

417.7.	192.63	245.	11	Cathartici distillationis causa que	693.
caro equina, caninus, ursina, leonina,		cartilagini asus	282.1	carbones ex cortice quid deficiat	
pardorum & asina	39.14	cartilaginum asus arterie affectus in-		1076.18.11.1.11.1095.	18
caro equina sanguinis, & calida	44.64	faciles	242.10	Catechomen libraguerunt; discernit	
		cartilaginum asus arterie figura		577.	50
caro ex predestinatis animalibus que sit		241.	8	Causa facultatem quoniam habet	1085.
claus probatissimus	409.19	cartilago car sui instrumentum claudenda		31	
caro galeonum	400.17	non asponum	242.7	Causa et prima facies	1081.32
caro grana	398.20	cartilago existens que	249.18.	Causa affectus que dicitur	735.1
caro hepatis ad sanguificationem aspi-		110.	6	causa conservatrix utriusque circuli ca-	
sime	340.57	cartilago ex mucoso circumstante bu-		corpus necessarii alitiam	819.
caro hircina ad gignendum succum bo-		more nutritur	89.10		
mon, & coquendum est deterrima		Carne ut natus facies	1085.7		
392.	55	Castrorum differentie	406.9		
caro hircina innoxia	417.5	Causa hircina	397.15	causa coactionis detractionis pulsam, est	
caro leporina sanguinem gigni transfor-		causa uncturatus aeris est	112.63	usque fluxum	551.40
ma, sed melioris succi quam bubula		causa uncturatus calidum gigni	397.	causa doloris hemieranie	1107.50
& canis	592.60. 417.11	34		causa accidentaria, sine quibus non	
caro mulorum	399.11	causa oxydationis amission est epu-		695.	42
caro non castratorum redeat quippe		mus	397.19	causa antecedens	455.7. 552.76.
grana & urosum	113.16	causa optimis gustu quomodo digna		599.26.66.1	14
caro nulla ex seipsa sensum habet	201.	secundus	1112.41	causa antecedens facultatis robur ad-	
		causa qui praferenda	1112.56	augentes, sunt duplices	587.5
		causa sicut uentrem	102.18	causa continens	552.13
caro nusquam reperitur per se	41.1.	causa duplex	1109.71	causa conservatrix quoniam sunt	819.
711.	3	causa facultas	1084.64	18	
caro omni aetate inanis est cetera ca-		causa in circumstantiis commutatur	1185.	causa detractionem citantes	688.33
prina, & bubula	467.61	35		causa diversae differentie carum ratione	
caro ovilla excrementosa	592.53	causa pro generatione uti licet	1151.33	deficiant	106.17
caro piscium que sit natus, & que de-		Causes	1787.11	causa dant agere, possessionem ducunt	
terior	199.14	causa & crassum generant succum	418.	10.	13
caro que dicitur	913.55. 1134.1	13		causa eadem, eandem creationem posu-	
caro suilla	402.11	causae pravae succum non gignit		lent	116.18
caro suilla humanae profundis	192.43	407.	61	causa emotio longe est molestior quicquid	
caro suilla que sit ad salandum congrua		Castrorum calidius quam ut conueniat		11	680.14
enissima	403.65	phlegmonis	914.9	causa externa vel procuratrix que di-	
caro suilla potentissimum omnium natu-		castrum uires	1117.18. 1119.56	catum	599.27
392.11. 394.44. 397.56.		castrum quando utendum	1157.14.7	causa effluvia	68.49
416.47.	882.41	castrum commensuratum modum		causa diuina interperiet que 600.9	
caro sui medicis aetate, optima	409.	1274.	52	causa inaequalitatis in uno pulso	501.
15		castrum putredine pulvis	720.12	44	
caro tardorum	398.14	Castrum quod accidit	1113.	causa interperuenientem inquirende	
caro taurina, sequitur arteriam	192.57	castrum caro suavis & pinguis	1113.57	80.	11
carotides arterie sub caluaria producit		11.		causa medullam indicant	16.33
plexum reformationem	147.48	Catagmaticum Andromachi	1160.50	causa morbosae que & quatuordecim	
caro uersuta nutritur sanguine	19.11	catagmaticum Asclepiades	1160.19	1744.	6
Carpesij facultas	1085.16. 118.	catagmaticum Moschianus	1112.12	causa naturales & non naturales, quoniam	
61		Catepsi detento, dormienti aperti pal-		ditati ex effluendo in easque pro-	
Carpi articulationis duplex	206.16	pebris	750.38	ter naturam	54.50.65.16
carpi consideratio	117.12	catepsi detentorum descriptio & pulsus		causa prima & maxime principales	
carpi & metacarpi ossa non plura 3.	117.12	577.	33	que sunt	691.1
47		catepsi detentorum figura & pulsus	517.13	causa procuratrix inuadit carum cor	
carpi motus quot, & de quibus tenden-		Catepsi detentorum lenius	1113.18	porationem	694.31
di sunt	203.56	catepsi detentorum depatit ex quibus tenen-		causa procuratrix morborum dicitur	
carpi pars superior tribus consistit ossi-		tur	1158.27	circulationes	694.36
bis	117.18	catepsi detentorum est trinitas farina uires		causa procuratrix que dicitur	661.
castrorum arterie pulsus experiendo a-		1053.	44	16. 55.12.4. 5.4.78.	59
pprimae	510.19	catepsi detentorum quando utendum	917.75	causa pulsus mouetur ut inueniatur,	
carpas quid	117.12	Catopodia ad substantiam nutriti-		considerare oportet instrumentum.	
carpas consistit ossibus octo	117.12	1150.	54	usum & facultatem	99.18.4
205.	23	catopodia descripta de Celsus	871.18	causa pulsus praecipue, sunt continen-	
Cartilaginea nobis splendens	401.43	catopodia ex alio compositio	1189.	tes	551.47
cartilaginea uocis instrumentum	141.49	43		causa resistit deus uti mouetur sunt quot	
carpi et ceterorum, qui uidentur	206.10.	catopodia ad ardorem nutriti sunt et		caliditates	521.9
&		flangens	1150.61	causa utriusque conditionis nutriti sunt	
cartilagini scutiformi muscoli proprij				614.	5
				causa	

## I N D E X.

- causa externa non laedit nisi interna pre-  
 sinit 17, 19  
 causa generis acutis indicat 15, 13  
 causa inaequalitatem efficiens, semper in  
 pulsibus ordinatis summa et fixa est  
 56, 6  
 cause indurantes arterias que sunt  
 59, 9  
 causa morbi que fit diuturna 65, 59  
 causa morbis motu, omnes sunt frigi-  
 dae sunt calida fuerit, horrentis rigori-  
 bus inducere potest 68, 0, 40  
 causa non potest agere, sine patientis a-  
 ctitudine 78, 1, 43  
 causa quod dicitur 75, 4, 66, 4, 50  
 69, 5  
 causa quatuorplex 66, 4, 5  
 causarum continuationem variantium pul-  
 sibus, et de coniugationibus 55, 7, 17  
 causarum differentia triplex 56, 5, 14  
 causarum dignoscendarum modi extra me-  
 dicam artem positi 58, 1, 15  
 causarum dignoscendarum qui sunt arti-  
 faciales modi 58, 1, 2  
 causarum efficientium differentia duplex  
 17, 33  
 causarum genera praefer naturam que  
 sunt 92, 0, 1, 4  
 causarum genera quatuor 33, 6, 63  
 causarum genera tria in causis 55, 2  
 21  
 causarum genus duplex 59, 9, 2  
 causarum medicamentorum quatuor genera  
 4, 19  
 causarum motionis differentia quatuor  
 sunt 18, 5  
 causarum praecedentium febrem putri-  
 dam, quod singule inducunt 92, 0, 25  
 causarum praeservandarum differentia  
 triplex 81, 9, 7  
 causarum praefer naturam differentia  
 51, 4  
 causarum procatarrhicarum usus 85, 8  
 24  
 causarum pulsus generationis tria genera  
 37, 9  
 causarum pulsus mutationum, generumque utro-  
 que exemplo tractato 55, 11  
 causarum salubrium differentia duplex  
 82, 9  
 causarum salubrium materiae que sunt  
 81, 0  
 causa salubris 359, 4, 7  
 causa sine qua non, que 66, 4, 54  
 Causae in quibus accedunt medicamen-  
 ta 81, 6  
 Cauteria sanguinem supprimunt quod re-  
 liquum efficitur 101, 7, 3  
 cauteris, castoreo, in quibus utantur  
 365, 18  
 cauteris in ore putrilaginosos aliterbis  
 quando utantur 21, 6, 14  
 Cautis quos possident vires  
 108, 6  
 Cerebrum, haec omnia sunt mollia 105, 2  
 64  
 Cerebrum facilius 108, 5, 49  
 cerebrum quod 108, 5, 43  
 cerebri dactylorum facultas 181, 6  
 cerebri vires 119, 5, 46  
 cerebri utriusque facultas 108, 5, 40  
 108, 5, 63  
 Cere, qui morbus 175, 4  
 Cerebri pulsus diuicandae quod  
 expendere oportet 54, 1, 1  
 Cerebri materis facultas 101, 6, 2  
 cerebri minoris facultas 114, 1, 3  
 cerebri non recipit Galenus inquam  
 fuisse 20, 9, 17  
 Cerebri utriusque vires 210, 2, 25  
 Centrum quod 27, 2, 2  
 Cerebrum, aliter, porro, in ampelo-  
 praefertur facultas 59, 1, 55  
 Cephalica symptomata diuersa a causis  
 variis producta 120, 5, 51  
 cephalica magis faciliorem dicitur ce-  
 phalalgia 130, 9, 48  
 cephalica quod 76, 4, 15  
 130, 9, 51  
 Cephalalgia et cephalica diferen-  
 tia 74, 6, 1  
 Cephalica et magis generosiora sunt  
 116, 0, 40  
 cephalica medicamenta 87, 8, 49  
 cephalica ad quae medici utantur 116, 0, 40  
 55  
 cephalicum hinc 114, 4, 6  
 cephalicum ossa corrupta educunt 117, 5, 30  
 Cere abunde ratio 115, 2, 25  
 cere clota est emphysea 104, 1, 53  
 cere clota mordacioris est expertis  
 102, 2, 57  
 cere qualitas 108, 7, 2  
 cere usus alteri casu est periculosus  
 85, 0, 2, 118, 1, 16  
 cere per se non cognuit ulceribus fonsi-  
 dis 315, 5, 41  
 Cere si gumi facultas 101, 6, 37  
 cerebri utriusque speciei et facultas 182, 40  
 108, 6, 15  
 cerebra sine filioque 58, 6, 10  
 cerebri plurimum acribus medicamentis  
 quando reseruantur, et quando mi-  
 nus 117, 0, 43  
 Cerebri tunc gignitur a crassa me-  
 ningis tenuiore reddito 206, 1, 32  
 66, 0, 57  
 Cere et Galeni frigida, quomodo me-  
 dicantur 90, 9, 15  
 cerebri facilius 103, 6, 40  
 cerebri ex theopha 87, 0, 61  
 cerebri Galeni inflammationes acri-  
 bus ventriculi et hepatis maxime com-  
 munes 124, 2, 13  
 cerebri humidum ablutum frigida, et  
 lides afflicti refrigerat omnes 101, 3, 55  
 cerebri roborando utrinque com-  
 mune 89, 3, 46  
 cerebrum simplex aceto ablutum, et tri-  
 mures calidos optinuit est praesidium  
 101, 9  
 cere Typhoides 115, 4, 41  
 Cerebri praerediti acribus 67, 9, 15  
 Cerebri quae dicuntur 4, 15, 10  
 Cerebri est principium spiritus me-  
 dicalis 81, 9, 11  
 Cerebri effectus symptomata 32, 1, 45  
 cerebri aliter utrinque ablutum quod  
 dam fuisse seruatum 255, 5, 9  
 cerebri anoxia 181, 4, 0  
 cerebri anterior a posterioribus diuisio-  
 nis intercedente dura meningis  
 155, 3  
 cerebri anteriores utrinque inspiratio  
 nem expiratioque atque effluunt  
 effluunt 25, 150, 14, 9, 10  
 cerebri aut meningum inflammationes me-  
 cessant febri atque delirium sequuntur  
 60, 3, 44  
 cerebri calidi et humidus indicia 81, 8, 65  
 cerebri calidi et siccus indicia 114, 5, 7  
 cerebri calidi indicia 114, 10  
 cerebri et meningum eius infla-  
 mationibus quando euacubus come-  
 munt 92, 1, 6  
 cerebri et crenata crassiora per facili-  
 ter expelluntur 25, 1, 6  
 cerebri excrecentia utrinque calidi 19, 4, 10  
 cerebri exores, versus a se radicem  
 12, 23  
 cerebri frigidi et humidus indicia 81, 9, 42  
 cerebri frigidi et siccus indicia 114, 21  
 cerebri frigidi indicia 81, 1, 15  
 cerebri functionis propriae quae diu-  
 rantur 71, 0, 18  
 cerebri humidus indicia 81, 1, 32  
 cerebri intemperion humidum quae se-  
 quantur 60, 1, 28  
 cerebri laetitia 25, 1, 43  
 cerebri meatus ad palatum descensum  
 55, 55  
 cerebri meatus declinationem usus 25, 1, 56  
 cerebri morbi quomodo dignoscendi  
 82, 7, 4  
 cerebri motus 33, 9  
 cerebri nates 194, 1  
 cerebri naturam quae indiciorum gene-  
 ra ostendunt 81, 6, 56  
 cerebri pars anterior, mollis, mollior,  
 posterior durior, duris gignendis ut  
 35, 2, 63  
 cerebri partes quod posteriores, et durior  
 22, 26, 32  
 cerebri producentes maxime, quae ad  
 nates pertinent 26, 0, 50  
 cerebri productiones in oculis usus 26, 1, 19  
 cerebri refrigerata, crenis frusto, ablu-  
 tum melum 251, 20  
 cerebri siccus indicia 81, 8, 49  
 cerebri temperata quibus aceto conuoluit  
 NN 3

de	54,36	36,	696,61	Chonaeffus quon facultatem tenet	1111,	35
crebri uentriculi quibus sunt	34,4,1	crebrum uentricum, quae solentarij mo-	337,	Chamae dapheri facultas	1077,18	
crebri uentriculus medius & princip-		35	337,	Chamaeae uis	1111,18	
issimus in uentre habetur	316,23	crebrum non eget corde, ut sensus &	337,	Chamaeleon quon uires habet	Ibid. 14	
crebri uisio per quas regiones excen-		monetur animo	337,	Chamaeleon facultas	Ibid. 22	
tratur	735,41	crebrum per uentricum, partibus uim sen-		Chamaeleon facultas infigit	1031,	
crebro calido & humido praeditus ut		tendi largitur	675,21	Chamaeae quon uim tenet	1075,16	
asper aduersus, sic confert aquilo	819,	crebrum propter oculos in capite collo-		Chamaeae quon uim tenet	1111,	
819,	11	catur, propter crebrum sensus re-		33		
crebro deiectione obitus, aut compressus		liqua	251,48	Chamaeae uis	Ibid. 42	
cus uentriculus quoniam accidit		crebrum pulfore	291,14	Chamaeae quon uim habet	Ibidem	
322,	57	crebrum quae suo odore impleant		8		
crebro exilio, animus non priuatur		675,	51	Chorea cinis facultas	1100,11	
sensu nec motu, praeuocant ad ali-		crebrum quid cibis	394,51	Chorea quon du actur	415,21	
quem uentriculum priuatum sit		crebrum quando officatur ut instrumen-		Chelidoni uis	1113,49	
343,	60	tum, & quando ut pars similis		Chene capiti coelestia duo	1191,10	
crebro multo a membris, nihil offus-		742,	4	Chos sue coagulat, seruantes sex capiti		
di animal	344,4,7	crebrum quibus canaliculis purgetur		1191,	54	
crebro quae uis sanguis infuset	191,6	477,	47	Chorae quid digerit	1070,16	
crebro uis	316,60	crebrum quoniam sit canaliculis	677,	Chorae capiti coelestia tres	1192,19	
crebrum aere calidius	251,17	18		Cholea maris	686,1	
crebrum aium crebro praeditus pra-		crebrum quo tempore formetur	124,3	Chondriae uis	1113,59	
flantius tenet, quanto diutius	395,	crebrum, rationalis animae domicilium		Chondriae quae elixir uires quibus debet ef-		
41		417,	44	se sustinet	1171,40	
crebrum solidum a quibus facile implea-		crebrum recipit sensus, imaginationis		Chondriae, nutrimentum optimum	1111,	
tur	815,14	& intellectu completur	352,	62		
crebrum cum sanguine arbitrio motus non		59		Chorion	106,13	
eget musculis	72,15 249,27	crebrum, sensus, nervorum motusq; so-		Chorion facit origo & coloris		
crebrum coesto spiritus ualde desat		lutaris principium	1114,5 35,	267,	28	
129,	58	50,	343,6	Chorion facit uires uis triplex	267,16	
crebrum corde postius gigni	103,	crebrum, spiritalis medulla, & glandu-		288,	28	
63		lae quon faciem praebent	407,13	Chorionem constantem formam		
crebrum cordi exiguum, sensum uero		Cera uis uis quomodo accidit	709,	lenis exprimit	534,56	
organum immensum nervorum munda		5,	1191,50	Christi doctrinam implet subiectum	Ca-	
apophysis	251,11	Cerae uires uis facultas	1110,30	leus	531,8	
crebrum demittit matricem facundiam		Ceras totius substantiae excrementa ad		Chironem alius et telerion quoniam		
spine	114,40	gignenda cornu transmittitur		1171,61		
crebrum, dum inspiratus, aliquid aere		390,	29	Chrysippi de partibus animae opinio		
attrahit	129,40 107,1	Cerussa lota facultas	1117,3	327,	51	
crebrum est nervorum mollum omnium		crussa uires	1151,14	Chrysippi error duplex	335,21	
origo	261,21	Cessationem circa respirationem est op-		Chrysippi scilicet aliter discursus	332,2	
crebrum ex solo semine oritur	109,24	posito uis uires ponens rationem & den-		27		
crebrum facile ab aere refrigeratur	251,	titatem	498,48	Chrysosolae facienda ratio	1132,17	
23		crassantes inter respirationem breuis &		Chrysosolae uis	1126,10	
crebrum frigidum a quibus facile leda-		longe, a quibus casus proficiuntur		Chrysosolae uis	1114,5	
tur	817,37	499,	17	Chrysosolae animaduersio natura si-		
crebrum habentes frigidum, feminae-		crassationum quantitas propria, varietas,		similis conuenit seruandis tempe-		
riores sunt	812,41	densitas	490,16	ritate naturae: non seruandis,		
crebrum in alio loco locatur	109,	Cetaceorum caro	401,52	contraria	404,21	
41		Chalacatissimatis	954,4	Cibaria epileptici apta quibus esse de-		
crebrum in apoplexia magis afficitur:		Chalacati pars transit in sagapenum		beant	1006,40	
uentriculi, in sopore & epilepsia		1181,	24	Cibaria pinguis & lenta appetentiam		
750,	25	Chalacati uires	1176,40 1181,54	curant	199,60	
crebrum inspirare expirare	131,15	1219,	58	Cibi ad gignendos bonos humores, pre-		
crebrum in temperie afficitur, qualis		Chalacati uires partibus condacit		stantiores quoniam	408,51	
symptomata inducit	602,51	1166,	24	Cibi asilae qui sunt admodum	422,59	
crebrum leporis consistit pueri densi-		Chalacati facultas	1170,10 1220,	Cibi asilae, acerbis aut sicca natura, sup-		
titus	1136,60	17,	1136,53	primunt alii excrementa	416,	
crebrum nascenti excitat	394,53	Chalcitis crustas excitat	1170,2	53		
crebrum nervis & musculis facultatem		Chalcitis omnium celeritate funditur		Cibi boni succi citra calorem, qui sunt		
sopeditat	818,40	1151,	17	1199,	51	
crebrum nervis similium, mollis ta-		Chalcitis quon habet uires	1125,59	Cibi capientes nunquam comitatur cali-		
men	252,57	Chalcitis uires capis sit facultatis	1120,	das in temperie	767,18	
crebrum nervorum & spiritalis medu-		10		Cibi capientes causa	726,41 766,30	
lae origo	149,26 282,41 309,			Cibi		





Colera à spiritibus acribus contingit 779,  
25  
colica 225, 30  
Colica excrementis quælia 770, 10  
colica præsidium mitigans, est & curati-  
onem & prognosticon Ibid. 17  
colica remedium 772, 10, 1132, 19  
colica symptomata præcedentia quæ-  
771,  
colica medicamina Andromachi 216, 1  
34  
colici affectus ex cruditate refrigerati-  
onis gignuntur 653, 64, 732, 3  
colici à suppuratis quomodo distingui-  
tur 769, 59  
colici doloris, & cibus qui ab impetu la-  
pide oritur, sunt communia præsidia  
causacuratiua 732, 16  
colici doloris, & cibus à lapide, signa di-  
uerse Ibid. 20  
colicis maligna Antipatri 1181, 45  
colis uicis unde deprehendi possit 779,  
15  
colle uti glutinis facultas 1088, 18  
colla longando in uicis animaduersa  
120, 4, 8  
Colligantia quæ sint 1058, 35  
Colligantiones partium quibus modis sol-  
uantur 6, 14  
Colligantiones causæ 661, 63  
Colla sive anclorum productiones unde-  
citur 221, 55  
colla spondylii primus, posterius pro-  
ducuntur carni, foraminibus obli-  
quis 219, 47  
colla ueritatis primæ duæ sine membra-  
ne, quæ reliquæ transunguntur  
236,  
colla ueritatis quibus partibus nervus  
largiuntur 250, 55  
colla ueritatis contrahit 214, 43  
colla ueritatis musculis per omnia similes  
est sedus musculo 181, 6, 346, 19  
colla ueritatis sicut 231, 2, 303, 3  
colla ueritatis spondylii a qualem portio-  
nem ad usum nervi præbet 190, 18  
collum æthere arterie grana satum  
250,  
collum cum pulmone semper & nascitur  
& perit Ibid. 10  
collum maris 302, 41  
collum non habentia animalia sunt mu-  
ta 250, 18  
collum quæ animalia habent, & quæ  
non Ibid. 11  
collum septem constans spondyliis 226,  
17,  
collum ueritatis fœminæ breuius & la-  
tius uirilis 101, 19  
Collum Asclepiadis ad malarum dolo-  
res 1229, 17  
collutis Crisiani ad dentes motus & e-  
ratos 2130, 8  
collutantes moderate ex quibus sunt  
2136,  
34

collutantes ualde astringentes Ibid. 38  
Collyria laxandi modis 1127, 40  
collyria Libyana & cygnæ quæ dicuntur  
Ibid. 38  
collyrianda ex opio confectum facit-  
ur 931, 2  
collyrium ad oculorum dolores a tristi-  
tis 1222, 12  
collyrium diarrhædon Ibid. 57  
collyrium ex malarum furis 1215, 18  
collyrium ex uino aspidochelone acem  
moderat 1217, 158  
collyrium Pacciorum 1219, 12  
collyrium succum ex phrygia lapide, om-  
nis addit robur 481, 16  
collyrium crypthera dictum 1222, 35  
Colicibus facultatem quam habent  
1088,  
Colica intestinum quatuor 120, 11  
colica suppurata interdum in se habet  
127, 46  
Coloponia duplici 1183, 25  
Color corporis quando exoptima sit hu-  
morum nota, quæ subjungit 487, 4  
color corporis quæ modis natiui possit  
766,  
color cutis qualitatem humorum subius  
putrefactionem indicat 1129,  
16  
colores ad medicamentum acribus digna-  
scendas parum conferunt 1051, 3  
colores uicis unde oriuntur 673, 9  
colores qui alii sunt calidiores 1051, 12  
colores uicis qui conferunt 673, 13  
color floris rubicundus 616, 60  
color in plenitudine duntaxat indicat  
991, 14  
coloris rufi flauis discerni 926, 57  
color plumbeus quid indicet 457, 30  
colorum uicissitudines unde oriuntur  
691,  
color uiridis quomodo fiat 617, 16  
Colubæ carni felis uiscosa 705, 40  
colubæ terre olæ domesticis sunt præ-  
stantiores 416, 41  
Colunella inflammata curatio 1216,  
26  
colunella laxate remedium 1234, 32,  
1238,  
colunella quando fit exidenda 950,  
26  
colunella quid 24, 158, 1236, 18  
Columnæ processus 1133, 8  
Comari fructus populeus 327, 10  
Comastionem nullum est frigidum  
1114,  
Comitidi morbo eduxis quid arguat  
1137,  
comitidi obnoxios quid fuerit 1067,  
10, 1205, 10, 1183, 7,  
1141,  
Commentaries de usu partium cum quæ-  
dam hyemum conscriptis Galenus  
214,  
Commissuræ arterie, uenæ, & nervi

inter se ita in corpore 316, 83  
Commodi morbus 651, 31  
Commodi sequendatur in Italia Gale-  
ni, dum M. Aurelius bellum inferre-  
bat Germanis 651, 31  
Commotus quæ medicamenta conu-  
niunt 1185, 14  
Commotiones tendentes ad sunt 17, 13  
commotiones magnitudinis, remediis  
magnitudinem non indicat Ibid. 55  
composita cognosci non possunt simpli-  
cibus ignotis 1018, 19, 357, 32,  
1153,  
composita aniculis, ex Apollonii li-  
bris 1210, 31  
composita Menecratis spumas decide-  
re faciens, & corpora attenuans  
1226,  
compositiones hepaticæ Asclepiadis  
1257,  
compositiones nephriticæ Asclepiadis  
1267,  
compositiois præparatio causæ 663, 46  
compositio isum ex uicis Philocrati  
1221,  
compositum semper simplicibus positi-  
um 490, 11, 1221, 37  
comprehensio integra quomodo fiat  
196,  
Conceptionis ratio 82, 40, 105, 21,  
& 32, 107, 18  
Concretio pulcherrima quæ dicitur  
423,  
Conche capit mystra duæ 1292, 6  
Concidunt thoracis & eisdem de-  
missionis discernunt 499, 2  
concupi aliqui perfectum sine dextera  
necesse non est 1173, 4  
concupi infirmis 296, 11  
Concordia inmodis primo falsa, deinde  
amara redduntur 79, 55  
concordia & cruditas ex propriis ca-  
gionibus excrementis 29, 45,  
612,  
consentire non sustinet morbus, nec ibi,  
nec alio 1188, 32  
concessionis quid indicet 29, 53  
concessionis sunt expendenda in cog-  
noscentis præsentibus & futuris cri-  
sibus 658, 1  
concedendi ciborum magnopere præ-  
sticiendum in singulis febribus  
921,  
concessionis quæ conferunt 30, 4, 1,  
81, 12, 462, 32  
concordia absolute inbecillitatis signa  
619, 12, 618, 4  
concordia bene & male causa  
1229,  
concordia indicia, quomodo tempore  
apparet, salutaria 614, 57  
concordia organa & successiones  
408,  
concordia signa 627, 40  
concordia uicis unde  
684, 17  
con-

## I N D E X.

- concessio uisum causa communis  
 quæ 681,55  
 concessio uisum causa extra uentri-  
 culum lesum, quæ 624,8  
 concessio uisum contingit bifurca-  
 583, 52  
 concessio uisum quid Ibid. 4,8  
 concessio quæ sit ab innato colore, ab  
 extrinsecus colore innato 1054,1  
 8  
 concessio quid sit 59,33, 640,49,  
 683,42, 691,16  
 concessio requirit temporis diuturnitatē  
 326, 48  
 concessio triplex 408,55  
 concessio uisum uisum febribus  
 79, 36  
 concessio facili, facili corruptum  
 368, 13  
 Consequens aliquid quando in no-  
 bi sit 1055,12  
 Conscientia in glaciem facili, tem-  
 peramentum fusi frigidi uisum uisum  
 eadem conscientia uisum 1016,  
 19  
 Conscientia quomodo corpori accidit  
 680, 60  
 Conscientia quæ 1058,55  
 conscientia, frigiditas est proprium 1040,  
 16  
 Conscientia coherens plus interdum  
 obstat quam proficit 359,17  
 Conscientiarum generum uariis 395,  
 59  
 conscientiarum usus 1046,16  
 conscientiarum simplex est quibus consistit  
 1007, 9  
 Conditio sive, quoniam habent facultatem  
 404, 31  
 conditoris magnifica commendatio  
 126, 4  
 conditoris artem splendescere etiam in u-  
 nitate matris 315,14  
 Condylus in ossibus quid 96,25  
 Conditio ad omnes sanguinis uisum  
 1346,9  
 conditio dista lucida Ibid. 1  
 conditio ex fructibus Asclepiadis, uen-  
 triculi subversum, caliditas et dysen-  
 teria conueniens 1150,45  
 conditio uisum stonachice Andromachi,  
 1340, 16  
 conditio solum de lorum et uisum  
 et tenuis et dysenteria 1245,  
 61  
 Conditio in toto corpore est una 564,  
 22  
 Conditio artis medicæ in effluuium co-  
 gitatione consistit 1201,46  
 Conditio facili 1093,31  
 Conditio ad maximum circulum uisum  
 omnium quæ circa rotundam cer-  
 porum sunt 165,48  
 conueniens in exquisitum rotundum solle-  
 riores, quæ in planioribus 169,  
 32  
 Conditio animæ mortal præcedat  
 eam, quæ administratio in uisum 1091,  
 30  
 Consensus et discrepantia qualitatium  
 insunt rebus uisum 1050,35  
 Consequentia quæ dicuntur 32,32  
 Conscientia medicæ parti triplex  
 363, 36  
 Consilium in uisum platis durandis  
 ad cicatricem quod 1059,32  
 Conscientia humiditas etiam corpori  
 dant eugram alunt: dant utri et  
 terræ, copiosum, et quod argi  
 absumitur 376,19  
 conscientia quid 355,43  
 conscientia quæ sunt humida, à quibus  
 saliter sumuntur 379,17  
 Conscientias metum à quibus humi-  
 ditas sunt 801,7  
 conscientias causa 664,32  
 conscientia quæ ratione febriem gignit  
 616,6, 889,64  
 Chytrum corporis optima quæ sit 66,  
 26, 67,6  
 conscientia membri in quæ consistit  
 487, 61  
 conscientia animalium et diffari elemen-  
 torum uisum 391,40  
 conscientia mellis animæ irrationa-  
 bilitas 391,11  
 conscientia esse aliquid condonandum  
 616, 14  
 conscientia uisum uisum habenda est  
 ratio 466,61  
 conscientia ad dyspnoiam hanc exigui-  
 um habet 427,59  
 conscientia ad inuentionem uisum  
 et ad somnium uisum plurimum  
 potest 903,10  
 conscientia est signum naturalis uisum  
 proprietatis, atque etiam causa inter-  
 dum 427,11  
 conscientia non sicut ac proprium tem-  
 peramentum seruanda 896,  
 13  
 conscientia plurimum potest ad uisum  
 uisum uisum 964,17  
 conscientia quoniam ad uisum bonita-  
 tem uel prauitatem posita 73,  
 64  
 conscientia quomodo uisum uisum  
 uisum 903,59  
 conscientia reddit uisum uisum  
 ut græus 425,57  
 conscientia uisum uisum natura 429,  
 32, 1016,61  
 conscientia rationalis ad inuentionem  
 necessaria 359,12  
 Conscientia sua forte omni uisum  
 tristitia 426, 8  
 Conscientia qui dicitur 129,45  
 conscientia ad modestiam uisum est uisum  
 4341, 1  
 conscientia uisum uisum quid uisum  
 423, 45  
 conscientia quæ soluit 1201,33  
 Conscientia arteria habet quatuor pul-  
 sum genera 187,17  
 conscientia arteria quatuor discretis  
 543, 24  
 conscientia arteriarum in quibus consis-  
 tit su pulvis, et in quibus ob-  
 scura 540,14  
 conscientia arteriarum exteriorum sub-  
 80 606,11  
 conscientia arteriarum usus 351,  
 38  
 conscientia et conscientia usus 591,  
 41  
 conscientia in arteriis celeritas, magni-  
 tudinem uisum uisum uisum  
 587, 50  
 conscientia uisum uisum uisum  
 150, 46, 471,7, 5044  
 52, 919,14, 972,4  
 986, 53  
 conscientia uisum uisum uisum  
 145,11  
 conscientia quoniam dicitur esse 919,55,  
 1254, 18  
 conscientia quatuor uisum 58,  
 51  
 conscientia uisum uisum uisum  
 901,30  
 conscientia uisum uisum uisum  
 427,46  
 conscientia uisum uisum uisum  
 359,42  
 Conscientia uisum uisum uisum  
 534,10  
 Conscientia et caliditas etque uisum  
 ferenda 421,11  
 Conscientia quid 2158,356,44  
 conscientia uisum uisum uisum  
 931,59  
 Conscientia uisum uisum uisum  
 819,60  
 Conscientia uisum uisum uisum  
 191,44  
 Conscientia et solum uisum uisum  
 919,55  
 Conscientia uisum uisum uisum  
 881,45  
 Conscientia uisum uisum uisum  
 427,44  
 Conscientia 271,7  
 Conscientia 225,4  
 Conscientia uisum uisum uisum  
 617, 19  
 Conscientia et tremor in solis uisum uisum  
 uisum 517,40  
 Conscientia sit ad repletionem uisum et uisum  
 uisum 225,44  
 Conscientia in uisum uisum  
 661,1  
 Conscientia epilepsia quam uisum  
 NN vij

fiant in affectibus per consensum  
 745. 35  
 consensiones que curari possint & que  
 minus 913, 43  
 consensiois ab humorum copia aut in-  
 flammatione oris, curatio 716,  
 121, 32  
 consensiois epistemicorum causa 745,  
 121, 32  
 consensiois omnis causa 776, 47,  
 740, 31. 733, 38  
 consensio organorum spermaticorum ad  
 seminis excretionem conducat 301,  
 63  
 consensio quid 715, 61, 156, 43  
 consensio que differt a naturali motu  
 740, 18  
 consensio tensiones quando comitetur  
 1753, 21  
 Cerebra utriusque facultas 1018, 54  
 Cerebri pulsionem motum cerebri non e-  
 git 324, 3  
 Cerebri hanc officina maximam id-  
 ponic 1056, 43  
 Cerebri pulsio in diuina ubi fons ignis  
 121, 55  
 Cerebri facultatis initium 184,  
 45. 339, 30  
 Cerebri quatuor datus 339, 35  
 Cerebri arteriarum ortum origo 141, 10.  
 343, 55. 349, 47 327, 18.  
 306, 11. 696, 60. 45, 33. 199,  
 16. 805, 54  
 Cerebri arteria sine pulsatione suppetat  
 1240, 36. 808, 41  
 Cerebri calidissima corporis particula 351,  
 83  
 Cerebri calidus fons 234, 10.  
 12, 357.  
 Cerebri cerebrum utitur per tria usum  
 321, 53  
 Cerebri consensio hepatis, iunctio causae urinae  
 605, 7. 54  
 Cerebri consensio septis transuersae Ibid. 35  
 Cerebri cum arteria per se pulsus 551,  
 57, 74, 14.  
 Cerebri affectus necessarii officinae ar-  
 teriae 594, 54  
 Cerebri & hepatis ex se mixta coniunctio-  
 ne necesse fructu tribui sicut 312,  
 10  
 Cerebri in se et cartilagineum 185, 18.  
 219, 51  
 Cerebri in se quatuor locum ora meso-  
 rum 339, 31  
 Cerebri interdum in se sunt varia temperam-  
 ta 596, 1  
 Cerebri dilatatione trahit, contrahit inori-  
 tur 331, 59  
 Cerebri non in se sunt tres fons 185, 19  
 Cerebri rudis & corrupta, nulla soluta  
 ria actione animal impeditur 322,  
 46  
 Cerebri utriusque obducitur datus est pul-  
 sionem datur efficientes 600, 31

Cerebri affectus symptomata 327, 46  
 Cerebri auri que accendit 184, 4  
 Cerebri arteriarum motus Ibid. 53  
 Cerebri arteria in cardenem membra-  
 nam motus & figura Ibid.  
 59  
 Cerebri arteria substantia 312, 3  
 Cerebri arteria salitas 184, 43  
 317, 53  
 Cerebri calidi & boni indicia 821,  
 46  
 Cerebri calidi & fecti indicia 821, 35  
 Cerebri calidi indicia 820, 43  
 Cerebri calor duplex 595, 35  
 Cerebri calor unde minor atque maior red-  
 ditur 990, 18  
 Cerebri caro calidior universi corporis  
 partibus 43, 34  
 Cerebri caro qualis 314, 18  
 Cerebri contractionem quo iuvant 345, 3  
 Cerebri contrahit quando fuit 314, 60  
 Cerebri corpore vasso a frigidiore, motu  
 declinari non potest 590, 10  
 Cerebri cum pulsat committitur 315,  
 34  
 Cerebri dilatatio quando fuit 314, 16  
 Cerebri & arteriarum motus non est au-  
 luntarius 348, 15. 184, 10  
 Cerebri & hepatis generatio 109, 32  
 Cerebri & musculi discrimen 91, 40  
 Cerebri facultas quo 594, 19  
 Cerebri figura 324, 1  
 Cerebri frigidi & boni indicia 821,  
 63  
 Cerebri frigidi & fecti indicia 823, 3  
 Cerebri frigidi indicia 821, 13  
 Cerebri fuliginem expelli in systole per la-  
 ter & magnam arteriam 343,  
 30  
 Cerebri generando unde materia 123, 36.  
 & 59  
 Cerebri boni indicia 821, 10  
 Cerebri interperet comes est facultas in-  
 brallitas 589, 16  
 Cerebri interperet protinus ceteris par-  
 tibus communicatur 990, 44  
 Cerebri interperet est minor inflamm-  
 torie 589, 14  
 Cerebri morbi unde cognoscantur 817,  
 11  
 Cerebri motus a natura 343, 59  
 Cerebri motus duplex 321, 7  
 Cerebri officia quatuor 316, 10  
 Cerebri officii inveniendi ratio 185, 15  
 Cerebri partes 314, 4. 319, 53  
 Cerebri officii usus 381, 27  
 Cerebri proprii affectus 759, 43  
 Cerebri quatuor quatuor fuit 314, 64  
 Cerebri fecti indicia 821, 33  
 Cerebri fustiter fons perpetui motus  
 64,  
 23  
 Cerebri fustiter ventriculus 314,  
 3  
 Cerebri fustiter ventriculus longe mai-  
 rem habet calorem ceteris partibus

707, 44  
 Cerebri fustiter ventriculus, recepta-  
 lion spiritus est 64, 11. 131,  
 46  
 Cerebri fustiter pars cui fuit trassit ac de-  
 nor dextra 315, 43  
 Cerebri fustiter ventriculi officii datus  
 324, 16  
 Cerebri fecti & postio 321, 43  
 Cerebri fustiter ventriculi acron e-  
 motus eadem 185, 44  
 Cerebri fustiter ac cibis qualis 195,  
 24. 407, 8  
 Cerebri fustiter per motum diffusi  
 fuit 184, 3  
 Cerebri temperies & interperet ex  
 quatuor constatur elementis 314,  
 30  
 Cerebri temperies necessaria est cerebri  
 & hepatis 719, 6  
 Cerebri duo ventriculi 111, 44.  
 123, 16  
 Cerebri vasa oriuntur ab illis basi al-  
 tera partem principalem  
 314, 1  
 Cerebri vasa quatuor motus 339,  
 7  
 Cerebri ventriculus dexter, pulmonis  
 genera ceteris 335, 10. 336,  
 54  
 Cerebri ventriculus dexter pulsus, cui  
 vasa a iocore inferiori est 340,  
 43  
 Cerebri ventriculus tertius nusquam est  
 147, 34  
 Cerebri ventriculus uterque pulsus videtur  
 328, 13  
 Cerebri uterque fustiter pulsus  
 118  
 Cerebri videtur quando statim periturus  
 759, 64  
 Cerebri vasa quatuor alimentis quatuor fustiter  
 videtur 339, 18  
 Cerebri principium compositi arteriarum  
 motus 505, 31  
 Cerebri est fustiter atque calidus hepatis  
 341, 47  
 Cerebri excurre quatuor postio 700, 3  
 Cerebri frigidiorem caliditatem cerebri cali-  
 distum 816, 39  
 Cerebri spiritum a pulmone per me-  
 riam unctum 331, 11  
 Cerebri ventriculus, hepatis fustiter non po-  
 test ad balium contrahit perducit  
 822, 44  
 Cerebri fustiter 1059, 3  
 Cerebri vasa ista quibus est datus cen-  
 frunt 1118, 44  
 Cerebri fustiter refrigerant quatuor  
 est spiritum 760, 18  
 Cerebri in distole spiritum trahit, in systole  
 pulsat 343, 65  
 Cerebri vasa caloris origo 713, 65  
 Cerebri in se caloris fons & principium  
 504, 10  
 Cerebri

## I N D E X.

- cor inter utraq; thoracis spacie medium  
confistit 131, 43. 232, 35. 233.  
62. 287, 53  
cor in utero accipit spiritum à magna ar-  
teria 140, 10  
cor laborans inter quib; temperie, pulsus  
mutari fas erat ut quales efficit  
596.  
cor mouetur perpetuo citra uoluntatis  
imperium 93, 43  
cor mouetur ceteros, quatenus à parti-  
culis suis excutitur ad motum 591,  
30  
cor mouetur perpetuo, & quare 109,  
15  
Corneæ tunc et erose, que mediocri-  
ta cognoscunt 1217, 14  
corneæ tunc et asces 1263, 20  
corneæ tunc et 1214, 6  
cor nec masculinus est, nec eger, utrius  
ad obediens sanctorum 124, 16  
cor neq; refrigerationis neq; uicis prin-  
cipium 121, 3  
Corripit, ra magna ex parte superius ca-  
rent decedens, & cor 122, 2  
cor non prout per foveas, sed ex pul-  
mone in abstrusum 215, 17  
Cornea ducta dentes reddunt flendi-  
dos 1123, 61  
corneæ suæ utri apices quid 103, 35  
cor nullum fortitur ad motum animalium  
112, 2  
corpus cuius fit scilicet 1019, 43  
corpus humani as 1174, 44  
corpus ceruicis & capricornum u-  
terum utrius 1164, 47  
corpus matris sitis & as 103,  
43  
Corneæ 20, 243  
Cornealis sutura quæ 132, 15  
cornealis uicæ 1213, 31  
Corneopodus facultas 109, 10  
cor ortu primo, utrius seminis magnitudi-  
ne 27, 14  
Corporæ ab initio possunt consistere, nō  
perueniunt ad sensum, aut aliquo  
semper morbo tenentur 473, 43  
corpora ægrotantia à ceteris distin-  
guuntur sensibilibus operationibus  
sionibus 126, 16  
corpora calida humidiora quib; ceteris  
alimencum sibi asportant 601,  
43  
corpora causis morbis facili corrip-  
untur 221,  
corpora dissipata facilia & dissilia  
que 903, 40  
corpora ex quolib; occasione calida del-  
ta in hunc mutant 104,  
corpora frigida & siccæ celeriter sen-  
sunt 472, 4  
corpora humana quatuor elementorum  
composita sunt 66, 30  
corpora humida & calida fluxum in  
uicem educta sunt 472, 5  
corpora inbecilla cur obiciuntur in  
morbus facilius resistunt 189,  
62  
corpora imparia, quæ magis nutrit, et  
magis lodes 419, 6  
corpora intemperata, quibus diuersis se  
dicuntur ad medicamentum 169,  
60  
corpora magna aut parua quæ dicuntur  
52, 65  
corpora melliora induribiliora indi-  
gant medicamentis 1155, 18, 116, 1,  
17, 116, 63. 1156, 21  
corpora quæ sunt duriora aut molliora  
canda 440, 42  
corpora secundum naturam se habentia,  
fructuosa alteranda autem quæ mor-  
bo premittunt 412, 30  
corpora siccæ & frigida cur marantur  
infirmitatibus 621, 10  
corpora siccæ saluta, coris sunt similia  
404, 2  
corpora similia à se mutuo nullum tem-  
peramentum accipiunt 1012, 57  
corpora solida cum ariscent, cubi sunt  
108, 2  
corpora utriusque sunt redundancia; fa-  
cile succedunt causis morbis  
66, 41  
corpora uersa constant compositum  
quatuor elementorum 89, 64  
corpora uersa constant materia  
temperie 69, 11  
corpora lassata cui sanguis bonus quidem  
exiguus fuerit, autem humores plu-  
rimus, quæ melendi ratio adhibenda  
439, 28  
corpora constitutio optima quæ dicuntur  
412, 1  
corpora constitutio salubris iudicium ex  
natura habet illas 24, 35  
corpora constitutio triplex 478,  
51  
corpora humani diuisa 61, 11  
corpora nostri compositio triplex 657,  
31  
corpora quælibet species non intelligi  
in anima capax 60, 19  
corpora salubria statim habet latitudinem  
476, 53  
corpora statim inæquales trifariam fi-  
unt 471, 51  
corpora structura, quæ desideret  
121,  
corpora differenda 410, 64  
corpora dispositiones dissimiles 713,  
63  
corpora humidiorum natura 117,  
60  
corpora statim utriusque sunt duplices ge-  
nere 472, 59  
corpora in illis septem oppositiones  
516, 1  
corpora uicem quatuor in se mu-  
tuè agunt 1174, 21  
cor posterius hepate format 121, 36,  
123, 59  
cor prout moueri incipit, & ultimè  
efficit 124, 15  
cor, principium motus ariscent 124,  
45  
Corpendia ex sanguinis sui copulâ 49,  
33  
corporei qui 49, 27  
cor pulmonis alimentum præparat 139,  
21  
cor pulmonis consentiens quales efficit  
pulsus 600, 51  
cor pulmonis per laues arterias collige-  
tur 123, 16  
corporei uisus 111, 12  
corpus alterum necessarium quæ sit 12,  
129, 43  
corpus boni habitus quodam sit dictu-  
dum 104, 19  
corpus contra pestilentem causam quæ ra-  
tione præseruari debeat 73, 4  
corpus durum simpliciter 116, 3  
corpus c. quilibet medium, detritum & ce-  
dendum medicamentum, sed secundum  
aliquid 67, 28  
corpus ex se duplici ratione consumitur  
410, 16  
corpus frigidum & humidum nullum  
in actibus reperitur naturaliter  
62, 23  
corpus habetulla copiosum, multi sunt  
nutrimenti 169, 3  
corpus humanum ex accidenti medicum  
& philosophia dicitur subiectum  
13, 50  
corpus magnum unde tale 67, 25  
corpus moderate durius, firmius aduer-  
sus causas internas 66, 64  
corpus non rarefaciendum antequam ad  
curat 917, 33  
corpus nostrum constituitur, contraria,  
contenta, & quæ respectu feruntur  
711, 46  
corpus nullum uisione caret 1116,  
42  
corpus optime constitutum, quare mi-  
nus morbi succubatur 66, 31  
corpus optime constitutum ad custodiam  
sui desiderat amorem excessum me-  
dicum 465, 28  
corpus optime temperatum in regnu-  
bus intemperatis non gloriatur 442,  
56  
corpus optime quando angustia nō fit  
gida laudem 649, 13  
corpus parum arde 6, 16  
corpus qui duar quæ ferre, & qui me-  
uri 713, 1  
corpus rariæ ac molle facili ab extrin-  
secis inuasis efficitur 417, 57  
7

corpus salubre	66.1.19, 48	ria, acuta, & nervus	127.47	crisis habentis post precedentes com- dines non interponit	612.1
corpus sanum quando dicitur	350.10	coctum sibi simile, est proleto non co- miti, sed desinere in coctum, quoniam	174.20, 249.13	crisis morbi cum excretionibus qui passus inducit	612.51
corpus sanum secundum habitudinem quod- non dicitur	364.116	coctum utrumque sunt septem, membo- rum quinq. 249.20. 136.4	41	crisis autem procedi difficiis toleran- tia 96.20	47
corpus sanum sibi simile, natura omnia congruentia inveniunt	443.43	coctus rescentes musculi	173.11	crisis presentium symptomata	612.1
corpus secundum affectionem solum quod non dicitur	364.11	coctus faciles	1019.21	crisis quando tenetibus natura 643.57	57
corpus simile frigidi & siccum solum dicitur portibus colligere tamen in se pi- tuitosi & siccis excrementis, que purganda sunt	469.15	Ceteris Naturae rationem quem vim ha- beat	1118.17	crisis triplex quantitas que ratione prædixit Galenus Eudemus 642.	42
corpus simile nullum est vacuum aut pleticum	513.24	Coctum sicut brenia caput quatuor di- citur	1121.19	crisis absque cruetum non fit	641.53
corpus totum transmutabile	487.43	coctum, continet erythema quatuor	41	crisis bona & instantia indicia que	612.1
840.57.	1015.14	Coctum sicut sunt acicula secundum ad utrumque unum	1015.67	crisis excretionem concedit indicat	612.1
corpus simile optimi ad purgandum comparatum	567.10	coctum quod	131.00	crisis dies ex ipso metu invenitur	640.
corpus unum esse sibi transmutabile & siccis	507.16	Coctum articuli qui musculi sunt	138.	crisis dum veniat, prævenit decretionis dicitur	650.40
corpus unum non ex una particula constat	513.16	Coctum articuli duplex sunt ligamen- tum	160.51	crisis futura per abscessus que signa sunt	644.55
Cor quando pisset	124.48	Coctum laborantibus quid subvertit	1113.	crisis bona potest dignosci	612.53
cor quo formetur tempore	121.38	C. 2. ANTI fructus admodum ex- porridus & longus, non sunt perfe- quendo ad finem usque	870.16	crisis imperfecta que	617.12.
Correlationis differentia in quo unum 360.	60.	crani productio	109.31	crisis in idem tempus debet eire cum ac- cessione	640.9
cor respiciendum instrumentum	231.11	crano forato, dura membrana crebri quod necessitas	179.53	crisis in prout quatuor diebus accessio exemption	612.31
corrupta vacuum, crudi coquenda	456.	crano frallo commode insillunt reser- vatum tepore in meningem crassam	120.1.	crisis mala que	612.12. 641.19
Corruptio ac interior duplex nobis in- est necessaria	419.41	crano car ex pluribus ossibus consistit cranium inmobile, cum moris crebri	249.	crisis non bona que nocet	641.19
corruptio summe acida, à quibus co- bu gignatur	643.19	Crasi intestini usus	224.12	crisis per abscessum que	1112.10
corruptio est aliam que sequitur	667.	Crasi in urtre horrent	402.11	crisis per excellentiam que dicitur	612.
Corruptionis ciborum tres differentie	711.	Crasi cum pulvis eriguit usus	541.46	crisis perfecta quid	641.17
corruptionis modis duobus	1059.11	Crasi cum acida dicitur diffinit	61.	crisis quando futura sit sperari dicitur	612.1
corruptionis necessitas inde nobis ac- dat	475.18	Crasi cum acida dicitur diffinit	61.	crisis quando tunc contingit	612.14
corruptio quæ motus	712.45	Crasi cum acida dicitur diffinit	61.	crisis quod	602.16. 610.19. 614.13
corruptionis omne, alienum à natura est	901.	Crasi cum acida dicitur diffinit	61.	crisis que morbi tempore fiat	640.11
cor siccitatis fibrarum omnia genera	234.	Crasi cum acida dicitur diffinit	61.	crisis salutaris ne sit an perniciose unde cognoscitur	610.44
cor siccitatis privatum, moveri cessat	125.	Crasi cum acida dicitur diffinit	61.	crisis simpliciter que sit sibi nocenda	612.
cor utriusque principium	1112.4	Crasi cum acida dicitur diffinit	61.	crisis et moratur quiescere, non necessa- ria	641.54
cor unde nutrantur	293.	Crasi cum acida dicitur diffinit	61.	crisis utritque per fugiri possit que consi- deranda	641.4
Corydalis herbe vires	114.11	Crasi cum acida dicitur diffinit	61.	Crasi faciles	1020.11. 1101.47.
Coryce vel grandis causa que	691.	Crasi cum acida dicitur diffinit	61.	Crasi sicut ferit caput	1201.11. 1202.
Coryce laborantibus nigella oleis inbita sterosamenta mouet	129.56	Crasi cum acida dicitur diffinit	61.	Crasi optimi nota	1212.19
Coste omnes utriusque dorsi alligantur duplex nodo	187.1	Crasi cum acida dicitur diffinit	61.	Crocodyli formis faciles	1020.87
Coste prime minime	291.43	Crasi cum acida dicitur diffinit	61.	Crocodyli præparatio	1214.19
Coste utriusque spicæ	116.1	Crasi cum acida dicitur diffinit	61.	Croci concipi à summo & quære	416.
Coste utriusque duodecim	116.52	Crasi cum acida dicitur diffinit	61.	Cruidas acida non contingit in his, nisi admodum rari: neque accendit dicitur	1894.41
Costarum lacer	183.50	Crasi cum acida dicitur diffinit	61.	Cruidas acida non excitat balium sum- dum	1112.48
Costarum utrumque sedes duplex	136.51	Crasi cum acida dicitur diffinit	61.	Cruidas causa est morborum ex utroque humoribus ortum	411.29.
Costarum sicut præterea cum pituita esse causari	186.60	Crasi cum acida dicitur diffinit	61.	Cruidas que sit alius deterior	411.11.
Costarum singulis in propinquo est arte-		Crasi cum acida dicitur diffinit	61.	Cruidas	

- eruditus quid 631.46  
 eruditus quid significet 631.49  
 eruditatem patientiam, quoniam facit in  
 febres incidit, et qui agere 711.  
 32  
 eruditates nullam necessitatem symptomata  
 sepeant 621.18  
 eruditates quid indicent 32.55  
 eruditibus qui potus cibique congruent  
 459, 9  
 eruditati quae sortibus commoda 458.  
 56  
 eruditatis cause 764.50  
 eruditatem differentiam 895.6  
 Erudum simpliciter quidem sit 631.  
 16  
 Erura duo soli homini dote inter prede-  
 stina venia 107.61  
 Erura gratia picanda et curia et erura  
 da 467.19  
 Erura in solis dominibus ad rellam lina  
 subtrahuntur spene 110.7.  
 Erura plogone obfissa quomodo cu-  
 rantur 916.14  
 Erura altera affe, reliqua est fiant  
 condon 915.4  
 Erurum matrona administratio 176.  
 62  
 Erura fixa extensio, quando accidit  
 308,  
 Erura erura 246.44  
 Erura autem quae 805.21  
 Erura autem, et temporum insensu  
 941.34  
 Erura, erura ambulationis 210.40  
 Erura, erura 401.21  
 Erura non caritatem asfringente  
 39,  
 Erurallus a vitro matine 165.  
 2  
 Erurallus tunc cur non factus sit o-  
 mnis spherion 267.14  
 Erurallus humor cur rotundus fuit et  
 oblongus 77.7  
 Erurallus humor principalissimus ut  
 fuit instrumentum 252.43.265.10  
 41.62,  
 Erurallus quid 1165.19  
 Erurallus videtur in vitro, utati  
 spherion sensibile in aqua 165.  
 32  
 Eruriforme 1165.18  
 Erura consideratio 1166.60  
 Erura extensorum muscularum diffinitio  
 353,  
 Erura masculus 941.10  
 Erura proventus duo 217.8  
 Erura, erura consideratio 1167.4.  
 61  
 Erura in columnis proventus 1171.  
 14-15  
 Erura quid 1166.10.202.61  
 Erura radio subest 1166.61  
 Erura fuit uina 1016.60  
 Erurum, erura, erura, erura, si  
 non celeriter perficiatur ac digeratur,  
 in succum lrisibus unentis si-  
 mitem concurrens 410.34  
 Erurum in facilius 1104.1106.7  
 Eruribus semen quomodo reponatur  
 in hyemem 179.2  
 Eruribus vel colapymbis facilius  
 1088,  
 Eruribus ut et facilius 179.20  
 410.16,  
 Eruribus fuit et eraci affixa, ruel-  
 lit a naribus sanguinem 167.  
 24  
 Eruribus ista, praecipui aliteris con-  
 grui 1066.5  
 Eruribus adnotata, dolorem in sola statu  
 erurum solus 913.12  
 Eruribus eraci adnotata, capitis sicut  
 dolores 927.61  
 Eruribus cur inuatur 940.47  
 Eruribus cur ad mammae affiguntur  
 libid. 61  
 Eruribus diversis partibus adnotata,  
 quas fluxiones reuolunt 941.  
 6  
 Eruribus quando effigenda accipit  
 1105,  
 Eruribus sanguinem a parte reuolunt,  
 atque ad ipsum, si sit opus, attrahunt  
 941,  
 Eruribus sunt purificatione adhibitis,  
 excitatis caloribus 711.15  
 Eruribus fluidi dissimulatio est idonea  
 946,  
 Eruribus hypochondriis affixa, seu  
 gaus ad nates impetum reuolunt, in  
 medullis ex utero effluunt  
 1000,  
 Eruribus quando utrumque 945.55  
 941.8.1000.14,  
 Eruribus adnotata esse dolentia  
 triculo monet Archigenes 215.1  
 11  
 Eruribus ambibus adnotata, uerit da-  
 lere sedat 77.19  
 Eruribus in capite effluunt quando  
 intendunt 1106.56  
 Eruribus intendunt in effluunt da si  
 1106.56  
 Eruribus facilius 1091.44  
 Eruribus inuatur, uerit et eraci ma-  
 roni apparet eruribus causa 117.21  
 Eruribus facilius 1091.51  
 Eruribus inuatur fuit animaliter erura  
 950,  
 Eruribus corporis uniuersi reuolunt  
 melancholus sanguinem 1174.55  
 741,  
 Eruribus inuatur terit speciei 741.  
 01 20  
 Eruribus quae indicunt 1106.55  
 Eruribus 1106.55  
 Eruribus quae sufficiunt 1106.57  
 Eruribus adolefcentis ualido uerbo cur  
 repon exemplum 636.1  
 Eruribus scopus 111.11.214.1  
 Eruribus totus summe in quibus sit fite  
 1005,  
 Eruribus partem illam ad ueneratib  
 fite 945.15  
 Eruribus per contraria molenda est  
 716,  
 Eruribus pro partem differentie uariet  
 946,  
 Eruribus morbos necessaria est corporis  
 naturae cognitio 840.52  
 Eruribus per acclia, delecta et pla-  
 na, consideratio 111.64  
 Eruribus uerit, et tenet corporis habi-  
 tum 117.19  
 Eruribus fite per fite 915.14  
 Eruribus quae dunt 657.3  
 Eruribus circa oculos motus, consert aperit  
 diu ac claudendi oculis 117.51  
 Eruribus densa quomodo relaxanda 454.  
 12  
 Eruribus frigida et humida quibus sit 11.6  
 Eruribus gignenda ratio 115.17  
 Eruribus benignis temperatissimi est regula,  
 seruandam quam omnis diuiduatur  
 1052,  
 Eruribus in regione temperata, similitudinem par-  
 tem subiectam naturam producit 57.  
 64  
 Eruribus lacere in abscessibus medicatio  
 911,  
 Eruribus lara quae reuolunt 454.19  
 Eruribus media, quibus non esse debeat 441.  
 57  
 Eruribus omnium inuatur pars 623.51  
 Eruribus operimentum commune eruribus  
 250,  
 Eruribus per quibus subdita 114.56  
 Eruribus quare producta 114.58  
 Eruribus quaterne de fite 415.1  
 Eruribus fite, similitudinem fite fite inuatur  
 afflate 501.5  
 Eruribus fite ad generandos pilos idonea  
 libid. 30  
 Eruribus fite et quae perit, reuolunt non po-  
 terit 111.14  
 Eruribus fite, ut fite perit 407.12  
 Eruribus fite affe, quibus eruribus po-  
 terit 111.17  
 Eruribus fite, quibus eruribus fite  
 parit 714.10  
 Eruribus, tunc est instrumentum 44.17  
 Eruribus tenet animalis 117.9  
 Eruribus uerit maxis in homine temperat  
 est extremum media 44.15  
 45,  
 17  
 Eruribus caput comber dote libid.  
 Eruribus o 117.4  
 Eruribus inuatur in uerit fite fite caput  
 diu quomodo prober 117.9  
 Eruribus et parit inuatur fite fite  
 in uerit 64.14  
 Eruribus multi eruribus fite fite fite fite

ad solvendum ducen 170,26  
 cydationem & strabonem faciem asser  
 uendi ratio 1096,19  
 cydationem strabonemque faciem duc  
 asseruat com melle coctis, formati  
 ex oculi uentriculo robur 384,19  
 Cypri facultas 1092,7  
 cysti facultas 1092,16

D

ΔΑΜΟΝΙΟΥΣ 314,46  
 Δαπνός herba uires 1077,15

Dauci semina quam habeat facultatem  
 Ibid. 1

DECIDENTI AE tres motus 95,30

decidentia sit præter voluntatem 95,44

Decimissipimus ordo, altero qui à decimo-  
 edano sit, longè fortior exitus, 614,27

decimissipimus index est uigessim &  
 uigessimiprimus, magis tamen uigessim  
 613,11

Decimatio in pleuride quando adsit  
 619,39

decimationis morbi argumenta 622,14

decimationis optime, qui passus 642,6

decimationis tempus quod 614,42

decimatio quid 622,16 717,10

Decidia amica propriam quietatem in  
 aquam transmutant 401,53

decoctionem omnem, quocumque coquatur, semper  
 per se ipsam euadit Ibid. 46

Decurritoria tempora tria 610,5

decretoriorum proportio semper est sex-  
 uanda 615,45

Decubitus in alterum latus commenda-  
 tur 100,15

decubitus supinus datur, et cur 100,12

Deficere ab optimâ constitutione, tribus  
 de causis contingit 466,9

Deficere omnia uelle, ad sobrietatem per-  
 tinet disciplinam 515,11

definitio duplex, substantialis & nomi-  
 nalis 813,23

definitio essentialis quid 517,7

definitio ex fine constituta, non ex  
 quibus parient ambiguitates 359,34

definitiones sunt rerum non nominum  
 510,64

definitiones tot sunt, quot res 512,2

definitionibus non opus est in rebus no-  
 minis 516,22

definitionis optime usus 813,29

definitio nominis quæ dicitur 516,39

definitio non prima, generis duo, notio-  
 nis de uideretur atque essentialis Ibid. 29

definitio rerum quæ in generatione con-

sistunt, quæ habeatur optima 517,64

Deflexus unde in uentriculum accidet  
 689,38

Deglutendi difficultas unde 752,54

Deglutire cur facilius quàm uocare 81,13

Deiectionem ciborum celerrimam quæ sequi-  
 tur 667,15

deiectione quando uidentur 456,54

deiectionis intermissio fit præter  
 uoluntatis imperium 689,1

Deletio manus ac delapsus differunt 95,45

Delectatio & dolor quibus sensibus ma-  
 ior, minor adsit 672,19

Delectatio genere quæ sit 58,49

delectatio humane nature quæ sit  
 103,7

delectatio quæ præterfaciendo emittit,  
 quomodo ab illis differat, quæ sua  
 frigidiitate extinguant 103,6,53

delectatio, tota substantia 1061,11

delectationum genus primum 38,62

delectationum genus secundum Ibid. 64

Delecta gratissima quæ antiquissimum le-  
 galitatem impuente reliquerint  
 1000,61

Delictis exulceratis particula quid sit  
 molenda 1172,53

Delictura ulceribus quid sit adhiben-  
 da, & quando soluenda 1171,1

Deliqui animi à mutatione immo-  
 dicatorio 965,10

deliqui animi ob sudores, curatio 966,3

deliquium acini patientes ex fume insi-  
 gu, quomodo reuocantur 1251,13

deliquium animi quæ inducere possunt  
 965,11

Delirantium spiritus magnus sumit &  
 rursus 497,4

Delirium ex seipso transverso oritur, quid  
 762,9

delirij causa 69,55 762,7

delirium ardorem febrium quomodo fiat  
 742,47

delirium à seipso transverso oritur, quo-  
 modo à pleuritide distinguitur 762,46

delirium in astusibus febribus cur acutis  
 487,53

delirium quid 666,15 683,13

delirium quod cerebrum affectum sequitur  
 603,19

Delirium 401,17

Delirium affectu humiditas 70,15

Demetrius 648,14

Demongstrationem duo principia 368,13

Dens carinis hominis atrique unius in-  
 est 274,14

Densitas unde oritur 451,7

densitatis aliterum una causa, prioris  
 tionis defectus 402,11

densitudinis meatuum exiguorum causa  
 905,47

densum quid 442,5

dente exempto quæ remaneat alba a-  
 liquid doloris 122,12

dentes à quibus fauente humoribus  
 Ibid. 61

dentes argentei & mercuriales, quod li-  
 quet ex illis qui sunt exempti oppo-  
 nit 122,14

dentes canini 114,7 274,17

dentes confirmans remedium 1219,14

dentes dolentes quid frangat 1074,16

dentes dolentes & pulsant 122,79

dentes duobus effectibus sunt obno-  
 xij 122,7,49

dentes firmantia ex Arctigine 1219,49

dentes iuxta 114,5 274,10

dentes iuxta plures duplo sunt cau-  
 sis 274,50

dentes inferiores superioribus per omnia  
 æquales 274,41

dentes interdum inflammatione simile  
 quidem perperamur 122,7,33

dentes in utroque maxilla sedem 114,4

dentes maxillæ superiori infusi, termi-  
 nantur in his radicibus ad artem  
 114,10

dentes maxillares quini 114,9

dentes molares 114,14 274,16

dentes molium nervorum cerebri paria  
 per tantum 114,18

dentes præseruanda contra erosione  
 122,9,65 632,62

dentes prominentes exteri duntaxat 122,9,37

dentes quoque superiores distinguant 110,39

dentibus cur inter ossa cetera, sibi su-  
 perius molli tribuitur 110,37

dentibus extrinsecus citra dolorem reu-  
 da 122,60

dentis formis processus 121,31

dentisfractio ad omnia gingivarum &  
 ossa ultra faciem 121,37

dentisfractio optimam 1219,39

dentisfractio 130,29

dentitionis puriorum congruentia mul-  
 camenta 1219,56

dentium affectu ex redundante, hanc  
 huius est fortissimi 1217,35

dentium affectu sensibus sensuaria,  
 quibus medicamentis curantur Ibid. 56

dentium affectus ex inopia sensibus ar-  
 dus ritus 1217,14

dentium





ponit	613,53	202,	34	dispositiones rhematicae plures in-	
die septimus, apud de decretorios	607,7	digitum masculi	155,15	lesum Romae	1150,14
51. 608,33.	615,14	digitum ossa cor comitum quadru-		dispositiones simplices per se sunt no-	
die septimus regi affluetur	609,4	triflexi, intus vero nequaquam: su-		scende	630,17
die sextus postumus decretorios	607,7	ut atq; in lateribus	198,16	Difficili ratio	122,11
52.	615,17	190,	30	Diploma, inimica et inimica no-	
die sextus quando maligior sit septima		digitum quatuor pedu motum obliqui		64,	47
608,	39	masculi qui effluat	160,36	Diffinitionem notam respiratorum cau-	
die sextus tyranno affluetur	609,6	digitum singulis propriis inest mascul-		sa	498,15
die tertius et quantus qua ratione de-		lus	101,7	Diffinitio princeps pulsus pars, pluri-	
cernant	610,19	digitum tendens univrsi	100,3	moni; ad praesagendum conuenit	
die tertius, principium est decernationis		Diffinitionem aeternam esse promittit fem-		542,	42
acutis	615,54	dam securitatis	115,55	diffinitio ad cubum corporis cauitate ar-	
die aegritudo cor nigrescentino magis		Dilatari facile possunt nulla curia		sumenda	545,46
decrut	614,10	675,	1	diffinitio magna que sit	548,60
die nigrescentis fci finis trium septimana-		dilatatione arteriarum attrahitur spiritus		diffinitionis arterie univrsi et contra-	
rum	613,63	606,	15	dictio sunt imperceptibilis esse	
die nigrescentis quos morbos inducit		dilatationis arteriarum quantitas, ingenti et		549,	11
611,	14	septem: pulsuum differentias comple-		diffinitionis arterie quatuor generales	
die undecimas, decimiquarti est index		ctus		sunt differentia	586,11
619,	43	536,17		diffinitionis a sanguinis copia, curatio	
die nigrescentis plures absolute fuisse sa-		dilatationis arteriarum triplex usus	35,1	931,	56
lis morborum indicationes	614,	31		diffinitionis contradietionis arteriarum	
15		Dimensiones corporum sunt tres	510,35	usus	587,44
Diffinitionem interdum accipiuntur pro		Dimidium facti, qui bene corpus, habet		diffinitio spontanea unde accidit	931a
generibus et speciebus	511,52	799,	35	44	
diffinitio in acum pulsuum indicat, que		Dimittit quid motus	711,42	Distinguerenda que per se, et ex acciden-	
que sunt	519,50	Diocles ait dimensionum facultates sola		ti dicuntur	59,18
diffinitio generis quibus possit accom-		experiri nota esse	368,10	Distributio alimentum quomodo fiat	78
modari	533,17	Diognes Cynicus libidini dedit operam		78,	142,31
diffinitio nomen unde sit dictum		775,	33	distributio humoris urinx, unde per cor-	
534,	15	Dionysii tyranni inclementia	166,60	pus fiat	19,14
diffinitio nullius alterius esse potest, quod		Diophantus medicamentum ad scorpioni-		distributionis ratione misceatur astrin-	
per se et scilicet consistit		um et phalangium idus	128,7	gentibus medicamenta contraria dis-	
555,	53	7		positioni haemorrhoeae	114,4a
Diffusio corporis duplici modo	782,	Difficiliter fugiunt Galenus	1019,		
21		33,	1109,57	46	
Digerens Alexandri	1181,7	difficilis et adlyone tradidit hylarum		distributio virtutis quid	145,14
Digerentia medicamentis que fiat	1214,	plentum	1075,13	Duxis quid	356,41
11		Difficilis medicamentis compositis du-		Dixitum prima finis qui sit	424,63
digerentia que	1168,40, 1206,39	plex, quatuor utraque, crudis et apta		dictum et propositum mollioris cau-	
digerentia uolenter que	1214,17	459,49,	481,4	sa etiam malorum	645,50
digerentibus quando utendum	943,5	Diphryges quatuor vires habet	111,13	Dixitum medicamentis que	1057,60
1182,	49	Dipsan qualitas	1077,35	duretica praesentia, crudis et non	
digerentibus soli quatuor utendum ad		dipsan suum infert interpergabit	1273,	utilia	459,14
oris inflammationes	1211,13	49		duretica qualis esse debeant	836,1
digerentia Asclepiades vires et compo-		Disceplina omnes unde carperint negli-		Dixitum	1216,3
sitio	1182,12	gi	645,16	do doctrina a finis notione quo	
digerentia Alexandri vires et compo-		disciplinarum studia plurimum ad ad-		do primum exposita	811,11
sitio	1182,7	piscendas virtutes possunt	424,11	doctrina defunctus utitur Galenus in	
Digestio minoris assidua ventris deie-		Difficilis qualis in principio adhiben-		te medicinali	1181,14
ctione	478,39	da	1124,14	doctrinae genus optimam quod	932,7
digestio ciborum symptomata, sym-		difficilis minoribus cur sit in principis		doctrinae ordinata tres	111,5
ptomatumque eade	686,18	utendum ubi digerere conuenit		doctrinae que per rerum elementa infi-	
Dignus eruditione artium in pede, qui me-		1134,	18	nitur, alii omnibus utilior	444,
suu sit	160,41	Dispositio effluat que	463,32	50	
digni singuli cunctis tribus assiduis	137,	dispositio que sunt	1217,18	doctrina, una voce explicata optima	
46,	197,50	dispositio seruitur, car semper sunt		170,	57
dignus quadriflorum mounidis, quadri-		misenda conuenientia	979,47	Doder adlyon fuit incertum secundum	
florum applicat tendones	199,	dispositio eadem quod sit augenda		1181,11	100,45
53		817,	23	Dogmatici et Rationales utuntur ratio-	
digitum aetiones omnes per tria ossa		dispositio que vehementissime calida		ne	649
complexus	198,35	sunt, in quibus sit usus concordia		dogmaticorum obidictiones contra metho-	
digitum fieri unde	95,16	libid.	11	duos	8,11
digitum utraque ad quid conducit		Dispositio composita que sunt	534,	Delubris meritis fons cum filij	
		53		276,	51

## I N D E X.

- dolibus suis similes horis si videtur esse  
 species phlogistica 377, 12  
 Dolorem corpus idem patibile et  
 fibile 34, 3  
 dolorem sui sensus et alterationis ca-  
 pax, necesse est 31, 48  
 Dolor ab inflammatione hepatis, quid  
 73, 4  
 dolor artus et vena, qualis 714, 12  
 dolor capitis nullus ad humiditatem con-  
 sequitur 1197, 19  
 dolor calicis nephriticus, circa princi-  
 pia, eodem fecit mediam desiderat  
 769, 9  
 dolor, dum partem metatur temperis,  
 fit 61, 17  
 dolore affligente praestat omnino ad-  
 ditionem malum non longere 1109, 3  
 dolore extensio quae partes afficiunt  
 731, 53  
 dolorem nec faciat, nec humiditas pro-  
 pria ratione infert 672, 11  
 dolorem quae mingens 916, 18  
 dolorem qui humores maiorem, et qui  
 minorem inferant 712, 17  
 dolor tot quibus à pulvere sanguis e-  
 ruptus, non infertur 714, 11  
 dolores articulares à quibus gignuntur  
 humoribus, quae notae indicant  
 1161, 9  
 dolores inflammationem reddunt respi-  
 rationem inaequalem atque inordi-  
 natam 497, 10  
 dolores intersternales à crassius facis pro-  
 ductis, quae ratione emendati sunt 912, 16  
 dolores oculorum et aurium, quae ratio-  
 ne leniendi ibid. 17  
 dolores acuti nec doctores, nec calidiores  
 tantum extrinseca sedantur 978, 16  
 dolores singuli, partem afflicti ostendunt  
 717, 18  
 dolor hepatis, viscosa corpora in conser-  
 sum adducit 714, 43  
 dolor à phlegmate metallis aut acrio  
 excusio, quod moderatur 1166, 28  
 Dolorisum et incendium quid 714, 2  
 dolor mitigando est amplius opinemur  
 912, 63  
 dolor inflammatione exasperat, fluctu-  
 at, huiusmodi occasum praebet 1191, 4  
 837, 17  
 dolor inflammationis vesicalis unde ac-  
 cidit 731, 15  
 dolores à flatulentia spiritus ori, curatio  
 912, 1  
 dolor à mordente humore articulo, curatio  
 ibid. 4  
 dolor à spiritibus crassis in ventre eductis,  
 curatio 977, 64  
 dolor à tenui acrio humore excitatus, cu-  
 ratio 933, 18
- doloris causa inaequalis interperentia  
 651, 10 771, 23 931, 27  
 doloris celici cui ventris sui fibrae curatio  
 931, 41  
 doloris expugnandi ratio duplex 926, 4  
 doloris finis unde posuit indicium sumi  
 654, 10  
 doloris species prima, sunt duae 731, 56  
 dolor lateris excolit respirationis opera  
 86, 48  
 dolor maxime profusus irritat, tum pble-  
 guonae auget 861, 27  
 dolor membrorum ambientium ossa,  
 quibus 734, 9  
 dolor pulsantis neque in peripneumonia,  
 neque in pleuritis oritur 711, 26  
 dolor pulsantis quae inflammationes se-  
 quatur ibid. 41  
 dolor pulsantis quae partes primario af-  
 fectus molester, et quae per consensum  
 ibid. 43  
 dolor punctivus pertinet ad membranas  
 734, 31  
 dolor punctivus ubi consistat 731, 63  
 dolor quid indicat symptomata 682, 19  
 dolor quando fiat 679, 56 350, 13  
 dolor quid 730, 42  
 dolor quid indicat 817, 42  
 dolor sanguinem trahit 991, 40  
 dolor sensus quando accidit 714, 36  
 dolor terribilis quid 731, 14  
 dolor ubi urbenentis infertur 731, 53  
 dolor urbens aures excolit 961, 10  
 dolor ulcerosus et pruriginosus 734, 15  
 dolor unde exoritur 1101, 11  
 Domes excreta puris quid non esse  
 debeat 441, 18  
 Dormientes non omnino sensus experient  
 100, 39  
 dormire non posse à dolore, nec cause nec  
 supponi comendationem 451, 51  
 Dorsum spindylis singulis, septem infert  
 productiones 1181, 57  
 dorsum vertebrae consideratio 1151, 17  
 dorsum duodecim constans spindylis  
 126, 18  
 Dorsum quoniam facilitatem habet  
 1077, 18  
 DRACHMA nota quae fit 1291, 13  
 drachma constans scrupulis tribus 1190, 19  
 drachma et denarius Romanus est ulen  
 1252, 30 1100, 16  
 Draceni marini trigle, et aliorum id  
 genus animalium facultates 1142, 3  
 Dracunculus 390, 52  
 Dracunculus 604, 57 1077, 32
- Dryas serpentis aures 1273, 42  
 DUCIS et imperatoris opera quae  
 167, 2  
 Dulce calidius austerius 1044, 17  
 dulce à moderato calore provenit  
 1041, 68  
 dulcedo est communis omnium quae mi-  
 nuerunt 1046, 26  
 dulcedo omnis à temperato calore ori-  
 nit, ut asstringens à frigore 1119, 50  
 dulcedo sola nutrit 1046, 47  
 Dulcis ad calidius utrigit, unde sunt  
 natura 381, 19  
 dulcia proxime accedunt ad naturam  
 rerum, quibus talia videntur 1044, 4  
 dulcis quae dicuntur 1020, 10  
 dulcis valde, valde calida sunt 1041, 60  
 dulcibus interfecti non itur non licet  
 918, 47  
 Dura ad apertum aptiora 123, 22  
 durum multum est frigidum 1041, 60  
 dura et frigida consiliosa, ut omnia 867, 32  
 dura et molli quae 351, 17  
 dura, asperam repellunt cutem ibid. 42  
 dura quae dicuntur 551, 1  
 Durities arteriarum tantis inde accidit  
 766, 30  
 durities est qualitas tactus 351, 60  
 durus quibus modis atque fit 1052, 57  
 durum et molle quot modis dicuntur  
 1052, 36  
 durum quid ibid. 50  
 DYSPHYGES quibus ulceribus  
 comitantur 1170, 15  
 Dysenteria ab atra bile incipit, morbi-  
 fra 803, 6 128, 65  
 ex Dysenteria à fluxu oris bile plerique  
 fermentat 80, 38  
 dysenteria causa 704, 22 725, 1  
 769, 10  
 dysenteria et sanguinis eruptioni quae  
 comitantur 1106, 2  
 dysenteria qui visus comitantur 931, 52  
 dysenteriae symptomata quae procedunt  
 712, 54  
 dysenteriae visus ut quibus intestinis fit,  
 quomodo discernatur 769, 16  
 dysenteria gravissima, curatio maxime  
 medicamentis mordentibus 926, 3  
 dysenteria hepatica 721, 56  
 dysenteria oritur ex intestinale ulceri  
 690, 19  
 dysenteria quid 725, 32 769, 9  
 dysenterias quid perscrutentur 1068, 21  
 1074, 10 1077, 34  
 1078, 1 1087, 28 1088, 6  
 1084, 10 1121, 30 1151, 48  
 O O Y

# EPITOMES GALENI

1136,60. 1140,17. 1145,  
16  
dysentericis epibema cōmodum 1164,  
46  
dysentericis remedia Andromachi 1163,  
38. Asclepiades 1164,15  
dysenterici auri qui 1163,32  
Dyspeptica ultra que dicuntur 1154,  
15  
dyspepticis medicamenta congruentia,  
eorum facilius diffunduntur 1169,  
35  
dyspepticores differentia ibid 5  
Dyspnœ causam inuestigatio 755,  
60  
dyspnœ remedia Andromachi 1147,  
56  
dyspnœ remedia Asclepiadis ibidem  
33  
dyspnœ est respiratio laesa 489,  
43  
dyspnœ ob refrigeratum calorem na-  
turalem, qualis 493,36  
dyspnœ ob solum ardorem producta,  
qualis ibid 18  
dyspnœ simplex que sit dicenda, et  
que composita 490,7  
E  
EBENIUS 1078,7  
ECHINOMATA 708,10  
ecchymosis curatio 862,19  
ecchymosis quid 855,47  
echini brachia ut 1080,33  
echini marini caro 402,55  
echini marini vis 416,12  
eclogia deputationum 1157,41  
ELEGANDVM est sobrius et salubri-  
ter 423,18  
educatio optima quibus paratur 415,  
54  
EFFECTVS nullus absolutus in arti-  
bus humanis, nisi causæ conspirant  
omnes 695,8  
efflatio arteriarum asperæ ætatis 250,25  
efflatio, inspiratio violenta 512,30  
efflatioem que faciant 755,49  
efflatioem strepentem que efficiant  
755,50  
efflatioem contraria urberibus inspira-  
tio 1021,46  
efflatio quid 1021,42. 110,58  
481,59. 645,44  
efflatio quomodo fiat 755,31. 477,  
51. 499,3  
effluuiis puris scilicet facienda est apta  
980,38  
effluuium que corpora maiorem, et  
que minorem patiuntur 317,23  
effluuiis avertenda a partibus principa-  
libus ad ignobiliores 814,15  
effluuiis in molendinis in his alacris, que  
apud expurgari non possunt 816,  
10  
ELEGANDVM 445,6  
ELAPHOBOSCOs quomodo

beat 1079,4  
elatrius vis 1106,17  
elatrius vis 1079,2  
elementa animalium propria sunt qua-  
tuor humores 37,47. 18,1  
elementa constituantur duodecim ex ma-  
teria et qualitatibus 37,37  
elementa corporis nostri mutua inter se  
patiuntur, ac tota per tota misceantur  
37,27. 657,39. 990,4  
elementa corporum que 781,31.  
1115,6  
elementa insunt corporibus facultate,  
non actu 349,62  
elementa nec nutriunt, nec ullam gustus  
que intatem offerunt 1046,42  
elementa omnium gratulabuntur et cor-  
ruptibilia que 345,63  
elementa omnium sunt, terra, aqua, aer,  
et ignis 141,19. 35,62. 38,  
19. 657,43  
elementa propriis eorum meritis 442,8  
elementa que 43,12  
elementa sensibilia sunt similia aper-  
ta 74,74  
elementa secantia sunt ignis et terra  
419,22  
elementa sola absolute dicuntur calida  
frigida etc. 41,61  
elementa uariationum sunt quatuor 101,  
64  
elementa uero plura, tum alterationem ob-  
noxia 24,13. 34,63  
elementa et principia discernunt 34,31  
elementis solum sunt insunt qualitates  
36,2  
elementorum in se iudicem transitus 58,  
53  
elementorum propriorum iudex non po-  
test esse sensus 33,12  
elementorum qualitates intereunt, ani-  
malis preuenit 73,22  
elementorum singulorum quiddam simi-  
le in actionem corporibus repe-  
ritur 53,44  
elementorum substantia, ad propria re-  
uertuntur, elementa, animalia pre-  
uenit 37,10  
elementorum usus immoderatus ad inte-  
rionem ducit 36,63  
elementum corporum, non est unum  
31,26  
elementum non potest esse imparabile  
34,13  
elementum purum nullibi reperitur 351,  
30. 1008,18. 1913,7  
elementum quid 33,9. 741,58  
elementum, quod corpus dicitur 36,  
58  
elementum semper aut excipit corpa-  
ri aut apponitur 36,60  
elementum si uiri animum perat, perit et  
animal 36,54  
elephantiasis cōducit superat et 983,4  
elephantiasis incipit medicamentis egre-

ghum 1125,58  
elephantiasis in Germania rarum 983,  
6  
elephantiasis que purgationem conferunt  
983,8  
elephantiasis 663,11  
elephantiasis ab atra oritur bile 703,  
46  
elephantiasis curatio 1144,16  
elephantiasis in Alexandria plurimum  
inueniunt 983,4  
elephantiasis uirum prodesse tanquam  
maius, ac per eam resistat 318,  
28  
elephas, qui sit effectus 687,63  
708,19  
elephas nascitur propria substantia depo-  
nit in aqua, et nascitur ab illa sibi  
aliquid assumunt 363,49  
elephas arimoniam deponunt 1156,  
26  
EMOLLIENTIA debent esse em-  
ollientia 1056,42  
emollientia et per momenta quomodo  
diffunduntur 1054,46  
emollientia que 1054,60. 1056,15  
emollientia quibus committuntur 1053,  
36  
emollientia recentia, praesentia 1056,  
19  
emollientibus rursus insunt putrefactionem  
quid 1166,28  
empedocles opinio resiliunt 116,64  
empiricus hinc et pinacem ducunt de  
bet uim 1079,18  
empirici cur similia tentant medicamen-  
ta committunt 1164,34  
empirici dogmaticis discernunt 6,51  
empirici methodicis, quibus inter se sunt  
concordes 12,13  
empirici quomodo uterentur transitu ad si-  
milia 24,39  
empirici sola dicuntur experientia 6,7  
empirici suae inspectionis confirmant res  
species 6,19  
empiricorum argumenta contra metho-  
dicos 8,11  
empiricorum ars quid 848,1  
empiricorum artem imitatrix insistentia  
maius constituit 6,18  
empiricorum historia inuenit 14,1  
empiricorum methodicorum, in Ratione  
audet obediunt 12,4  
empiricorum propria 12,6  
empiricus qui sit uocandus 843,59  
emphatica que 1216,55  
emphatica oppositum quide 1057,10  
emphaticorum essentia qualis ibi 5  
emphaticorum natura duplex 1041,42  
emphatica res sunt per linguam collo-  
cunt 1158,49  
emphatica Alkimienis compositio et u-  
sus 1177,51  
emphatica Alkimienis compositio et u-  
sus ibi 28  
emphatica uandis Galeni facit  
1151,14

## I N D E X.

- 1151, 34  
emplaftri ex ebulliente Aflepiadis  
uires & compofitio 1175, 21  
emplaftri ex ebulliente compofitio  
1152, 43  
emplaftri ex felibus compofitio & u-  
fus 1177, 43  
emplaftri Mubetronis facultas & com-  
pofitio 1181, 15  
emplaftri Mofchionis compofitio & u-  
fus 1159, 48  
emplaftri pōmici facilius 1150, 56  
emplaftri pyracanti compofitio 1159, 23  
emplaftri Serapionis compofitio & u-  
fus 1180, 12  
emplaftri Scribonij largi uires & com-  
pofitio 1175, 16  
emplaftri Tberlemis uires & compo-  
fitio 1159, 44  
emplaftri uiridis Andromachi uires &  
compofitio 1177, 63  
emplaftrum melinonem & uiridum di-  
firum 1152, 2  
emplaftrum ex coricis 979, 22  
emplaftrum ex diadama ad malum uale  
1177, 5  
emplaftrum ex Ladano 1159, 28  
emplaftrum Malui ex fimpole 1177, 32  
emplaftrum Hygieni multi ufus 1158, 35  
emplaftrum melinon Andromachi 1181, 10  
emplaftrum melinon Heraculi 1181, 17  
emplaftrum melinon Menuri 1181, 23  
emplaftrum melinon Serapionis 1181, 23  
emplaftrum rufum Galeni 1181, 54  
Empyftoras quid 716, 15  
Emergentis uires emplaftri 145, 53  
E N A S M O N 1181, 10  
Enemon nigrum Hæc 1161, 33  
Enardrofu quid 121, 56  
Encanthis 709, 58  
Enterocles generatio 661, 53  
Enterocles quid uirtut 109, 58  
Emula compofitio 1079, 7  
E P H I M E R A cum habent infe-  
ftia ab illece originem duxit 957, 65  
epibemeræ cui aqua fit interpitid propi-  
nanda 807, 2  
epibemeræ cum quibus tri crebrombus de-  
finant 905, 33  
epibemeræ funt nulle putredine interce-  
derent 714, 13  
epibemeræ interdum à fungulis callo  
oriuntur 706, 44  
epibemeræ oriuntur à procacitate caufa  
oriuntur 715, 15  
epibemeræ fuperuenientes hemorrhis uir-  
gum, quemodo à putredine differunt  
784, 28  
epibemerarum calor efl perperius fuitus  
785, 30  
epibemerarum caufe 781, 14-955, 54  
epibemerarum caufa, contraria funt ad-  
molende 957, 59  
epibemerarum curatio 955, 63-957, 23  
epibemerarum incitatio accidet cum fu-  
dore uirtute 785, 38  
epibemerarum pulfus & urina quid  
785, 31  
epibemeræ à denfata cute difcendi na-  
tio 957, 11  
epibemeræ ex triftitia et folitudine in-  
ducit extremum corporis 956, 47  
epibemeræ fi moritur in putridum quibus  
diagnofte inducitur 786, 1  
epibemeræ ex inflammatione inguine,  
que accidit 957, 14  
epibemeræ in illis ratio conuenient 957, 32  
Epicrofti quid 904, 39  
Epithymides in faminarum triftitibus  
maxime obferuat 304, 2  
epithymis que uocatur 112, 20  
epithymis r alix ac principium uaforum  
femininum 314, 45  
Epigaftri mufculorum opus 101, 22  
Epiglotidis corpus 246, 22  
epiglottidis fiffura & uentriculi 246, 7  
epiglottidis fubftantia, magnitudo & fi-  
nes 247, 64  
epiglottidis ufa 181, 54  
epiglottis fua ligula, ad uocem & fi-  
rnes eductionem neceffaria 246, 3  
Epilepfia aliquando oritur à uiciniis  
743, 59  
epilepfia confiftit in cerebro 740, 40  
epilepfia caufa 740, 41-741, 38  
246, 63, 9-661, 25  
epilepfia obnoxij uocandi funt ex cru-  
ritus 998, 16  
epilepfia tres differentia 744, 12  
epilepfia quid 666, 1-676, 7-  
777, 10-740, 34-750, 21  
Epileptici inter uiris uicinia funt purgan-  
di 1005, 12  
epileptici plerumque melancholici funt, et  
à conuerfo 743, 9  
epileptici abftinentiam efl à lauariis  
1006, 1  
epileptici que carnes conueniant  
1007, 1  
epileptici qui fructus conueniant  
1006, 1  
epileptici puero quod prandium fu con-  
ueniens 1181, 6  
epileptici puero uicinis ratio conueniens  
1005, 14  
Epimeri facultas 1079, 45  
Epythides 709, 11  
Epythides largiunt 280, 43  
Epythides rati & alne, que committit-  
nae corpo 206, 24  
epiphyfis uicinis fimilis 256, 65  
Epythide 709, 27  
Epythos quid 779, 14-22, 13  
Epythymis 1079, 42  
epithymum atrum bilem purgat 127, 4  
14  
Epoche 3, 31  
Epomidi mofuli 118, 13  
Epodes 709, 50  
Epodeta que dicuntur primarij, &  
que fecondarij 1059, 36  
epulotiorum finis quis 1161, 10  
epulotiorum opera 1121, 61-1161, 6  
epu edam Andromachi 1169, 54  
epulotium candidum Telephoni 1181, 62  
epulotium Critonis ex Ladano 1173, 57  
epulotium ex cadonia 1159, 14  
E Q V A non recipit femina humorem  
209, 32  
Equi natura 194, 15  
Equitatione conueniant uicini 445, 64  
equorum hebreas quibus medeantur mor-  
bis 118, 17  
Equus uelocior leone 119, 54  
E R A S I S T R A T V S ne mactem  
fermentum fecit de fanguine detra-  
hente 981, 10  
Erethmi depreffionis, pulcritudinis, uirtutis,  
neceffaria funt illis uicinis corporis  
generatio, quod à putredine uer-  
ficat 304, 31  
Ergoti qualitates 1081, 32  
Errata combufti facilius 1140, 33  
Errantia, putrefacienda & liquenda  
corpus noftum, per rufum dicuntur  
edida 59, 2  
errores que denotant quare uirtut  
medantur 37, 13  
errores uicinis fpecies 1048, 53  
Eroffionis caufe 356, 54-916, 49  
Eroffia 1106, 16  
erofia quibus liquentibus leniantur  
1207, 16  
erofion n alens bilem per uires 1159, 30  
Errores circa ægrem aduifis, producul  
morbum, uel accerfunt morbum 39, 24  
Errores in formatione quo impliciter con-  
fiftit paffus 832, 13  
Errores funt paffus iudicia 328, 50  
error æternus triplex accidet 681, 61  
error benignum conueniens 419, 32  
erratum circa ægrem conueniens, uirtu-  
tem decertare dici obferuari 611, 47  
Errat facilius credidit fpermatice 389, 21  
Errat putrem que habent uires  
1141, 60  
Errat, delitit & phafoli facultates  
416, 3  
erratum, bonum non bonum efl adma-  
1181, 10  
Erratum funt erodit prius efl faui cum  
00 ij

nulle lamen crassos ibi acis humores  
 377,16  
 erumpunt soluti articulos 1105,34  
 Eryci facultas 1080,2  
 Eryngii facultas 1081,34  
 Erysimi facultas 1080,8  
 erysimum sesamo deterius 377,14  
 Erysipelas ex flama erit bile 704,  
 19. 708,4. 79,137. 94,151.  
 970,56. 1103,42  
 erysipelas unde accidet  
 94,4. 53  
 erysipelas plegmonodes quando acci-  
 det 971,1  
 erysipelas plegmonosum quod dicatur  
 707,1. 62  
 erysipelas quid 943,66  
 erysipelas quid à plegmone differat  
 941,1. 54  
 erysipelas quod dicatur 707,47  
 erysipelas furiosum unde accidat  
 944,1. 56  
 erysipelas solius cutis est pufio 971,7  
 erysipelas uerum, in aliquo uisere con-  
 sistens frigida potu sanatur 899,  
 50  
 erysipelati refrigerando medicamenta in-  
 dona 944,19  
 erysipelati generatio 991,4  
 erysipelati curatio 917,35. 944,4.  
 35. 1103,61. 1150,40  
 erysipelati lucente curatio 1150,50  
 erysipelati refrigerandi termini qui  
 944,1. 30  
 ¶ ESCHARAE ingente nathus  
 excoctis sternutatoriis sunt 1115,  
 4  
 Escharam que detrahunt 981,11  
 Essentia cossu paracuta que dicatur  
 111,35  
 essentia cossu rei est principium, à quo  
 ordinandum est ad exellum omnem in  
 quosumum 841,44  
 essentia proprietatis essetis partis indi-  
 cium est 774,7. 732,31  
 essentia rei prius qualitate requiritur  
 549,1. 54  
 essentia singulis accedit ex temperie qua  
 tor qualitates primarum 196,19  
 Esula facultas 1091,66  
 ¶ EVACUATIO inaequalis que fit  
 1004,1. 44  
 evacuatio in tumoribus praeter naturam  
 duplex 944,18  
 evacuationem quando pariter expedit  
 994,1. 19  
 evacuationes proprie per loca sunt, in  
 quibus evacuantur 891,1,33  
 evacuationes subita ac uulsa, quid ca-  
 uenda sunt 964,11  
 evacuationis modus multiplex 819,30  
 evacuationis species 813,41  
 evacuationis corpus que sunt prius consi-  
 deranda 971,57  
 euasura morbum sterfordi pertransit

illis tempora uideri solent 64,49  
 Eucrasen quod dicendum sit 1031,13  
 Eudicere quid 163,10  
 Euphorbi quod dicatur 316,61  
 Euphorby qualitas 1080,25  
 Euphorby 1104,10,1189,63  
 euphorby uis eius euasit 1163,46.  
 1207,1. 59  
 euphorbum ad punctus tendens fuit  
 1163,1. 42  
 euphorbum receptis cordibus, pallidus  
 autem inueterat 1207,61  
 euphorbum satis recentiori est inferius  
 1166,1. 39  
 Eupipides in Medea ait tres fuisse ani-  
 ma facultates in beneuolentibus  
 317,1. 3  
 Eupipides qui necessarii sunt 49,144.  
 431,1. 56  
 ¶ EXACERBATIONIS. quarta  
 nis, quod medicamen conferat 715,  
 47  
 Exanguia omnia, sanguine praedita fri-  
 gida 48,12,13,53  
 Exanthemata medicamentis resistenti-  
 bus indigent 822,13  
 Exanthemata quid 1042,13  
 exasperatio & leuitas quibus de cau-  
 sis contingat 663,27  
 Excoctio facta inueterat calorem remou-  
 eat & densiorem reddit respiratio-  
 nem 504,62  
 Excessus corrigendus per contrarios ce-  
 cessus usque paratione 463,11. 466,  
 1. 889,37  
 excessus diffolunt uires 415,10  
 excessus immoderatus omnis, consensu in  
 habitudine ad aliquid 64,16  
 Excoctis medicamentis 116,60  
 excoctis modis pectoris quid conferat  
 1082,60. 1091,10  
 excrementa alii quae esse debent 61,3.  
 51. 615,13  
 excrementa alii quibus de causis suppon-  
 untur 416,48  
 excrementa à quibus causis mouentur  
 680,1. 19  
 excrementa cerebri crassiora, per que  
 instrumenta excoctur in uasi me-  
 dia 118,19  
 excrementa corporis duobus modis ma-  
 tuentur 778,12  
 excrementa cur interdum citius, interdum  
 tardius quam oportet à natura ex-  
 pelluntur 619,57  
 excrementa cur non plura mor paria-  
 ra, quon pro ratione cibi assumpti,  
 excrementa 688,59  
 excrementa cur sequat pars uis ad al-  
 liam mittere 801,4  
 excrementa distincta in corpore miranda,  
 comparsant 86,16  
 excrementa & uernendi ratio 230,14  
 excrementa fouent calorem praeter na-  
 turam, quomodem ligna ignem

799,1. 18  
 excrementa hepatica que dicuntur  
 767,1. 1  
 excrementa in singulis membris animalis  
 nati, non habent certam praescriptam  
 uiam 416,14  
 excrementa in liberis & pueris  
 delinquentia, expedit transire deor-  
 sum 447,17  
 excrementa nigra quomodo ad atra bile  
 differant 703,5  
 excrementa non trahi ab organis absp-  
 quidatis committunt 229,7  
 excrementa pitui familia in uisibus, glan-  
 dulis in uisibus 771,31  
 excrementa pinuosa conuenit diuidere,  
 incidere, committere & abstergere  
 126,1. 10  
 excrementa putrescentia quos differant  
 meritis 257,43  
 excrementa quomodo accipi contingat  
 797,1. 61  
 excrementa quibus de causis nobis inci-  
 dit excedunt 100,13  
 excrementa quid incidunt 109,7  
 excrementa sanantur, cur flum 226,62  
 excrementa semper e pelluntur à fa-  
 cultatibus ad induriores partes 119,  
 49. 481,34. 661,50. 798,10  
 excrementa à syncretis substantia fuerint,  
 quomodo fiat 436,11  
 excrementa subingredi quomodo plui, &  
 quomodo minus accrescat 587,55  
 excrementa inueterata inueterata du-  
 plex causa 686,57  
 excrementa pellenda uaria organa di-  
 uersis facultatibus praedita, natura  
 insunt 470,3  
 excrementorum alii praeter naturam à pla-  
 ceti species 621,50  
 excrementorum color non magnam ha-  
 bet vim ad officium uicinis induen-  
 dum disposicionem 615,10  
 excrementorum copia uide deprehenda-  
 tur 606,63  
 excrementorum cruentorum quatuor sunt  
 differentiae 690,11  
 excrementorum duo genera 357,50  
 excrementorum expulsi à cerebro ex-  
 pirante inueterat 255,5  
 excrementorum proprietates in regio mor-  
 bo consideranda 761,12  
 excrementorum quantitas respondet 128  
 filiorum suorum 566,19  
 excrementorum species partem efficit  
 indicat 737,16  
 excrementorum suppressio, alio uenit,  
 aut intestinum 436,60  
 excrementorum uacuatio, omni febri est  
 necessaria 911,1  
 excrementorum uires peraguntur cum  
 sanguine, tria genera 686,47  
 excrementorum uis duplex 1104,53  
 excrementorum uis inueterata commu-  
 scopi, uacuatio & alacritas

## I N D E X.

435.  
 exercitatio omnia que exercitatio  
 caret 890,50  
 exercitatio alii inordinata quide non  
 fit 616,44  
 exercitatio ceteri non potuit, sed ma  
 ius 81,40  
 exercitatio hepaticum a dysenteria  
 quod distinguendum 769,41  
 exercitatio infestat aut qualitate aut  
 quantitate 667,49  
 exercitatio in primæ carnis generatio  
 ne duplex 850,56  
 exercitatio singularum partium que  
 bus de casu suppressum 417,35  
 exercitatio sola quantitate alienum,  
 quod sit 689,48  
 exercitatio variam, variis corporis affi  
 ctibus esse ordinatum ostendit 616,  
 4  
 exercitatio ubi tenetur frigidum, ne  
 demeritum putrefactionem signifi  
 cat 615,60  
 exercitatio carnis in uicere a ubi tenetur  
 facientibus exordium 951,19  
 exercitatio carnis qualem requirit medi  
 camenta 863,52  
 exercitatio a calore & a frigore quomodo differ  
 unt 778,19  
 exercitatio naturalis semper sequitur con  
 sistentiam 606,53  
 exercitatio critica græcia præcedit  
 symptomata, ægriæ necesse præbe  
 re 607,51  
 exercitatio humoralis quod sit refe  
 renda 676,53  
 exercitatio prænotare, qui facili possit  
 969, 48  
 exercitatio que in quibus morbis præ  
 cipue expendenda 618,3  
 exercitatio que per se 607,2  
 exercitatio in vapores sensum effugunt  
 256, 59  
 exercitatio & retentionis præter natu  
 ram, casus 779,1  
 exercitatio instrumenta duplicia 102,  
 16  
 exercitatio quibus modis fiat 9,21  
 619,41. 778, 51  
 exercitatio differentia 827,50  
 exercitatio qui superius & qui infer  
 us partibus debent 467,14  
 exercitatio non coarctat, sed adhi creditas  
 uti humorem pluitudo, & cur  
 439,10. 451,61  
 exercitatio acrius facitior sunt 113,7,  
 26  
 exercitatio cur profectus dormiat 675,  
 39  
 exercitatio assidue usum & sensum aut  
 cognitionem concitat 513,55  
 exercitatio cur ante cibum administran  
 da 419,14  
 exercitatio exordium modum, colligit  
 corpus 1005,18  
 exercitatio in actione liberalium studiis  
 418,1  
 exercitatio in particularibus consistit  
 900,13  
 exercitatio corporis exercitatio ani  
 mæ obliuantes antipathia 359,  
 53  
 exercitatio sunt medicæ 417,17  
 exercitatio thoracis sunt respiratio  
 nis & uocis 445,14  
 exercitatio uidentur caput triplicem  
 1005,40  
 exercitatio circa affectionem locorum  
 notum tres modi 710,21  
 exercitatio commodissima tempus  
 419, 29  
 exercitatio duplicia commoda 491,  
 6  
 exercitatio forme scribis utile, unde  
 sunt concludenda 466,45  
 exercitatio interpositum inuolun  
 ta 419,13  
 exercitatio terminus sit alteratio res  
 pirantis 114,3  
 exercitatio omnium actus, infusio ca  
 loris augmentum excitatur 444,  
 19  
 exercitatio emittit pericula & ma  
 la 367,50  
 exercitatio qualitas 444,5  
 exercitatio usus 912,1  
 exercitatio partium sphaera omnes cor  
 poris partes exercit 366,16  
 exercitatio per totam uitam requiritur,  
 ut qui ut perfectus reddatur 421,  
 31  
 exercitatio præparat corpus ad balne  
 um frigidum 911,2  
 exercitatio quando inhibenda 445,14  
 exercitatio qui motus nocet 418,64  
 exercitatio robur augeat, igne solui  
 780,42  
 exercitatio ubi tenetur ex robusta celeritate  
 composita 445,10  
 exercitatio quæ transmittit frigidum potu  
 egredi 413,17  
 exercitatio laetum quide debet esse  
 446,41  
 exercitatio 519,15  
 exercitatio corpus qualem ad aperie  
 rapia expectat frigidum 447,7  
 exercitatio corpus quando latitudinem  
 446,17  
 exercitatio tritum 445,19  
 exercitatio manuum, humerorum 114,10  
 exercitatio moderata quomodo inueniunt  
 pulvis 544,17  
 exercitatio musculorum maxime propria,  
 que 444,41  
 exercitatio post eruptionem que mala pro  
 ducant 477,46  
 exercitatio que celeritate absque robore  
 peraguntur 445,1  
 exercitatio quæ præsentat cibis & me  
 dicamentis inueniuntur 417,60  
 exercitatio robusta sive celeritate 444,  
 31  
 exercitatio notitia, & solida & robu  
 sta corpora ualidiora efficiunt 104,14  
 36  
 exercitatio improbus augeat quidem cali  
 ditatem spiritus aut ualidius absumit  
 492,40  
 exercitatio uicini rationis 444,8  
 exercitatio generis 443,51  
 exercitatio prima genera tria 411,59,  
 444,12  
 exercitatio quoniam citra pulcritudinem, et  
 que minimè possint administrari  
 444,17  
 exercitatio utiliter 30,62. 443,59  
 exercitatio aduocandi alio & uisita pri  
 mi solatis, & solis partibus molli  
 frisione calidus 419,45  
 exercitatio ante cibum mediocre, confer  
 nat corporis temperationem constituit  
 nec 405,46  
 exercitatio ante prandium mediocre, con  
 fert ad somnium laetum 406,1  
 exercitatio molli alio tempore, quod ante ci  
 bum administratur 443,62  
 Exhalatio quomodo augeatur 448,40  
 Exhalatio corpus que sunt 811,17  
 exhalatio quatuor gradus etiam ardent  
 1064, 37  
 exhalatio tres interitus molli miscle  
 la, remittitur autem oleo aut cerato  
 115,6, 50  
 Exhalatio manifesti refert balneum  
 806, 39  
 Exhalatio a plenitudine quomodo curandi  
 966, 12  
 exhalatio ob prauos fuit uentris et infu  
 siones, quomodo curandi 114,43  
 exhalatio a calore curatio 967,3  
 exhalatio a uicini imbecillitate orie  
 curatio 114,55  
 exhalatio ex benedicta puri aut aqua  
 later autem euacuante curatio 114,  
 59  
 exhalatio ob artem affectionem orie, cu  
 ratio 114,44  
 exhalatio ob febrem aut plethoram via  
 gentium, curatio 114,8  
 exhalatio ob interitum dolorem, cu  
 ratio 114,52  
 exhalatio ob uentri præcipui obstru  
 ctionem, curatio 114,27  
 exhalatio ob refrigerationem curatio  
 966, 61  
 exhalatio ob facilitatem facere præ  
 cantio 967,14  
 exhalatio ob uentri, ut imbecillitatem,  
 curatio 966,18  
 exhalatio præter expectationem ob  
 orie, curatio 967,24  
 Exhalatio: qui dicuntur 709,43  
 exhalatio primæ infusionis spiritus cerebri  
 215, 51  
 exhalatio præcessit 114,61



# EPITOMES GALENI

Experiendirationes diuise 1036,33  
 experientia amebodas mitior fortior  
 solius sanguine, non aut ora ordine  
 841, 60  
 experientia fidei inuentarum compro-  
 bat 471,48  
 experientia medicamentorum facultates  
 indicat 1030,47  
 experientia quid 11,64  
 Exprimi que & quomodo medicamen-  
 ta debemus 1031,12  
 Experirelli à sereno cor se descendunt  
 680, 8  
 Expiratio confort ad sanguinis expel-  
 lendum fuliginem 456,14  
 exspiratio cor in forma maior 509,41  
 exspiratio est alioquin remissa libid. 14  
 exspiratio & systole in pueris excellunt  
 libid. 44  
 exspiratio febricitantibus qualis 4943  
 46  
 exspiratio frigida, cor mortis nuncia 504,  
 6  
 exspiratio in dormientibus cor magni-  
 tudine & uolucitate inspirationem ex-  
 cedit 491,47  
 exspiratio magna simul & tarda in de-  
 linitibus actus 492,8  
 exspiratio maxima sui internis masculis  
 uterofilibus 103,31  
 expirationem que faciunt 755,47  
 expirationis aer cor fit per inspirato  
 488, 18  
 expirationis magnæ & uolucis cause  
 493, 3  
 expirationis nullus masculus opifex  
 102, 19  
 expirationis species pro causarum dif-  
 ferentiis uariæ 493,14  
 expirationis usus 211,57. 494,14  
 exspiratio parua simul & tarda quibus  
 fit 498,10  
 exspiratio parua simul & uoluc 498,  
 exspiratio quid 122,40 (12)  
 exspiratio rara simul & magna conti-  
 nuarum ofitationem signum atq; me-  
 dici coexist 504,44  
 exspiratio tacta, sonorali quomodo fiat  
 643, 41  
 Exspirationes ex pectore quid promouet  
 1080, 9  
 Exspirationes que emulsiatone significant  
 625, 27 (623,31)  
 expulsiões que permixti significant,  
 expulsiões que fini idonea 109,12  
 expulsiões facultas bona 623,14  
 Expulsiões extrinsecarum impediunt,  
 cause triplex 686,57  
 Expulsiões alio per tesser qualis 675,  
 58  
 expulsiões & retentiões utrius facultas si-  
 bi mutuo succedit 82,17  
 expulsiões ut quando immodice mouet  
 617, 39  
 Exquisiti à non exquisiti quomodo di-

stinguuntur 960,49  
 Extensantes motum, inueniuntur 711,16  
 Extensio articuli sui ab externis tendone  
 199, 43  
 extensio sui preuolente musculo externo  
 96, 51  
 extensio tanquam motus instrumenti ani-  
 me 93,59  
 Extenuandi corporibus, uicibus, articu-  
 laribus comoda medicamina que  
 sunt 950,62  
 extenuatarum effectio est duplex 806,  
 21  
 extenuantes reficiendi ratio 951,29  
 Extergenda ad uicis puritatem facien-  
 tia, que sunt 1240,60  
 extergenda cum quidam debet esse ex-  
 ad nitrosa: uiscera autem, uel si ali-  
 quod aspidiotis fortiter, nihil no-  
 cuit 1057,13  
 extergenda leuiter que sunt 1335,44  
 Extinctio quid 68,10  
 Extremum plurimum distans utriusq; à me-  
 diis in quoq; genere 1284,40  
 Extremus omne est uacuandus 50,7  
 Extrematio omnis ex altera bile orta, in-  
 solubilis 704,26  
 Extrema omnia redduntur substantie te-  
 nuiores 1112,35  
 Extremum serpentis moderate doloribus di-  
 tum 1132,30

## F

**F**ABA A Ægyptia drachmen cen-  
 tinet non dimidia 1190,17  
 faba Ægyptia, nostra est humidi-  
 tas & excrementosior 375, 57  
 faba inflationes parua 375,40  
 409, 45  
 faba graua continet oboles duas 1190,  
 26  
 Fabarum substantie 375,44  
 fabarum us 416,11091,6  
 faba pisa profertur 416,3  
 Facies musculi omnes, actus à terra con-  
 ingatione recipiunt 274,6  
 facies ægri inspicunda 351,50  
 facies unde suas ueras recipiunt 749,  
 61  
 Faciles à cerebro deformes per ner-  
 uos, si ne corporea an incorporea,  
 Calores ambigi 544,50  
 faciles alioquin genus inuasi 19,31  
 faciles aliter ut hepatis est uelut alias  
 prius passione 1255,4  
 faciles amentis in somno quæsi: na-  
 turalis fortius agit 675,18  
 faciles arterie extrinse inderilla, uel  
 aliqua mole humorem oppressa, quot  
 erat passus 560,24  
 faciles atraxitrix fontium singulis  
 inest 39,10.76,52  
 faciles astrictæ & nitæ adest in qui  
 gressatur in uero 95,3

faciles bisariam ledunt 681,60  
 faciles comode in somno se intrare re-  
 cipit magis 570,11  
 faciles diuerti arterias à corde fon-  
 tæp habet 91,17  
 faciles duplex, alia scilicet & poten-  
 tia 1013,19  
 faciles est causa effritrix 697,4  
 faciles extrinse quando mouetur  
 799, 55  
 faciles expulsiões facit crises 606,32,  
 619, 64  
 faciles extenuandi, quibus brebibus in-  
 sua 1061,36  
 faciles formatrix 74,64  
 faciles inuasiandi, quibus brebibus fit in  
 sua 1061,58  
 faciles inuasiandi præsulgi indicat 15,  
 35  
 faciles non indicat remissionem 19,17  
 faciles omnis coexistit in relatione  
 74, 5  
 faciles prohibet ne accipiat id quod  
 requiritur 19,14  
 faciles purifica à corde inuasi arterias  
 per ipsarum immixtionem substantias  
 508, 39  
 faciles quantitas ciborum scopos  
 19, 56  
 faciles quid 1012,18  
 faciles ratiocinatrix coexistit in cerebro  
 377, 17  
 faciles retentrix in quibus extrinse 82,  
 10  
 faciles retentrix, trahit & expul-  
 tritricem modis intercedere debet 83,  
 43  
 faciles scripitrix quadruplex 351,26  
 faciles uicibus per corpus dispersa  
 128, 52  
 faciles uidentis quando offendatur  
 668, 31  
 faciles uitalis est libera 496,65  
 faciles uitalis & naturalis, animalisq;  
 uelut perficitur, & ex quibus di-  
 gnosci eorum imbecillitas possit  
 967, 59  
 faciles uitalis quibus negata, & quibus  
 uehementissima data 606,7  
 faciles unde cognoscantur 604,60,  
 605, 29  
 facultate aliquid ex aduerso dimittit ei  
 quod alit 1024,43  
 facultate expulsiões existunt imbecilla  
 quid accidet 687,46  
 facultatem differendi rem similitudi-  
 nis, plurim fecerunt uiceres 352,  
 11  
 facultatem inuicere, qui natura queque  
 efficit, bene in ingruunt est 507,  
 36  
 facultatem inuicibilem consistere in cor-  
 de 337,47  
 facultatem que depriment 557,  
 12

facilem

## I N D E X.

- facultatem visalem solventia 314, 37  
 facultate robusta e. effente, dilatare tho-  
 racis non modo minor fit 497,  
 46  
 facultates alterari tot in animal,  
 quot elementares partes 74, 57  
 facultates animal gubernantes sunt plu-  
 res 99, 2, 3  
 facultates astrae & aethere ut differe-  
 rant 1136, 32  
 facultates elementares ac primae que  
 74, 41  
 facultates fortes, corpus in suam natu-  
 ram mutant 111, 50  
 facultates naturales necessariae ad salu-  
 tem 77, 34  
 facultates naturales semper suis adu-  
 erbis laetant 497, 8  
 facultates naturales sunt quatuor 56,  
 20. 604, 45. 676, 39. 1255, 24.  
 445, 16  
 facultates per universa solidiora perme-  
 ant 700, 10  
 facultates quae proprietati ratione in-  
 fant, à methodo sunt distinctae 1117, 50  
 facultates quae, quae aetates habent for-  
 tiorem & inveteriores 692, 4  
 facultates quae naturae sunt, quae ratio-  
 ne inveniuntur 74, 15  
 facultates tres diversae inveniuntur  
 131, 7  
 facultates valide totidem à medicis de-  
 terminantur ut quibus 579, 15  
 facultate valente nunquam pulsus esse  
 puerus ad iuvenem potest 57, 4, 44  
 facultatibus validis magna pulsus pec-  
 cillares cunctant 567, 39  
 facultatis animosae, quae cordi inest,  
 quid proprium 127, 30  
 facultatis anodynae natura 1060, 45  
 facultatis appetitoriae effectus 422,  
 54  
 facultatis atrophicae symptomata  
 686, 2  
 facultates differentiae sunt robur & im-  
 becillitas 553, 31  
 facultates essentia cuiusque partes, in  
 comenda eiusdem partis tempera-  
 mento consistit 513, 51, 597, 22.  
 697, 2. 766, 51. 1012, 26  
 facultates essentiae lesiones propriae,  
 sunt interpretis 681, 64  
 facultatis est animalis, motus voluntari-  
 as 717, 51  
 facultatis imbecillitates, quos morbos se-  
 quuntur 694, 61  
 facultatis inoffensivus immoderatus 421,  
 14  
 facultatis indicandae experimentum  
 sumendum est ab ea re, ad quam di-  
 citur 1012, 32  
 facultatis metrici instrumenta, sunt  
 nervi & muscoli 712,  
 48  
 facultatis metrici opus assimilatio  
 75, 16. 606, 2  
 facultatis nutritionis symptomata 687,  
 32  
 facultatis oblesiones diversae, variis  
 pulsuum inaequalitates producant  
 561, 2  
 facultatis visus opus 606, 1  
 facultatum aleo-pharmacorum natura  
 duplex 1060, 16  
 facultatum corpus nostrum regitum  
 tria principia 721, 4, 8  
 facultatum medicamentorum excessus  
 & gradus discordi sunt 1018, 7  
 facultatum naturarum ordo 81, 62  
 facultatum nos dispensationem robur in-  
 becillitasque, ex propriis indicantur  
 similitudinibus 991, 53  
 facultatum principia distincta sunt, i-  
 pse tamen insistent in singulis in-  
 strumentis 606, 18  
 facultatum singularium lesiones in de-  
 pte, quae signa indicant 767,  
 32  
 factis sanguinea duplex species 708,  
 9  
 facti quid 1046, 10  
 facti influunt, atque corrumpit semen  
 81, 13  
 facti & alii facultates 1077,  
 56  
 factum ex viciis probabilissimi facti  
 411, 46  
 facti nulla comprehensio 915, 4  
 factis aduersariis quae mordaces humo-  
 res collegunt in ore utriusque 1202,  
 61  
 factis caecina 579, 18  
 factis, 41  
 factis cur à calore impediatur 674,  
 47  
 factis quid ibid. 22  
 factis cuique est inimicum, alima au-  
 tem plura 1045, 10  
 factis creatis terram unde oriuntur  
 1030, 19  
 factis causa 674, 43  
 factis sensu in officio utriusque 228,  
 48  
 factis toleranda causa 871, 3  
 factis utriusque, factis suscipit lotium 106,  
 6  
 factis utriusque membrana 105, 15. 305,  
 20  
 factis utriusque membrana continet humo-  
 rem florem 106, 2  
 factis utriusque oritur ab urago 1214, 7  
 factis utriusque principium ubi 105, 61  
 factis utriusque 415, 52  
 factis utriusque tollit factis lentes 275,  
 47  
 factis utriusque quidem maxime ad sus-  
 purationes promouet, borboriga utri-  
 usque distincta 979, 28  
 factis utriusque quoniam & quo-  
 tidie sunt 448, 7,  
 factis quid 666, 14  
 factis causa, refrigeratio 602, 8  
 factis inflammationis remedia Asclepi-  
 adus 323, 1, 4  
 factis distinctae perfrangitur 412  
 factis Calceum non perfrangitur du-  
 cebat 651, 47  
 factis & diuturna detritum utrum est  
 propinandum aquosum 891, 49  
 factis diuturna vel parva quando bono  
 febricitant 597, 63  
 factis laborantibus quotidiana licet medi-  
 catio 810, 53  
 factis bethian, bethian & utriusque  
 quatuor in inferis 807, 27  
 factis tertiana quae arguant 952,  
 34  
 factis putrida detritum, nec laetudo, nec  
 relaxandae esse antequam corpus ut  
 custodit fuerit 922, 33  
 factis acutissimae 791, 41  
 factis à putredine sanguinis ortae sum-  
 pliores sunt quam ab aliis humori-  
 bus 796, 64  
 factis ardentes à tertianis quo differunt  
 711, 14  
 factis ardentes à tertianis & bethian  
 ortae in marasmus, i.e. degenerant  
 765, 41  
 factis ardentes consueverunt indicari  
 per exertiones 968, 62  
 factis ardentes & tertianae quae gi-  
 gnant 681, 2  
 factis coarctae 752, 51  
 factis continue cur tertio vel quinto die  
 solvantur 640, 12  
 factis continue nec borboriga nec riga-  
 rem faciunt 795, 61  
 factis cum habent si abspice aliter ori-  
 untur, sunt suspensae 951, 6  
 factis cunctis à principio nulla egunt ut  
 non febrient 916, 57  
 factis cur succeduntur inflammationis par-  
 tibus 723, 6  
 factis decedentes quae 613, 14  
 factis diuturnae quoniam & sunt & di-  
 catur 897, 28. 901, 6  
 factis diuturnae diu imperium trahunt  
 suum diuturnitatem 905, 2  
 factis diuturnae, qualiter pulsus muti 593,  
 34  
 factis diuturnae quando solvantur 710, 28  
 factis diuturnae unde profragantur 540,  
 51  
 factis diuturnae quae 613, 44  
 factis epacanthosae 791, 41  
 factis epimericae ex deorsum cur 617,  
 17  
 factis epimericae solus spiritus sunt pas-  
 siones 616, 48  
 factis epimericae ex habent ortae quae  
 arguant 817, 22  
 factis epide 615, 18  
 factis e. bethian attentae 798, 57  
 factis ex inflammatione, sunt sympto-

# EPITOMES GALENI

in portione inflammationis	938,4	631,	43	febris non non ex a quo contrahitur	661,4
febris ex pituita, cuius qualitates	797,18	febris quotidianae praecipue gignuntur	633,1	febris ab animi affectibus	891,6
febris tabida obducit	797,2	febris quotidianae quibus naturis sunt fa-	790,62	febris ab exercitatione inmodica	711,
febris belluae ne lassissimum quidem cr-	913,46	militares	889,10	febris ab usione productae, curatio	891,
febris belluae occupant solidas corporis	785,44	febris febiles quae dicuntur	611,57	febris ab iracundia quando gignatur	782,
partes	889,30	febris semiterminales, quae extinctiones sol-	611,57	febris ab iracundia quando gignatur	9
febris belluae quae dicuntur	889,30	nunt	611,57	febris ab iracundia quando gignatur	9
febris belluae quoniam ab initio sunt	597,	febris sunt effectus utrosque generis	611,57	febris ab iracundia quando gignatur	9
597,	27	614,	26	febris ab iracundia quando gignatur	9
febris belluae rursus a principio erui-	599,1	febris synocha diuersae sunt a continuis	640,	febris ab iracundia quando gignatur	9
tur	599,1	640,	2	febris ab iracundia quando gignatur	9
febris belluae nulla accendit causa	896,	febris synocha nullum habent circuitum	619,	febris ab iracundia quando gignatur	9
896,	36	619,	7	febris ab iracundia quando gignatur	9
febris belluae post sumpsum cibum ex-	718,	febris synocha quae dicuntur	897,42	febris ab iracundia quando gignatur	9
candescere, exacerbat, aequaliter	718,	febris tabida quae sunt	787,1	febris ab iracundia quando gignatur	9
718,	37	febris tertianae a fluxu producuntur bile	130,	febris ab iracundia quando gignatur	9
febris hometanas	791,41	130,	60	febris ab iracundia quando gignatur	9
febris Lypthiae	65,17	febris tertianae quibus naturis sunt semi-	790,32	febris ab iracundia quando gignatur	9
febris hynae & hepidae	1014,54	liores	790,32	febris ab iracundia quando gignatur	9
febris marasma dei ob quae usura ma-	909,4	febris synocha detentus quidam absque cibo	915,3	febris ab iracundia quando gignatur	9
ri ex parte accidit	909,4	struere debet	915,3	febris ab iracundia quando gignatur	9
febris omnes ardentissimae, pulsum for-	590,51	febris tabida quando animi labori	789,	febris ab iracundia quando gignatur	9
mantur cerebrum	590,51	789,	46	febris ab iracundia quando gignatur	9
febris oritur ob obstruendum mentis	782,	febris belluae nato a epistole & sic-	906,	febris ab iracundia quando gignatur	9
782,	36	et a principio corriguntur	906,	febris ab iracundia quando gignatur	9
febris oritur ex sanguinis permixtione	790,11	61	46	febris ab iracundia quando gignatur	9
in alio humore, minus cerebrum pu-	790,11	febris belluae nulla adest accessio	718,	febris ab iracundia quando gignatur	9
trides sunt	790,11	718,	46	febris ab iracundia quando gignatur	9
febris paranothiae	791,41	febris belluae, quibus alie non copu-	806,57	febris ab iracundia quando gignatur	9
febris per circuitum moueri unde contin-	799,36	lantur, hanc quous tempore consi-	806,57	febris ab iracundia quando gignatur	9
get	799,36	rant	806,57	febris ab iracundia quando gignatur	9
febris postea a puritate oritur	784,	febris putridis adest velox systole	716,	febris ab iracundia quando gignatur	9
784,	12	716,	12	febris ab iracundia quando gignatur	9
febris persistentes non paucae ab initio sunt	597,14	febris putridis post concessum hu-	806,	febris ab iracundia quando gignatur	9
belluae	597,14	morum, balneum opulenter	806,	febris ab iracundia quando gignatur	9
febris persistentes non uoluntate sunt	8117,40	54	806,	febris ab iracundia quando gignatur	9
calidae	8117,40	febris quae cum alia sunt infusant,	964,	febris ab iracundia quando gignatur	9
febris, praeter belluae, omnes dupli-	63,	non opus est alia euacuatione	964,	febris ab iracundia quando gignatur	9
in quibus constant in temperie	63,	2	964,	febris ab iracundia quando gignatur	9
44	63,	febris quartanae quae originem pre-	791,10	febris ab iracundia quando gignatur	9
febris putridae	64,56	stent	791,10	febris ab iracundia quando gignatur	9
febris putridae & belluae quae ducun-	897,10	febris synochis nullus adest circuitus,	718,	febris ab iracundia quando gignatur	9
tur	897,10	et proinde neque accessio	718,	febris ab iracundia quando gignatur	9
febris putridae quales pulsus formantur	591,	42	718,	febris ab iracundia quando gignatur	9
591,	41	febris continuae detentis, nec balneo nec	917,60	febris ab iracundia quando gignatur	9
febris putridae causa procatartica nulla	785,49	uino, nec uentibus rursus inbus	917,60	febris ab iracundia quando gignatur	9
praecedit	785,49	utendum	917,60	febris ab iracundia quando gignatur	9
febris putridae ex latu diuidendi ra-	987,13	febris cuiusque pulsus post cibum alie-	789,1	febris ab iracundia quando gignatur	9
tio	987,13	naturae in magnitudinem & uelocita-	789,1	febris ab iracundia quando gignatur	9
febris, quae accendunt	781,46	tem	789,1	febris ab iracundia quando gignatur	9
febris quae saluberrima & pestime	614,	febris nec in accessionis initio, nec in	915,1	febris ab iracundia quando gignatur	9
indicant ex decretorio die	614,	ipsius incremento laudantur	915,1	febris ab iracundia quando gignatur	9
61	614,	febris quibus quales a dei eligere, prepa-	915,1	febris ab iracundia quando gignatur	9
febris quae typis laetant	810,11	rant, debemus	915,1	febris ab iracundia quando gignatur	9
febris quoniam dissolutae aetate ex-	613,56	febris continuae quae calidius sunt	890,64	febris ab iracundia quando gignatur	9
cretis	613,56	frigidis & aburati	890,64	febris ab iracundia quando gignatur	9
febris quomodo inter se misceantur	631,	febris continuae ex lassitudine signa	637,	febris ab iracundia quando gignatur	9
631,	63	15	637,	febris ab iracundia quando gignatur	9
febris quotidianae a pituita ossibus bu-	350,58	febris continuae pulsibus uariis semper ad-	596,10	febris ab iracundia quando gignatur	9
more	350,58	est celeritas	596,10	febris ab iracundia quando gignatur	9
febris quotidianae cuiusmodi puris cor-	612,59	febris continuae respiratio quidam	492,52	febris ab iracundia quando gignatur	9
ripiant	612,59	febris gignenda quae requiruntur	661,8	febris ab iracundia quando gignatur	9
febris quotidianae non cum rigore, sed	808,1	febris calidus in synocha quando nimis	808,1	febris ab iracundia quando gignatur	9
cum refrigeratione quidam inuadit	808,1	tur, aut augetur	808,1	febris ab iracundia quando gignatur	9

## I N D E X.

- febris pestilens ac letalis causa 596.  
 7. 785,33  
 febris putride indicatio duplex 813,  
 24  
 febris putride propria signa 598,9  
 febris putride propria est celeritas  
 599,  
 febris putride quando epidemicus succi-  
 dat 785,60  
 febris quando accendatur 455,43  
 febris quando gignatur 459,25  
 febris quartana ab atra bile fit 634,53  
 febris quartana curatio 117,717  
 febris quartana exaspilata gignitur ab a-  
 tra bile 793,10  
 febris quartana maxime ardet in autu-  
 mo 613,32  
 febris quartana que dicenda 613,16  
 febris quartana febris aqua frigida est  
 perpetua remittens 915,3  
 febris quid 574,16. 716,61. 781,  
 51. 902,47.  
 febris quotidiana cum singulis diebus ac-  
 cendatur 791,61  
 febris quotidianae descriptio libi. 10  
 febris quotidiana & tertianae descriptio  
 613,  
 febris quotidiana solutionem offert pi-  
 tuus excretio 618,32  
 febris quotidiana fit à pituita 654,19  
 febris quotidiana que dicenda 613,29  
 febris remedia sunt bene dicta & refri-  
 geratio 901,48  
 febris requirit vias rationem frigidaem  
 atque humilem 895,10  
 febris semiteriana a celsis nunquam in  
 tergo desinit 719,8  
 febris semiteriana ex quibus consistit  
 715,  
 febris semiteriana maxime inuadit Ro-  
 ma 719,22  
 febris synocha requirit vias rationem  
 tenuissimam 911,6  
 febris synocha tota una status est 612,  
 14  
 febris synochos que dicatur 788,46.  
 915,  
 febris tabida à tabe quomodo differat  
 787,  
 febris tabida indicio que 787,12  
 febris tertiana duplex quando adesse di-  
 catur 614,37  
 febris tertianae accessiones tempora sex  
 describuntur, quibus reperiuntur &  
 in altum intermissionem capilli-  
 bus 717,61  
 febris tertianae accessio quo tempore in-  
 teruallo finatur 792,5  
 febris tertianae accessio ultra duode-  
 cim non procreabit bonas 652,  
 16  
 febris tertianae breuium solutionem que  
 urina videtur libi. 20  
 febris tertianae descriptio 717,21  
 febris tertianae & quartanae mixturae,  
 quatuor contingentes 794,50  
 febris tertianae & quotidiana descri-  
 ptio prius singulis coloris 792,  
 47  
 febris tertianae exaspilata descriptio  
 634,  
 febris tertianae solutionem, excretio hinc  
 testatur 618,30  
 febris tertianae symptomatica 792,1  
 febris tertiana ex genere ardentior est  
 350,  
 febris tertiana oritur à flaua bile per cor-  
 pus nota 634,10  
 febris tertiana pura intra septimum ca-  
 centur absolvitur 613,43  
 febris tertiana quando dicatur 635,16  
 febris utroque vascularum interosta-  
 lum diffusis, perit una & effusio  
 187,  
 febris tertiana correptis quo accessiones  
 tempore est potius danda 612,6  
 febris ab humorum putredine ardentem  
 tempora quatuor que 720,7  
 febris accessiones que faciunt len-  
 gues & breuioris 792,10  
 febris accessions remissio modo 897,  
 49  
 febris coloris differentia triplex 781,  
 55  
 febris cause, nonnullae sunt aliqua  
 effluas 452,31  
 febris colliguntur curatio 914,  
 11  
 febris complexio & consensio quid  
 796,  
 febris continenter remedia maxima  
 duo que & quatuor in utrumque  
 899,  
 febris continenter citra aciditatem in-  
 fluxum, curatio 963,50  
 febris conueniens duplex species  
 791,  
 febris contrariarum indicia 919,  
 66  
 febris non accidentibus infestationem,  
 curatio 963,58  
 febris diariam in bilioso tempera-  
 mento, non communis omnium, non  
 cuiusque propria vias ratio 891,  
 17  
 febris differentiae ab accidente deson-  
 ptae 780,60  
 febris differentiae à materia cui haeret  
 color praeter naturam suspit, sunt  
 tres 781,5  
 febris differentiae tres generalissimae  
 806,  
 febris diuisio 655,40  
 febris epidemicarum cause & indicia  
 616,  
 febris exaspilata ardentior & tertianae  
 non desinit 613,7  
 febris genus compositum, confusum da-  
 ploiter libi. 21  
 febris hecticarum duo propria signa  
 596,  
 febris hecticarum hectica ex urina in-  
 usfragari aequat 597,12  
 febris hecticarum nulla fit statim in  
 primis diebus, sed in progressu  
 637,  
 febris intermittens differentiae tres  
 791,  
 febris intermittens & continuatur  
 desinit 791,19  
 febris intermittens typi singuli, quot  
 baris exasperant 809,60  
 febris longiora & breuiora vnde de-  
 prehenduntur 613,48  
 febris maxime principales differentiae,  
 functione ab ipsorum substantia  
 780,  
 febris mista ab eorum complicatione  
 differt 718,10  
 febris mistam non ignorabit, qui sin-  
 gulas simplicium cognoverit 616,  
 46  
 febris non intermissionem temporis  
 permutat quinq. 718,21  
 febris prius differentiae 889,16  
 febris putidarum differentiae 917,  
 11  
 febris putidarum indicium calor est  
 mordax & aris 786,19  
 febris putidarum pulsus qualis libi.  
 32  
 febris putidarum tria genera 654,  
 43  
 febris putidarum variarse differentiae  
 simplices sunt sex 796,17  
 febris putidarum urinae qualis 786,  
 40  
 febris quartanarum signa & sympto-  
 mata 612,15  
 febris, que et locis patientibus ac-  
 cidunt, formam esse compositam  
 635,  
 febris quotidianarum indicia 652,46  
 febris simplicium tria genera 612,  
 46  
 febris synocharum curatio & vias  
 ratio 892,48  
 febris synocharum differentiae tres  
 897,  
 febris synocharum genus duplex  
 libi. 46  
 febris synocharum maiorem praefle-  
 dum quod 892,18  
 febris tabidarum proprium est sici-  
 les 788,59  
 febris tertianarum & aduerentium di-  
 scrimen 612,8  
 febris tertianarum quartanarumque se-  
 cundum pulsus discrimen 613,58  
 febris tertianarum signa & sympto-  
 mata 611,63  
 febricitates qui ratione sumus actibus  
 352,  
 febris qualitas 1119,47  
 febris visus sanguinis repergit à bile

217,	3	figura circularis difficilissima ad patien-	3035, 31
Femoris consideratio	134, 3	den	296, 23
femoris forma	134, 6	figurae angularis propriae	98, 34
femoris motum ad interiora, qui musculi		figurae artuum mediae, quae requirantur	97, 4
necessitates	138, 13		43
femoris musculi	166, 4, 5, 116, 19	figurae doloris expertes	100, 48
femoris musculi descendunt ad caput mo-		figurae extremitatis manus quatuor	92, 3
uundae tibiae articulatione posteriora		figurae exquisitae mediae, caeteri dolore	97, 8
217,	18		99, 41
femoris os omnium maximum	138, 1	figurae extremitatis, sunt dolorificae	101, 46
218,	61		29
femoris pars superiora pro sede ischijs co-		figurae omnium maxime quae sunt	110, 29
tylem fortior	113, 1	figurae rotunda quae infert	119, 28
femoris structura ad sollesiones idonea est		figurae manus simpliciter media quae sit	98, 2
ibid.	8		figura media cum utriusq. musculi inten-
femoris iulocera glutinandi ratio	116, 4,		sione, offert dolorem
46			figura media dolore carens, quomodo
Femur circumgrates musculi	309, 31		inueniatur
femur extrorsum agens musculi	ibid.		figura media, dupliciter dicitur
13			figura media in artuum motione quando
femur intro abducens musculi	309, 3		ferretur
Femoris facultas	1080, 66, 1103, 55,		figura media in signis artuum est indi-
216, 4,	138		cat
Femur facultas	1118, 35		figura media quae sit
femur igne mollescit	1178, 58		figurae mediae distensionis seruamus
Femur ut	3098, 1		97, 11
femur quando ascendit ad ossa frastra fir-			figura non simpliciter media quod duplex
mita	877, 55		98, 22
Femur vel fermentatio quid	947, 50		figurae omnis conficit aut linea curua, ca-
¶ FIBR. AR. circulares in intestinis tes-			ua, aut recta
tibus C. cur	14, 34		figurae omnis molesta, sunt inebriatis
fibre musculorum thoracis intermedia,			97, 13
tionem habent contrariam exteriori			figurae partis quid indicet
lesioni	174, 28		figurae partium a quibus casus uincitur
fibre oblique opulentur retractoris po-			693, 58
terioris	856, 1		figurae animal tripliciter potest, si recta
fibre quae quibus astringuntur seruatur			lineam efficiat spina cum curuibus
221,	6		110, 19
fibre rectae trahendi gratia sunt centri-			figura rotunda ad patendum difficilissima
cule	84, 49		137, 43
fibre thoracis musculorum et terne, quid			figurarum cuiusq. digiti sex uniuersales
latitiam quoniam sunt fortiores			circa apprehensionem differunt
173,	60		197, 60
fibre transuersae, contrahendi gratia ob-			figurarum excessus dolorem offert, C.
dulae	84, 51		cur
fibrarum actiones uariae	214, 50		figurarum extremitatum eadem operantur
fibrarum differentiae C. uis	119, 13		mutationem, mediae uero tardius
fibrarum tertium genus est obliquarum			ibid.
85,	54		in figurarum non simpliciter medianam
Fibula	112, 61		differentiam, uerum genus semper mu-
Fibulae utilitas	115, 61		sculorum agi
Fibula extrinsecus tibiae est attensa ibid.			figurarum rotunda sola patitur agere
57			197, 29
Ficus matures congruere senibus	470, 3		figurarum uarietas conserit ad patendum
5			difficultatem
ficus arbor quoniam habeat facultatem	1108, 38		Filicis uis
1108,	38		1103, 19
ficus arida C. uiridis facultas ibid.	1108, 38		Filicis uis
ficus C. uiridis caeteris autumnalibus fru-			1077, 45
ctibus praestantiora	409, 61		Fimus amaris attrahit
ficus excoctae naturae	413, 49		1059, 61
finem facultas	130, 14		Firmitudinem articularum, ligamentorum
Fieri per se, C. ex accidenti quid	664, 37		fortitudo C. exalta compositio effi-
57			cit
figura artuum extrema dolorifica	97, 6		Fistula arca ad quid utilis
			713, 57
			fistula quid
			707, 1
			fistulae uisita sunt lena
			3035, 31
			¶ FLAMMA. arbor est accensio ibid.
			44
			flammae a quibus arguuntur
			485, 19
			flammae quod modis extingui possunt
			487, 31
			flammae extinguitur dicitur sub cunctis
			medicamentis
			306, 19
			flammae ignis, non continuo comparanda
			con calore mundum
			804, 6
			flammae omnis, opus habet aere modera-
			te frigido
			485, 58
			flouorem motus duplex
			ibid. 42
			flammae extingui a sereno sole
			1045, 15
			Flumen discit calcificationem C. re-
			manens
			375, 41. 894, 25.
			978, 5
			flumen in uentriculo grauius quae sequi-
			tur symptomata
			689, 19
			flatus in uentre causa
			ibid. 5
			Flauus Boribus
			648, 21
			Flexibilitas digiti cur magni dupliciter
			tendens sunt duci
			100, 33
			Flexio artuum fit ab interno tendore
			159, 46
			flexio fit praecedente musculi interno
			96, 53
			Flouescens calor acris
			47, 26
			Floris aris uires
			116, 6
			114, 2
			Fluxus corporis nostri quomodo refica-
			tur
			419, 58
			Fluxus humores ad dolentes particulas
			798, 46
			Flexibilitas motuum quibus mediamen-
			tis partitur
			914, 19
			Flexio calida in uentriculum quid motu-
			tur
			479, 17
			fluxio frigida in uentriculum quid faciat
			ibid.
			19
			fluxionem trinum colorum, transierunt
			esse reddendum
			915, 15
			fluxionem aerium et colorum quid sit
			alitur
			1080, 34
			fluxionis distentione quae mediamen-
			ta conuertit
			972, 26
			fluxionis alidae cause
			687, 61
			fluxionem communem in pulmonem uen-
			tionem, communis est in quibus pul-
			mon
			601, 21
			fluxionem causa
			87, 21. 798, 18.
			915, 14.
			1130, 59
			Fluxio mulieris sistenda potius Apollo-
			nij
			1164, 3
			¶ FOEMINAE cur uiris purgari
			45, 21
			formae non emittit fructus foras, sed
			in utero
			114, 32. 301, 49
			formae uiris inbreuitatis
			331, 18
			formae crebrae, caetero mascula disten-
			ta
			114, 1
			formae laetiae, menses non prohi-
			te
			309, 42
			form-

- femina mare imperfectior, quia frigidi*  
*297.* 62  
*femina mafculo humidior & frigidi*  
*117.21.* 250, 22  
*femuli uires* 109, 64  
*femur oleum etiam in totum citram re*  
*postitum* 193, 44  
*Femur et decocti facies* 116, 18.  
*1217.* 48  
*feruginei eloi facies fempit cum meli-*  
*le substat interfectionem prout bu-*  
*mores* 176, 10  
*feruginei facies auxiliatur diuturnis*  
*idoneis officiis* 176, 17  
*feruginei uis* 176, 14, 416, 14, 110, 13.  
*1183.44*  
*feruginei decoction oculorum terjoni*  
*conferit* 943, 4  
*ferugineum non boni facit est* 409, 17  
*ferugineum inter calfacientia legumi*  
*na recusetur* 176, 26  
*feruri dorem quid acculit* 1107, 3  
*ferus comparatio ad plantas* 110, 10.  
*123.* 2  
*fetus, dum a sole natura regitur, nec ar-*  
*teriarum nec cordis functione indiget*  
*123.* 63  
*fetus formatio ratio* 78, 113, 53  
*fetus in fumentis uicini ubi conuocan-*  
*tur* 103, 17  
*fetus in uero diffenfio* 239, 17  
*fetus non indiget crebro, & quare*  
*123.* 65  
*fetus nouum mensibus perficitur* 81, 20.  
*779.* 52  
*fetus per que uisa colligitur* 123, 32  
*fetus per que uisa trahit spiritum &*  
*fanginem* 107, 9  
*Fetus malababeri* 112, 3  
*Femore calida quibus nocent* 883, 11  
*femore ex oleo & ablutibus quando u-*  
*terantur* 893, 14  
*Forma corporis offibus similis* 151, 9  
*formam naturalem que uident* 661, 56  
*formatio animi prima, constat ex se-*  
*mine & sanguine menftrua* 46, 12  
*formatur natura effugit particulas se-*  
*cundum animae mores* 14, 47  
*Formidabilis inducunt rigorem* 714, 64  
*fortibus infuit densae fortes & multi,*  
*timidi contra* 174, 47  
*fortis uicini alteri, bifariam dicitur*  
*100.* 7  
*fortius improbitas inconstantia* 128  
*fortius uiuunt non uirtuti est, diutius*  
*preffare* 425, 12  
*fortune que tribuuntur* 352, 28  
*forma & ars per auxilia morbis pro-*  
*fluent* 914, 40  
*fortius uari quicquid reſe operatur*  
*318.* 43  
**FRACTURA** 12, 51  
*fractura curatio* 876, 43

*fracturae quae uisus ratio conueniat*  
*814.* 63  
*fracturae facies fit calli aduenientia. I-*  
*bidem* 59  
*fracturae scopus, uisus* 876, 18  
*fractura quid* 876, 42  
*fractura, quod pertinet ad intrinsecum*  
*primum, est incommutabile* 876, 45  
*fracturae longae curandi ratio* 876, 29  
*Fracturabilis in mollibus uincitur* 416  
*14.*  
*Fractura epileptici ratio* 1005, 49  
*fractura uiscera ratio* 446, 2  
*fractura apud bene perit quem usum pre-*  
*ſent* 442, 32  
*fractura dura, confingit molli soluti*  
*ta minuit. medicum angit* 442, 53.  
*442.* 20  
*fractura est e. circutatio, indurabilior pre-*  
*ſent corporibus* 1005, 46  
*fractura ex oleo aequa est, ſicca aut in-*  
*aequalis* 1026, 11  
*fractura ex hydrore quae facis corpori-*  
*bis acculit* 1028, 14  
*fractura media inter mollem & duram ad-*  
*bibenda* 447, 19  
*fractura molli quid efficit* 442, 32  
*fracturae e. circutatio in uisus ſubſeruat*  
*442.* 16  
*fracturae mediae* 440, 48  
*fractura media moris utendum* Ibid. 10  
*fractura ex oleo uſus* 1026, 6  
*fracturae matutinae poſt ſentiam albi-*  
*ditate uſitas* 466, 23  
*fracturae mediae indicio ſunt rubor & os*  
*mar* 442, 14  
*fracturae preparatorie ſunt* 442, 27  
*fracturae terminus, quae carnis augenda*  
*gratia preſentur, ſit uigens tumor*  
*Ibid.* 20  
*fracturae terminus quid* 954, 40  
*fracturae contrarietate alia in fractura*  
*genere, alia in officiis qui ab ea pro-*  
*ueniunt. conſiſtit* 440, 56  
*fracturae differentiae in uariis ſum ſex*  
*Ibid.* 40  
*fracturae diuerſarum uarij uſus* 440, 39  
*39.*  
*fracturae genera omnia dicuntur reſpe-*  
*ctu cellularum* 441, 38  
*fracturae menſura iuxta quae ſit uarij*  
*da.* 442, 49  
*fracturae particularis coniectionis no-*  
*men* 441, 20  
*fracturae utiles differentiae eae diſtin-*  
*xerunt Hippocrates ſecundum affe-*  
*ctum contrarietatem* 441, 2  
*fracturae preparatoria quomodo admi-*  
*ſtranda* 442, 35  
*fractura prohibet dolores per circutium ac-*  
*cidentes, ſi duas uel tres horas ante ac-*  
*ceſſum adhibita ſit* 467, 29  
*fractura quid eſſe debeat* 439, 61  
*fractura adhibere aliter ſemum* 927, 28  
*fractura inſperata quibus uſus* 454, 4

*36*  
*frigit ex terna per accuſiones unde ch-*  
*tingit* 715, 18  
*frigidus applicatus, accuſationem calorem*  
*amittit* 59, 6  
*frigidus car ſoporem gignit* 737, 2  
*frigidus potus quando utendum* 899, 13  
*frigidus potus car marilem uſus ranguſ-*  
*ſis, atq. ob id benedictus ledat. Ibidem*  
*62*  
*frigidus potus interſperſus & immo-*  
*dicus, quoniam mala comedit* 890, 18  
*frigidus potus quibus periculoſus eſt,*  
*442.*  
*frigidus natatione quando poſſitur uti in*  
*ſynochis* 918, 11  
*frigidus non a corpore noſtro uincitur,*  
*ſed ipſum uincit* 58, 1  
*frigidus opportune calidus, quos a ſe-*  
*bre liberet* 696, 17  
*frigidus quando ſit propinandum in que la-*  
*borant ſynochis* 916, 61 918, 8  
*frigidus quae urbenentius mordet*  
*1040.* 23  
*frigidus quibus effertur & quibus non*  
*899.* 42  
*frigidus enochis aliorum effertur*  
*711.* 1  
*frigiditas mollicies organorum conui-*  
*dit, quae pulſum diſſerentia produ-*  
*cit* 357, 12  
*frigiditas ſarminae uſitas* 998, 40  
*frigiditas immodice cauſa* 661, 18  
*frigiditas opera* 117, 20, 1042, 22  
*frigidum, aeris inimicum* 1161, 16  
*frigidum nihil prompte comburitur*  
*120.* 28  
*frigidum peruenit craſſum, ut conu-*  
*ctus repellat* 1059, 36  
*frigidum poſtulat* 61, 18  
*frigidum quae ratione ſit mordax* 1039, 57  
*frigidum ubiq. eſt debiliſ, cupiditatis*  
*692.* 35  
*frigidus cauſa triplex* 1051, 23  
*frigus cui corpori ſubiri adſerit poſuit*  
*695.* 58  
*frigus eſſit corpus ad motum inerts*  
*717.* 2  
*Frigus pſis modato* 277, 46  
*Frigus cutis* 279, 6  
*frigus cutis, uoluntarij motus parit*  
*263.* 58  
*frigus muſculus, ſi ab eis habet diuerſum*  
*uſum tendentes* 168, 42  
*frigus eſſa car duas ſimul & cauſa*  
*121.* 9  
*frigus ad reponendum apuſum* 402, 41  
*41*  
*frigus arbori omnes nulli ſunt ſucci pro-*  
*ter euſant* 409, 34  
*frigus frigore cernit, ſi diu in ueni-*  
*cido horreat* 179, 41  
*frigus horati ſi correſponder in uentre,*  
*ſimilis letalibus uicinis ſit* 409, 38  

P P

fructus borarij a gri servatus 578.64  
fructus borarij qui dicuntur Ibid. 60  
fructus omnes cognoscere & maxime sunt  
calidi 1043.8  
fructus omnes in primo sui ortu sunt acer-  
bi 1043.7  
fructus, quibus in medicamentis utitur  
410. 10  
fructus qui succari non possunt 408.4, 6  
fructus tenaci uisus canonis epi 417.  
74  
fructus utriusque ex terra & aqua gignit  
ur 55.5  
fructuum arborum facultas 580.24  
fructuum differentie 1043.3  
fructuum qui sunt uisui, & qui mittere  
1043. 16  
fructuum saporis 1043.65  
fructuum sententia, ab ipsius maxime distri-  
bunt 348.18  
Frumenta que dicuntur 415.12  
¶ FULGURIS immoderata, quas  
resistantes difficultates inducit  
401. 55  
fulguris uis 1095.39  
fulgur ex immoderato uisui gignitur 494.  
Furibiles sunt, oculis autem aciem acut  
1084. 13  
furor ex sensibus nascitur 894.33  
Furibiles uideat a corporibus simili-  
bus 847.2  
functionibus aliis que instrumenta sunt  
concordantia 693.67  
functionis causa efficiens 846.62  
functionis lesio, symptoma non morbus  
est 653.56  
functionis lesio, terminus mutationis ca-  
lidae partis 64.11  
functionis uisus partis impeditur, idcirco  
efficitur 601.19  
functionem omnium causam, animam 87.  
32. 431.20  
functionem requisitam ad uitam tres  
differentias 603.9  
Fungi 594.12  
fungi faciles 1097.8  
fungi succari non possunt, proinde uisui  
in se habere uidentur 408.4, 4  
fungorum epi periculosus 191.18  
fungorum nexu, que opulentur Ibid.  
39  
fungorum qualitas 406.62  
Furibiles quibus cultis arteria urbes  
fuit 371.3.1055.49  
furibiles capitis a serpens succo arborum  
1195. 9  
furibiles capitis curatio Ibid. 11  
Furibiles quibus cultis arteria urbes  
fuit 371.3.1055.49  
Furibiles capitis curatio, curatio & spe-  
cies 1125.14  
Furibiles 709.12  
Furibiles Andromachi contra ponitur  
1168. 58  
futura non licet in principio cognoscere

nisi admodum prospecta morbi spe-  
cie 612.54  
futurorum non historia, sed diuina po-  
testas 14.0  
G  
GAGATES quas uires habet  
1119. 21  
Galathea uires Ibid. 45  
Galathea uires 1119.4  
Galeni conflantur 424.54  
galeni genus clarum 425.55  
galeni salustia 646.57  
galeni pars in rebus 650.1  
galeni in seruis singulis 421.56  
galeni in uisui iracunda 424.17  
galeni opulentia 425.54  
galeni palustria 1123.51  
galeni pater in uisui discipulorum ge-  
neris uirescentia 405.1  
galeni preceptum fuit Aristoteli Euphi-  
dici 1125.62  
galeni possibiles 648.4  
galeni de genere Reus, cum gloria ex a-  
quo atque honoris uirescentia 648.8  
galeni a M. Auerro temp. magni  
considerabatur 651.6  
galeni de causa episcopi facies & de a-  
nomie substantia dubium 1126.18  
galeni de uires integram ferme pregit  
statum 100.5  
galeni Eudemo Peripatetico prelatum  
sebre quartana 646.16  
galeni Eudemi liberant a tribus qua-  
rentis Ibid. 51  
galeni ex omni regione conditus sibi ad-  
ferri triginta medicamenta 1063.  
57  
galeni ex quibusdam lectu fuit prodi-  
tus 651.1  
galeni in seruis partis additus, flu-  
diti medicam 646.5. 895.  
36 36  
galeni medicamentum ex aqua munda-  
rum gratia uires per se in rebus regio-  
nes 1120.43  
galeni Masice sententia de omni po-  
tentia Dei relinquitur 279.6  
galeni nulli liberos suos pro prium  
nomen praescriptum 840.17  
galeni pateris laudes longis uires de-  
cantat 424.14  
galeni quando ab emet in imperio im-  
munitis per se 404.58  
galeni que ratione praedixit eadem  
affertur sanguinis fluxum per na-  
res 652.1  
galeni que ratione quidem metron  
Remo ex libidine amoris egrotare  
cognovit 648.57  
galeni sanguinis fluxum urbenstem d  
nare dextra quomodo compositum  
652. 21  
galeni Sexto Antentia filia praedixit  
modos, dicitur, & reclusum morbi  
650. 44

galeni uires Romae imperante Mure  
Aurelio Antonino 649.61  
galeni uires sanguinis 465.17  
Galathea uires 1143.10  
Galathea 401.19  
Galla sandus 1085.57.1110.15  
Gally nomen uires & facies 1075.  
44  
Gallorum ius quam uires habet 1141.  
25  
Gallus per se sanguinis detrahendum  
995. 74  
Gallorum ius uires 1141.25  
gallorum testes praescribi saginatum  
praescribunt 1041.6  
gallorum uires uires uires uires uires  
cero autem colitur 1011.23  
Gangrene curatio 981.32  
gangrene quid 707.34. 708.43.  
981. 43  
gangrene uires fuit 707.8  
Gangrene ex mase, in qua rose de-  
color fuerunt, Commodi temp. fuit  
Gallus lenit 651.15  
Gari uires 1144.15  
Garon 591.19  
Gaudet, qui in tere premensuratur cum  
amore flagrant 421.41  
Gaudet noster fuisse etiam dicit  
671. 15  
¶ GEMINORVM instrumentum  
uires 255.16  
Geminus praescribit 874.16  
Geminus qui nequeunt 504.13  
Geminus absque, quid dicitur 246.9  
generatio, actus compositus 74.17  
generatio masculi & feminis uires  
temperamentis qualitate aduersione  
118. 19  
generationem primam negligenter tra-  
ctari ab uires uires uires 175.  
60  
generationis omnium corporum ex qua-  
tuor elementis constant 1046.1  
generationis fecunditatem quibus uires  
uires uires 129.14  
generationis progressus 74.16  
generationis ratio 296.60  
generatio uires prima uires 140.13  
generatio quibus prius, & quibus pise-  
rus colligit 114.61  
generatio quid dicitur 78.10  
generatio, quis actus 75.43  
generatio uires dicitur species 45.18  
Gensile facies 1107.10  
Gensia ex firmis regenerari uires possunt  
111. 29  
Gensiles omnium feminis partum de-  
bitissime 119.31  
gensiles partes que feminis non emet  
gent 119.15  
gensilia feminis in se formata sunt,  
sed in uero calori uires uires pro-  
pulsari hanc potuerunt 128.16  
gensilia mascula a feminis quare dif-  
ferunt



## I N D E X.

- sunt 119,6  
 glandula masculi & feminæ proporia  
 ne sibi correspondent 118,37  
 glandula sensibilibus cute 301,20  
 glandula nervi, nervi arteriæ, quales  
 302, 16  
 Glandula corruptela, quatuor qualita-  
 tes sunt, eas 251,53  
 glandula præcipuum utitur ob gnis-  
 rum interperitiam 275,10  
 glandula præcipuum quod cohibet  
 1032, 7  
 glandula recens concervæ descriptio  
 12, 9  
 glandula infusiles quibus gravitatis sit  
 idonea 110,59  
 glandula que uocatur 109,61  
 Glandula liberata ab obstructione 1075,  
 49  
 Genu arculus tria habet ligamenta  
 160, 55  
 genu inflammationis curatio 977,61,  
 97, 8  
 genu inflammata dolorem magnam leu-  
 na, hyeme calida, æstate frigida sunt  
 admodum 977,12  
 genu quatuor regiones quibus præsidium  
 facit, eas 316,28  
 genu tumores flatulentos quid dicantur  
 119, 22  
 Genuum agrestis maris Genuus  
 leuon 414,38  
 genibus arborum & fruticum 390,7  
 Genuum que 205,15  
 Genuatione in quibus utuntur 467,57  
 ¶ GIBBVS unde accedit 751,49  
 Gibbæ ut 1075,33  
 Gignens quid 151,63  
 Gignit & sanctus facies 359,12,  
 1075, 58  
 Gignere unde nomen propaginem  
 accipiant 261,43  
 gignens inflammata oleum leniunt  
 præsentat 1228,15  
 gingivæ lævæ quid careat 1118,4  
 ¶ GLABRA sunt, que sunt frigida  
 & bona 50,16  
 Glabritas 1091,16  
 gladius ceteris secundo bebesit 1096,12  
 Gladium præsens semper eandem magni-  
 tudinem servare 779,34  
 glandes illic utuntur 402,1  
 glandes quæritur 386,55  
 glandes quæritur crassi succi 407,59  
 glandula magnæ, dicitur 185,6  
 glandula ad ætatem longiori latioris et  
 fanguinioris 247,18  
 glandula: cur sunt maxime fluxionibus  
 eductæ 934,17, 992,51  
 glandula: bene sunt pates 110,19  
 glandula lingue adiacentes 270,50  
 glandula: maxime quæ sunt succum præ-  
 bent 407,41  
 glandula, molle dividit sublimibus  
 semper infertur 233,9
- glandula: infertur 225,33  
 glandula: nervi prædicitur 310,11  
 glandula: omnes in cibo sunt succus  
 394, 73  
 glandula: stabiliunt dispositiones usorum  
 310, 7  
 glandula: usorum dispositiones replent  
 350,1 49  
 glandula: usum sublimem fulera  
 120, 27  
 glandularum densarum & succarum, sit  
 bene fluxum & rararum ipsi ibid.  
 38  
 glandularum duplex genus ibid 36  
 glandularum duplex utilitas 110,33  
 316, 18  
 glandularum lingue, & maxime uti-  
 les 394, 9, 275, 38  
 glandularum natura duplex est 309,  
 51, 949,18  
 glandularum oculorum usus 270,46  
 Glos arguitur quam habet ut  
 1071, 15  
 Glos oculi oculorum casus 820,17  
 Glos ut 1075,62, 1130,10  
 Glosium & diaphanum ordinata, ex-  
 spirata & plegmatia sunt  
 945, 17  
 Glosium maribus cecitatem maxime  
 affert 368,15  
 Glos: betha quam uin habet 1076,1  
 Glos: ut coque quid 96,24, 151,62  
 Glosini confusio 118,11  
 Glos: caput: inter se ad omnia  
 salt cognoscit 435,60  
 Glos: duo ceteri minime 256,64  
 Glos: ut signi Hære uter 1161,42  
 Glos: utum sit ut  
 ibid. 8  
 Glos: utum ruptum usum a quibus  
 sunt 114,4,16  
 Glos: utum sunt  
 1076,19  
 Glos: utum sunt adhibita, ipsi reddi  
 meliora 1215,26  
 Glos: utum sit  
 1076,19  
 ¶ GOMPHOSIS quid 113,3  
 Gonorrhoea sit  
 695,43  
 Gonorrhoea, quid est cunctis 677,3  
 Gonorrhoea quoniam partum sit affert  
 779, 18  
 gonorrhoea quid 774,4  
 ¶ GRACILIS, liberaliter respici-  
 solent 78,28  
 Graciles deficientes maxime 684,56  
 graciles unde contrahuntur 48,59  
 gracilitatem corporis qua pulsa signifi-  
 cet 581,6  
 gracilitas casus 479,15  
 gracilitas remedia ibid. 19  
 Gradus excessum quatuor qui  
 18  
 Gradus facies 1066,39  
 Gradus quid 693,6  
 Gradus: ut subvertit fluxum  
 1251, 14  
 Gradus a altero in altero gignit  
 698, 19  
 Gradus unde 699,30  
 Gradus ut 1092,47  
 Gradus generatio 1071, 14, 116  
 Gradus in corpore præter naturam ob-  
 tentis, que loquuntur symptomata  
 775, 32  
 ¶ GULA ciborum ad ventriculum uti-  
 lis, 11  
 Gula efficitur, que parte cataplasma ad-  
 bibetur 940,20  
 Gula efficitur duo generis 761,2  
 Gula: cur tunc duplex sit data  
 762, 63  
 Gula: externa: tunc infertur omnia &  
 arguitur 85,22  
 Gula: cruditatis medicamentis efficitur  
 lævæ affert, & ligenda 801,20  
 Gula: inflammata: unde 761,14  
 Gula: paralytica que 616,1  
 Gula: juss 8528,763,51,940,24  
 Gula: inter degenerationem sit infertur  
 85, 37  
 Gula: uterque pars præloque 119,19  
 Gula: facies 1081,46  
 Gula: & trageantibus sit in oculis  
 & maxime 1119,10  
 Gula: uterque inflammationis que confert  
 81, 17  
 Gurgulio inflammato remedia feruntur  
 Archigenon 1137,13  
 Gurgulio: affert curatio secundum Hip-  
 pocratem ibid. 11  
 Gurgulio: sine columella: uti 276,  
 40  
 Gurgulio præcipuum pertinet utrum, pe-  
 dibus & pulmonem refrigerat  
 659, 14  
 Gurgulio: ad id quod partum affert  
 & utrumque aut utrum 670,46  
 Gurgulio: sensum a quibus affertur  
 672, 35  
 gustus bene malum affert quod succi con-  
 ferat 673,18  
 gustus que subicitur 1019,50  
 gustus quod proprium 890,14  
 gustus diffinitus, differentes: situlentis  
 non substantiis arguit 124,22  
 gustus quantitates que 1061,18  
 gustus saporis petipit 346,59  
 ¶ GYMNASIAVM uti quid  
 fuerit etiam 563,14  
 gymnastica deabus artibus infertur di-  
 versis 565,21  
 gymnastica ibid 9  
 gymnastica legitime ostendit 163,55  
 Gymphi facies 1122,18  
 Gymphi uterque ibid. 19
- H
- HABITU affertur quid dicitur  
 84,5  
 Habitudo: corporis definitio  
 & pulsa ut naturæ omnia 577,54  
 habitudo: corporis quoniam sunt san-  
 guinis influentia ferunt, & que dis-  
 pp y







[illegible]

tem in uno pulsa contragere, exami-  
nari 529,3  
inæqualitas in crebritate, raritate, se-  
cundum duos pulsus 524,59  
inæqualitas intermissa in uno pulsu  
merum præsentem annuntiat 594,  
19  
inæqualitas in uno pulsu quando accidit  
511, 40  
inæqualitas pulsus ab infusa materia  
517, 20  
inæqualitas pulsam iuxta accessiones  
quid inducat 599,10  
inæqualitas quantitatis dilatationis, di-  
versas arterie partes occupans 516,  
41  
inæqualitas firmitatis placentiarum ma-  
xime propria 516,15  
inæqualitas utrius pulsus æq. lateris inter-  
dum 594,3  
inæqualitas utrius pulsus, longi est quon-  
cellidius deterrit 591,16  
inæqualitas ex fluxu arterie causæ  
564, 19  
inæqualitatis motus in uno pulsu 524,13  
inæqualitatis utrius contentiones diffe-  
rentes 516,60  
inæqualitatis inæqualitas que nomenatur  
524, 59  
inæqualitatis inæqualitatis differentia  
521, 14  
Inanis duplex 438,15  
Incidentia faciliorem que habeant  
414, 48  
incidentia qualis esse debent 504,5,  
54  
Inclinatio corporis in anteriora, celeri-  
tatis motum movet 529,10  
Inclinatio omnibus infestis hominibus, ad  
appetenda bona, male propulsenda  
72, 25  
Incontinentes qui vocentur 529,45  
Incrementum seminis unde possit dignosci  
625, 9  
Incrementum morbi 717,3  
Incrementum morbi unde cernere opor-  
tet 625,17  
Inculpationem in omni genere cæteris  
ex regula præponatur 438,46  
Infectio ab ætate, natura, rege, anni  
tempore, et statu cæli, quando fini-  
tæ et diffinitionem habeatur 596,  
13  
Indicatio à simplicitate sumpta, curationem  
immutat 971,46  
Indicatio à febri sumpta, reliquis superior  
existit 896,17  
Indicatio à particulis sumpta necessaria  
941, 29  
Indicatio à viribus sumpta in plurimum die-  
rum febribus, maxime est momenti  
905, 54  
Indicatio à virtute curationis prima sumit-  
ur, non tamen curationem nos docet  
902, 31

Indicatio curationis à causa presente su-  
mitur 858,12  
Indicatio curationis generis dissimilis est uni-  
ca, videlicet contrarietas 903,19  
Indicatio intermarum partium omnium co-  
muni 861,12  
Indicationem conferentiam non sum ab  
effectibus 11,16  
Indicationes agnoscendum in putridis febri-  
bus unde petenda 904,53  
Indicationes à laborantis temperie sum-  
ptæ, diversam habent rationem ab il-  
lis, que ab ulcerum differentia sumi-  
tur 861,7  
Indicationes febrium diuturnarum, et æ-  
tæ, que pluribus diebus affligunt,  
unde sumuntur 896,13  
Indicationes in putridis unde sumende  
918, 45  
Indicationes medicatrices unde sumuntur  
902, 28  
Indicationes morborum corporum sum-  
ptæ sunt à duobus particulis 903,42  
Indicationes quæque sumuntur ab effectibus  
partibus 974,13  
Indicationes remissionem unde sumuntur  
914, 64  
In indicationibus contrariis expenden-  
de magnitudo corporis, que ad indica-  
tionem conferunt 896,15  
Indicationibus curationis una communis,  
compositum sit medicamentum 939,  
52  
Indicationibus inter se pugnantibus, quid  
in scopis indicationibus sit perpenden-  
dum 915,18  
Indicationum dignitates sunt affirmatæ  
902, 5  
Indicationum primarum sunt duæ diffi-  
rentiæ 851,14  
Indicatio quando à febre, et quando à fe-  
bris causa sumenda sit 904,17  
Indicatio quid 12,61, 84,5  
Indicatio remissionem à natura partis la-  
borantis de sumpta, est multiplex  
817, 47  
Indicatio utra ab effectibus causis in-  
vestiganda 57,14  
Indicatio utilis nulla, sumitur à causa non  
permanente 854,12  
Indoles et natura cæcis, et plethoricis in  
pueris et ætate, deinde in ætate, æ-  
tatem nature sue aptum docendum  
355, 21  
Industria exemplis validior 1022,7  
Industria sunt frigida et humida  
1056, 47  
Industria qualia medicamenta conveniunt  
977, 3  
Industria varie merendi rationes  
1003, 9  
Industria aduersæ calidis et siccis natu-  
ris 906,51  
Industria post unam sessionem cum magna  
dormi adhibenda 988,30

Industria, que symptoma inducit 988,8  
Industria ut curationis obliquemur, longum  
tempus desiderant, et æquale unum  
sum corpus inaniunt 985,13  
Industria et unæ sessionem finit circa  
unum eundem, et grum non esse usum  
pendant 919,13  
Industria longissimam ferunt, quibus cor-  
pus crudi succi redundat 927,  
60  
Industria non esse attendam in casu biliosis  
1204, 37  
Industria non, sed ceteris raritas curationis  
987, 48  
Industria, priusquam ceteris sit, nec materiam, nec  
humorem potest 937,35  
Industria triplex, ex ebullitione febri, red-  
dit acris 935,65  
Industria inueniunt, sed longo tempore, et illi  
periculo 985,41  
Industria longis quoque incommoda superan-  
tunt Ibid. 15  
Infantis sile, lacte nutriendus, dentes pri-  
mos erant dentes. 414,34  
Infantes cur glabri 5112  
Infantes medicandi ratio triplex 412,  
46  
Infantes natura propensi ad risum, ac  
et erit Ibid. 55  
Infantes ne incidant in urbenientes mo-  
tus, cæcandum 415,50  
Infantes quæque artibus quadruphon-  
isler gradibus 508,1  
Infantes quibus de casu placent 411,  
57  
Infantis aduersæ naturæ resistibili-  
tatem naturæ admodum esse inbecil-  
les 124,13  
Infantis naturam triplicem excogita-  
ri oportet 412,55  
Infans priusquam inuoluatur silem esse  
infrigidum 412,17  
Infans avertendum, licet et balneum 412,  
21  
Infantis corpus fricandum oleo dulci id est  
post longissimam somnum 414,37  
Infantis etas habet naturæ functiones  
multas ad benevolentiores, quæ reli-  
quæ etates 411,30  
Infantis educandi ratio 412,15  
Infantis etas apud Cæcos minor, primis  
æditi in lacum, demergitur in fri-  
gidum 414,61  
Infantis huius omnia recipiunt ornata  
tam à superioribus 617,8  
Infantis acribus expellentiis fa-  
cultatis causa 417,14  
Infiammata ab acerbis exasperantur  
1137, 19  
Inflammatio calidis est afflicta 715,20  
Inflammatio erysipelas que dicitur  
907, 64  
Inflammatione incipiente, repellentibus  
est attendam 1000,16  
Inflammationes diuersarum partium ma-  
gis

- ria symptomatica inducunt 574.4  
 inflammationes in alio corpore, cur me-  
 dicamenta actione possident, quon-  
 pro phlegmonos natura 940.  
 44  
 inflammationes non statim in principio  
 solvuntur 623.4  
 inflammationes omnes evacuationes ex-  
 sectat Erasistratus 937.6.4  
 inflammationes eris quod sunt 319.15  
 inflammationes quae excretionibus solent  
 612.  
 43  
 inflammationes quae febres faciunt, ut  
 phlegmon ex plenitudine sunt 922.  
 42  
 inflammationes quando se accendunt  
 973.  
 inflammationibus acutis eorumque est  
 immoderata caliditas 970.1  
 inflammationibus diversis in eadem de  
 parte quae phlegmatica continentur 1022.4  
 inflammationes cur albedines cataplas-  
 mata calida 859.17  
 inflammationes incipientes, urgentes et ac-  
 centas, quae curantur phlegmatica  
 121.  
 5  
 inflammationis causa et curatio 616.  
 14.7.5.25. 970.10. 971.50.  
 983.19. 1023.17. 1025.14.4.  
 1186.7. 1110.4.7  
 inflammationis causa una est siccitas  
 974.  
 39  
 inflammationis humida multiplex diffi-  
 cilis 970.15  
 inflammationis eris a sanguine induci-  
 tur ibid. 23  
 inflammationis prima differentia ibid. 6  
 inflammationis corporis quatuor quae  
 719.  
 54  
 inflammationis suppuratione congruere  
 cataplasma ex farina tritica, quae in  
 oleo et aqua bullierit 973.51  
 inflammationem circa menses acciden-  
 tem contingentibus causa  
 792.  
 59  
 inflammationem incipientem curatio  
 1212.  
 62  
 inflammatio quid 659.65  
 inflammatio seu phlegmon quid 925  
 inflammatio quomodo se habet superacuat  
 798.  
 62  
 inflammatio ab ordine quomodo differt  
 946.  
 15  
 inflammatio in iustitia quomodo curan-  
 de ibid. 58  
 inflammatio in iustitia quomodo differt  
 ibid. 22  
 inflammatio quae competit 1101.3.4  
 inflammatio scopi 946.19  
 inflammatio replicata 1216.15  
 inflammatio suppurans secundum formas  
 935.  
 54  
 inflammatio glandulae quoniam produci-  
 fuerit 315.61  
 inflammatio, ex optima sen-  
 guine fit 616.10  
 ingurgitatorum cibo distenta et systole  
 qualis 509.14  
 iactum a natura constitutum, eorum dis-  
 positionem a seipso fieri 339.47  
 iactum dilatationis arteriae, et contra-  
 ctum finis, cur nervus sensum effu-  
 giat 545.35  
 iactum inactionis optimus quod sit  
 159.  
 9  
 iactum morbi quod sit 609.17  
 717.  
 5  
 iactum arteriarum minus si quidam inferri-  
 bus non 147.62  
 insalubre corpus simpliciter quod sit  
 814.  
 22  
 insalubre corpus et nunc, quod sit ibid.  
 25  
 insalubria quae dicuntur 815.17  
 insalubria signa quae 815.17  
 insalubria simpliciter facile a morbis  
 casu superantur 816.6  
 insalubres communiter collocantur in te-  
 neris 16.8  
 insensibiles fundementum est omnium  
 expulsiuum 426.5  
 inseparabiles sunt ab omni latente tem-  
 perie et fluxum per quod mobile est  
 per motum 490.51  
 insensibilis qui degant 704.17  
 insensitia quae, quae bonos refrant  
 651.  
 49  
 in in acriis considerandis, quoniam ratio  
 sit habenda 651.16  
 ex insensitia quae corporis dispositio co-  
 in duri deprehenditur 652.47  
 insensitia composita difficultates sunt  
 numero quatuor, itidem similiter ex-  
 perandi 491.48  
 inspiratio expirationi contraria 101.45  
 inspiratio expirationis quomodo contin-  
 get 1250.8  
 inspiratio si liberace dilatata: expiratione,  
 eodem depresso 647.12  
 inspiratio in cerebrum ad usum necessa-  
 ria 25.450  
 inspiratio libera 112.22  
 inspiratio maxima fit externis interco-  
 stalibus muscularibus 1023.10  
 inspiratio quod efficitur ibid. 47  
 inspirationes ab exhalante spiritus quales  
 491.  
 1  
 inspirationes angustissimas et decrevis-  
 sime quales 493.18  
 inspirationes ob caloris excessum quales  
 ibid. 1  
 inspirationes ob immodicam frigus, qua-  
 les ibid. 2  
 inspirationis cum expiratione cellatio  
 492.  
 55  
 inspirationis duplex refractione 677.7  
 inspirationis magnae et velox causa  
 497.  
 49  
 inspiratio omnis modis 1291.6  
 inspirationis praeviatione desinit et ut  
 lectus sequitur, si facilis robustus sit  
 494.10  
 inspirationis usus 251.56. 491.12  
 inspiratio quid 122.12  
 inspiratio parva finalis et velox 497.  
 17  
 inspiratio subtilis quae sit dista 757.35  
 inspiratio refrigerat motum calorem, ex-  
 pectat eundem purgat 508.6  
 inspiratio, velox et est utilis 351.18  
 instrumenta inactionis sunt duo, ratio  
 et experientia 241.49. 846.19  
 instrumenta inactionis et experientia  
 sunt duo 849.19  
 instrumenta indicandi sunt octiduo  
 sunt a natura data, ratio et experien-  
 tia quoniam aliter aliter semper  
 indiget ope 1245.10  
 instrumenta nutritioni servata, natura  
 711  
 50  
 instrumenta prima quae dicuntur 657.  
 61  
 instrumenta quibus omnia inactione  
 degunt sunt duo, ratio et experien-  
 tia 11.62  
 instrumenta quomodo sunt continentia  
 572.  
 46  
 instrumenta secunda quae dicuntur 658.  
 instrumenta singula geruntur habent su-  
 caliditatem 814.2  
 instrumenta sordida quando accidunt  
 618.  
 22  
 instrumentorum externalium extrinsecu-  
 ti deservuntur duplex ratio 1292.  
 65  
 instrumentorum morbi 694.2  
 instrumentorum naturalium et animalium  
 deservuntur 710.1  
 instrumentorum naturalium singulorum  
 deservuntur attribuantur symptomata  
 666.  
 47  
 instrumentorum singulis inest unica par-  
 ticula, cum tota esse tribuitur 662.  
 21  
 instrumentorum vitia quomodo bene qua-  
 les pulsus efficiunt 660.14.  
 instrumentorum actum vel integritas ob  
 magnitudinem, numerum, figuram et  
 consistit 21.40  
 instrumentorum molle facile dilatur, non  
 ita quoniam densum 556.12  
 instrumentorum primum unius functionis  
 gratia conditum 573.2  
 instrumentorum quid 842.4.6  
 instrumentorum totum pluribus attribuitur  
 sufficit 251.12  
 intellectus et memoria ad omnes artes  
 necessariae 1291.7  
 intellectus intelligibilem index est  
 312.  
 57  
 intellectus temperari sequitur 256.51  
 intellectus parvi auditus 703.6  
 intemperantia frigida capiti et nervi-  
 bus quomodo succurrunt 480.  
 33



intemperantie partium sunt octo, quae  
per contrarias qualitates reducenda  
sunt ad mediocritatem 124,9,3  
intemperantia quando ad melius sunt tra-  
ducenda, & quando sic contrarian-  
da 81,62  
intemperantiarum genus est duplex  
119,  
intemperantiarum quae magis sunt febre-  
bus obnoxiae 89,1,15  
intemperantibus cur non sit medicandum  
99,1,  
intemperantia calida frigidaque sunt  
per contraria curanda 475,1  
intemperantia quodvis facilius ad pro-  
priam naturam reduci, quam ad im-  
peramentum optimum 474,20  
intemperantia sola alteratione sanantur  
81,4,  
intemperantia equalis & inaequalis discri-  
men 61,5  
intemperantia calida symptomata 767,  
18  
intemperantia differentiae 904,9  
intemperantia inaequalis differentiae, natu-  
ram afflictorum corporum sequuntur  
61,  
intemperantia summatim nota quae 49,56  
intemperantia calida & humida maxime  
potius morbi est obnoxia 89,4,  
61  
intemperantia calida & sicca ad febres ex-  
cipienda opportunissima 895,18  
intemperantia collata ad causam esse sunt  
41,  
intemperantia dolorem inferi 731,63  
intemperantia dum sunt in acie, contrariis  
corrigenda: ut si uideatur humilior,  
dum sibi uacare non possunt 472,6  
intemperantia & qualis cur nullo effusio de-  
bet 679,13  
intemperantia est duplex 125,4,47  
intemperantia est summatim & morbi 49,  
52  
intemperantia frigida & humida quando  
ad uicinia uocatur 195,16  
intemperantia humida omnium facillime cu-  
ratur 885,49  
intemperantia inaequalis, dolores portant  
679,  
intemperantia inaequalis quae sit dicenda  
661,  
intemperantia inaequalis quae tripliciter con-  
tingat 61,60  
intemperantia morbi quae 49,51  
intemperantia omnis natura inel effusio facili-  
tati 677,51  
intemperantia omnis, morbus est 667,  
46  
intemperantia per contraria curanda 818,  
21,  
intemperantia primum morborum causa,  
& quare 79,43  
intemperantia quae intra summatim finem con-  
sistunt, per acta quod contraria possunt

lani per labores aut similia 474,9  
intemperantia sanata quae 49,54  
intemperantia siccata solidam aliquam sold-  
partem occupantes, nunquam integri  
sanantur 18,60  
intemperantia siccata in aegris est, quod simili-  
tudo in sanis 88,17  
intemperantia simplici per contrarias qua-  
litates curantur 976,16  
intemperantia uiciorum omnis uirtus deli-  
cit 685,10  
intemperantia uentris à quibus gignatur  
487,  
intemperantia uisita quando seruanda, &  
quando deridenda 915,28  
intemperantia una per se durare diu non  
potest 471,14  
intemperantia circa salubrem & insalubrem  
sunt qualitas & quantitas & igran-  
dorem 810,14  
intemperantia uiciorum concordia diffundit-  
ur sunt, quoniam caro 409,1  
intemperantia ob ciborum inopiam neminem  
97,  
intemperantia nullum animal potest, nisi cor à  
morte agendi cesset 1016,40  
intemperantia modi sunt quatuor 801,61  
intemperantia arteriarum periculis est aliis  
inaequalitatibus cunctis 189,10  
intemperantia in pulsibus sit ne naturalis,  
an non, quomodo dignoscenda 651,  
36  
intemperantia quid uocetur 611,14  
intemperantia singulae, quarum par-  
tem lesiones comitentur 917,  
27  
intemperantia secundum uide mouetur  
851,  
10  
intemperantia femorum quid sanet 121,  
12  
intemperantia quid sanet 1101,64  
intemperantia ad distributionem condita  
119,  
intemperantia ex ossa sanata sunt facilia: tenui-  
ta, difficilia 876,8  
intemperantia quae uariis inuoluta 215,55  
intemperantia, naturae instrumenta sunt 102,  
21  
intemperantia nec attrahere nec retinere ne-  
cessum est 119,13  
intemperantia non intelligit transire facultate  
119,  
intemperantia non trahunt à uentriculo 771,  
48  
intemperantia sola duabus consistit tonis, qua-  
rum singulae ex fibris transversis con-  
sistunt 86,4  
intemperantia suprema, cibo & potu infima  
difficilis curantur 716,53  
intemperantia terrae, sive lumbri quid uim ha-  
beat 114,1,43  
intemperantia crassi dolor ut diguoscenda  
711,  
intemperantia cur duplex sit notia 180,18,  
214,15, 101,44, 912,5

intemperantia dolentibus quae opulentior  
101,  
intemperantia exidentibus per abdominis uul-  
nus, quid agendum 875,1  
intemperantia exaceratis quomodo sananda  
861,21  
intemperantia inest alicui expellendi infirmitas  
688,  
intemperantia superioribus uel inferioribus ex-  
aceratis, quomodo sananda 88,  
769,  
intemperantia aliquo ualente quid agendum  
876,  
intemperantia curatio facilius aliorum in-  
teritum partium, & cur 704,  
14  
intemperantia dolores ubique sunt, inuen-  
tur à bobus & per sident iniectione  
diagnosticis 975,12  
intemperantia doloris causa 770,12  
intemperantia fibrarum periculis circularis  
180,  
intemperantia menses lenientia 894,  
21  
intemperantia natura & ardo 180,42,  
115,50,  
intemperantia obnoxia distributionis gra-  
tia solia 115,17  
intemperantia substantia non medius à  
uentriculo differt 121,49,  
intemperantia uiciorum alicuius quae ratione me-  
dicandum 869,12  
intemperantia utraque tonica uillos habet  
transversos 119,46  
intemperantia rectum 178,4  
intemperantia rectum quibus inuitatur  
101,  
intemperantia quae propinqua non sunt 861,  
38  
intemperantia in frons facilius 117,43  
intemperantia organa sunt duo, ratio & ex-  
perientia 989,48  
intemperantia dolor ex alicuius bonis 414,18  
intemperantia primum uiciorum ferdissimum  
414,  
I R A, caloris lecta cor est frigus  
660,  
Iracundia naturae quae 81,10  
Iracundia dum sit timor est aduersa,  
pulsus inaequales efficit 860,6  
Iracundia comites pulsus qui 884,  
64  
Iracundia quae superuenit 315,15  
Iracundia est uicium uiciorum caloris frigus  
860,  
Iracundia uis 475,10  
Iracundia ignem reddit calorem infirmum  
71,  
Iracundia à natura esse tribuitur ratio-  
ni contra cupiditatem 315,61  
Iracundia caloris abundantia erigit  
71,  
Iracundia esse alicuius & effe-  
ctum, secundum uarias animae partes  
316,  
Iracun-

## I N D E X.

transmissa quibus sit existenda 342.

35

transmissa quid Ibid. 39. 78. 165

transmissa si naturaliter habetur, oportet  
nec rationis sequitur 36. 14

transmissa si non nec potest, et tunc re-  
prehenditur a nobis 42. 14. 49

transcurrit necesse perit 61. 13

transcurrit perit extremis casibus 68. 1

58

transcurrit refrigerato, prudenter iudi-  
cia sumitur 42. 14

transgressus impetus nihil ab infamia de-  
fert 42. 15

transgression deformitas Ibid. 37

transmissus ferret calor in corde 44. 4

24

transgressus cuius sit facultas 108. 37

transcurrit quid 166. 19

transmissionem animae partium trans-  
missiones spiritus esse rationalem au-  
tem, solus rationis natura 33. 4. 10

transmissionis capitis dolores que con-  
suevit 110. 4. 13

transmissus utrumque quam anim possidet 108. 2

45

transmissionem Andromachi 231. 5

transmissionem urgente, acutus non est attendit  
ante transmissum corpus 126. 13

transmissionis quid proficit 108. 1. 108. 3

40

transmissionis calapsioma 117. 13

transmissionis confert uena scilicet in cubito,  
et nomas 126. 17

transmissionis que medicamenta in principio  
consuevit Ibid. 13

transmissionis a sanguine orta, si scilicet poplite  
uena curatur 99. 17

transmissionis rursus orta a sanguine: si autem  
ortus, quomodo curatur 116. 17

transmissionis naturalem suum fluxum cohibet  
67. 6

transmissionis quid et quando accidit 77. 3

27

transmissionis quoniam sit symptoma 69. 37

77. 3

transmissionis Epigoni, ad media medicamen uide  
117. 6

53

transmissionis a lapsu aëris et compositione 117. 3

12

transmissionis aëris 254. 58

transmissionis compositionis, et nota 172. 6

transmissionis aëris, genere est duplex 104. 3

47

transmissionis aëris, infusa uel in uertice,  
periculis, obsecra, mala: absque  
forma, uita, manifesta et bona dicitur  
60. 7. 59

transmissionis morborum diuturnorum et  
pauca constitutione, est aëris 619. 17

17

transmissionis diffinitione uarie 607. 19

transmissionis que in morbis aëris, fluenti-  
bus, et complicatis 7. 13

transmissionis fieri per sensum, infirmum,  
et facultates infirmum uicinas 15. 2

transmissionis morbi ex parte in aquas, infirmum,  
fieri 609. 63

transmissionis morborum, acutorum ex natura  
diuturnum, infirmum, longum ex parte  
fieri 617. 1

transmissionis que in aëris, fieri, quibus  
dicitur fieri tribuenda 610. 10

transmissionis fieri et fieri cognoscere ad  
quid proficit 614. 5. 4

transmissionis rationis sensum, infirmum, atque  
calorem diffinitionem 10. 14

transmissionis naturae infirmum, que con-  
suevit communis adfert 15. 1. 46

transmissionis naturae singula infirmum et  
transmissionis tot diffinitione, quod diuturnum  
decretorum 707. 49

transmissionis rationis intellectus, perfectum  
lente sumitur 10. 18

transmissionis rationis, que ostensione cognoscitur  
fuerit, uide 10. 10

transmissionis aëris consideratio 13. 16

transmissionis uicinas 14. 1. 1

transmissionis uicinas consideratio 14. 5. 4

transmissionis consideratio 116. 14

transmissionis latus faciles 110. 17

transmissionis quadrati faciles 109. 16. 4

transmissionis fructus faciles 12. 59. 2

transmissionis albi compositionis 464. 14

transmissionis albi condimentum 400. 60

transmissionis albi album 195. 1

transmissionis aëris concharum, atque anno-  
serum galinaceorum, diuturnum subdi-  
tunt 416. 13

transmissionis diuturnum proprium 27. 35

transmissionis aëris ex symmetria matris tri-  
sumae partium 44. 5. 1

transmissionis que pallo percipiunt ex an-  
drogma 12. 61

transmissionis per indicationem patet 12. 44

transmissionis aëris florentibus fellis, uita-  
litas, atque bariditas carnes congrue-  
re 192. 15

transmissionis aëris florentibus fellis, uita-  
litas, atque bariditas carnes congrue-  
re 192. 15

transmissionis aëris florentibus fellis, uita-  
litas, atque bariditas carnes congrue-  
re 192. 15

transmissionis aëris florentibus fellis, uita-  
litas, atque bariditas carnes congrue-  
re 192. 15

transmissionis aëris florentibus fellis, uita-  
litas, atque bariditas carnes congrue-  
re 192. 15

transmissionis aëris florentibus fellis, uita-  
litas, atque bariditas carnes congrue-  
re 192. 15

transmissionis aëris florentibus fellis, uita-  
litas, atque bariditas carnes congrue-  
re 192. 15

transmissionis aëris florentibus fellis, uita-  
litas, atque bariditas carnes congrue-  
re 192. 15

transmissionis aëris florentibus fellis, uita-  
litas, atque bariditas carnes congrue-  
re 192. 15

transmissionis aëris florentibus fellis, uita-  
litas, atque bariditas carnes congrue-  
re 192. 15

transmissionis aëris florentibus fellis, uita-  
litas, atque bariditas carnes congrue-  
re 192. 15

transmissionis aëris florentibus fellis, uita-  
litas, atque bariditas carnes congrue-  
re 192. 15

transmissionis aëris florentibus fellis, uita-  
litas, atque bariditas carnes congrue-  
re 192. 15

transmissionis aëris florentibus fellis, uita-  
litas, atque bariditas carnes congrue-  
re 192. 15

transmissionis aëris florentibus fellis, uita-  
litas, atque bariditas carnes congrue-  
re 192. 15

transmissionis aëris florentibus fellis, uita-  
litas, atque bariditas carnes congrue-  
re 192. 15

transmissionis aëris florentibus fellis, uita-  
litas, atque bariditas carnes congrue-  
re 192. 15

transmissionis aëris florentibus fellis, uita-  
litas, atque bariditas carnes congrue-  
re 192. 15

transmissionis aëris florentibus fellis, uita-  
litas, atque bariditas carnes congrue-  
re 192. 15

transmissionis aëris florentibus fellis, uita-  
litas, atque bariditas carnes congrue-  
re 192. 15

transmissionis aëris florentibus fellis, uita-  
litas, atque bariditas carnes congrue-  
re 192. 15

transmissionis aëris florentibus fellis, uita-  
litas, atque bariditas carnes congrue-  
re 192. 15

transmissionis aëris florentibus fellis, uita-  
litas, atque bariditas carnes congrue-  
re 192. 15

transmissionis aëris florentibus fellis, uita-  
litas, atque bariditas carnes congrue-  
re 192. 15

transmissionis aëris florentibus fellis, uita-  
litas, atque bariditas carnes congrue-  
re 192. 15

transmissionis aëris florentibus fellis, uita-  
litas, atque bariditas carnes congrue-  
re 192. 15

transmissionis aëris florentibus fellis, uita-  
litas, atque bariditas carnes congrue-  
re 192. 15

transmissionis aëris florentibus fellis, uita-  
litas, atque bariditas carnes congrue-  
re 192. 15

transmissionis aëris florentibus fellis, uita-  
litas, atque bariditas carnes congrue-  
re 192. 15

transmissionis aëris florentibus fellis, uita-  
litas, atque bariditas carnes congrue-  
re 192. 15

transmissionis aëris florentibus fellis, uita-  
litas, atque bariditas carnes congrue-  
re 192. 15

transmissionis aëris florentibus fellis, uita-  
litas, atque bariditas carnes congrue-  
re 192. 15

transmissionis aëris florentibus fellis, uita-  
litas, atque bariditas carnes congrue-  
re 192. 15

transmissionis aëris florentibus fellis, uita-  
litas, atque bariditas carnes congrue-  
re 192. 15

transmissionis aëris florentibus fellis, uita-  
litas, atque bariditas carnes congrue-  
re 192. 15

transmissionis aëris florentibus fellis, uita-  
litas, atque bariditas carnes congrue-  
re 192. 15

transmissionis aëris florentibus fellis, uita-  
litas, atque bariditas carnes congrue-  
re 192. 15

transmissionis aëris florentibus fellis, uita-  
litas, atque bariditas carnes congrue-  
re 192. 15

transmissionis aëris florentibus fellis, uita-  
litas, atque bariditas carnes congrue-  
re 192. 15

transmissionis aëris florentibus fellis, uita-  
litas, atque bariditas carnes congrue-  
re 192. 15

transmissionis aëris florentibus fellis, uita-  
litas, atque bariditas carnes congrue-  
re 192. 15

transmissionis aëris florentibus fellis, uita-  
litas, atque bariditas carnes congrue-  
re 192. 15

transmissionis aëris florentibus fellis, uita-  
litas, atque bariditas carnes congrue-  
re 192. 15

transmissionis aëris florentibus fellis, uita-  
litas, atque bariditas carnes congrue-  
re 192. 15

transmissionis aëris florentibus fellis, uita-  
litas, atque bariditas carnes congrue-  
re 192. 15

transmissionis aëris florentibus fellis, uita-  
litas, atque bariditas carnes congrue-  
re 192. 15

transmissionis aëris florentibus fellis, uita-  
litas, atque bariditas carnes congrue-  
re 192. 15

transmissionis aëris florentibus fellis, uita-  
litas, atque bariditas carnes congrue-  
re 192. 15

transmissionis aëris florentibus fellis, uita-  
litas, atque bariditas carnes congrue-  
re 192. 15

transmissionis aëris florentibus fellis, uita-  
litas, atque bariditas carnes congrue-  
re 192. 15

EPITOMES GALENI

lac non succulare est 1016,46  
 lac minimum animum efficitur 1047,27  
 lac oniar thoracis ac pulmonis partibus prodit 106,37  
 lac coarctum facillime alteratur 112,61  
 lac optimum quale 106,36, 101,56  
 lac optimum optimi est succi 106,37  
 lac quibus animalibus colligi in pretere nequeat 129,43  
 lac quibus modis scindatur 129,43  
 lac quibus nocet 106,39  
 lac quibus sit exhibendum 469,50  
 lac quomodo in alienis qualitates mutetur 1047,46  
 lac sanatur pulmonis ulcere 407,46  
 lac ferri plurimum habet, nihil obest 106,31  
 lac si in aere aliquandiu immoretur, mutatur prompte 101,31  
 lac fluitum ubi est multum haerendum 406,26  
 lac tabianum 869,62  
 Lactarius non purgatur 106,31  
 Lactarius ad accretum absterendum, et quare 414,14  
 Lactis ubi sit 129,56  
 Lactis mensuris quod gignendū radem et alibi et medicus ratio desideratur 106,31, 36  
 Lactis quando mel et sal intremiscunt 870,9  
 Lactis comoda 469,33  
 Lactis crustosus facilius 406,19  
 Lactis differentia 105,47, 406,13  
 Lactis elaborationis quae conferunt 129,65  
 Lactis et mestrurorum una est substantia 986,17  
 Lactis et senilis effluere facultas 106,31, 61  
 Lactis generationem quae prohibent 106,31, 18  
 Lactis gignendi ratio 106,31, 6  
 Lactis in ventre corrupti nota 912,29  
 Lactis medicis usus comendissimus uteribus usus contra e 1217,43  
 Lactis maxime quae corrigunt 106,42  
 Lactis optimi nota 414,24, 112,52  
 Lactis partes quae magis, et quae minus alunt 109,11  
 Lactis feraci facultas 406,18  
 Lactis ferro usi sunt uteris ad delinendum alunt 106,32  
 Lactis ferum alium mouet 406,29  
 Lactis ferum quomodo uim habeat 112,22  
 Lactis substantiae caesae facultas ibid, 18  
 Lactis subtilitatis diversae 127,4  
 Lactis subtilitatis triplex 406,12, 112,15  
 Lactis temporis 106,31  
 Lactis utriusque notae 414,27  
 Lactis usus 112,57, 112,36

Lactis usus aliusmodi uocet deinde ac glaciatus 106,40  
 Lactis usus uti uim et commone praecipuum 870,46  
 Lactis et facultates 109,32, 103,4  
 Lactis et ferum superferunt 415,6, 938,40  
 Lactis succi liberaliter sumptus facit lrem non papaueris succo facultatem fortior 109,45, 103,51  
 Lactis succus si integre ad cor peruenit ret, peremerit non ferus ac cicuta 103,61, 28  
 Lactis refrigerat et est somniferus 107,31  
 Lac uacuum dysentericus solum 117,4, 59  
 Lac ut in nidorem uel in aeternum uertitur, caloris ratione 106,57  
 Lac utilis aduenti retremiscendum 129,42  
 Lactari ex uino triti uires 117,4, 2  
 Lactari facilius 1087,39  
 Lactatione esse sordes ab hircorum hauris dispersas 1193,31  
 Lactetia et corruptione corpus generare sunt duplicia 419,2  
 Lactis diffunditur calor per totum corpus 57,2  
 Lactis, medium inter coarctum et comatum 121,31  
 Lactis, quibus sunt exasperanda 816,25  
 Lactata ex aceto sunt subtiliora: ex uino magis cicatricem obducunt 117,4, 30  
 Lactopus cuius sit facultas 1097,33  
 Lactina plumbae lumbis haerens, facit coarctum ne thumet ueneris imaginationes 483,31  
 Lactopos facilitas 1092,40  
 Lactum acendi ratio 1109,45  
 Lactis fuerit quomodo uim habeat ibid, 17  
 Lactis uita quomodo uim habeat ibid, 41  
 Lactis et oxylapathi uires 1092,43  
 Lactis uel hirci et gressu facultas 118,37  
 Lapidis atris flammam edunt 57,6  
 Lapidis omnes fieri 1120,10  
 Lapidis quid frangat 1066,47, 1067,33, 1073,2, 1047,18, 1099,4  
 Lapidis in uesica canthio 835,57  
 Lapidosa abluendi ratio 1024,54  
 Lapis diaphani quomodo facultatem habeat 1170,37  
 Lapidosa omnia quae abluunt, sub ardore si sole sunt ex humore aliquo laetigenda 1151,3  
 Laryngem alio partibus colligentes musculis 1045,32  
 Laryngis cartilaginei muscoli conueniunt 1044,49  
 Laryngis cartilaginibus inesse duplicem actionem et motum 125,10  
 Laryngis cartilaginei sensiferius positus 1244,5

Laryngis membris et compositis 111,5  
 Laryngis muscoli 100,45  
 Laryngis musculi decem 125,10  
 Laryngis musculi unde sunt nervi recedunt 127,2  
 Laryngis musculosorum sinus et posuunt 111,20  
 Laryngis nervi omnes sex 150,60  
 Laryngis nervorum retremiscendum consistens 127,28  
 Laryngis secunda cartilago 124,4, 8  
 Laryngis tertia cartilago arylea notis ibid, 24  
 Laryngis tribus cartilaginibus decem musculi conueniunt 125,9  
 Larynx 101,19  
 Larynx cui non est simplex cartilagineus coarctat 124,4, 4  
 Larynx ex tribus constat cartilaginibus, mortuorum a propriis duodecim musculis 124,4, 311,28  
 Larynx instrumentum uocis, qui si eripiat fluxionem, illam potest aduocare 479,5  
 Larynx sursum trahitur larynx, quomodo gula deorsum 84,62  
 Larynx transfigantibus nobis rimant ad faciem 124,4, 36  
 Larynx uocis principissimum instrumentum non 150,17, 124,56, 129,2, 8  
 Laryngis facilius 1106,19  
 Laryngis granati omnes boni succi cibum possulant 451,33  
 Laryngis spem nata, morbos deuocant 454,62  
 Laryngis diffundit qualem repleatur remedia 1023,32  
 Laryngis doloris tollendo apostemum medicamentum quod 118,16  
 Laryngis phlegmonose uel a uice conueniunt 464,35  
 Laryngis quassantis remedium 451,4  
 Laryngis si uel a uice remedium ibid, 12  
 Laryngis uel a uice remedium 450,5, 4  
 Laryngis tres aliae differentiae oriuntur ex tribus primis, dum hinc inter se repulsi ac septima, dum in unum simul omnes tres coarctant 451,24  
 Laryngis uel a uice causa 682,45  
 Laryngis uel a uice causa 450,2  
 Laryngis uel a uice causa 450,34, 451,27  
 Laryngis uel a uice causa quae frigiditas conueniunt 450,36  
 Laryngis triplex potestati ori frigus 680,3  
 Laryngis uel a uice quae conueniunt motus ac frigiditas 450,44  
 Laryngis uel a uice quae conueniunt quidem 451,30  
 Laryngis uel a uice quae conueniunt in uociferum 449,62  
 Laryngis 449,62

## I N D E X.

lasiendo concessoria quid est quando sentitur 450, 14	lasiendo concutens 610, 12	lasiendo in quibus sit quies solvenda 451, 43	lasiendo interdum lasitudine solvitur ibid. 40	lasiendo plegionensis unde contrahitur 455, 34	lasiendo quod plegionensis sensum infert curator per sanguinis mistionem usque ad aeternam deliquitum 464, 1	lasiendo quousque que corpora pluri- mum infert 451, 13	lasiendo quid 1005, 14	lasiendo spontanea que 455, 12	lasiendo spualia 450, 11	lasiendo transita quando accidit 450, 9	lasiendo transita spontanea que 630, 7	lasiendo transita superuenit plicioribus 455, 33	lasiendo ulcrosa in que corpora maxi- mi cadit 450, 12	lasiendo ulcrosa magis accitit motus quid quiescentibus 680, 11	lasiendo ulcrosa non ex abundantia na- scitur 455, 29	lasiendo ulcrosa que 610, 10	lasiendo ubi cito durare 987, 4, 1	lasiendo dolores immiterates quid prae- sent 1049, 60	lasiendo quid motus 733, 7, 841, 4, 4	lasiendo motus quando in pulsu obse- ratur 833, 40	lasiendo nascuntur inuenit Galenus 169, 59	lasiendo 263, 5	lasiendo frigida ubi periculis sit quid causa 45, 11	lasiendo frigida usque, medietate quid seperius attingit 449, 4	lasiendo frigida comoda 449, 15	lasiendo 40	lasiendo frigida nova unde descendit 449, 54	lasiendo frigida tempus, et quoniam sterium apertum ibid. 17	lasiendo solutorem uires 1077, 3	lasiendo uires 1139, 65	lasiendo inmodice, et olenti rabur, et parturientia facilitatem 976, 2	lasiendo plenis et cacochymis adnotat fluxum ad effluas partes concludit 1152, 46	lasiendo prorsus uires 1056, 66	lasiendo ubi sunt, et quomodo 1056, 59	lasiendo ita comitatur uires 9, 15	lasiendo causa 963, 14	LI G V M I N A epulapicis que con- minant 1007, 15	legumina omnia fruges, conuoluta sunt difficilia 375, 50	legumina differantur uires 1113, 42	legumina rubra 1113, 37	legumina quid prorsus 1087, 61	legumina interdum a cacochymis uires, mardacia effluunt 1014, 40	legumina per se, ab his, que ex accidenti ad faciunt, quomodo iudicis distinguan- tur 1014, 14	Lenon 193, 44	Lenis aduersatur qui recondunt crasso ac melancholico succo 375, 30	lenis bus colla supprimit uirescentem fluen- tem corroborat 575, 14	lenis largius sumpta elephobentia et ed erit ualida 275, 59	lenis pifana inuicta, optimam edulcora- tione 113, 15	lenis quibus possit usui esse 113, 11	lenis usum integren debet 113, 11	lenes quam uires habeant 409, 45	416, 5	Lenitudo paftris qualitas 1112, 11	lenitudo uirescentem soluit et sistere po- test, sed diuersa ratione 181, 9	Lenitudo facultas 1109, 6	lenis et brachia deorsum ducent sub- ducere ipsa autem corpora sistere 368, 46	lenis sustinentia et succus quidatem in ut si contrarietatem habent 375, 10	Lenis natura 194, 17	Leontopodi facultas 1095, 55	leuonissa omnia medulle expertia 210, 31	Lepidensis natura 151, 45	Leprosi prorsus causa 681, 46	leprosi quid sunt 1103, 22	Lepus marinus pulmentum exalcerat 1174, 13	Leptogi causa 69, 57, 56, 50, 577, 11	605, 30	Leptargicorum febres sunt tepidae 1157, 53	Leptargus est effectus contrarius pterni- tati 945, 19	Leptargus, letalior morbus prorsus 116, 576, 56	Leptargus quid 942, 5	Letalia haud omnia sunt deleteria 1231, 45	Leucanthi aet 1091, 65	Leucalis facultas 113, 61	Leucay facultas 1091, 5	Leuiores expeditus obsequantur trahen- tibus 118, 68	LIBANOTIDES sunt uires 1094, 31	liberandum facit 113, 12	Libidinosorum quidam qualis 780, 17	Libido qua ratione cognosci queat 412, 62	Libido reddit benignam belis agrefibus similem 412, 57	Libra constat drachmis magnae sex 115, 4	libram constituent aetate duodecim 1190, 14	libram mensuram olei, continere uires decem ponderales, Galenus experit 1190, 14	libra 1151, 3	Librario solida, mensuratur buncida 115, 1	librariamento eruditorem quendam 370, 51	libram de natura feruor, dubitatur fuisse Hippocratis 111, 5	Librari facultas 1091, 56	Libraria exacerbat medicamentum feruor 111, 5	libraria medicamentum exacerbat 111, 56	librari a quibus buncibus signatur, et quidam medicamenta desiderant 115, 1	librari uires 1091, 55	libraria remedia Critici 111, 56	Libra 111, 56	libra affluat buncis sic ut uires in funi- bus et in uires et uires et uires 996, 18	libra ab omni melancholico succo nec sit in uirescentibus 113, 11	libra et uires, corpus mouet, et contra- rio 80, 47	libra et uires utitur alimento quid bunc 904, 6	libra et uires utitur sanguine 704, 59	768, 41	libra et uires utitur 115, 50	libra et uires, que accidit 80, 41	libra et uires, que uires sunt fecan- de 974, 55	libra et uires melancholicus feruor 113, 11	80, 11	libra et uires obstruita quid libere 1101, 2	libra et uires quid discit 977, 18	1068, 36	1069, 51	1084, 11	1101, 11	libra et uires longitudo, sanguis facit ut per corpus digeratur 1106, 1	libra et uires quid medietate comitatur 911, 11	libra et uires multas atque magnas esse tribuit 113, 4	libra et uires astringentibus uires con- uolunt 1160, 3	libra et uires cataplasmatum Ascle- piadis 1160, 55	libra et uires locis repurgat sangui- nem a melancholico succo 1190, 11	1180, 54	111, 5	libra et uires si buncis uires inter au- mentum et medietatem dignum iustitiam mouet 104, 11	libra et uires Antromachi 1160, 11	libra et uires Asclepiadis 1160, 17	libra et uires optima Antigenis 1161, 10	libra et uires peritiam quomodo occurrat 113, 11	libra et uires distanti comitatur 977, 11	libra et uires medietatem 919, 55
----------------------------------------------------------	----------------------------	--------------------------------------------------	---------------------------------------------------	---------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------	------------------------	--------------------------------	--------------------------	-----------------------------------------	----------------------------------------	-----------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	------------------------------	------------------------------------	----------------------------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------------------------	--------------------------------------------	-----------------	---------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	---------------------------------	-------------	-------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------	----------------------------------	-------------------------	---------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------	----------------------------------------	------------------------------------	------------------------	-------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------	--------------------------------	---------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	--------	------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------	---------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------	----------------------	------------------------------	---------------------------------------------	---------------------------	-------------------------------	----------------------------	-----------------------------------------------	---------------------------------------	---------	--------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	----------------------------------------------------	-----------------------	--------------------------------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------------------------------	---------------------------------	--------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	---------------------------------------------	------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------	-----------------------------------------------	---------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------	---------------------------	--------------------------------------------------	-----------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------	----------------------------------	---------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	----------------------------------------------------	----------------------------------------	---------	-------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------------------------	---------------------------------------------	--------	-------------------------------------------------	------------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------	----------	--------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------------	-----------------------------------------------------	-------------------------------------------	-----------------------------------

lenis quoniam hepatis vitia, nigrescent red- dunt colorem 766, 17	obitus 175, 4	Liquorem ex cinere quantum habet 1122, 49
lenis, sublimis 111, 60	linguae duo nervorum genera adfunt 110, 51	litionis in spongia applicatum, ex- ternarum partium status discuit 946, 18
lingua apus 407, 7	linguae duplex 160, 17, 175, 10	livum quid 1040, 66
lingua ad aff. flux, utral totius corporis epitoca 704, 18	linguae affectus privatus qui sunt 730, 51	¶ L O B I bortesces 46, 16
lingua melancholici est siccis 407, 7	linguae arteriae, venae, et nervi 1, 2, 40, 251, 40, 353, 31, 354, 20, 275, 13	Loca patiens quomodo affectus sunt in pleurit 614, 1
lingua astrictum 111, 58	linguae carnis substantia 391, 63	loci affecti notitia, qua ratione Galenus coramini innotuit 718, 64
linguae cataplasma 113, 17	linguae constructio 118, 63	loci affectum affertum 717, 43
linguae eadem quae et hepatis cata- plasmata opusculis 116, 17	linguae cur phares nervi tribui 1046, 7, 19	loci affectu innotuit quae sunt neces- saria 714, 58
linguae quod opusculis 105, 17	linguae duplex, inest facultas 670, 19, 1046, 16	Locorum affectum notae unde famen- tor 717, 8
lingua recurrens arietis bilis 80, 19	linguae ligamenti inferni usus 275, 17	locum affectum ostendit certius, locum per quem fit exercitio 275, 7
lingua tenuis, sanguinis portione nutritur quoniam hep- 21, 14	linguae manus 94, 7	locus aff. dui quid indicet 15, 14
Linguae cataplasma quae 770, 10	linguae manus 94, 17	76, 43
linguae causa 615, 64	linguae musculari materiam a seipsum com- pactione 262, 7, 7	locum affectum unde cognoscendum 711, 51, 735, 43, 737, 46
linguae quid supprimat 102, 19	linguae nervi sensus 261, 47	locum omnium in corpore locum 11, 8
lingua uacuat locum per intersticia 940, 8	linguae paralytis 676, 53	49
linguae venositas potentes tolerat 977, 16	linguae voluntarius motus a quibus ner- vis fit 710, 1	locus tepidus utra in aceto urit 118, 1
Ligamenta 111, 16, 112, 21	linguae usus 251, 13	Legimus uti medicum qui sit diurnus 84, 6
ligamenta articulos in digitis 199, 1	linguae gustus senserunt 112, 44	Leli temperata 1067, 47
ligamenta quoniam uacuat quae sunt pe- riculo educta 874, 10	linguae in omniem partem mouetur libere 275, 8	lelum in trice maxime reperitur 178, 16
ligamenta uacuat locum per intersticia 116, 31	linguae Graecum unice commendat Ga- lenus 511, 15	Lomition subactum 1124, 14
ligamenta giganti circa musculos mem- branas 91, 18	linguae transfectione Galenus quomodo curat 947, 10	Lomitus cuius sit facultas 1094, 2
ligamenta, membranae, nervi, unde nutri- antur 89, 31	linguae secundum diuersas partes a diuer- sis saporum qualitatibus affertur 1014, 41	Longi maxime, sunt humidi 475, 51
ligamenta oriuntur ab ossibus 874, 15	linguae uerbementes siccat, perit gustus 347, 16	Lore compositio 181, 45
ligamenta sunt sensus expertia 774, 18, 946, 12, 1164, 37	linguae uocis et loquae instrumentum 112, 35	lore facultas 116, 48
ligamentorum affectus cur periculo uac- cent 1164, 35	linguae utraque a posteriore basi ipsius ce- rebrum accipit possidet 260, 41	lora quae ratione animi sunt reddunt 116, 50
ligamentorum in corpore triplex usus 115, 41	lini semina in aqua calida, refrigeran- tem cremorem efficit 481, 10	Leti cauescent imbecilliores 1120, 11
ligamentorum usus ac consistuntia 116, 57	lini seminis facultas 177, 15, 1093, 60	leni expurgandi ratio 77, 2
ligamentorum usus ac consistuntia 116, 57	lini seminis facultas 177, 15, 1093, 60	lotes ardet cuius sit facultas 1094, 15
ligamentum ab affe transit in ei, insensi- bile est, nec potest quicquam moue- re 199, 40	lini et cerebri seminibus quid praec- ipue accidunt 415, 17	¶ L V C H M agere infamiam 16, 10
ligamentum nec sensum nec motum habet cui in corpore esse 112, 9	lini et cerebri seminibus quid praec- ipue accidunt 415, 17	Lacrymarius 650, 16
ligamentum quid 92, 9	lini et cerebri seminibus quid praec- ipue accidunt 415, 17	Lactaria omne robur uitae profertur 165, 31
Ligula 350, 10	Lippitudinem accidentem per circuitum quomodo Galenus curat 799, 13	Lambi quoniam constant spondyli 216, 18
Liquor consideratio 14, 18	Lippitudinis causa non, quae medicorum aspirant 1116, 39	Lambi quoniam constant spondyli 216, 18
Lili facultas 1090, 15, 1197, 9	Lippitudo quid 660, 11, 1118, 18	Lambi quoniam constant spondyli 216, 18
Limonum facies etiam subdit, cor au- tem his colla sistit 193, 39	Liquendi medicamenta in duplici uase facit 1167, 9	Lambi quoniam constant spondyli 216, 18
Limonum facultas 1091, 47	Liquor proprius est calidus 1040, 17	Lambi quoniam constant spondyli 216, 18
Limonum acide oritur 1190, 23	Liquores lenientes qui dicuntur 1118, 17	Lambi quoniam constant spondyli 216, 18
Linguae ab intima ligularibus accipit ne- ces 145, 33	Lithargyri praeparandi ratio 1151, 4, 1152, 40	Lambi quoniam constant spondyli 216, 18
linguae a quibus nervi accipit talium et gustum 749, 46	Lithargyri qualitas 1180, 46	Lambi quoniam constant spondyli 216, 18
linguae conducit plurimum masticationi 273, 14	Lithargyros quoniam non habet 1113, 11	Lambi quoniam constant spondyli 216, 18
linguae cur sensum habeat expostum 1035, 5	Lithargyri reddidit expertis resistent, si ex uina uel aetio abluatur 1151, 64	Lambi quoniam constant spondyli 216, 18
linguae diuisa serpentibus per coacti boni 1035, 5	Lixiuus facultas 1088, 50	Lambi quoniam constant spondyli 216, 18

## I N D E X.

- lunivici quod enect 1081, 14. 48.  
 1089, 55. 1107, 39  
 Luna à solis recessu, suas omnes metas  
 nes recipit 617, 15  
 lune apparitionis tempus quoties  
 611, 39  
 lune circuitus quot diebus peragitur  
 618, 27  
 lune forme 617, 26  
 luna ris qui sub ipsius lumine innoverit di  
 utius fuerit, pallorem et capiti gra  
 viditatem cavet 617, 40  
 lune motus, causa est omnium permuta  
 tionum, quae in corporibus accidit  
 618, 52  
 lune occultationis tempus quidem longum  
 618, 8  
 lune opera quando invaduntur et quid  
 do longius fiant 617, 35  
 lune opera, sol effuditur inferiora  
 617, 36  
 lune plenitudo celeritatem, nonnullam au  
 tem mutationem, inaequales et duras  
 nas efficit 617, 53  
 lune variae effectus, pro variis cum sole  
 positionibus 617, 53  
 luna scilicet aut infusum progressum et  
 eam, non sanis, non aegris indicat  
 619, 1  
 luna in septimanis praecipue magnas mu  
 tationes inducit 620, 26  
 luna menses atque eius dies disposuit  
 617, 18  
 lunam quando deficit lunam 617, 33  
 luna solis aculeo eget 1114, 43  
 luna veluti princeps inter solem, atque nos  
 medius 1114, 50  
 Luna ex luce concipere potest 109, 20  
 lupi et canes eodem modo et moriuntur,  
 et eorum 1113, 26  
 lupini agrestis facultas 1081, 61  
 lupinus 416, 7. 1081, 45  
 Lupularum farina quibus morbis medica  
 tur 1114, 56  
 lupinus concoctus difficultis succumque pro  
 ducit crassum 376, 14  
 lupinus crassus succi est 409, 13  
 lupus seu lumar 399, 43  
 Luvatio cum ulcere incurabilis 320, 20.  
 855, 46  
 luvationis species quae postea 286,  
 22  
 luvationes angustiae sunt necitantes fir  
 quae in ordinem atque paulatim fiunt  
 753, 2  
 luvationes species oblique, quae portis  
 ledunt 752, 7  
 luvationem causa et curatio 813, 64  
 luvatio meretriciarum fieri possit  
 753, 29  
 Lux maior minorem semper dissipat  
 267, 19  
 Lychnis quae nives possidet  
 1094, 24  
 Lycophae 1114, 7. 1119, 56
- Lycophae quae habet nives 1066, 65  
 Lysimachii 1094, 20  
 M  
 MACEA nives sit fundit :  
 1094, 41  
 Macleani quali visus rati sunt  
 pingere soleant 474, 20  
 Macleani sunt cibandi parati, si dicitur  
 699 83, 120  
 Magnus ferro est specie similis, illo loco  
 servit 1038, 46  
 Magneti vis 67, 30. 1119, 13  
 magni et minoris differentia 541, 36  
 magni et parvi comparatio facienda est  
 ad ipsius generis medium 543, 46  
 Magnitudo nihil conferit ad optimum cor  
 poris constitutionem 67, 29  
 magnitudo nulla sine dimensionibus tri  
 bus 531, 55  
 magnitudo partium quibus de casibus me  
 teorae 661, 43  
 magnitudo substantiae et virtutis facit ad  
 cognitionem loci affert 752, 31  
 Magna universum semper sunt principia  
 338, 15  
 Magnae vis 1105, 14. 1069, 29  
 Malabarici vis 2094, 50  
 Mala Cephala 1109, 64  
 Malitiosa primi ordinis quae sunt 1184,  
 10  
 malitiosa secundi ordinis quae sunt  
 1184, 22  
 Male 109, 51  
 mala et pyra aspergentia quibus et quid  
 do verum licet aut contrarium  
 384, 24  
 Malagma Andromachi 1185, 2  
 malagma Andromachi ex meliole 1254,  
 27. 1185, 6  
 malagma Dioscoridis 1184, 45  
 malagma ex bacis lauri Andromachi  
 1185, 13  
 malagma Hirvatum ex meliole, asper  
 gentem doloribus accommodatum  
 1254, 7  
 malagma Nili 1255, 62  
 malagma Polyarchiae, quibus affertibus  
 confert 1254, 26  
 malagnata hepatica 1185, 15  
 malagnata quae dicitur 1181, 41  
 malagnata Lixy nives et compositio  
 1184, 50  
 malagnata Neapolitana nives et tempo  
 fitis 1184, 51  
 malagnatum temperamentum est calidum  
 1181, 43  
 mala opinio non ante maturitatem col  
 ligetur 384, 2  
 mala praesertim acerba, quando et quibus  
 affert debent 384, 10  
 malorum assa et assifina 280, 63  
 mala poctica 418, 24  
 mali Armenici vis 1096, 40  
 mali pyrenati sunt parvi facultas 1104,  
 46
- mali per se quibus 1096, 34  
 mali acerbis quando utendum 183, 48  
 mali acidis quando utendum 1114, 49  
 mali asperis quando utendum 1114, 46  
 Malloti quid 137, 16  
 malloleum iactis quando mellea  
 456, 61  
 Malorum aspergentium atque acidum di  
 ferentia 381, 55  
 Malorum differentia atque facultates  
 1114, 17  
 malorum facultas diversa 1096, 18  
 malorum pocticae species tres, asper  
 gentium, acidum et acidum 1213, 64  
 Malorum species et facultas 387,  
 46. 1077, 63. 1094, 53  
 Malum citium ex quibus conficitur parti  
 bus 418, 19  
 Malum pocticum, ventriculum roborat  
 906, 10  
 malum vero aliud 711, 4  
 Mamillaris exortus 131, 18  
 Mammae duae quibus in pectore 249, 6  
 53  
 mammae impraegnatum et lactationem  
 quales 710, 44  
 mammae numero quibus infert 249, 2  
 48  
 mammae quando horrent ad pectus ma  
 sculis 250, 7  
 mammae tegumento sunt cordi 249, 55  
 mammae minus 297, 47  
 mammae usque unde exortantur  
 149, 60.  
 mammae quae tempore lact accretae 297, 2  
 21  
 Mandragora vis 1094, 59  
 Manis causa 744, 13  
 mania quid 673, 17  
 Manibus affidit appositus perficitur sup  
 paratio celeritatem 1094, 17  
 Manipuli nota est M. 1293, 46  
 manipulus quid dicitur 1114, 45  
 Manis ortus 401, 61  
 mania quid 1177, 13  
 mania dicitur buboni felle infundenda  
 915, 39  
 mania (baris) magis dicitur aspergit  
 865, 39  
 Manicem duplicem et collo suspensum ge  
 ritur 419, 61 (315, 3)  
 Manu laborante, si arista mala sunt crura  
 manibus atque apprehensio 197, 6  
 manus, artem non solum homo habet  
 161, 35. 209, 8  
 manus apprehensionis gratia confertur  
 196, 42  
 manus, artem organum 195, 15  
 manus cervice caret artibus 161, 62  
 manus car dicitur 196, 15  
 manus cur dicitur 195, 64  
 manus dicitur in tres magnas partes  
 58.  
 manus extrema 162, 1. 201, 61  
 manus extremae masculi 155, 12

manu homini tribuitur à natura pro-  
mibus defensusus armis simul 194.  
44  
manus molles tactu: dura, capiti ac-  
modatior 44, 35  
manus masculi septem 20, 1, 19  
manus omnem comprehendendi figuram  
196, 9  
manus est organum ante organa 195,  
31  
manus sunt organa spiritus animalis con-  
structionis 194, 3  
manus tergerende apte quales non esse de-  
bet 54, 127  
manus totae 16, 64  
manus totius unae duae 144, 4  
manuum duplex usus 4, 33  
manuum motus non omnis efficitur mu-  
lorum fit 95, 37  
Marasmus dei à colligantibus febribus  
quomodo differtur 91, 65  
Marasmus duplex est 802, 32  
marasmus incurabilis 912, 13  
marasmus quid 803, 47, 181, 65  
marasmus quomodo incipit 787, 33  
Marti Aurelii elementum Galenus ter-  
stat 650, 13  
Marti Aurelii dispositionem non fuisse  
fibrialem, contra à quibus ceteri medici,  
deprendit Galenus 651, 12  
Mauroris nomen unde trahatur 575,  
43  
mercor quoniam partium incendit ut plu-  
rimum comitatur 772, 16  
Mercurius Aulianus temp. accitit sicut The-  
riacis 1270, 17  
Mere mortuum cur nec plantam, nec ali-  
um animi alit 1049, 39  
merces de vitiis, feminis, singulis, ut plu-  
rimum conueniunt 112, 39, 129, 7  
39, 778, 14  
meris mortui aqua cuiusmodi fit 1049,  
19  
Mercurij facultas 110, 13  
Mercurius calomelae Galeni prae-  
dicitur 646, 65  
Mercurij puri caritas, cui cor detestum  
fuit 186, 1  
Mascularum generationis principium da-  
plex 300, 32  
mascularum gigni in calidiori et sicciori et  
perueniunt famiam in humidiori et  
frigidiori 119, 57  
mascularum breuiori tempore formatae quā  
faminae, et quare 118, 35  
mascularum farinae siccior et calidior  
117, 33  
Masseteres musculi 169, 62  
Masseteres facit 1095, 7, 111, 38  
masseter uterque gra- 1249, 32  
Materia alterans corpus sunt quatuor  
363, 31  
materie remedium quadruplex genus  
470, 32  
materie imbecis cantuaris eduli afflicta

443, 31  
materie species, temperamentum 70,  
41  
materia ingenerabilis, incorruptibilis  
36, 13  
materia prima unica quatuor elementis  
subiecta est 35, 18  
Matrix laborante, urna secunda est in  
mullulo aut poplite 712, 40  
matricibus et partibus quae ad marionem  
trifidus pertinent, paucis opus fuit  
seruati 303, 33  
matricis collum cur natusque ac medio-  
crius ducit 196, 43  
matricis conuersiones ad vicina corpora  
303, 35  
matricis mater 297, 45  
matricis plures foci sunt numerosos et  
dentibus partes 297, 9  
matricis receptaculorum numerus, mater  
laron numero aequalis 194, 19  
matricis foci in bamiu est gemini  
194, 11  
matricis tunicae cur in se ante fibram  
gerit 303, 50  
matricis nasa 315, 47  
matricem sicut opportunitatem 196,  
31, 30, 11  
Matrix cur unica tunica consistit 194, 41  
Maturatio fructibus praesentia à saluti ca-  
lore 1044, 44  
Maxillae figurae mediae morientibus ac-  
dit 100, 25  
maxillae inferioris figurae extremae à qui-  
bus masculis sunt 100, 17  
maxillae inferioris masculi 273, 1  
maxillae inferioris osium consideratio  
134, 31  
maxillae inferioris tres motus 168, 56  
maxillae ossa trina 131, 44  
maxillae superioris ternae, quae parte in ea  
inferiatur 160, 61  
maxillae superioris ossa trina 281, 37  
maxillae superioris suturae 131, 15  
maxilla inferior ex duobus ossibus con-  
stat 170, 13  
maxilla inferior nullam processionem for-  
tat, quamquam medullam continet  
180, 45  
maxilla inferior, superiore immota, in a-  
nimalibus cunctis praeter crocodilum,  
mouetur 165, 53  
maxillum bonis fortibus est transformatum  
169, 26  
maxillum inferiorem circumagentes mu-  
sculi 273, 9  
maxillum inferiorem masculus qui ape-  
rit 173, 3  
maxillorum suturae 281, 1  
maxilla superior cur sit definita medulla  
180, 36  
Metea agrius coquitur panibus herba-  
ceis, flauis, magis uentriculum implet  
174, 10  
et METEVS à peruenire descendit

usus 303, 1  
metas corporis uentris, secundum ipso-  
rum medium, sphaericae 256, 31  
metas patentes quibus partibus sunt tri-  
buti ad euerrenda extrema 437,  
39  
metas peruenientes ad medium uentri-  
culum errant 292, 63  
metas feminari in feminis aperuunt  
circa coruam, intra sectionem, ubi se-  
men suum effundunt 115, 14  
metas et ripentium à testibus feminae  
implantationes 301, 52  
Metasium animalis calorem refrigerat  
58, 10  
Metes facit 316, 39  
metes medicamentum 57, 12  
metes uacantia rationem superant  
125, 18  
Medendi methodi principium unde 125,  
medendi ratio conueniens ad effectum  
originem 719, 31  
medendi rationes uariae 360, 64, 737,  
16  
medendi tot sunt rationes quot morborum  
ideae 846, 61, 830, 50  
medendum triplex est 516, 15  
Medus uena consideratio 144, 11  
medus in quo genere, uti specie quae de-  
bet 471, 7  
Medusae sulcus simul et confusio-  
nis 11, 17  
medicamentum ad inflammationes uigentes  
accommodatissimum Sorani 123, 31  
medicamentum caphurum quale 117, 27  
medicamentum confusum moribus  
60  
medicamentum contra uisiosos succos in men-  
struali tunica praeflationem 886,  
41  
medicamentum Critonis ex chameleonte  
117, 4, 32  
medicamentum diacrydion 123, 33  
medicamentum dialoos 478, 5  
medicamentum diastemon 1178, 61  
medicamentum diastemon deficiat ad  
pedus confertur 1241, 62  
medicamentum distributioni confertur non  
statim à cibo ducendum 462, 25  
medicamentum diureticum 127, 54  
medicamentum ex caricis et crico, alio sal-  
uente apertum 470, 10  
medicamentum ex charta combusta, nomen co-  
pescum 910, 9, 1179, 5  
medicamentum ex columbino stercore 1167,  
40  
medicamentum ex euphorbio ad nervorum  
passiones commodum 1166, 47  
medicamentum ex herbis confectum 1167,  
47  
medicamentum ex pice, utile ad canis rabili-  
mosus 194, 11  
medicamentum ex populo ad articulares do-  
lores 1117, 17  
medicamentum ex scilla confectum epilepsias



- confert* 1007, 10  
*medicamen Heracides Tarentum adare*  
*c. sui altera metra* 1174, 10  
*medicamen Magne didum* 1159, 17  
*medicamen metallicum adensum quod*  
*d. 1165* 43  
*medicamen podagricum Plauti Cleme-*  
*n* 117, 55  
*medicamen purgans, multiplex habet si-*  
*gnificationem* 1061, 11  
*medicamen quale applicandum* 61, 22  
*medicamen siccitatem primo gradu de-*  
*bet detergere. Et siccare.* 851, 9  
*medicamen scillitum opionem epilepti-*  
*cis.* 1007, 51  
*medicamenta asfringentia* 866, 44  
*medicamenta asfringentia cur fugienda*  
*in productis carne* 812, 49  
*medicamenta calida Et frigida a nobis*  
*fuerunt aliter sunt utrum, ut pro-*  
*inde postulat dicuntur idia* 55, 51.  
 1017, 5  
*medicamenta de atricon dicuntur Andro-*  
*medo auro* 1174, 134  
*medicamenta de atricon inducuntur que-*  
*a. ha esse debent* 851, 16. 861, 49  
*medicamenta detergentia, sordes asfricis*  
 1015, 8 32  
*medicamenta digerunt asfringentibus*  
*missa, longe sunt auriata, sed minus*  
*afficiuntur tamdiu digeruntur* 1181, 1  
 11  
*medicamenta duo, eisdem generis sed fa-*  
*cilius differunt, ad minores*  
*remotus cur in propius habere semper*  
*opariuntur.* 1165, 16  
*medicamenta educuntur uterina* 76, 48  
*medicamenta capillata que dicuntur*  
 1044, 58  
*medicamenta cruenta* 875, 15  
*medicamenta erodenda ferro ignis sunt*  
*similia* 1044, 56  
*medicamenta Et nutritiva, quando*  
*absolutissime indicanda* 60, 31  
*medicamenta Et nutritiva sepe ad-*  
*ministranda, Et corporis simplicissimum*  
*afficiat* 60, 19  
*medicamenta excoquenda tenuissim sunt la-*  
*bida Et fluidissima* 880, 10  
*medicamenta excoquenda tenuissima, minus*  
*redduntur acria si comburantur, ad-*  
*hoc minus si albata fuerint* 1151, 36  
*medicamenta excoquenda humore per dis-*  
 1006, 1155, 15  
*medicamenta explorandi ratio* 1015, 1  
 51. 1015, 61. 1015, 39. 1064, 69. 1220, 50  
*medicamenta ex tergentia que sunt*  
 1116, 37  
*medicamenta facilius calida, quando*  
*non est facit* 1017, 1  
*medicamenta ferunt omnia sunt compo-*  
*sita, ut autem in se facilius for-*  
*matur* 1015, 38. 1040, 56  
*medicamenta frigida Et dieteria, cum si-*  
*tus magis, in calidis natura sunt sui*  
*exerant* 1055, 62  
*medicamenta glutinosa quibus esse de-*  
*bent* 861, 46  
*medicamenta hepatica Archigenis* 1158, 48.  
*medicamenta humoribus cretibus infusis*  
*expelluntur cunctis que sunt*  
 1057, 19  
*medicamenta metalla debent esse tiu-*  
*la, si sint atra morsum facitura*  
 875, 10. 10.  
*medicamenta metallica omnia maiorem*  
*non excoquenda feruntur, ubi pluscu-*  
*lum ebullierint* 980, 19  
*medicamenta uteruntur eorum, que sunt*  
 155, 45  
*medicamenta miltia que* 1173, 5  
*medicamenta novacula statim ab initio*  
*sanguinem ducunt* 1001, 58  
*medicamenta nostrum calorem non nisi*  
*ab ipso mutata mutant* 561, 1  
*medicamenta ocularia* 1065, 19. 1116, 50. 1119, 35. 1121, 11  
*medicamenta omnia ei sunt optima, qui*  
*afficitur quibus excoquuntur, excoqui*  
 1155, 66  
*medicamenta omnia que pallio in corpo-*  
*re suo ueris exerant* 1015, 10  
*medicamenta omnia ressebit ad aliq-*  
*uam uisum connexionem dicuntur* 1056, 64  
*medicamenta plura, secundum diuersas*  
*sui ipsorum partes, ueris effectibus pro-*  
*ducunt* 1171, 14  
*medicamenta purgantia, proprium tra-*  
*hant humorem, Et quantum ordine*  
 393, 76, 41. 764, 53.  
 705, 11. 1001, 51. 1038, 41. 1171, 20  
*medicamenta putrescentia* 1166, 11  
*medicamenta que* 58, 44  
*medicamenta que sunt laudanda Et quo-*  
*modo* 1034, 44  
*medicamenta quando in nos eadem na-*  
*turam, quam prius in ignem, asferunt*  
 1015, 54  
*medicamenta quando nos celsant*  
 1017, 62  
*medicamenta, quorum non ad cerebrum*  
*descendere oportet, qui sunt appli-*  
*canda* 943, 19  
*medicamenta reponendi ratio* 1161, 51  
 11  
*medicamenta siccitatis que sunt* 851, 12  
 11  
*medicamenta simplicia, pda sunt natura*  
*composita, afficiunt contrarios gignit*  
 1055, 15  
*medicamenta singula talia dicuntur, qua-*  
*lia sunt res illa nostri corporis*  
 1010, 40  
*medicamenta si non proficiunt, curandum ne*  
*laedant* 1159, 1  
*medicamenta sine circumferenda, sunt a-*  
*demerit siccitatis* 981, 17  
*medicamenta suspensientia cur non re-*  
*uerit nunti, nec uerum impesse ex-*  
*hibenda sunt* 916, 46  
*medicamenta suspensientia obducunt*  
*quodam dolore, effectum tamen red-*  
*dunt maiorem* 911, 10  
*medicamenta suspensientia, potius autem*  
*ad compositionem sunt utraque* 916, 38  
*medicamenta suspensientia que rationem*  
*pharmacis congruuntibus ad sangui-*  
*nis repletionem miscantur* 1044, 56  
*medicamenta substituta que dicuntur*  
 1144, 19  
*medicamenta traxita non sunt amon-*  
*di auri, quibus sua fronte excoquuntur*  
 1121, 61  
*medicamenta tenuantia* 414, 9  
*medicamenta traxunt puriora efficacius*  
*re sunt crassum partem* 1117, 10  
*medicamenta non traxandi habentia, ab*  
*obstructionibus liberant* 405, 17.  
 815, 51  
*medicamenta uiridia consuecunt ratio*  
 1117, 18  
*medicamenta uisaria uide perantur*  
 1065, 1  
*medicamenta uisla Et lota acrimoniam*  
*amittunt, Et ad illa ipsa uisum est*  
*in malloibus Et euocantur a corpo-*  
*ribus* 1119, 58  
*medicamen temperaturis quod debet de-*  
 1017, 41  
*medicamenti gratia unde succedunt*  
 869, 26  
*medicamentis compositis cur utantur*  
 1119, 43  
*medicamentis delecteris nihil in uita dis-*  
*facilis reperitur, seruus autem exco-*  
*quendis* 1173, 17  
*medicamentis dissoluentibus que ad ex-*  
*coquenda uisera propriantur, id est*  
*secunda excoquenda* 1158, 7  
*medicamenta leuocibus in prius est ut-*  
*endenda in curandis deperitis* 1190, 62  
*medicamenta multis diuersi generis sub-*  
*fluxus sunt immixta* 1038, 10  
*medicamentis omnes lesu, acria me-*  
*diusque senes asfringunt* 875, 11  
*medicamentis que ad uisum Et ueris*  
*faciunt excoquenda, diuersitatem e-*  
*liquod Et mel miscendum* 1062, 11  
 11  
*medicamentis quos non uident homines*  
 1051, 49  
*medicamentis singula propria quod m-*  
*in se facit* 101, 11  
*medicamentis suspensientibus Calces*  
*in quibus si sunt* 904, 31  
*medicamentis suspensientibus quando*  
*utuntur* 1100, 55  
 QQ ij



medicamentis terminum rerum nec natura-  
lum qui 1010, 19  
medius in universa substantia constituitur  
ex mixtione extremorum 44, 9  
medius naturae quid sit 355, 38  
medius omnis ex contrariis est mixtum  
1015, 41  
medius semper expulsetur, consilium in  
variatione ad aliud 411, 61  
medius sit, quod versis extremis est fu-  
niformis materia 1029, 2  
Medullae ac adipis sunt medicamenta  
sicciora idcirco 917, 7  
medullae omnes insensibiles 698, 4  
medullae spinales membranae 548, 1  
medullae spinales processus in se per  
sensibiles 55, 32  
medullae spinales tercia densa 193, 1  
medullae vires 116, 17  
medullae similare spiritibus nutritionem  
1025, 108, 10, 196, 19  
in Medullam à causa lumbis preceptum  
per singula spiritus foraminum (in-  
guale vel) rami arteriae 146, 1  
medulla osseum humidorum ac magis succi-  
lis 92, 8  
medullarum utrobis est optima 111, 22  
medulla spinalis in se transmissio, vel  
accidit 199, 18 121, 15  
medulla spinalis distribuitur in nervos  
quinguentis ossibus 207, 19, 119, 2,  
26  
medulla spinalis sita inter tertiam &  
quartam vertebrae spazantem annuam  
distans confusum 190, 42  
medulla spinalis non pulset 293, 17  
medulla spinalis omnia nervorum du-  
ctum principium 261, 19  
medulla spinalis erant à cerebro 547, 11  
medulla spinalis quale prebetur corpori  
alimento 194, 61  
medulla spinalis vult truncus arboris  
212, 44  
medulla rependi ratio quae 116, 17  
medullae effusum, non visum, pendet à  
motu: quoniam dantur de curvatura  
manus non inflexuram. 772, 61  
Mel 403, 60  
Melampyrum in tritu 175, 21  
Melancholica causa 745, 51  
melancholica hypochondriacae à ventriculi  
le oris, pagis 745, 32  
melancholica hypochondriacae causa  
744, 46  
melancholica hypochondriacae sympto-  
mata & signa 764, 13  
melancholica hypochondriacae quae 745, 27  
melancholicum recitum quatuor Gal-  
leni curant 69, 56  
melancholia inde 69, 56  
melancholica alienationis unde oritur  
683, 17

melancholici qui ciborum auditum sunt  
768, 52  
melancholicorum merces 744, 2  
melancholicum excrementum in utero  
culum excrementum 126, 64  
melancholicus sanguis in quibus habetur  
ut quibus munitur 741, 44  
melancholicus siccus qui dicitur 701, 31  
Melancholia vires 1121, 51  
Melancholia 701, 31  
melancholia morari sit utile 809, 47  
melancholia lacte confusi utrinque facit, im-  
perfecte refrigerato 184, 58  
melancholia in calido corporibus citius utrius-  
que in bilem frigidum autem accrescit  
dantissimum sit 405, 7  
melancholia in utero 913, 32  
Melancholia 701, 31  
Melancholia ut 401, 5  
melancholia effe aptum sicut conglutina-  
do 980, 46  
melancholia quando ex retentione rarietur  
369, 39  
Melancholia decedunt 1219, 59  
melancholia quam habet uter 1095, 27  
melancholia in floribus uter ut in bilem 79, 6  
melancholia in fructibus uter ut in sanguinem  
79, 9  
Melancholia Lucij preceptoris Galeni  
1214, 8  
Melancholia vires 1119, 48  
melancholia sumptum, nomen promittit  
401, 14  
Melle corrigine placet utrumque praesens  
469, 19  
mellis acromia quomodo retunditur  
401, 12  
mellis coctis munda utrum ibidem  
30  
mellis cocti facilius ibid 17  
mellis siccitas 1095, 31, 1356, 19  
mellis matrem non esse congruentem  
401, 1  
mellis optimi notae 760, 18  
mellis usus quatuor fugiendos aut respo-  
pondus in fructibus à capite in affe-  
ctu arteriae 147, 6  
mel longa collata amara efficitur  
791, 35  
mel mellei ex 791, 41  
mel nihil in se vera corpus continet bilis  
75, 65  
mel non potest potestentibus quae-  
mentum congruit 1176, 45  
mel omne calidum atque in corporibus cal-  
idis bilem 412, 45  
Melopropium natura & facultas  
179, 60  
mel propium quod sit 181, 44  
1280, 50  
mel opimum ut brevissime tempore co-  
quatur, ut minimum spiritus cumini  
460, 60

mel pleuralem legi adaptionem, amara  
1047, 19  
mel passiva adhibita, incommode de-  
pau & lites efficitur 415, 46  
mel quando passiva infunditur 415, 44  
mel quibus conficitur & quibus non 80, 1  
1. 1706, 403, 28, 1047, 16  
mel rosulae & acrimonia 403, 64  
mel succum pingui consilientia transmittit  
418, 44  
mel temporis spacia amarebit 1047, 26  
mel ubi dantissimum 403, 4  
mel utrinque in sanguinem, postulat ut  
utrum & utrum frigidum 79, 46  
mel utrinque ex coctis amara, quod  
tempore extra collatum patitur  
1231, 51  
mel utrum est gravior tercia parte 1294, 15  
Membra corporis extrema minus alant,  
sed promptius deiciuntur 591, 54  
membra inflectitur ab utero formata sunt,  
excedendo inibi illa 466, 56  
membranae ciliae cinguli duplex 112, 32  
membranae quae usum oculis cordis  
applicat 83, 50  
membranae thoracis subiacentes  
176, 1  
membranae ex qua seminis parte signa-  
tur 108, 22  
membranae in utero semini obvoluntur  
107, 41  
membranae cerebri consideratio 191, 31  
membranae dolores sunt latet ac quae  
125, 7, 31  
Membranae omnia ex semine oriuntur  
111, 25  
Membris nullis aut conciliandis deinde  
811, 41  
membranae naturam oris 12, 13  
membranae principium necessitudo  
564, 36  
membranae mortificatione quatuor sit ad-  
flectendum 981, 45  
Memoriae obliuio, causa 718, 10, 719, 38  
memoria evalescens resistitur, quae sit  
consideranda 711, 31  
Memoriae obliuio, animi molles  
310, 59  
Memoriae uterque naturam, quae con-  
glutinetur 1201, 16  
memoriae crasse partes amari alberti-  
fieri caliditate in animalis vivente  
101, 45  
memoriae crasse vult 155, 19, 159, 46  
memoriae curandae scopi unde profici-  
sunt 1104, 38

meninges tenuioris usus 255,13  
Meninx crassa cerebri sita in tribus lo-  
cis 191,22  
meninx crassa crania connecta 164,8  
meninx dura afflicta, quas pulsus pignat  
607, 55  
meninx dura perforata 254,62  
meninx tenuior siue pia mater cum uenis  
punctat ad cerebri meninges 192,2  
12  
meninx tenuis affici siue cerebro non po-  
tissimum neque hoc absq. illa 603, 54  
meninx tenuis inter cerebri et cras-  
sam consistit: crassa inter tenuem et  
crassam 255,24  
Mens habitus in syderibus totius melior  
et perfidior quam in corporibus ter-  
restribus, quoniam substantia illarum  
purior 311,56  
mens quibus apparet 347,40  
mens siue substantia ubiq. sita sit, que  
libet instrumenta uel longissime sua  
subdit mouet 311,16  
Menses ducentia quomodo à diuersis  
differt 1062,60  
mensis et urinas que eilient libet 55  
mensis euacuant uenas si de uisita populi-  
ne, uetiaq. talum 938,18  
mensis in uetrem demittuntur non abra-  
buntur 1062,46  
mensis que promouet 997,27,1137, 56  
mensis quibus ex causis plus minusus et-  
que fluat 603,27  
mensis reuelli forsam quomodo possint  
864, 12  
mensis uide debentur 601,21  
mensis à luna innaturat per se innaturat,  
ut alia cuncta 618,50  
mensis lunaris 177,39  
mensis non omnia consistit triginta die-  
bus 617,13  
mensis quid 610,24  
mensis quot diebus consistit 621,17  
Mensuras in mulieribus profusum sin-  
gulis mensibus 916,10  
mensuras quando mulieri discernunt  
777, 19  
mensuras quibus sup. pressa ob nide posita  
non sunt, uenae sectione occurrunt  
982, 31  
mensuras suppressa, quibus notis depre-  
duntur 777,11 et 52  
mensuras sup. primuntur, si sita in cubito ne-  
ra 997,15  
mensuras sunt euacanda per crura, re-  
uolunda per uenam in cubito sectione  
991, 60  
mensuras suppressa quo passio discens  
mulierem esse gradum 777,18  
mensuram euacuata 100,44  
mensuram uenae ductu suum sym-  
ptomata 777,64  
mensuram retentio non est asphidus,

siue neq. canon siue naturalis ex-  
cretio 17,5  
mensura tempus quid 126,57  
Mensura ratio in exhibitione alimenti  
per ephemeras febres ex quibus su-  
menda 957,39  
mensura optima est 420,12  
mensura elix. erat olim apud Romanos  
cornea 1165,62  
Mentem diuinitatem esse per aerem exten-  
sam arbitrat Gadenus 319,9  
Mentis facultas 1081,8  
Mentis nomenclatura 313,50  
mentis transuersus est inaccessibilis  
547, 24  
Menstruuius uis 1093,64  
Mercurius cum diuinis ac auctor cunctis  
aerem commendat 1034  
Mesenterii sinus 179,56  
Mesenterij ergo et usus 225,8  
mesenterij siue 179,56  
mesenterij substantia ex quibus consistit  
libet 48  
mesenterium triplex 148,1  
Mesenteriae uenae 110,30  
mesenteriae uenae omnes ad hepatis por-  
tas perunguntur 178,11,21,4,64  
mesenteriarum uenarum consideratio  
147, 14  
Mesopsi facultas 1095,48  
Mesopsorum et forderum facultas  
384, 58  
Metacarpij consideratio 157,42  
metacarpij ossa quatuor 205,26  
metacarpium quatuor consistit ossibus  
137, 52  
Metallica abiacenti modi diuersi 115,4  
49  
metallica diutius cetera magis succant, et  
minus rostant 1174,5  
metallica omnia dolorem excitant 1166,  
16  
metallica omnia succant 1120,32  
metallica plenus sunt coquenda, ut adha-  
rent 1151,61  
metallica que dicuntur 1120,28  
metallicis plurimum igne substantie est  
inmixtum libet 40  
metallorum crassitudo quomodo asfra-  
tur 1165,16  
Metaphora ab artificiosa doctrina able-  
ganda 935,25  
metaphorae que recipiuntur, et que re-  
spondent 536,11  
Metobolus diapheris que sunt conside-  
randa 501,10  
metobolus à solis affectionibus indicationes  
sumunt 724  
metobolici continentur duas commoditates  
morborum, asphidionem atq. fluxum,  
ac tertiam ex his causationem 728  
metobolus et Rationales qui commenda-  
differtatq. inter se 115,58  
metobolus quibus artibus inueniunt optima  
7, 19

metobolici pollicentur se totum aerem do-  
stus curricula mensuram sex 74,7  
metobolici quibus distinguuntur ab Em-  
puris et Rationabilibus 74,0  
metoboliarum dogmata 15,56  
metoboliarum secta quid 7,17  
metobolus tria capita 359,24  
metobolus inuenire quid sit 144,57  
metobolus cognoscendi mores uolunt  
420, 35  
metobolus consistit in uenerabilibus  
900, 22  
metobolus que alius atq. ipsam quique  
metobolus consistunt 21,6  
metobolus quid 358,54  
metobolus ueritatis inueniunt 352,  
18  
Metetrachyte puldendorum instrumenta  
1265, 55  
Micon cibus sit facultatis 1096,53  
Micon ad cibus est ponice praefatus  
libet 59  
miles lenis cibus sit facultatis libet  
60  
Mily et ponice facultas 416,24  
mily uel cecubi facultas 1085,91  
milium ad cibus est ponice praefatus  
libet 61  
Mili capitis uis 1274,17  
Mina Aegyptia et Attica consistit libris  
seidem 1290,15  
mina continet uncias uiginti 1160,19  
mina Romana continet libras uiginti  
1190, 13  
Mintus et lenis cerebro fugiat à po-  
te etia 127,61  
Mingrati inter dormientes reme-  
dit 1266,99  
Mintum quid dicatur 148,65  
Mistio expulsiue, felis Dei et naturae  
est opus 44,24  
mistum corporum existitque que pla-  
num conducant 127,  
mistum quatuor et facultates, sent  
tate per totum mistum 140,64  
Misti, atq. ferissimum phormica  
1180, 11  
Molubridates praemonitas antidote uinci  
à ueneno hanc potat 1278,23  
1280,19  
Mongastera que 1168,43  
et Mnesithereus 390,16  
et MODERATA similibus confer-  
uanda, immoderata contrariis corrigi  
de 411,52  
Moderatas qua in re continentem superet  
424, 1  
Molus aquae propinquant in ardentibus  
febris, unde petrasus 961,19  
Mola 118,49  
molam absq. uero coarcti à muliere non  
posse 109,19  
molle cum mediocri calore, est humidum  
47, 54  
molle est quod in scriptum cedit, ne mi-  
gat

## I N D E X.

grat aliis	315,52	609,	33	morborum articularium communes cau- se	126,6,4
molle ad patiendum aptiora	252,21	morbi magnitudo cognoscitur ex symp- tomb	29,42	morborum causa, quæ sunt dicenda	664,
molle et duri latius	315,40	morbi magnitudo est scopus sanguinis mittendi, purgationisq; adhibende	360,	62	61
molle quod dicatur	402,34- 55,12,	360,	62	morborum compositiorum, compositiorum fact causæ	662,15
1052,	50	morbi numerus est unum in unius sex mor- bis	847,41	morborum compositiorum partium simi- larium quatuor differentiæ	619,48
molliendi rationes plures	1052,60	morbi non feruntur omnes quatuor tem- poribus	30,18	morborum ex uno solo jure comite præ- ceptionem	947,16
molliora facilius aliterantur	401,19	morbi ad humorem affluunt	350,15	morborum ex humore solo ortorum 13	947,14
molliora infirmiorum, ad pulsuum ma- gnitudinem sunt	567,15	morbi partium dissimilariarum vel infra- mentaliarum quatuor generibus conti- nuerunt	617,54	morborum generationi non est errorum 18	716,41
molliora infirmiorum quædam ad pul- suum magnitudinem consistunt, et quæ- dam siccis	567,48	morbi per intervalla redeuntes sunt præ- cipui morientur	1005,10	morborum genus duplex	847,15
molliora quid	1052,55	morbi primi quatuor	79,34	morborum in unumquemque sex genera	847,
Molliora valentia facilius	1152,8	morbi primi levis sunt fientium	664,	44	44
Molliora valentia compositiorum	414,	61	61	morborum novitiam partem à lesa parti- cula indicat	844,43
Mora debere alios cibos procedere 582,	13	morbi principium ad præsidia ferenda aules præbet indicationes	709,44	morborum peracutiorum duplex differe- ntia	610,52
move materiam divitiarum nature mobi- ta est tr. asium dissimilem	221,48	morbi, quæcumque symptomata sunt causæ	667,	morborum permutatiarum cum æger est interituum, tres modi	621,4
movea vomitum et siccitatem, aut præsidia congruent	312,10	morbi regii ab his febri insidentibus civi- tate	763,14	morborum permutatiarum tres differe- ntiæ	1164,14
Morbi acuti et selectissimi tenuissimum ad dures rationem possunt adhiberi, longiores	960,35	morbi regii causa	1164,14	morborum qui non solentur duplex natu- ra	710,49
morbi acuti et vites, sunt exigui temporis, non tamen omnes breves morbi sunt acuti	621,61	Eius curatio	1001,41, 1111,18	morborum simplicium genera quæ sunt	657,
morbi acuti per excretiones, et diuturni per abjectionis reges solvantur	643,	morbi regii prædicti	970,40	15	15
15	15	morbi à fluxu capitis orti quomodo ac- curandum	749,11	morborum solutioni fixæ quæ adesse de- beant	607,14
morbi acuti qui	504,16	morbi articulis auxiliatur etiam indi- cationem	1143,33	morborum spiritus diversæ	654,16
morbi acuti et vites per vicia indicent pur- gatione	1003,45	morbi articulis, externa adhibenda re- media	871,18	morborum tempora cognoscuntur ex cre- ditatis et conceptionis indicibus	730,
morbi acuti similis, uniusmodi ad ex- tremum ascendunt magnitudinem	30,	morbi fieri qui dicuntur	1009,10	34	34
30,	33	morbi familiarium partium dissimilariarum in in- tempore	149,50	morborum tropica et media latitudinis momentosorum habent	710,14
morbi articulis curatio	1267,11	morbi familiarium partium singuli sunt du- plex	657,20	morborum tempora quatuor	11,18
morbi calidi à bile oriuntur	799,18	morbi simplices familiarium partium quæ sunt	657,	Morbosa quæ	61
morbi calidiores facientes, ex morborum dispositionibus inter se oriuntur	802,	46	46	morbus contrarius duos ceteros curan- di ratio	964,51
morbi cogniti, ipsius indicis est princi- pium	848,12	morbi speciei, curationem tantum indi- cat	35,31	morbus futurus prævenit quæ à na- ture ordine rursus revivunt	818,18
morbi compositi partium dissimilariarum quæ sunt dicendi	660,17	morbi similibus maiori ex parte ite- nuerunt	471,19	morbus peracutus, quæcumque saltem de- terioris est septimus in curatio	610,41
morbi contrarii tollantur	643,50	morbi status decet, qualis et quæque ul- tiori ratio esse debeat	621,51	morbo ingente impetum accitiorum tempus	18,24
morbi crescentes ad magnitudinem notæ 611,	13	morbi totius principium est eius curatio	719,	morbum nemo subito causat ab his, qui sunt	641,
morbi causæ generationi propriæ quæ- dam est tempus	710,40	morbi actus tempora sunt quatuor	719,	morbus posse in initio dismuti	20,18
morbi differentie	901,19	morbi ut sunt, quos interpretatio et solu- tionem esse alium	14,61	morbus acutus ex aliis qui dicuntur	616,
morbi dissimilariarum, eius causa antecedens est	813,14	morbi signis indicibus	622,40	51	51
morbi dissimilariarum in purgationibus quæ inducit	1003,5	morbo comitibus ceteris medicamentum	1109,	morbus acutus	111,13
morbi diuturni qui	616,52	1109,	1	morbus cognoscitur ex symptomatibus	19
morbi effluvia in primis cognoscenda	716,	morbo declinante, opportunitatem accitiorum esse alium	18,25	morbus est ad operationis vel struere oblationem	657,18
morbi ex decidendis acuti	616,49	morbo naturæ suæ cognato laborantibus minus periclitantur	187,65	morbus et passio quid differant	664,
morbi exiguus subdit à natura alicuius	715,	morborum anteriorum indicia in diebus in partibus sunt, quia et affectiones	620,	41	41
morbi frigidi à pituita	799,16	620,	9	morbus ex aliis peracutus qui	616,11
morbi hæmorrhoidali curatio	868,10	morborum ad quatuoraginta usque dicuntur peracutiorum duplex natura	616,18	morbus hypochondriacalis qui sit diu- tus	744,18
morbi in acutis principium, laboriosum				morbus in depressione dispositione	619,
				morbus in formatione	658,50

morbus in magnitudine qui sit 659,16  
 morbus in numero duplex, cuius utraque  
 differentia trifurcata fundatur 658,  
 61  
 morbus instrumentalis dupliciter accidit  
 Ibid. 39  
 morbus instrumentalis quadruplex  
 84,71 39  
 morbus iniquum soluitur nisi conuulsio  
 nis signa in euercentis praecurrerint  
 39, 52  
 morbus omnis eandem sibi perperam na-  
 turam 2<sup>am</sup> essentiam servat 725,5  
 morbus omnis idios 64,18  
 morbus peracutus communiter quid dica-  
 tur 616,16  
 morbus quid 410,62. 630,19. 651,  
 32. 664,24. 725,45. 841,16.  
 844,1. 848,19  
 morbus qui distinguitur sit a simularum  
 partium uno 24,54  
 morbus, quoniam sit inmoderatio 657,  
 17  
 morbus simpliciter acutus qui dicitur  
 616, 39  
 morbus symptomatum causa est 26,8  
 morbus unde cognoscatur 604,59  
 Mordacia basid omnia sunt calida  
 1017,  
 mordacia minus sunt trivialis, si parum  
 facultatem continent 112,16  
 Mordaxia 2<sup>am</sup> alystergeia, biliosa 6<sup>am</sup>  
 cacochyma 226,55  
 Mordaxium alio sita facultate calida,  
 alio frigida 1039,66  
 Mordaces quae nascuntur 1040,53  
 mordacioribus cibi apti qui sunt 1024,  
 10  
 mordaxio quibus superibus sit commu-  
 nis 1047,51  
 Mores aegri quando expendendi 496,  
 32  
 mores animi quot corruptant 433,16  
 mores cognoscuntur ex partium figura  
 71, 22  
 mores plerumque sequuntur regionis natu-  
 ram Ibid. 33  
 mores redduntur probi a recta iustis ra-  
 tione 432,12  
 mores sunt duplices, civiles 2<sup>am</sup> naturales  
 821, 11  
 mori 2<sup>am</sup> crisi in accessione principis,  
 quibus contingat 641,61  
 mori cum nemo possit in totius morbi de-  
 clinatione, nisi ob errorem correpi-  
 tionem 641,50. 642,2  
 mori reperit quibus contingat 759,57  
 mori sanctus 1096,62  
 mores accedunt, dum utriusque assueti-  
 tudine 381, 26  
 Moriuntur homines in pejus accrescen-  
 tia tempore 614,40  
 Mororum facultas 410,19. 382,  
 1. 1199,4  
 Morosi vires 1120,14

Morsus a superfluo capillum acci-  
 lis est 1112,43  
 morsus a rubido cane cordi ratio 646,  
 114. 121,153,54. 1279,51  
 mors quid 46,52. 640,54. 804,13  
 mors quo morbi tempore fiat 641,12  
 Morsus, rubidi canis pedis Cratippi  
 1286, 53  
 morsus rubidi canis conservandus est an-  
 pertus ut minimam quadragesima dies  
 1277, 54  
 morsus stenuis quid sanet 1097,16  
 Morianus plumbum confert ad confi-  
 cendam medicamentum refrigerantia  
 1114, 15  
 Morien 2<sup>am</sup> crisi accessum quae indi-  
 cent 642,38  
 mortis dies qui sine cognoscatur Ibid.  
 41  
 mortis esse tres modos, iis qui sine crisi  
 moriantur 642,9  
 mortis periculum quid praemonet 599,  
 40  
 Moron generatio prima ex temperantia  
 10 216,5  
 Moron putrilium diversitates 68,17  
 Moribus cunctis qui sit communis 73,  
 46  
 Morioni articulationum in digitis duplex  
 aculion 191,60  
 motus post cibum incommoda 406,  
 4  
 motus quartum genus 95,60  
 Motus propria, motus 2<sup>am</sup> tardus  
 490, 54  
 motus quae insunt 542,48  
 motus quae requiruntur 281,56  
 motum contrarium naturae non molitur as-  
 se, quoniam priorem servavit 519,19  
 motum non sensu, sed ratione colligitur  
 547, 11  
 motum voluntarium illo sensu, quae por-  
 tetur erant 671,59  
 motus alius quid 73,58  
 motus alius ab alio sit musculo 94,19  
 motus animales unde procedunt 93,3  
 motus arteriae 2<sup>am</sup> cordis est naturalis  
 100, 31  
 motus astricti mox desinunt 580,52  
 motus celeritas facultatibus astrictae,  
 materiis aduersatur 91,53  
 Motus celeritate iudicanda, quorum  
 sit habenda ratio 542,60  
 motus caliditatem aut frigiditatem ex lo-  
 cis ubi mouentur corpora iudicari  
 547, 6  
 motus celeritatem tarditatemque adimen-  
 dit 640,14  
 motus compositi qui 73,4  
 motus cordis ac arteriarum nunquam in-  
 termittit 445,17  
 motus cruris ad latera ex abundantia est  
 317, 17  
 motus cuius articula digitorum pedis na-  
 tura est naturalis quatuor 213,40

motus cum plurima facultate animalis in-  
 digerit 671,17  
 motus depressi species 666,1  
 motus est duplex 725,43. 842,40.  
 845, 61  
 motus ex subtilitate est animalium 180,  
 29  
 motus in adione consistit 310,48.  
 346, 24  
 motus in pulsu interrupti differentiae que-  
 ritur 516,19  
 motus languidi, corpus reddunt frigidum  
 2<sup>am</sup> putrefactionem 433,41  
 motus naturae contrarij sequuntur poten-  
 tias contrarias 87,17  
 motus naturae unde procedunt 93,1  
 motus naturae, corpus reddunt biliosum  
 431, 40  
 motus passivus quid 73,55. 518,  
 10  
 motus propria sunt velocitas 2<sup>am</sup> tardi-  
 tas 501,46  
 motus simpliciter duplex existit 710,5  
 motus simplices qui sunt 73,19  
 motus subternos, qui exercitatio 419,  
 10  
 motus velocitatis distinguunt effectus dolo-  
 risque organorum respirantium, ab his  
 qui extra dolorem insistant 494,  
 55  
 motus molli, viribus superiores, sunt re-  
 mili 710,15  
 motus voluntarij emitti a musculo sunt  
 197,10. 715,57  
 motus voluntarij origo cerebrum 324,4  
 29  
 motus voluntarij symptomata 676,46  
 motus voluntarius qui 100,48  
 Motum diversum effectus diversi  
 446, 8  
 motum in musculari quatuor differentiae  
 96, 1  
 motum naturalium species diversa  
 445, 31  
 motum qui adhaerens non sunt triplex dif-  
 ferentia Ibid. 58  
 motum qui sibi inuicem succedunt, neces-  
 sum est uno perire, perire et alterum  
 94, 59  
 motum se invicem consequentium dila-  
 tionem sine altero servari est impossi-  
 bile 485,55  
 motum variatus pugnat cum constri-  
 ctionis securitate 101,60  
 Motus premum, princeps animae facul-  
 tas 318, 13  
 Motus qui veluti quiddam aegre 729,  
 21  
 ¶ M V G I L fule conditus affirmatur  
 199, 39  
 Mulier cum venis probi sunt, quibus  
 caret morbi 916,18  
 muliere praegnat, quae prius gignen-  
 tur 105,7  
 mulieres cum careant pilis moti 277,33  
 mulie-

- mulieris glabra, & cir. lib. 30  
 mulieris fibrilis que sunt 50, 52  
 mulier emulsi studiorum naturae ampes 14  
 mulierum fecunditas & difformitas ad 16  
 Muli b. p. r. 199, 62  
 muli in andam corollis 400, 29  
 muli juncti & ceteri 199, 51  
 Mulier & bibulis 199, 40  
 mulier facultates 199, 53  
 mulier in pueri aequi confutur 463, 13  
 mulier in naturis biliosis bilis facile 890  
 mulier quibus non sit conueniens 914, 22  
 Murina rerum ordinis maxime & pulcherrimus 215, 11  
 Murina Rone omnium fide murina pferre maxime uidentur 400, 43  
 Muris faciles 154, 15  
 muris arant pulvis ferat ab ipso emor- 127, 33  
 murina capita uita deopis necesse 127, 4  
 Muscorum uis lib. 58  
 Musculi abdominis esse 432, 60  
 musculi ab esse huius productione 145, 30  
 musculi ad collum afflicti locati, afflicti da- 127, 4  
 musculi ad eam partem in duobus dunt, ad quam uertunt ipsorum fibrarum 246, 7  
 musculi aequi ad obliquum inclinantes, mo- 28, 7  
 musculi caput mouentes sunt esse & in- 28, 58  
 musculi carnes tendunt, nullum mouent 91, 55  
 musculi corpus flectentes 152, 16  
 musculi constitutio 215, 14-71, 2  
 musculi conuolutes radium ad primum & superum 204, 10  
 musculi crura extendentes & flectentes min. & maxime 307, 14  
 musculi cubiti articuli flectentes, duo sunt anteriores 150, 6  
 musculi digitorum 15, 13  
 musculi de Jecoris coram capibus, non ab eam funduntur 190, 17  
 musculi equi similes 489, 34  
 musculi & tendones interni flectionem edunt, extrinseci extensionem 91, 10  
 musculi extensorum extensionem dicunt 100, 18  
 musculi extenctis flectionem inter ubi in strumina mouentur 178, 7  
 musculi expulsi extensorum flectionem 436, 14  
 musculi extendentes articulum genui 157, 45  
 musculi in abdomine in tendenda uis nobis sunt multo 82, 63  
 musculi in brachio dunt obliqui motibus reuam confutur 298, 10  
 musculi inuicem praesunt 22, 32  
 musculi in scurbo aliter se habent quod in 298, 18  
 musculi inter costales duo & u. gna 458  
 musculi intercostales duplices lib. 64  
 musculi intercostales qui ratione refectur 188, 14  
 musculi irrigantur sanguine ex uenis & arteriis praeflante 91, 58  
 musculi lae fibrarum a quibus initis arantur 169, 4  
 musculi lae inuicem ratio 168, 63  
 musculi lae origo 179, 50  
 musculi lingue carnis tenduntur 91, 35  
 musculi multi colores 168, 47-278, 19  
 musculi motum capitis praeflantes obli- 287, 17  
 musculi obliqui in brachio 203, 16  
 musculi obliqui obliqui praeflantes motus 214, 37  
 musculi osse a ueteribus ignoti 15, 37  
 musculi osse mouentur, sunt sex 74, 26  
 musculi omnes in extremum sefionem tra- 91, 16  
 musculi palpebris dunt dentes sunt duo 74, 2  
 musculi pars que in se habet motum ex- 91, 16  
 musculi pedum circumstantes qui 160, 18  
 musculi qui ratione priuatus motus 189, 11  
 musculi recti, extensum flectionem aut ex- 214, 19  
 musculi reuoluntur extensorum dunt 214, 44  
 musculi retradi ad dorsum contrahentes lo- 314, 12  
 musculi ab domitis uel cum sepe trans- 447, 34  
 musculi in tendentibus totis transuerim abfistit, motus flectionem partem tollit cor 944, 4  
 musculi scapula ab eam aduocant 17, 57  
 musculi semper trahunt uersus proprium principium 170, 7  
 musculi in se unum tantum fibrarum ge- 214, 40  
 musculi singuli, singulos habet motus sui plect 214, 47  
 musculi magna ex parte in se fibrarum se- 214, 55  
 musculi soli uoluntario motu praediti 310, 17  
 musculi omnibus inferiori uersus, aut in ipfam aquam, aut parum capiti pro- 246, 41  
 musculi parum imbecilliores committuntur ad uoluntatem 205, 19  
 musculi sedis & uersus uoluntatis re- 77, 33  
 musculi temporales, inferioris maxillae sunt eandem 17, 16  
 musculi temporales in quibus sunt maxillae lib. 23  
 musculi temporales laesi que suspensa- 160, 55  
 musculi tres in maxillam trochanteris in- 159, 3  
 musculi ualde parui in pede ab anatomi- 214, 1  
 musculi uinum flectentes unde arantur 203, 34  
 musculi uinum trahunt uersus proprium principium 170, 7, 16  
 musculi uoluntario motu sunt in inferi- 320, 14  
 musculi uis 28, 34  
 musculi uis interiori abfistit, exteriori pars 91, 5  
 musculorum affectiones & aberrantes motus 496, 52  
 musculorum aditus cognitis maxime in 15, 13  
 musculorum caro qualis 91, 54  
 musculorum consensum quod uideantur 94, 13  
 musculorum cubiti & motus unum tres 202, 30  
 musculorum cubiti uis lib. 16  
 musculorum destructiones duplices 200, 49  
 musculi exteriori abfistit, pars flexa ad 91, 7  
 musculorum flectionem atque extenden- 202, 6  
 musculorum flectionis ad uis animas sub- 184, 13  
 musculorum in extremum brachy node arte 154, 13  
 musculorum inferiorum ratio 90, 12  
 musculorum intercostalium fibrarum 187, 34  
 musculorum intercostalium fibrarum quon- 249, 1  
 musculorum intercostalium uis 210, 50  
 musculorum interiorum cubiti origines 154, 49  
 musculorum motus uis 202, 18  
 musculorum musculorum aditus 178, 12  
 musculorum nomenclaturam singulis, ali-



appositi sunt contrarij motus aduersi  
184.  
muscularum motus in sinistris par-  
tibus, aequalis ad dexter partes 115.  
53  
muscularum a motum alio sit pro fibrarum  
positi modo 184, 53  
muscularum quod genus articulum mouet,  
uulsiuonem suam non obuenit qui  
extenduntur 157, 60  
muscularum respirantem in fermentatione di-  
uocatio 487, 60  
muscularum sedio melianda pro fibrarum  
dubio 151, 47  
muscularum singulis ut una alio, sit  
motus iunctis natura inest 94, 44  
muscularum substantia ex quibus consistit  
113, 10  
muscularum temporalium sita senectutis  
172, 47  
muscularum et tendendum nutrimentum  
quale 407, 11  
muscularum thoracis adiones particula-  
res 488, 61  
muscularum istum motum extendentium  
duo principia sunt 116, 8  
muscularum transuersae sectionis adio-  
nem eorum differunt 151, 48  
muscularum temporalium utique tres nervi in-  
figuntur 161, 16  
muscularum cistis uniuersis incandens 153, 2  
muscularum deliuides 161, 19  
muscularum dum tenditur, trahit ad se par-  
tem in quam inferitur 95, 30  
muscularum et circumiecta ad inferiorem pro-  
prietatem quibus 120, 19  
muscularum in fermentatione animalis et na-  
turale 91, 61  
muscularum lateris 150, 13  
muscularum lateris ad seminem et muscu-  
larem uniuersum consistit 129, 53  
muscularum lateris fibras omnes recipit a col-  
le spondylis 113, 6  
muscularum lateris uide nervos recipiat  
71, 1  
muscularum non expellit contrahitur citra  
animalem facultatem 96, 14  
muscularum nullus caret arteria et uena  
116, 15  
muscularum nullus in summe motus ex-  
tioris regione 164, 1  
muscularum omnis carnosus, idemque humi-  
dior carne 151, 18  
muscularum omnium in corpore maximus  
quos 108, 70  
muscularum propriam instrumentationem motus  
91, 4  
muscularum rectus, relictum ministrat motui,  
oblique obliquum 157, 11  
muscularum temporalis, debilis et minimus  
humor 172, 33  
muscularum tendone insigniter sedus nocet  
eius particulae membrum 91, 3  
muscularum transuersum se habet, in quem par-  
tem frangit 95, 12

muscularum uelut plerumque quodam  
muscularum musculusque firmiter differencia  
cognoscitur 157, 5  
Musculus caro epileptici accitior  
1155, 10  
Musculus cinis podagricus lauit 114, 1  
29  
Musculus quando et quomodo preparatus  
nutritum in artu inflammationibus  
113, 13  
Musculum delictum alium 411, 61  
Musculum dulcissimum, alium subdant  
111, 1  
Musculum nominibus ueritatem fluctibus implet  
114, 10  
Musculum quatuor dulce 104, 48  
Mutari in citius animi nihil potest nisi per  
medum 113, 13  
Mutatio ciborum per cruditates in pre-  
grinam qualitatem, est uisum deter-  
rere 1255, 23  
Mutatio sit aut in qualitate, aut in quanti-  
tate 411, 11  
Mutationes et fluxus uulsiuonem que col-  
que per spiritum dures propriis con-  
tingunt 619, 47  
Mutation animal quo nerui intercepto  
reddatur 110, 64  
Mya YAGROS cinis sit facultatis  
1097, 3  
Myxofacilis Ibid 11  
Myrcopa que dicuntur 1117, 1  
Myriophylli faciles 1097, 18  
Myrmecae 709, 30  
Myrmecianum curatio 951, 34  
1081, 9  
Myrmecae et Myrmecae que cinis  
1098, 41  
Myrtha cura ascriptionem distitit reser-  
cat 1119, 49  
Myrtha Barotia uis 1107, 13  
Myrtha faciles Ibid 17, 1180, 59  
1131, 33  
Myrtha odor, capiti dolorem prouocat  
1103, 8  
Myrtha uis non admodum tunc 1151, 11  
11  
Myrtha thoracem et pulmonem parat  
1097, 30  
Myrobolus lientem inat 1271, 16  
Myri faciles 1097, 14  
Myri fructus natura et faciles 111, 17  
Myrtum oleum cressitiam est partem  
qualem ut alii defendere possit 911, 35  
Myrtum capiti cinem non et eius  
quartam partem 1191, 8  
N  
NAR VOS in facie, que detegit  
1101, 41  
Nary cinis sit facultatis 1091, 6  
Narysi faciles Ibid 11  
Narysi cinis sit 1097, 60

Narysi montana faciles Ibid 54  
Narysi faciles 1161, 48  
Narysi sunt respirationis uocum 679, 9  
Narysi flumini pisces produci Tyberinis  
longi meliores 400, 48  
Narysi demitti portionem 1171, 15  
16  
Narysi ferantur cur in et oblique deter-  
quantur 1276, 10  
Narysi motus uisiles 154, 40  
Narysi musculi quales 109, 5  
Narysi obstruuntur moribus peris obstruunt  
1547, 17  
Narysi pinis dilantur ob spiritum  
organorum uisceralem 733, 35  
736, 31  
Narysi uisita quibus medicamentis cui  
rimet 1161, 28  
Narysi alio quando spiritus dures adio-  
nem 496, 63  
Narysi alio musculari et nerui 1275, 60  
Narysi alio uisiles Ibid 55  
Narysi uisita uisiles bipartem 118, 18  
Narysi ossa transiens 110, 64  
Narysi osium consiliatio 1151, 8  
Narysi uisita exangis 118, 33  
Narysi uisita interna cur consiliatio 110, 3  
Narysi uisita que medicamentis desiderem  
869, 9  
Narysi uis 670, 57  
Narysi uisita cinis seminis faciles  
1084, 45  
Narysi 1161, 11  
Narysi uis obstruunt 111, 33  
Narysi uisita 1277, 14  
Narysi uisita musculari sunt radicis 101, 7  
Narysi uisita possunt similes esse paren-  
ti secundum partes diuersas 118, 1  
Natura aegy in primis medus conside-  
rent 111, 61  
Natura animalis adio in lacum adiones  
omnem partem docet 107, 10  
Natura a flatu ari qui differt 77, 44  
Natura calida, frigida potior inuicem  
891, 16  
Natura cuius animalis corpus afflicta  
ideam scit 1177, 33  
Natura cuiusque ex primarum qualitatum  
temperie consistit 850, 40  
Natura cuiusque quando alteratur 61, 11  
Natura eadem et qui in parvis et in ma-  
gis corporibus esse possit 155, 31  
Natura et animam uisita 1291, 11  
Natura et artificem possunt aduenire, ad  
autem inuicem 106, 45  
Natura bilis ex longiori inchoa fibris  
anionis accipitur 819, 61  
Natura calida et uisita, magis qui  
calida et uisita sunt et sunt per-  
frum 895, 16  
Natura et cernenda 1151, 10  
Natura et diuersa, diuersa uisita uisita  
alio

- alende 411,3  
 natura facultates primæ, ipsarum inter  
 se et aliarum desiderare ministerium  
 75, 32  
 natura effugit corporis formam, animæ  
 moribus congruentem 177,35  
 natura gaudet confectis 895,61  
 natura bonæ omnia possibilis 178,10  
 natura impetus quando nimis sit unus  
 dus 121,1,4  
 natura in distribuendis utriusque tres scopi  
 125, 18  
 natura industria circa formandas verti-  
 bras 120,1,6  
 natura in pueri ætate celatioribus et hu-  
 midioribus, putredinis fluxionemq. nec  
 bis sentiat 475,16  
 natura in singulis providentia 613,10  
 natura ipsius inclusit tantum in crisi  
 modo suscipiendo, consideranda ut-  
 nus 643,1  
 natura motus quando determinat ordi-  
 natum, sunt, et quando item contrarij  
 642, 24  
 natura nostra cum exercitio habetur me-  
 gna necessitudo 411,7  
 natura opera, inevitabilia 80,1,12  
 natura opera longe huius materia  
 247, 16  
 natura opera prima, ac velut capitis  
 75, 29  
 natura opera que 71,28. 80,1,14  
 851,41. 955,161  
 natura opificem perpetuum 126,18  
 natura providentia in collocandis instru-  
 mentis 100,4,6  
 natura robur unde cognoscatur 129,4,0  
 natura scopi, circa corpus frugendum  
 125, 62  
 natura scopi in procreandis animanti-  
 bus 804,4,3  
 natura sollicitudo circa particularum se-  
 curitatem 105,10  
 natura et anima, nihil aliud quàm cal-  
 dum sunt 713,15  
 natura ex quibus consistit 914,4,4  
 natura infirma, validum neq. motum neq.  
 colorem sustinet 1045,39  
 natura in morbi ardentia laborant, ad  
 debuit remedia, magis opprimunt  
 129, 18  
 natura hoc inferior à cælesti magis per-  
 superat, ab eis quicquid habet bo-  
 na, recipit 613,17  
 natura de æne ex commoda temperie na-  
 scitur 667,4,1  
 naturaliter se habentia corpore, similis  
 sibi præter naturam autem, sanctorum  
 possidet 854,45. 895,45  
 natura admodum esse medicamentum  
 1001, 62  
 natura bonam quo corruptam, et in-  
 tusam in meliorem mutant 443,4,6  
 natura cuiusq. cognoscere medicinam  
 parat 955,13  
 naturam, erroris et animæ eorum qui nos  
 procreant, scire sua industria  
 176, 46  
 natura laboratione cognoscitur, que sunt  
 necessaria 915,19  
 natura, ac naturam securitatis, quandoque cõ-  
 silet 311,19  
 natura nihil frustra militat 107,6,4  
 120,1,6. 103,12. 240,47  
 natura non est impedienda, sed laudanda  
 985, 55  
 natura non insidet utriusque uasis ad senie-  
 laboratos materias, et ad omnia cõ-  
 frictas 319,21  
 natura ut miseri corpora plurimum dif-  
 ferentia 109,13  
 natura nullius materis utriusque seruat  
 formam 775,51  
 natura optima omnium celebrandam ut  
 forma indicat 443,16  
 natura optima tandem appetit, quoniam  
 concupit 810,4,6  
 natura optimæ consuetudo, omnia requirit  
 melioria 891,3  
 natura partu affectu quid indicit 974, 9  
 natura partium patientium, maxiliorum  
 materiam induit 977,99  
 natura per totas corporis partes extensa  
 77, 43  
 natura plurimos morbos soluit per sen-  
 guis excretionem 985,47  
 natura præparat corpus animæ moribus  
 aptum 126,1  
 natura prior et sapienter arte 145,15  
 natura quid 613,11  
 natura refert ea que ex semine sunt or-  
 ta non possit 151,0  
 natura rerum quo paulo incrementa 151, 19  
 natura semper nervus, necnon et arteria  
 à propositis partibus unum 114, 21  
 natura 11  
 natura superante morbum, æger secum-  
 tur 710,57  
 natura temperata à uteribus est præter  
 missa 404  
 natura temperata, regula est constituen-  
 da utriusque ratione 40,11  
 natura calidis et sicci que utilitas ratio  
 temperat 890,12  
 natura calidis quiescentem 474,53  
 natura humidis et frigida que conne-  
 xum 471,1  
 Natura, expletivis facultatis est motus  
 depræstatur 615,19  
 natura inveni quod indidit 716,40  
 natura præcedit motum 679,13  
 ¶ N E C A N T I A frigore, sola quanti-  
 tate letalis sunt, contra quàm ea que  
 putrefaciendo aut erodendo morti-  
 mont 1016,63  
 Nephriticorum urine quales 770,7  
 nephritici que unum 1090,11  
 Nervi à cerebro, musculos suos deferunt  
 facultates 92,45  
 nervi ad percipienda infestantia natu-  
 ris organis tribuit 118,51  
 nervi affectus astricti musculo continen-  
 tem et sensum 91,17  
 nervi coniungunt semper eadem magni-  
 tudine 110,4  
 nervi consensu curant 874,1  
 nervi deducunt facultatem animalem  
 199, 18  
 nervi duri et fortes personæ motui, con-  
 ferunt, ad ea que crassiora sunt par-  
 tum tactu distribuenda 115,16  
 nervi duri quibus tribuuntur portiones à  
 spinali medulla 110,1,7. 111,1  
 nervi ex cerebri substantia propagantur  
 92,11. 161,24. 874,19  
 nervi ex cerebro producti musculos suos  
 largiuntur motum 112,31  
 nervi entis quibus sunt 112,14  
 nervi habent sui similes 489,33  
 nervi in manifestis eademque apparent  
 1162, 7  
 nervi in quibus lectionis affectus, et in  
 quibus tenduntur 73,10  
 nervi longius corpore motum et sen-  
 sum 112,49  
 nervi motum et crumque que differunt  
 111, 53  
 nervi molles ad sensum, duri ad motum  
 apti 104,16. 163,15  
 nervi molles recti ad sensum tendunt  
 151, 52  
 nervi molles omni sensu tactu sunt præ-  
 diti 146,17  
 nervi motus voluntarij opifices 149,11  
 nervi moventes largiunt musculos, si ab-  
 scinduntur, tunc excipiunt musculo, a-  
 nimam reddunt motum 642,4,9  
 nervi moventes ibidem, à colla spina ex-  
 oriantur 747,11  
 nervi musculos principium motus largien-  
 tur 745,16  
 nervi musculos in inspiratione instruun-  
 tum 489,17  
 nervi non à dura meningi, sed à medulla  
 alius exoriantur 141,49  
 nervi nudi quoniam medendi casum po-  
 tuerunt 1161,63  
 nervi omnes producuntur coniuncti  
 150, 1  
 nervi optici, velut oculi rami radices  
 146, 40  
 nervi per directionem casu curant 871,8  
 nervi puncti oleo et alio fovenda 871,41  
 nervi puncti quibus medicamentis posui-  
 lent 871,44. 875,5  
 nervi puncti quoniam mali acutius pharma-  
 ca possunt 1162,12  
 nervi quibus sensus gratia sunt necesse  
 tribui 1162,43  
 nervi qui magis diffunduntur à cerebro,  
 et magis durescunt 147,13  
 nervi recedentes refrigerati, vocem non  
 perdunt 755,4

in Nervis cernit modis que corda sint  
1165, 10  
nervus dolor afficit non acutis 733,  
47  
nervi sensus qui sint 146, 10  
nervi septime copule sunt primi expe-  
siti duri 161, 10  
nervi septime copule unde oriuntur, et  
in quas partes diffunduntur 161, 13  
nervi sunt inter se partes, in quas se  
revertunt, desinunt et sensu et  
motu 160, 5  
nervi infusi ut a supremo principio  
91, 1  
nervi sunt ut ferarum prae dicitur, Gale-  
nus dicit 671, 13  
nervi non utriusque cordis conficiuntur 104, 1  
27  
nervi continui sentiendi et movendi fa-  
ciles infusi 184, 14  
nervi opacis sili, sensibiles in ista mea-  
tas 149-41, 110, 61, 145, 184,  
661, 5, 743, 25  
nervi punctionis emplastrum opacum  
873, 63  
nervi per ista quae medicamenta con-  
sueverunt 1164, 60  
nervi substantia arteria et nervi 733,  
42  
nervi indurati in brachio et crure,  
quod medicamentum adhibendum  
173, 64  
nervi indurati ubi frigidum admo-  
vet 1161, 13  
nervi trine sextae et septime conu-  
gati copule commiscetur, tendentes ad in-  
feriora capitis 110, 19  
nervi thoracis nunciat, a spinali medul-  
la oriuntur 124, 14  
nervi transversus indurati curatio 173,  
59  
nervi indurati curatio 873, 51, 1163,  
13, 1164, 16, 1163, 12  
nervi aut medulla spinali mixti trans-  
versum, que infra scissuram sunt par-  
tes, et motu et sensu praestant  
91, 40  
nervi punctionis est dilatandum  
873, 18  
nervorum effectus duplex 190, 14  
nervorum a spinali medulla oriens con-  
iungit quarta, quinta, sexta, septime,  
octava et nona 129, 14  
nervorum a spinali medulla oriens con-  
iungit secunda et tertia 129, 60  
nervorum a spinali medulla oriens pri-  
ma coniungit 1161, 18  
nervorum brachii externorum origines  
161, 16  
nervorum in cutis foras diffusorum,  
radices quatuor 166, 16  
nervorum magnorum in cubito defen-  
dentium sunt quatuor numero 161,  
40  
nervorum mollitudo et duritiae estiman-

dae methodus 163, 8  
nervorum molliorum duritiae oris ac  
progressus 151, 10  
nervorum mollium prima, secunda, tertia  
et quarta copulatio 149, 47,  
161, 15  
nervorum mollium quinta copulatio 150,  
11, 161, 135  
nervorum mollium septima coniunctio  
150, 43  
nervorum mollium sexta coniunctio 150,  
16, 161, 44  
nervorum opacorum consideratio 149,  
14  
nervorum opacorum oris 111, 1  
nervorum oris a cerebro 740, 1  
nervorum per diffunduntur in nervu-  
lum 119, 9  
nervorum per ossa sacri foramina pro-  
ducuntur tria paria 116, 47  
nervorum principum, arteriarum et spi-  
nalis medullae 192, 14  
nervorum punctionis angustiae non us-  
dem medicamentis curantur, quibus  
nervi madati 1164, 63  
nervorum recurrentium oris, progressus  
et radices 111, 62  
nervorum resolutionem acriam variis se-  
quantur symptomata 671, 14  
nervorum se se coniungentes in nervu-  
culum oblique implantatio 163, 17  
nervorum tertia coniugationis proci-  
sus diffundit se in faciem, dentes, et  
guttur 150, 12, 751, 2  
nervorum tertia coniugatio gastricae va-  
cae 110, 12  
nervorum totius corporis oris 156, 4  
nervorum tres diffunduntur 111, 12  
nervi molles natura quibus tribuitur  
110, 15  
nervi resistentes in istis Galenus  
728, 47  
nervi septime copule cum illis qui a se-  
xis oriuntur, copulantur natura 161, 6  
nervi sexaginta oris a spinali medulla  
143, 12  
nervi aut ligamentum, scissa, resci-  
sus non possunt 111, 12  
nervi nulli semper in sexfora, dures in  
confusio illa mouentur inferius  
110, 32  
nervi nulli in cor distribuuntur 139,  
33  
nervi nulli sine vasculo motum pra-  
estant 719, 28  
nervi omnis exangui et frigidi 14,  
63  
nervi omnis sensu praeditus 93, 13  
nervi omnis vel a cerebro vel a spinali  
medulla oriuntur 146, 18  
nervi quando redduntur insensibiles 146,  
4  
nervi quando transversum secantur  
155, 40  
nervi quantum mollium, tantumdem sen-

sus ferunt 121, 6, 146, 35  
nervi quibus inflammatio propria co-  
nspicitur, ac sunt mente dicitur  
92, 10  
nervi quid 1161, 15  
nervi via est matris facultatis a cre-  
bro descendens 93, 19  
Nervi dicuntur tripliciter 113, 60,  
1017, 30  
nervi quae dicuntur 113, 40, 1017,  
63  
nervi quae sunt 115, 19  
nervi corpus quod sit, nervi promi-  
scuitatem 114, 44  
nervi uerba secundum significationem quod  
sit 1161, 13  
nervi uerba tertia significationem quod  
115, 7  
¶ NIGELLAE faciles 1097, 27  
nigella oleo interea et affusa, inde-  
tur grandae 119, 86  
Nigrellae oculorum cause 80, 12  
nigredo quatuor uis aduersus  
671, 35  
Nihil a familiaris infestum 119, 9  
nihil ex nobis sit 80, 4, 13  
nihil ex propriis affectionibus conficitur 111,  
21  
nihil in contrarium qualitatem totum si-  
mul negat 114, 45  
nihil inanis fortisque partem agendi facili-  
tem formae 15, 57  
nihil sit sine causa 89, 55, 110, 12,  
141, 9  
Nili excretion 115, 45  
Nomen omne nomen 116, 16  
Nomi summa et ap brachium quam ha-  
bent facultatem 409, 61  
nisi uerba 1111, 11, 1113, 10,  
1143, 41  
Nisi uis quae locomoda offert  
412, 11  
¶ NOMAZ quibus uerba sunt 1179, 1  
Nomen differentes est, quibus uis uis-  
sunt in utrumque aeg. in uerbum  
143, 5  
Notio commentis 66, 4, 141, 13  
notiones medicinales experientiae quae  
614, 49  
Notitia apothecae 116, 6  
notitia praeparationis 1161, 5  
Notandum nihil in sensu corporis  
160, 54  
Nouissimum quando fiat 617, 31  
Nuxa a uino illa quomodo deprimen-  
dum 114, 42  
¶ NUCCI regiae nominibus affragant  
115, 15  
nux pinis vel strobili facilius 1161,  
14  
nux pinis et strobili substantia  
et facilius 115, 10, 1081, 18  
nuxem uiridem succo adesti affragant pe-  
netrans 1113, 63  
nuxi depraui cause 661, 50  
nuxi-

## I N D E X.

- Nutritus ubi stratus quam diligenti-  
ter considerandum 414, 6
- Nutritus confusum unde petenda in a-  
gri 907, 17
- Nutritus in prima accessione inuagire  
qui sunt 906, 4
- Nutritus modus unde colligi possit  
613, 4
- Nutritus qui non sunt in ipsa accessione  
declinatione 907, 14
- Nutritus tempus in synochis quale sit a-  
piam 916, 55
- Nutritus tempus unde sit conuictandum  
914, 62
- Nutritus uti que ratione firmetur  
471, 31
- Nutritus omne similitudinem sibi suum  
ex sanguine trahit 111, 4, 2
- Nutritus inuagire aut intertempus  
sumpta infirmitas 57, 15
- Nutritus simul et medicamenta  
59, 38
- Nutritus sunt meritorie calida  
104, 1
- Nutritus uterum solatius, bilisus ad  
trahit ante alias cibos ingerenda  
477, 13
- Nutritus principia quatuor 314, 37
- Nutritus quibus ab officio et tem-  
poris est ferenda 916, 4, 8
- Nutritus quando minuenda quantitas  
aut mutanda qualitas, aut utriusque  
cuiusdam 477, 4
- Nutritus quantitas à virtute, qualitas à  
tempore ferenda est 916, 33
- Nutritus duplex genus 104, 3,
- 57
- Nutritus et quocumque distans 76, 9
- Nutritus à medicamento quomodo  
differt 84, 9
- Nutritus animalis quid non sit carne  
ritus 84, 10
- Nutritus attrahit ut nature 78,
- 34
- Nutritus omne dulce 104, 13
- Nutritus propriè quod sit 57, 15,
- 36, 4, 4. 58, 41. 76, 6. 1013, 13
- Nutritus tripliciter dici 57, 21
- Nutritus anni ab eo quo dicitur  
105, 1
- Nutritus ut alteratur, sic etiam qua-  
quo modo alterat ut quod miratur  
427, 37
- Nutritus illi, que nature et nobis sunt fa-  
miliaria 404, 4, 3
- Nutritus corpus que parum et que u-  
berius possunt 120, 57
- Nutritus inter duo horum qui possunt  
906, 39
- Nutritus assimilatio proficua 56, 33
- Nutritus augescendis necessaria 73, 18
- Nutritus naturalium aditum est prima  
627, 6
- Nutritus necessaria que 31, 3
- Nutritus aditum magis, est electissimum
- et lenis 614, 56
- Nutritus organa 600, 40
- Nutritus quando fiat et eius causa 75,
- 20, 81, 58. 474, 46
- Nutritus quid 74, 33, 114, 31, 69, 16, 6.
- 1041, 33. 135, 5, 23
- Nutritus quomodo fiat 408, 59, 46, 4.
- 49
- Nutritus grana, lassando in fantulo est in  
epia 484, 18
- Nux uigilans sentit foliqui septuaginta  
in duas 129, 5, 29
- Nux picea 1407, 3
- Nux lentica continet foliqui decem et  
octo 129, 5, 9
- Nux regia sumpta cum carica et ruta fit  
diacaphuracum 115, 4, 3
- Nux regia uiridis, apta est solando uen-  
tri 315, 46
- Q N Y M P H A L A S facit 1098, 19
- Nympha matris propagandum 305,
- 34
- O B S E S cibi digestio minui-  
da, augenda autem exalta-  
da est 478, 37
- Obesitas caritas 950, 55
- Obesitas placet dysuria quibus conuictus  
uideri 669, 41
- Obesitas quando scelerata uideatur  
ibid. 34
- Obesitas quid uideatur dupla 668, 40
- O H uero à frigore gignitur 673, 3
- Obusci quod 101, 4
- Obusci constat foliqui tribus 1290, 32
- Obusci ab ipse ratione non fit 13,
- 27
- Obusci et experientia idem 13, 1
- Obusci fieri debet in pluribus 13, 42
- Obusci uero basit in similibus aculeum  
conuictus colligitur 13, 13
- Obusci qui fieri debet integra et ab-  
soluta ibid. 14
- Obusci audi ratio 82, 56
- Obusci non aperienda priusquam ple-  
nitudo uacuetur 919, 3
- Obusci afflicti sunt est partium dissimila-  
rium 128, 15
- Obusci et densitati cutis ex parte  
flata prout, quod carnalis remedium  
433, 15
- Obusci à duro fletore caritatis  
835, 32
- Obusci remedia etiam ad conuictus  
nem facit 477, 34
- Obusci non differunt et cause et  
remedia accommoda 30, 46, 43, 3.
- 6, 474, 32. 477, 56. 835, 49.
- 892, 16. 905, 49. 919, 31. 1070,
- 61031, 31. 1101, 36. 1101, 4, 8.
- 1106, 61. 1144, 14
- Obusci quod 912, 49
- O C C A S I O temporis conuenit in  
his que corpus necessarii afficiunt  
850, 39
- Occipitis foramen maximum 132, 64
- Occiput nec facile exoritur, nec citra no-  
xam refrigeratur, præcipuum stru-  
ctus aculei cum sit 1198, 22
- Occidens qualem esse debet 1038,
- 37
- Oculus sole ratione comprehendendus  
131, 23
- Occiput negotiosum non mutat tempera-  
mentum 474, 4, 3
- Oculi uis 1114, 1, 7
- Oculi et ceteris suis facultatibus 361, 23
- Oculi cor lacrymans 644, 18
- Oculi fabria 146, 37
- Oculi glauis et nigri unde sunt 120, 9
- Oculi humoribus que producantur in  
t. hum. 366, 3
- Oculi musculus magnus 300, 47
- Oculi offendentur à uidentibus splendore  
366, 56
- Oculi que parte expurgantur 417, 50
- Oculi quare grauius 169, 11
- Oculi quare posterioribus capitis partibus  
non uisus 164, 61
- Oculi quare uisus possunt peruenire  
748, 38
- Oculi actum perueniunt 8, 16
- Oculi caligantibus que sunt consideren-  
da 714, 40
- Oculi ferunt maiores et molliores ner-  
uam illa dicitur parti 310, 4, 4
- Oculi perueniunt medicamenta que  
850, 27
- Oculi sursum uel deorsum peruenit sine  
ita uidentur duplia 748, 51
- Oculi tunc 842, 50
- Oculi ultra pulia medicamenta pos-  
sunt 810, 3
- Oculi inflammato facit ferendum et lat  
medicamentum oculorum 11, 11
- Oculi afflicti remedia Archigenes  
1213, 14
- Oculi afflicti per conuictus  
748, 62
- Oculi à flatulencia substantia et ter-  
forum, citato 945, 64
- Oculi angustis crusta que conuictus  
1101, 5
- Oculi caritatis quid inducit 956, 58
- Oculi diffinitionis à pluritudine cu-  
ritatis 947, 58
- Oculi dolores compositi sunt bona  
li, aut media 996, 19
- Oculi dolores que ratione Galenus  
sanat 850, 12
- Oculi dolores uidentibus causis  
1221, 60
- Oculi dolor unde exoritur 941, 4, 3
- Oculi extremitas que parte expur-  
gatur in uariis 270, 35
- Oculi ex signis, in sanis etiam acci-  
dunt cognoscuntur 617, 7
- Oculi fluxus caritatis cum non sint adu-  
munda obstruuntur pharyngea et a  
piti uidentur 1118, 8
- Oculi plurimam repulsiuam agunt

fructum pharmaceum	1113, 3	670,	55	oleo camemelle in quibus sit urentem	
scelerum debilitas à creffo humoris	7	odorata omnia conciliant capitis dolorem		corporibus	1198, 16
scelerum quæ auxilium	109, 1	746,	60	oleo media redduntur fere	1012, 12
scelerum inflammationem cum fluxione		odoratum sensus ubi perficiatur	747,	oleo post frigidum membra subgrada	
quæ ratione Galenus de art. 990, 16		61		4, 19,	54
scelerum inflammationis quando balat		odorata sensu non saporis esse existere		oleosa se fluxum accendunt	55, 61
Cur curat	943, 52	129,	9	oleo angustis qui sunt, Cur qui morantur	
scelerum magnitudo quid indicet	819,	odoratum non amittit suum	1050, 15	1012,	7
60		Odorata non in licant facultates medica-		elutata omnia corambyum	410, 22
scelerum morbus curatio	942, 43	mentorum	1021, 57	olea omnia gignunt p. accensum sordid	
scelerum motus qualis	911, 46 94, 11	odores pleriq. similiter separibus nos af-		nam	117, 17
scelerum motus quibus voluntariis, to-		ficiunt	1030, 9	olea que ob lentorem facili descendunt	
lentiis; illis præferti musci	269,	odores urtumentiores caput commo- la-		169, 21,	
32		dunt	111, 13	oleum omnium radices eurentemias	
scelerum motus unde precat	748 10	odori sensus in quibus cerebrum urticu-		sunt	417, 43
scelerum musci facilius concipiuntur		lis colluctat	1050, 27	oleum pteridumque cadu temperata	
4, 9,	14	odori non prinde ut super sensibilibus it		fluit, quoniam folia	189, 55
scelerum musci ubique	269, 43	p. rati indicat	ibid. 4, 6	oleum moris speciei facies	410, 13
scelerum motus	151, 37, 112, 40	odori refrigerantem conferi capiti exal-		oleum adhibi conditum redditur	1014,
scelerum nervi, creffiores nervi lingue		fudo	130, 62	62	
1, 8,	42	odorum dignitas inuit plurimum istum		oleum diuon subdacti	1012, 19
scelerum nervi motores unde oriantur		risperantem	351, 9	oleum accitum	461, 17
251,	8	odorum dignitas promouetur ab infusio-		oleum calfacit, at non exidenter	1026,
scelerum paritas quid significet		ne cerebrum	255, 3	50	
220,	2	Q. D. I. M. A. ex cuius humoris afflu-		oleum calorem parit eis, quibus applica-	
scelerum phlegma inuit aut alburnum		tu nascitur	708, 5, 991, 15	tur, accendit	ibid. 62
941,	39	ardens in quibus symptoma sit	976,	oleum chamæmelum	413, 14
scelerum plagis que opulentur		34		oleum corporum illorum, odoris Cur sudoris	
1113,	26	ardens quid	944, 56, 976, 31	effluum prohibet	1018, 5
scelerum pus, colluria ex meritis desu-		ardens parit in fo. thorax Cur iter non		oleum cur adurere nos calfaciat	1016, 1
tuunt	954, 39	quam infusio	601, 51	oleum est diuon medicamentorum nate	
scelerum pus quomodo uacuandum ibid.		ardens Cur anarismatis discrimin		ria	1025, 17
64		703,	35	oleum Cur uris non propriis nos calfa-	
scelerum pus quomodo curetur	954, 49	ardens ex infusio ori curatio	976,	chid. J. ad. infusio frigori	1017, 51
scelerum sensus aliorum omnium creff-		33		oleum experientiam est in domesticis	
simas	110, 46	ardens curatio	944, 64, 1099,	1016, 18	
scelerum sensus unde precat	748, 17	54		oleum experti salis Cur salsum, quomodo	
scelerum sicut longè missiles	252, 12	Oenopis radix metorem distat	69,	aliam subducit	1015, 19
scelerum temperantia quomodo digre-		61		oleum frigidum accendit	1016, 1
scantur	119, 49	Oesophagi in ventriculo infusio		1016,	16
scelerum toris induratis que conferat		212,	46	oleum infusio premit	1022, 11
1120,	50	asphragmatis Cur asus	253, 16, 762,	oleum infusio lenit	1021, 27
scelerum uasa quando sint præcedenda		60		1023,	20
941,	20	asphagus seu gula	117, 37	oleum lenit est minime mordax	1078,
scelerum uita quid exparet	1077, 42	Ocypot	1139, 40	31	
scelerum ulcera, quibus medicamenta po-		ocypot quem non habet	1135, 7	oleum lenitatem est lenius commo-	
stulant	1218, 7	Q. O. L. A. calida Cur relaxantia	451,	119, 1,	37
scelerum ulcerum scopas	1219, 4	28		oleum lenitatem inter brachia Cur si-	
oculus ceruere unctione que populee è di-		Oleum	1078, 12	catilla	1027, 5
rectis opposita sunt, ab id. volubiles		Oleum cum uris in uris collatio	1037, 47	oleum multifariam dicitur nos calfacit	
esse	269, 26	olei differentia complures	922, 22,	1017, 38	
oculus pharmaceum roborans	1210, 64	927, 14, 2013, 2,	1156, 31,	oleum oculis mordet	1012, 18
oculo uno clauso, amplius aliter pu-		1075,	20	oleum emphaticum asstringit	1015, 2
pilla	267, 61, 345, 2, 663,	olei dulcis natura Cur acris	1016, 1	oleum pingue lenius, que ratione affi-	
58,		olei effectus uarij	1012, 10	merit	1078, 62
oculus salus propter opacum nervos		olei facultas	1176, 38	oleum quid effusa ad frigidum	447,
260,	65	olei ex oleis facultas	1078, 17	13	
oculus, organum lucidissimum Cur quon-		olei inania prohibet faciem exten-		oleum quibus facies inuit sit nigrum	
sumissimum soli	215, 17	tionem	478, 12	1026, 57	
oculus utique quoniam habet motus re-		olei lenitatem facultas	1174, 41	oleum repugnandi ratio	1024, 18
ctus Cur dicitur circularis	944, 40	olei portis	1015, 10, 1043, 45,	oleum ut accen. ardeat doloribus col-	
Q. O. D. A. B. I. L. I. V. M. substantia est		olei calidi persasio, quibus conueniat		eis à frigido succo ortis	931, 25
aspera	1070, 13	1012,	57	oleum subonem	450, 18
odorandi sensu, principium est ca-		olei refrigerandi ratio	ibid. 49	oleum sympathicum	461, 10
riterium cerebri ventriculorum		olei acris qualitas expendenda ibi.	44	oleum simpliciter Cur per absum dicti	
				1022, 63	

## I N D E X.

1012,	61	omphacium	1210,37	62	351,18.170,18
oleum talem servat nostram temperiem,		Omphacini facultas	1156,32	opocoron nervorum constitutio in urina	
qualem accipit	1017,19	Omphaci & acetum in quibus differunt	1044,	distictisq;	270,32.145,8
oleum temperie est medium	1013,18		56	opocoron nervorum ceteris	344,1
oleum tepidum nervis casus non congruit		¶ O N A G R. 1 facultas	1008,16	63	
1163,	25	Ondrychis cuius sit facultatis	1bid. 62	opocoron nervorum progressus	251,62.
oleum ucluti materia reliquerum medicamen-		Ondrychis uis	1067,1	264,	61 (165,19
tionem	1027,10	Oncles quibus morbis conueniat	1066,	59	
oleum ulcera reddidit ferdida	875,18	Oncis cuius sit facultatis	1099,2	Opus de usu partium commendatur, tam-	64
oleum ulteri casus aduersissimum medica-		Oncina cuius sit efficacie	1091,59	quam ibidemque utrum principium	
mentum est	869,60	¶ O P E R A T I O lardis tripli citur	217,	319,	16
oleum uulsum & byarrum quibus af-			48	opus de usu partium philosophis longe	
fectibus proffit	1143,25	Opera uoluntaria duplicia	101,14	anulsum	1bid.10
Olfacienti ratio	150,6	opera uoluntaria que dum plene sunt li-		opus quod dicatur	71,31
olfacientia de sensuum uis esse nesci pel-		bera, quodam corporis effectibus in-	101,15	¶ U R C H I S ferapiis qui habet uisum	1099,
luciam, neq; eius est	129,12	ferant	101,15	55	
olfacienti sensus in antrioribus cerebri		operis de usu partium comoda	310,1	Ordo & equalitas, naturae similitudo	
mentis sita	129,50. 254,	Ophiasis unde	954,8. 1180,32	est	566,24. 594,26
26		Ophius cuius sit facultatis	1118,31	ordo ad alterationē quare plura sint	
olfacienti uis ad quibus labefactetur		Ophthalmae sue lippitudinis medicamen-	1210,	infinita	751,46
760,	58	ta congruentia qualia esse debeant	32,	organum amia in animalibus infinita ha-	
Olfactum substantia	119,1	3267,	4	berit ad naturae facultates	120,18
Olfactum instrumenti sedes	147,16	epithemia quid	37,21.971,10	organis respiratoris praesentia in istis,	
Olfactum qui uapores uoluptatem uel do-		Opifici artem manifesti quid induit	125,	qua carumque gran dolere animal af-	
lorem efficiant	673,44	58	58	figantur	495,1
olfactum acri uapores infestant	673,	Opil uires	1261,24	organorum elementa que	74,58
40		Opino recens mali praesentia, cur iustitia	1261,14	Ore ueritatis nascibundo existente in	
olfactum de quibus dicatur	127,5	tion inferat inuicemque autem, neque	33,14	alia restrictione, quid agendum	471,
olfactum & gustus ciborum discernenda-		Opio confectus utrumque est post tempus	978,	17	
rum instrumenta	411,60	compositionis ad nimis sensibile	978,32	Organi facultas	1099,27
olfactum sensibile	119,1	opio confectionum medicamentorum com-	1262,	Orimurda tria musculorum genera de-	
olfactum sensibile etiam non est partium		positiois scopus tria proponit	35	stinata, aperta, claudenda & cir-	
quam sensibile audire	171,12	1262,	35	conuegentium	273,62
Oliue	470,13	opio qualia medicamenta miscenda	1bid.	eriri & coherere differunt	161,20
oliue & aut quid tenui uisui consider-		50		eris eff. diuinitas cur medicamenta for-	
418,	16	opio quando in capitis dolore attendam	1202,	ta & utrumque non cabenda	
oliue balneae & collybiae eductae		1202,	31	1231,	7
ante alios cibos, uicinis subducendi		Ophibotones quid	716,17	oris crustis delenda rimanda uaria	
grata	38,22	opium quibus inferri debeat ad aures in		1235,	30
oliue maria conditae dispositum & uice		flammatas	1207,58	oris inflammationis curatiois communis sit	
mentis effringunt	1259,4	opium recipiente medicamenta dolorem		pus quis	2210,65
oliue partem naturam largiantur		tollunt, ipsam tamen dispositionem re-	978,12	oris inflammationis uigentes quibus me-	
385,	19	linquant	978,12	dicamentis sint eo, unde	1232 52
Olois uis	1095,50	Opobalsamum ad affectiones indigestes		oris inflammationibus induratis, que me-	
Olyra	547,27	calore non magis pere opulari	1199,	dicamenta conueniant	1232,42
Olyra uis	415,56. 1098,53	1199,	19	oris inflammationibus medicamentis que	
¶ O M E N T i constitutio & usus		Opocarpus est letale, ut peritiorque in		epidemat	1232,12
210,	24	myrba	1232,28	oris inflammationi contrariae que con-	
omentis figura	179,40	Opopaeus facultas	1100,15. 1183,	gruant	1bid. 47
omentis natura	210,29	34		oris musculi	170,5
omentis origo	1bid. 64	Optici nervi productio, effectum crystalli		oris partes uide necnes ad soperi di-	
omentis praeparationis utilitas	211,10	lin humoris ad cerebrum uerax est		scernendos recipiant	200,4
omentis uicis ad mesenteria uiciorum	142,1	mutatis	165,41	oris passibus extirpandi pharmaca que	
18		optici nervi cur intra cranium inuaginantur,		conueniant	1235,17
omentis exidente per ualues quid agen-		postea autem diuisuerunt	271,56	oris nerui diuier est omnibus fieri facili	
dum	276,9	optici nervi finis, consistencia, & confusa	346,29	partibus	201,13
omentis generando unde principium		optici nervi soli cerebro non apparent		oris tunica quoque diuidit soperis	
179,	30	271,56		276,	4
omentum fons caloris gratia condi-		optici nervi sensibiles foriuntur me-		oris ueritatis eff. bilis pharmaca A-	
tionem	178,35	271,56		scipius	1252,40
omentum quid	179,14				
omentis egerit materia ex qua, & effluat					
te a quo fiant	695,21				
omentis sunt medicamina	418,53				
Omphaci facultas	1044,7. 1150,37				







# EPITOMES GALENI

Pars coniuge carnes median requirit po suerunt 304,43	condē 467,26	220, 36
pars dextra sola, uel sinistra, aut resolu- ta 729,41	partes instrumentales 344,20. 349,60	partibus singulis quatuor infusis scilicet 767,21
pars inflata omnis dolet agendo 761, 30	partes matris dextrae aut sinistrae si- nistris 399,63	partibus superius inflatis exterius necesse dicitur illis secundum esse 974, 55
pars nulla in factu generatur citra sen- suum substantiam 121,60	partes maxime carnes quae 81,12	partibus in partibus suis aditus et usus 74,60
pars nulla proprie se habetur 318,19	partes nervis carentes 309,60	partes corporis à natura sunt consti- tutae congruentis animi moribus 217, 23
pars omnis quae mouetur, uariis utitur modis 94,50	partes 392, 20	partes uniuersae sibi inuicem conueni- unt 196,40
pars quae corporis, quod furis magis se perat, uero promptus manus suum obit 583,53	partes non impellunt animam ad agen- dum 295,13	partes minores sunt 864,45
pars quae propter quilibet tempore habet substantiam 79,29	partes omnes alimento indigent 117,9	partes nulla ex se habet sensum 219, 6
pars quae, simulque nata sunt animalia, suum habet usum 125,29	partes omnes alimentum sub ipsius assimi- lant 301,45	partes omnes agunt secundum proprie- tatem temperamentum 76,64
pars quid dicatur 194,31. 842,19	partes per quas fit fluxus, corroboran- da 965,59	partes in inflammatione obferuari à se dore ipsius unitatis 277,17
pars similis quae dicitur 842,57	partes pligmate oppresse, dupli- ficuntur affectu 61,1	partes in inflammatione tria genera 296,4
pars superna recipiens, qualis esse de- bet 970,34	partes praemorse quae 349,57	partes causales sunt perit uero tem- poris 79,11
Partes agrotantes displicendi ratio 8,6, 39	partes principes sunt cerebrum, cor, ve- sicula et testiculi 816,43	partes cuiuslibet usus ad cognitionem effe- ctorum locorum conducit 724,6
partes affectus quando auditur et quid de triplici uacari debent 881,4	partes quae aliis prius fluxiones ex- cipiant 992,55	partes in inflammatione cario, si uniuersum corpus sit plenum 216,55
partes animalium extremis, quodam cor- pori alimentum praesent 407,23	partes quae citius, quae posterius in na- ro formantur 46,13	partes inbecillitas ad intemperie nasci- tur 258,6
partes à femine oritur 122,1	partes quae differunt ad uitam principis 214, 15	partes in inflammatione dolet quando solu- ne 61,16
partes à similibus temperatae sunt cau- sa leuatur facile medico uero con- trarium usu inuenitur 819,56	partes quae corrigi, et quae minui pos- sunt 812,48	partes putrefactis radix aduocanda est 982, 7
partes à uiscera autem latus: à rebus, sunt carnis similes 774,18	partes quae dant interdum prius deperire ganer 767,55	partes solae substantiam conferunt me- dicis excrementis 814,17
partes carnis, naturae calidiores 49, 17	partes quae uacantur facile, et quae a- criora medicamentis desiderant 817,18	partes utilitas ex altione cognoscitur 199,11, 222,6
partes corporis omnes nervorum sunt et pores 148,42	partes quae uia cum effectu amputantur 950, 18	partem altioni semper usus est conueni- entis 116,23
partes corporis seruantur aut uisus ra- tione, aut medicamentis, aut manu opera 32,35	partes recludentes reserantur tripliciter 818, 23	partem constructionis prius scopus u- tilitas 277,25
partes corporis uniuersae, opera sunt na- turae 74,19	partes reserantur, pigre ad motum sunt 220, 22	partem corporis hominis temperatae 45,6, 48,4
partes dextrae, sinistrae sunt partes 355, 33	partes sentes admodum siccae, licet me- dicis capacitates superfluae humiditate redundant 475,13	partem differentiae 975,48. 816, 36
partes dextrae masculorum sinistres, fe- minarum esse generatrices 300,2	partes sensu uacuae nullius symptomatis sensum possunt percipere 692,1	partem formationes quomodo carie- ntis natiuit 974,27
partes dextrae, in uis quibus modis ad- ducantur 852,19	partes singulae trahunt alimentum simi- litate: licet alia sanguinis sedimenta 1259, 45	partem in inflammationem quoniam magis et quae minus sunt excludenda 974, 11
partes eas plethi solere, quibus quis pre- cant 342,47	partes solidae ex semine generantur et nutruntur 114,12. 914,45	partem naturae pro aetate differentiae 407, 36
partes ex defectu nutrimenti celeriter re- frigerantur 384,17	partes solidae nullo modo humiores ef- ficiuntur 825,17	partem uicissitudinem doloribus quid me- dicatur 116,11
partes excrementa reddunt fortiores et solidiores 427,68	partes tardi sexus continent omne me- dicamentum 883,64	partem officia quoniam sunt necessaria uitae, et quae distant et utiles 258, 11
partes familiari alimentis destituta, ex- pletur succo uisibili 257,41	partes uoluntario motu praedictae, ad mi- nimam duabus eorum masculis sibi op- positis 269,2	partem praefundum effectus, quod re medie possident 28,60
partes fortiores ad inbecilliores excre- menta propellant 87,22	Partibus uis 1079,23	partem similitudinem naturae ex quibus con- sist 589,9
partes inbecilliores à fortioribus humo- res recipiunt 992,42	Partibus uicibus inest facultas propriam trahendi materiam 259,16	partem similitudinem morbi in pura intem- perie consistunt 1197,42
partes inbecilliores earum omnium prima corruptionis excrementis morbus libet 49	partibus inflammatis acutis necessariis impedire calor et trahit 374,13	partem similitudinem morbum duo ge- nera 2189,15
partes infirmis dum laborant non sunt fi-	partibus similibus prius animam faciuntur feruntur acceptae	partem similitudinem propriam diuersam quod

quod	225,11	PECCARE qui plus aut minus di-	Proprium natura & facultas	379,1
partium singularium singulis que nutri-		cantur	988,60	47
mentum suscipiunt, symptomata sunt		Peccata & falsa opinione natiuitas	419,1	
duodecim	606,55	23		
partium singule per que confiderantur		peccata aliena quoniam nostra elariorum per-		
sunt	91,13	fectum	419,64	
partium singule per quem regionem par-		peccata infra modum non aliterantur de-		
gentur	774,3	mentum	1190,10	
partium singularium motus in phlegma		Pectinis esse	317,64	
tu sunt detrahendi fluxus	924,10	Pectus affectio paruis infirmitas sicut ea		
partium temperata quomodo construc-		tapismatis asperguntur	921,40	
tur	820,45	pectori phlegmone obfessio, que mela-		
partium altera et motus, que non infestat		mentis cooperantur	940,12	
super nitens, in casu	1169,32	pectus extrinsecus que conducat		
partium multum triplex	234,13	1090,1		
partium vena quando in sella collocanda		pectus incrementa edunt cum tusti		
52,57		ad medicamentis transibunt	835,63	
partium vena agere medicamentum conu-		pectus effusa tota, que respicit cum eo rem-		
erit	1187,9	issionem	186,55. 249,17	
partes & ab eis differentia	769,13	pectus per qui regionem purgatur	940,1	
Parasides	209,50	23		
Paragryna Hira quomodo componatur		Pedes homini prestiti esse cum detestis,		
1181,1	11	non molles	210,51	
Passus animalium plurimum confirmari		pedi conueniunt motus quatuor	214,18	
ad laetis bonitatem, vel malitiam		Pediculus maris remedia	1193,7	
469,1	14	Pediculari in capite ad quibus causis orian-		
Passus fit ab altero	301,8	tor	1181,24	
Passilis Ane. Arizon, ad uulneroses ac-		Pedunculus, siue planta, metacarpis similitu-		
trahendi & profectus	1151,4	dinem refert	211,23	
passilis diuersi conata profusa sanguis		pedis anteceteris partes adambulans per		
in eis erigunt abortis	806,59	similes comprehenditur	212,26	
passilis ex glacio ad inflammas aures		pedis conatus truen commodorum gratia		
120,10. 8		efformata	1181,55	
Passilis nigri, Galeni compositio	3178,1	pedis uicis inferior media inter mollem		
11		& duram	215,65	
passilorum Aristarchi compositio &		pedis digitorum motiones quatuor	213,1	
1181,4		23		
passilorum diuersi per 3000 usque. Ibid.		pedis dignitas magnus ex duobus tantum		
24		articulis constat	212,30	
passilorum ex facie confectis, quos		pedis inferior regio unde alimentum ac-		
haberi tredecim de charbe appel-		cipiat	167,60	
lant	124,18	pedis motus ad quibus dearticulationibus		
passilorum rosaceorum confectio ex Du-		presenscitur	212,43	
modum	1284,13	pedis musculorum genera quatuor	160,1	
passilorum scillitiorum preparatio	1272,1	30		
59		pedis nervi	167,8	
passilorum Theriaci usus & compositio		pedis osium consideratio	118,52	
1178,16		pedum distictio ualde opportuna	210,1	
passilorum Andronis	1209,60	44	211,10	
passilum ex chara compositum. Ibidem		pedum partes interne, cum aliis &		
64		magni cum externis	211,43	
passilum ex Corallo	1245,50	pedum urne quatuor	147,4	
passilum fungorum compressum	1178,1	Pellus quille uis	1138,33	
43		Pelops Galeni preceptor	744,154	
Pallaxia, diuersi, & eorum facultates		Pelvis in tra compressi operacionem ner-		
11	1107,39	uorum	260,17	
Partis consideratio	118,45	Penis essentia tota in uetris fistuloso con-		
partis usus	216,14	sistit	710,14	
Partis que dicitur	846,21	Penis quando e tenditur	804,55	
Partis quoniam que	26,25	Pentaptychus uis	1180,15	
Pan. contraxi aliquod ad alterationem et		Periply facies	2100,43	
seleuacionem conuati	21,63	Periplos uicis sit facultas	110,9	
partim diuersi singula, ex finitimo genere		40		
147,41		Periplos mecleporum, uim habent res-		
Panaceum cura	398,1	uenda urinum	167,10. 379,49	

# EPITOMES GALENI

sub specie transverse erigo 224, 23  
 Pericoronis quid sunt 113, 20  
 Pericoronis in Peria letalis est, in  
 Aegypto innocua 326, 45, 1100,  
 53, 1206, 52  
 Perisica cur non possit alios cibos manduca-  
 re 118, 12  
 Perispiratio carnis, celeritè purgata  
 63, 16  
 Perturbationes maxime facili deprehendi-  
 ductur ab omnibus, leues autem ne-  
 quequam 419, 54  
 Perituri membri curatio 835, 40  
 Perituri singularis 286, 26, 28  
 Perituri ubi dicitur 215, 43  
 Perit hominis, quæ maxime manum intol-  
 lerat 214, 35  
 Perit quoque organum appetitiferum  
 Ibid. 16  
 Pessarij conficiendi modus ad leniendos  
 dolores colicos 913, 49  
 Pessilens lues est utriusq. fera quædam,  
 ab arvis patresine orta, cui nihil ef-  
 ficacius obnoxia necatur 117, 7, 65  
 Pessilentiæ ab Aithenis qua ratione Hip-  
 pocrates abegerit 117, 8, 4  
 Pessilens febre que corpora facili et  
 dissimulat corrumpunt 781, 45  
 Pessilenti morbo corrupti fugiendi 781,  
 59  
 Petasites quem habet facultas 1101, 4  
 Petroselinum 1101, 6  
 Petrusdum ut 1101, 41  
**PHAGAGDAINAE** et cæci exo-  
 creti curatio 972, 51  
 Phagedæna quid 708, 50, 845, 17,  
 1179, 14  
 Phalaris illas efficit totum corpus  
 775, 43  
 Phalaris morsus 744, 62  
 Phalaris quam vim habet 1112, 18  
 Phalaris cuius sit facultas Ibid. 18  
 Pharmacia arteria que dicitur 1240,  
 23  
 Pharmacia ex publica velle dila, et qua  
 facilitate sint proclia 1101, 5  
 Pharmacia dissecantia que sunt 1233,  
 49  
 Pharmacia fortis que intelligitur 1259,  
 58  
 Pharmacia liquidiora minus sunt mole-  
 sta 1164, 18  
 Pharmacia polytrella ex contrarijs con-  
 stant 1175, 62  
 Pharmacia purgatoria sicuti sumpta, non  
 reuocari possunt 994, 32  
 Pharmacia que alij substituitur 1244,  
 41  
 Pharmacia sola nihil sunt 1237, 1  
 Pharmacia sunt de ratione manus 1237, 2  
 Pharmacia utriusq. suæ facultates ostendit  
 1190, 45  
 Pharmacia pharmaci composita et u-  
 sus 2149, 60  
 Pharmacia hemerocidis quando in bema-

crania utendum 1207, 49  
 Pharmacia alius cur interdum non cadit  
 1004, 16  
 Pharmacia assumpta, persona error est  
 sorbendus Ibid. 9  
 Pharmacia Actriorum affectionibus o-  
 culorum accommodata 1222, 46  
 Pharmacia anodynæ conficiendi ratio  
 1152, 18  
 Pharmacia Asclepiadis ulceribus diffi-  
 cilibus 1172, 9  
 Pharmacia basilicum quid dicitur 1208,  
 53  
 Pharmacia hepaticum nullius uehemens  
 ter refrigeret 1236, 42  
 Pharmacia Nicotati catilidis dysme-  
 ricis comenens 1253, 48  
 Pharmacia uinum multis effectibus opti-  
 mum hanc reperitur 1251, 4  
 Pharynx 250, 29  
 Pharynx est causa effluuii, spiritus co-  
 bibendi ipsius uiscerum 447,  
 59  
 Pharynx principalissimum uocis instru-  
 mentum 245, 48  
 Pharynx et eruida fundus 376,  
 45  
 Phasianorum caro 977, 63  
 Phasilon quem tenet uim 1082, 58  
 Phidias 77, 47  
 Philautia omnium est 420, 2  
 Philonum suspensio 926, 40  
 Philopetri portus, naturalis, rationa-  
 lis, moralis 530  
 Philopetra immunes reddit a precatis  
 343, 27  
 Philopetra omnium disciplinarum do-  
 ctoria 646, 1  
 Philomena incipiens mulier, inerte-  
 rit ex ipsa affectu partibus na-  
 cunde 997, 41  
 Philomena quando accipitur 912, 8  
 Philomena quando in scrobem degen-  
 rent 1186, 12  
 Philomena quoniam tumor superat ce-  
 lorem, qua ratione curanda 913, 10  
 Philomena uacuoque facili per sen-  
 gium detractionem 985, 20  
 Philomena curatio que sint conside-  
 randa 914, 25  
 Philomena non curatio 62, 55, 60, 63,  
 706, 4, 913, 61, 1127, 59, 1149,  
 65, 1150, 25, 1153, 1  
 Philomena cur febris sequatur 908, 3  
 Philomena erysipelatos quid persi-  
 net 1089, 37, 1130, 34  
 Philomena nascentes quid uocet 1102,  
 15  
 Philomena quoniam calor tumorem su-  
 perat, quibus medicamentis curare de-  
 beamus 913, 12  
 Philomena testium et uterum quid fa-  
 cet 1118, 15  
 Philomena affectum particulæ, nec na-  
 ræm, nec densiorem, nec diuturnam

efficit 9, 6  
 Philomena effluuii uiscerum bepa-  
 ne, perniciossimum est ante accipi-  
 nem edere 925, 10  
 Philomena erysipelatos, uel erysipelas  
 phlegmonum quid dicitur 944,  
 10, 674, 8  
 Philomena est masculi inaequalis inu-  
 perentia 612, 46  
 Philomena in ore quomodo curreat  
 918, 3  
 Philomena peris effluuii quando sciri-  
 suanda 915, 9  
 Philomena parium supernam qua ra-  
 tione curanda 916, 38  
 Philomena quando digerenda 915, 10  
 Philomena quid 500, 43, 705, 64  
 Philomena accidentia que 716, 51,  
 942, 59  
 Philomena a punctis morsae animalis  
 excitata, curatio 917, 2  
 Philomena causa 1013, 26, 1203, 41  
 Philomena curatio, curatio est huma-  
 rum 910  
 Philomena dissoluta, que est altera cu-  
 ratio, maxime optanda 61, 58  
 Philomena generatio 62, 10, 706, 32,  
 91, 55, 941, 59, 992, 9  
 Philomena scrobis eadem quædam  
 de generatio et curatio 1185, 62  
 Philomena sola mundum 1154, 11  
 Philomena superantis curatio 915, 11  
 Philomena conuersationem que necessa-  
 riæ sequatur 61, 59  
 Philomena depurati commodissimum ca-  
 teplasma 912, 46  
 Philomena incipientibus comode sub-  
 dentur asringentia 1043, 916,  
 60, 992, 37, 1150, 8  
 Philomena ut columella aut consueti-  
 tudine consilio, quid excutiat 1018,  
 16  
 Phoca 401, 28  
 Phocæ facili inter obstruunt 408, 12  
 Phocæ, dactylus, palmula 384, 65  
 Phocæ facies 1112, 52  
 Phocæ et masculi epigastrii, omne in-  
 firmum 1013, 19  
 Phocæ que 761, 60  
 Phocæ oron infania quomodo ab æ-  
 dentum febrium delirio differat  
 741, 39  
 Phocæ oron polsion inmodica crebra-  
 tes, proximam denotat syncope  
 577, 7  
 Phocæ oron solus multus et capite fides  
 et calidus 618, 14  
 Phocæ oron quæda que requiritur  
 683, 19  
 Phocæ oron causa materialis 577, 10  
 Phocæ oron differencia 741, 17  
 Phocæ oron uisus symptomata 612, 18  
 Phocæ oron nota præcepta que Ibid. 13  
 Phocæ oron uaria symptomata 749,  
 27, 761, 12  
 Phre-



# EPITOMES GALENI

Platonis facultas	1101,11	pleuritica non pulsus quales	615,13	plenitudo quibus plurimum et quibus mi-	
Plato de aëro	776,16	pleuritide infestante respiratio à sola fe-		nas alimenis praefecti	ibid. 61
Platonis circa febrium subtilitas duplex		pus transversa perficitur	731,63	Polydis	1101,43
error	350,51	pleuritidem ex insulae qui pulsus signifi-		poly minoris facultas	ibid. 51
platonis de clementis sententia	349,10	cet	603,11	Polyx quae opposita quatuor digitis re-	
platonis de virtutis sententia	343,10	pleuritides incedit quae	761,46	liquis	190,19
platonis de visione sententia	347,10	pleuritidis quid conferat	1039,13	Pulsus motus unde	153,16
platonis opus de Deo	356,6	1185,	60	pulsus tendens carales	200,15
platonis opus de inspiratione et respi-		pleuritidis crudae signum, nihil sperre		pulsus tendens et infusus	209,63
ratione cancellorum	351,35	621,	5	Pulsiones fortis contragunt affligit	ma
platonis sententia de corde	343,15	pleuritidis exquisita symptomata	760,	re	115,14
platonis sententia de fluxu bile	350,	44		Polychresta relinquere ab eis, quae ad singu-	
65		pleuritidis generatio, signa et sympto-		las affectiones parantur	1210,7
plato tres animae facultates, tribus rei-		mata	26,31. 621,1. 615,4-	Polydron regula	66,47
pud paribus comparat	352,61	715,	12	polydron in carceris suis celebris naturae	
Platonius conatibus brevis sunt, du-		pleuritidis insuperabilia symptomata		est imitatus	318,16
turne convenientes	618,13	761,	14	Polydron quem habet non	1102,
Platonius ad vires non requiritur nec-		pleuritidis proprium signum est ferrans		58	
cessarius magna humorum caliditas		vocatus pulsus	174,13	Polydron quoniam habet non	ibid. 15
693,	18	pleuritidis symptomata quatuor semper		Polygonatus	ibid. 39
pleuritidis perpetua adest humor et po-		si ostenduntur	500,57	Polygoni facultas	1204,18
das	701,2	pleuritidis humorum differentiae pro ma-		Polypi descriptio, causae et remedia	
pleuritidis ad sensum infestantem		ritate humorum eam generantur		1214,	45
inducit est gravior	698,11	760,	54	Polypterus	909,16
pleuritidis species quibus notis sunt di-		pleuritidis varia acriditas pro differre-		Polypterus quid sit	1101,63
stinguenda	700,53	ntis humorum à quibus generat		Polypterus de hisse operum, ut cum de-	
pleuritidis utriusque quantitas quidi-		574,	58	re iam munda coedit	1274,12
tas quibus signis definienda sit		pleuritidis differentiae	516,20	Poma praevocata quae	417,64
991,	38	pleuritidis necessarii sequitur tussis	17,	Poma sylvensis facultas	1079,49
pleuritide ad vires, facit in putredinem		11		Pompholyx opus oculorum furtum	
abire	991,16	pleuritidis et quid sit quando fiat	760,	bus medicorum	1215,62
pleuritide distendens, dicitur uasa		42		Pompholyx quibus utilis	1214,60
697,	25	pleuritidis indicari potest die trigesimo-		Pondrum medicinalium nomina quae sunt	
pleuritide est duplex, quarum utraque eget		quarto	629,50	1290,	10
vacuatione	696,46. 990,10	pleuritidis quid	32,13. 574,47. 731,	Populi fluxus ab uno ad alios trans-	
pleuritide gravior etiam non distendit,		29.	971,31	mutat	1576,64
ad vires sensumque vires, non autem		Plexus retiformis	318,18	populi musculus flectit genus	217,6
ad naturas	697,19	plexus retiformis elaborat animalium spi-		Populi albe vis	1093,16
pleuritide iuxta uasa reperitur in rebus		ritum	144,13	populi albe temperata	1067,32
quae inanimati	ibid. 12	plexus retiformis ex plurimis arteriis co-		Porelli quid nomenclatur exhibent	
pleuritide mater colligitur hyeme et ve-		tertus	218,56	192,	47
re	702,16	plexus retiformis recipit productionem		Porellorum pedes coniecti in passum,	
pleuritide secundum uasa quae dicitur		quandam à crasso minge	164,17	medicam reddunt	193,17
700,44. 899,17. 990,		plexus retiformis ubi locatus	154,51.	porcellum deflectionem quid rectus mca-	
18		316,51.	328,16	tum, furtus conoqui	181,14
pleuritide secundum vires quae dicitur		plexus retiformis ubi caret	149,9	Pori quomodo generantur	1166,13
700,41. 781,61. 899,15.		plexus usorum circa testes et mamma-		pori usque felis, omni gratia confecti	
990,	10	casus gratia sit felis	315,11	211,	14
Plethora ramendositate vacuatur uene		Plumbegens aëres	1113,58	Pororum balem excipientium sunt	ibid.
friduae	30,18	plumbi facultas	1214,2	54	
plethora curatio	917,13	plumbi lentia adnotata lumbis, nocturnis		Pori agrestis facultas	1069,19
plethora quando fiat	119,13	pollutiones coarctet	1124,13	Porta quid	180,58. 217,43
plethora quid	481,41. 700,63.	plumbum unicum male et pondere au-		porta uena cur dicitur	12,14
916,	13	gritur	ibid. 9	Portulacae us	188,12. 1070,47
plethorici bant omnes egent uene fridua		plumbum usum quibus conducit affligi-		1204,	17
ne	989,16	bus	ibid. 39	portulaca stuporem dentium facit	13.
plethorici cur acule febricitant	574,43	Pluton apud Galenum non prebat		61. 183,11.	1070,13
plethorici quomodo sunt vacuandi iuxta		461,	14	Possa dissoluti gnomos	861,16
Hippocratem	986,5	PODAGRICI vacuandi sunt ex		Possidant furtiva illustris	712,15
plethorici et peripneumonici cur caput		cubito	998,15	Possus indicat portem affligit	717,17
perpetua affligitur	574,61	Polemoneis	2103,44	Potamogiton quam habet non	1107,
plethorici secunda uena in cubito partis		Potentia	415,50	61	
affligit	996,5	potenta epota cum uno aspero, utrem		Potentiae naturales aliae, in quibus roba	
plethorici unde semper diuiores habent		de succa	171,60	flores aut imbecilliores aliae sunt	
pulsus peripneumonici	601,43	potentia laudatissima unde fiat	ibid. 55	692,	37

poen-

potentia retentrix triplex symptoma tri- buitur	639,14	principium quod solent accari plurimum	780,	Propositiones quae ex mutua acri con- sistent, sunt acrie	1031,31
Potens facultas	1098,12	principium colicæ est accidens	779,33	Propria discernenda ab his quæ sunt per confusionem	34,18
Potius, suavior quid est imperfectum	31,47	principium quod 693,40.	778,46.	proprium esse non statim quæ in se habile	500,8
potius est id quæ dicuntur	38,57	946,65.	1266,14	Propter divi artis pars duplex	823,15
potius talia quæ dicuntur	531,41	Præceptum sensu referri debet ad verum	781,	Propter quæ	129,50
54,16.	61,42	Præceptum quæ	549,52	Præceptum quæ non statim quæ in se habile	500,8
Potio frigida quibus conveniat morbi, et quibus sit propinqua	965,51	Præceptum ratione quæ fieri à natura di- citur	536,49	Præceptum quæ non statim quæ in se habile	500,8
potio hydrops aliusq. interconversionem effe- ctibus summi unitis	1238,58	Præceptum naturæ generationis sunt sui generis et semine geniale	429,8	Præceptum quæ non statim quæ in se habile	500,8
potens semper aliqua pars in pulmone per effectum arteriam deflatis	351, 33.	Præceptum animalis tria	249,22.	Præceptum quæ non statim quæ in se habile	500,8
8632.	1023,10	143,	28	Præceptum quæ non statim quæ in se habile	500,8
potus sit modus quibus organa respira- toria nutrire conspiciantur: cetera mod- is quibus bronchia et trachea et infir- mitas succis obstruuntur	1147,12	principia, et quæ ex ab illis oriuntur, sepe unicum accipiuntur et inducunt	817,	Præceptum quæ non statim quæ in se habile	500,8
¶ R A C E S C E P T O R I S officium	42	817,	45	Præceptum quæ non statim quæ in se habile	500,8
54		principia facultatum uniuerso corpori sunt, hepatis, cor, cerebrum aliq. infir- mitas	975,	Præceptum quæ non statim quæ in se habile	500,8
Præceptum in ostendis morbus obstruc- tum quid	73-36	126,25	62	Præceptum quæ non statim quæ in se habile	500,8
Præceptum Pythiam	419,43	Præceptum nos gubernantia quæ	759,1	Præceptum quæ non statim quæ in se habile	500,8
Præceptum facies	311,31	Præceptum appetitoris opera quæ	543,	Præceptum quæ non statim quæ in se habile	500,8
Præceptum melius transmutatur quoniam cruda	404,61	43		Præceptum quæ non statim quæ in se habile	500,8
Præceptum subiectum ex affluentiis genitum paratur	651,37	Præceptum summi quæ indurata	6-9,31	Præceptum quæ non statim quæ in se habile	500,8
Præceptum aliter ille non potest, qui morbi et arum magnitudinem non expen- ditur	960,69	Præceptum in morbi acutis cognoscenda ra- tio	628,64	Præceptum quæ non statim quæ in se habile	500,8
Præceptum quæ sunt unitis optimis	604,	Præceptum in infirmitatibus opera	343,35	Præceptum quæ non statim quæ in se habile	500,8
51		Præceptum rationalis opera	144,10	Præceptum quæ non statim quæ in se habile	500,8
Præceptum dolor sensus quid signifi- cat	644,15	Præceptum cuiusque morbi proprium, et tenoris signis determinatur	624,15	Præceptum quæ non statim quæ in se habile	500,8
Præceptum profusiones quando sunt peritiosae	931,22	Præceptum generationis particularum, cor accedens sit induratum	804,	Præceptum quæ non statim quæ in se habile	500,8
Præceptum scilicet, uti morum, quæ sunt in infirmitatibus	640,60	47	7	Præceptum quæ non statim quæ in se habile	500,8
Præceptum si extenuetur morum, se- quitur debet	778,19	Præceptum plantationis, quæ ex semine gignit	110,42	Præceptum quæ non statim quæ in se habile	500,8
Præceptum futuris quod sit peritiositas medicus	603,26	Præceptum, potentia dicitur totum	108,	Præceptum quæ non statim quæ in se habile	500,8
Præceptum inflandi duplex ratio ubi necesse	951,6	Præceptum secundum latitudinem consi- deratur in prima affectione	625,42	Præceptum quæ non statim quæ in se habile	500,8
Præceptum quando curantur	39,27	Præceptum totius operis maximum	332, 31	Præceptum quæ non statim quæ in se habile	500,8
Præceptum futurum ex presentibus su- meritur	604,51	Probabile propria	621,45	Præceptum quæ non statim quæ in se habile	500,8
Præceptum ratio unde sit petenda	37, 48	Processus colicæ	373,4	Præceptum quæ non statim quæ in se habile	500,8
Præceptum utilitas	27,50	Processus cubiti	203,6	Præceptum quæ non statim quæ in se habile	500,8
Præceptum ex potibus sumitur	506,18	Præceptum in morbis unde deprehende- tur	301	Præceptum quæ non statim quæ in se habile	500,8
Præceptum habetur futurum, præcep- tum ex prædictorum	379,55	Præceptum ebrioidis notitia in oculis	265, 24	Præceptum quæ non statim quæ in se habile	500,8
Præceptum ad dentes erosos	1239, 10	Præceptum ebrioidis notitia in oculis	265, 24	Præceptum quæ non statim quæ in se habile	500,8
Præceptum optima, cor sepe in principis mili nature indicatur	1203,53	Præceptum ebrioidis notitia in oculis	265, 24	Præceptum quæ non statim quæ in se habile	500,8
Præceptum refrigerantia varia	909,58	Præceptum ebrioidis notitia in oculis	265, 24	Præceptum quæ non statim quæ in se habile	500,8
Præceptum quid esse debet minus	454, 38	Præceptum ebrioidis notitia in oculis	265, 24	Præceptum quæ non statim quæ in se habile	500,8
Præceptum indicit crescit	1002,1	Præceptum ebrioidis notitia in oculis	265, 24	Præceptum quæ non statim quæ in se habile	500,8
Præceptum causa	780,35	Præceptum ebrioidis notitia in oculis	265, 24	Præceptum quæ non statim quæ in se habile	500,8
Præceptum curatio	947,6.	Præceptum ebrioidis notitia in oculis	265, 24	Præceptum quæ non statim quæ in se habile	500,8



# EPITOMES GALENI

pueruli masculini duo 104,61  
 puerulo natus canis 114,63  
 pueruli partes muliebres virilibus sunt si-  
 milis, nisi quid sunt inurese 108,4  
 pueruli trahi casse 104,47  
 pueruli viri epiphyse acies gratia  
 coarctantur 105,8  
 puerulorum inflammationes que epipi-  
 lenne 106,7  
 puerulorum poli cures gratia erit 179,3  
 puerulorum uena 14,6,18  
 puerulorum uictra digno ferendi ratio  
 126,1  
 puerulorum uictra, quida medicamenta  
 possident 171,4,6  
 puerulorum uictra quibus phormice in-  
 digerit, & quomodo curantur  
 126,1  
 puerulorum uictribus quid differat 107,1  
 puerulo transiens remedia 126,1,63  
 puerulorum uictra cur preparandum habet  
 glandularum acellum 110,4,6  
 puerulorum uictra quide 129,1  
 Pueruli cur non sint ueneratē cogendi ad  
 nomen 411,6  
 puelli optima præditi corporis habuit,  
 animi quoque mores uicupatē foris  
 411,15  
 puellus potio frigida à cibo est eadem  
 431,1  
 puellus admetus uictri, calorem illius so-  
 uri 181,8  
 Pueri carent ratione 116,19  
 pueri cur magnis dilatationibus arteria-  
 rum regant 161,14  
 pueri cur somnolenti 171,53  
 pueri uictri perfecti sunt tercia septen-  
 nio 415,18  
 pueri quibus puertus, corpus & cre-  
 brum respiciunt 486,17  
 pueris ante decimum quatuor annum san-  
 guis non est mittendus 995,7,920,  
 44  
 pueris cur permittendi sit uis illi, que  
 non infigitur ledunt 1006,56  
 pueri secundum septem annos ingressi, tem-  
 perantiores 415,41  
 pueri moribus duplex frigiditas & le-  
 uandis temporibus 414,42  
 pueri optimi temperati cur interde-  
 dum sit uis 415,10  
 pueri plurimum uis spiritus habuit  
 1055,1  
 pueris post decimum quatuor annum, quid  
 de sanguis mittendus 920,51  
 pueri rationem esse imbecillam, uident  
 autem euale cure, quoniam decimum  
 annum 114,12  
 pueris uehementiores pluresque affectus  
 quam adulti oboriantur 113,41  
 pueri uena non est secunda 991,10  
 pueri uenarum retentorem habent imbecilla-  
 rem, expultricem non admodum for-  
 tem 691,64  
 puerorum calor mitis 47,15

puerorum educatio similis cultus & pla-  
 tarum 414,15  
 puerorum & infipientium iudicio medi-  
 cis à coquo uel differt 64,6,6  
 puerorum ingrua uenia ad afflicta sunt  
 propensa 414,14  
 puerum pauca ad uictratem naturae pro-  
 pensa 121,10  
 puerorum substantia cur minus arteriis  
 egredi præfida uacuitate 901,54  
 puerorum substantia cur omnium facili-  
 ter digeratur 901,51  
 puerum ion habili ad balos reddito, que  
 peragenda 415,6  
 puerum post cibum, quem balneum capere-  
 rit, cur non statim sit bibendum  
 414,1  
 Puerperæ, ante quibus mensis sunt, cur  
 facili refrigerantur 129,7,6  
 puer quousque exercitui debeat 44,6,10  
 Pugilis nota est P. 1191,45  
 pugilis quid continet 114,1  
 Pulchritudo adionum ubi curatur  
 111,1  
 pulchritudo anime in quibus consistat  
 114,1  
 pulchritudo arte nō exalta inuicilis 1,63  
 pulchritudo corporis in quibus consistat  
 111,1  
 pulchritudo uictra ad quid refertur  
 127,1  
 pulchritudo uictra in quibus consistat  
 110,1  
 pulchritudo uictra que dicitur 196,10  
 pulchritudo 1076,5  
 Pulmo agnoscitur, periculis & uictribus,  
 quibus affectibus consistant 117,6  
 pulmo à thorace uidetur distare in anima  
 lobis quomodoque excedit 191,10  
 pulmo cur bestiam febrem non gignat  
 1807,1  
 pulmo quare in his quid gerantur uero ad-  
 modum rubet 106,63  
 pulmo & dexter cordis uentraculis quibus  
 adistat 115,14  
 pulmo re se motus expers, mouetur ad ma-  
 iorem thoracis 115,49  
 pulmo ferè sensus expers 495,1  
 pulmo frigide fluxione infestatus quid  
 edat respiracionem 601,10  
 pulmo medicis cucurbitula similis  
 426,1  
 pulmone & dextro cordis uentraculo ca-  
 rent animalia ex arte non respiran-  
 tia 119,19  
 pulmoni cur maxima uena sit à corde im-  
 plantata 114,41,316,6  
 pulmone in flammato abstinendum ab a-  
 stringentibus 921,46  
 pulmoni inflammato applicanda cucur-  
 bitula, si prius corpus sit uacuum  
 114,1  
 pulmone interiore, interiore uenam &  
 cordis dextram uentraculum 115,18  
 pulmoni omnia infant, que sunt ad eo

larem euacuationem 117,14  
 pulmoni salda interpretare officia natus  
 600,1  
 pulmonis caro, dierationis actus primus  
 organum 142,58  
 pulmonis caro laxissima maturat & pul-  
 monis sanguine 121,1  
 pulmonis caro quida, & quid non præ-  
 fiet 142,49  
 pulmonis dolores cur remissius sunt,  
 quoniam thoracis 614,10  
 pulmonis crispelae quid 758,17  
 pulmonis euacuatō curatio 871,16  
 Indicia 868,6  
 pulmonis fibrarum motus 115,48  
 pulmonis frigidi indicia 826,6  
 pulmonis inflammatio que sit 758,14  
 pulmonis inflammatio symptomata 714,1  
 62  
 pulmonis interperiri æqualis & inae-  
 qualis uidetur 758,12  
 pulmonis quoniam lobus cum gressu con-  
 ducit 112,62  
 pulmonis quintus lobus uelut subserui-  
 calum uicre causat 140,59  
 pulmonis sicut Indicia 826,11  
 pulmonis sinus 600,45  
 pulmonis struere infirmatibus artum  
 omnibus radum 116,47  
 pulmonis substantia leuata mollisq. cum  
 sit, à picatrefore inflammato sangui-  
 ne 176,19  
 pulmonis tuberculo oris, quid sit respi-  
 ratio 716,14  
 pulmonis tuberculum que ostendunt  
 757,1  
 pulmonis tunica 140,64  
 pulmonis uasa à quibus occassiones ri-  
 puerit 758,17  
 pulmonis uase cur natura alterant  
 115,1  
 pulmonis uase quo ordine proprie in-  
 plantantur materis 141,42  
 pulmonis uase uictra, & unde oriuntur  
 142,1  
 pulmonis uase disrupto si inflammatio fac-  
 cessit, cur affectus nequa consisten-  
 duri 865,8  
 pulmonis uis uictrum, quando insensibile  
 sit 169,53  
 pulmonis uictra ægri curantur 754,13  
 pulmonis uictra cur difficillime sanantur  
 167,61  
 pulmonis uictra ex melle facti erosione id  
 tracta, insensibilibus propter sunt 871,  
 10  
 pulmonis uictra in indeploratis curantur  
 per uictra 871,15  
 pulmonis uictra disquidando per uictrum  
 purgatur 774,10  
 pulmonis uis 115,63, 484,48  
 pulmo maxime uehementis dolore cru-  
 elior 757,18  
 pulmo nutritur sanguine asperso & se  
 nut 115,62  
 pulmo

## I N D E X.

- pulmo emulsiu celeritatem cordi dei no-  
 xam 600,42  
 pulmo per quem sicut purgandus 18,41  
 pulmo per se non mouetur 761,14  
 pulmo quide probat nutritionem  
 395, 10  
 pulmo sensu caret 731,28  
 pulmo solus inter omnia viscera ex corde  
 nutritur 77,13  
 pulmo spiritus promptuarium 131,64  
 pulmo uocis & respirantis instrumen-  
 tum 1bid,50  
 pulmo uocis gratia & respirantis con-  
 ditus 135,31  
 Pulvis infanti 112,59  
 Pulvis uari discretus quomodo fuerit in u-  
 na dilatatione inaequalis 125,52  
 Pulvis durus crebrius, mollior vari-  
 tates contraxit esse 556,17  
 pulvis placentiarum quidem adit  
 proprias 577,17  
 pulvis ceteri modis magnitudo, modis ad-  
 iungitur crebrius 58,4,5  
 pulvis cui mensuram uel locum sit in-  
 achidit 518,63  
 pulvis inest gratia quies 519,15  
 pulvis gignendo inaequali quae requiritur  
 519,42  
 pulvis magno gignendo quid requiritur  
 565, 18  
 pulvis urinanti facit fomicem  
 521, 13  
 pulvis uulso & urinanti quae com-  
 munia & quae propria 527,56  
 pulvis uulso facit urinanti 528,  
 10  
 pulvis ab elici bifarium 591,18  
 pulvis causae proprias experientia co-  
 gnoscit 512,40  
 pulvis dei durum aut mollem ex acciden-  
 ti 536,16  
 pulvis durissimus sicut & maximus  
 non reperiri unquam 540,2  
 pulvis esse inquam motum ait Zeno  
 537, 57  
 pulvis moderatum & immoderatum in-  
 ueniri catio 544,61  
 pulvis urinantiem ab uulso non que-  
 ritur, sed quatenus sola distinguitur  
 517, 54  
 pulvis partes primas, non magnas prelo-  
 ratur 503,64  
 pulvis absolutus aequalis 522,17  
 pulvis absolutus aequalis non aduenit fe-  
 citatem 522,16  
 pulvis absolutus inaequalis 522,18  
 pulvis absolutus magnus et parvus qui di-  
 catur 524,46  
 pulvis absolutus ordinatus, partes seruatur  
 circines omnes 522,41  
 pulvis abis uicinitia latum proinde  
 re non possit 550,53  
 pulvis a cordis calore uariatur 595,  
 24  
 pulvis aequalis quomodo iudicanda ue-  
 nit 511,26  
 pulvis alii lentis ubi cernitur 564,64  
 pulvis alii qui sunt dicendi 565,12  
 pulvis alius quando excretionem signifi-  
 cat 606,56  
 pulvis anginae 578,17  
 pulvis anginae laborationem 518,18  
 pulvis mouentes & circinantes an-  
 de gignatur 564,9  
 pulvis ante alia omnia indicat communem  
 causae constitutionem 587,15  
 pulvis a quibus mutari possit 509,4,52  
 557, 4  
 pulvis aethybus triplex 527,48  
 pulvis bis feriens, interperit cordis cor-  
 poris proprias symptomes est 597,4  
 pulvis breuis qui dicatur 582,12  
 pulvis calidiorum 112,58  
 pulvis calidi inest corporibus 123,53  
 pulvis calidi copiose qui sunt familiares  
 554, 2  
 pulvis capriciosus 591,83  
 pulvis capriciosus quando gignatur  
 528, 50  
 pulvis capriciosus discretis discrimen  
 563, 13  
 pulvis catichis 517,15, 577,47  
 pulvis celer & tardus qui sit 542,34  
 546, 42  
 pulvis celerior, calidior temperatione:  
 tardior, frigidiior declarat 585,11  
 pulvis celeritas et tarditas quid 510,55  
 pulvis celeritatem quando gignatur  
 554, 10  
 pulvis celer, tardus & moderatus qui  
 519, 59  
 pulvis circulanem inordinatus 522,48  
 pulvis contrarium, pulvis epilepticus  
 rum sunt similes 578,61  
 pulvis contentus quis 555,2  
 pulvis contradiendum ferit 519,10  
 pulvis contrarium casus, 564,28  
 pulvis contrarium & uibrati 528,11  
 539, 5  
 pulvis contrarium 517,4,5,57,56  
 pulvis rarus gratia infirmitati sunt 593,12  
 pulvis cui sunt inaequales, partibus ar-  
 etasus infirmos 574,23  
 pulvis decretum excretionem indicat  
 561,19  
 pulvis decurati deficientes 523,22  
 pulvis decurati reciproci 561,15  
 pulvis decurati significant facultatem in-  
 becillitatem 594,5  
 pulvis decurati unde proueniunt 563,  
 61  
 pulvis deficiente reciprocus 593,44  
 pulvis deficiente uenari 521,1  
 pulvis deficiente essentia 577,22  
 pulvis dictus frequens, rarus & mode-  
 ratus pro ratione quatenus interueni-  
 to systolem & diastolem 521,6  
 pulvis discretus qui necessarius etiam ultra  
 res est generatio 564,58  
 pulvis durus 594,2  
 pulvis discretus qui dicatur 561,60  
 pulvis durus, siue uerum feriens, non  
 diuersus uenari pulvis est 525,  
 42  
 pulvis durus uibrati unde 561,60  
 pulvis differentia in dilatationis quanti-  
 tate 510,49  
 pulvis differentia una in parte inaequa-  
 lis inaequalis 521,49  
 pulvis differentia quicquid interpretat  
 ram differentia res 561,6  
 pulvis deflexus quidam sentiam 71,2  
 pulvis dominatum 512,8  
 pulvis duriores, partes uicinitas sunt  
 573, 64  
 pulvis durus & mollior ab aethybus  
 & mollior ab duris sit 516,16  
 pulvis durus proprius est primus 521,28  
 pulvis durus simul parus, oneris ferit sunt  
 uibrati 524,58  
 pulvis durissimus unde accidit 591,5  
 pulvis durus & mollior ab aethybus  
 & mollior ab duris sit 516,16  
 pulvis durus, partes sitisse et duras est  
 510,59  
 pulvis durus, partes sitisse et duras est  
 510,59  
 pulvis durus citra uibrationem quid signi-  
 ficat 595,11  
 pulvis elephantiasis 579,124  
 pulvis elephantiasis 518,59  
 pulvis coram qui sumptum celebrat  
 518, 63  
 pulvis epilepticorum 512,10  
 pulvis epilepticorum epilepticorum  
 sunt similes 518,59  
 pulvis est calor caloris seruandus gratia  
 507, 64  
 pulvis est naturae opus 49,12  
 pulvis & respirantis non idem usus et  
 quibus rationibus persisteri possit  
 503, 59  
 pulvis erysipelas uulso & uenari  
 521, 47  
 pulvis erysipelas qui dicatur 1bid,51  
 pulvis erysipelas qui dicatur 513,45  
 571, 4  
 pulvis facilius oppresse 514,45  
 pulvis facilius soluitur 1bid,44  
 pulvis facilius uulso soluitur ob dimer-  
 ti in apiam 1bid,53  
 pulvis febrium pestilentiore prius ad na-  
 turam recta 596,12  
 pulvis sit a corde & arteria 521,28  
 pulvis florentium 521,1  
 pulvis fluidus 521,64  
 pulvis formicos est emulsiu uicinitas, non  
 locum ceter 528,26  
 pulvis formicos non est ceter 522,32  
 542, 58  
 pulvis formicos qui dicatur 512,4,514,  
 59,591  
 pulvis formicos quando gignatur  
 572, 52  
 pulvis frigidiior cordis temperiem com-  
 munes 596,28  
 pulvis generatione uenari 573,38

pulsus graciliorum 512, 56. 567, 60  
 pulsus graciliorum simul et multorum  
 dimensione confusus 541, 50  
 pulsus brevis omnium marcescentium  
 communis 516, 42. 576, 4  
 pulsus brevis qui 512, 4. 575, 9  
 pulsus hydropicus 518, 31  
 pulsus interictus 511, 61. 579, 15  
 pulsus immixti recipiunt 523, 6  
 pulsus immixti et de regionibus 569, 65  
 pulsus inaequales a quibus casus pro-  
 ficiuntur 559, 12. 589, 14  
 pulsus inaequales in suis, qui magis  
 aliquid factus sunt accesserunt 64, 5. 64  
 pulsus inaequales quando per crises sunt 64, 4. 8  
 pulsus inaequalis qui sit ordinatus, et de  
 respirator 517, 5  
 pulsus inaequalis quales 569, 2  
 pulsus inaequalis anque amissionem ferri-  
 tu 515, 14  
 pulsus in hyeme quales 569, 8  
 pulsus in nullis febribus intermissione ad  
 fluxum naturalem recurrunt, praeter  
 quam in ephemeris 956, 28  
 pulsus in omni genere moderatos inno-  
 drantur inueniuntur ratio 546, 12  
 pulsus inordinati in absolute consistit  
 etiam in impari 523, 31  
 pulsus inordinatus simpliciter ibid. 44  
 pulsus in quibus parvus clarius per-  
 cipitur 512, 19  
 pulsus inter equalem et inaequalem nul-  
 lus est medius finis neque inter ordi-  
 natum et inordinatum 512, 32  
 pulsus interictuales 561, 51  
 pulsus interictuales 511, 15  
 pulsus interictuales, intermittentes ad-  
 uertere 590, 40  
 pulsus intermittens quid 511, 5  
 pulsus intermittens 523, 25. 561, 27  
 pulsus intermittens cum praecursu sunt  
 parvi 590, 35  
 pulsus intermittens minus obiectus per  
 mixtus sunt et parvi, quibus inue-  
 nitur ibid. 1  
 pulsus intermittens a quibus casus oria-  
 tur 561, 40. 589, 24. 590, 45  
 pulsus in ure quales 586, 64  
 pulsus in utero et partem motus, accres-  
 centis initione natiua 599, 28  
 pulsus in utero alius 515, 14. 561, 55  
 571, 64  
 pulsus in utero est maximus 569, 16  
 pulsus longus in utero conuoluitur 519, 1  
 pulsus longus et acutus quid 510, 1  
 pulsus longus 573, 6  
 pulsus longus quando accidit 565, 48  
 pulsus longus, brevis, levis, angustus, al-  
 tus et humilisque 520, 1. 531, 32

565, 57. 566, 7. 582, 30  
 pulsus libidinosus 516, 65. 576, 43  
 pulsus magnitudine copiam continentium  
 maris cognoscimus 550, 37. 551, 54  
 pulsus magnus vel celeris cause quae  
 534, 12  
 pulsus magnus et parvus sub predica-  
 mento ad aliquid est, et quantitatem  
 significat 511, 48  
 pulsus magnus et acutus brevis nulli  
 quoniam aliter 599, 4  
 pulsus magnus, longus, levis, altus, acutus,  
 molis, celeris, si quoniam, et qualis  
 ordinatus, et his obiectis qui dicuntur  
 512, 12  
 pulsus magnus, parvus, gracilis, terribilis  
 qui 512, 3  
 pulsus magnus praestendit fluxum sui  
 quoniam et acribus 641, 62  
 pulsus magnus vel parvus quando dicen-  
 dus 546, 22. 551, 4, 51  
 pulsus maioris disti, confusa quoniam  
 sunt differentia 551, 39  
 pulsus marcescentium unde quod est ac-  
 quis, cum confusa in salubri partibus  
 516, 16. 575, 54  
 pulsus marcidiorum simul cum inflamma-  
 tione quales 576, 3  
 pulsus maximus, celerissimus simul et er-  
 raticus quid significat 595, 10  
 pulsus maximus et acutissimus, ut  
 liliam ferit compressione 574, 40  
 pulsus maximus quid dicitur 511, 41  
 pulsus medii omnes sunt naturales, praeter  
 eum qui habetur inter vehementem  
 et languidum 554, 15  
 pulsus medius inter languidum et urbe-  
 mentum quomodo dignoscitur 565, 48  
 pulsus medius qui naturae sui, molis in-  
 ter languidum et vehementem datur  
 516, 45  
 pulsus metuetionem 515, 18  
 pulsus minimus effectus faciles extremi  
 deinde 518, 19  
 pulsus moderati non omnes continui na-  
 turales 557, 18  
 pulsus moderati soli singulis generibus in  
 duosibiles sunt 533, 16  
 pulsus moderatus est inueniendus 544, 49  
 pulsus moderatus ex sole motus qualitate  
 explorandus 547, 46  
 pulsus moderatus in quibusdam reperi-  
 tur 510, 46  
 pulsus moderatus quid dicitur 564, 60.  
 581, 55  
 pulsus moderatus quomodo indicandus  
 546, 6  
 pulsus moderatus quod modus datur  
 585, 29  
 pulsus mortuorum 515, 17  
 pulsus multiformis casus 561, 10. 600, 14  
 pulsus multiformis sunt, qui ex effectibus ere-  
 bti et pulsatibus oriuntur 604, 6

pulsus multorum quibus autem celerior  
 est 547, 43  
 pulsus mutatur ab acquisitis habitibus re-  
 sponderunt perinde ac si a natura  
 sunt 515, 4  
 pulsus natiui qui 516, 42. 521, 65  
 pulsus naturae calidiorum 567, 52  
 pulsus naturae optimae, aliorum omnium  
 regula est et mensura 545, 21.  
 504, 56  
 pulsus naturalis cum aliorum semper videat-  
 ur 564, 43  
 pulsus naturalis memoria tenendus 510, 57  
 pulsus nec celeris, nec magni esse pos-  
 sunt, nisi ipsi possidet 559, 24  
 pulsus nunquam sunt profecti tardis vel  
 parvis, scilicet nulla existerit 555, 54  
 pulsus amicus intermissus, morbo referre  
 590, 7  
 pulsus amicus possum qui 591, 13  
 pulsus optimae constitutioni praedictus  
 quales 569, 29  
 pulsus ordinati inordinatis casus 566, 18  
 pulsus ordinatus in circanti paritate co-  
 sistit 521, 27  
 pulsus ordinatus inordinatis quomodo  
 differendus 511, 5  
 pulsus orthopneum acutus 518, 19.  
 573, 12  
 pulsus paralyticorum 512, 2. 578, 12  
 pulsus parvi per accidentem arteriae que-  
 ritur dicuntur 542, 5  
 pulsus perussio quid 511, 4  
 pulsus per leues arterias fit 496, 18  
 pulsus peripneumorum 516, 54.  
 576, 17  
 pulsus pleuriticeum 517, 576, 59  
 pulsus plethoricorum 516, 52. 576, 12  
 pulsus plethoricorum 516, 8. 574, 17  
 pulsus plethoricorum celer, durus, minor  
 quoniam febris expedit, nec non erit  
 est 574, 51  
 pulsus plethoricorum si in maiorem cre-  
 bratorem mutantur, morbi peripneumorum,  
 aut plethoricorum 575, 6  
 pulsus praegestorum, maiores, eritioris  
 et celeriores 570, 7  
 pulsus primum quid 512, 27  
 pulsus praesens a robore facilius ui-  
 detur 514, 50  
 pulsus parvi quoniam parvi 544, 44  
 pulsus praeterea celerissimi, magni, et cre-  
 bti 561, 10  
 pulsus praeterea nuper eritiorum  
 516, 29  
 pulsus quando et quibus de casibus mutatur  
 445, 41. 594, 52  
 pulsus quid 519, 14. 516, 45  
 pulsus qui excretionem eritiam significat  
 641, 60  
 pulsus qui inter se coire possunt et non  
 540, 4  
 pulsus

## I N D E X.

- pulsus qui naturae modum egrediuntur, quomodo cognoscendi 510,40  
 pulsus quomodo cognoscatur 514,61  
 pulsus rarus & creber qui dicatur 557,49  
 pulsus rarus unde gignatur 590,12  
 pulsus reciproci dearteriis 591,45  
 pulsus redduntur urbenientes per bonas indicationes 575,1  
 pulsus sensus 512,60  
 pulsus sensibilem e. b. b. inuratus contradi-  
 ctionem, qualis esse debeat 540,54  
 pulsus sensum, parum, tardum & rari 568,14  
 pulsus simpliciter brevis qui sit 566,15  
 pulsus simpliciter magnus qui sit 511,43  
 pulsus sine quibus materi non possit 550,6  
 pulsus suffocationis productus ab utero 511,11  
 pulsus suppuratorum 578,37  
 pulsus tunc 575,37  
 pulsus tunc 571,19  
 pulsus totius corporis, antequam cor con-  
 ferat partem prius affectum, proinde  
 in contrarium alterationem non po-  
 test 600,15  
 pulsus tremulus quid indicet 594,12  
 pulsus tristitiae 571,15  
 pulsus vacuus quomodo intelligendus 515,8  
 pulsus variari in animi perturbationibus 649,4  
 pulsus variari pro ratione diversarum cau-  
 sarum 541,60  
 pulsus urbeniens, longus, durus, mol-  
 lis, plenus, vacuus 521,15  
 pulsus urbeniens magnusque quibus adfit 540,17  
 pulsus urbeniens, semper à facilitatis ro-  
 bore fit 586,11  
 pulsus urbenientes sunt valde contradi-  
 ctorii 519,55  
 pulsus urbeniens est proprium curren-  
 re 551,24  
 pulsus urbenientissimus optimus 591,18  
 pulsus urlores tardus sunt securiores 590,62  
 pulsus urlores unde creantur 491,2  
 pulsus urticatus 514,60  
 pulsus urticatus & formicans sibi mu-  
 tui succedunt 545,21  
 pulsus urticatus infirmum faciliat de-  
 monstret 592,46  
 pulsus urticatus quidam accidit 511,60  
 pulsus urticatus sicut sunt febribus ac-  
 cidere 592,63  
 pulsus urticatus & ardoris unde diti-  
 568,49  
 pulsus urticantes quibus effectibus ac-  
 cidunt 572,47  
 pulsus urticatus quando accidit 515,1  
 pulsus urticatus 519,6  
 pulsus urticatus diuturnus quidam gignatur 597,8  
 pulsus urticatus si adfit, nonnulli robo-  
 ris facultatem possidere declarat 581,7  
 pulsus urticatus unde fiat 562,13  
 pulsus urticatus ac multum quales 512,50  
 pulsus urticatus facultatis est opus 29,41  
 pulsus urticatus & urticulantes sicut dif-  
 ferunt quantitate 561,26  
 pulsus urticatus ex humida mollis arte-  
 ria nascitur 591,60  
 pulsus urticatus nunciat sordorem 643,58  
 pulsus urticatus quando sordorem decreto-  
 rium promittit 592,53  
 pulsus urticatus quomodo fiat 527,41  
 pulsus urticatus semper in alitis sordibus  
 est 576,49  
 pulsus urticatus inaequaliter à sede arteriae  
 pressa 527,57  
 pulsus urticatus motu, proportio est ad al-  
 teram 519,46  
 pulsus urticatus 515,16  
 pulsus urticatus à deficiente pulsu differt  
 561,20  
 pulsus urticatus & inaequaliter quo-  
 modo cognoscenda 547,52  
 pulsus urticatus quae à quibus cau-  
 sis magis proficiuntur 511,47  
 pulsus urticatus generationes tres 592,24  
 pulsus urticatus à quibus causis oriri  
 possit 551,16  
 pulsus urticatus celeritatem vel tarditatem ut ca-  
 gnoscamus, neque temporis neque in-  
 terni quantitatis spectanda 546,55  
 pulsus cognationis permutationes, tria  
 sunt spectanda 544,29  
 pulsus crebrius causa, est prioris a-  
 ctionis defectus 554,42  
 pulsus decurtationem dignoscendum  
 ratio 591,4  
 pulsus decurtationem discrimen 561,15  
 pulsus decurtationem duplex genus 593,1  
 pulsus diuturnus differentie in qui-  
 bus conflantur generibus 525,63  
 pulsus differentie diuturnus, pro auctis  
 etis utriusque effectibus 511,56  
 578,47  
 pulsus differentie in distensione, secun-  
 dum singulas dimensiones, sunt novae  
 519,61  
 pulsus differentie in trinis simul di-  
 mensionibus acceptorum sunt septem  
 & viginti 510,13  
 pulsus differentie pro balatorum di-  
 versitate 514,1  
 pulsus differentie pro diuturnitate re-  
 gionum 511,30  
 pulsus differentie pro exercitiorum di-  
 versitate ibid. 56  
 pulsus differentie pro inflammatione  
 non & parum inflammationem na-  
 turis diversis 518,55  
 pulsus differentie pro miscella morbo,  
 quibus facultas & instrumenta mi-  
 scentur 557,20  
 pulsus differentie pro modo cibi as-  
 sumpti 514,11  
 pulsus differentie pro multitudine vel  
 dicitur organorum 556,20  
 pulsus differentie pro varietate dolo-  
 rum 515,24  
 pulsus differentie quatuor dum facil-  
 itas simul & usus mutatur 555,47  
 560,8  
 pulsus differentie secundum aetatem 544,40  
 pulsus differentie secundum diuturnitatem  
 synopsi 515,4  
 pulsus differentie secundum diuturnitatem  
 tempora 515,56  
 pulsus differentie secundum motum  
 sunt tres 519,56  
 pulsus differentie secundum quietem  
 arteriae sunt tres, rarus, creber, &  
 medius 521,42  
 pulsus differentie secundum tempora,  
 referuntur ad usum, facultatem & in-  
 strumenta 569,20  
 pulsus differentie viginti septem 551,4  
 pulsus differentie pro varietate bonae  
 non exprobrationem 701,14  
 pulsus differentiarum genera, Archi-  
 genes propter qualitates vocat 514,20  
 pulsus digestionis, admodum longum id  
 pus definitur 518,18  
 pulsus dimensiones deprehendendi ra-  
 tio 545,5  
 pulsus duarum morbi intermissione, Gade-  
 mus dubitat an quoniam vivere possit  
 589,50  
 pulsus durities à quibus augeatur 575,24  
 pulsus effrenatus definitio, quae brevis  
 sit, nulla causam potest 556,59  
 pulsus & respirationis similitudo 503,25  
 pulsus & respirationis unde colliga-  
 tur non eundemque esse usum 506,26  
 pulsus examen qualiter incandens sit 544,2  
 pulsus generationum primae causa  
 sunt ipsi atque facultas 600,19  
 pulsus generationum ipsi duplex 580,19  
 pulsus generationis causa continentes  
 sunt tres 559,58  
 pulsus inaequaliter contingit interdum  
 ad sanguinis copiam in venas aut in  
 arterias infusum 560,54  
 pulsus inaequaliter quid 511,31  
 pulsus inaequalitates compositae ibid.  
 55  
 pulsus inaequalitates simplices ibidem  
 50

pulsus inaequalitas, quae secundum di- versas arteriae partes fit, differentiae 516, 14	Punctus & finis siccitatis 1118, 2	Pus in thoracis capaxitate communis ex potenti tempore in pulmonem affe- rit arterias transmittit 761, 13
pulsus in contraria affaia permuta- tionem quid proprium 563, 15	Puncta 1122, 33	pus laudabile quale esse debet 754, 60

## I N D E X.

mita 990,55  
 putrescentibus apte medicamentis que  
 981, 63  
 putrescentiam circa articulos curatio  
 2163, 3  
 putrescentiam curatio per que fieri de-  
 beat medicamenta 1161,51  
 putrescentiam subtilitate qualis 1143,  
 28  
 putrescere que nullo modo possunt libi-  
 30  
 putrescenti calida & humida que in si-  
 mili loco conclusa pressari non pos-  
 sunt 915,55  
 PYCNOCOMIUS 1103,57  
 Pyloros 241,11  
 pylorus ventriculi officium inferius  
 85,  
 Pyretici vis 1103,44  
 Pyriti vis sibi facultatis 1118,51  
 Pyritibus 1441

**Q** VADRVPEDA cur re-  
 quant scire ut flare  
 2101, 9

quadrupedibus que commodius alit ex  
 illa corporis fabrica 209,54  
 Quæstio-æ affectionibus humanis ventiles  
 que sunt 354,65  
 quæstio omnis sub definitionem cadit  
 352,4  
 Quæstus acerbis refrigerat & facit  
 54,  
 quæstus ætiam non astringenti facit  
 912,  
 quæstus astringendi est in astrictis remi-  
 ssis, in acutis interita 409,5  
 quæstus & quantitas per hæmorrhagiam  
 effluvia ducit 335,14  
 quæstus gignitur in materia & perit  
 56,  
 quæstus propria ab aliis obcuratur  
 1022,  
 quæstus sive subtilitas, nulla esse potest  
 160  
 quæstus affluens, caliditas, frigidas, hu-  
 miditas, & siccitas 24,12,118,123  
 quæstus effluatissime caliditas & fri-  
 giditas 612,6  
 quæstus omnes qualem tenet in se mu-  
 tal agent 1016,10  
 quæstus primæ & secundæ que decon-  
 tur 1175,66,1051,35  
 quæstus specificæ que sunt, & cur sic  
 dicuntur 1010,3  
 quæstus sunt organa officia 54,13  
 quæstus tactiles que sunt 555,61,  
 1019,  
 quæstus tactiles totam proximæ rei sub-  
 stantiam dicunt 24,19  
 quæstus tactus virtus vel utitur conse-  
 quatur incompen 86,40  
 quæstus experientia inclinatur ad frigiditas  
 383,  
 quæstus salse facultas 1143,19

quæstus que in quibus frigiditibus  
 crescant efficaciores 925,6  
 quæstus summitates frangenda con-  
 trarium infusis 1014,17  
 Quæstus diffinitionis & contrarietatis  
 519,19,  
 quæstus visus extensio non est ma-  
 gnitudo 515,6  
 Quæstus detentis ingenda sunt usura  
 ingentis cataplasmati; emolien-  
 tibus 961,65  
 quæstus detentis sæpius purgatis esse,  
 apparentibus iam casibus signis  
 961,  
 quæstus causa 791,9  
 quæstus raro ab initio incipiunt 812,3  
 quæstus longissimus nominis; periculo-  
 sa 960,22  
 quæstus ætiam curatio 961,51  
 quæstus ætiam baliditas 958,65  
 quæstus confert uonibus 961,5  
 quæstus visus ratio conveniens 961,  
 44

Quæstus septim est index 609,47,  
 611,  
 Quæstus vis circutis sufficit ad cogni-  
 tionem futuræ crisi 614,50  
 quæstus quæ sepe ardet & qui in-  
 actum contingunt 611,52  
 Quæstus quæ non habeat 1077,49  
 Quæstus arterie duplex 588,19  
 Quæstus arteriarum utrius quid sit pre-  
 prium 587,37  
 quæstus arteriarum quid sit commune  
 587,  
 quæstus interius tempus in pulsu non ex-  
 atit digno sci potest 541,35  
 Quæstus duas copulatas tertio quoque  
 die accrescent facere 630,47  
 Quæstus mædus ob uisionem olon Ro-  
 ma est pulvis 645,18  
 Quæstus non alius modis, sed seipsum quo-  
 que debet ureri 411,46  
 Quæstus pro suo effectu admodum conste-  
 rat sentire 1034,18  
 quæstus ex quoque trahere, & in quæstus  
 mittere potest 68,14  
 Quæstus causa 791,3  
 quæstus curatio 965,10  
 quæstus quot principal corrumpit  
 959,  
 quæstus prelois est & periculosa  
 960,  
 quæstus declinationes non termi-  
 nantur subordibus 959,56  
 quæstus indicia libi, 18

**R** ABIDORVM morbus quid  
 accideret 1151,46  
 Radices acriter & potentiores  
 eandem & felis que sunt 381,18  
 radices element ætiam habentium,  
 succum possunt melleum 410,29  
 radices que pulu melleum referunt acri-  
 moniam, morbum aut adorem, tenet in

du sunt adurere 417,46  
 Radicular crude perperam effluvia poss  
 canem 391,50  
 radiale utriusque facies 1103,61,  
 391,  
 Radix dearticulationes 107,14  
 Radix & alia quod pertinet ad figuram  
 & constitutionem diffinitionis 107,23  
 Radix musci prædicitur sunt quæstus  
 154,  
 Radix posita oblique 207,10  
 radus 203,1  
 radus car sine incombis 207,22  
 radus, pæne et 98,53  
 Radix alba & betæ diffinit piteus-  
 sis habetis, quod non datur ipsam  
 felis 390,24  
 Radix rhodia quam habeat alia 1104,38  
 Ramen alacris est signum 774,6  
 Ramen carnosus 709,24  
 Ramen, quis sit morbus 154,  
 Rame ipse uires 1141,55  
 Ramen sibi sibi & facultates  
 1074,  
 Rapæ vel biniadu facies 390,57  
 rapæ 1076,51,1091,12  
 Rarefactio que dicuntur 1058,18  
 rarefactio qua ratione refrigerari 661,2  
 Rara que sunt 1015,38  
 rara que sunt 1015,38  
 rara que sunt 1015,38  
 Raritas ab intermittente pulsu quomodo  
 distinguitur 590,18  
 raritas corporis quibus salubritas, quibus  
 insalubritas 674,  
 raritas pulsu non nunquam uacat pericu-  
 lo, sicut nec remissus nec paratus  
 590,  
 Rarum quid 441,5  
 Rares ætiam dicitur artes 195,55  
 Ratiocinandi uis interit, & quæ 69,  
 34  
 ratio communis 654,8  
 ratio cur interponenda sensibus 1011,  
 15  
 ratio duplex 989,59  
 ratio inest hereditas 319,1  
 ratio inest damus cum dicitur communis  
 12,18,  
 ratio inest 12,  
 ratio inest 471,45  
 rationales posse curatiorem mutare, quod  
 Empirici non heri 15,4,  
 rationes que pulu uisunt ad fundam  
 transiunt 14,51  
 rationalium assertio contra veritatis  
 12,18,  
 rationalium contra Empiricos responsio  
 12,  
 rationalium obediens aduersus Empe-  
 ricos 11,2  
 rationalium progressus 6,16  
 ratione ducit sequitur aut uirtus aut uirtus,  
 effectus nunquam 330,18  
 ratione lesa, sepe memoriam ledit con-  
 tingit, & e contrario 713,26

rationi rellatari que dicuntur 328, 44	radices 95, 7	cessaria 27, 2
rationi semper iracundia obsecundet ut summi philosophis 326, 36	refrigeratio completa, sensum et motum tollet 710, 50	remedium usui aptum, in arce medica est precipuum 27, 33
rationis, que cerebro inest, aperta 527, 27	refrigeratio in febris, que brevis sit temporis atque periodica 908, 14	remedium Cleopatre ad acheras 1196, 51
ratio per experientiam indices redditur generosior 436, 43	refrigeratio respiratorii finis 94, 16	remedium Cleopatre capillos augeri et decurare 1193, 14
ratio, postea emittit sui et abscidit 124, 24	refrigeratio totius corporis et particu- lar efficit, supprimit surgentem pro- fluxum 866, 1	remedium contra defluens capillos Ar- chigenis 1194, 8
ratio postulat calidum indicat 46, 64	refrigeratio adhibens 65, 4	remedium Crisidis ad acheras 1196, 39
ratio precepi inasibili actone, ut equis e- quo 326, 2	Regni maxima pars communis omnino faciles 1171, 1	remedium fursorum Archigenis 1195, 18
ratio (que homo est) in cerebro colloca- tur 122, 13	Regiones intertemperate qualis produci corpora 442, 39	remedium surgentem sistens 1245, 1
ratio quando concurrat affectui 329, 33	regionum cum temporibus comparatio 350, 41	remissionis tempus dicit quod debet 718, 14
ratio quando felicitur suo sanguine mi- nute 124, 16	regionum arietis, dissonum in moribus facit 331, 63	Rem dexter finistre elatione 186, 20
ratio quando relictur affectui 329, 33	regius morbus permissus 767, 58	217, 12, 299, 17
ratio sensui est communis 547, 33	Rem de qua disputatur, in primis oppor- tet habere substantia 354, 44	renes cum lotio atque abest bilem et san- guinem 227, 52
Rauendum quod amittitur 1102, 21	Relaxantibus quando sit attendum 921, 54	renes et urticae duae, hepatis grauis con- ditae 122, 21
reuerbo quando gignitur 1240, 25	Remedia ad eas qui letidia habent 1274, 53	renes expurgant serum à seipso 218, 16
reuerbo quod 691, 7	Remedia Apollonii ad acheras 1196, 29	renes facili scirrbum contrahunt 939, 32
RECESSIBVS à natura temper- rie exiguis, cuius opus est mutare ut corrigeatur 887, 56	remedia Archigenis ad acheras 1196, 25	renes quibus inflantur, urinae sup- primantur 516, 4
Reidus morbi quando timenda 607, 18	remedia Archigenis ad acheras 1196, 25	renes si gignunt calculos, totum autem cor- pus sit graue, que attendum videtur tunc 481, 16
Reclinatio qui fiat 95, 42	remedia Archigenis ad acheras 1196, 25	renes sunt praei suci et tenuis diffi- ciles 194, 31
Reconditio praeternaturalis quid consistat 464, 37	remedia Archigenis ad acheras 1196, 25	renibus inest uis trahendi leui 76, 60
Recti qui spirare solent 716, 44	remedia acribus accitantiis 482, 20	renibus male affectis, que uerax sunt fr- cande 997, 7
redum, intestinum sextum 100, 51, 225, 59	remedia boud impant administrantur, cum omnia sint praeu naturam 19, 4	renibus si gignunt calculos, totum autem cor- pus sit obfusum, que uis uis uis uis uenas 481, 63
Reducenda ad temperiem, non medica- cra praesidia possunt, sed contra- ria, et que a quo à medio recedunt 1032, 14	remedia podagrica à nephriticis diffinit 472, 1	renis exacerbat indicia que sunt 771, 10
Redundantia morbi quando orientur 476, 53	remedia repellentia identa sunt poleg- monis incipientibus 921, 48	Remittentia que renem alio et sitis 1217, 7
Refrigeratio medicamentis ratio 1198, 45	remedia Sorani contra acheras 1196, 37	renem calculos quid frangat 1086, 46
refrigeratio extrinsecus, in febris, que luc esse debent 909, 29	remedia uacuanda omnia uisum ex- alant 901, 15	renem faciles 691, 7
refrigeratio inuolucel, naturam calorem extingunt 976, 3	remedium inuolucel ex uera demonstra- tione parata, in raro contingitibus longe praestat experientiae 737, 27	renem inflammatis morbis que medica- menta conueniunt 1167, 1
refrigeratio quando scirrbum producit 1186, 27	remedium inuolucel rationalis praestat illis, que experientiae inuolucel 1230, 41	renem posita inaequalis 315, 20
refrigeratio, sensum asserentia et in- ducunt corpori, postulat sunt si- gida 56, 4	remedium quoniam praecipui reddit artem medicam camethalem 994, 32	renem spiritibus causae duae 127, 45
refrigeratio finalis et asserentia quia bus morbus conueniunt 1072, 19	remedium refrigerantium alia per se, alia ex accidentis refrigerant 910, 28	renem substantiae, sanguis aspergitur u- flus facit 227, 58
refrigerantibus quando cura pariter ue- de fuit sanguis, attendum 167, 13	remedium refrigerantium bonifac- tionis, duplex est materia 908, 33	renem uentres 181, 28
refrigerationem faciles 712, 5	remedium uoluntatem genus in quibus consistat 2560	renem ulcerationem certissime note que 771, 16
refrigerantium systa, quibus tunc aut in capiti delirius possunt 1198, 61	remedium usui commoda, que sunt re- per-	Renutritio erosorum à quibus fuit 1244, 40
Refrigerari quid 1016, 30		Repellentia que sunt 1206, 12
refrigerari car sunt excitandi ad non 504, 61		1214, 36
refrigerari dolent maxime circa uigiliam		repellentia sunt applicanda regioni su- perapostit ulceri 1171, 15
		repellentibus quando utendum 1265, 18
		repellere humores à capite, que commo- de possunt 967, 13
		Repertatio sit per asserentia et refri- gerantia 815, 41



## I N D E X.

Repreſentanti que dicuntur 1059,30  
 repreſentantia ſunt applicanda paulo ſu-  
 pri partes patientes 971,30  
 Repleſiones immoderate que ſequitur  
 63, 18  
 repleſiones immodice reſolūti pulſus qui  
 deni maiores, repletiſſimas autem mi-  
 nori atq; creberrimi 506,49  
 Reſpiſoria quando miſcenda medicamen-  
 ti paratiſſima 1213,59  
 Remon differentie 10,4  
 remon præter naturam duplex eſt diffe-  
 rentia 919,46  
 remon præter naturam tria ſunt genera  
 16,10, 594,45  
 remon que in noſtro corpore habentur,  
 quatuor genera 84,4,10  
 remon ſenſus cadentium, at per ſe non co-  
 gnitum, obſervatio index 10,11  
 Rei adherentes reddunt cognitiſſimū locū  
 affectum 722,52  
 rei ad ſua nutritionem non egent aliis ſu-  
 ſu præterquam emulgeſcentibus 1213,1  
 rei continentur in partibus præter nati-  
 ram, faciunt ad cognitiſſimū locum  
 affectum 721,60  
 reſtratio uſus queſitæ diſruptione & ro-  
 ſione diſſipat 763,54  
 rei expendendæ à medico 360,49  
 Reſuſcit omnes calcſcunt 1149,16  
 reſuſcit creberrimæ facultas 1104,18  
 reſuſcit differentia 465,41, 1104,1  
 12, 1051,63, 1166,12, 1182,3,  
 1186, 48  
 rei naturaliter in partibus continen-ſa-  
 cient ad cognitiſſimū locum affectū  
 721, 41  
 rei non naturales quatenus corpora no-  
 ſtra affectant 339,60  
 Reſolutio præcipuè dicitur, ubi motus  
 perit 747,49  
 reſolutio quid lib. 5  
 reſolutio muſculo diſtincti partu pari ipſe  
 in contrarium contrahitur 751,17  
 Reſpirandi diſſimilitudinem compoſitionum,  
 que ſunt uſuſſimæ coniugationes  
 497, 48  
 reſpirandi ſimplices diſſimilitudines nū certū  
 in ſic ent. coniugate autem, ad iudiciū  
 minime ſalutis perducunt 497,15  
 reſpiratio à cerebro que de cauſa ſuit  
 113, 9  
 reſpiratio ætherale unde ſuit 503,33  
 reſpiratio conſiſtit ex contrariis motibus  
 490, 41  
 reſpiratio contraria uenit ut ſimil poteſt  
 & ex aliſſa cre reſpirata 504,56  
 reſpiratio cordis gratia ſit 351,51  
 reſpiratio deſeruiſſimū ſimil & dolentiū  
 qualis 500,34  
 reſpiratio duplex 548,63  
 reſpiratio eſt arbitrio ſubdita 496,61  
 reſpiratio eſt uoluntarius motus, & opus  
 animæ 100,4, 245,60, 497, 61

reſpiratio & deſignatio nunquam ſimil  
 ſunt 141,6  
 reſpiratio & pulſus iſdem ex cauſis me-  
 tanones ſimiles recipiunt 506,13  
 reſpiratio & pulſus una re diſſerunt  
 510, 10  
 reſpiratio ſanctus ad ſalutem magnā ſan-  
 ctuſſimū 504,12  
 reſpiratio ſine omni pulſu proportionem  
 reſpondet 491,18  
 reſpiratio ſit per inferas arterias & mu-  
 ſculos 496,40  
 reſpiratio ſit ſecundū calorem inſuſi gravis  
 486, 30  
 reſpiratio inflammatiſſimū thoracis 493,  
 10  
 reſpiratio magna & parua quando ac-  
 cidit 486,48  
 reſpiratione cadit, quidam ſeruo ſibi  
 mortem conſciunt 1014,10  
 reſpiratione duri uenit quæ 491,63  
 reſpirationem ſolam ſuppediat ſpæum  
 tranſiſſum 187,30  
 reſpiratione priuata, ac mentem ſimil-  
 re poſſumus 484,58  
 reſpiratione efficiende que conſtraint  
 759, 17  
 reſpirationi ſancti uolentiſſe que erga-  
 na ſeruant 489,18  
 reſpirationis actiones inter ſe communis  
 ſer ſunt quinq; 755,40  
 reſpirationis cauſe in genere ſunt tres  
 485, 28  
 reſpirationis differentie omnes in tribus  
 oppoſitiſſimis comprehenduntur  
 504, 57  
 reſpirationis diſſimilitudines quatuor coniuga-  
 tiones lib. 17  
 reſpirationis dolentiſſimæ erga, quæ con-  
 ſequitur ſpiritus 497,44  
 reſpirationis duplex uſus 506,63  
 reſpirationis & pulſus idem uſus 490,  
 64, 507,61  
 reſpirationis & pulſus nū idem ſeruant  
 timentis 352,1  
 reſpirationis pulſus et quies que ſi poſt  
 dilatantur breuior poſt compreſſio-  
 nem longior 491,27  
 reſpirationis uenit quæ cauſa 496,  
 55  
 reſpirationis inſtrumentorum ſpeciei mal-  
 coples 488,17  
 reſpirationis magnitudo eandem cauſam  
 conſeruat quem uolentis poſſu-  
 led 491,50  
 reſpirationis motum offenſis duplex  
 499, 13  
 reſpirationis opifices, tres ſublimem tho-  
 racis muſculorum coniugationes  
 271, 56  
 reſpirationis organa 487,44, 600,  
 58  
 reſpirationis organa modè efficiſſis, rem-  
 die unde petenda 1240,38  
 reſpirationis organum aliquo dolenti,  
 1106, 9

non parum, ſed cerebrum agunt ſpi-  
 ritum 501,8  
 reſpirationis organum anguſtiſſimū Libe-  
 rantium catandem ſcapu communes  
 & proprii quæ 1247,3  
 reſpirationis organum anguſtiſſimū que  
 efficiunt 1246,63  
 reſpirationis partes quatuor 489,15  
 reſpirationis ſpecies eadem eſt omnibus  
 ſuccumbentibus pulmonibus 601,27  
 reſpirationis totus quatuor ſunt diffe-  
 rentiæ 502,11  
 reſpirationis uenit motus ab uſu impul-  
 ſus præcedentem reſpirationem contra-  
 hit 499,34  
 reſpirationis uenit poſſunt eandem cauſam  
 eſſe que pulſus uenit 491,5  
 reſpirationis uſus 774,43, 915,  
 63  
 reſpirationis uſus primus & maximus  
 143, 23  
 reſpirationis utilitas, inter alios cauſas  
 obſeruat primus 488,52  
 reſpirationis utilitas prima ſecundū  
 lib. 8  
 reſpirationis utilitas principaliſſima eſt  
 conſtraint calorem inſuſi, amoluiſſi  
 ſpiritus nutritionis 490,56  
 reſpiratione non omnia petiſſe per ſol-  
 ritum interceptio, qua ratione co-  
 gnitiſſimū 505,35  
 reſpirationem duplex reſſa 499,9  
 reſpiratione opus eſt animalis potētiæ pul-  
 ſus, uenit 509,1  
 reſpiratione, opus non plene uolentis li-  
 berum 1012,5  
 reſpiratione ordinata & inordinata  
 496, 1  
 reſpiratione parua frequenſ, in quibus di-  
 ſpoſitionibus aſſiſi 417,2  
 reſpiratione parua & rara, uenit ab er-  
 ganiſſimū reſpirationis refrigeratis  
 503, 62  
 reſpiratione quando leditur 752,56  
 reſpiratione quibus de cauſis eſſiſi 125,  
 11  
 reſpiratio, refrigerationis cauſa ſit  
 485, 19  
 reſpiratio, ſerpi tranſiſſiſſi et thoracis mu-  
 ſculorum eſt aliſſo 100,44  
 reſpiratio ſolacis dicitur calorem  
 507, 53  
 reſpiratio ſtortioſa unde 503,47  
 reſpiratione animiſſiſſi ſaculatiſſi extre-  
 mitate refrigeratis propriis ſignis que  
 ſunt 498,58  
 rei ſenſus cadentis, ſenſu dicitur  
 10, 16  
 reſpirationis plenus ſi à cordibus ad ba-  
 ſin cerebri conuoluit 507,2  
 reſpirationis excrementorum cauſa, qua-  
 trane aduocanda 437,53  
 reſpiratione quomodo ſit 774,51  
 reſolentiſſi à capite modè diuerſi  
 1106, 9

tracuendi ratio	864,32	38	1017,	31	
Ranalis est fluctuant humorum moderatus et dermatis eorum qui sunt obferunt parum	974,36	Rigor per circuitus rediunt, quid ex terminet	1067,31,1088,58	refractionem refrigerandi modus	891,16
Ranalis est derivatio et matrice quibus sua motus	Ibid. 45	Rigor est refrigerandus ad non expulsiu	679,1	refractionem refrigerandi et calidam duris corpora	1033,3
Ranalis fit ad quoniamque distans loca	859,4,2,93,7,54	Rigor febrem ardentem illi superueniens cor soluit	630,46,714,58	Rose facultas	1804,13
Ranalis humorum fluctuant, in cibariis molenda est	860,54, 913,60, 916,43, 972,5	Rigor fit a frigida et calida causa	631,33	Rose infusa excrementa tria	1050,53
Ranalis cum evacuationibus, incipit ibi fluere humoribus adhibendis sunt	998,1	Rigor fit, flauis hinc late per membra sensibilibus	715,12	Rose partes quatuor	1034,5
Ranalis modis duobus	963,16, 999,59	Rigori adest motus multus, rous et frequens	678,11	Rose partium exorta	1050,59
Ranalis per febrem acutam quoniam fit effluat	994,68	Rigor febri cor superueniens	612,30	Rose refrigerat, succus euidenter refrigerant	1031,33
Ranalis sanguinis fit ad contraria, derivatio ad uena	864,8	Rigor interduo ad penita uictra erigitur	715,38	Rose fit a frigida in secundo exitu	103,1
RANALIS papaveris species	1095,62	Rigori quid requiritur	713,4	Rose pulvis in quibus curare polypus soluit	1335,24
Rhabaridis solutio quando uisum excolat	669,29	Rigori cause	455,18,663,18,715,1	Rose siccum succum effundendi ratio	103,4
Rhabaridis tancie usus	Ibid. 16	Rigori adest	882,46	Rose siccum tepidum quoniam caliditatem possidet, odoreque aliorum anagionum excolui	910,7
Rheumii facultas	1103,59	Rigor morbosus quid	713,14	Rose siccum	1031,56
Rheumii	1104,3	Rigor quando excolitur	643,13	Rose siccum	1031,56
Rheum adulterandi modus	1285,6	Rigor quando obdurat	714,13	Rose siccum	1031,56
Rheum esse uicementem asfringens gustus	1283,17	Rigor quando fit letalis	681,34	Rose siccum	1031,56
Rheumiditatis uentriculi et intestinum morbosus contrarius	1183,17	Rigor quoniam qualis	715,50,793,33	Rose siccum	1031,56
Rheumiditatis uis	1098,15, 1104,42	Rigor quid	713,64	Rose siccum	1031,56
Rheum est duplex	1233,14	Rigor siccum citra febrem accidit	63,17	Rose siccum	1031,56
Rheum quoniam possidet facultatem	1104,55	Rigor siccum febri ex pucta inter duos oritur	791,53	Rose siccum	1031,56
Rhythmus inaequalitas quomodo fit	519,33	Rigor tertius et quartus quomodo diffinitur	613,32	Rose siccum	1031,56
Rhythmus dignoscendo quid explorandum	549,57	Rigor tertius et quartus qualis adfit	791,34	Rose siccum	1031,56
Rhythmorum differentie multiplices	531,59	Rigor tertius qualis	715,53	Rose siccum	1031,56
Rhythmorum mutatorum cause	566,29	Rigor uicementis non adest febribus infirmitatibus	719,1	Rose siccum	1031,56
Rhythmum inaequalem efficit proportio commensurata	529,64	Rigor uicementis non adest febribus infirmitatibus	719,1	Rose siccum	1031,56
Rhythmus in quo consistit	549,17	Rigor uicementis non adest febribus infirmitatibus	719,1	Rose siccum	1031,56
Rhythmus in solu pascuis urbanis similes dignoscitur	Ibid. 61	Rigor uicementis non adest febribus infirmitatibus	719,1	Rose siccum	1031,56
Rhythmus quomodo et qualis et quomodo in aqua	518,61	Rigor uicementis non adest febribus infirmitatibus	719,1	Rose siccum	1031,56
RICINI uel cici facultas	1087,30	Rigor uicementis non adest febribus infirmitatibus	719,1	Rose siccum	1031,56
Rigore hominis sole partes extrinsece refrigerantur, recurrent sanguine ad interiora	684,45, 684,14	Rigor uicementis non adest febribus infirmitatibus	719,1	Rose siccum	1031,56
Rigorem ex humore frigido curatio	715,44	Rigor uicementis non adest febribus infirmitatibus	719,1	Rose siccum	1031,56
Rigor absque febri quibus accidit	65,30	Rigor uicementis non adest febribus infirmitatibus	719,1	Rose siccum	1031,56
Rigor accidit inflammationi conuerso in abscessum	714,62	Rigor uicementis non adest febribus infirmitatibus	719,1	Rose siccum	1031,56
Rigor a tremore quo differtur	712,53	Rigor uicementis non adest febribus infirmitatibus	719,1	Rose siccum	1031,56
Rigor cor corpus urbanitatis quoniam amata inalestat	714,15	Rigor uicementis non adest febribus infirmitatibus	719,1	Rose siccum	1031,56
Rigores citra febrem quando gignuntur		Rigor uicementis non adest febribus infirmitatibus	719,1	Rose siccum	1031,56

## I N D E X.

- Salomonis cedis quibus medeatur affe-*  
*ctibus* 114.1, 63  
*Sal capitis fermentis non est aptum* 110.6,  
 46  
*Sal emollientibus non iniciendus est,*  
*quia excoctat valde* 107.6, 19  
*Sal thioriaci extrinsecus corpora* 95.4, 5  
*Saltes thioriaci quibus auxiliandis affe-*  
*ctibus* 117.9, 7  
*Saltes thioriaci preparandi ratio* ibid.  
 15  
*Salvus foliorum ole* 108.1, 64  
*Salvis flas in uiscera oppositis, lentes indu-*  
*ratos sanat* 97.7, 40  
*Salvis genera* 104.9, 60  
*Salvis viris et differentie* 40.1, 59,  
 104.9, 46, 111.0, 47, 114.1, 10  
*et* 11,  
 117.7, 67  
*Salvis est facultas* 114.1, 17  
*Salvis usus in quibus probetur* ibid. 15  
*Salvia hominis ac superat, utraque dicit*  
*perniciosa* 64.4, 3  
*Salvia hominis leisoni scorpion crecat*  
 64.4, 3  
*Salvia humana aduersatur beffinis homi-*  
*num promeribus* 111.1, 61  
*Salvia trioni acutioris ad que confert*  
 111.1, 50  
*Salvia amarescent, amplius excoctabile*  
 104.9, 35  
*Salvia que dicuntur* 103.0, 11  
*Saluformia Sardica, aptima* 40.4, 17  
*Salvi Andromachi vires et compositio*  
 111.1, 59  
*Saluformis eam esse ad saluandam opti-*  
*ment, cui enim insulare uideatur*  
 104.9, 31  
*Saluformis facultas* 114.4, 19  
*Saluformis ex accidenti nuncupatur mor-*  
*dicaciones sanant* 102.5, 5  
*Saluformis si differretur, credite curare be-*  
*niam* 99.6, 1  
*Salubre corpus simpliciter quod sit* 11.4,  
 8  
*Salubre corpus ut moue, quod sit* ibid.  
 11  
*Salubria que* 1, 63, 36, 75, 81, 5,  
 11  
*Salubria signa que* 115.1, 4, 359,  
 45  
*Salubrium corporum digestionem unde*  
*petenda* 815.1, 4  
*Saluus si uisus* 107.9, 11  
*Salvis spes quando adfit, et quando sit*  
*diagnosticata* 60.4, 63  
*Sanandi corpus communis* 83.6, 13  
*Sana fundibus seruanda* 47.1, 8  
*Sanantis uentis, est ablati uel trans-*  
*positio* 83.6, 13  
*Sanatio quid* 90.1, 15, 919, 51  
*Sanctorum facultas* 111.5, 4  
*Sanctus quom un habet* 111.6, 11  
*Sanguis fluentis ad firmitatem ingit colla-*  
*ta* 80.4, 9, 117.9, 9  
*Sanguis in utero alius* 4.12, 40  
*Sanguinem detrudere, que sint conside-*  
*randa* 96.5, 62, 98.9, 11, 99.1,  
 14  
*Sanguinem detrudere in synocha que*  
*consideranda* 90.0, 1  
*Sanguinem i uiscera fluentem remedium*  
*sapponimus* 116.7, 13  
*Sanguinem ex dextra uel sinistra nare*  
*profusum supprimi de ratio* 164.4,  
 15  
*Sanguinem expurcibus, repetenda est*  
*misio sanguinis* 163, 16  
*Sanguinem fluentem ab hepate et sple-*  
*ne, curandis admodum illis ascri-*  
*buis retrahunt* 96.9, 11  
*Sanguinem mittere in omnibus putridis*  
*febris quando sit saluberrimum*  
 92.1, 38  
*Sanguinem per nares quid trahat* 109.0,  
 52  
*Sanguinem retinens ob refrigerate spi-*  
*ritus organa, curandis* 57.7, 12  
*Sanguineorum partes omnes ex microscis*  
*sanguine gignuntur* 37, 18  
*Sanguis per nares fluente quando et*  
*quid secunda uenia* 164.1, 11  
*Sanguis praedictis que insunt* 180,  
 23  
*Sanguis ex profundo profusum quomo-*  
*do occurrendum* 166.1, 17  
*Sanguis a pulmone reuelli indicia*  
 71.4, 5  
*Sanguis causa calor temperatus et mo-*  
*diu durans* 80, 19  
*Sanguis cretici et cretione per na-*  
*res quom indicent* 96.9, 18  
*Sanguis detrudendi mensura, quom au-*  
*xilium auxilium facilius multo de-*  
*prehenditur* 98.7, 13  
*Sanguis detrudis iteranda est, et cur*  
 465.2, 99.6, 12  
*Sanguis detrudis aut purgatione*  
*quibus seon proficiendum sit ueniente*  
*ure* 47.1, 16, 99.1, 9  
*Sanguis detrudis humoris uisus si*  
*in uenis et arteriis uenit* 100.1,  
 30  
*Sanguis detrudis que posulante*  
 90.0, 19  
*Sanguis detrudis que prohibent*  
 ibid. 7, 90.1, 18  
*Sanguis detrudis quando sit pletis*  
*do uenanda* 99.4, 61  
*Sanguis detrudis prime et secun-*  
*da cur interponendum sit tempus*  
 164.4, 59  
*Sanguis detrudis que commoditas*  
*insit* 99.4, 17  
*Sanguis erupcionem uras scilio compe-*  
*scit* 99.4, 9  
*Sanguis erupciones uisus laborandis*  
*que sint* 99.6, 1  
*Sanguis erupcionis quid prosit* 108.1,  
 38  
*Sanguis erupcio per nares per ratione*  
 curanda 99.4, 11, 115, 18  
*Sanguis eructationis fistulae, medi-*  
*cas habet libetam potestatis, etiam*  
*adtem nequaquam* 97.7, 10  
*Sanguis eructationes omnes prater nar-*  
*em sunt, in quibus exceptis* 87.7, 32  
*Sanguis erupcionis quid conducit* 119.9,  
 60  
*Sanguis flauis, subdus, spirituosus et cali-*  
*dissimi origo, sicut caris sinus est*  
 141, 51  
*Sanguis fluentis per nares uisus du-*  
*plex* 86.7, 13  
*Sanguis fluentis causa triplex* 87.7, 17  
*Sanguis fluxum a nardibus curandis*  
*præcordis aduoca compescit* 96.5,  
 40  
 99.6, 11  
*Sanguis fluxus que bonum uel malum*  
*facit trisum* 64.4, 13  
*Sanguis humidus et ruber generatio sit*  
*in iecore* 142.1, 51  
*Sanguis in fœnem degeneratio* 111.5, 3  
*Sanguis misio in quantis quatuor*  
*celebranda* 96.1, 14  
*Sanguis misio, in quibus adest ciuon*  
*humorum copia, quomodo celebran-*  
*da* 99.4, 42  
*Sanguis missum prohibet aris con-*  
*stantis impense calida aut frigida*  
 96.4, 17  
*Sanguis misio quando ad artem dese-*  
*ndum usque celebranda* 191.5, 6  
*Sanguis misio quando sit eodem die re-*  
*petenda* 46.4, 6  
*Sanguis mittendi principis scopi quid*  
*sint* 99.1, 9, 99.5, 8  
*Sanguis mutatio post uram scilio*  
*quando expectanda sit* 99.1, 17  
*Sanguis periculi diuise* 38.4, 9  
*Sanguis profusum per nares, que sint*  
*signa* 64.4, 18  
*Sanguis reductio non indicat uram*  
*scitionem* 86.0, 16  
*Sanguis retellens a carbo producit*  
*ta curatio* 87.0, 11  
*Sanguis sex libris tant detrudis sufficit*  
 99.1, 59  
*Sanguis supra modum esset puri pon-*  
*guit, ut fluxum, crassum in artem bl-*  
*tem conuertitur* 79.7, 5  
*Sanguis temperies quibus de causis na-*  
*scitur* 70.1, 42  
*Sanguis uacuitas iterata quomodo fieri*  
*debeat* 99.7, 44  
*Sanguis uisibilis facultas* 117.7, 13  
*Sanguis uisibilis complacit cur sint*  
*crassissimi apriora* 86.5, 1  
*Sanguis absque plenitudine uisus quomodo*  
*do detrudendus* 89.1, 10  
*Sanguis a corde adorem habet* 4.1, 12  
*Sanguis ad intestina et uentriculum per*  
*mesenteria uenas in longiori itinere*  
*retrahitur* 114.1, 19  
*Sanguis, esse de uenit, per pulmonem*  
*eluctio* 74.1, 7

# EPITOMES GALENI

Sanguis à icterine et hinc uacuat per  
 uterulum 764,33  
 Sanguis arterialis subtilior et uapor  
 sior 213,9  
 Sanguis attenuatus et absolutus omnis  
 post bilium tenuissimum est in cor  
 pore 18,47  
 Sanguis à usui effluere potest quatuor  
 modis 861,19  
 Sanguis ex natura familiarissimus me  
 diatus omnisu postremu 1039,18  
 Sanguis ciborum inopia arctat ac desuper  
 seipso redditur 918,14  
 Sanguis columbinus hyposthegnatus con  
 sors 212,14  
 Sanguis columbinus infunditur per crani  
 fracturas 114,5  
 Sanguis columbinus neq. sumit, neq.  
 conceditur facilius suum sergent  
 inferre 199,3  
 Sanguis coarctatus materia est latis et  
 mensuri 1062,15  
 Sanguis cohibetur in uenis 223,42  
 Sanguis dupliciter inanis redditur  
 901, 44  
 Sanguis dum fluxu pulsus sunt explandus  
 994, 18  
 Sanguis ex quatuor consistit humoribus  
 149, 41  
 Sanguis extra sua uasa, subit in gressum  
 conuulsiu 702,39  
 Sanguis facile fit caro 111,39  
 Sanguis fit à propria hepatis carnis sub  
 stantia 140,61  
 Sanguis fit ex indidici calore 79,15  
 Sanguis flatus inmodicus, quomodo sup  
 primendus 399,16  
 Sanguis gallinarius 399,1  
 Sanguis in arteriis inflammatur ex pble  
 gmon primu 63,18  
 Sanguis in cerebro contentus, alteratur in  
 sanum 741,10  
 Sanguis in scirrhosis et pblegmonis fluxe  
 febre arsi, quando mittendus 998, 32  
 Sanguis in generatione, materie ratione  
 etbetur, semen, opificus 429,9  
 Sanguis in gressu casualis, gravioris  
 symptomata induit 406,23  
 Sanguis in inflammationibus putrescens,  
 quatuor febres gignit 588,4  
 Sanguis in inflammationibus, quibus de  
 trahendus 995,32  
 Sanguis in inflammatione particulis dupli  
 de causa corrumpitur 796,68  
 Sanguis in lassitudine quando fit mitten  
 dus 451,19  
 Sanguis in principio fluxu mittendus,  
 si purior febre laborans ualidi sit  
 uiribus nec eruditus subest 910,37  
 Sanguis in pulmone, aut inter pulmonem  
 et uesicu putrescens, talem efficit  
 350, 18  
 Sanguis in reliquo corpore quando ex  
 pblegmon accendatur 63,31

Sanguis in synochis cur non inmodicus de  
 trahendus 911,13  
 Sanguis in uenis scilicet supprimendus,  
 cum alteratur pulsus 995,14  
 Sanguis in uterulo continetur prae  
 natura 682,28  
 Sanguis leporinus et caprinus suauissi  
 mus 397,50  
 Sanguis male affectus qui dicitur 684,1  
 Sanguis materialis principium partium na  
 sti corporis 77,61  
 Sanguis, medius inter chylium et hepatis  
 eorum 221,15  
 Sanguis melancholicus in uniuersum cor  
 pus occupat, uel cerebrum solum, quo  
 modo discernendus 741,40  
 Sanguis menstruus, sanatus alimentum est  
 admenon 119,55  
 Sanguis mensurius non est prima mate  
 ria, gignendūq. animalis proprie  
 196, 53  
 Sanguis mensurius quantitate et quali  
 tate est uulsiu 705,9  
 Sanguis mensurius utro non familiaris  
 103, 10  
 Sanguis nec puro nec soni detrahendus  
 891, 8  
 Sanguis niger quibus uacuat sella uena  
 703, 31  
 Sanguis non est simplex 38,53  
 Sanguis non solum dicitur animal, sed edo  
 rem cuius uacualem censetur 990, 16  
 Sanguis nullus est frigidus 1126,55  
 1127, 41  
 Sanguis ob plenitudinem uisum, tuni  
 cas distringit 65,14  
 Sanguis omnis conuulsiu diffusus 397, 44  
 Sanguis omnis excrementicius 399,6  
 Sanguis omnis in cibo utendus, sicut et  
 uiscera 417,13  
 Sanguis optimus à quibus fuit 414,11  
 Sanguis per quod instrumenta ab utroque  
 bile purgatur 81,29  
 Sanguis post bilem calidissimus 63,50  
 Sanguis, potentis semen est 116,21  
 Sanguis probus, nature possessus est  
 901, 41  
 Sanguis productus ex moderata quatuor  
 elementorum temperie 150,8  
 Sanguis profluat ex uisui aliis descriptis,  
 quomodo supprimendus 164,47  
 Sanguis purus excrementis calidior  
 399, 61  
 Sanguis putrescens, proprii distan pro  
 ducit inflammationem 636,55  
 Sanguis putrescens ad emere bilis natu  
 ram transit 636,32, 766,19  
 801, 10  
 Sanguis putrescens in uentre, aut in gra  
 uem coactus, extrema pericula indu  
 cit 350,12  
 Sanguis quando externo calore incalescit  
 796, 53

Sanguis quando mittendus 456,52  
 860, 14  
 Sanguis quando mittendus sit ad animi  
 usq. deliquitum 994,52  
 Sanguis quando necessarius putrescat  
 799, 7  
 Sanguis quae parte excerni solet 751, 60  
 Sanguis quare aliis omnium uacuat  
 39, 12  
 Sanguis qui ad spiritum arduatur, et ef  
 ficitur est illo qui consistit in hepate  
 213, 32  
 Sanguis quibus exacerbat per intestina  
 etris quibusdam periodis 86,56  
 Sanguis quibus quo tempore, ubi et quae  
 constitutione, paratus detrahendus  
 899, 2, 993, 31, 995, 51  
 Sanguis in arteriis quoq. continetur  
 501, 53  
 Sanguis quous die mittendus, si id morbus  
 atque uires fudeant 899,10  
 Sanguis si plant secundum uisceris reditus  
 dicitur, bonum 644,16  
 Sanguis si nihil uiget, aut prohibeat a  
 liud, quando iu mittendus 992,40  
 Sanguis subtilissimus à de tro cordis si  
 transit in sinistram per medium se  
 ptum 88,64  
 Sanguis succorum optimus 43,41  
 Sanguis suillus tempore est bonum pra  
 fonsis 112,63  
 Sanguis uiridum uariation 1127,42  
 Sanguis purgantes graues ferunt  
 1002, 5  
 Sanguis exquirit, quae necessaria 363,12  
 Sanguis non est opus ad resurrendum ore  
 276, 39  
 Sanguis animi 331,1  
 Sanguis corporis quae 312,63  
 Sanguis elementorum est conuolatio  
 331, 27  
 Sanguis est duplex, una temperatissima,  
 altera uisui uisio exposta 412, 43  
 Sanguis et morbus unde oritur 627, 44  
 Sanguis inculpabilis conferendum quae ui  
 tio exposta est, reducenda per cen  
 traria ad moderatus temperamen  
 tum 431,46  
 Sanguis in quibus inuicenda 657,11  
 Sanguis instrumentum partium in qua  
 bus consistit 412,64, 410,10  
 Sanguis lenitudinem habet 67,54  
 Sanguis morbo, digestus, et tempore pri  
 or 422,52  
 Sanguis operatiois aptitudinem, non ad  
 defendenda 657,14  
 Sanguis primorum corporum in bona con  
 sistit temperie 349,27  
 Sanguis quando dicitur 66,13  
 Sanguis quid 360,5, 363,40, 416,18  
 et 61, 664,45, 845,24  
 Sanguis

## I N D E X.

sanctus familiarum perizon qui fit	65,	Sarcotichum facile	1161,4	scirbus canerosus ab usu emollientium	
60.42, 60. 430, 17. 850,		Sarcotichum finis quis	Ibid. 13	exasperat	1056,19
49		Sarcotichum opimum confici ex argente		scirbus et quibus quid	976,31
sanctus, scopus communis conuictus	161,6	cerato simplici admixta	1149, 7.	scirbus familiaris est tantum datus	
tum		1240,	1	spissis corporibus	604,13
sanctus semper nobiliss. sanctus absolut	36	Sardus, Myli, Pelamides, Carali	401,	scirbus infensilis, minime curantur re	
471,		35		cipi	976,34
sanctus tripliciter dicitur	364,12	Satyrifimus vel priapifimus qui fit	708,	scirbus quid	946,7, 1056,9
sanctum alio naturalis, pulchritudine		65		scirbus quomodo ad usum curantem	
consequitur	360,17	Saxifraga et betonica tenet optimi		figatur	976,60
sanctum que uincit	30,65	afficiunt	12-2,16	Sciffura quid	215,2
sanctum curandis esse sanctibus	64,	SCABIES et lepra que spectant		Scelopendra	109,4,9
1. 49		708,	56	Scolytus	1107,2
sanctus quando membra frangitur		Scammionum trabis flammam bilem		Scopi in nervis distribuendis tres	103,
798,	1	1189,16.	1271,12		
sanctus dominum durescit	430,53	Scandit uis	1106,59	scopi secundum quos singula res quibus ag-	
sanctus habens discernitur ex functioni		Scaphocides os	115,55, 159,8	gradiatur	356,28
bus secundum naturam obis	430,	Scapulae processus recurui sunt	294,16	Scaporum induratum dignitas unde sit	
32		Scapulae processus superiores	Ibid. 54	inducenda	951,42
sanctus latitudo ample	49,59. 66.	Scapularum confectio	136,10	Scapuli aditus, prius egrediuntur can-	
471,	38	Scapularum lani musculi	312,43	sa	216,50
sanctus iterum studium, uideretur		Scapularum motus à quibus proficiuntur		scapi curatibus prius à morbisque di-	
thodis, consistit in corporibus, consus		musculis	170,35, 171,48.	strophis nascitur	1149,34
et si quis	418,1	295,	19	scapi in curandis ulceribus precipuos	
Sapa est mustum plurimum collum		Scapularum usus	291,40	quis	1156,11
417,	45	Scaphi ex alea usus	1275,9	scapi in ortibus curandis quis	1214,
Sapa ex musto dolorem sedat	1308,63	Scaphi curatio curat, prius sunt foranda		34	
Sapores tres similes	421,3	per spargium calere aqua	1000,	Scardi faciles	1107,8
Sapores uicinas à peccato homines		46		Scardum calidum in corruptis dicitur	
424,	2	Scaphi quae partes, et in quem usum		1212,	47
Sapientia quid	840,16	seleuans	Ibid. 36	Scaria quide medicamentum	1155,11
Sapientissimus scilicet scipio per se		Scaphi quomodo quid sit attendendum	975,1	Scardopragi natura	1170,10
grosit	419,44	Scaphi quomodo profectores quando con-		Scardi oculi	745,8
Saper acit est calidus	1047,58	ueniant	979,17	Scardi quoniam non possident	1170,
Saper acitum sincerum reperitur in uicis		Scaphi quibus morbis conueniat		13	
de et oxyphallo	1045,61	1000,	49	Scardi lites grauiora induci sym-	
Sapores acidi sunt essentia sunt acidi et		Scaphi quibus multitudine sit adhiben-		pnomata	775,45
frigidus	Ibid. 55	da et quibus scito uicis	994,1	Scardi uenerunt refrigerat	745,8
Sapores acres quomodo ab amaris differe-		Scari inter sexatiles pisces primus ob-		Scardi, hominis uicis scito uenerunt	
rant	1043,41	finet	400,21	404,	51
Sapores ex aliis expone est impossibile		Scari uicari osium beneuol corpus		Scari quid sit subterraneum	121,13
1020,	10	compallio	111,46	Scardi nata que	129,14
Sapores ex miscella quatuor primarum		Schiri floris faciles	1109,18	Scardi continet obolis duos	1190,
qualitatem nascuntur	Ibid. 16	Schisti qui uires habet	1110,1	21	
Sapores qui uicari	1046,43	1210,	2	SCCTA de elementis differetis sunt	
Sapores dulcis natura	1043,30	Scintilla habens, nulla in re hallucina-		quatuor	34,11
Sapores sili et amari differunt	1049,	1000,	10	Selle medicorum tres	11,18
57		Scintilla non inuicti irrationabilibus ani-		Selle principes inter medicos due	
Saporem actionem faciles	1048,10	me facultatibus	134,16	6,	11
Saporem differunt in acribus fructibus		Scintilla ex aliis uires est quibus con-		Sellium trium conuenientia	11,45
1041,	8	stet	911,19	Sellium forma in parte suppurante	
Saporem dissensiones ex doctrina Platoni		Scilla aceto inuicta, uicis non uicari	911,	58,	
1019,	60	1000,	13	Sello quomodo admixta melle	162,10
Saporem facultates et opera	1064,	Selle succum recipiendi ratio	Ibid. 15	Secunda	110,45
4		Selle uis	1106,63	Secunda aduicentia est scintilla uicem	
Saporem qualitates afficiunt reliquis e-		Sellinum confectio	122,10	brana	Ibid. 49
non potest, ut lingua, licet non pri-		Scintilla 945,12. 1054,40.		Secunda conuenit cum uicis	105,17
us ab ut percipiuntur	1014,61	1186,	4	Secunda confectio et de scintilla	105,
Saporem singularum qualis sit finis aut		Sciri generatio et causa	976,57.	9-109,3. 121,12. et 17	
seruatus	1048,10	991,11. 1014,10. 1058,9. et 11		Secunda uicis in duas uicis et uicis	
Saporem impenetrabilem	1063,63	Sciri incurabiles ab aliis quomodo di-		arterias conuenit	121,18
Sapphyri uis	1113,1	ferantur	1186,6	Secunda uicis uicem scintilla tantum ac-	
Sarcocolla	709,14	Scitibus à priuata uicis ortis, quibus me-		dicamentis conueniant	105,19
Sarcocolla faciles	1105,21. 1219,	Scitibus speciei duas	708,6	114	33
56					

# EPITOMES GALENI

secundari arterie inuentas à corde se  
 tes defleferunt in utero 240,28  
 secundarum arteriarum omnes sunt propagi  
 nes arterie à corde ortæ 340,39  
 secundarum sunt chorij usas 305,32  
 secundarum uerue omnes, propagationes sunt  
 maxime uteræ 340,10  
 Se di inflentur præcedenti; cataplaf  
 ma conueniens 1066,60  
 sedi inflatæ quæ confectæ 1068,32  
 sedis & musculis & motus qualis 94,  
 26 230,2  
 sedis medicamenta Andromachi 1164,  
 65  
 sedis muscularum usus 131,48  
 sedis musculis resoluatur inmodico frigo  
 re 729,53  
 sedis prolapsus remedium 1263,16  
 sedis ulcera car æger curentur, & qua  
 lis pharmaca possint 1264,55  
 Semen calidum copiosius gignitur,  
 ad id ipsos ad expulsiõnem perti  
 net, qualis uisus ac merendi ratio co  
 ueniat 483,14  
 Semen codicrutia 483,32  
 Semen ex caridum 301,47  
 Semen, effectus principum animalis  
 77, 62  
 Semen externum inuito per carnalitates  
 779, 7  
 Semen ex semine gigni 111,59  
 Semen est faculus & materia mensura,  
 materia & facultas 116,15  
 Semen formation quo pacto gignatur  
 104, 29  
 Semen femininũ tenax frigidusq; mus  
 lo 108,61  
 Semen genitale extra propria uasa cor  
 pi 831,33  
 Semen gigni uenit, arteriarum, utrum, et  
 prima animalium organa 107,15  
 e men maris, principum animalis effecti  
 uum: itemq; motus 298,60 299,31  
 Semen muliebri confert animalis genera  
 tioni, & uoluptatem excitat 301,3  
 Semen muliebri quale 775,1  
 Semen muliebri solum potest faciemina  
 lem gignere 115,26  
 Semen muliebri uirili in utero misce  
 tur 108, 56  
 Semen non esse permittit quæ suscit  
 1063, 27  
 Semen non gignitur in æstibus glandu  
 latis 120,60  
 Semen opifitum habet fatiorem 124,61  
 Semen prolifacum quale esse debeat 117,  
 15  
 Semen prouocantia supprimentiq;  
 1063, 13  
 Semen quæ gignunt extinguunt 1063,  
 7 113,12  
 Semen quæ materia trahit ab utero, &  
 per quas uias 108,29  
 Semen quod sit 116,19  
 Semen quod imperfectius mouetur su se

mina: quod perfectius, masculina  
 299, 9  
 Semen quo tempore præcipue concipi  
 tur 106,34  
 Semen retinetur quàm mensura suppres  
 sa, quibus grauiora symptomata uise  
 rat 775,6 10  
 Semen sanguine succius 429,16  
 Semen seminarum est partium 117,50  
 Semen succus est maris conuenientissi  
 mus 303,18  
 Semen supprimunt omnia refrigerantia  
 1063, 21  
 Semen & mensuram qualis habeant prin  
 cipia 116,25  
 Semen ubique præpedit, ea pars domi  
 nanti sui somis 117,61  
 Semen uirile à muliebri nutritur 502,9  
 Semen uirile est membranarum & uasa  
 non motum origo 302,6  
 Semen uirile quale 299,4  
 Semen uirile spiritus plenum 108,15  
 Semen uirum perfectum ex uirili & mu  
 liebri constat 115,29  
 Semen utrumq; necessarium miscendum ad  
 factus generationem 299,16  
 Semioctyla recipi acclabula duo 129,1  
 61  
 Semina diuisione reposita, cur uires ha  
 beant inbecilliores 371,50  
 Semina facultate suis plantis similia  
 414, 63  
 Seminalia uasa feminina profusa à testu  
 bus, insistant in cornua matris  
 108, 50  
 Seminales metus 112,15  
 Semina parua mole multam substantiam  
 retinentia, aptum sunt succi & mal  
 ti alimenti 874,40  
 Semina præstantiora quæ sunt 408,31  
 Semina præe facit quæ 574,41  
 Semina tenuiora quæ 415,12  
 Semina quibus uisum diligenter pur  
 ganda 178,24  
 Seminaria in feminis uasa continet si  
 men 105,8  
 Seminary metus possit 104,57  
 Seminary uasus insertio in pudendam  
 112, 40  
 Semina ragofo arteria 371,38  
 Semini bus quando utendum libd. 42  
 emia insonat quatuor facultates natura  
 les 108,25  
 Seminis & lactis elaboratio 144,11  
 Seminis excretionem & compressionem  
 emittit ingeni uoluptas & cupiditas  
 673,60  
 Seminis feminis usus quis 108,59  
 Seminis muliebri proprium 116,51  
 Seminis substantia 301,23  
 Seminis substantia quibus aptissima  
 108, 10  
 Semperuius facultas 1067,18  
 Semetipsum ab inclinante uide, non gne  
 re sed magnitudinis differt 305,19

Semina interperies quæ di est 677,58  
 Semina, meritis naturalis est 471,14  
 Semina quæ ratione possit obfist 305,  
 41 49  
 Semina quid 804,1  
 Semes confectus laboribus sunt extremis  
 467, 2  
 Semes crebrius et paucius cibandi 468,3  
 Semefant corpora ab inuentione cadent  
 804, 29  
 Semes car fieri ad uniuersas functiones eo  
 quæ male effluunt feruore 692,19  
 Semes car tremidi 710,43  
 Semes car uigiles 718,56  
 Semes desipunt frigiditatis ratione  
 70, 68  
 Semes externi confectio opere, uel si no  
 dicit nuntio su 470,59  
 Semes naturali temperie sunt fieri, boni  
 di & crementorum copia 463,6  
 Semes omnes carent robore 991,17  
 Semes quibus præfatis un debeat, ac in  
 obfistiones incident 469,4  
 Semes solida partibus sunt fieri, curre  
 mentorum aut copia bonitas 1014,  
 28  
 Semibus à quibus cibi abstinentum  
 468, 53  
 Semibus deligenda quæ humidi & cal  
 faciant 470,55  
 Semibus eadem quæ condescendunt ex  
 pedis uisus reia 467,63  
 Semibus qualis esse debeat exercitatio  
 466, 59  
 Semibus refrigeratio est perennis & rora  
 486, 65  
 Semibus saluta miora recentib. 469,2  
 Semibus systole laboris 509,46  
 Semibus uisus humellans dignus 470,1  
 Semibus urina & alius quibus medicand  
 tis atq; cibi mouenda 470,3  
 Semis accurata descriptio 429,40  
 Semis omnia animalia sunt obnoxia 101,  
 39  
 Semis ab inclinante quibus notis distin  
 guatur 805,29  
 Semis ad interitum est uia 46,10  
 Semis corrigendum per calefactionem et  
 humellantia 466,14  
 Semis ex morbo absolutum, est incurra  
 bile: non absoluitur, cito inflamen  
 dum 801,19  
 Semis ex morbo quid dicatur 575,64  
 184,3 912,33  
 Semis ex morbo quomodo introducat  
 806, 5  
 Semis nec curari, nec sanari potest  
 105, 23  
 Semis quid 470,47  
 Semis multa semis fugiunt 91,3  
 Semis cognita inspectuere solida ib  
 firmata 1161,40  
 Semis infirmata in capite quatuor  
 253, 20  
 Semis posulant neruum mollis 232,18

# INDEX.

fenſoria que quibus ſint traſſiora aut le-  
 uiora 749,51  
 fenſoria uoluntarij agentia duplex ha-  
 bent nerruorum genus 123,23  
 fenſorij alterati, ut ſit fenſus, percipi de-  
 bet ab imaginatione, rationatione,  
 & memoria 253,55  
 fenſoriorum inſtrumentorum ſingula, quae  
 ea eſſe dicantur 147,11  
 fenſorum duos ſenſus, patiuntur 257,30  
 fenſoriorum non immutatur a quouis ſenſu  
 ibid.  
 fenſoriorum omnes gentium 255,55  
 ſenſus acutiſſimo praedia, medicamenta  
 acuta non tolerant 976,10  
 ſenſus acutiſſo, quibus contingat ueniſſe pre-  
 dicte 719,24  
 ſenſus indicandae cunctiſque & diſcreſia  
 731, 7  
 ſenſus uiceroſus ſi ſit conuenientia cruditas id  
 in primis ueniſſe, quibus in externa cor-  
 poris habuit conſiſtere, quod agendi  
 463, 46  
 ſenſus communis ſymptomata quae ſunt  
 665, 60  
 ſenſus deprauati ſymptomata quae  
 676, 31  
 ſenſus eſt alterationis dignoſis 147,35  
 ſenſus & motus non ex iſdem nerris, ſed  
 quibus digiſſe diſpenſari 161,56  
 ſenſus & motus origo conſiſtit in cere-  
 bro 716,14  
 ſenſus & motus quae uia ſuppediuntur  
 144, 43  
 ſenſus inſiti particularis nemo praedicte  
 93, 7  
 ſenſus in iudicandis medicamentis non  
 ſunt conueniendi 1018,19  
 ſenſus in paſſione conſiſtit 310,47  
 ſenſus inſtrumentum alteratur dum ſen-  
 tiuntur 348,1  
 ſenſus intra ſe reſoluit effectum urbem  
 tem patumder 675,49  
 ſenſus non eſt ſine alteratione 64,25  
 ſenſus non ſit abſq; nerris effectus 346, 23  
 ſenſus melius, quatenus & quales ſit ſan-  
 guis in arteriis contentus, poſſeſſi com-  
 monſtrare 551,15  
 ſenſus partis effectus quos exhibet indi-  
 cationes 818,62  
 ſenſus quomodo ſunt 675,14  
 ſenſus qui pado extrinſeci 104,120  
 ſenſus ſenſibilium iudex 551,6  
 ſenſus uiceroſus, acrim ſequitur humorum  
 qualitatem 698,64  
 ſenſus uiceroſus nullius plenitudinis eſt  
 propria nota 699,37  
 ſenſus uiceroſus triplex 455,18  
 ſenſus uiceroſus unde proueniat 455,18  
 906, 31  
 ſenſus uiceroſus praefente, cruditiſſe, huma-  
 ribus ab alto in corporis habuit de-  
 ſtributis, quae attendi ratione ſit na-  
 tendum 461,64

ſenſuum inſtrumenta quae 128,47  
 ſenſuum qui mutare immoratur uoluptate  
 efficiuntur, et traſſiora obiectis poſ-  
 ſident 673,19  
 ſenſus uicarij quodam eſt pati 729,10  
 ſenſus canis ſacialis 1091,47  
 ſenſum corpora plurimum inueniuntur pin-  
 guis friſidans, poſt ſumum matutinum  
 aſubria 466,33  
 ſenſum nemo quietem ex toto poſſidat,  
 ſi d neg; exercitium urbem ibid.  
 27  
 Serpie iſta quem uim habet 1139,24  
 Serpiem ueniſſe in uentrem deſcendunt  
 141, 16  
 Septentrionales aggreſſiſſimis moribus  
 71, 25  
 Sepi cordis ſeruitus 238,65  
 Sepi ſeruitus duo 176,24  
 Septimana decretoria eſt merborum acci-  
 terum 619,19  
 Septimana tres uiginti diebus ſemper de-  
 ſcribitur 615,49  
 ſeptimana, perfectio eſt periodus 613, 47  
 ſeptimana quot diebus conſiſt 611,18  
 ſeptimaeſter ſarcus, citius centum obſequi  
 laqueiſſe diebus ardi non poſſet  
 127, 25  
 ſeptemſter partes attendi primus termi-  
 nus 116,45  
 ſeptimi quartus eſt index 608,19  
 ſepi tranſuerſi effectus, ut pulſus uariet  
 603, 3  
 ſepi tranſuerſi conuexiones 178,64  
 ſepi tranſuerſi & nerris & muſculis  
 quodis 94,18  
 ſepi tranſuerſi figura, ſitus, & nerris  
 291,50, 489,14  
 ſepi tranſuerſi digito 187,3  
 ſepi tranſuerſi partes 175,60  
 ſepi tranſuerſi ſubſtantia & centum  
 174, 37  
 ſepi tranſuerſi ſubſtantia & dentic  
 249, 7  
 ſepi tranſuerſi ſubſtantia, exedus wa-  
 ſculis: figura, circularis eſt 178,54  
 ſepi tranſuerſi uſus 174,34, 222, 42, 488,12  
 ſepi tranſuerſo animal uelut ſolo in par-  
 tis reſpirationibus 189,4  
 ſepi tranſuerſo inſtamento quae cler-  
 rimd conuulſiones ueniſſe, quomodo  
 ſuffocationes pulmonum obſequi  
 obſiſſo 516,1  
 ſepi tranſuerſis quando minides ſeruit  
 ſit 995,17  
 ſepi tranſuerſum interiact cordi &  
 hepati 222,27  
 ſepi tranſuerſum neſcine a coſtis ſpa-  
 riis 175,60  
 ſepi tranſuerſum, pberet, diaphra-  
 gma, idem 186,52  
 ſepi tranſuerſum reſpirationis orga-  
 num, diſtingit ſpiracula a na-

ualib; nerribus 216,19, 500,65  
 ſepi tranſuerſum ſepi aet traſchibilem  
 animae ſacilitatem ab oppoſita  
 761, 62  
 ſepi tranſuerſum ſolent perfectiſſe lenent  
 reſpirationem 751,45  
 ſepi tranſuerſum ſubſtantia & uſu  
 muſculis 187,32  
 ſepi tranſuerſum thoracis tranſuerſum  
 ueniſſe 499,4  
 Sermo a mente, non ex mente, ſed ex ſoni-  
 mo gutture proſuſcitur 321,17  
 ſermo mentis nuncius ibid. 13  
 ſermorem quae efficiunt 755,52  
 ſermore qui optime ſtatut 550,60  
 ſermoris ergone quae 754,47  
 ſerica fruſtus 386,19  
 ſeri genera omnia, incrementa 51,25  
 ſerphi ſacialis 1101,42  
 ſeri ex genere ciborum 125,7,13  
 ſeroſa humiditas quae in matrem con-  
 ſiſt, ubi uacuabit, partes exciſit ad  
 agendum, uoluptatemq; maximam co-  
 ſiſt 301,18  
 ſerpylli ſacialis 1080,5  
 ſeruari quod, iſdem generibus a quibus  
 corrumpitur 431, 5  
 ſerum alium lactat 1039,9  
 ſerum, eſt ſanguinis uicibulum 218,20  
 ſerum ſanguinis quos effectus producat  
 687, 2  
 ſermoni 1105,53  
 ſermonibus magni & albi ſacialis  
 1105, 58  
 ſermonem cum melle in placenta cognitur  
 37, 31  
 ſermonem & cryſſum caſſit ibid. 35  
 ſermonem ſubacti ſermonem ibid. 27  
 ſermonem ſerui caſſi ibid. 30  
 ſerpi quon habet uim 1150,49  
 ſerui mutato nomine uocat ſit An-  
 toxius 899,34  
 ſerue nerruorum conuulſionis parti na-  
 le in abſque thoracis muſculum pro-  
 pagatur 190,54  
 ſeruius capiti coſtalis duos 1191,57, 1292, 41  
 ſeruius Romanus continet uocis uiginti  
 115,60  
 SICC A Largo calore liquata ſpeciem  
 humiditatis reſeruit 51,10  
 Siccantia citra reſonant quae ſunt 1170, 27  
 ſiccantia corpus noſtrum citra conge-  
 lationem 1051,13  
 ſiccantia ſimul & aſtringentia 1170,40  
 ſicca omnia dura ſunt 471,43  
 ſicca quon melida melius ſonit 142,28  
 ſicca uicibus uacatione 414,14  
 ſicceſcere neceſſari corpus poſt conſi-  
 ſtendi uigorem car contingit 850,11  
 ſicces conſiſti ueniſſe mortalitatis cor-  
 porum 475,48  
 ſicces conſummatas, leſionibus eſt  
 82, 8



# EPITOMES GALENI

facilis in quibus morbis arteria im-	similium partium integritas et unum	Silphibz m	Ibid. 54
dat 524,25	in elementorum moderatione immo de	Sitientes vehementer, quibus acciden-	819,19
faciles partium solidorum summa, infa-	ritateq; consistit 24,49	tum differt ab potante subest	772, 4
ciabilis 912,15	simile simili similare et notum 251,48	Sitium quid leniat 1076,20	674,48
facilius que sit fortis facilitas 884,11	similia que dicuntur 551,16	Situm qui fuerit gignat 674,48	815,2
facilius a uigiliis et animi afflictibus	similia jbi motu congrua et antica	Sitit ad thoracis uisceribus oborta quomo	815,2
artus, quomodo corrigantur 454,1	642 46	do distinguatur a uentriculi sit 815,2	59
facilitates particulares quibus notis de-	similia similibus adhibenda quatenus sunt	Sitit ingreditur causa 772,21,1018,49	888,51,974,35
prehenduntur 1040,5	811, 44	Sitit partis afflicte quas indicationes ex	815,2,4
facilius medicis humidum nutrimentum	similibus que seruatur, contrarius die-	Sitit quatuor	21,55
454, 54	rentur 452,34	Sitit uisus accitiorum particularium u-	21,55
facilitas inmoderate casae 663,10	similibus utrumque que meretur 259, 28	Sitit uisus accitiorum particularium u-	21,55
facilitas solutorum corporum si perdat, fuerit necessario frigida 884, 15	similis que sunt substantie, inter se mu-	Sitit uisus accitiorum particularium u-	21,55
facilitas speciei marie 811,10-814,7	tuando differt ab identitate 1038, 56	Sitit uisus accitiorum particularium u-	21,55
facilis etiam accipit formam 111,16	similitudo est inter ea que aliud, et illa	Sitit uisus accitiorum particularium u-	21,55
facilis omne et ratione prompti succu-	que alantur 417,30	Sitit uisus accitiorum particularium u-	21,55
ditur 574,4	similitudo liberorum ad parentes, contra	Sitit uisus accitiorum particularium u-	21,55
facilitas quoniam possidet 1105,65	git ex semine 115,64,119,65	Sitit uisus accitiorum particularium u-	21,55
Signa eructatus, concolationis, et mortis	similitudo unde fiat 115,49	Sitit uisus accitiorum particularium u-	21,55
ut colligenda 615,21	similitudinis liberorum ad parentes ratio	Sitit uisus accitiorum particularium u-	21,55
signa decenteria ante concoliationem ma-	Ibid. 38	Sitit uisus accitiorum particularium u-	21,55
nentia, uae, quoniam per crism fuerunt	similitudinis trium, tria principia que	Sitit uisus accitiorum particularium u-	21,55
morbus 614,4,7	320, 1	Sitit uisus accitiorum particularium u-	21,55
signa decenteria ad signis concolationis	similium transitis in se inuicem facili-	Sitit uisus accitiorum particularium u-	21,55
modo differtur Ibid. 11	104,6, 14	Sitit uisus accitiorum particularium u-	21,55
signa in argrotantibus que dicuntur sa-	Simplex ac inculpati in corporibus quod	Sitit uisus accitiorum particularium u-	21,55
lubria aut perniciosa 619,2	non sit 438,48	Sitit uisus accitiorum particularium u-	21,55
signa letalia in synochis 918,10	Simplex dicitur duobus modis 815, 57	Sitit uisus accitiorum particularium u-	21,55
signa letalia in synochis 918,10	simpliciter uires quibus cognoscantur	Sitit uisus accitiorum particularium u-	21,55
signa maxima in febrentibus unde pre-	174, 9	Sitit uisus accitiorum particularium u-	21,55
da 956,6	Simulantes dolorem que ratione depre-	Sitit uisus accitiorum particularium u-	21,55
signa morbum fatorem indicantia ex ma-	bendi possunt 654,46	Sitit uisus accitiorum particularium u-	21,55
trorum genere sunt 827,16	Simulans regio apertissima est ad transi-	Sitit uisus accitiorum particularium u-	21,55
signa morbi et saluti 618,7	tendens uires applicandam medica-	Sitit uisus accitiorum particularium u-	21,55
signa optime constitutionis corporum	mentum 1195,52	Sitit uisus accitiorum particularium u-	21,55
que 815,18	Singula ex parte illa, que imbuunt uen-	Sitit uisus accitiorum particularium u-	21,55
signa que alia uisum Ibid. 19	triculo corpus 685,51	Sitit uisus accitiorum particularium u-	21,55
signorum crispis aduersionem graui ba-	Singulis que medentur 1251,58, 16	Sitit uisus accitiorum particularium u-	21,55
betur proprium 628,10	Singulas 677,6	Sitit uisus accitiorum particularium u-	21,55
signorum differentia triplex 618,1	Singulas causa 685,46, 745,60, 1251, 46	Sitit uisus accitiorum particularium u-	21,55
signorum futuram arguendam indicen-	Singulas causa ubi consistit 682,55	Sitit uisus accitiorum particularium u-	21,55
tem naturam duplex 818,11	Sintus deligatus quid sit adhibenda	Sitit uisus accitiorum particularium u-	21,55
signum alioquin quid dicatur 767,57	1159, 2	Sitit uisus accitiorum particularium u-	21,55
signum pro puncto 1270,13	Sintus glutinatus uiri, ex quibus signis col-	Sitit uisus accitiorum particularium u-	21,55
Sitiqua, gena quatuor pendit 1190,13	ligi possit 981,10	Sitit uisus accitiorum particularium u-	21,55
Sintus cur et quatenus homini similis	Sintus curatus 980,15, et 18	Sitit uisus accitiorum particularium u-	21,55
151,15, 177,17	Sintus implendi ratio 1157,45	Sitit uisus accitiorum particularium u-	21,55
Sintus gressus quid 508,7	Sintus liquidiora phlegma possulant	Sitit uisus accitiorum particularium u-	21,55
Sintus hominis uisum ridicula 272,58	Ibid. 57	Sitit uisus accitiorum particularium u-	21,55
194, 9	Sintus quando abluendus ex uero 980, 51	Sitit uisus accitiorum particularium u-	21,55
Sintus omni ridicula anime, ridiculum cor-	Sintus, qui afflicti dicatur 706,42, 714,14, 980,15	Sitit uisus accitiorum particularium u-	21,55
pus tribuitur 201,1,29,4,1	Sintus quomodo deligendus Ibid. 58	Sitit uisus accitiorum particularium u-	21,55
Sintus agnus facultas 415,55	Sintus quam uim habeat 1106,42	Sitit uisus accitiorum particularium u-	21,55
Similares partes quot immoderata cru-	Sintus quid uocetur 1245,2	Sitit uisus accitiorum particularium u-	21,55
clari possint sine humorum afflicto-	Sintus profundiora phlegma possulant	Sitit uisus accitiorum particularium u-	21,55
rum afflicto 847,10	Sintus profundiora phlegma possulant	Sitit uisus accitiorum particularium u-	21,55
Similium corporum differentia simplici-	Sintus profundiora phlegma possulant	Sitit uisus accitiorum particularium u-	21,55
ter, quot elementa, totidem, com-	Sintus profundiora phlegma possulant	Sitit uisus accitiorum particularium u-	21,55
posuit 24,40	Sintus profundiora phlegma possulant	Sitit uisus accitiorum particularium u-	21,55
Similium inter se et dissimilium diffe-	Sintus profundiora phlegma possulant	Sitit uisus accitiorum particularium u-	21,55
rentiae unde nascantur 1034,30	Sintus profundiora phlegma possulant	Sitit uisus accitiorum particularium u-	21,55

## I N D E X.

mes	99,61	Speciem animalis à matre potius suscipit	nom	261,47	(61
femina quid conuiliat	1109,19,1113.	facies	116,40	Spontaneum musculorum fibræ oblique	176,
10		Species indolitas reperitur in singulis re-		Spontaneum musculorum processus	176,
femina à balneo concoquit nullid, et ma-		rum generibus	149,6	51	
lios succos diluunt	451,4,4	Species omnis uicari potest pars, non au-		Spontaneum musculorum quatuor capite	
femina ad uicarium est una	574,4	tem contraria	137,31	libid.	60
femina coracquet	917,14	Speculatio circa medicorum dissidia, quod		Spina supra diaphragma ualde signatur	
femina diuina crades succos digerit		propt	135,54	113,1	15
prohibet, et uiscera reddit granata		Speculum à disforia et compositione ma-		Spina tota per decimum grandylum diui-	
917,	19	xime necessaria ad artis constitutionem		sa in partes omnino æquales	119,
femina mer. le. frater	570,6,4	353,	40	33	
femina natura qui	571,18	Speculatione artis ratio confirmanda ex-		Spina nigriti quatuor uiribus constat	
femina post cunctos succos perducant,		pericula	4,53	114,	13
immoderatas exigit	570,38	Specula uentis	57,3	Spiralis et uita separari non possunt	
femina præter naturam	571,18	Spelte facultas	1080,17	774,	41
femina profundus, sentiendi fontibus		Spermatizationem usumque sitis et pro-		Spiratio et uix quando perit 188,14	
latet	676,4	gressus in masculis	103,51	Spiratio erigens simul et rare frigide-	
femina quemodo fiat	571,15	Sphæla sine uita	174,14	tem significat	757,10
femina quas pulsus faciat	170,13	Sphæricus quod	708,41 877,17	Spiratio facili in quibus acutis morbis ad-	
Semina facultas	1107,4,1	Sphære parue extricationis commo-		salutem nigritiam habeat mamentum	
Semina mortem remedia uaria Anabigrit		ditas 166,10. et 52. et 61. 367.		616,	45
1111,	17	35. et	19	Spiratio frequens quid indicet	757,13
Semina oriant non sunt competendi in		Sphære parue extricationis uicari omni		Spiratio magna simul et rara non est la-	
febris	libid. 12	periculo	167,46	separabili à delecto	499,64
Semina uari ab æquisitione sentiendi		Sphæroides os	112,52	Spiratio resolutio unde contingat	
facilitatem ortumque curam per stupor		Sphæroides os fortius apophyses ptery-		719,	17
factorem	libid. 10	goides	131,52	Spiratio persua que	747,43
Semina in acribus casus	libid. 6	Sphæragis Lemnia	1115,15	Spiratum à corde uicibus corpus attrahit	
Sopelismata à quibus possint discerni		Spinae nardi facultas	1097,51	91,	8
1111,	18	Spina nardi radice equat sic dicta	1128,11	Spiratum animalium partem à uicis, par-	
Sophismata existunt ex similitudine quon-		Spina	110,15	tem et præcipue ab acribus	912,
dam uici habent	libid. 16	Spina cum corporis quædam carina	110,4	112,	15
Sophistæ extrinsecus sunt	114,8,66	Spina constat ex quatuor et uicibus		Spiratum balneum que gignat	
Sophistæ res ipsas negligunt, de nomi-		Spinae cæ p' uicibus compoita sit		947,	4
nibus solent	110,53	Spinae cæ p' uicibus compoita sit		Spiritus alterationis casus que	919,50
Sophistæ utuntur indolentibus et ex-		Spinae cæ p' uicibus compoita sit		Spiritus animalis à cerebro diminuitur ad	
piis	1011,64	Spinae cæ p' uicibus compoita sit		oculos	669,1
Sopor consensus sequi uicibus de-		Spinae cæ p' uicibus compoita sit		Spiritus animalis à cerebro nascitur	
lectis	750,18	Spinae cæ p' uicibus compoita sit		919,	35
Sopor quid	libid. 12	Spinae cæ p' uicibus compoita sit		Spiritus animalis, anima propria mat-	
Soporifica quærit ostenda	916, 12. et	Spinae cæ p' uicibus compoita sit		ria	704,40
30		Spinae cæ p' uicibus compoita sit		Spiritus animalis conuincitur in cerebri ul-	
Soporifica sunt, quæ extremi refrigerant		Spinae cæ p' uicibus compoita sit		triculo 242,6. 117,10. 144,21.	
675,	61	Spinae cæ p' uicibus compoita sit		507,11.	740,60
Soporificis quando utendum	916,14	Spinae cæ p' uicibus compoita sit		Spiritus animalis est anima substan-	
Soporifici causa	717,10. 718,62. 750,	Spinae cæ p' uicibus compoita sit		tia, aut primus ipsius instrumentum	
19.	70,14	Spinae cæ p' uicibus compoita sit		437,11.	730,40
Soris facultas	1008,19	Spinae cæ p' uicibus compoita sit		Spiritus animalis exaltatur per uolun-	
Soris ab acri medicamento excitatur,		Spinae cæ p' uicibus compoita sit		tat morians	507,18
quemodo discernendæ ab eis, quæ ul-		Spinae cæ p' uicibus compoita sit		Spiritus animalis in quibus absortatur	
cus propria ratione producit	1171,	Spinae cæ p' uicibus compoita sit		559,	41
41		Spinae cæ p' uicibus compoita sit		Spiritus animalis non est anima substan-	
Sordes extricationem	1130,57	Spinae cæ p' uicibus compoita sit		tia	144,10
Sordes hominum quibus affectibus conse-		Spinae cæ p' uicibus compoita sit		Spiritus animalis nutritionem, esse minus	
crant	113,53	Spinae cæ p' uicibus compoita sit		commune respirationalis et pulses	
Sordes quoniam non habent	1104,60	Spinae cæ p' uicibus compoita sit		508,	3
et SPACIA paribus uisita	61,15	Spinae cæ p' uicibus compoita sit		Spiritus animalis præcipue nutritur ex in-	
Spadum inter concordam quæ ratione in-		Spinae cæ p' uicibus compoita sit		spiratione que fit per uicem 487,18	
leptate finitur	302,11	Spinae cæ p' uicibus compoita sit		Spiritus animalis quid	119,1
Spadum omnis perit uicibus	112,	Spinae cæ p' uicibus compoita sit		21	
49		Spinae cæ p' uicibus compoita sit		Spiritus animalis unde nutritur	437,
Spargit facultas	1107,48	Spinae cæ p' uicibus compoita sit		17	
Species animalis ad subiectas generatio-		Spinae cæ p' uicibus compoita sit		Spiritus aut anima est substantia, aut	
nis materies consequntur	1169,119,	Spinae cæ p' uicibus compoita sit		primus illius instrumentum	1055,
60		Spinae cæ p' uicibus compoita sit		21	

EPITOMES GALENI

spiritus cohibitis ad apotheciam con-	ferretur, quo fiat modo	448,1	spiritus cohibitis cui operi conferat	447,11.	448,14	spiritus cohibitis, est musculorum dextra-	tis & abluuntur exercitatio	446,5	spiritus cohibitis interponenda exercitia	mimentur	448,17	spiritus cohibitis, calor in respirationis	organi astringit	679,44	spiritus cohibitis que probanda & que	improbanda	447,40	spiritus cohibitis quomodo fiat	libidem	54	spiritus costringitis coactisq; plurimum co-	ducit ad foris faciliorem, et dispo-	lans contra	669,6	spiritus densus quid significet	503,48	spiritus densus sicut & magnus quando	reddatur	503,1	spiritus diu cohibitis sicut singulis	504,4	53	spiritus effrenatus que corripunt	519,9	53	spiritus est in ipse generatione motus	principium	296,11	spiritus fluidus in aëre motibus	unde colligitur	1109,10	spiritus frigidus cor et nobis effluens, in acutis tantum morbis perniciosus	503,35	503,6	spiritus inaequalis quoniam effrenatus fit nota	493,11	spiritus magnus & per multum tempus, quid significet	513,14	spiritus magnus & rarus delirium indu-	cit	757,8	spiritus naturalis	514,54.	In hepate continetur	919,40	spiritus nihil aut parum in cor transmi-	tuntur	911,11	spiritus obscuri qui dicuntur	505,53.	Quibus sunt mali	libid. 47	spiritus oculi confert ad colorum abluen-	tiam	163,11	spiritus parvus & densus delirium est si-	gnum	491,4	Quibus superveniunt affectiones	libid. 49,500,49-502,55.	505,41	spiritus principiorum instrumenta que	172,10	spiritus qualitas, non substantia, cordi est et ipsa	91,14	spiritus quantitas distinctioni organorum spirituum semper proportionem re-	spiciunt, quando naturam se habet	495,22	spiritus subtilis quid	505,46	spiritus ubi conficitur	242,19	spiritus subtilis quis	344,21.	A corde nascentur	324,52.	344,16.	919,38	splanchnici vel mesici facultas	1075,40	splendore oculi interius cum externo mi-																																																																																																				
steter	267,46	Splen visus est minimi obnervum dolo-	500,16	stentia frustis sibus consummandis re-	quirit	877,16	splenis caro rarior & levis carne dapa-	lis	233,18	Spondyliis	212,4,50	Spondyli partes que fortiores	290,44	Spondyli que parte masticulatur mutui	211,50	Spondyli singuli sibus habent obliquos	216,41	Spondyli singuli, nervorum, emittunt una conjugentem	793,11	Spondyliis	1108,65	Spondilio primo due insunt cavitates	283,14	Spondylorum constructionis scopus pri-	mus duplex	290,20	Spondylorum productiones quot habeantur	283,58	Spondylorum productiones transverse	287,61	Spondyliis medius in tota spina cur pro-	ductionem postum in neutum melli-	net partem	287,44	Spongia ardens accitatur erupitundus sanguinis	114,4,5	Spongia ista facilis	libid. 14	Spongiam lapideam vis	115,8	Spongiae salis facultas	114,3,48	Sputa in pleurinde que sunt miora, et que magis extenua	613,11.	Viri-	orum subsidentis sunt persimilia	629,24	Sputa inspicienda in pleurinde	614,30	Sputi pessimi signa	711,11	Sputi colorum auriarum in pleurinde ra-	tio	27,19	Sputorum colores quid ostendant	655,20	Sputum concoctum morbum facit brevis-	sim	623,12	Sputum crudum morbi ostendit languidi-	nem	libid. 14	Sputum non durum duplex	libid. 8	Sputi pleurisorum species diversae	715,26	Sputum praecon malignumq; periculum atq; pernecium inducit	613,15	¶ S Q V A M A E atus & semivires	1112,58	Squamae omnes sunt mordaces	1123,4	Squamae appositiones	264,45	¶ S T A C H Y S quam vim habeat	1107,57	Staphis agria colligat carne	3048,15	Staphyle quid	1216,31	Staphylia facultas	2076,60	Staphylomata	709,61	Stare bonum possunt doctus nuntius pe-	ditus, et moriri non item	210,65	Stetioni ferme, cecipios & oblongos pe-	des esse apppositos	21120	statio motus est	711,5	status morbi	717,9	status morbi cognoscendus aq; praeo-	gnoscendus	614-615-640,43	status morbi, autem crisi est regula	640,39	status temporis elapso, paulatim morbi solventur, amittit est periculum	libid.	43	status tempus in pleurinde quando ion adeffe significatur	619,17	status ubi curatissima totius morbi pars	624,40	Statema quid	707,649,40	stelles in magnis solis defectibus additur ex profundissimis putis	267,8	stellis visus a scorpionibus, eos perimit	1275,13	Stercoris confertur & citranorum melle mixtus	115,17	Stercoris bubuli vis	112,61.	1274,31.	Caprilli	112,27.	Callinacti	112,2.	Ovilli	libid. 5.	Canini	112,1.	Colubini	112,11	stercus celumorum inflammari potest	56,64.	Crocodylonum & sterno-	rum quibus afflicti sunt confertur	213,3.	45	Stercus bubulorum sicut gutturi poligono nat	112,11.	Luporum quibus con-	ferretur	libid. 14	Stercus murum aleprieis curat	113,42	Stercus nullum nec refrigerat, nec dume-	fit	113,52	Steriles ac melle frequenter sunt spiritus interceptione laborant	505,49	Sterilitatem quid inducat	1100,65	Sternuamenta accitatur graecum	150,55.	Quae sunt	150,56	Sternuamenti casu ubi consistit	682,54	Sternuamentum quid dicitur validius a pe-	ditur in passis humoris eculis	679,14	Sternutatio	libid. 1.	Vit ad solen, & quare	110,62.	Interdum ex acciden-	ti conducti carentissimi pe doris edu-	cerent, purgati venarum & gulan	681,57	Sternutatione interdum expulsa ea que reu-	ci per tusion non poterant	611,6	Sternutationem quid promouet	1074,55.	1107,17	Sternutationis spes	1015,10.	Eius stilus	151,1	Sternutatio plurimum inat caput, visio ob defillationem accidit	679,23	Sternutatoria mitigatiorum ademptiones leniuntur	1107,4- & 13	Stercoris quomodo accidat	1000,10	Stibij facultas	1220,3	Stimuli cibus sit facilitatis	1125,17	Stipentia cuius que sunt	890,61	stipatio duplex	897,24-905,45	stipatio in febribus usorum unde con-	tingat	

tingit	916,4	quid inducit	689,30	Non admittunt uera sectionem, quia	
stuporem que excitant	905,11	Surgimenta hancorum quam uim habent		caerent robore	993,18
stuporem carnis	916,19	1076,	11	succi plantarum omnibus duplex excitamen inest	1015,47
Suppes à nature gubernatur	73,28	Stroma quando fuit	949,16	succi mixti in uentriculo cellulis que	
Suppes duplici de causa corrumpitur		stroma et choras	709,23	conferant	1301,52
954,3. Habent congruentiam sensum, et per eam sunt quatuor facultates naturales	90,15.	stroma quid	914,43	succi autiosi ad gignendum materiam magnam	
Placitum accendit libid. 46.		stromas quid distat	1089,14	bebent uim	404,40. 684,52
modo gignuntur	337,59	Strutium quam habeat uim	1108,15	succorum calfacientium differentia	1164,
Suppes inesse solum appetitum uim,		Stultitie causa	683,2. 715,64	13	
ut Plato	337,23	Stultitia quid	718,11. 739,13	succorum proprietates quando emendatur	1044,17
Suppes inest anima vegetatrix	73,29	Supperacientibus miscetur calfacientia, ut eorum malignitatem corrigit, rorantque uires deducunt	1252,2	succorum quoniam plus minusus reperiuntur	1333,15
Starchen conducere ad alterum concessio- nem uisionem	1120,61. 1281,11	Suppidus frigiditas efficit	711,43. 730,35	succi acres que gignunt	906,18
Starchen quam habeat uim	1108,5	35		succi carni cumque harentes inapportant	469,
Starchen de anima opima	70,37	Saporis diffusio quales	731,14	succi carni cumque harentes inapportant	469,
Stomachica Asclepiadis	1250,17	supor medius dolorum soluit	739,33	succi frigidos, sapor: calidos, niglicis gignunt	458,54
Stomachica debent habere astringentia uim		supor omnibus accedere partibus potest		succi frigidos subesse quis pulsus indicat	928,6
prope allentum	1133,57	libid.	63	succi lentos et crasses quid fecit et exierunt	1123,32
Stomachica Galli	1250,19	supor quid	1060,49. Quo fuit modo	succum melancholicum purgatia	948,2.
Stomachica Aster ditionem Asclepiadis, inextinguibile	1152,13	677,21. Quos infest		Que gignunt	7031,6
Stomachica	117,19	730,	54	succi appositus alicui parti, non reuertitur ab alia	88,15
Stomachica acerbissima conficiendi ratio	1235,14	Stoma aluntur elata	350,13	succi acri	11,6
Stomachica inflammationibus induratis apta	libid. 11	Stomachica differentia	1189,19. Eius facultas	succi carniis potius seruiscit ut mignum	1044,
Stomachica diuinem compositione apta omnibus est	1232,24	1108,20. 1205,28		succi Cyreniacus	1076,37.
Stomachica ex misto compositione	1233,59	SVBLATIO morbi sui per contraria	915,15	Vitrem	458,13
Stomachica ex succo maris quod duplex est positio	1232,10	Substantia acria mista est per omnia sanguini	781,11	Sulores arctici quando soli sunt expellendi	643,53.
Stomachica ex succo maris uindictam ad omnia inflammationes conuenientissima, compositio	1231,60	Substantia cerebri, neruorum et spiritus medulle, eadem	124,49	Robustes uires indicant	691,22.
Stomachica ad omnia oris uicia	1234,	Substantia cunctis rei ad qualitates primas constituitur	37,61	Frigiditas quid significat	630,3.
55		Substantia mobilis, quies est mors	714,10	Omnibus scribitur sunt proprii	638,54.
Stomachica Andromachi ex bessa, arginis et agrorum	libid. 19	Substantia generum omnium supereminet	41,	Quos dissolunt afflicti libid. 58.	
Stomachica Andromachi ex misto	libid.	Substantia partium desitit aut mutatur	125,	Retinent odorem et colorem rios, quem purgant, humores	691,27
24		Substantia portis quid inducit	38,5	Suloris color à succo proficiscitur, non à solidis animalis partibus	457,59
Stomachica Asclepiadis	libid. 63	Substantia quid	356,38. Quotuplex dicatur	Suloris materia et generationis modus	1130,
Stomachica ex naciis deaurandis non est	1233,8	Substantia quot additionibus lat facultatibus praedita	68,53	41	
Stomachica ex punicorum succo	1232,	Succosus ad id quod uacuat quomodo fiat	84,59	Suloris non nimis fluxus non suppressit	691,29
66		Succi alij ascensum aut contrahunt: solum autem oleum, mel et uinum, in longum durant tempus	1014,9	Sulor	714,45
Stomachica ex succo nucum, ceteris omnibus praefata	libid. 18	Succi et quibus causis utropelluntur	457,	Sulor fuliginosus	1110,51
Stomachica Sorori ad satientes gingiuas et humore praegruentes	1235,61	43		Sulor succorum uisum corporis notat	417,
Strabismus	1210,19	Succi à quibus deducuntur per corpus	1036,	21	
Stranguria quando uisus est symptomata, uel eius affectus existit	772,37.	Succi et afflu attendendi antequam euacuetur	18	Suffocantur animalia ob qualitatis penam	415,12
7		286,57. 1002,11		Suffocantur merula exspirato	414,58
Stranguria quibus de causis fuit	690,63	Succi crudi quando deliquit animi aut finem copiam habuerunt	930,26. Quando uacuant et quando minime	Suffocantur quid	632,12.
Stranguria quae sunt	1098,64	43		Suffocantur laborantes, quid et cernere possunt	345,12
Stranguria cuius sit facultas	1108,21	Succi Cyreniaci uis	1099,19	Suffocantur incipientem quid perferant	123,
Stranguria à fluxu profusum et auctorem et, qui fluxus ipse magis trahit: interfluit per uicem: per uicem, qui magis uisus est effluere descendere	690,16	Succi dulcis facultas	383,61	41	
Stranguria marumillis puris stridentibus		Succi omnes, praeter sanguinem sunt et immoderato calore	79,16	Suffocantur gigni inter crystallum et corneum	1631,4.
		Succi pingues et asperata leniunt	673,12	Quomodo differat à uisum et à oculis à uentriculo calens	749,8
		Succi crudi reserui, ut tenuissimum uisum rationem perferant	459,39.	Suffocantur curanda quae notiones sunt necessariae	32,2.

367, 30  
 suffusio purgandorum 367,  
 55  
 suffusio: quoniam possint usum recipere 668,61  
 suffusio: remedia 1110,55  
 suffusio: vel hypopion quid sit 1223,  
 54. Curatio libi,60  
 suffusio: remedia Heri 1224,  
 41  
 suffusio: pharma ab Arubigene  
 prodita libi, 12  
 Sulfuris vis 1121,47  
 Suis ex parte partes epileptici consensu  
 1007, 4  
 Sumptionem differre: quoniam 355,12  
 Superflua ambigua causae: asium qui  
 bus coherent 198,86  
 Supercilia: si frons unde notantur pro  
 pugnis accipiant 161,45  
 Superciliorum usus 168,51  
 Superfluitas: causae: partis, illius: proprii  
 dissimularem indicat 621,52  
 Superfluitas: morbus: et aeris quibus est  
 fluit 78,33  
 Supernus: una: expellitur: semper: a suis  
 quibus ad imbecillitates pertinet  
 91,41 35  
 Suppuratio: quid, 1052,31. Quando  
 accidit 575,6. In abscessibus  
 quae ipsam prohibent 99,7  
 Quando et quibus medicamentis me  
 landa 1115,11  
 Suppurati: qui dicuntur 575,14  
 Sura: quae uocantur 118,16  
 Sura: tota: carnea 131,62  
 Surditas: contrarius praesidium opus ha  
 bere, his qui auron doloribus infestati  
 1111,57  
 Surditatis remedia ab Arubigene consen  
 sita 121,14  
 Suis: sunt: asperere: quid 110,37  
 Suis: magnus: epiglottis: ad anastomosis  
 riuolum: et: anastomosis 187,61  
 Sufpirantes: ex: iudicio: post: longum: tem  
 pus: suspirantem: magnam: efficiant  
 500, 14  
 Sutura: coronalis: per: medium: anteriorem  
 uentris: uentrem: cerebri: firmat: transfor  
 sa 160,16  
 Sutura: capitis: quae 132,46  
 Sutura: cerebri: tres 164,21  
 Sutura: a Libodides 259,58  
 Sutura: in: qua: capitis: perit 164,17  
 Sutura: media: quae 112,16  
 Sutura: per: caput: longitudinem: semper  
 feruatur 112,40  
 Sutura: quid libi, 2. Relia 160,35  
 Sutura: et: quid: quid: esse: desiderant  
 218, 11  
 SYCUMORVM substantia: et: sa  
 casitas 386,17  
 Sympliciorum: quorundam: fraudulentum  
 mares 581,21  
 Sydera: praedicta: esse: summe: intelligentia

70,  
 Symmetria: omnis: dupli: ratione: dicitur  
 430,  
 Symmetria: quid: dicitur 1064,11  
 Symphysis: quid 131,41  
 Symphysis: dupliciter: differt 126,6  
 Symphysis: magni: uti 1108,61. Primi  
 facultas libi, 30  
 Symptoma: duplex 844,21. Apisio  
 ne: et: morbo: quid: differt 665,3  
 Symptoma: largus: sumptum: quid 665,11  
 Proprie: dictum: triplex: est libi, 16  
 Symptoma: sequitur: morbum libi, 1  
 Symptoma: symptoma: succedit 667,11  
 Symptomata: ex: se, nec: curationis: ratio  
 nem: inducunt, nec: praecursum: inducunt  
 925, 47  
 Symptomata: quae: se: morbo: ac: necessa  
 rio: sequuntur, et: quae: non 697,61  
 Symptomata: quae: dicuntur 668,3  
 Symptomata: subiacere: negleto: morbo  
 quando: cognoscitur 925,56  
 Symptomatum: cronicorum: duplex: natura  
 621, 19. et 22  
 Symptomatum: differre: tres 165,15  
 699,39. 925,36  
 Symptomatum: in: corporum: effectibus: et  
 effectibus: differre: prima: quadra  
 plex 667,13  
 Symptomatum: in: universis: affectionibus: tria  
 reperiuntur: genera 614,43  
 Symptoma: quae: notat: Hippoc. 752,13  
 Symptoma: quid 971,31  
 Symptoma: 131,52. Eius: triplex: species  
 131, 1  
 Symptoma: nihil: in: corpore 118,11  
 Synchondrosis 131,9  
 Synchondrosis: ossa: quadrilatera libi, 61  
 Syncope: stomachica: quomodo: uires: exol  
 uat 764,19  
 Syncope: quid 691,10. Duplex: est  
 759, 47  
 Syncope: laborantibus: omnibus: quae: me  
 num: sit: exhibendum 912,16  
 Syncope: praecipit: est: uires: lapsus 929,  
 15. Quibus: succedat: casus 931,17  
 Syncope: ab: ere: uentris: arie: curatio  
 930,19. A: cruditatis 928,24  
 Syncope: 112,10  
 Synochi: generatio 802,14  
 Synochi: quando: oritur 899,12  
 Synochi: uires: sunt: tempus: est: uires: ac  
 cibus 791,11. 802,10  
 Synochi: tres: differe: 791,16  
 Curatio 915,11  
 Synochi: non: incidit: in: imbecillitas: uires  
 920, 41  
 Syntaxis 132,10  
 Syntaxis: reperi: quae: effluuium: prop  
 riorum: respondet 509,31  
 Syntaxis: naturalis: est: relaxatio: alimen  
 ti 509, 21  
 T  
 TABES: cor: quibus: de: causis: possit  
 corripi 789,55

Tabes 663,11  
 Tabes: cum: composita: quae 803,5  
 Tabes: quibus: supponitur: et: si: uires: libi,  
 11,79,54. Exposita: quando: di  
 citur 787,59. Incubitus: quae: 1  
 sit 860,17. Non: fa: si: uires: non: uires  
 principia: affert 801,18  
 Tabes: omnes: quae: modo: sunt: curandae  
 806, 10  
 Tabes: qui: sit: morbus, et: unde: gignatur  
 479,70,118,21. Quorum: affertus  
 dicitur 801,58. Simplex: quae 801,  
 2. Quibus: de: causis: accidit libi, 8.  
 Synochi: quando: accidit 806,17.  
 Vires: ex: ea: quae: partes: omnes: ac  
 cipit 805,62  
 Tabes: partes: quibus: alimenta: possit  
 lent 108,19  
 Tabes: et: putridum: ex: parte: fugiendi  
 781, 43  
 Tabes: arteriarum: optimam 1241,55  
 Tabes: terribis: causa 806,11. Quae: ra  
 tione: et: dissimulatur 808,15  
 Tabes: nostram: quae: moris: repellit  
 350, 19  
 Tabes: non: pssonum: ex: parte: in: hydro  
 pe: humore: ne: an: affertus: in: uires, re  
 grant: contrahit 551,18  
 Tabes: cognoscitur: quibus: quibus: est: libi,  
 118,21  
 Tabes: et: gustus: quibus: intercedentibus  
 sunt 147,12  
 Tabes: facit: omnium: crassissima 125,  
 50. Hominis: temperata: medius: est  
 omnium: temperatum 105,147  
 Index: est: duri: et: molli: 515,38  
 Index: moris: temperationem, sit: ac  
 quiescentem: quibus: experti  
 651,101,11. Omnes: sensus  
 est: moris: sensus 665,56. 671,  
 5. Per: motum: uires: sit: ex: quibus  
 111,47. Partis: ma  
 gis: quibus: agit 671,13. Multis: gra  
 uis: affertus: quibus: reliqui: sensus  
 665,49. Solus: est: calidiorum: est  
 index 46,58  
 Talcum: oculi: in: oculi: imperfectum  
 198,7. Propter: imbecillitatem: natu  
 ra: non: erumpit 119,32  
 Talcum: quid: et: ubi 138,17-211,18  
 Tamaris: facit 109,7,20  
 Tangere: aut: in: motu: a: quo: tendit: sit  
 103, 27  
 Tangere: arteriam, al: dicitur: arteriam: pul  
 sationem: quae: sunt: sunt: perpendiculari  
 517, 28  
 Tarditas: et: uires: ab: anni: motu: in  
 separabilia 502,11  
 Tarsi: ossa: tria 211,59  
 Tarsi: 140,2. 160,14  
 Tarsi: et: quibus: in: corpore 111,21. Pro  
 portione: respondet: campo 112,19  
 Tarsi: et: uires: uires 110,5,1  
 Tarsi: et: uires 110,5,1  
 Tarsi: et: uires 110,5,1  
 Tarsi: et: uires 110,5,1

I N D E X.

Telluriorum fulsorum istarum facultas 114,1, 59  
Temperamenta aëritia, pulvis et aeris  
nata mutant 571,19  
temperamenta complent particulari sub  
stantiam 196,57  
temperamenta corporis, anime motui ut  
rioni, illamq. excludunt 70,3  
temperamenta hominum et ciborum con  
sideranda 370,2  
temperamenta inculcata, similia possu  
lunt 895,14  
temperamenta non indefinita ex natura  
exteriorum indicanda 55,11  
temperamenta fructus similibus, alie  
ratur comaritis 474,60  
temperamenta varia quædam similia, et  
quædam contraria requirunt 895,55  
temperamenti calidi et humidus indicia  
814,31. Calidi et siccus indicia ibi.  
25. 890,1. Calidioris indicia 824,5  
Calidi triplex differentia 473,18.  
Frigidi et humidus indicia 824,50.  
31. 49. Frigidi indicia 124,14. Hu  
midus indicia ibi. 12. Moderati indicia  
66,52. 117,61. Siccus indicia  
824,19  
in Temperamentis indicandi spectanda  
mutationes, ex quibus in quæ sunt  
55  
temperamentis calidioribus absq. excessu bu  
miditatis aut siccitatis, quæ adhiat  
473  
temperamentis calido absq. humidus et  
siccitatis excessu, quantum vini effici  
dunt 474,55  
temperamentis calido et siccis præditi  
tardus mollioribus, exercitiis omnibus ex  
ercendi 474,13. Quod si minus ratio  
conveniat 473,12  
temperamentorum collationes diversæ  
414,7. Differentie namque 41,43  
Frigidorum differentie tres 476,1  
temperamentorum indicia 825,4  
temperamentum calidum et humidum,  
quæ cura maxime debeat 475,19.  
Calidum et siccum, si per decessum  
a tempore in frigidum et siccum dela  
bitur, quæ sequatur 824,65  
temperamentum contrarium videtur ratione  
mutatis, custoditur autem simili 475,  
14. Sit per quatuor 90,6  
temperamentum frigidum et humidum  
quæ debeat utilis ratio 476,30.  
Frigidum in utroq. excessu se moderata  
re habens, quæ cura debeat ibi. 13.  
Homini quomodo considerandum  
510. Humidum licet in principio  
debetur, tempore tamen progressu  
fit alius melior 475,17. Modicum  
consistat ex duobus in medicis atque  
sanatari 850,14. Plantarum co  
gnoscitur essentia et gustu 390,14  
K calidior succus dum amovetur cal  
lor bonum in absenti 473,62. Succu

et frigidum quæ ratione sit calidior  
dum sunt et humidandum 476,7  
temperans quis 529,47  
temperantia naturales quo differunt a  
morbus 815,10  
temperata natura diuina omnium caus  
49  
temperatum rutilum, calidum et humidum  
41  
temperatura ad iustitiam 42,54  
temperatura calida quæ 45,51  
temperatura corporum tripliciter affe  
ctum 41,10. Frigida et siccus  
indicia 814,60. Partium, variationes  
affectionum notant 974,35  
temperies quæ sequatur 71,7  
temperie media prædictum, quomodo co  
gruat 1050,44  
temperie medium utriusq. extremis infir  
mitas 1017,11  
temperies aris possiones quæ 41,9  
temperies calida dicitur vel alia vel po  
tissime 44,1. Calida et siccus, hi su  
nt 50,19. Calida facit iracundus 75,  
10. Duplex est 914,60. Liberan  
tis, quid indicet ibi. 18. Necessario  
species sui forme est 60,21. Non  
temperata quæ 45,50. Optima cor  
pori in adolescentia accedit 475,17  
Optima semper servanda 914,17.  
Optima unde conciliatur 68,28.  
Proba consistit ad anime virtutem  
68,11. Siccus corpulenta 476,4.  
Singularum partium, ex earum fun  
ctionibus perscrutanda 51,62. Tempe  
rata quæ 45,14  
tempera aculiorum morborumq. non ca  
dem 101,12  
tempera generationis fortium quatuor  
quæ 109,58. et 60, 110,  
2. et 6  
temperantia masculinorum usus 161,50  
tempera morbi non dicunt numero de  
finiuntur 621,14  
tempera morbi itaque sunt quatuor  
ibid. 8  
tempera morborum, 1. Ab animalium  
arise quomodo differunt 716,27  
tempera morborum ac remedium vel  
ipso distinguuntur 18,35  
tempera morborum, differentiam reme  
diorum non indicant 40,12  
tempera, quod a facultate requiritur, in  
terius et exterioribus 17,35  
tempera tria circa nutrimentum concordi  
nem distributionemq. 87,16  
temperibus singulis qui ibi conveniunt  
375, 15  
temperi parendum 809,19  
temperum differentia apud medicos du  
plex 18,1  
temperum mixtum 94,14. 176,7  
temperum ortus 617,45  
temperum differentia nec quantitate nec qua  
litate indicat 29,48

temperum a primo conceptu quatuor 12,4,  
11  
temperum morborum comparatur arisi a  
nimatum 716,18  
Tendens hanc sine periculo conservare  
116,4  
tendens inquantis digitis 152,60  
tendens atq. nervorum effectus a quod  
periculosi sunt, eandemq. tendens ra  
tionem desiderant 116,4, 41  
tendens capite 151,13  
tendens videtur nutrimentum 153,6  
Tendo 21,16  
tendo in calcaneum inferius ex duobus a  
liis tendentibus consistit 114,19. Ne  
mon superet quibusdam in locis tras  
formatione principalis et decalpa 91  
21  
tendo non omnis sensus experti ibidem  
15  
tendens cur infirmi membranis atque re  
tenti 199,47  
tendens digitorum unde oriantur 101,  
27. Extendunt et fluctuant corpus  
207,2. Inducunt quæ ratione currentur  
945,18. Movetur digitorum pro  
cedunt a cubiti musculis 199,28. Ner  
vosa corpora sunt 731,44  
tendens generatio et usus 93,33.  
199,51. 104,41. 181,10. 874,  
25. In articulis digitorum inferius  
ratio 100,59. Latratorum conside  
ratio 104,57. Movetur digitorum pe  
dem duo tendens generis prædicantur  
a musculis ibi 151,14  
tendens natura media est inter ligemen  
tum et nervum 92,3  
tendens, qui inferuntur pedibus, impli  
cationes 111,13  
tendo omnis in os inferuntur 91,53. Pri  
mum motus instrumentum 181,11  
Tento dicitur nervus, quomodo mollior  
ligamentum 91,8  
Tentibus perterrefaciunt 681,31  
tentibus utrumq. accrescere 16,41  
Tentis et incrementa omnia, sagitta  
libus sunt moderata 414,19  
Tentis contritus repleti 914  
tentis duplex omnibus inest musculari  
101, 65  
tentis et contritus unde fuit 534,17  
tentis utrumque quibus de causis contin  
gat 716,5  
tentis causæ 677,14. 699,8. et 31.  
1056, 61  
tentis quid indicet 699,46  
tentis quid vocetur ibid. 5  
Tentis facili et aëro atque melle in  
tenduntur, remittuntur melle oleo 414,  
51  
tentis facili alterius crasso 78,16  
tentis omne, crassum obstruat superet  
671, 60  
tentis, sive in coarctationem tertium 180,  
47

terris fauile digni	463,19	bus promouetur	963,16. Vitis	14.	paris quibus fuerit applicata	971,61
terris non omnia sunt ignis	1017,53.	no conueniens	Ibid.	14	¶ I HENAR	100,19
Prompte ualiditate atq; refrigeran-		Tisile ut	1114,47		Theorema quid dicatur	10,61
tur 1016,31. Quando misenda e-		Tisilata duae carnis quibus consistit	402,	15	theorema aene ad propolis res spirit	10,11
fringentes	913,63	testaceorum succi crassi	406,48		referendum 10,11. Arterum su-	
temon ac crassiori partem que di-		testaceorum succi alium subdunt	403,	2	mon, perperam, utroq; in le. con-	
cantur	101,59. 1040,43	testi cetorum succis omnis alium deicit	406,		sententia esse debet	9,47. 11,1
temon partem tenui prompte d'ra-		Ibid.	101,13		theorema artis punctionis	31,58. 10,60
tor	611,4	testis alterius totum corpus	113,15		quibus consistit	10,60
Tempid si admouetur, dissolutio uer-		Aritius mali sunt succi	94,14		Theorica adnota uideri, articulo non	
trici formidinem	893,87	ne uicinis primum sunt	113,14		ita canis rubidi	117,61
Terridile usum in fratribus capiti. G le-		Cui crurum tot corpore formis	104,60		theorica Andromachi ceteris praefata	117,61
nus dicitur	873,13	qualitatem commouetur	Ibid 50.		117,61	
Terridile sua dicit	1109,13	Formarum carnis sicut	104,60		theorica cuius ignis purgatorius	117,61
terridibina resina	1151,19	Gallinae tenui uitis non compit	417,		theorica Eudocimae	1116,35
terridibina solut alium abstrigat. in-		417, 2. Gallinae praeferat	417,		theorica constitutur phamacorum	
fera	400,15	p. n. l. adhibet obliquum	194,19.		quodam uero per tota misetur,	
terridibina faculas	1176,41.	398, 19. 407,16. Inflammati cur pla-			conspicuit in naturalis uandem	
1156,	35	tu febris accendunt	604,3.		commouetur, omniis incipit	
terridibina praetegit	1166,1	Ma-			115,	56
Terminus factum prout temporis quis		ruum humores sunt ac meliores se-			theorica duodecim annis ad profectum	
1111,	14	mutis	104,60.		conuolui, effig ualidum est ad	
terminus terronae expositio longissima,		ficat cordi	113,9. Semen confusum		triginta annos, inuicem, fraxigera	
sepi abiotur crumibus	610,10	Ibid. 45			117,61	51
Terra accessu sui prout	1040,10.	194,14. Trahus sicutum hemo-			theorica reponendi ratio	Ibid. 19
55,	64	tem 114,1. Varis mulierib. cur se-			theorica perfecti phamacorum purgen-	
terra Ampelites	1117,3	men exaltat obliquum	104,19.		ti operationem supponit	1170,14
terrae Caliae & Criticae faculas		testiculi canis faculas	1099,44		theorica Arty	1116,35
Ibid.	8	testiculi formuarum quales	145,63.		theorica corporis & anni affectus ad	
terrae Chie uis	1115,38	198,	52		uideri	117,13
terrae Comolae uis	Ibid. 18	testis masculini salubres formis	168,		theorica elephantitis confici. consilia	
terrae differentie	1114,63	168,	58		117,13	984,11
terrae Terrae uis faculas	1117,12	testiculorum arteria	313,11. Calidum		theorica in quatuor principio rubidum,	
terrae uisile est ut superariu corpori		& siccum indicia	811,31. Flexus		quid melle	961,35
111,	51	corum uariiformes	159,10. Formi-		theorica, Mudridium ab uis capite	
terrae institionis uis	1117,14	neorum positio	104,52. 104,3.		1180,	18
terra climata uis quodam esse dicit		301,61. Prudente	104,60. Eorum		theoricae possit crudes facies mouit,	
55,	34	temperatae que significant	813,		concoquere autem aut desuper pre-	
terrae pastus uisae differentie compo-		14.			dictum melle	646,31
rit	1115,10	testis deuter masculis, sinister potius			theorica praeterea corpora dissoluit	
terrae Pignis faculas	1117,11	formis signis	115,43		117,61	46
terrae Sclausis uis	1116,18	testis sinister in uis, & matris fini-			theorica quibus affectibus conuenit	
terrae purgandae ratio	1115,80	stra in formis, recipi imperisum	190,15		911,18. 117,16. 117,61	117,61
terra igni admoti non solent	1115,55	Testis ablati in formis periculis,			theorica anodi secundum Androm-	
terrae abluendi ratio	1115,59	& quae 11160. Calidum & hu-			achem compositio	117,61.
terra quae uis faculas uis possidet	1115,4	modum indicia	121,12. Eorum cor-		117,61. Eius opporiet uis Gale-	
terra Sumia	1116,2	pus nutrit ab humore seroso, quae			nus a quatuor triplici Eudemon	
Terris quae sunt temon partium		conuenit	113,40. Formarum ac		berani	64-110. Vitis probanda
1161,	18	uicium discrimen	104,54. Form-		1176,55. Proprietas quodam	
Terrena ab ardente continuo quomodo		arum uis	Ibid 61. Frigidum et		117,61. Quodammodo faculas	
dissert	714,51	Frigidum et	104,40. Frigi-		80,18. Eius uis quibus et alius	
terrena causa	791,7	dorum & siccum indicia	82,11. 8.		& temporibus congrua, & quibus	
terrena expositio uisile, duodecim ad		Eorum ius diuersi	115,30		minis	117,61
saecum dicitur compellat	960,	Terrena quae	710,18. Quando sunt		theorica utrum post absolutum totum	
44. Coratio	961,2	961,	11		nem	Ibid 14.
terrena neque curatio	Ibid 61	Tetracharmis uis	869,1. Ex quibus co-		theorici artificum preparatio	117,
terrena ex interuentibus diuersis		116,16	116,16		Theriac inflammati, quae sicutum	
misimam	960,11	Tetracharmis	1109,49		110	975,15
terrena exposita quae 791,7. Quando		Theriac faculas	1061,37		theorica capacitas in diuersa faculas	
haderne	900,16	Thapsia bimula eripat praefata	1161,37		116,5.	
terrena duas copulatas inuadere singu-		Thapsia faculas	654,21. 1081,41		Dolens quibus resistent	
lis dicitur	610,14	1189,55. Sengenem attrahit ad			760,16. In sterilitate eius quod sibi	
terrena exposita quae uisile ratio con-					notum propolis super	191,14
ueniat	901,48				theorici	
terrena uisile conferri uisum post d-						



## I N D E X.

- thoracis interperies, timoreque qua  
 lem pulsus alterationem inducant  
 601,36. Eius laetudo caliditatis in-  
 dicatione 820,51. Morbum eius co-  
 gnatio 827,12. Mentes ab aëre  
 245,60. Musculi 322,99. A qui  
 bus urinis dicitur 146,3. Ovisum eius  
 consilietur 135,61. Partes eius in-  
 flammatae expurgantur per aspira-  
 tionem 735,33. Situs 219,13.  
 820,59. Vfus 461,50. Virg. eius  
 uicinis confusio, perit & uix & re-  
 spiratio 323,42  
**Thorax** cui ex aëritu simul & musculis  
 constat 149,35. Cui in duas partes  
 distinctus 232,34. Ductum constat  
 ueribus 292,21  
**Thorax** necessarius uoci atq; respiratio-  
 ni ibid. 11. Principalissimum respira-  
 tionis organum 109,56,293,44  
 760, 11  
**Thorax** quid 186,41. 231,40. Est  
 uicinis mentis cordi et pulmonis 232,23  
**Thorax** lapideus aëres 219,15  
**Thorax** salsifusius melioris reuerbus  
 404, 30  
**Thorax** cortex asringit et succat 936,4  
**Thorax** cortex & mamma 1220,32  
**Thorax** facultates 151,20. 109,3,20.  
 156,14. 1176,32. 218,39  
**Thorax** carum gignit 112,46. Dolorem  
 lenis, concipiat 1219,43. Pari mo-  
 uendo quatenus uideretur 955,63  
**Thybens** quos habet uires 1118,16  
**Thymus** 143,21,233,2. 709,58  
 Eius facultas 101,13  
**Thymia** 212,60  
**thibis** anterioris musculi sunt sex qui se-  
 ptum 214,47  
**thibis** consuetudo 134,33  
**thibis** musculi exterioris tres 159,46.  
 Nervi 166,39. Posterioris parit  
 sex muscoli 214,45  
**thibis** simulata 211,11  
**thibis** uelocem tendentem infans capite  
 214, 5  
**thibis** minor feruore, & quare 216,7  
**Thymus** alium siliu, & crudas huius  
 res gignit 37,12  
**Tumor** affectus in uicinis contrarius est  
 560, 9  
**tumor** diuturnus, corpus refrigerat 522,  
 35 611,55. Inuicem autem a tristitia non  
 differt 973,20. Subitus quando  
 peruenit 624,7. Vehemens quia ra-  
 tionem pulsus iniquitatem efficit 560,  
 15  
**Tumescit** descriptio 769,48. Eius ortus  
 690, 23  
**Tuberculi** uires 110,17  
**tuberculum** genera septem ibid. 36.  
 Quibus affectibus medentur ibi. 25  
**Tigna** fabula 144,43. 127,58.  
 721, 24  
**TORORVM** generatio unde, &  
 quare incurabiles 1161,3  
**Tonsillae** 709,52  
**tonsillarum** inflammationum curatio scilicet  
 dum Arctogenem 1217,31  
**tonsillae** inflammatae, uires sub lingua, uel  
 uicinis angulis uiderentur quando inci-  
 dendae ibid. 64.  
**Torpidus** arthriticonum quid disciat  
 1119, 2  
**Torcular** 259,65  
**Terminis** facit, adularum contrarius fa-  
 cultatibus inter se pugnantibus  
 363, 58  
**Terpedinis** marinis uires 1141,65,486,  
 44. Piscis uires non reddit terpi-  
 dum per medium tridentem 775,33  
**terpido**, pestifera, aëris 402,44  
**terpor** quibus de casu orti solet  
 671,9. 918,15  
**Tragacanthae** quon facultatem habet  
 1110, 44  
**Tragis** uires ibid. 41  
**Trigon** quibus affectibus medentur  
 ibid. 51  
**Trigonum** uires 1099,11  
**Tragus** 405,50  
**tragus** quemodo praeparatur 174,10  
**Trabens** aëris, expeditus ex diuersis op-  
 positus trahit 227,14  
**trabenna** omnia, calida sunt necesse est  
 1060, 11  
**Trabes** totum ex toto 86,14  
**trahit** quod est aduentus, euacuaturq; in  
 breuibus ibid. 62  
**Translucida** quae figura facilius fiat  
 7631, 19  
**Transitus** ad similia 6,14  
**Transuolens** materiam quid requiritur  
 217, 46  
**transmutatio** semper fit in alteru 14,17  
**Transmutatio** fit per aëritas, carumq; mo-  
 tum 757,10. 774,37  
**transpirationes** unde prohibentur  
 916, 2  
**Tridantem** duas genera 25,53  
**Tridentem** mulierem ob purgamenta  
 pari partem retenta, scilicet in mallo-  
 lo aëris curant Hippocrates 721,33  
**trement** cui serici uicinis; interperien-  
 tes caripianur 677,54  
**trement** quid, & quemodo fiat 677,  
 14. & 41. 710,20. & 64,  
 711,17. 712,54  
**trementis** cause diuersae 712,25  
**Tribulus** 1110,61  
**Trichomanes** cuius fit facultas 1111,9  
**Trisoli** facultas 1094,27  
**trisoli** odoratus uires 1095,53  
**trisolum** affligit partes sanas 1272,6  
**Triphylli** uires 110515,1111,5  
**Tripholi** facultas ibid. 2  
**Trisibus** inter conuersionis uideri modus  
 573, 10  
**Trisition** quae signa arguent 637,2  
**tristitia** quid 331,23. Quon malitiam  
 fortiter 682,4. Refrigerat 573,16  
**Tristis** differentiae 370,60. 415,19  
**tristis** elix inuicem 371,54. 415,  
 25  
**tristis** facultas 1103,49. Eius facies  
 415, 23  
**tristitiam** mansum seruantes quae electri-  
 citate conuoluit 84,22. 1103,23  
**tristitiam** aëris habet trabendi humorem si-  
 bi uicinis 765,15  
**Trochenteris** 118,18  
**TVBIL** 407,1  
**ubera** quon habent facultatem 391,  
 28  
**tuberculum** 709,44  
**Tuber** terrae quon aëris habet 1111,43  
**Tumor** corporis non semper signum ple-  
 thorae 700,13  
**tumores** compositi 1203,43. Similes con-  
 inasquali interperie 65,46. Prae-  
 ter naturam coarctantes septum trans-  
 uersum, parum, uelocem & densum  
 faciunt spiritum 491,57. 949,61.  
 Pro humorum effluuium differen-  
 tibus uariantur 662,42  
**tumor** fuscus a uicis quemodo differt,  
 & quibus medicamentis possidet  
 1815, 13  
**tumoribus** gutturis quae conferant  
 1076, 43  
**tumoris** color, causam ipsius declarat  
 947,19. Flammam curatio 977,  
 54. In scirrhum abeuntis curatio  
 979,36. Suppurati curatio ibid.  
 51  
**tumorum** causa, tumorem esse efficit  
 636, 43  
**tumorum** praeter naturam uarietas unde  
 nascitur 914,17  
**Tunica** amphibiastrides 146,48  
**tunica** eadem uisumque gola, pharynx,  
 larynx, & interna offensa arrius  
 1240, 44  
**tunica** inflammationum hepatis purgata  
 tum externe & interne quales  
 229,18. Molles quando sunt agiles  
 res ad motum, & quando tardiores  
 509, 59  
**tunicarum** in uicinis in pulmone terna-  
 tio quare 215,18  
**tunica** uicinis, gola, & emoluit quae  
 in ore sunt, cui sita continua 219,  
 33. Quae fibrae illis affligit 219,43  
**Tumba** humorum caliditas aëris 903,43  
**Turber** & torpido 417,1  
**turris** marinis uires 744,64  
**Tusti** inuicem accellunt 1026,10  
**Tustilaginis** uel uicinis caliditas uires  
 1074, 48  
**tusti** ex uicinis non necessariis sunt ma-  
 dula & aëris, sed contrā 1057  
**tusti** ex uicinis nec tamen optimi  
 1244, 22  
**tusti** quid accellunt 1074,48. 1108,  
 20

usli reiciendo, quoniam spiritum inter-  
cipiunt 679,13  
usli capiti nobil condici 679,13. Eius  
causa, & usli 681,32. 1035,22.  
Eius ut plurimum ratio 773. Ma-  
gnus, pauci capiti duobus de causis  
754,1. Naturae est symptoma 761,16.  
Ob refrigerata respirationis ar-  
guta, spiritus cohibetur prohibetur  
679,40. Quid sit ibid. 9. Quan-  
do exaltet 147,45. 151,64.  
Quoniam animi indit 761,35.  
Quos humores et perire facit ede-  
at 679,13  
Q TYPANITES 551,41-579,13  
13. Vniuersum corpus replet spiritus  
579,13  
TYPHA 574,30  
Typa compositio qui 810,28. Dupli-  
cationem adueniens qui sunt 812,30.  
Hysterici qui 810,16. Mobili ibid.  
13. Perueniens 810,31. Proxi-  
ferende ibid. 16. Proleptici ibid. 24.  
Quoniam accurate descripti 811,  
47. Quoniam omnia ceteris di-  
tarniores ibid. 54. Simpliciter qui  
810,27  
Typorum demeritorum proprium  
811,14  
typorum differentie 810,14  
typorum quatuor que consequuntur  
811,47. Quoniam quoniam que comitatur  
810,47. Tertium que sequitur  
ibid. 58  
typus accensionum quid ibid. 4  
typus febrium unde merendum 809,57  
typus demeritoris fieri, perueniens ut  
dicuntur portendens 811,5  
typus quartani duplex 812,37  
typus quartani quoniam 810,43  
typus quotidianus duplex 811,32  
typus quotidianus quartani iunctus  
ibid. 44  
typus quotidianus qui 810,19  
typus quotidianus tertiano & quartano  
iunctus 811,41-47  
typus quotidianus untriculo male affe-  
cto confectus 810,57  
typus tertianus duplex 811,34-58  
typus tertianus quartano iunctus ibid. 53  
typus tertianus qui 810,41  
Tyne Democratis vires & compositio  
1181,48

V

ACVANDI modus unde pe-  
tendus 917,49  
natura proxima sunt, qui ab us,  
que temperandi natura habent, ex-  
sperantur 1013,63  
naturandi qui sunt liberius, & qui por-  
tius 995,3  
naturandi qui sunt vere inuete, & quomodo  
1001,12  
naturandum corpus cur autem sit, quoniam ob-  
feruandis liberandum 891,25

naturandum in accensionibus per superio-  
ra: in remissionibus, per inferiora  
1003,14  
naturandum semper per communica-  
tiones 713,42  
naturantia que sunt 917,49-917,7  
naturae descriptio: capiti humores que  
commodi possunt 961,39  
naturae quando corpus conuenit 935,  
12  
naturari in quoniam modum singula partes  
debent 975,7  
naturatio sui per trahentia 30,30  
naturationem pueri a qui morbi possident  
1003,19  
naturationes copiosae qui ferant facili,  
qui diffusi 87,7  
naturationes fieri ob causas que illos pe-  
ficiunt 428,27. Immoderate quibus  
de causis succedunt 652,12  
naturationes immoderate quando et quo  
modo accidunt 1039,1  
naturationis modus quomodo a figura par-  
tis affesse sentitur 881,42. Eius  
qualitas ex quibus metienda sit 991,  
31  
naturationem modi diversi 1051,33  
naturatio optima que 28,51  
naturatio per frigiditatem solam, quibus et  
quomodo administranda 927,1 Per  
partem lesam non est melioranda, vi-  
uerso corpore pleno 836,46. Quoniam  
de sui in duas particulas dicit 996,  
24  
naturam nobil in erbe dicitur 535,7  
Valere & egrotare quando se dicit bo-  
nitas 842,13  
Vapor extenuatus est humor 671,14-  
1014,36  
Vires 709,35  
vires curandi ratio 943,46  
vires prius sentientes, quoniam vires ab eis  
fluctum recipiens 851,15. Quando  
sunt excludenda 117,120. Unde orien-  
tur 701,63  
Vari descriptio & curatio 665,5,  
1235,  
varium est quod praeter naturam existit  
489,47  
variorum callosorum remedium 1225,49  
variorum remedium Critonis ibid. 43  
Vasa confusiva corroborandi ratio 943,  
26  
vasa emulgentia 399,38  
vasa excludendi ratio 941,17  
vasa in renes inserta a magna vena et  
arteria 181,22. In testis delata 181,40  
Vas apertum ostium quod dupliciter posuit  
863,63  
vasa que dolorem admittunt, & que meli-  
us 1232,3  
vasa que intra matricem facta alendo gi-  
gnuntur 305,15  
vasa quibus modis disrumpi possunt 687,  
62. Quod dupliciter male affecta dican-  
tur

688,3  
vasa seminaria testibus habent vni generis  
de semen 111,56. Semper plena sunt  
ut sunt 114,37. Vitalem spiritum cum  
seroso humore rapiunt ibid. 9  
vasa spermatica dextra oriuntur a magna  
dextra vena & arteria, pars autem ab  
emulgentibus dextris 199,41. Sinis-  
tra a sinistris arteriis emulgentibus  
399,30  
vasa vixit quid 564,62  
vasorum generatio 127,3  
vasorum in testis implationes 303,18  
vasorum emissionem a corde professionem o-  
rificant quoniam membranas sunt insti-  
tae 136,42  
vasorum refectionis unde contingit 688,  
16. 1059,17  
vasorum secundae progressus 305,49  
vasa plenum aut vniuersum quomodo dicitur  
53,62  
Vasa quoniam sunt & dicuntur 661,4  
Vires duae ut matricis duae mulieribus  
infestae 297,38  
Virescentia emulsi conuersus, vniuersus ut  
generis, facultatis rebus, organorum pro-  
prium 491,12 (54)  
Vena a linne in uentriculo derivatur 80,  
143,11-183,25  
vena arteriosa 143,11-183,25  
vena arteriosa a dextro cordis styca ori-  
etur 236,12  
vena arteriosa duabus conuenit, hanc,  
ferre ad pulmones ex dextro cordis  
untriculo 181,18  
vena arteriosa membranas habet quod dicitur  
adueniens 236,19  
vena caua 176,17-199,14  
vena ab hepate origo 10915,123,24  
vena caua humerorum, origo ueniens per  
tionem inferiorem 145,40  
vena caua suggerit alimentum untriculo  
corpori 214,49. Truncus bifido est  
fontis 309,49. Vulnerata est diuisa  
sa, uixit sequitur mors 121,36  
vena confusa vna tantum boricis 181,18  
183,13  
urinae abesse arterias que sunt 148,44  
397,60  
urinae alentes matrem, naturamque eam  
colligunt feruor gratia confectae  
300,34  
urinae arteriosae membranas tres organum  
dicitur 237,15  
urinae arteriosae, tres adueniens mem-  
branas, inter fontis uergetis 336,38  
urinae a untriculo citum elaboratione su-  
gerunt hepati 277,45  
urinae cauae consideratio 141,5. Eius diuisio  
& processus 123,18-142,26.  
128,15-138,55. 319,15  
urinae cauae ductu ad cor sanguinem, tres  
infestae sunt foris membranas inter uer-  
gentes 217,28  
urinae cauae indumentum 222,31. Infestae  
in cordis uentriculum dextra 218,35  
179-

## I N D E X.

- Progressus ad superiora 335,5  
 uena cava secunda 335,4,2  
 uena cili promptissima 335,53  
 uena cor nutritrix unde 385,11  
 uena cruris interora insidentes 167,2  
 23  
 uena duc in totum motum propagat  
 ur 164,3  
 uena; habentes arterias adiacentes  
 14,1  
 uena hepatis omnium tenuissima 331,53  
 53  
 uena in cubito dext 996,41  
 uena in cubito cruris dissimulata 167,2  
 10  
 uena inflammata hepate que secunda  
 917,1  
 uena interstitionum uentriculique nutritri-  
 ce dicata 324,53  
 uena malleolarum & popliteum disse-  
 ctur, quibus efficitur puritas acciden-  
 tur 997,3  
 uena medie confederatio 164,4,2  
 uena mifericordie primam confusio fons  
 gignens 324,4,0  
 uena preperant alimendum eodem ma-  
 do, quo hepatis 327,52  
 uena que secunda 165,30  
 uena que ratione exaltius conficiuntur  
 164,55  
 uena quibus lute & quibus cinereo in-  
 firmitatibus 994,7  
 uena quibus nullis subest arteria 148,23  
 23  
 uena secunda ratio in diversorum par-  
 tium affibus 938,6  
 uena secunda ratio in fluxionibus que  
 descendunt ab extera arteria, thoraci-  
 ca, pulmonum, capiti & collum  
 121,46  
 uena felix que menses promouant  
 997,18  
 uena sectione indigent plerique, qui tamen  
 extra plenitudinem sunt 989,22  
 uena sectione perperam administrata,  
 plures priores 988,4,9  
 uena sub lingua secunda sunt gutture et  
 affera arteria inflammatis, post oper-  
 tam in cubito uenam 997,50  
 uena sunt conuulsi uentriculi & ueni  
 161  
 uena totius manus musculis penetrat  
 161,38  
 uena tunica multifarorum fibrarum  
 86,3  
 uena humeralis quando secunda 64,4,19  
 uena in loco inflato non secunda 165,3  
 uena in quibus non sit secunda 130,4,28  
 uena interna in quibus tendenda 64,4,21  
 21  
 uena uena magnam oculi angulum, &  
 que in fronte est felix, quibus acciden-  
 tur affibus 997,55  
 uenam canem in facibus in arteriam uen-  
 nesam peruenit, atq; hanc in magnam  
 arteriam 307,12  
 uena media quando operienda 464,21  
 uenam sepius in eodem incidere non ex-  
 pediat 1000,47  
 uena nre admodum puris neq; scilicet  
 secunda 8,1  
 uena pratergressa umbilicum in fimo he-  
 patis inferiatur 305,48  
 uena portis duplex 121,20  
 uena portis que 319,37  
 uena refracta in maribus confert capitis  
 doloribus 1206,12  
 uenarum aliter perceptantium cubitum  
 confederatio 144,12  
 uenarum arteriarumq; generatio 109,22  
 22  
 uenarum arteriarumq; in conceptibus co-  
 sideratio 148,39  
 uenarum cubiti que in quibus affibus  
 sunt secunda 996,36  
 uenarum hepatis explendatio 766,9  
 Interiora thoracis perscrutantem con-  
 sideratio 144,4,1  
 uenarum inter uentriculum & hepatis  
 plex ministerium 86,4,3  
 uenarum mifericordiarum inaequalis distri-  
 butio 320,4  
 uenarum nutritio unde 34,1  
 uenarum opus ad quibus casus uariis pos-  
 sit 445,52  
 uenarum radialis iecur 342,24  
 uenarum tumor quando plenitudinem fon-  
 gignit uentrici 700,26  
 uenarum tunice sanguinem gignere ne-  
 quunt 340,64  
 uenarum usus 199,35  
 uenarum usus cerebri & cordi gignen-  
 dis necessarius 106,57  
 Venas corruptas regeneratasq; uoluit  
 Galenus 111,62  
 uenas habiles angustas impatientes sunt  
 iudicis 49,9  
 Latas habentes facili-  
 ter cito dissolunt 49,11  
 uenas secantibus qualem longissimam re-  
 dundum ab arteria 164,65  
 uena testicularis 112,18  
 ueneno exindi, quale fortioriter corpus  
 77,68  
 Venere uoleptatis appetitibusq; con-  
 se in matris & instrumentis quoq;  
 est 300,57  
 uenarum ex usu redditus imbecilliores, ad  
 excludi, aut refrigerari, qui retentis  
 corrigi debent 453,48  
 ueneri tempus aptum quod sit 830,64  
 uenis ad uentriculum & interstima peri-  
 uenibus in se uis fonsifica 321,36  
 uenis arteriosis cur tunice duc tribu-  
 unt 24,23  
 uenis communicari pulsum & respira-  
 tionis usus 213,40  
 uenis cubiti ebulliens, possimus in uena  
 ab eis distilla fieri 996,48  
 uenis in se faciles fonsifica 74,13  
 23,1  
 uenis in sinu hepatis felis subditae sunt  
 arteriae 321,19  
 uenis lateribus prae dictis alioforti sunt  
 angustioribus frigidiores 4,1,60  
 Venter animalibus est, quod arboribus  
 terra 338,54  
 uenter crassus baud parit subtile me-  
 tite 361,46  
 uenter cur circa cibos contrahatur 87,42  
 42  
 uenter chorici per uenas mifericordie fi-  
 bi alimendum trahit 89,12  
 Hepati  
 alimendum praecogit 125,6  
 uenter quibus in ore ueneratur 85,16  
 uenter tard magis sequenti tempore a-  
 stringatur, quam magis sacri fusa-  
 tis 470,17  
 uentrem tunc solentia 470,12  
 uentriculi aduersus symptomatica que  
 666,38  
 uentriculi actio propria est concedio  
 226,47  
 uentriculi affibus medicamenta Anbi-  
 gnis 115,34  
 uentriculi affibus siccis, reddit totu cor-  
 pus gracilis 88,62  
 uentriculi alteratio ex calido & frigi-  
 do curati facillima 850,60  
 uentriculi ad frigidum alimendum usq;  
 refrigerari medicamentum 651,15  
 uentriculi calidi indicia 821,34  
 uentriculi cerebri anteriores, grandiores  
 191,51  
 uentriculi cerebri tres ibid. 55  
 uentriculi exaltati pus, tunc progna-  
 de dicuntur quoniam uenit 869,50  
 uentriculi facillime quatuor nutriti-  
 uis instrumentis 85,19  
 uentriculi frigidum affectionem signifi-  
 cat, praesens nihil sitre 1210,31  
 uentriculi frigidi indicia 821,41  
 uentriculi similes in dextra animae par-  
 te, in dext. ab hepate calidi 319,19  
 uentriculi gallioacet anferunt; praesentia  
 tiffini 409,16  
 uentriculi grauidus laborantis ob de-  
 fluxum dum uis ad caput descendit  
 est ciuatis 857,18  
 uentriculi humiditatis notae 825,20  
 uentriculi intemperantiae corrigende  
 sunt contrariis 886,60  
 uentriculi interna uenae uisio 85,1  
 uentriculi morbi duplex 681,40  
 uentriculi morbi unde cognoscendi  
 827,26  
 uentriculi motus 217,19  
 uentriculi orificium superius cur infirio-  
 re latius 219,15

ventriculi retentrix **Ex** palpitrix facili-  
ter 678, 48  
ventriculi fieri indicia 835, 25  
ventriculi status proximus quis 420,  
41  
ventriculi temperati intertemperatiq; nota  
53,  
38  
ventriculi tertius tertius 220, 58  
ventriculi tertius, etiam gratia sui duplex  
220,  
36  
ventriculi tertius tertius tertius tertius  
tertius, que medicamentis possunt  
225, 25  
ventriculi tertius per quos mucus excre-  
tur 715, 37  
ventriculi tertius sunt usque 298, 27  
ventriculi tertius tertius tertius tertius  
tertius sunt per os tertius 225, 22  
ventriculo admodum fuso, **Ex** medius in  
caliditate preter naturam, que uetus  
ratio conuenit 835, 18  
ventriculo affluenti quid auxiliatur  
1102,  
25  
ventriculo affluenti que per os sunt fusi  
glenda 1253, 31  
ventriculo calido coarctate non capite frigi-  
do, quando succurrendum  
421,  
8  
ventriculo demittitur interdum bene-  
fici per eundem uetus, per quos tripe-  
tis sunt tertius tertius 704, 62  
ventriculo due sunt tertius 835, 46  
180,  
18  
ventriculo frigido, in quem pituita descen-  
dit a capite, quando succurrendum  
421,  
44  
ventriculo infanti quatuor naturales faci-  
litas 215, 37  
ventriculo fuso **Ex** frigido redditis,  
que uisiones conueniunt 814, 13  
ventriculo fuso, medicis refrigeratis,  
que medius ratio debetur Ibid.  
26  
ventriculo soli sensum indigentia con-  
tinet natura, **Ex** quare 218, 46  
ventriculo stomacho affluenti, solis latus  
extremum quibus ab affluenti exigi-  
tur 978, 43  
ventriculo esse uelati promissarium co-  
mune omnium partium rationem corporis  
217,  
35  
ventriculo infirmum que roborat  
894,  
34  
ventriculo qui habent biliosum facilius  
ebrius concoquant corrupti diffusi-  
les 363,  
39  
ventriculo roborantia 966, 31  
ventriculo affluenti, ebrius in uapores in-  
dorosis corrumpit 685, 13  
ventriculo affluenti, quales pulsi efflu-  
ent 602, 18  
ventriculo alium qualitatem respicit  
83,  
51  
ventriculo anserinum succosissimum  
228

ventriculus cerebelli cur anterioribus mi-  
nor 256, 17  
ventriculus cerebri posterior maximus,  
ab anterioribus per insignem meatum  
antrum spiritum recipit Ibid. 7  
ventriculus cerebri iuxta **Ex** dextera  
293,  
9  
ventriculus cerebri tertius Ibid. 14. In-  
ter duos priores **Ex** quartum poste-  
riorem, per breue meatus Ibid. 61  
ventriculus ebrius completitur totus  
81,  
30  
ventriculus cibi excipiendi conditus  
177,  
56  
ventriculus crassus ac carnosus melius co-  
qui grauiori 229, 40  
ventriculus cur oblongus 219, 10. Dicitur  
habere nodos inter se differentes, ra-  
tione diuersorum uisuum 224,  
10  
ventriculus id quod continet totum com-  
pletitur 221,  
1  
ventriculus imbecillus, nisi corroboretur  
cibo, recipit totum corpus excremen-  
ta 44  
400, 2  
ventriculus imbecillus non rebus conco-  
quit 835, 9. Intemperie laborans ca-  
lida, non bonitate medicis, facili  
frigida potione curatur 885, 23  
Nutrimenti inopia impletur excrementis  
biliosis et feris 87, 16  
ventriculus promissarium ciborum  
674, 16. Quare rotundus 219,  
24  
ventriculus quatuor inferat inferibus  
atque uetus 673, 38  
ventriculus quibus inflammatio non con-  
coquant 516, 3  
ventriculus que per os excrementa con-  
coquant 381, 12  
ventriculus sui ipsius causa nutrimentum  
suscipit 464, 47. Sin gratia tantum  
circa cibis contrahit 243, 3  
ventriculus trahit uel rebus, transuersus  
expellit cibum **Ex** potum 219, 47  
ventriculus, uetus, **Ex** infirmus, quales  
prebeant nutrimentum 395, 10  
uentris differentia pro ciborum differen-  
tiis a natura constituta 178, 14  
uentris mergi nullus usus 1137, 13  
uentris partes unde **Ex** quando gignun-  
tur 123, 38. Eius presens quid au-  
xilium 1021, 20  
Vetus immoderate, spermatica organa  
uide debilitat, **Ex** cur 114, 9  
uetus que somnum excipit, a florenti-  
bus excreta 418, 57  
uetus quatenus sit salubris 830, 60.  
Quibus inuertia 476, 16. Reddit  
corpus laetius, frigidi, imbecillus et  
ficus 45, 15. Sicut **Ex** frigida tem-  
peramentis inuicissime 475, 16,  
476,  
12  
Veraces esse non possunt, qui magnetem  
ardet frequentant 420, 23

uerari facilius **Ex** spiritus 1079, 15  
uerarum dicta conuenit, homines ene-  
cat 602, 12, 1038, 51. 1272,  
10  
uerarum epotes, quem facit pulsus  
579,  
33  
uerarum uigilant faciem melancholicam  
elicit 1119, 25  
Veridici spiritus **Ex** facilius que 1212,  
21  
Veridice recte facilius 2106, 16  
Veridice ut mouetur 681, 65  
ueris temperantiam in medis omnis ex-  
cessus consistit 404, 46  
ueritas omnis odium parit 410, 62  
ueri medij temperamentum 4125, 3755  
37  
uer medium, temperatissimum, quo tem-  
pere corpora optime habent 569,  
24  
ueris later quid excreti 1097, 3  
ueris per omnia uariis medicamentis  
955,  
4  
ueritatem corpus trahit spiritum prius  
est 257, 16  
uer non descendit ad idem **Ex** humidum  
44,  
5  
ueritatem curatio 955, 16. 1108, 43  
uer saluberrimum 404, 29  
ueritatem ad costas duodecim 124, 40,  
Ad hunc quousq; Ibid. in collo fr-  
pice Ibid.  
ueritatem spiritus medulle inuicissimum  
250,  
43  
ueritatem superiores decima, arduus pro-  
ductionis habent conuenit: delectus  
autem, conuenit: inferiores autem de-  
cima, conuenit 289, 17  
ueritatem totius spiritus uigilantissimum  
223,  
53  
ueritatem contritus diuisio 124, 35.  
Eorum forma angustiora sunt per  
latus Ibid. 14.  
ueritatem humiditas 292, 56. Liga-  
mentum Ibid. 51  
ueritatem primam cur latitudine ma-  
xime 287, 8  
ueritatem processus 114, 60  
ueritatem affluenti cur rare simul **Ex** conueni-  
sa 244, 7  
Veriginis causa 746, 8  
ueritatem ad cerebrum pertinet Ibid. 2  
ueritatem unde affluenti 1022,  
1022, 6  
ueritatem illis excreta Ibid. 5  
ueritatem clausi perit ab seque masculo  
211,  
2  
ueritatem caliditate lapidis indicia  
723,  
26  
ueritatem caliditate lapidis conuenit  
723,  
41  
ueritatem calidos que conuenit 1100, 4  
ueritatem ad propria que 772, 41  
ueritatem illis inuicissimum, argenteum  
Ibid. 60  
ueritatem





## I N D E X.

- ulcera curantur arietat ab extremi col-  
faxantibus atq. refrigerantibus 354, 32
- ulcera igni adestis quid inest 112, 34
- ulcera maligna sunt arietat que sunt 117, 3, 49
- ulcera maligna, qualis medicamentis con-  
gant 971, 49-517, 7, 3
- ulcera maligna quid periculis 112, 31
- ulcera maligniora, ulcerantur requirit re-  
media 117, 3, 19
- ulcera non sunt exasperanda prius quam  
corpus unctum sit purum 858, 33
- ulcera que sanescere prohibent ibi, 38
- ulcera quomodo sint tractanda 1:70, 38
- ulcera transieris diligentius quam rella  
inagenda sunt 856, 18
- ulceribus contumacibus aduersantur cum  
aleis non ariet 1170, 31. Eius 117, 3, 53
- ulceribus contumacibus phormica tem-  
perata deservit ibid, 62
- ulceribus dyspeptosis atq. malignis me-  
dicamentis conueniens 1114, 22
- ulceribus frigida morlex 1019, 49
- ulceribus incipientibus posteriora esse astra  
gentia 1151, 17
- ulceribus internis partium que me-  
dicamentis praeferat 864, 48
- ulceribus intractatis que praeferat  
1091, 63
- ulceribus nihil humectans est utile 1151,  
38
- ulceribus qui ratione medicamentis me-  
dicantur 1169, 30
- ulceribus ut desiderari pharmaca, quot  
ipsarum sunt sufficientes 1169, 14
- ulceri casu que medicamentis conueniunt  
1174, 1
- ulceri curando que requiruntur 857, 3
- ulceri recenti capitis in ex eo statim flu-  
at sanguis 861, 1
- ulceris casu curatio 833, 15
- ulceris casu curatio duplex scopis  
849, 19
- ulceris casu generalis curatio 1155, 27
- ulceris casu uicis incurabilis curatio 1173,  
22
- ulceris deligendi ratio 856, 16
- ulceris diuturnitas est fuci uisus indicio  
859, 31
- ulceri si adit tumor, in primis curandus  
est 855, 29
- ulceris inflammato curatio 857, 39
- ulceris labra quomodo excidenda sunt  
857, 3
- ulceris propria curatio unde prescriba-  
tur 854, 47
- ulceris pulmonem, effere arietis et  
facionem deservit 713, 30
- ulceris rotuli in parte fella, curatio  
936, 10
- ulceris simplicis differentiae proprie non  
de sumenda 855, 39
- ulceris ferdia et casu curandi ratio
- Ibid. 6
- ulcerum curandorum consilia uniuersa  
1157, 35
- ulcerum curatio immutatur plurimum per  
singulas animalis partes 868, 57
- ulcerum malignorum fenum scopis quis  
1171, 10
- ulcerum nomina uaria 845, 16
- ulcerum tempora que curat que 710, 46
- Ulcus canon in sano corpore curandi ra-  
tio 810, 35
- ulcus cum canon bene plenum qualis nam  
remedia possident 852, 60, 153, 8,  
859, 31, 861, 42, 971, 47
- ulcus curandum contrariis, corpus autem  
ulcerantur similibus 1156, 40
- ulcus cicdo, part. quibus sit abluendum  
973, 57
- ulcus in humidiori natura minus steten-  
dum: in faciori, uicententius est  
852, 64
- ulcus non potest curari nisi caro subleui-  
pro nam di modo se habeat 854, 13
- ulcus quid 12, 60, 84, 5, 12, 35, 42
- ulcus simplex omne non facit in astra-  
gi debet 852, 59
- ulcus simplex solum agglutinationem de  
solvat 851, 63
- ulcus uicemum crassiorum, intestinorum  
quomodo dignoscendum 716, 61
- ulcus unde fiat 763, 61
- ulcus uicentis solatio 64, 30
- Ulcus faciles 1150, 19
- Ulcus corat duobus ostibus 98, 33
- ulcus extremitati figura 107, 42
- ulcus pectore recta Ibid. 11
- ulcus quatuor motus 104, 30
- Ulysses iracundiam ratione uicentis  
116, 31
- Ulyssis in ancillas exanderfentia 535,  
59
- Umbilici arteria uicelo inter-  
ceptis, arietis que in secunda habetur,  
pulsu deservit 540, 24
- Umbilici regio, totius corporis aduersionem  
uerba 1111, 31
- Umbilici uasa quatuor 105, 3
- Umbilici uicentis uicentis 1059, 15
- Umbilici: quid 102, 58
- Uncia Antwerpensis Romanorum  
fusa, Colemanica, Romanorum superant  
tribus obolis 1190, 156
- Uncia quatuor octo drachmis 1154, 159
- Uncia 1160, 151
- Uncia Hippocra, Romana obolis duo-  
bus est maior 1190, 154
- Uncia libra est duodecimae pars 1169,  
66
- Uncia uicis medicinalis 1191, 11
- Uncia Parisica, Romana est minor in-  
terea fere drachma 1190, 15
- Uncia Veneta, Romana est minor fere se  
spedratone 1191, 2
- Uncia ex oleo obstat, quo minus digerit  
ut et resoluatur fuci 841, 11
- Unguentum ex populo manducatum fa-  
gende 481, 49
- Unguentum roborantem uicentis 480,  
19
- Unguentum quibus esse debeat 419, 39
- Unguentum uicis arietis ad postea 1010, 7
- Unguentum quatuordecim est index 6091,  
46
- Unguentum faciles 187, 4
- Unguentum calcificanda sunt in duplici  
se 893, 19
- Unguentum omnia liquenda sunt in duplici  
uase 1165, 18
- Unguentum relaxantia 451, 24
- Unguentum de dyctro preparatio 1173,  
16
- Unguentum solatio 480, 23
- Unguentum stratum Ibid. 25
- Unguentum ad apprehendendum opit digi-  
taria formetibus arietis 156, 13
- Unguentum cur medicamentis duri 197, 19
- Unguentum cur semper augentur Ibid. 10
- Unguentum rotandi formetibus gratia fedi  
Ibid. 16
- Unguentum oculi 709, 60
- Unguentum oculi primaria ratione pupillum  
obstat 670, 11
- Unguentum augentum in lingua uicentis  
197, 35
- Unguentum capillorum arietis uicentis  
1118, 15
- Unguentum consideratio 165, 4
- Unguentum genus gratia cui quod melius  
est conditum 197, 16
- Uncia, in paribus instrumentis solu-  
ti, est impossibilis 814, 23
- Unguentum carnis solue, que praeferat  
Ibid. 17
- Unguentum praeferat nature Ibid. 12
- Unguentum solatio 856, 40
- Unguentum solatio communis meritis simi-  
lium et instrumentum parient  
12, 48
- Unguentum la singulis praefertissimum 541, 1
- Unguentum pluribus contrarium dicitur  
10, 10
- Unguentum quid 116, 65
- Unguentum esse, quod secundum naturam est  
459, 45
- Unguentum que efficiunt 715, 51
- Unguentum qui efficit uicentis Ibid. 10
- Unguentum impedit autem, ob inflama-  
tas affluunt circa uicentis aut a-  
fuerant arteriam uicentis, quibus ali-  
bus et medicina ratio conueniat  
1141, 1
- Unguentum interceptis arteriis Crisidis  
1142, 19
- Unguentum necesse est faciem moder-  
146, 13
- Unguentum arate gratia causa 816, 39
- Unguentum lenis et effere cause Ibid. 19
- Unguentum magis uicentis et parietis causa  
Ibid. 17
- Unguentum materia effluat 150, 35, 151, 68



# EPITOMES GALENI

141,60. 33,143. 738,10.  
 755. 39  
 uacu organa 754,49. 1240,16  
 uocem prout in Larynge formari 244,1  
 41  
 uacu propria instrumenta que 738,15  
 uacu uocis causa 755,13. 816,13  
 Vela manus cur glabra 51,1  
 uelut manus musculus 152,42  
 Valvula biliofus congruentia 390,4.7  
 uolucrum carnes que factus aggruue  
 equantur 397,57  
 uolucrum manus cuius sit facultas 1300,0  
 58  
 Voluntas equi similes 489,38  
 uoluntas querens respirationis sui causa  
 48,1 36  
 Voluptas non in bonis ponenda 310,17  
 uoluptas quando fit 671,25  
 uoluptas quid 730,43  
 uoluptas uisum stimulant potui dis-  
 solvere 214,15  
 uoluptatis habent similitudinem inter se  
 communem autem secundum ge-  
 nerat 354,18  
 uoluptatis que sequenda, que fugien-  
 da 354,16  
 Voluntas causa 616,18. 770,45  
 uoluntas afficitur uix liberatur 700,44  
 uoluntas qualis afficitur libid. 39  
 Voluntas incepti qui 1002,44  
 Vomere nemo nisi ad uenteris proci-  
 uis, tegridus 716,16  
 uomenta cur non intendem per cruditates  
 lassitudinis copulatas 461,43  
 uomenta quomodo agri preparandi  
 1002,39  
 uomenta que ratione olim sanguis men-  
 sibz uenteris promouebat 216,50  
 uomenta quando uidentur 461,60  
 uomenta ante cibum quibus conducit  
 478,1  
 uomitus a quibus casu mouentur 81,  
 51. 681,10  
 uomitus quibus et per que prouocan-  
 tur 886,59  
 uomitus signa que sint 644,10  
 Vox cogitationum mentis notitia 31,  
 13  
 vox fieri non potest nisi in aëre sit en-  
 gressor 245,60  
 vox fit breuiter tantu, quando decreuit of-  
 flatio 118,9  
 vox principalissima uentum animæ aëre  
 314,1 12  
 vox que ex causa perire ad uisum posuit  
 754,1 71  
 vox quando in uocem et magnitudinem  
 uicium 755,6  
 vox quando intercipitur 1240,13  
 vox quæ ratione efficitur 323,13  
 vox quibus periret 674,55  
 V. R. A. G. O. S. 105,6, 131,44  
 Verities quid 227,12  
 Verities una despectu constant 214,32

uerritron oblique inferentis usus 231,  
 4  
 uerritron uisum intra uisum opera-  
 la 181,36  
 Vrina alba, cruditate indicat 439,  
 37  
 urina apesa et tenuis quid indicet  
 437,30. 616,40  
 urina cruda que 616,31. 711,12  
 Vrinaculi usus 506,5  
 urina que apparet nobis frigida in bel-  
 uis 1030,61. 1032,2  
 urina farine bordeatque similis quid si-  
 gnificet 637,12  
 urina color, exercitij temporis est nota  
 439,1 36  
 urina excreta à quibus fiat 724,10  
 urina excretio ut fiat 306,12  
 urina humane facultas 1131,11  
 urina humoris potione multo persilienti  
 merbo liberata sunt libid. 20  
 urina leuiores representantes, fursore  
 e. q. quid notent 627,15  
 urina uicinas ex quibus occasio ab-  
 strahit 690,46  
 urina permutatiois species uarie  
 437,1 40  
 urina principalis spectanda in febribz  
 614,1 29  
 urina purganda cur duo instrumenta,  
 alia excrementis purganda tantum  
 uicem cum sit 227,40  
 urina que habeant rationem subsistanti-  
 617,1 1  
 urina que in uiris ac mulieribus et que  
 in parvis sunt extrahit libid. 54  
 urina redditio inuoluntaria quando ac-  
 cidit 771,35  
 urina subrose, sublaue, et subnigra  
 617,1 54  
 urina suppressa causa 771,27  
 urina suppressa uariis causationes, pro  
 diuersitate casuum 106,15  
 urina furas cur per uisum collum ad ex-  
 cernatur 106,39  
 urina humane omnium indurabilia 1131,  
 10  
 urina indurata concoctionem que fit in ue-  
 nis 614,5  
 urina in epidermide qualis 956,42  
 urina intermittens febrium singulis  
 propriis 959,60  
 urina letalis que 721,15  
 urina lutea, farida, et oleaginosa unde  
 627,1 50 41  
 urina modice pallida quid indicet 419,  
 17  
 urina que prouocant 961,14  
 urina secreta à sanguine per renem in  
 uisum deiciunt 436,18  
 urina nigra cur pessima 617,10  
 urina nigra peroxide ut sputum nigrum,  
 mercuri deiciunt 621,14  
 urina omnis facultate est calida 1131,6  
 urina optima ab humoribus putrefacti-  
 bus, aut pessima qualis 785,6

urina optima que 616,8. et 49,  
 627,31. 721,6  
 urina pallida et suppurata que 616,  
 47  
 urinae erudum persona que ibid.  
 39  
 urinae uicinas medum inferit 129,50  
 urina rasa quid significet 419,19  
 urinae horridorum differentia triplex  
 616,1 19  
 urina sola indicat naturam humorum in  
 uenis delescentium 456,7  
 urinae quid prouocet 1099,4  
 urina succorum que in uisum continentur,  
 sola 457,12  
 urina suppressa ob resolutionem exercendi  
 uim quomodo exprimitur 721,36  
 urina suppressa, que sint consideranda  
 721,1 4  
 urina turbida quid indicet 457,33  
 urina unde suppressa 690,15  
 Vrina aliam dicitur 389,29  
 urinae facultas 1068,8  
 urina extrahit uerritron libid. 5  
 urina subacti aliam tollatione magis  
 quam purgatione libid. 10  
 VSTORVM differentia 1114,32  
 Vfus incrementa uiri remissiones, ex calidi-  
 do et frigido constantur 584,11  
 usus partis quid 318,6  
 usus pulsuum abundantia caloris aug-  
 met, uiri ex quo animalis spiritus  
 363,1 45  
 usus pulsuum quando uirget 562,38  
 VTERI afficitur sine eius primum  
 febribz contingens causa 777,5  
 uteri effluuium differentie sunt plurime  
 774,1 28  
 uteri collum masculinum, naturæ carne  
 cartilaginea 104,32  
 uteri contractio 103,47  
 uteri conuulsio et relaxatio opportu-  
 na 678,16  
 uteri corpus à quibus causis durari pos-  
 sit 693,16  
 uteri duritiei quid accedat 1090,19  
 uteri erosio magna ex parte in cernit et  
 tingit 778,12  
 uteri inflammationi hauserit uenis in cru-  
 re sedis 907,18  
 uteri locus affectus quomodo conuulsi-  
 dus 777,31  
 uteri moderati magnitudine que 103,25  
 uteri natura et operatio 82,25  
 uteri effluuium triplex causa 86,18  
 uteri et conuulsi et in conceptione, et  
 dum pbelemente affligit 22,48  
 uteri peruersiones ad menstrua sequuntur  
 suppressa 777,1  
 uteri praudentia in propellendo furta  
 81,1 50  
 uteri stomachus, uia est partes et feminis  
 86,1 37  
 uteri suffocatione affligit per arterias  
 tantum sui persisteret 1266,41  
 uteri

uteri suffocatione periclitantes, quibus ut utatur 1119, 14	uteri infirmitati adione inuenta 251, 47	uicium passorum que, quide et quanta corpori alimentum prescient 182, 8
uteri suffocationes que sequuntur sym- ptomata 1266, 16	uoluntas partium cognita facit diuer- gos interpreses 120, 28	uicium passorum que presstantores 111, 61
uteri suffocationis causa ibid. 45	utilitatis partium cognita facit ad cogni- ferendas effectus 130, 17	uicium essentia uaria ratio ibid. 10
uteri suffocationis curatio 966, 10, 49	¶ V V A. aspera, acida, acida et q. fa- ciles 181, 15	uicium fuit gurgulio aut colicilla cunctis ad uicium conuincendum 176, 8
uteri suffocatio quibus contingat, et que de causa 774, 19	uicium dulces quon non habeant ibid. 12	uicium articulationum rudiunt carceris 160, 39
uteri uicium 104, 1	uicium generose que sunt ibid. 17	uicium nullum ex pinguis medicamen- tis aduocandum 972, 48
uteri uicium 146, 15	uicium minus auri quam fides deferendum uolenter 180, 63	uicium 22, 55
in Vero facultas reuoluitur et expulsiue ceruicis 112, 65	uicium non meturescent in frigidis regi- bus 112, 4	X ANTHI 111 1092, 29
uterum constituitur due uicium obfusum posuit 104, 16	uicium posse feminis expertes creuant in Cilicia ibid. 1	Xenophonitis milites 166, 58
uterum in conceptione ad pudendum pro- uenit, feminis ad fiat obusum 107, 20	uicium posse si stringentes non sunt, non conducitur leni et hepatis uicibus 118, 21	Xenon canis sui facultatis 1098, 31
uterum uicium asseum et uicium uicium reuoluitur 103, 15	uicium posse uicium 1073, 20, 1156, 15	Y dactylis 169, 8
uterum non prestat arteris secundarium motum 140, 18	uicium posse, uicium uicium uicium 112, 15	Z E A et cypha idem frumentis gravis 415, 59
uterum progreuationem crepiscit 104, 49	uicium que magis uicium, et promptius deriuantur 111, 14	Zeta fuit spica, media inter bot- dum et tritium 174, 16
uterum que ratione uicium uicium uicium 776, 18	uicium uicium facultas ibid. 11	¶ ZINGIBERIS facultas 1080, 40
uterum, uicium uicium, desiderio prolii affli- ctus 106, 27	uicium non abscondenda radices 176, 17	zingiber quid 460, 16
utile theorema quomodo dignoscatur 10, 33	uicium quid 695, 8, 708, 52	zingiber a effa 272, 58
utilitas omnibus prima ob adione ac- cedit, secunda a partibus 111, 17	uicium passorum discretio et ferula 112, 24	Zygoma quid uicium 111, 35, 1112
utilitas partes non nisi exponitur, nisi 10	ut 112, 54	Zyphi facultas 1080, 61

F I N I S.

BASILEAE PER THOMAM GVARI-  
NVM, ANNO SALVTIS HVMANÆ  
M. D. LXXI.





